



Nº 13863





**DE CANDOLLE**

---

**PRODRMUS**  
**SYSTEMATIS NATURALIS**  
**REGNI VEGETABILIS**

**PARS XI**

**T Y P I S C R A P E L E T**

VIA DICTA DE VAUGIRARD, 9

DE CANDOLLE

---

PRODRMUS  
SYSTEMATIS NATURALIS  
REGNI VEGETABILIS

SIVE

ENUMERATIO CONTRACTA  
ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM

HUCUSQUE COGNITARUM, JUXTA METHO LI NATURALIS NORMAS DIGESTA

EDITORE ET PRO PARTE

AUCTORE

ALPHONSO DE CANDOLLE

PARS UNDECIMA

Sistens præsertim Acanthaceas et Verbenaceas



PARISIENSIS

SUMPTIBUS VICTORIS MASSON

PENES STUDIORUM PUBLICORUM MINISTERIUM SOCIETATUM ERUDITARUM BIBLIOPOLIA

FORO DICTO DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE

VENITQUE APUD EUMDEM LIPSIÆ, PROCURANTE L. MICHELSSEN

XXV NOVEMBRIS M DCCC XLVII

D 221 P

Ex.

SIGNORUM PRODROMI EXPLICATIO.

- Planta monocarpica duratione ignota.
- (1) Planta monocarpica annua.
- (2) Planta monocarpica biennis.
- (3) Planta rhizocarpica, seu perennis herbacea.
- (4) Planta lignosa, cujus magnitudo est ignota.
- (5) Serrutex, nempe planta lignosa cuius altitudo ad summum bipedalis.
- (6) Frutex, nempe planta lignosa, a basi ramosa, plns quam bipedalis.
- (7) Arbuscula, nempe planta lignosa, trunco donata et infra 25 ped. altitudinis.
- (8) Arbor, nempe planta lignosa, trunco donata et 25 ped. superans.
- (9) Scandens.
- (10) Planta seu flos masculus.
- (11) Planta seu flos feminus.
- (12) Planta seu flos hermaphroditus.
- (∞) Numerus indefinitus, sic evula  $\infty$ , id est plurima non numero definito.
- ? Signum dubitationis.
- ! In synouimia ant loco natali indicat specimen ab auctore ipso aut viatore inscriptum.
- v. s. c. Visa secca culta.
- v. s. sp. aut v. s. Visa secca spontanea.
- v. v. sp. aut v. v. Visa viva spontanea.
- v. v. c. Visa viva culta.
- v. in h. Visa in herbario.



---

# PRODROMUS

## SYSTEMATIS UNIVERSALIS

### REGNI VEGETABILIS.

---

Ordo CXLIV (1). OROBANCHACEÆ (2) *Lindley introduct.*  
ed. 2 p. 287 *Veg. kingd.* p. 609. — Orobanchæe *L. C. Richard in Pers. enchir.* 2. p. 180. *Juss. in Ann. Mus.* xii. p. 445. — Orobanch. gener. *Wallr. οἰασκευὴ Francof.* 1825. p. 28. *Bartl. ord. nat.* 173. *C. A. Mey. in Ledeb. fl. alt.* 2. p. 287. *Endl. gen. pl.* 725. *Meisn. gen. pl. rasc. diagn.* p. 314. — Orobanchinæ (Personatarum sectio) *Link handb.* I. p. 506. — Orobanchideæ *Dumort. anal. fam.* p. 23.

Flores hermaphroditi, rarissime unisexuales, irregulares. Calyx liber, persistens, 4-5-sepalus; sepalis in calycem gamosepalum 4-5-fidum, vel per paria in partes laterales apice integras vel bifidas coalitis. Corolla gamopetala, hypogyna, pentamera vel lobis supremis coalitis tetramera, supra basin circumscissa emarcida persistens, aestivatione imbricata, tubo tubuloso vel campanulato plus minus arcuato, limbo subregulari vel saepissime bilabiato, labiis inæqualibus, superiore integro galeato vel plus minus emarginato bilobo, inferiore trifido, ad faucem saepissime biplicato bigibboso, plicaturis glabris villosisve. Stamina 4, didynamia, tubo corollæ inserta. Antheræ biloculares, persistentes, loculis basi saepius calcarato-cuspidatis rimâ longitudinali vel poro oblongo basi dehiscentibus. Ovarium liberum, disco carnoso unilaterali saepius obsoleto aut in glandulam anticam producto cinctum, uniloculare placentis parietalibus utroque latere ovarii geminis distinctis aut geminatim coalitis, vel placentis duabus e pariete porrectis late bilobis. Placente erga axim inflorescentiæ laterales. Ovula plurima, rarissime pauca, anatropa funiculis brevibus vel interdum longiusculis. Stylus terminalis, simplex persistens vel deciduus, apice inflexus vel rarissime rectus.

(1) Convolvulaceæ, in vol. 9, numerum CXXXVII pro CXXXVIII errore habuerunt; inde Ericyneæ ordo GXXXIX, Boraginæ CXL, Hydroleaceæ CXLI, Solanaceæ (nondum editæ) CXLII, Scrophulariacæ CXLIII et Orobanchaceæ CXLIV.

(2) Auctore cl. Reuter, Genevensi, herb. Boissier custode.

Stigma magnum, capitato-bilobum, lobis placentis superpositis aut antice et postice sitis, nunc obscure medio sulcatis, rarius subclavatum, indivisum. Capsula unilocularis, apice vel juxta totam longitudinem bivalvis, nunc valvis erga inflorescentiam lateralibus apice et basi cohaerentibus antice et postice in mediâ parte longitudinis aperta, valvis medio vel saepius juxta medium placentas solitarias vel geminas, filiformes vel dilatatas gerentibus. Semina plurima aut rarius pauca, minima, subglobosa, oblonga vel pyriformia; testâ crassiusculâ, fungosâ, scrobiculatâ vel interdum tuberculatâ; raphe et chalazâ obsoletis; endoplevrâ tenuissimâ, albumine copioso albo pellucido arte cohaerente; embryone minimo, obovoideo, prope umbilicum sublaterali, apice integro vel subbilobo. — Herbae fibrillis radiciformibus e caudice ortis aliarum stirpium radicibus adnatae; caudice hypogaeo, nunc incrassato, subtuberoso, nunc cylindrico, ramoso, squamis obtecto, apice scapum solitarium vel plures simplices ramososve, nudos, pedunculiformes vel saepius crassos, carnosos, squamis vestitos, semper coloratos exserente. Squamae foliorum loco, scapo concolores, sessiles, sparsæ vel imbricatae. Stomata rara. — Flore et habitu Scrophulariaceis, mediante Hyobanche, affines; situ frequenter (1) laterali lobi oris calycis, ovario 1-loculari et seminibus Gentianaceis (monente cl. Lindley) proximæ; nec non Cyrtandraceis praesertim Loxonieis et Gesneriaceis valde propinquæ ex ovario uniloculari et capsulae dehiscentiâ; sed a prioribus albumine copioso, a posterioribus ovario libero et fructu semper capsulari diversæ. — De anatome radicis, haustorum, caulis et foliorum in Lathraea et Clandestinâ confer ad observationes Sutton in Trans. linn. soc. 16. p. 399. t. 22 et 23 Duchartre in Ann. sc. nat. ser. 2. v. 20. p. 145; de germinatione, adhuc vix notâ, ad Vaucher Monogr. des Orobanches, in-4°, Genève, 1827. p. 8. t. 16; de anatome florum et capsularum, ad Gærtner fil. carp. 3. t. 185, Endl. ic. gen. t. 72, 80 et 81, Putterl. et Endl. gen. pl. fl. germ. fasc. 23.

### CONSPPECTUS ORDINIS.

*Epiphegus*. — Flores polygami, inferiores feminei, superiores hermaphroditi steriles. Calyx bibracteolatus, 5-dentatus. Stylus deciduus Capsula corollâ emarginata calyprata, incomplete bivalvis.

*Phelipaea*. — Flores hermaphroditi. Calyx bibracteolatus 4-vel

(1) Diversitas in situ lobi stigmatis a cl. Reuter observata, jamque in Irdeis cognita, illustri Brown in Horf. pl. jav. rar. part. 2. p. 110 et 112 sententiam confirmat de coadunatione varia lobi stigmatis et situ antico et postico carpellorum in praesenti ordine. (Alph. DC.)

5-fidus. Ovarium antice glandulâ hypogynâ stipatum. Stylus deciduus. Capsula unilocularis, apice bivalvis, valvis basi cohaerentibus.

*Conopholis*. — Flores hermaphroditi. Calyx bibracteolatus, ventrīcoso-tubulosus, spathaceus, antice ultra medium fissus. Capsula unilocularis, bivalvis.

*Orobanche*. — Flores hermaphroditi. Calyx ebracteolatus, diphyllos. Stylus persistens. Capsula unilocularis, incomplete bivalvis, valvis basi et apice cohaerentibus.

*Boschniakia*. — Flores hermaphroditi. Calyx tubulosus, ebracteolatus, subtruncatus, inaequaliter 5-dentatus. Capsula unilocularis, incomplete bivalvis, valvis basi et apice cohaerentibus, medio placentam gerentibus.

*Clandestina*. — Flores hermaphroditi. Calyx ebracteolatus, campanulatus, 4-fidus. Capsula unilocularis, apice bivalvis, valvis medio placentam linearem gerentibus. Semina pauca, 4-5.

*Lathraea*. — Flores hermaphroditi. Calyx ebracteolatus, campanulatus, 4-fidus. Capsula unilocularis, bivalvis, valvis juxta axim placentas geminas latas confluentes gerentibus. Semina plurima.

*Anopanthus*. — Flores hermaphroditi. Calyx ebracteolatus, subcampanulatus, 5-fidus. Capsula unilocularis, bivalvis, valvis intra marginem utrinque placentiferis.

#### *Genera affinia vel dubia.*

*Aeginetia*. — Flores hermaphroditi. Calyx ebracteolatus, spathaceus, laxus, antice fissus, postice acutus. Capsula bilocularis? irregulariter bivalvis, valvis placentiferis.

*Epirhizanthus*. — Flores hermaphroditi. Corolla trifida. Stamina 4-5, monadelpha. Capsula globosa, didyma, bilocularis, bivalvis, dissepimento e valvarum marginibus introflexis. Semina in loculis solitaria.

*Obolaria*. — Flores hermaphroditi. Calyx diphyllos bracteiformis. Corolla quadrifida. Ovarium uniloculare. Capsula unilocularis, bivalvis, valvis medio placentiferis. Semina plurima.

I. EPIPEGUS (1) Nutt. gen. amer. 2. p. 60. Endl. gen. p. 726, icon t. 80. — Leptamnium Raf. in amer. month. magaz. jan. 1819. — Mylanche Wallr. Orobanch. diascene 75. Orob. sp. Linn.

Flores polygami, infer. feminei, sup. hermaphroditi, steriles. Calyx bibracteolatus urceolatus 5-dentatus. Fl. hermaphr. Corolla hypogyna, tubo

(1) Cel. Nuttal nomen *Epifagus*, incaute e græco et latino depromptum, anno 1818 propositum, quod in *Epiphegus* (επί τι super et φυγός fagus) anno 1825 primus verisimiliter mutavit cl. Darlington in Florula cestrica p. 72. Rafinesque in Amer. month. mag. jan. 1819 (nec 1818 ut dixit Endl.) Epifagum barbarum denuntiat et ait (p. 194) se a longo tempore nomen Leptamnium propositum in Monographia Orobanchearum, sed hoc opus mihi et al. Asa Gray (notice bot. wright. of Rafin. in Amer. journ. sc. v. 40) ignotum. Rafinesque med. fl. 2. p. 237 Leptamnium Virginianum Raf. 1810 citat, sine designatione operis. Epiphegus non mihi placet, nam species nova generi accedens forsitan Fago mimic parasitica erit. (Alph. DC.)

compresso, labio superiore fornicato integro, inferiore trifido aequali. Stanina 1, corollæ tubo inserta, inclusa, subæqualia; antheræ biloculares, loculis basi discretis cartilagineo-mucronatis. Ovarium disco annulati obsoleti, uniloculare, placentis duabus parietalibus bilobis. Ovula plurima, funiculis longiusculis. Stylus simplex; stigma capitatum emarginatum-bilobum, lobis erga axim inflorescentiæ antice et postice sitis. *Fl. feminæ.* Corolla brevis, obsoleta 4-dentata, moy basi soluta, ovarium sub grossificatione calypratim tegens. Ovarium ut in *fl. hermaphr.* Stylus brevis. Stigma emarginatum. Capsula brevis ovata apice incomplete bivalvis, fissuræ anticæ profundius distinctâ, valvis medio placenteris. Semina plurima, oblonga, testâ coriacea. — Herba boreali-americana in Fagorum radicibus parasitica: caule immâ basi incrassato radiculos copiosas emitente, e basi ramoso squamis brevibus carnosis remotis vestito, ramis basi esquamatis, superne floriferis; floribus laxe racemoso-spicatis, inferioribus fructiferis corollis brevissimis, super. hermaphroditis corollis semipolicariibus angustis haud fructificantibus; bracteis squamæformibus pedunculum brevem aequalibus; bracteolis calyci adnatis bisidis, lobo antico minore postico dinidio calyce longiore.

E. VIRGINIANUS Bart. phil. 2. p. 50). *U?* In Virginiam, sylvis eollium prope Rutherfordton, Carolina sept. (Rugel!), in civitate Ohio (Frank!), in Canada et Novo Brunswick (Hook.). — Orobanchæ Virginiana Linn. sp. 882. E. americanus Nutt. I. c. Darlingt fl. eestr. p. 376. Hook. fl. bor. am. 2. p. 93. Endl. I. c. Mylanche Wallr. gen. Orobanchæ. 76. — Moris. Oxon. hist. sect. 12. t. 16. f. 9. (v. s.)

II. PHILIPPEA Tourn. cor. 47 (excl. sp.) Desf. fl. atl. 2. p. 60. C. A. Mey. in Ledeb. fl. atl. 2. 459. G. Don gen. syst. 4. p. 631. Meisn. gen. pl. vasc. 1. p. 311. 11. 225. Walp. repert. bot. 3. p. 456, non Phelypæa Thunb. — Orobanches sp. Linn. Wallr.

Flores hermaphroditæ, bibracteolati. Calyx tubulosus, 4-5-fidus vel dentatus. Corolla hypogyna, ringens, labio superiore erecto bifido, inferiore trifido patente. Stanina 4, corollæ tubo inserta, didynama, inclusa; filamenta basi complanata; antheræ biloculares, loculis basi divaricatis mucronatis, connectivo mutico vel mucronatum. Ovarium uniloculare, placentis parietalibus quatuor, geminatum approximatim. Glandula hypogyna obsoleta. Ovula plurima. Stylis simplex; stigma capitato-bilobum, lobis erga axim lateralibus. Capsula unilocularis, apice bivalvis, valvis basi cohaerentibus, juxta axim placenta geminas gerentibus. Semina plurima, subglobosa, minima, testâ fungosâ, crassâ. — Herbæ, aphyllæ, scapo simplici vel ramoso, in Europâ mediâ et australi, nec non in Asiâ finitimâ super aliarum stirpium radicibus parasiticæ, Orobanches habitu.

Sectio 1. TRIONYCHIUS Wallr. gen. Orob. p. 58. C. A. Mey. in Ledeb. fl. atl. 2. p. 460.

Calyx 4-5-fidus, lobis elongatis inæqualibus aequinatis. Antheræ superficie glabré, loculis villoso-dehiscentibus. Capsula stylis deidui basi coronata.

\* Scapo simplicissimo.

1 P. LANUGINOSA (C. A. Mey. in Ledeb. icon. fl. ross. alt. illustr. t. 377 et fl. alt. 2. p. 460), albido-sUBLANUGINOSA, bracteis ovato-laneolatis calycem superantibus, calycis lobis laneolatis subæqualibus, eorollâ porrectâ denum patentim curvata fauce subinflatâ labii superioris paulo longioris lobis reflexis, labii inferioris lobis subæqualibus ellipticis obtusis subdenticulatis, filamentis glabris, antheris rotundatis glabris vel margine sublanato-pilosis, stylo glanduloso, stigmate bilobo. *U* In herbidis altaicis, ad flumen Talitz et Colunjia

- prope Barnaoul, prope Stauropolim! ad pagum Suwant (Hohenack. herb!), Ural (Fisch!), ad Volgam in Artemisiâ campestrî (Bunge!), in campis ad Irtim superiorem (h. Patrin), in Songariâ (Turcz. in h. Boiss. sub nom. *O. borealis!*), in apricis Alatau inter fl. Sarchan et Aksu (Karelin et Kirilloff n. 1797!). — C. A. Mey. enum. cauc. 394. — Gmel. sib. 3. p. 214. t. 46, f. 1. Scapus simplicissimus 4-10-pollicaris, bracteæ calyces corollæque extus pilis crassis sublanuginosus vestita. Corolla violaceo-cœrulea; labium inferius intus plicaturis duabus velutino-hirsutis præditum. (v. in h. DC.)
2. *P. CŒLESTIS*, scapo simplici vel ramulis abortivis subramoso, floribus confertis breviter spicatis, calycis campanulati 4-lobi laciniis linearisublatis tubo longioribus, corollæ porrecta curvato-falcata tubuloso-infundibuliformi superne ampliata fauce aperta margine denticulato-fimbriatâ dense ciliatâ, labio superiore bilobo lobis obtusis extus revolutis, inferiore lobis ovato-rotundatis obtusissimis subæqualibus ad basin plicaturis prominulis villosis, staminibus ad basin subhirsutis, antheris ad suturas parce lanuginosis.  $\mathcal{U}$  In cacumine montis Syphi in radicebus.... (Boissier!), in Cariâ (Pinard!). Orobanche cœlestis Boiss. et Reut. in Pin. pl. exs. 1843. Scapus 4-5-pollicaris, basi in bulbum medicriter incrassatus, inferne squamis oblongis laxis vestitus. Flores in spicam brevem densam subrotundo-ovatam dispositi, in vivo pulchre cyanei. Corollæ extus puberulæ tubus calyce duplo longior. Bractea lanceolata bracteolæque piloso-furfuracea. A *Ph. lanuginosa* bracteis calyce brevioribus vel subæqualibus nec longioribus, corollis majoribus lobis rotundatis obtusis margineque dense ciliatis; a *Ph. longiflora* scapo crassiore, calyce lanuginoso, corollis porrectis lobis majoribus differt. (v. s.)
3. *P. LONGIFLORA* (C. A. Mey. ! enum. pl. cauc. p. 104), scapo simplici parce remotoe squamoso, bracteæ ovato-lanceolatis calycem æquantibus, calycis urrecolati dentibus inæqualibus linearis-lanceolatis, corollæ tubo porrecto sub-infundibuliformi flaccido in limbum patentissimum ampliato, labiis ovatis retractis, staminibus basi internâ hirtellis, antheris villosis.  $\mathcal{U}$  In agro astracanico, Caucaso (Prescott in h. Lenorm.!) prope Helenendorf terr. Elisabethopolensis Armeniæ or. (Hohenacker!), prope Byzantium (Noe!), in insula Cypro (Kotschy ex Pœch). *O. longiflora* Pers. ench. 2. p. 181. Reich. pl. crit. f. 932. Scapus spithameus teres basi vix incrassatus squamis paucis linearis-lanceolatis prædictus. Flores laxi, corollâ calyce triplo longiore extus puberulæ, labiis margine ciliatulis. (v. s. in h. DC. et Boiss.)
4. *P. PULCHELLA* (C. A. Mey. in Eichw. pl. casp. p. 17. t. 18), albo-lanata scapo simplicissimo, squamis paucis ovatis acutis distantibus vestito, floribus breviter spicatis, bracteis ovatis acutis calycem subæquantibus, calycis 4-fidi corollâ triplo brevioris lobis linearis-sublatis subæqualibus, corollâ sub-incurvâ et basi cylindrica in fauce sensim ampliata extus lanata intus pilosiusculâ, labiis subæquilonigis lobis abbreviatis rotundatis fimbriato-dentatulis, staminum filamentis glabris, antheris margine lanatis, stylo longe piloso, stigmate flavo obliquo (non nutante) subbilobo. — In Imeretiâ. Bracteolæ lineares calycem subæquantes. Corollæ saturate violaceo-cœruleæ linea 10 circuit. longæ.
5. *P. CŒRULEA* (C. A. Mey. enum. cauc. 104), scapo simplici, calyce gamosepalô 5-dentato, dentibus lanceolatis acutis, corollâ tubulosa antrorum curvata tubo medio angustato, laciniis labiorum acutis planis, antheris glabris vel basi paulo pubescensibus.  $\mathcal{U}$  In Europâ media et australi nempe in Gallia orientali et australi, Angliâ, Germaniâ australi, Vallesiâ, monte Voiron prope Genevam. (J. Muret!), in radicebus Achilleæ Millefolii parasitica. Orobanche cœrulea Vill. dauph. 2. p. 406. Rehb. pl. crit. 7. f. 892. Engl. bot. t. 423. Koch syn. ed. 1. p. 538. *O. purpurea* Jacq. austr. t. 276. Schk. handb. 205. t. 176. Coss. et Germ. fl. paris. t. 19. K. Scapus atro-purpureus, superne bracteæ calyces corollæque extus pilis furfuraceis obsita. Corolla violacea vel lilacina. Stamina glaberrima vel apice

parce villosa. Stylus stamina subæquaus glandulosus. Stigma capitatum crassum flavescens, demum in lobos tumidos divisum. (v. v. et s. in h. DC. etc.)

5. *Millefolii* (Rchb. pl. crit. 8. f. 1055 et 1056), humilior, corollæ molliore pubescenti ciliatâ calyce breviore lavandulaceâ aut cœlestinâ, lobis subrotundo-rhombeis acumiuatis. — In radicibus Achilleæ Millefolii pluribus locis per Germaniam (Walp. rep. 3. p. 458.)

7. *riliaris* (Griseb. spicileg. fl. Rümel. 2. p. 59.) cœruleoscens simplex calyce 5-4-fido, corollæ violacea supra fundum constrictæ tubo sensim arcuato-patente, limbi lobis ovatis acutis dense glanduloso-ciliatis, anthera-rum margine lanato-ciliato, stigmato pallide amethystino. — In radiciebus...? in peninsula Hagion Oros.

6. P. *CÆSIA* (Reut. non Griseb!), prinoso-surfuracea, scapo simplici anguloso, calycis 1-dentati dentibus lanceolato-acuminatis tubum æquantibus aut brevioribus, corollæ erectâ tubuloso-infundibuliformi supra ovarium constrictâ ad fæcem valde ampliatâ laciniis labiorum ovatis obtusis vel acutiusculis ciliatis, staminibus inferne pilosiusculis apice glandulosis, antheris glabris.  $\mathcal{L}$  In Hispaniaustralis olivetis prope Astapam (Hanseler!), in provincia Manchæ Castellæ Novæ in collibus gypsis prope La Guardia ad radices Lepidii subulatæ! in Sicilia montibus Madonie in Artemisia camphorata (Guss.), prope Massiliam (Solier!) in h. Lenorm. Duby! Jordau! in Artemisia inculta Del.) Bagnols in Pyrenæis orientalibus Jord.!) Orobanchio cæsia Rchb. pl. crit. 7. f. 936. Guss. prodr. suppl. p. 208. syn. 2. p. 138. Scapus 3-4-pollicaris, valde angulosus, superne bractæ tubum calycinum excedentes calycesque hirsuto-surfuracæ. Squamæ ovato-triangularia. Flores dense spicati, pallidi, cœrulei, corolla extas puberula. Stigmatis lobi in specim. hispanicis ut in iconæ Reichenbachianæ semi-circulari-conniveutes. (v. v. et s.)

7. P. *GRACIOSA* Webb phyt. canar. 3. livr. 82. p. 153), scapo simplici semipedali sicco dilutis rufo-surfuraceo-pilosæ, spicæ laxiusculâ, bractæ lanceolatis linearifiliformibus, calyce campanulato-urceolato 4-fido, laciniis basi lanceolato-subovatis apice acutatis vel subuliformibus carinatis, corollæ elongatæ angustæ labii inferioris ad faucem convexo-plicati pubescentis laciniis rotundatis crispis crenato-denticulatis, filamentis ad basin leviter pubescentibus, capsulâ calyce longiore ovato-oblongâ compressâ acutâ rufâ apice pubescente, seminibus globosis fungosis albidis. — In Lancerottâ et in insulâ parvâ arenosâ nomine Graciosa ad radices Affinis P. arenaria et longiflora.

8. P. *ARENARIA* (Walp. rep. bot. 3. p. 459), scapo simplici, calyce monospalio quinquedentato, dentibus subulatis corollæ tubulosâ subrectâ, tubo medio angustato, fauce subinfusatâ, laciniis labiorum obtusis margine reflexis, antherarum suturâ lanato-pilosâ.  $\mathcal{L}$  In argillosis et arenosis ad radices Artemisia campestris parasitica, in Galliâ! Germaniâ! Vallesiâ! Pedemontii subalpinis! Hispania prope Matritum! Grauntum ad radices Maruta cotulae (Rambur!, et in Tnuriâ! Orobanchea arcmaria Borkhaus. in Rœm. n. mag. p. 6. Koch syn. ed. 1. 538. Rchb. pl. crit. 7. f. 929, 930, 931. Alb. Dietr. fl. boruss. 9. t. 519. Coss. et Germ. fl. paris. t. 19. L. Orob. Borkhausenii Bess.! Scapus simplicissimus dodrantalis vel pedalis. Calycis dentes linearis subulati inæquales tubo longiores. Corolla subpollicaris, supra ovarium constricta, a basi ad apicem sensim ampliata, labiorum lobis ovatis obtusis, margine ciliatis. Antheræ ad suturam villoso-lanatae. Stylus glandulosus. Stigma bifidum aurantiacum. (v. v. et s.)

\* *rubenti-arenaria*, calyce gamosepalo ebracteato 5-fido laciniis lanceolato-subulatis tubum corollæ dimidium æquantibus posticâ multo breviore dentiformi obtusâ, corollæ tubuloso-infundibuliformi autrorsum subcurvata ad faucem subampliatâ, labiorum laciniis ovatis obtusis vix denticulatis non ciliatis, staminibus basi hirtulis, antheris nudis, stylo glanduloso, stigmate retuso bilobo ceruino. — Ad radices Medicaginis prope Lugunum (Al. Jordau!). Planta valde singularis inter Phelipæam

arenariam et Orobanchem rubentem certe hybrida! inter utramque facie exacte media, a priore calyce ebracteato et antheris glabris, a posteriore calyce gamoscpalo 5-dentato distinctissima. Scapus 4; pollicis altus, supra basin bulbosam contracto-attenuatus, dein incrassatus, squamis lanceolatis laxis imbricatis obtectus. Flores laxè et breviter spicati, O. rubentis facie et magnitudine similes, extus glanduloso-pubescentes. Bractæ oblongo-lanceolatae floræ subæquantes subnervoso-striatae. ( v. in h. Jordan. )

9. P. STRICTA (Moris! ined. sub Orobanche), scapo simplicissimo stricto, floribus erectis subpedicellatis calycis profunde 4-fidi lacinii subulato-setaceis longissimi tubo corollæ longioribus, corollâ tubulosâ ad faucem ampliatâ dorso arcuatâ, labio superiore compresso profunde bilobo lobis ovatis obtusiusculis, inferioris lobis ovatis acutis margine ciliatis, antheris glabris, stylo subglanduloso, stigmate truncato-bilobo.  $\mathcal{U}$  In Sardinia ad radices. . . Scapus subpedalis simplicissimus subflexuoso puberulus, squamis ovatis vel ovato-lanceolatis sparsis vestitus. Calycis puberuli laciniae longissimæ, tubo ipso triplo vel quadruplo longiores. Corolla extus puberula. Labii inferioris lobi acuti nervoso-striati inter se plicaturis gibbosis hirsutis separati. Bractæ elongato-lanceolatae floribus breviores, bracteolæ subulatae lacinias calycinis subbreviores. ( v. s. comm. a cl. Moris. )

\*\* Scapo ramoso, vel subramoso.

10. P. LAVANDULACEA, scapo simplici vel nonnullis ramulis abortivis prædicto, calyce campanulato 5-dentato dentibus e basi ovatâ subulato-acuminatis tubo corollino multo brevioribus, corollâ tubulosâ antrorum et arcuatim curvatâ, tubo medio angustato, lacinias labiorum brevibus ovatis denticulatis ciliatis, antheris ad suturam lanato-ciliatis vel glabriusculis.  $\mathcal{U}$  In Siciliâ (Guss. Duby!), insulâ Zacyntho (Margot!), prope Messeniam (Despreaux!), Nicæam (Risso!), in Galliâ australi ad montem Sanctam Victoriam (h. DC!) prope Lac dep. Var (h. Jordan!), in Algeriâ prope Bonam (Mutel), in Canariis (Despr.), in radicibus Triticî phenicoidis? ex Risso, Pteridis Aquilina ex Despr., Thapsis villosa et Ferula Tingitanæ sec. Durieu ex Schultz in litt., Scorpium muricatum ex Mut., Psoraleæ bituminosæ et Acanthi mollis ex Guss. Orobanche lavandulacea Rchb. pl. crit. vii. f. 935. Guss. suppl. p. 207. syn. 2. p. 137. Orob. Schultzii Mutel fl. fr. 2. p. 352 in adn. atl. suppl. f. 2. bona! Orob. coerulea Bor. et Chaub. exp. Mor. non Vill. Ph. Schultzii Fr. Schultz in litt. Ph. trichocalyx Webb! phyt. canar. p. 154. t. 185. Orob. vagabonde Vauch. ? monogr. Orob. p. 66. t. 15. (quaæ forsan O. Muteli ?) — Cup. pamphl. 2. t. 116. Bon. t. 52. optim. ! Scapus pedalis vel altior angulosus pilis articulatis furfuraceis obsitus. Spica elongata dense multiflora. Bractæ ovatae calyce subbreviores. Corolla puberula 7-8 lineas longa coerulescens venis saturatioribus (Mut.), in secco fusco-purpurea apice violacea, labiis brevibus inferioris lobi inter se plicaturis duabus albo-villosis segregatis. Stylus glaber vel parce glandulifer. Stigma bilobum lutescens ex Mut. (v. s. in h. DC. etc.)

11. P. FRAASII (Walpers rep. bot. 3. p. 460), calyce gamosepalo quinque-dentato, dentibus e latâ basi lanceolatis acutis, corollâ calycem triplo excedente tubulosâ subhorizontaliter patente subarcuatâ, tubo supra ovarium coarctato tunc ampliato, fauce ampliâ, lacinias labiorum ovatis, labii superioris approximatis, labii inferioris distantibus, staminibus infra medium tubi insertis glabris.  $\mathcal{U}$ ? In radicibus Psoraleæ bituminosæ ad Tripolizam crescit. O. Fraasii F. Schultz in Flora 26. p. 127. Planta pulcherrima purpureo-coerulea columnmodo Ph. sicula et Ph. lavandulacea comparanda (Schultz). Affinis videtur Ph. lavandulacea et forte eadem species?

12. P. PYRAMIDALIS, scapo simplici vel apice ramoso calyce quadridido campanulato, lacinias lanceolato-acuminatis, corollâ tubuloso-infundibuliformi dorso arcuatâ carinato-subcompressâ ad medium constrictâ superne ampliatâ, lacinias ovatis obtusis patentibus intus margineque hirsuto-ciliatis, labii supc

- rioris lobis extus reflexis, inferioris ovatis subequalibus, staminum filamenti glabris, antheris ad marginem lanato-pilosis, stylo glanduloso, stigmate retuso-bilobo.  $\mathcal{L}$  In monte Tmolo supra Philadelphiam in radicibus. (Boissier!) Scapus semipedalis vel subpedalis, superne ramosus paucisquamatus. Flores speciosi in spicam elongatam pyramidalem dispositi. Corolla infundibuliformis, pallide cœrulea, in secco rufescens, extus glabriuscula vel pilis glandulosis parce obsita, intus et ad margines pilis articulatis hirsuta. (v. s. in h. Boissier.)
13. P. HELDREICHII, scapo simplici vel subramoso crasso, calycis quadrifidi campanulati laciniis lanceolato-subulatis tubo longioribus, corollâ tubulosoinfundibuliformi ad medium constrictâ superne valde ampliatâ laciniis ovatis obtusis intus hirsutis margine repando-crenatis ciliatis, labii superioris lobis correctis dein reflexis, inferioris ovatis subequalibus, staminum filamentis glabris vel basi subhirtellis, antheris glabris, stylo glanduloso, stigmate retuso-bilobo.  $\mathcal{L}$  In arenosis planitie prope Koniali in Cariâ interior (de Heldreich 1845). Scapus crassus 8-14-pollicaris simplex vel ramo uno altero rovo auctus subflexuosus angulosus. Bractæ calycesque hirsuto-furfuracei. Flores longe denseque spicati. Corolla pollicem longa pallide cœrulea hirtello-glandulosa. Stigma albidum. Bractæ elongato-lanceolata calyces brevior, bracteolæ lincari-subulatae tubum calycis æquantes. Capsula magna ovata tubum calycis superans. Ph. pyramidali affinis sed ex omni parte major, antheræ glabræ nec lanuginoso-ciliatae. (v. s.)
14. P. RAMOSA (C. A. Mey. enum. pl. cauc. p. 104. Walpers rep. bot. 3. p. 459), scapo ramoso parce squamoso, floribus in spicas laxas elongatas acutis dispositis, calyce 4-dentato, dentibus ovato-triangularibus acuminatis, corollâ tubuloso-subinfundibuliformi, labiorum lobis ovatis obtusis subequalibus margine ciliatis, staminibus basi pubescentibus, antheris glabris vel interdum subciliatis, stylo tenuiter glanduloso, stigmate retuso bilobo. (I) In Europâ totâ, Sibirâ, promontorio Bonæ Spei! et Abyssinâ (Dillon ! in h. mus. Paris.), ad radices Cannabis sativæ! Nicotianæ Tabacum! etc. parasitica. Orobanche ramosa Linn. sp. 882. Engl. bot. t. 184. Bull. h. t. 399. Rchb. pl. crit. 7. f. 933 et 934. Alb. Dietr. fl. Boruss. 6. t. 250. Coss. et Germ. fl. Paris. t. 19. H. Putterl. et Endl. in gen. germ. fasc. 23. ic. Orob. du Chanvre Vauch. monog. p. 67. t. 16. Scapus ramosus vel rarius simplicissimus superne ramisque hirsuto-furfuraceus. Squamae bracteæque ovatae breves. Calyx tenuiter membranaceus postice excisus Corolla pubescentes inferne pallide apice cyaneo-purpurascentes vel cœruleentes. Stigma albidum. Capsula ovato-subrotunda calycem subæquans. (v. v. et s.)
15. P. INDICA (G. Don gen. syst. 4. p. 632), scapo ramoso parce squamoso, calyce 4-dentato dentibus e basi latâ lanceolato-subulatis, corollâ tubulosoinfundibuliformi ad faucom ampliatâ, labiorum lobis ovatis acutiusculis vel obtusis margine ciliatis, inferioris longioris lobis subequalibus, stamiibus basi parcissime pilosis vel glabris, antheris ad suturas lanuginosis, stylo glabro stigmate retuso bilobo. (I) In humidæ Georgiæ Caucasicæ prope Elisabethpolim (Hohenacker un. itin. anno 1832 et 1834! sub nom. Orobanches ramosæ et lavandulacea), in Indiâ orientali!. Orobanche indica Roxb. fl. ind. 3. p. 27, non Wallich pl. exsicce! Rami graciles. Flores laxi, quam in Ph. ramosâ duplo majores. Antheræ lanuginosæ. Planta Indica omnino eadem est ac Caucasicæ! (v. s. in h. Boiss. DC. et Benth.)
16. P. MUTELI (F. Schultz! in Mutel fl. fr. 2. p. 353 et atl. t. 43. f. 314, suppl. t. 2. f. 5 sub Orobanche), scapo ramoso parce squamoso, floribus in spicas abbreviatas subdensifloras dispositis, calyce 4-fido lobis lanceolatis acutis vel acuminatis, corollâ antrorsum curvâ tubuloso-subinfundibuliformi supra ovarium contractâ superne ampliato-inflatâ, dorso sub apice convexâ, labiorum lobis ovatis obtusis vel acutis margine ciliatis, labii inferioris lobis subequalibus inter se plicaturis convexis villoso-hirsutis donatis, staminibus glabris

vel basi parce villosulis, antheris nudis vel sublanuginosis, stylo glabro, stigmate retuso bilobo. (I) In collibus et arenosis maritimis regionis mediterraneæ : regni Neapolitanæ! Dalmatiæ! Græcæ! Rumelia! Asiae minoris! Ægypti superioris ( Acerbi ! ), montis Sinai! Algeriæ! Hispaniæ! et Lusitaniæ! Galliæ meridionalis prope Olbianum! Lue! Aix! Telonem! Niceam! ( Jordanum ! ), in radicibus variarum plantarum uti Chrysanthemum coronarium! Hedypnois cretica , Anthyllis tetrapbylla , Rumex intermedius ! Calendula arvensis! Erodium cicutarium! Barkhausia sp.! Prenanthes bulbosa! Ononis sp.! etc. — Pl. caesia Griseb. fl. rumel. 2. p. 50. excl. syn. Rebh. (uon Reut.). P. ramosæ affinis, differt tamen specie multo brevioribus, floribus confertioribus, corollis ad medium valde contractis ad fauem ampliatis. Corolla cœruleo-violacea in ferme pallidior. (v. s. in b. plur.)

*P. nana*, scapo simplicissimo abbreviato paucifloro. — Prope Fluminem Illyriæ (Noe!), Algeriam (Bové!) O. nana Noe in Rebh. fl. germ. exsiccat. n. 1352. (v. s. in h. Boiss.)

17. *P. EMARGINATA*, scapo valde ramoso pauci-squamoso, floribus densiusculæ spicatis, calyce 4-dentato, dentibus triangulari-lanceolatis acuminatis, corollâ tubuloso-infundibuliformi ad medium constrictâ superne valde ampliatâ dorso convexâ, labiorum lobis ovatis margine ciliatis, labii inferioris lobis emarginatis intermedio paulo majore, staminibus glaberrimis, stylo parce glanduloso, stigmate retuso bilobo. (I) In arenis maritimis ad oceasum Adaliæ super radicibus Ononis ramosissimæ? ( de Heldreich ann. 1845 ). Scapus 5-6-pollicaris, valde ramosus, basi glabrescens in bulbum intricato-fibrillosum iucrassatus, superne violaceus ramique tenues subflexuosi albo-villosi. Bractæ ovato-lanceolatae albo-villosæ longitudine calycis. Corolla pulchre cœrulea 7-8 lineas longa extus puberula inter lobos labii inferioris bigibbosa, gibbis flavis villosis. Stigma pallide cœruleum. (v. s. comm. a cl. v. Heldreich.)
18. *P. OXYLOBA*, scapo simplici vel parce subramoso pauci-squamoso flexuoso, calyce parvo profunde 4-lobo lobis triangulari-lanceolato-acuminatis tubo corollæ multo brevioribus, corollâ tubuloso-infundibuliformi supra ovarium constrictâ superne ampliatâ antice curvata, lobis triangulari-ovatis acutis ciliatis, labii superioris porrectis, inferioris patentibus subæqualibus, staminibus glabris vel basi parce ciliatis, antheris ad suturam sublanuginosis, stylo parce glanduloso, stigmate retuso-bilobo. (I) In Cariâ ad muros prope Castellum Alayæ , ad radices Anthemidis Cibiae adbærrens, legit cl. de Heldreich, 1845. Scapus 5-6-pollicaris interdum subpedalis gracilis flexuosus glabrescens basi longe radiculosus squamis ovatis laxis præditus. Bractæ ovato-acuminata calyce subbrevior. Corolla hirtula stigmaque pallide cœrulea, magnitudine corollæ P. ramosæ. (v. s. comm. a cl. v. Heldreich.)
19. *P. ROBUSTA* (Walpers rep. bot. 3. p. 460), villosiuscula, scapo ramosissimo, spicis densifloris, bractæ calycis longitudine, calycis 5-fidi lacinia quinta minima, corollæ tubulosæ labio superiore bilobo, lobis reflexis labii inferioris reflexi lacinia æqualibus vix creuulatis, filamentis glaberrimis, antheris villo cinetis, stylo glaberrimo, stigmate biglobulato stramineo. (I) In collibus arenosis apries Borussiae prope Potsdam ad radices Artemisiae campestris , in collibus elatis Kurilikow prope Cremena Volbyniae (Godet!) — Alb. Dietr. fl. Boruss. 3. t. 151. fl. March. 338. Scapus bipedalis vel altior strictissimus e basi (pollicem fere diametro) ramosus livide virens glaber, infra spicas parce villosus. Squamae ovales obtusa pollicares semi-pollicem late super. angustiores acuminatæ. Spicæ 9-pollicares vel longiores. Bractæ teruæ lanceolato-lineares intermedia longiore. Calycis lacinia (excepta posticæ) lineari-lanceolatae acuminatissima. Corolla pollicaris, tubus incurvus ad fauem intus breviter villosus. Stigma pallidissime sulphureo-globuloso-bilobum. (v. in h. Godet.)
20. *P. EGYPTIACA* (Walp. rep. bot. 3. p. 463), scapo ramoso, ramis elongatis angulatis flexuosis, squamis caulinis oblongis aenatis, floribus laxe racemosis

pedunculatis vel subsessilibus, calycis 5-dentati cupuliformis dentibus lanceolato-setaceis tubum aequantibus vel superantibus, corollâ tubuloso-infundibuliformi ad faucom ampliata extus puberula intus pubescente, staminibus styloque glabris. (I) In Ægypto (Coquibert!), ad Cahiram in hortis (Bové!), in radicibus Brassicarum et Solani Melongeæ. Orob. ramosa Delile fl. ægypt. non Lin. Orob. Ægyptiaca Pers. ! encl. 2. p. 181. Orob. pedunculata Viv. non Linn. Orob. longiflora Sprn. ! non Pers. Orob. Delilei Decaisn. ann. sc. nat. ser. 24. p. 201. Phelipæa pedunculata Walp. rep. bot. 3. p. 459. Flores pl. ægypt. decad. 22. Phelipæa pedunculata Walp. l. c. A var. ð differt tantum floribus sessilibus vel subsessilibus. (v. in h. DC. et Boiss.)

*a. Delilei*, floribus subsessilibus. — In Ægypto (Bové! Boissier!), in agris Solani Melongeæ consitis, prope urbem Mossul (Kotschy ! pl. Alepp. et Kurl. exsicc. n. 430!), in arenis maritimis prope Eubœam (Spruner!) Orob. longiflora Sprn. ! non Pers. Orob. Delilei Decaisn. ann. sc. nat. ser. 24. p. 201. Phelipæa Delilei Walp. l. c. A var. ð differt tantum floribus sessilibus vel subsessilibus. (v. in h. DC. Boiss. etc.)

21. P. TRICHLONOA, scapo crasso ramoso parce squamoso, floribus denso spicatis, calycis campauulati 4-dentati dentibus a basi lanceolatâ linear-setaceis tubum aequantibus vel superantibus, corollâ erectiusculâ tubuloso-subinfundibuliformi subrectâ margine ciliatâ, labio superiore lateraliter compresso emarginato lobis extus reflexis, inferiore lobis ovatis obtusis, staminum filamentis basi subpuberulis, antheris ad suturas piloso-lanatis, style glanduloso, stigmate retuso bilobo. — In Persiâ australi prope ruinas urbis Persepolis inter Atragalos spinosos (Kotschy ! pl. pers. austr. exsic. n. 408 ex parte.) Scapus crassus inferne glaber superne pilis furfuraceis albidis brevibus onustus. Corolla corulea (ex Kotschy), extus hirto-puberula, intus ad palatum prominule bigibbosum villoso-barbata, oor. P. coruleæ magnitudinis. Bractea lanceolata furfuracea calyce subbrevior. Bracteolæ linear-setaceæ. Deutes calycis sæpe reflexi. (v. in h. Boiss. et DC.)

*b. simplex*, scapo simplici glabriuscule, corollâ glabrescente. — In Persiâ australi. — Kotschy ! pl. Pers. austr. exsicc. n. 905. Auch.-Eloy ! h. 5076. (v. in h. Boiss.)

22. P. HIRTIFLORA, scapo crasso ramoso, floribus erectis, calyce campanulato 4-dentato hirsuto, dentibus lanceolato-linearibus tubo longioribus corollâ tubuloso-infundibuliformi ad faucom ampliata dorso convexâ, labio superiore bilobo, inferiore trilobo, lobo medio longiore, lobis ovatis acutis intus hirtis et ad margines pilis articulatis dense ciliatis, staminum filamentis glabriusculellis, antheris ad suturas piloso-lanatis style glanduloso, stigmate retuso bilobo. — In Persiâ australi (Kotschy pl. exsic. n. 920 et n. 408 ex parte!) Affinis P. tricholobæ, differt floribus majoribus P. arenariae magnitudinis. Calycis dentes sensim lanceolato-acuminati. Corolla hirtæ, lobis acutis. (v. s.)

23. P. HOHENACKERI, scapo ramoso pauci-squamato basi in bulbum nudum subrotundum incrassato, calycis quadrilobi dentibus longe lanceolato-subulatis inæqualibus tubo longioribus, corollâ arcuato-curvatâ tubuloso-infundibuliformi medio tubo constrictâ fauce inflatâ, labiorum lobis crenulatis, inferioris ovato-subrotundis medio productiore, staminibus glabris vel basi parce pubescentibus, antheris nudis, style glabro vel parce glanduloso, stigmate retuso bilobo. — Prope pagum Suwant Georgiae Caucasicae (Hohen.). Scapus 5-6-pollicaris ramosus basi in bulbum subrotundum denudatum incrassatus. Rami, bractæ calycesque puberulo-furfuracea. Flores dense spicatis. Corolla extus puberulae parcissime ciliatae pallidæ apice coerulecentes. P. tricholobæ affinis, differt corollis arcuatis ad faucom ampliatis apertis, antheris glabris. (v. in h. Hohenacker.)

24. P. RUFESCENS (Griseb. spicileg. flor. rumel. 2. p. 59), rufescens ramosa, calyce quadrifido, lacinias lanceolato-acuminatis, corollæ homochroæ parum constrictæ tubo patente dorso arcuato, limbi lobis ovato-oblongis obtusis, antherarum valvis marginè lanato-ciliatis, stigmate cerino-flavo.  $\Sigma$  In Thracie

littore radicibus Plantaginis Lagopodos. Herba pallide brunnea vel rufescens, hinc violaceo-tincta, palmaris, puberula, basi paulo incrassata, sepe pluricaulis. Squamæ erecto-patentes, lanceolatae, in axillis sæpius gemmiferæ, quibus nondum evolutis caulis appetat. Spica brevis densiflora. Bractæ ovatae acuminatae calycis tubum subæquantes, bracteolæ lineares. Calyx ad medium 4-fidus lacinii inæqualibus, hinc fissus. Corolla rufescens vel subinde violacea semi-pollicaris, limbo brevi glanduloso-ciliato. Stamina supra-basilaria glabra. Stigma bilamellatum cerinum. (v. in h. Griseb.)

25. P. LUDOVICIANA (Walp. rep. bot. 3. p. 461), pubescenti-glandulosa, scapo brevi subramoso, spicâ elongatâ densiflorâ, calyce inæqualiter 5-fido tubi corollæ dimidium æquante lacinii lanceolato-linearis obtusis, corollâ tubulo-infundibuliformi subrectâ intus extusque pubescente labiis subæqualibus ciliatis, superiore bifido, inferiore trifido, lobis acutiusculis, staminibus inclusis basi hirtis, antheris glabris vel parce pilosis.  $\mathcal{U}$  In Americæ borealis montibus scopulosis, Saskatchewan, Novâ Caledoniâ, in prov. Texas (Drumm.!) Orobanche Ludoviciana Nutt. gen. pl. amer. p. 253. Hook. flor. bor. amer. 2. 292. Calyx sepe sexfidus observatur. Labium corollæ superioris sepe integrum. Bractæ ovatae obtusæ calyce dimidio breviores. (v. in h. de Charpentier ct Dunant.)
26. P. CALIFORNICA (G. Don gen. syst. gard. 4. p. 632 n. 3), viscido-pubescenti, scapo simplici vel ramoso, floribus corymbosis vel racemoso-spicatis, calycibus bracteatis campanulatis regulariter 5-fidis, corollâ rectâ tubulosâ ringente, labio superiore plano apice bilobo, inferiore trisepto, laciñis dissitis linearibus acutis, staminibus ecalcaratis antheris sagittatis rimâ villosis, stigmate orbiculari peltato.  $\mathcal{U}$ ? Prope portum Sti Francisci in California. Orob. Californica Cham. et Schlecht. in Linnaea 3. p. 134. Tota breviter viscido-glanduloso-pubescenti. Scapus triplicaris. Squamæ lanceolatae acutæ. Flores pedunculati; pedunculi præter squamam fuloientem bracteis linearilanceolatis instructi. Calyx pubescenti-cinerereus, dimidium corollam æquans, laciñis linearibus, basi dilatatis. Corolla pollicem longior, tubulosa; labium superiorius planum vexilliforme bilobum lobis acutiusculis. Stamina non exserta. (v. in h. Benth.).
27. P. MACRANTHA (C. Koch in Linnaea 17. p. 290), scapo glabro squamis patentibus obsito, bracteis ovato-oblongis calycem quadrifidum æquantibus corollâ rectâ tubulosâ pubescente triplo brevioribus, labio superiore bilobo intus glabro, inferiore æqualiter trilobo intus præcipue inter laciñias laterales et medianum piloso, staminibus corollæ basi insertis, vix dimidium tubum superantibus, antheris marginis pilosis, stylo bicapitato glaberrimo.  $\mathcal{U}$  In Armeniâ.
28. P. ARMENA (C. Koch in Linnaea 17. p. 291), simplicissima, inferne glabra, squamis carnosis coloratis ovato-acutis obtecta, superne cum bracteis ovato-lanceolatis albo-lanuginosa, calyce bracteis duplo corollâ triplo breviore, lobis ovato-acutis inæqualibus, corollâ rectâ subæquilibra intus annulo lato albo-piloso notata ex quo stamina evadunt, seminibus nudis.  $\mathcal{U}$  In planities ad Araxem sita.
29. P.? SUBACAULIS (Benth. Scrophul. indic. 55), caule brevissimo crasso squamato, pedunculis in caule 3-5 squamis brevioribus unifloris, calyce tubuloso basi parum inflato apice irregulariter 4-5-dentato, corollâ tubo basi tenui breviter exerto dein in faucom amplam dilatato, limbo breviter et late subbilabiatis quinquefido, staminibus 4 glabris, antheris glabris, loculis calcaratis. — In Peninsulâ Indiae orientalis. Calyx 6-7 lin. longus. Corolla 2-2  $\frac{1}{2}$  poll. Stigma capitatum? Capsula...?

Sectio II. CISTANCHE Link et Hoffmans. flor. portug. 4. p. 319. t. 63.  
Walp. rep. 3. p. 461.

Calyx semiquinquefido, lobis æquilibus obtusis. Antheræ undique lanatae. Capsula stylo persistente dumum longitudinaliter secidente terminata. Scapus simplicissimus. — Hæmodorum Wallr. gener. Orob. diasc. p. 69. sect. 4.

30. *P. fissa* (C. A. Mey. eum. cauc. casp. 104), lanuginosa, squamis floribus lanceolatis obtusis calyce longioribus, calycis fissi laciñiā superiore lineari, inferiore spathæformi quadridentata, dentibus obtusis, corollæ (violaceæ) rectiusculæ tubuloso-campanulatae laciñiis patentibus subæqualibus semi-orbiculatis, filamentis basi barbatis, antheris apice connectivo producto mucronulatis, stylo glaberrimo, stigmate indiviso.  $\mathcal{W}$  In Caucaso ad radices....
31. *P. salsa* (C. A. Mey.! in Ledeb. icon. fl. altaic. illustr. t. 376), sub-lanata, bracteis ovato-lanceolatis calyce sublongioribus, bracteolis linearilanceolatis calycem æquantibus, calycis campanulati laciñiis ovatis obtusis lanuginoso-ciliatis, corollæ subincurvæ tubuloso-campanulatae lobis subæqualibus semi-orbiculatis patentibus vel revolutis, filamentis basi barbatis antheris muticis, stigmate emarginato.  $\mathcal{W}$  In locis argilloso-salsis deserti Soongarico-Kirghisici trans flum. Kurtschum, in littore orientali maris Caspii (C. A. Mey.!), Sibiria (Bunge!), prope Ispahan (Auch.! n. 5080). — Ledeb. flor. alt. 2. 461. Amblatium Tataricum Fisch. mss. Planta ex observationibus non parasitica, semipedalis vel pedalis. Scapus erectus, crassitie digitæ minoris vel tenuior, inferne incrassatus, squamis ovato-triangularibus vel oblongis tectus. Bractæ calycesque sublanuginosi. Corolla odorem violæ spargens, 1-½-pollicularis, glaberrima, tubo albido intus ad staminum insertionem annulatum piloso, limbo ameno violaceo. Filamenta basi dense lanata. Antheræ dense albolanatae inæqualiter bimucronulatae. Stigma leviter bilobum fuscescens. (v. s.)
32. *P. flava* (C. A. Mey.! enum. cauc. casp. p. 104), glaberrima, squamis linearilanceolatis floralibus corollâ multo longioribus, calycis tubulosi lobis ovatis æqualibus ramoso-venulosis obtusis tubum subæqualibus, corollæ flavæ subincurvæ tubuloso-campanulatae lobis patentibus subæqualibus ovato-rotundatis, filamentis basi pubescentibus superne styloque glaberrimo, antheris apice connectivo producto mucronulatis, stigmate crasso indiviso.  $\mathcal{W}$  In radibus...? ad mare Caspium. Scapus crassitie digitæ minoris. Flores sesquiplicares, inferiores pedicellati, superiores sessiles. Bracteolæ linearilanceolatae calycem æquantes. (v. s.)
33. *P. violacea* (Desf. fl. atl. 2. p. 60. t. 115), scapo carnoso sulcato, bracteis ovato-oblongis calycis longitudine, calycis semiquinquefidi lanuginosi lobis oblongo-ellipticis obtusis, corolla tubuloso-cylindrica leviter arcuata limbo irregulari quinque-lobo lobis rotundatis subæqualibus, plicaturis duabus ad fauem labii inferioris, staminibus basi villosis apice incurvis, antheris crassis villosis, stylo staminibus paulo longiore, stigmate crasso retuso obscure bilobo.  $\mathcal{W}$  In Barbariæ arenis deserti prope Tozzer (Desf.), in maritimis Algeriæ prope Oran ad radices Chenopodiacearum frutescentium (Durieu! iu litt.), in littore Tripolitano (Viv. fl. lyb. p. 134). Orobanchæ Phlipæa Willd. sp. 3. p. 352. Scapus nunc simplex nunc basi ramosus crassitie pollicis quandoque brachii. Squame lanceolatae obtusiusculæ erectæ. Flores sessiles dense spicati spicæ conicæ. Bractæ coloratæ. Corolla (ex Viv.) discolor, tubo albicante, limbi laciñiis supra intense violaceis, plicaturis ad limbi divisiones lutescentibus. Floret hieme. (v. s. flores comm. a cl. Durieu.)
34. *P. tubulosa* (Schenk pl. æg. arab. 23), scapo carnoso sulcato uni-vel tripedali, squamis late lanceolatis obtusis, bracteis ternis lanceolatis elongatis, calycis laciñiis oblongis obtusis, corolla tubo curvato calyce duplo longiore, filamentis pilis sparsis obsitis, stigmate corollam superante.  $\mathcal{W}$  Inter Suez et Tor, in Arabia Petræ, in radicibus... Scaps pollicis crassitie cylindricus sulcatus squamatus. Bractæ ternæ, duabus lateralibus fere duplo brevioribus, media maximâ calyce superante, omnibus lanceolatis acutis carnosis margine laceris. Corolla tubus calyce duplo longior arcuato-infundibuliformis, laciñiæ labii superioris et inferioris laterales rotundatae, intermediae paulo breviore acutiusculæ. Filamenta exserta sparse pilosa. Antheræ cordato-sagittatae muticæ villoso-lanuginosæ. Stigma bilobum glabrum.

35. P. LUTEA (Desf. fl. atl. 2. p. 60. t. 146), scapo sulcato carnoso simplicissimo, bracteis opacis ovato-lanceolatis substriatis calyce longioribus, calycis campanulati lobis ovatis obtusis, corollâ e basi angustatâ arcuato-tubulosâ in fauce valde ampliatâ 5-fidâ lobis ovato-rotundatis æqualibus patentibus, staminibus basi hirsutis antheris maximis obsolete mucronatis, stigmate capitato emarginato.  $\mathcal{U}$  In arenosis humidis Barbarie prope Mascal (Desf.), in staginis salsis et ad ripas fluminis Sig prov. Oran, ad radiccs Chenopodiacearum frutescentium parasitica (Durieu ! in litt.), in Arabia et Ægypto ! (Walpers rep. bot. 3. p. 462). Scapus pedalis et ultra pollice crassior glaber squamis oblongo-lanceolatis opacis estriatis (in secco). Bracteola oblongæ calyce breviores. Calyx campanulatus, lobis ovatis obtusis æqualibus margine subsecariosis subintegris, corollâ medio tenus arcuato-tubulosâ inferne sensim angustatâ superne valde ampliatâ, tubo intus infra staminum insertionem hirsuto. Antheræ magnas lanato-villosæ. (v. in h. DC. specim. Desfont. et flores a cl. Durieu.)
- $\beta.$ ? major, scapus tripedalis, flores majores 1 $\frac{1}{2}$  poll. longi, stamina basi glabriuscula. — In prov. Oran ad el Oudja observavit cl. Durieu ! An sp. distincta ? (v. s. flores a cl. Durieu comm.)
36. P. TINTORIA (Walp. rep. 3. p. 462), glaberrima subnitida, squamis ovato-amplexicaulibus calycisque lobis margine membranaccis irregulariter sublacero-crenulatis, calycis tubuloso-campanulati lobis rotundatis obtusis marginibus imbricatis, corollâ e basi angustatâ arcuata tubulosa in fauce valde ampliatâ lobis ovato-rotundatis obtusis subæqualibus, staminum filamentis basi hirsutis, antheris maximis obsolete mucronatis, stigmate capitato-emarginato cernuo.  $\mathcal{U}$  In maritimis et salsis Europæ austro-occidentalis et Africæ borealis, prope Tangidem (Salzm. Schousb.! in h. Pavon), in Hispaniâ prope Gades ! Lusitanâ (Welv.! pl. exsicc. n. 72). Bender trans Tagum (Guthnick!). Cistantche lutea Link et Hoffm. fl. port. I. p. 319. t. 63. Rchb. pl. crit. 7. f. 939 optim. Orobanche tinctoria Willd. sp. 3. p. 353. Lathraea Phelipæa Linn. sp. 843. Brot. fl. lus. 1. p. 184. Scapus crassus sulcatus, squamis laxis margine membranaceo-pallidioribus laxe imbricatis vestitus. Bracteolæ ovatae basi attenuatae margine sublaceræ calyce subdimidio breviores. Calycis lobii imbricati margine membranacei. Corolla infundibuliformis, tubo ad medium curvato, lobis patentibus vel reflexis. (v. in h. DC. Boiss. etc.)
37. P. SENEGALENSIS scapo simplicissimo crasso fere a basi florifero, bracteis oblongo-lanceolatis obtusis calycem æquantibus vel superantibus, calycis tubuloso-campanulati lobis ovatis obtusis, corollâ e basi angustatâ tubuloso-infundibuliformi calyce triplo longiore superne ampliatâ arcuata demum incurvâ, lobis ovatis subæqualibus patentibus, staminibus basi subvilloso antheris maximis obsolete mucronatis, stylo glabro stigmate capitato-emarginato.  $\mathcal{U}$  In Senegalâ (Sparmann ! Rousson ! Sieber ! Perrottet !) Scapus subpedalis crassus basi bulboso-incrassatus squamis laxis oblongis vestitus. Bracteolæ oblongo-lineares dorso carinatae calycis tubum subæquantes. Flores in vivo pulchre lutei (ex Rousson !) fere Nicotiana magnitudinis. Corolla longe tubulosa extus lævigata intus infra staminum insertionem hirsuta. (v. in h. DC.)
38. P. CALOTROPIDIS (Walp. rep. bot. 3. p. 462), spicæ confertiflorâ, scapo glabro spongioso, bracteis apice acuminatis calycem superantibus, bracteolis ellipticis canaliculatis glabris basin versus pilis carnosis ciliatis calyce brevioribus calyce 5-fido segmentis obtusis glabris, corollâ ringente tubo calyce subduplo longiore curvato, limbo bilabiato, labio superiore bifido minore suberecto, segmentis rotundis emarginatis purpureis, inferiore patulo trifido segmentis rotundis emarginatis purpurascens intus flavis, fauce valleculis duabus instructâ, staminibus inferioribus longioribus glaberrimis, stigmate apice elevato.  $\mathcal{U}$ ? In radicibus *Calotropidis Hamiltonii* in the Sickli states Indiae orientalis. Orobanche Calotropidis Edgeworth in Hook. journ. of bot. 2. p. 285. Antheræ juniores in antherium lineare loculos superans productæ quod postea marcescens ad antheram affingitur, bilobæ, cordatae pilis albis præscriptim ad

basin marginesque saccorum hirtis, juuiores liue pilis arcte ecoalitis post impregnationem discedentibus. Pollen ovale. Stylus staminibus longior medio angustatus curvatus glandulosns. (v. in h. DC.)

39. *P. COMPACTA* (G. Dou geu. syst. 4. p. 632), scapo simplici brevissimo, squamis ovatis acutis imbricato fere a basi ipsa in spicau oblongam compactam undique floriferam abiente, bracteis scarioris subdilatidam corollæ longitudinem sequantibus, calyce tetraphyllo leví corollâ triplo breviore, lobis ovatis obtusis quandoque veluti truncatis, corollâ tubulosâ incurvâ superne sessim dilatata, labio superiore bifido lobis ovatis acutis, inferiore trilobo, lobis omnibus rotundatis nudulatis subæqualibus, staminibus longitudine tubi, filamentis levibus, antheris lanuginosis, stylo staminibus longiore incurvo, stigmate capitato-truncato.  $\mathcal{X}$  In littore magnæ Syrteos. Orobauche compacta Viv. fl. lyb. p. 34. t. 15. f. 2.

40. *P.? CYTINOIDES*, scapo simplici humilius crasso undique squamis ovato-rotundatis imbricatis tecto, floribus pedicellatis umbellato-corymbosis, pedicellis calyce brevioribus basi bibracteolatis, calyce campanulato irregulariter 7-dentata, corollâ calyce paulo longiore tubuloso-campanulata superne ampliata, labio superiore profunde bilobato, inferioris trilobi lobis oblongis integris, filamentis ad medium tubi insertis glabris, antheris glabris basi poro deliscenti-us?, stylo glabro, stigmate clavato obtuso integro.  $\mathcal{X}$  Crescit copiosissime in sylvis humidis umbrosisque Ootakamund Neelghirris Indie orientalis ubi legit jaunario florentem cl. Perrottet. Scapus subbipaniculatis crassitudine digitis uniuoris undique squamis glabris adpressis dense imbricatis obtectus. Bracteæ obovatæ, flore subbreviores. Bracteolæ lincares carinato-plicatae calycom dimidium æquantes. Flores flavi pulcherrimi (Perr.). Corolla parum aperta extus sparsa hirsuta. Tota planta in siceo nigro-picea nitida. (v. in h. DC.)

### † *Species nomine tantum nota.*

*P. CARNOSA* C. A. Mey. in Walp. nomine solum cit.

*P. (ORONANCHE* Spenn. ) *SICULA* Walp. rep. 3. p. 463 sine deser. An *P. la-* vandulacea?

### *Species exclusæ.*

*P. ABBREVIATA* Steud. = *Æginetia abbreviata*.

*P. UNIFLORA* Spreng. = *Anoplanthus uniflorus*.

*P. BIEBERSTEINI* Fisch. = *Anoplanthus Biebersteinii*.

*P. COCCINEA* Pers. = *Anoplanthus Biebersteinii*.

*P. FASCICULATA* Spreng. = *Anoplanthus fasciculatus*.

*P. FOLIATA* Lamb. = *Anoplanthus Biebersteinii*.

*P. INDICA* Spreng. = *Æginetia Indica*.

*P. TOURNEFORTII* Desf. = *Anoplanthus Tournefortii*.

III. *CONOPHOLIS* Wallr. *Orobanch.* 78. *Endl. gen. p. 726. ic. t. 81.* — *Oro-* branches spec. *Linn.*

Flores hermaphroditæ. Calyx bibracteolatus, ventricoso-tubulosus, spatheaceus, antice ultra medium fissus, postice acutus, breviter 4-dentatus. Corolla hypogyna, ringens, tubo basi ventricoso, labio superiore fornicate integro, inferiore trilobolobis subæqualibus patentibus intermedio obtuso. Stamina 4, corollæ tubo inserta, subæqualia, exserta; antheræ biloculares, loculis basi divaricatis mucronatis. Ovarium uniloculare, placentis parietalibus 4, geminatione approximatis. Ovula plurima. Stylus simplex. Stigma capitatum, obscure bilobum, lobis antice et postice erga inflorescentiam sitis. Capsula unilocularis, bivalvis, valvis juxta medium placentas geminas gerentibus. Semina plurima, minima, testa fungosæ

crassâ. — Herba in Americâ boreali calidiore indigena; caule simplicissimo carnoso, squamis succulentis siccitate cartilagineis imbricatis, in spicam indivisam conferte bracteatum desinente; floribus cauli concoloribus, luteis.

C. AMERICANA (Wallr. l. c. Walp. rep. 3. p. 464).  $\mathcal{L}$  In Carolinâ ad arborum fruticumque radices, ex gr. Carol. septentr. (Rugel!), in Floridâ (Chapmann!), Mexico (Andrieux!) Orobanche Americana Linn. suppl. 88. Willd. sp. 3. p. 351. Endl. ic. gen. t. 81. (v. in h. DC. Boiss. et Benth.)

IV. OROBANCHE Linn. gen. n. 779. excl. sp. Gärtn. fruct. 3. p. 42. t. 185. f. 4. dextr. C. A. Mey. in Led. fl. alt. 2. p. 43. Endl. gen. pl. p. 727. Walp. rep. bot. 3. p. 464. Putterl. et Endl. in gen. germ. ic. fasc. 23. — Orobanches sect. Ospreoleon Wallroth Orobanch. diasc. 29. Vauch. monogr.

Flores hermaphroditi, ebracteolati. Calyx disepalus, sepalis distinctis vel basi hinc antice aut rarius postice connatis, integris, incisis vel dentatis. Corolla hypogyna, ringens, labio superiore erecto bilobo vel bifido, inferiore patente, trifido. Stamina 4, corollæ tubo inserta, didynamia, inclusa, filamenta basi complanata, antheræ biloculares, loculis basi divaricatis mucronatis, connectivo mutico vel mucronato. Ovarium glandulâ hypogynâ obsoletâ, uniloculari, placens parietalibus quatuor geminatim approximatis. Ovula plurima. Stylus simplex. Stigma capitato-bilobum, lobis erga axim inflorescentiæ lateralibus. Capsula unilocularis, incomplete bivalvis, valvis basi et apice cohaerentibus, juxta axim placentes geminas gerentibus. Semina plurima subglobosa minima, testâ fungosâ crassâ minute punctato-scorpiculatâ. — Herba in hemisphaerii borealis temperatis super aliarum stirpium radicibus parasiticæ; scapo simplici, erecto, squamoso; floribus in squamarum axillis solitariis, sessilibus, erectis.

\* *Stamina ad basin corollæ tubi vel saltem infra tertiam partem inferiorem inserta.*  
*Corolla campanulata, sape basi antice strumoso-ventricosa.*

1. O. GAMOSEPALA, sepalis plurinerviis antice posticeque alte coalitis inæqualiter bifidis tubo corollæ brevirioribus, lobis anterioribus brevioribus obtusioribusque, posterioribus plicato-carinatis acutis, corollâ erectâ tubuloso-campanulatâ dorso subarcuatâ extus glanduloso-scabré, labiis inæqualibus subintegris pilis articulatis ciliatis, labio superiore galeato integro vel leviter emarginato, inferiore breviore lobis parvis subæqualibus rotundatis, staminibus supra basin corollæ insertis basi triangulari-dilatata breviter puberulis superne styloque sparse glandulosis, antheris magnis ad suturam breviter ciliato-lanatis, stigmata cernuo profunde bilobo.  $\mathcal{L}$  In pratis humidis prope col. Karass et radices moutis Matschuka Georgiæ Caucasicae (h. Hohenacker!). Scapus subpedalis, basi squamis ovatis concavis laxe imbricatis vestitus, superne flexuosus. Flores laxe et subalterne spicati, erecti, O. Galii magnitudinis, in sicco atro-sanguinei. Bracteæ ovatae striatae ciliatae corollâ dimidio breviores. Anthers albidae basi longe et tenuiter mucronatae. (v. s. in h. Hohenacker.)

2. O. CRUENTA (Bertol. rar. it. pl. dec. 3. p. 56) sepalis plurinerviis subæqualiter bifidis tubum corollæ superantibus corollâ campanulatâ antice basi strumoso-ventricosâ dorso arcuatâ, labiis inæqualibus denticulatis glanduloso-fimbriatis, superiore galeato integro vel subemarginato, lobis patentibus, lacinias labii inferioris subæqualibus, staminibus in basi corollæ insertis dense pilosis superne styloque glanduloso-pubescentibus, stigmatis disco holosericeo elevato-marginato.  $\mathcal{L}$  In locis graminosis siccis argilosis ad radices Loti corniculati, Hippocrépidis comosæ, Genistæ tinctoriae! et pilosæ! Coronillæ Emery! in Helvetiâ, Germaniâ, Galliâ, Italiâ, Hispaniâ centrali! Lusitanâ (Welw.) — Reichb. ic. 7. f. 869. O. gracilis Smith trans. 4. p. 172. Rchb.

7. f. 898, 899. *O. vulgaris* Gaud.! fl. helv. 4. p. 176. t. 2. *O. earyophyllacea* Fr. Schultz! beitr. 8, nou Smith. *O. du Genêt des teinturiers* Vauch! monogr. p. 37. t. 1. *Corolla campanulata, ampla, basi antice strumoso-gibba, intus sanguinea. Stamina in imâ basi corollæ inserta. Stigma luteum, margino fusco-purpureo cinctum. Tota pilis glanduliferis teeta. Odor floris suaveolens.* (v. v.)

*8. citrina* (Coss. et Germ. fl. paris. p. 309. exel. syn!), tota in vivo eitrino-flava, seapo graciei.  $\mathcal{U}$  Cum praecedeute hinc inde. (v. v.)

7. *Ulicis*, scapis plurimis, floribus laxioribus, sepalis subintegris, eorollis extus glabriusculis minus ciliato-fimbriatis. — Ad radiees Ulicis nani in Gallia occidentali. *O. Ulicis* Desmou!. in nouv. ann. sc. nat. 3. p. 71. Præter characteres supra indicati ex specim. a el. Desmoulinis ad b. Vau-cher missis nullam differentiam ab *O. eruentâ* Genistæ tinctoriae inve-nire potui! (v. s.)

3. *O. RETICULATA* (Wallr? gen. Orob. diase. 42), sepalis late ovatis plurinerviis ad medium bifidis simplicibusque lobis lato-lanceolatis subdivariantis tubum corollinum æquantibus vel superantibus, corollæ campanulatâ antice ba-i strumoso-ventricosâ dorso areuatâ compresso-subearinatâ, labiis inæqualibus acute et irregulariter dentieulatis glanduloso-ciliatis totâ longitudine nervis prominentibus striato-reticulatis, labio superiore subemarginato-bilobo lobis lati rotundatis patentibus, inferiore breviore lobis rotundatis interme-dio majore, staminibus ad basin corollæ insertis glabris vel imâ basi parce et breviter hirsutis, stylo glanduloso, stigmatis profunde bilobi diseo (in siccœ) einereo-pruinosis.  $\mathcal{U}$  In Hispaniâ australi prope Gades (Monnard in h. Fauché!), in regno Granatensi prope Ronda et Estepona (Boiss! Hænseler!), Gibraltar! (Leman in h. Bentli.), ad radiees Cisti Ladaniferi. Seapus semipedalis vel pedalis cum squamis breviter hirsutis, squamis et basi late ovatis aëtius laxis ad basin strobilis instar imbricatis dense vestitus. Bractæ ovato-auminatis florem subæquantes. Corolla extus labioque superiore intus sparsim glandu-losa. Afinis *O. eruentâ* differt eorollis majoribus labio superiore majore ner-voso-striatis, et presertim staminibus glabris vel basi tantum parce pilosis. (v. in h. Boiss. et Bentli.)

4. *O. SPRUNERI* (F.W. Schultz! in Florâ 26. p. 130), sepalis plurinerviis latis-simis lanceolato-auminatis indivisis vel bifidis margine dentato-ciliatis corollæ tubum vix æquautibus, corollæ amplissimâ campanulatâ basi stru-moso-ventricosâ dorso curvata labiis inæqualiter dentieulatis glanduloso-ciliatis, superiore altero multo majore recto emarginato, lobis (in vivo!) patentibus, laeinâ mediâ rotundatâ labii inferioris lateralibus majore stami-nibus ad basin corolle insertis basi villosis superne glabris styloque glandu-loso-pubescentibus.  $\mathcal{U}$  In radiebus Cisti eujusdam ad Melissam prope urbem Naupliam (Schultz), in Atticâ et Argolidi (Spruner! Boissier!). Habitus *O. cruentâ* et Rapum. Corolla magna extus glabra in tubo et ad lab. superioris pilis capitatis adpersa, intus glabra nitida sanguinea. (v. s. comm. a el. Spru-ner! et Boissier.)

5. *O. PROCERA* (Koch in Deutschl. fl. 4. p. 438. syn. p. 534), sepalis plurinerviis late ovatis subæqualiter bifidis integrisque tubo corollæ brevioribus, eorollâ campanulatâ antice basi strumoso-ventricosâ dorso curvata, labiis inæqua-liter dentieulatis margine subglandulosis, superiore emarginato lobis porrectis, laeinâ intermedia labii inferioris paulo majore, staminibus in basi corollæ insertis glabris imâ basi parce pilosis apice styloque subglandulosis.  $\mathcal{U}$  Parasitica in radice Cirsii arvensis, in agris Palatinatus prope Manheim. (v. s.)

6. *O. RAPUM* (Thuill. par. ed. 2. p. 317), sepalis plurinerviis subæqualiter bifidis integrisque tubum corollæ subæquantibus, corollæ campanulatâ antice basi strumoso-ventricosâ dorso areuatâ, labiis undulatis obsolete dentieulatis (laudifimbriatâ). superiore galeato emarginato, lobis patentibus, lobo intermedio labii iuferioris lateralibus duplo majore, staminibus in basi corollæ insertis

inferne glaberrimis apice styloque glanduloso-pubescentibus, disco stigmatis holosericeo immarginato.  $\mathcal{L}$  In sterilibus ad radices Sarothamni Scoparii, in Germaniâ australiori, Helvetiâ transalpina! Hispaniâ centrali! Galliâ, Italijâ, Corsicâ in Anthyllide Hermanniae (Jord.). O. major DC. ! fl. fr. 3. p. 488. Gaud. ! fl. helv. 4. p. 175. Rchb. ic. f. 900. (O. major) f. 923. (O. Rapum). Engl. bot. t. 421. Alb. Dietr. fl. borussic. t. 249. Corolla ampla campanulata O. cruentæ, sicae luteo-fusca. Antheræ defloratis albis, staminibus inferne glaberrimis et labiis non fimbriatis dignoscitur. (v. v. et s.)

$\beta.$  *bracteosa*, spicâ valde elongatâ, bracteis flores superantibus apicem comosâ.

— In Galliâ australi prope Collioure (Benth. !), in subalpinis Pedemontii (Moris !). O. crinita Benth. cat. pyr. p. 109, excls. syn. Salzm. non Viv. (v. s. in h. Benth.)

7. *O. ANATOLICA* (Boiss. et Reut. in Pin. pl. Car. exsic. 1843), sepalis plurinerviis ovatis ad medium vel tertiam partem bilobis antice coalitis tubo corollæ brevioribus, corollâ coriacâ campanulatâ subrectâ dorso convexâ, labiis pilis arachnoides niveis ciliato-marginatis, labio superiore galeato integro vel cinariginato extus glanduloso lateribus reflexis, inferiore multo breviore lobis aequalibus ovatis obtusis integris, staminibus glabris supra basin corollæ insertis stylo glaberrimo, stigmate crasso bilobo verrucoso primum pulchre deuì squamido flavo.  $\mathcal{L}$  In monte Cadmo supra Colossam detexit amic. Boissier! 1842, in Cariæ montibus (Pinard! 1843), in collibus calidis arenoso-torfaceis prope Bouldour ad radices *Salviae Cedronellæ* Boiss. parasitica (v. Heldreich! 1845), etiam in pratis ad radices montis Sarial in Caucaso (Hohenacker). Species distinctissima. Scapus crassus, superne bracteisque pilis niveis araneosis adpressus vestitus, basi squamis ovatis obtusis imbricatis obtectus. Flores in spicam densissimam oblongo-cylindraccam dispositi. Corollæ obscure fusco-purpureæ extus labioque superiore intus glandulis sessilibus flavis conspersæ, labiis valde inæqualibus. Totius planta color in secco luride obscurus. (v. s.)

8. *O. VARIEGATA* (Wallr. gener. Orob. diasc. p. 40), sepalis plurinerviis e basi ovata profundi et inæqualiter bifidis tubo corollæ longioribus, corollæ campanulatâ dorso arcuata antice strumoso-ventricosa, labiis denticulato-crîspis ciliatisque, labio superiore galeato integro vel subemarginato lateribus porrectis vel demum reflexis, inferiore trilobo plicato bigibboso lobis rotundato-flabellatis intermedio majore, staminibus ad basin corollæ insertis basi internâ styloque hirsutis.  $\mathcal{L}$  In radicibus Sarothamni scopariae (Mut.) et Genista ciureae (Reut.) parasitica, in Galliâ Australi et Occidentali, in Pyrenæis (Benth.), Corsicâ, Algeria (Mutel), in collibus supra Genuam (Vauch.), Pedemontio prope Tendam ubi legi, Germania australi prope Inspurach (Rchb.). — Mutel fl. fr. 2. p. 351. Rchb. pl. crit. 7. f. 903, 904. O. fœtida DC. ! fl. fr. 5. p. 392. Duby bot. gall. p. 349. O. du Genet cendré Vauch. ! monogr. orob. p. 41. Scapus pedalis vel bipedalis, squamis oblongis lanceolatisque rigidis laxis munitus, superne villoso-furfuraceus. Bracteæ flores æquantes vel superantes sepalaque albo-hirsuta. Flores magni in spicam laxam elongatam dispositi. Corolla luteo-fusca intus purpurea. Stigma emarginato-bilobum dilatatum inflexum flavescentis. (v. v. et s. in h. DC.)

9. *O. SPARTII* (Guss. ! prodr. 2. p. 182), sepalis plurinerviis e basi ovata profundè et subæqualiter bifidis vel integris unidentatisque cum bracteis villoso-furfuraccis tubum corollæ aequantibus vel superantibus, corolla campanulatâ dorso subrectâ antice gibboso-ventricosa, labiis inæqualiter denticulatis, superiore subemarginato, inferiore trilobo plicato-bigibboso lobis ovatis intermedio majore, staminibus ad basin corollæ insertis imâ basi villosis superne styloque glanduloso-hirsutis, stigmate emarginato-bilobo flavescente demum fuscescente (Guss.)  $\mathcal{L}$  In collibus supra Genuam (Vauch.), Siciliâ (Guss. ! Splitg. !), Algeria (Mut.), Galliâ occidentali prope St-Sever et la Teste de Buch (L. Dufour !), ad radices Spartii juncei, Cytisi triflori, lanigeri et infesti parasitica. — Guss. syn. fl. sic. 2. p. 135. O. purpurea Rafin. cat. p. 80, non Thunb. O. fœtida Biv. manip. 1.

exclus. syn. ex Guss. non Desf. DC.! fl. fr. 5. p. 392 ex parte. *O. grandiflora* Presl fl. sic. 1. p. 34? non Bor. et Chamb.! *O. du Spartium* juncier Vauch. monogr. p. 42. *O. variegata* Mut. fl. fr. 2. p. 351 ex parte. Scapus 1-2-pedalis. Bractea floribus longiores vel æquales, apice acuminatæ ac reflexæ. Sepala valde variabiliæ (ex Guss.), ovata vel semiovato-lanceolata, acuminata, integra uideutata vel bifida, dente vel laciūa alterâ brevioræ. Corolla odorem nauseosum spirantes, in medio ampliatæ, non incurvæ, sordide purpureæ. (v. in h. DC.)

10. *O. CONDENSATA* (Moris! el. stirp. sard. 2. p. 8. non Griseb.), sepalis multinerviis latissime ovatis antice subcontiguis tubo corolla brevioribus inæqualiter bilobis, lobis anticus obtusis posticis longioribus lanceolatis acutis carinatis, corolla campanulatâ basi antice strumoso-ventricosâ dorso convexâ labiis irregulariter denticulatis, superiore emarginato-bilobo, inferiore lobis ovatis obtusis intermedio longiore, staminibus imâ basi corollæ insertis basi pilosis superne styloque glaudulosis, stigmate crasso profuso bilobo.  $\mathcal{U}$  In Sardinia (Moris! in aridis insulae S.-Antioco (Muller! exsic. un. it.), Corsicâ (Mut. et Algeriâ (Schimper! nn. it. 1832 sub. O. fœtida), ad Forum Juli Gallo-provinciae (Peyreim. ex Mut.)), ad radices Genistæ Scorpiorum et Corsicæ et Partii lauigeri parasitica. — Rchb. pl. crit. 7. f. 897. Milt. fl. fr. 2. p. 343. Scapus crassus pedalis vel sesquipedalis subflexuosus. Squamæ ovatae obtusiusculæ. Bractea ovatae vel ovato-lanceolatae corolla brevioræ sepalaque dense piloso-furfuracea. Flores inferiores sublaxi, superiores conferti, sed minus tamen quam in sequente condensati. Corolla atrosanguinea. (v. s. comm. a cl. Moris.)

11. *O. THYRSOIDEA* (Moris! mss.), sepalis plurinerviis late ovatis apice bifidis lacinii lanceolato-subulatis tubum corolla subæquantibus, corolla campanulata, labio superiore integro vel subemarginato convexo-galeato extus hirsuto-scabro, inferiore breviori deflexo lobis subæqualibus rhomboideo-acuminatis carinato-complicatis margine denticulatis vel irregulariter subtrilobis ciliatulis, staminibus glabris vel inferne pilosiusculis ad basin corollæ insertis, antheris magnis oblongis longe calcaratis pallidis, stylo glabro vel apice subglandulosi, stigmate bilobo.  $\mathcal{U}$  In radicibus Genista Corsicae parasitica in Sardinia. Squamæ crassæ ovatae vel ovato-lanceolatae. Flores densissime spicati. Bractea triangulari-lanceolatae corollam subæquantes. Corolla magna atro-sanguinea. (v. s. comm. a cl. Moris et in h. DC.)

12. *O. FŒTIDA* (Desf. atl. 2. p. 59. t. 144), sepalis plurinerviis pilosiusculis e basi late ovata in lacinias lineariformes subito angustatis tubo corolla longioribus antice coalitis, corolla papyracea campanulata dorso arcuatâ vel subrectâ lobis inæqualiter et remote denticulatis non ciliatis, labio superiore bilobo lobis extns reflexis, inferiore trilobo lobis ovatis acutiusculis subæqualibus inter se sinu late separatis, staminibus supra basin corolla insertis inferne pilosiusculis, antheris superne ad suturas subvillosi, stylo glanduloso.  $\mathcal{U}$  In radicibus Loti cytisoidis! Scorpiorum muricatis parasitica, in Africâ boreali prope Algeriam (Bové!), Tingidem (Salzm.!), in Hispaniâ meridionali prope Gades! Malagam Estepouam! (Boiss.!), in Pyrenæis orientalibus (Benth. cat. pyr. p. 109). — Rchb. pl. crit. 7. f. 924. Scapus quoad magnitudinem mire variabilis, nempe 5 pollices ad sesquipedem longus, squamis lanceolatis laxis vestitus. Flores dense spicati, apice bracteis filiformibus comosi. Bractea lanceolato-acuminata extus furfuraceo-hirsutæ flores æquantes vel superantes. Corolla nitida papyracea glabra vel glandulosa sessilibus adpersa superne atropurpurea inferne pallidior. Stigma flavum ex Mut. (v. s. in h. DC. et Boiss.)

13. *O. CRINITA* (Viv. fl. corsic. sp. nov. diagn. p. 11), sepalis late ovatis paucinerviis profunde bifidis antice coalitis lacinii linearis-subulatis tubum corolla subæquantibus, corolla tubuloso-campanulata apice incurvâ horizontaliter patente, labiis brevibus denticulatis, superiore galacto lobis rotundatis, inferiore lobis parvi rotundatis subæqualibus vel intermedio paulo majore,

staminibus glabris paulo supra basin corollæ insertis, stylo subglanduloso, stigmate emarginato-bilobo.  $\mathcal{L}$  in arenosis maritimis Corsicæ prope Bonifacio (Viv. Jordan!) Calvi (Solier), in radicibus Loti cytisoidis, Sardinia (Moris!), Siciliæ. — Guss. prodr. fl. sic. 2. 185. syn. 2. p. 136. Mutel fl. fr. 2. p. 351. O. du Lotus cytisoides Vauch. monogr. p. 50. Scapus palmaris vel pedalis basi vix incrassatus, squamis linearibus vestitus. Flores parvi O. minoris magnitudine, superne atro-sanguinei, in spicam densam cylindraccam apice bracteis sepalisque flores non explicatos superantibus congesti. Bracteæ lineari-lanceolatae, piloso-furfuraceæ, corollam æquantes. Stigma purpureum, ex Guss. (v. s. et in h. DC. et Jord.)

14. O. NEBRODENSIS (Tin. in Guss. syn. fl. sic. 2. add. p. 845), gracilis puberula, squamis linearibus acutis adpressis, spicâ cylindracea non elongata pauciflorâ laxiuscula, bracteis lanceolato-acuminate flores apertos excedentibus, sepalis bifidis, laciiniis triangulari-subulatis, corollis tubulosis sub-incurvis lobis denticulatis coniuentibus, staminibus glabris, stylo obsolete villosa. (1) in montosis Siciliæ. Flores parvi, sanguinei. Differt ab O. crinita bracteis flores jam explicatos excedentibus; spicâ non densâ ac pauciflorâ; corollæ lobis conniventibus, margine tenuiter denticulatis; gracilitate totius plantæ ac florum; quibus fere omnibus characteribus ab O. sanguineâ Presl dignoscitur (Tin.)

15. O. DENSIFLORA (Salzm. pl. tingit. exsicc.), sepalis plurinerviis e basi late ovata abrupte angustato-subulatis bifidis vel antice dente aucto trifidis tubum corollæ superantibus, corollâ glabrâ campanulato-tubulosâ dorso arcuatâ labiis inaequaliter denticulatis, superiore submarginato, inferiore trilobo, lobis ovatis intermedio majore inter se simi lato gibbo separatis, staminibus glabris vel basi parce pilosis prope basin corollæ insertis, stylo glabro, stigmate profunde bilobo incurvo.  $\mathcal{L}$  In arenosis maritimis regni Maroccani prope Tingidem (Salzm. Schousb. in h. Pavon! nunc Boiss.). O. crinita Rehb. pl. crit. 7. f. 922, non Viv! Scapus crassus angulosus piloso-furfuraceus. Squamæ lancolatae laxæ. Flores in spicam oblongo-cylindricam densissime congesti. Bracteæ lineari-subulate extus piloso-furfuraceæ floribus longiores apice spicæ comose. (v. in h. Boiss. et Benth.)

16. O. PRUINOSA (Lapeyr. suppl. p. 87), sepalis quinque-nerviis bifidis laciiniis subæqualibus angustis subulatis tubum corollæ æquatibus, corollâ campanulata dorso subcurvatâ, labiis expansis undulato-plicatis crispis obtuse denticulatis non ciliatis colorato-venosis, superiore bilobo, lobis labii inferioris rotundatis, intermedio duplo majore, staminibus supra basin corollæ insertis inferne villosis apice styloque subglandulosis. (1) in radicibus Fabæ, Viciae, Lupini, Lathyri et Calendulae arvensis parasitica! in Gallia austro-occidentali, Cata-launiâ! (Benth.), Italâ! Græciâ! insulâ Zacyntho (Margot!), in Oriente prope Aleppum (Kotschy! pl. alepp. n. 204), Ægypto inferiore (Kotschy!), in Canariis (Despr. in h. Lenorm!). — Reichenb. pl. crit. ic. f. 911. O. de la fève Vauch.! monogr. t. 5. O. grandiflora Bor. et Chaub. fl. pelop. p. 983. 23. Corolla magna præcedentium, sed tenuis substantiæ exsiccatæ papyracea, labiis magnis plicato-crispis instructa venisque cœruleis pulchre picta. Stigma violaceum ex Vauch. (v. in h. DC.)

17. O. SPECIOSA (DC! fl. fr. suppl. p. 395. non Walp. nec Alb. Dictr.), sepalis plurinerviis lanceolato-lineariibus simplicibus vel raro inæqualiter bifidis tubo corollæ longioribus, corollâ amplissimâ campanulata dorso subrectâ, labiis rotundatis denticulato-crispati, labio superiore bilobo apice paulo sursum curvato, inferiore lobo medio lateralibus majore, staminibus supra basin tubi insertis inferne sparse et breviter puberulis apice styloque subglandulosis stigmatis lobis crassis globosis. — In Gallia australi circa Telonem (Dufour). O. alba Mutel fl. fr. 2. p. 350. non Bieb. Scapus teres subpedalis basi subæqualis bracteisque pilis albis crispis glandulosisque vestitus. Squamæ sparsæ lineares paucae. Bracteæ lineari-lanceolatae corollam subæquantes. Corolla papyracea (in sicco) pallide rufescens; lobi marginem versus subhyalino-

pallidiores extus sepalæque pilis albis crispis prædicti. O. pruinosa Lapey. var. affinis, differt floribus majoribus concoloribus, sepalis majoribus subintegratis. Au var. pallida? Ab O. pallidiflora Wimm. et Grnb. diversissima! (v. in h. DC.)

18. O. LEUCANTHIA (Griseb.! spicil. fl. Rumel. 2. p. 57), pallescens palmaris basi subæqualis, bracteis corollæ tubum subæquantibus, sepalis 1-2-nerviis subulatis bifidisque, corolla tubo patente rectiusculo labio patente, staminibus suprabasilaribus glabris, stigmate violaceo. — In peninsula Hajion-Oros in Castanetis umbrosis prope Karas alt. 2000 ped. solitaria. O. alba Rchb. pl. f. 912. (excluso stigmatis colore). Habitus tenuior, spicæ abbreviata, corolla sceni-poll. longa, stamina 1 lin. supra basin inserta vel paulo altius ad punctum insertionis lanâ luteâ brevissimâ instrincta, ceterum glaberrima alba, antheris brunneis tenuiter biauratis, stigma biglobosum declinatum ex Griseb. (v. in h. Griseb. specim. imperfect.)
19. O. ALEXANDRI (Tin. in Guss. syn. fl. sic. nnd. p. 845), glanduloso-pilosiuscula, squamis bracteisque ovato-lanceolatis, spicâ laxâ, sepalis integerrimis seu ovato vel lanceolato-acuminatis bracteisque nervosis subæqualibus corollâ denticulata non constrictâ brevioribus, labio superiore emarginato subfornicate, inferiore trilobo longiore, staminibus styloque basi pilosis apice glanduliferis, stigmate bilobo glaberrimo subglanduloso. (I) In montosis Siciliae, Rubescens; flores subsemipollucres, ampli, suaveolentes, non incurvi, rubrostriati, venosi, glanduloso-punctati. Stigma purpureo-scutum. Ab affini O. pruinosa differt: brevitate pilorum grandulosorum; sepalis integerrimis eorumque figurâ, et una cum bracteis corollæ multo brevioribus; corollâ minus elongatâ. Ab O. Galii et caryophyllacea indicatis notis queque aliena. (Tin.)
20. O. ALBA (Steph. in Willd. sp. 3. p. 450), sepalis 3-5-nerviis e basi ovata lanceolato-acuminatis integris vel antice lobulo parvo aucti tubo corollæ brevioribus, corollâ campanulato-cylindracea ampliâ dorso subcurvata glandulis adspersâ, labio superiore obcordato-bilobo lobis latis rotundatis margine denticulatis, inferiore lobis rotundatis subæqualibus denticulatis, staminibus ad basin corollæ in-ærtis inferne parce hirsutis superne glandulosis, stylo glabro vel superne glanduloso, stigmate magno bilobo (ex sicco; obscure purpureo. 2 In Caucasi graminosis (Bieb.) in campis prope Karass prov. Cauc. sept. (Hohenack!), prope Elisabetopolim (Hohenack!). — Bieb. fl. taur. cauc. 2. p. 38. cent. pl. rossic. 2. t. 52. Rchb. pl. crit. 7. f. 912. Buxb. cent. 3. t. 11. Scapus 6-10-pollicaris basi mediocriter bulbosus, squamis oblongo lanceolatis glabriusculis tectus, superne fulvo-villosus. Flores speciosi magnitudine O. pruinosa albi subpurpureo tincti, extus labioque superiore intus glandulis adspersi. Bractæ lanceolata pubescenti-glandulosa corollam circiter æquans. (v. in h. Boiss. et Hohenacker.)
21. O. HYMENOCALyx, sepalis paucinerviis membranaceo-subhyalinis latissime ovatis antice contiguis vel sibi accumbentibus bifidis lacinis triangulari-ovatis tubo corollino æqualibus vel majoribus, corollâ late campanulata inferne inflato-ventricosa, lacinis irregulariter crispato-denticulatis, labio superiore profunde bilobo lobis rotundatis porrectis, inferioris lobis ovatis subæqualibus, staminibus ad basin corollæ insertis glaberrimis, stylo ovarioque glanduloso, stigmate bilobo. 2 In Georgia Caucasica prope Helenendorf (Hohenacker!) Scapus subpedalis striatus squamis laxis sparsis lanceolatis prædictus. Flores longe spicati substantia papyraceæ suberecti. Bractæ furfuraceo-hirsuta e basi ovata longe lanceolato-lineares florem superantes. Corollæ in sicco pallide rufescentes extus glandulosæ. Affinis O. Gallii, sed corollæ labio superiore profunde bilobo non galeato, staminibus glaberrimis differt. (v. in h. Hohenacker.)
22. O. GALLII (Duby bot. gall. p. 349), sepalis plurinerviis subæqualiter bifidis tubum corollæ dimidium æquantiibus antice contiguis connatis, corollâ e basi sensim ampliatâ campanulata dorso curvatâ, labiis inæqualiter denticulatis,

superiore galeato lateribus correctis (non patentibus), labii inferioris laciniis ovatis subæqualibus correctis tubo dimidio brevioribus, staminibus supra basin corollæ insertis dense pilosis superne styloque glanduloso-pilosus, disco stigmatice velutino margine elevato destituto.  $\mathcal{L}$  In collibus, campis, sylvarum marginibus, in Gallii veri et Molluginis radic. parasitica, in Britannia, Germania, Gallia, Helvetia occid., in parte inferiore Jurassi et Alpium calcarearum Sabaudiae, in Georgiâ Caucasica (Hohen!) et Sibiria Altaica? O. caryophyllacea Smith in trans. soc. linn. 4. p. 169. O. vulgaris DC. fl. fr. 3. p. 489. O. du Gallium Mollugo Vauch. orob. 55. t. 7! O. Bipontina Schultz! beitr. p. 7. O. caryophyllacea Rchb. pl. crit. f. 890, 891. Gaud.! fl. helv. 4. 176. t. 1. mala. O. Gallii Rchb. f. 892-895. O. strobiligena f. 905, 906. O. laxiflora Rchb. fl. excurs. p. 355. O. vulgaris DC! fl. fr. non Gaud.! Rchb. pl. crit. f. 908-910. O. major Poll. pal. 2. p. 200. Etiam ad hanc pertinere videntur ex cl. Walpers: O. adenostemon Rchb. pl. crit. 7. f. 894. fl. germ. excurs. 354. O. Krausei Alb. Dietr. flor. boruss. 7. t. 837. O. maerantha Alb. Dietr. l. e. 438. O. torquata Rchb. pl. crit. 8. f. 1128. Alb. Dietr. fl. borussic. 4. t. 440. O. gilva Alb. Dietr. fl. borussic. 7. t. 439. O. citrina Alb. Dietr. l. c. t. 441. Omnes in radicibus Gallii veri et Molluginis crescunt. (v. v.)

23. O. TEUCKII (F. W. Schultz! in Flora 1835, p. 200 cum. ic. analys.), sepalis plurinerviis subæqualiter bifidis, laciniis lanceolatis tubum corollæ dimidio subæquantibus antice contiguis vel connatis, corollæ campanulato-tubulosâ dorso rectâ galeatâ declivi, labio superiore integro vel subemarginato margine patente, inferiore trilobo deorsum verso, laciniis rotundato-obtusis subquadrisatis inter se sinu late obtuso separatis, staminibus supra basin corollæ insertis a basi ad medium pilosis, superne styloque glanduloso-pilosis, stigmate holosericeo verruculoso.  $\mathcal{L}$  In locis apricis lapidosis solo calcareo ad radices Teuckii Chamædryos! montani! Scordoniae! Pyrenaicæ! (Jord.) Thymi Serpylli parasitica, etiam ad radices Bromi erecti (1) adhaerens prope Genevam leg. amiciss. Dr. Fauconnet!, in Gallia, Germania, Helvetia occidentali. — Hollandie fl. Mosell. p. 322. Mutel fl. fr. 3. p. 344. t. 42<sup>3</sup> f. 307, suppl. t. 3. f. 6. Koch syn. ed. 2. p. 615. O. atro-rubens F. Schultz! in Flora 1840. p. 128. pl. gall. et germ. exsicc. n. 497, arch. fl. fr. e! d'Allem. p. 13. Corolla fusco-lutea, plus minusve in violaceum vel aurantiacum vergens, basi flavida, extus intusque ad labium superius pubescens-fancea aperta, sinibus labii inferioris vix prominul. Stigma profunde bilobum, fuscescens-sanguineum. Odor debilis caryophyllaceus. (v. v. et s. iu l. DC., etc.)

24. O. ANTIRRHINA, sepalis plurinerviis lanceolatis integris vel apice breviter bifidis tubo corollæ subæqualibus, corollæ campanulati amplissimâ hirsuto-glandulosâ, labiorum lobis patentibus rotundatis denticulato-crenulatis, superiore bilobo intus glandulosâ lateribus patentibus vel reflexis, inferiore lobis rotundatis subæqualibus, staminibus ad basin corollæ insertis glabris apice glandulosis, stylo glabro superne parce glanduloso, stigmate magno bilobo.  $\mathcal{L}$  In Podolia ad marginem sylvarum inter Zinkow et Bar rarissima (Godet! 1824). O. epithymum var. major? Godet h.! O. gracilis Bossier! in l. DC. non Smith. Scapus rubro-violaceus hirsuto-furfuraceus. Squamae bracteæque lanceolatae sepalaque hirsuto-furfuracea. Flores speciosi magnitudine et formâ Antirrhini majoris insignes laxe spicati, in sicco fusco rubescentes. (v. in l. Godet.)

25. O. EPITHYMUM (DC.! fl. fr. 3. p. 490), sepalis plurinerviis subulato-acuminatis tubo corollæ longioribus indivisis vcl dente divaricato-bifidis, corollæ campanulata dorso leviter arcuatâ extus labioque superiore intus glanduloso-pilosus, pilis tuberculo minutissimo insidentibus, labiis inæqualibus acute dentatis margine crispatis, superiore apice paulo sursum curvato bilobo, lobis

(1) Rarissime adhaerent Orobanche Monocotyledonibus! nam cel. Vaucher nunquam vidit ex monographiâ sua, p. 16. (Alph. DC.)

patentibus, lobo intermedio labii inferioris lateralibus duplo longiore, staminibus prope basin corollæ insertis inferne sparsim pilosis apice styloque glanduloso-pilosus, disco stigmatis velutino margine elevato destituto.  $\mathcal{L}$  In ericetis et pascuis lapidosis ad radices Thymi Serpylli, Th. vulgaris et Satureia montana! parasitica, in Galliâ, Helvetiâ occidentali, Sabardia, Pedemontio, montibus Hymalaiensibus (Edgew. in h. DC.) — Koch syn. ed. 1. p. 535. Rchb. pl. crit. 7. 1887-889. Putterl. et Endl. in gen. germ. fasc. 23. io. O. sparsiflora crit. 7. 1887-889. Wallr. sched. p. 309. O. du Thym serpolæt Vauch! orob. t. 6. mala. O. Wallr. sched. p. 309. O. du Thym serpolæt Vauch! orob. t. 6. mala. O. Wallr. sched. p. 309. O. rubiginosa Griseb. spicil. fl. Rumel. 11. p. 55. Humilior antece-erueta var. leiomou Griseb. spicil. fl. Rumel. 11. p. 55. Humilior antece-erueta var. leiomou Griseb. spicil. fl. Rumel. 11. p. 55. Humilior antece-erueta var. leiomou Griseb. spicil. fl. Rumel. 11. p. 55. Stigma crassum stylusque superne obscure purpureo (v. v.)

$\beta$ . *rubiginosa* (Walp. rep. bot. 3. p. 467), glandulis pallide rubiginosis adspersa, corollâ longiore angustiore obscure fuso-purpureâ labio superiore protracto subruucato, lobulis deflexis, antheris flavis, stigmate aurantiaco. O. rubiginosa Alb. Dietr. flor. boruss. 3. t. 252. O. rubra engl. bot. 1786. Rchb. pl. crit. f. 885.

26. O. PIENSELERI, sepalis ovatis plurinerviis tubum corollæ superantibus ad medium vel ultra profunde et inæqualiter bifidis laciniis lanceolatis nervo medio prominente subcarinatis, corollâ campanulatâ antice gibboso-ventricosâ dorso arcuatâ, labii grossè et irregulariter crispato-denticulatis, labio superiore bilobo sursum versus curvato, inferiore lobis ovatis retuso-truncatus intermedio majore, staminibus infra tertiam partem inferiorem tubi insertis filamentis angustis totâ longitudine hirsutis, stylo apico glanduloso, stigmate divaricatum bilobo.  $\mathcal{L}$  in Hispaniâ australis regni Granatensis Sierra de Juncqua (Haensteler). Scapis sesquipedalis angulosus squamaeque ovatae vel oblonge obtusa violaceo-purpurea, glandulis subsessilibus adspersa. Flores e majoribus inferiores remotiores longe spicati. Bractæ oblongo-lanceolatae corollam æquantes vel superantes. Corolla pollicem longa, extus et labio superiore intus glandulis subcessilibus conspersa, in sicco fuso-purpurea. Affinis O. Epithymo, differt statuâ multo majore, sepalis semper bifidis, corollâ majore, staminibus altius insertis totâ longitudine hirsutis. (v. in h. Boiss.)

27. O. SCABIOSÆ (Koch Deutschl. fl. 4. p. 448. syn. p. 534), sepalis plurinerviis ovatis in apicem subulatum attenuatis, corollæ tubum superantibus vel bifidis laciniis parallelis, corollâ campanulatâ dorso arcuatâ extus labio que superiore intus piloso-scabris pilis sparsis brevibus glanduliferis, tuberculo violaceo nigrove insidentibus, labiis inæqualibus acute dentatis margino crispis superiore paulo sursum curvato bilobo, lobis patentibus, laciniis labii inferioris æqualibus, staminibus prope basin corollæ insertis inferne sparsim pilosis apice styloque subglabris, stigmate bilobo sordide violaceo!  $\mathcal{L}$  in pastenis Alpium ad radices Scabiosæ Columbariæ et lucidæ, in Germaniâ prope Berchtesgaden (Berger) prope Lofer (Spitzel), in Styriâ, Austria superiore, in Helvetiâ occidentali supra Bex (Em. Thomas!) in monte Jurâ supra Thoiry! in rupe Vouarne prope cacumen Dolaz ad radicem Cardui deflorati (Rapin!) in monte Salevâ prope Genevam! in monte Lautaret Delphinatus (h. Jordan!) Similis O. Epithymo, differt autem caule altiore crassiore, tuberculis nigris piligeris corollæ, lobis labii inf. æqualibus et filamentis apice glabris conniventibus nec arcuato-descendentibus. Scapus, bractæ, corollæ extus præsertim in labio superiore, colore violaceo-fuliginosis notabilia! (v. v. et in h. DC.)

28. O. PALLIDIFLORA (Wimm. et Grab. fl. sil. 2. 233), sepalis plurinerviis late ovatis, subito in acumen subulatum contractis tubum corollæ æquantes, corollâ campanulatâ in medio dorso rectiusculâ superne antrorum curvatâ extus labioque superiore intus glanduloso-pilosus, pilis tuberculo ochraceo insidentibus, labiis inæqualibus acute denticulatis margine crispatis, superiore apice paulo sursum curvato bilobo, lobis patentibus, laciniis labii inferioris subæqualibus, staminibus prope basin corollæ insertis inferne sparsim pilosis

- superne glabris, stylo superne glanduloso-piloso.  $\mathcal{U}$  In radice Cirsii arvensis parasitica, in Silesia, et prope Frankofurtum ad Viadrum! — Koch syn. ed. I. p. 534. O. speciosa Alb. Dietr. fl. boruss. t. 149, non DC. Simillima antecedenti, differt præcipue sepalis et colore florum, tuberculisque piligeris minoribus ochraeis. (v. in h. Boiss. et Lechler.)
29. O. LUCORUM (Alex. Braun ap. Schultz in Annal. d. gew. d. regensb. bot. ges. 5. p. 504), sepalis late ovatis binerviis inæqualiter bifidis tubum corollæ æquantibus lobis posticis longioribus nervoso-carinatis, corollæ tubuloso-campanulatâ dorso curvatâ, labiis subtiliter glanduloso-ciliatis obsolete denticulatis superiore bilobo, lobis patentibus, inferiore lobis ovatis acutis intermedio sublongiore, staminibus supra basin corolla insertis a basi supra medium dense pilosis, stylo glabro, stigmatis divaricato-bilobi disco lœvi velutino.  $\mathcal{U}$  In radice Berberidis vulgaris parasitica, in Germania, Monachio loco dicto Englischen Garten, in Tyrolia australi passim (Facchini!) O. Berberidis Facch.! in litt., Koch syn. ed. I. p. 537. O. loricata Rchb. pl. crit. f. 918. Staminum insertio in icona nimium alta. Colore flavo-rubente, corollæ ampiore, rictu multo majore, lobis patentibus, non refractis, filamentis longioribus apice multo minus curvatis, stylo ultra staminum curvaturam emerso et stigmate majore fusco-rubro profundi bilobo velutino neque verrucoso-cicatrizado ab O. flavæ insigniter differt. In specimine Tyrolensi lobi calycini postice inter se coaliiti sunt! (v. in h. DC. etc.)
- Rubi*, floribus paulo majoribus et amplioribus, in radice Rubi cæsii habitans. Braun ap. Koch D. fl. 4. p. 458, non Vauch. ex Koch l. c.
30. O. FULGINOSA, sepalis plurinerviis e basi subovatâ longe acuminato-subulatis integris bifidisque corollæ tubo brevioribus vel æqualibus margine parce glanduloso-hirsutis, corollæ campanulato-tubulosa dorso subrectâ superne galeato-fornicata, labiis undulato-plicatis obtuse denticulatis, superiore bilobo lobis porrectis, inferiore lobis æqualibus ovato-acuminatis, staminibus supra basin corolla insertis inferne villosis superne styloque parce glandulosis.  $\mathcal{U}$  Cresci parasitae in radicib. Orob. digitati in Hymeto monte Græciae (Spruner!) in eodem monte ad rad. Cephalaria ambrosioides (Sartori!) in insulis Stechadiibus ad radices Cinerariae maritimæ (Jordan!). Scapus sesquipedalis fusco-violaceus ut squamæ sepalaque glanduloso-hirsutus. Corollæ labium superius obscure violaceo-brunneum, inferius pallidius venis fuscis' pictum. (v. s. comm. cl. Spruner et in h. Jordan et DC.)
31. O. CONCOLOR (Duby bot. gall. p. 350), sepalis uni- vel trinerviis e basi ovata subulato-acuminatis simplicibus bifidisque corollæ tubo brevioribus, corollæ tubuloso-campanulata porrectâ basi dorso arcuatâ dein rectâ, labiis obtuse denticulatis non ciliatis, labio superiore bilobo lobis rotundatis, inferiore trilobo lobo intermedio lateralibus paulo majore, staminibus supra basin corolla insertis inferne hirsuto-ciliatis, antheris parvis subrotundis stylo glabriuscule vel sparse piloso-glandulosi, stigmate profunde bilobo luteo.  $\mathcal{U}$  In Gallo-provinciâ, Foro Julii, Cannes et prope Olbiam (Jordan!) in radicibus Scabiosæ Columbariae, Chærophylli sylvestris et Menthae arvensis. — Vauch. monogr. Orob. p. 61. t. 11. Tota stramineo-lutea. Scapus gracilis semi-ad sesquipedalis basi in bulbum medicorem incrassatus ut squamæ sepalaque crispulo-hirsutus, squamis laxis ovato-lanceolatis acutis. Flores lutei O. minoris magnitudine. Corolla pilosiuscula tubulosa dorso inferne curvata deinde recta, labii super. lobis demum revolutis. Bractea corollam subæquans. (v. in h. Lenormand et Jordan.)
32. O. BARBATA (Poir. dict. 4. p. 621, non Rchb.), sepalis paucinerviis e basi ovata inæqualiter bifidis laciniis subulato-filiformibus tubo corollæ æqualibus vel majoribus, corollæ tubuloso-campanulata dorso basi curvatâ dein rectâ, labiis brevibus irregulariter denticulato-fimbriatis, superiore bilobo, inferioris lobis rotundato-retusis intermedio sublongiore, staminibus supra basin corolla insertis inferne breviter villosis, stylo glabro vel sparse glanduloso

stigmatae divaricatum bilobo.  $\mathcal{L}$  In Hispania (Poir.), Lusitanâ (Brot.) Wohlwitsch ! pl. lus. exsicc. n. 209 parasitæ in leguminosis annnis, in arvis ad pedem Serræ de Monsanto ! — Brot. fl. lusit. I. p. 183. Scapus 6-8-pollicaris crassiusculus superne bracteæque pilis albis subnugaciis munita. Squamae ovatae acutæ laxè imbricatae. Flores dense spicati in secco flavescentes. Bractæ striatae elongato-lanceolatae corollam æquantes vel superantes, apice spicæ conosæ. O. Picridis facie omnino similis, differt sepalis profunde bifidis nec subintegris. corolla labio superiore bilobo nec integro. (v. in h. Boiss. et Dunnant.)

33. *O. BOVEI*, sepalis plurinerviis e basi late ovata inæqualiter bifidis tubo corollæ sublongioribus, corollæ brevi tubuloso-campauulatâ dorso subcurvata labiis brevibus inæqualiter denticulatis, superiore submarginato bilobo lobis rotundatis porrectis, inferioris deflexi lobis retuso-flabellatis intermedio submajore, staminibus ad basin corollæ insertis parce et breviter pilosis o fauce subexsertis, stylo parce glandulosæ, stigmate profunde bilobo. — In Algeriâ (Boivé ! sub n. 22) cum alia spec. in h. Boissier mixta, in h. mus. Par. sub n. 137, ad radices Hyoscyridis radiatae (Boivé !). Forsan *O. media* Desf.? Scapus teres subpedalis superne subaugulosus piloso-furfuraceus squamis lanceolatis subadpressis basi imbricatis praeditus. Flores parvi longe spicati *O. minoris* sat similes sed multo breviores et minus arcuati. Bractæ corollam subæquans. Sepala inter se omnino libera. (v. in h. Boissier.)
34. *O. HYALLINA* (Spruner b.), sepalis subuinerviis e basi lanceolatâ longe subulato-acuminatis simplicibus inferne hyalino-membranaceis tubo corollæ longioribus, corollæ tubuloso-campauulatâ subrectâ inferne hyalino-membranacea, labiis parvis irregulariter denticulatis, superiore integro, inferiore lobis rotundatis aquilabilis, staminibus supra basin corollæ insertis inferne subvillosis, stylo sparse glanduloso subexerto, stigmate parvo bilobo obscure violaceo ? (I.)? In arenosis maritimis insulae Æginae rarissima (Spruner !). *O. Reuteri* F. Schultz in litt. ! Scapus 4-5-pollicaris basi in bulbum incrassatus tenuiter radiculosus superne albus et breviter villosus. Squamae lanceolatae acutæ glabrae. Flores pauci in spicam brevem dispositi albido-hyalini magnitudine *O. minoris*. Bractæ lanceolatae longitudine florum extus puberulae. (v. s. spec. imperfect. a cl. Sprun. communic. )
35. *O. AVELLANÆ* (Pfund in Florâ 26. p. 183), sepalis plurinerviis subæqualiter bifidis margine antice dente unico instructis contiguis vel coalitis tubum corollæ dimidiū subæquantibus, laciniis lanceolatis acutis corollæ tubuloso-campauulatâ antrorum curvatâ, labiis obtuse vel obsolete denticulatis glandulosi-ciliatis, superiore obtusissime emarginato lobis duobus patentibus diviso, inferiore inæqualiter trilobi, filamentis supra basin corollæ insertis, interne pilorum densorum serie munitis styloque superne glanduloso-pilosis, stigmate levæ.  $\mathcal{L}$  In Bohemiâ prope Pragam, in radicibus Coryli Avellanæ parasitæ. Scapus 8-10-pollicaris pallide mellitus glandulosus. Squamae lanceolatae longe acuminatae fuscæ.
36. *O. KLUGEI* (Schmitz et Regel, fl. bounens. p. 190), sepalis corollæ tubum æquantibus e basi ovato-oblongâ bifidis binerviis, laciniis subæqualibus subulato-acuminatis, corollæ tubulosa superne leviter antrorum curvatâ extus laevi, dorso glandulosi-pubescente, labio superiore emarginato eroso-denticulato, demum erecto, inferioris trilobi laciniis lateralibus e basi ovato-rotundâ acuminatis obsolete trifidis cuspidatis acute dentatis, media majore aeunte denticulata sèpissime nervo medio excurrente cuspidatâ, staminibus supra basin insertis sparse pilosulis, stylo glabro, stigmate cerino-flavo.  $\mathcal{L}$  Ad radices Trifolii medi prope Bonn Germaniæ. Planta pedalis vel sesquipedalis eleganter carneo-purpurea glanduloso-pubescentia nitida. Bractæ floribus longiores pallide purpurascentes. Spica elongata apicem versus densiflora subcomosa. Corolla 6-8 lin. longa dorso late purpurascens antice pallida venis intensius coloratis percursa.

\*\* Stamina ad medium tubi corollæ vel supra tertiam partem inferiorem inserta.  
Corolla campanulato-tubulosa.

37. O. RUBENS (Wallr. ! diasc. orob. 46) : sepalis plurinerviis late ovatis subulato-acuminatis postice anteiceque dente instructis vel inæqualiter bifidis tubum corollæ subæquantibus antice contiguis vel coalitis, corollâ e basi curvata tubuloso-campanulatâ dorso rectâ apice galeatâ declivi, labii inæqualiter dentatis superiore bilobo, lobis patentibus, labii inferioris lobis ovatis subæqualibus lateralibus patentibus, staminibus in curvaturâ corollæ insertis, a basi ad medium dense pilosis, stigmatis disco velutino margine elevato destituto.  $\mathcal{U}$  In agris et pascais radicibus Medicaginis falcatæ et sativa parasitica, in Germaniâ, Galliâ et Helvetiâ occidentali in moeniis Geneva ! — Koch syn. ed. 1. p. 536. O. elatior Koch et Ziz. cat. pl. pal. p. 12. Reichenb. pl. crit. f. 901. 902. O. Medicaginis Schultz in annal. d. regensb. bot. ges. 5. 505. Duby bot. gall. p. 349. O. de la Luzerne cultivée Vauch. ! monog. orob. p. 45. t. 2. O. Bueckii Alb. Dietr. fl. boruss. 3. t. 145, non Koch. Scapus pedalis vel altior violaceo tinctus. Flores longe spicati laxi pubescentes flavescentes vel obscure cinereo-fuscescentes. Bractæ lancolata corollam æquans. Corollâ 9-10 lin. longâ tubulosa, tubo supra basin conspicue curvato dorso recto vel subimpresso, labio superiore insigniter galeato et curvato apiceque paulo sursum curvato hæc species digneſit. Stigma cerino-flavum. Flores odore levi Convallariae ! (v. v. circa Geneva.)

38. O. LASERPITII-SILERIS (Rapin mss. !), sepalis liberis vel antice plus minusve coalitis plurinerviis e basi late ovatâ inæqualiter bifidis glandulosociliatis tubum corollæ subæquantibus, corollâ tubuloso-campanulatâ dorso areuatâ ad insertionem staminum constrictâ extus pilis articulatis glanduliferis basi bulbosis hirsutâ, labii inæqualiter denticulatis ciliatisque, superiore profunde bilobo lobis rotundatis, inferioris lobis ovato-retusis apice mucronulatis intermedio majore, staminibus infra medium tubi insertis, filamentis totâ longitudine hirsutis basi extus glandulâ maximâ suffultis, stylo sparsim glanduloso-hirsuto, disco stigmatis velutino pulchre citrino.  $\mathcal{U}$  In rupeſtribus calcareis inter lapides deciduas ad radices Laserpitii Sileris parasitica, in monte Jurâ ad caemicina Vuarne et Dolaz (Rapin !) supra Concise (Muret !) au Creux du Van (Bonzon !), in monte Salevâ ! prope Geneva loco dicto la Grande-Gorge legi, in Galliæ monte Colombier dep. Ain (Jordan). O. Laserpitii Jord. ! mss. cum. ic. Scapus sesquipedalis vel bipedalis crassus subangulosus basi in bulbum magnum incrassatus, superne bractæ sepalæ corollæque pilis glanduliferis vestita. Squamae lato-triangulares acuminato-mucronatae dense imbricate, superiores longiores laxæ cito emarcidæ. Bractæ e basi triangulari longe acuminato-subulatae corollam subæquantes. Corolla subinodora inferne pallescens superne bractæ scapoque fusco-violacca, pilis basi bulbosis apice glandulâ sphærica aurea capitatis. (v. v. et s.)

39. O. ELATIOR (Sutt. trans. lin. soc. 4. p. 178. t. 17), sepalis plurinerviis e basi late ovatâ apice anguste lanceolatis bifidis bracteisque furfuraceo-hirsutis corollâ tubo brevioribus, corollâ campanulatâ basi inflato-ventricosâ superne curvato-fornicatâ, labii inæqualiter denticulatis undulato-crispati labio superiore emarginato lobis lati subtundis vel subemarginatis, inferioris lobis rotundatis subæqualibus, staminibus in tertia parte tubi insertis basi lanceolatis lanuginosis superne subglandulosis, stylo glabro vel superne paree glanduloso, stigmate bilobo velutino-verrucoso flavo-cerino.  $\mathcal{U}$  In Galliâ sept. prope Metz (Schultz Leo ! in h. Boiss.), in insulâ Pregarmik prope Levra leg. Sendtner ! (Tomm. in h. Boiss.), Germaniâ borcali, Sueciâ, Angliâ, Helvetiâ, circa Rochefort in Jurasco (Burnat !) in radice Centaureæ scabiosæ parasitica ! O. elatior fl. dan. t. 1838. Engl. bot. t. 568. Hollandr. fl. mosel. p. 320. Mutel fl. fr. 2. p. 346. O. major Lin. ex Wahlenberg fl. suec. Scapus pedalis vel bipedalis angulosus superne hirsuto-furfuraceus crassitie digitis. Squamae lanceolatae. Bractæ lanceolatae hirsuto-furfuraceæ flores æquantes vel

superne superantes. Flores rubro-violaceo-rufescentes dense spicati, spica 6-12-pollucari. Corolla extus glanduloso-puberula, labio superiore intus glanduloso. (v. s. comm. a cl. Ceuturier et iu h. Boiss. et DC.)

40. *O. STIGMATOIDES* (Winmer fl. Schles. p. 280), sepalis pluriuerviis ovatis subæqualiter bifidis, laciaiis lanceolatis tubo corollæ paulo brevioribus, corollæ campanulato-tubulosâ dorso arcuatâ, labiis ero-s-dentioulatis, superiore obsolete bilobo lobis porrectis, inferiore subpatente trilobo lobis oblongo-rotundatis subæqualibns, staminibus infra medium tubi insertis a basi ad medium villosis supra sparsim styloque apice glanduloso-pilosis.  $\mathcal{U}$  ad fodinas sulf. calc. prope Dirschel Silesiæ, Centaureæ scabiosæ parasitica, prope Gratz Styriae in pluribus plantis ex gr. Antherico ramoso (Maly). Corolla basi flavida, antice flavo-fusca, paulo in rubicundam vergens. Stigma violaceum. — Ex cl. F. Schnitzl in litt. ad antecedentem pertinet.

41. *O. DECORA* (Moris mss.!), sepalis plurinerviis lancicolato-subulatis nervosocarinatis integris vel raro apice breviter bifidis tubum corollæ equantibus vel superantibus, corollæ tubuloso-campanulata extus glandulosâ dorso inferne arcnatâ dein rectâ, labiis irregulariter denticulatis glanduloso-ciliatis, labio superiore apice paulo sursum curvato bilobo lobis rotundatis patentibus vel reflexis, labii inferioris lobis rotundatis intermedio paulo majore, staminibus ad tertiam partem inferiorem tubi insertis inferne sparse hirsutis superne styloque glaadosis, stigmate magno incurvo profunde bilobo.  $\mathcal{U}$  In Sardinia prope Foni (Thomas!) in radicibus Scapus pedalis vel sesquipedalis basi subæqualis gracilis flexuosus parce squamosus glabriusculus. Squamæ laxæ lanceolatae acutaæ. Flores laxe spicati magni in secco pallido fusi. Bractæ laeoolatae striatæ corollam subæquantes. (v. s. in h. Charp. et Moris.)

42. *O. PICRIDIS* (F. W. Schultz! in Koch Deutsch. fl. 4. p. 453), sepalis uni-bi-nerviis integris vel antice dente auctis tubum corollæ superautibus, corollæ tubuloso-campanulata dorso rectâ apice antrorsum curvatâ, labiis obtuse denticulatis, superiore integro marginè laterali patulo, staminibus fere in medio tubi insertis a basi ultra medium dense pilosis superne verruculoso-scabriuscis, stigmatis disco sublaevi, granulis miutissimis obtusissimis dense obtecto.  $\odot$  in locis montanis, radice Picridis hieracoidis parasitica, in Germaniâ, Palatiatu prope Bipontem! Galliâ bor. orient. pr. Metz (Holl.), Neustriâ (Lenorm.! ) Styriâ, Capo d'Istria, Parenzo, Orsero (Benth.!), Italîa inter Novi et Geuanum. O. de la Picride Eperrière Vauch. monogr. orob. p. 60. t. 12. Hollandr. fl. Mosell. p. 322. O. palcas F. Schultz! in litt. Stigma sordide violaceum. Simillima O. loricatae, sed caulis superne et bractæ multo magis villosa, sepala uniaervia rarius dente aucta et tunc trinervia, corolla superne paulo magis antrorsum curvata, labium superius integrum, stamina a basi supra medium denso pilosa et supra verruculosa. Quam O. flava pilosior est, sepa corollæ tubum superant, corolla dorso multo minus curvata et labium superius integrum, lateribus vix patulis nullo modo refractis, filamenta longiora apice multo minus curvata, stigma ultra filamentorum curvaturam prominet sordide violaceum nec cerino-flavum latius et in disco subtiliter granulatum non cicatrismatum. Ab O. lucorum differt corollæ rectâ apice tantum paulo curvatâ, labiis obtuse crenulatis, labio superiore integro, insertione staminum altiore et stigmate subtiliter granulato. (v. s.)

43. *O. SALVIAE* (F. W. Schultz in Ann. d. gew. d. reg. ges. 5. p. 505), sepalis uninerviis inæqualiter bifidis tubum corollæ superantibus, corollæ tubuloso-campanulata dorso curvatâ, labiis denticulatis subciliatis, superiore bilobo, lobis porrectis, staminibus supra basin corollæ insertis a basi ultra medium dense pilosis superne pilis glanduliferis parce adpersis, stigmatis disco velutinao.  $\mathcal{U}$  in subalpinis, in radice Salviae glutinosæ, in Germaniâ, Carniolâ (Graaf!), Pedemontio prope Tendam in valle de la Minal, in Pyreneis loco dicto Cascade des Demoiselles ad radices Valerianæ officinalis (Benth.!) O. alpestris F. Schultz! in litt. Stigma intense cerino-flavum. Simillima O. Iucorum, a quâ

diffrerit sepalis semper uninerviis, labiis copiose denticulatis, lobis labii superioris semper porrectis, nunquam patentibus stigmatisque cerino-flavo. Ab *O. flava*, quâcum colore convenit, differt sepalis longioribus, lobis labii superioris porrectis, filamentis non in manubrii formam curvatis et disco velutino; ab *O. Picridis* labio superiore bilobo, stigmate cerino et velutino; ab *O. loricata* sepalis uninerviis corollâ dorso curvatâ, filamentis dense pilosis et stigmate cerino; ab *O. minore* sepalis uninerviis, filamentis dense pilosis et stigmate cerino. (v. v. s. in h. DC. etc.)

44. *O. LRICATA* (Réichenb. fl. germ. exc. p. 355. excl. syn. *O. flava*), sepalis 3-5-nerviis bipartitis tubum corollæ æquantibus, corollâ tubuloso-campanulatâ dorso rectâ apice antrorum curvatâ, labiis obtuse denticulatis, superiore bilobo, lobis patentibus, staminibus sub medio tubi insertis glabris basi parce pilosis, stigmatis disco... *¶* In montibus incultis in radicibus Artemisiæ campestris parasitica, in Germaniâ, Vallesiâ! Sabaudia, in Lautaret Delphinatus! et prope Lugdunum (Jord.!). *O. elatior* Schleich. exsic. *O.* de l'Artémise des champs Vauch! monog. orob. p. 62. t. 13. *O. Artemisiæ campestris* Gaud.! fl. helv. 4. p. 179. Rchb. pl. crit. 7. f. 917. Alb. Dietr. fl. boruss. t. 580. *O. minor* fl. dan. t. 1219? non Sutt. — Sepalis angustis 3-5-nerviis profunde divisionis corollam æquantibus longioribusque, corollâ 7-8 lineas longâ a basi ad labium inferius usque rectâ in dorso labii superioris tantum paulo curvatâ, labio bilobo patente, staminibus parce pilosis, alte supra finem tertiae partis tubi insertis dignoscitur. Stigma ex cl. Vauch. dilute purpureum. (v. s. in h. DC. etc.)

45. *O. FLAVA* (Martius in Schultz beitr. p. 9. ic. Koch syn. ed. 1. p. 536), sepalis uninerviis vel obsolete trinerviis integris vel antice dente auctis tubum dimidium æquantibus, corollâ tubuloso-campanulatâ dorso curvatâ, labiis denticulatis, superiore bilobo, lobis reflexis retrorsum accumbentibus, staminibus fere in medio tubi insertis a basi ultra medium dense pilosis, stylo glabro, stigmatis disco verrucoso-cicatricoso. *¶* In pascuis subhumidis, in radice Tussilaginis nivea, ad Isarem prope Monachium. *O. Tussilaginis* Mutel fl. fr. 2. p. 349. t. 42. f. 410, analyses. Species lobis labii superioris refractis, et postice sibi contiguis, ut Antirrhinorum, valde insignis. Tota cerino vel dilute flava; corolla 7 lin. longa; stamina longiora et apice manubrii instar fortiter arcuata et descendentalis; stigma cerino-flavum verrucoso-cicatricosum. (v. s.)

46. *O. PUBESCENS* (d'Urv.! enum. p. 76), sepalis bi- vel obsolete plurinerviis integris vel inæqualiter bifidis tubum corollæ superantibus, corollâ tubuloso-campanulatâ extus pilis articulatis albis sublanuginosis plus minus villosâ antice arcuatâ vel dorso subrectâ, labiis irregulariter denticulatis, superiore integro, inferioris lobis rotundatis intermedio majore, staminibus infra medium tubi insertis a basi ultra medium lanuginoso-pilosis antheris interdum apice subbarbatis, stylo glandulosi, stigmatis disco laevi (ex Schultz). *¶?* In insula Melos (d'Urv.!), Zacintho (Margot!), Græcia propo Naupliam et Corinthum (Sprun.! Zuccar!) Mistra (Boiss!), in monte Taygeto (Heldr.), ad Byzantium (Cast.! Noe!), in Macedoniâ (Friv. ex Griseb.), Egypto (Coquebert, Cariâ! (Pirard!), prope Adaliam (Heldr.!), in Galliâ australi prope Massiliam ad Montredon (Jordan!) in radicibus Chrysanthemi coronaria!. Anthemidis sp. ex Heldr.! Ligustici ex Zuccar. Prenauthes bulbosa ex Jord.! *O. versicolor* Schultz! in Florâ 28. p. 129. *O. villosa* Schultz in litt. 1831. *O. villiflora* Koch mss. *O. Chrysanthemi* Schultz. *O. arachnoidea* Schultz ex C. Koch in Thirke pl. or. exsicc.! *O. fragrans* Griseb.! spicil. fl. Rumei. 2. p. 58, non Koch. Scapus a 6 poll. ad sesquipedem altus in secco anguloso-striatus superne bractee sepalaque pilis albis articulatis sublanuginosis plus minus villosus, squamæ ovato-lanceolatæ laxæ superne striolatae. Flores mediocres, dense longeque spicati. Corollæ inferne pallidæ apice fusco-violascentes. (v. s. in h. DC. etc.)

*O. pallida*, scapo altiore floribus submajoribus pallidis subconcoloribus. — In

Macedoniā (Griseb.!) *O. superficialis* Griseb.! mss. in h. Boissier. (v. in h. Boiss.)

47. *O. ATTICA*, sepalis paucinerviis e basi ovatā in lacinias subæqualiter bifidas subulato-filiformes divisis tubum corollæ aequantibus, corollâ tubulosâ basi dorso curvatâ dein rectâ subhorizontaliter patente, labiis irregulariter crispato-dentatis, superiori emarginato-bilobo lateribus reflexis, inferiore lobis ovatis obtusis intermedio majore, staminibus infra medium tubi insertis a basi fere ad apicem villosis, stylo parce glanduloso, stigmate bilobo fusco cœrulecente.  $\mathcal{L}$  In radicibus Carduacearum prope Athenas (Spruner! Boiss.!), prope Naupliam in Lamio (Zuccarrii in h. Benth.!). Scapus 8-10-pollicaris hirsuto-furfuraceus, squamis laxis lanceolatis vestitus. Bracteæ tenues subenerves ut se-pala albo-villosa ovato-lanceolatae corollam æquantes vel superantes. Corolla tubulosa *O. minoris* magnitudinis vel paulo major nec arcuato-curvata sed basi dorso curvata dein recta, papyracea, ex sicco fusco-lutescens, venis violaceis picta. Antheræ fusco-violaceæ. (v. s. comm. a cl. Spruner et Boiss. et in h. Benth.)
48. *O. GRISEBACHII*, sepalis plurinerviis e basi ovatâ lanceolato-subulatis integris bifidisque tubum corollæ aequantibus vel superantibus, corollâ breviter campanulato-tubulosâ subrectâ dorso subarcuatâ, labiis brevibus crispato-denticulatis, superiori emarginato-bilobo, lobis rotundatis obtusissimis porrectis vel lateribus reflexis, inferiore lobis subæqualibns intermedio subretuso, staminibus infra medium vel supra basin tubi insertis a basi ultra medium breviter pilosulis, stylo glabro, stigmate parvo emarginato-bilobo pallide flavescente.  $\mathcal{L}$ ? In campus aridis prope Egirdir Pamphyliæ et in planitiâ Sparta ad radices Cichoracearum et Leguminosarum annuarum parasitica (v. Heldreich!) In Cariâ (Pin.! pl. exs. 1843), in Rumelie peninsula Hajion-Oros ad radices Campanulae persicifoliae (Griseb.!), Orobanchia condensata Griseb.! non Moris! nec Rehb. Scapus gracilis 6-8-pollicaris subflexuosus hirsuto-furfuraceus squamis laxis lanceolatis striato-nervosis vestitus, bracteæ lanceolatae furfuraceæ corollam subæquantes. Corolla albida apice subviolacea tintata, *O. minoris* circiter magnitudinis sed minus curvato-arcuata; stamina minus alte inserta ac in *O. minori*. Antheræ parvæ. (v. s. a cl. v. Heldr. comm.)
49. *O. STRIATA*, sepalis paucinerviis e basi ovatâ profunde et inæqualiter bifidis lacinias subulato-filiformibus tubum corollas subæquantibus anticis tenuioribus brevioribusque, corollâ campanulato-cylindracea dorso curvatâ labiis denticulato-crispati, labio superiore emarginato-bilobo lobis latis rotundatis, inferiore lobis subæqualibus rotundatis margine imbricatis, staminibus infra medium tubi insertis filamentis dilatatis glâbris vel basi parce pilosis, stylo parce glanduloso stigmate divaricatum bilobo fuscescente (ex Heldr.)  $\mathbb{1}$ ? In arenosis ad flumen Melas prope Alaya Asie Minoris in radicibus Coronilla rostratae Boiss. parasitica (de Heldreich!), in Cariâ (Pinard!). Scapus 6-8-pollicaris basi non incrassatus tenuiter et crebre striatus parce pilosulus squamis laxis oblongo-lanceolatis vestitus. Flores *O. minori* subminores luteo-straminei (ex Heldr.) in spicam oblongam densam dispositi. Bracteæ lanceolatae piloso-furfuraceæ corollam æquantes vel superantes. (v. s. s.)
50. *O. HEDERÆ* (Duby bot. gall. p. 350), sepalis subuninerviis lanceolato-subulatis integris bifidisque corollas tubum aequantibus vel superantibus, corollâ tubulosâ dorso incurvâ vel subrectâ superne lateribus compressâ venosâ, labiis margine crispato-denticulatis, labio superiore bilobo vel emarginato, inferiore lobo intermedio longiore, staminibus infra medium tubi insertis basi parce villosis posticis ab invicem remotis, stigmate luteo.  $\mathcal{L}$  In radicibus Hederæ parasitica, in Hispaniâ ad Aranjuez in prædio regio! Barcinonae (Benth.!), in regno Granatensi (Boiss.!), Genuâ (Vauch.), Niceam (Risso!), in insulis Boromeis (Rapin!), Sardinia (Thom. in h. Charp.), Pedemontio (Lisa! Jordan!), Helvetiâ prope Neuveville (Gibollet!). Neocomum (Godet!) et Vevay, (Burnat!), in monte Tauro (Kotschy! n. 47). — Desmoul.! ann. sc. nat.

ser. 2. v. 3. p. 80. O. du Lierre Vanch.! monogr. orob. p. 56. t. 8. O. major Lœfl. it. p. 151. non L. nec DC. O. barbata Rchb. Engl. bot. t. 2859 optim.! Scapus 6-20-pollucaris violaceus vel lutescens. Squamæ inferiores ovato-lanceolatae laxè imbricatae. Bractæ lanceolatae enerves corollam subæquantes se-palaque atro-violacea. Flores mediocres subinodori longissime spicati inferiores remoti. Corollaæ graciles subglabre e luteo violascentes. (v. v. in Hisp. et s. in h. DC. etc.)

51. O. AUSTEALIS (Moris! mss.) sepalis paucinerviis et basi ovatâ profunde bifidis, laciniis linearie-subulatis subdivergentibus tubo corollæ subærioribus, corollâ tubulosâ dorso curvatâ superne subrectâ labiis parvis denticulatis, superiore bilobo lobis extus reflexis, inferiore trilobo lobo intermedio longiore apice sub-truncato, staminibus infra medium tubi insertis inferne tuboque intus pilo-sulis, stylo glabro vel subglanduloso, stigmate cernuo bilobo transverse sulcato.  $\mathcal{L}$  In Sardinia in radicibus..... (Moris!) Scapus crassus 2-3-pedalis sulcate-angulosus hirsutus. Flores parvi in spicam densam subpedalem congesti. Bractæ elongato-lanceolatae piloso-furfuraceæ (in secco) nervoso-substriatae corollam æquantes vel superantes. O. Hedera affinis differt sepalis profunde bifidis lobis subdivergentibus, bracteis multo angustioribus longioribusque sub-nervoso-striatis nec prorsus enervibus. (v. s. comm. a cl. Moris.)

52. O. MINOR (Sutton trans. act. soc. linn. 4. p. 178), sepalis plurinerviis et basi ovatâ subito anguste subulatis bifidis, laciniis tubum corollæ æquibus longioribusque, corollâ tubulosâ arcuatâ labiis obtuse denticulatis venosis undulatis, superiore bilobo porrecto, lobis labii inferioris subrotundatis subæ-quibus, staminibus sub medio tubi insertis glabris inferne pilis sparsis obsitis. (1) In radicibus Trifolii pratensis parasitica, in Anglia, Germania, Helvetia occidentali, Italiâ, Galliâ, etiam interdum in plantis exoticis in ollis cultis, uti Pelargoniis, Fuchsia, et in caldario hort. genev. in Ceropegia elegante observavi! O. du Tréfle des près Vaucl.! monog. orob. p. 47. t. 4. Rchb. pl. crit. 7. f. 876, 877, 879. O. apiculata Wallr. gen. orob. diasc. p. 50, non Griseb. Stigma purpureum vel lilacinum. Similis O. amethystea differt tamen bracteis et basi ovatâ lanceolatis, tubum vel etiam corollam æquibus, corollâ seque latâ sed breviore, tubulosa, sensim curvatâ, nec subito in genu flexâ, labiis rotundatis, obtuse denticulatis, staminibusque minus alte insertis. (v. v.)

$\beta$  *flavescens*, floribus flavescente-concoloribus laxioribus minusque arcuato-curvatis. — In arenosis regionis Mediterraneæ, ad radices variarum plan-tarum parasitica, uempe Hypocheridis radicate! Galactitis tomentosæ! Dauci eriniti, etc., in Algeriâ! Hispaniâ australi, Galliâ meridionali prope Monspelium et Fluminem Illyriæ (Graaf!). O. Carote Desmoul. ann. sc. nat. 3. p. 78? O. pumila Graaf! an Noë? (v. s. in h. plur.)

53. O. CASTELLANA, sepalis plurinerviis et basi latâ ovatâ inæqualiter bifidis tubum corollæ subæquibus, laciniis anticis tenuioribus, corollâ campanu-lato-cylindracæ dorso curvatâ labiis inæqualiter denticulatis superiore galeato apice sursum suberecto profunde bilobo, lobis latis rotundatis, inferiore lobis rotundatis concavo-cochlearis intermedio majore, staminibus basi parce et bre-viter hirtulis infra medium tubi insertis, stylo glabro apice parce glanduloso, stigmate leviter bilobo.  $\mathcal{L}$  In lapidosis Castella Nova ad radices montium Car-petanorum prope Escurialem in radicibus Digitalis Thapsiæ parasiticam legi jun. 1841. Scapus violaceo-purpureus subpedalis crassus angulosus ut bractæ lanceolatae flores subæquantes pilis articulatis et glandulosis hirsuto-furfuraceus, squamis ovato-oblongis subadpressis prædictus. Corolla 9-10 lin. longa albida superne violaceo tincta extus pilis glanduliferis adspersa. Sepala hirsuta. (v. v.)

54. O. AMETHYSTEÀ (Thuill.! fl. paris. ed. 2. v. 1. p. 317), sepalis 3-9-nerviis et basi ovatâ subito anguste subulatâ attenuatis bifidis, laciniis angustis corollam æquibus, corollâ tubulosâ basi subito in genu flexâ et antrosum curvatâ dein rectiusculâ, labiis inæqualiter acute denticulatis undulato-crispis

ramoso-venosis, superiore galeato porrecto emarginato vel subquadriobo, lobis lateralibus labii inferioris subbitidis, intermedio duplo majore bi-trilobo, staminibus in curvaturâ corollæ iuersitatem glabris inferno sparse pilosis.  $\mathcal{Z}$  In ramis radicis Eryngii campestris et maritimî sub terrâ aut arenâ horizontaliter repentinibus parasitica, in Germaniâ prope Bonn et Coblenz, in Galliâ, prope Harfleur (Lenorm.!) circa Parisios, in Gallo-provinciâ (Jordan!) Fauche! — Koch syu. ed. 1. p. 538. Rehb. pl. crit. 7. f. 920, 921. O. Eryngii Duby bot. gall. p. 35. O. elatior DC.! fl. fr. 3. p. 490 non Sutt. O. de l'Eryngium des champs Vauch. monogr. Orob. p. 58. t. 10. O. elatior  $\beta$  microglossa Wallr. diasc. p. 51. Caulis violaceus vel purpureus. Squamæ oblongo-lanceolatae laxæ. Bractæ lauceolato-liueares flores aquantes vel superantes. Corolla albida vel dorso leviter lilacina vel tota lilacina venisque purpureis picta. Stigma fuscum vel rubro-fuscum. (v. v. iu Hisp. et s. in h. DC., etc.)

55. O. SEROTINA (Kirschleg. in Jahresb. der Pollichia 1845), sepalis ovato-acuminatis villosulis medianam corollam attingentibus nervo medio validiore lateralibus obscurioribus, corollâ tubulosa dorso subæqualiter arcuatâ lobo superiori bilobo marginè crispulo-undulato, labio inferiore trilobo lobis dilatatis medio vix emarginato omnibus margine repando-dentatis, pilis lanosis presertim dorso corollæ, stamiibus glabris vel subglabris versus basin corollæ insertis antheris apice acute mucronatis, ovario subglabro, stylo pilosulo antice curvato cum ovario angulum obtusum efficiente, stigmate crasso bilobo purpuro-brunneo. — Fl. octobri in agro Béth campstro culto prope Erstein Alsatiæ (Kirchl.). Scapus subglaber  $1\frac{1}{2}$  ped. longo. Spica laxiuscula apico bracteis basi ovatis versus apicem acuminatis florem evolutum æquantibus alabastra superantibus comosa. Corolla flavo-pupurascens venis purpureis. O. Amethystæ simillima a quâ vix differt inflorescentiâ laxiore, corollis brevioribus et laxioribus minus arcuatis, staminibus profundius insertis colore corollarum explanatarum purpureo pallidiore flavescente. An ejus varietas serotina?

56. O. BUEKIANA (Koch! syn. ed. 2. p. 619), sepalis plurinerviis ovatis bifidis, lacinias lanceolatis tubum corollæ dimidium æquantibus, corollâ campanulato-tubulosâ supra basin subito antrorsum curvatâ dorso arcuatâ, labiis inæqualiter denticulatis, superiore rotundato integro vel leviter emarginato porrecto subgaleato marginè paulum recurvato, inferiore (deflexo) lobis subrotundis integris intermedio paulo majore staminibus infra medium tubi insertis, basi parce pili adspersis, stylo glabro apice subglanduloso.  $\mathcal{Z}$  In locis incultis super Medicagine sativâ parasitica, circa Francofurtum ad Viadrum. O. elatior Dietr. fl. boruss. t. 148 exclus. synon. O. rubentis Wallr. et O. elatioris Sutt. Hæc ultima serotina est, julio et augusto flores suos explicat. Flores pallide flavi in rubente vergentes. Stylus apice purpureus. Stigma flavum. (v. s. in h. Lechler et Jordan.)

57. O. BRACHYSEPALA (F. Schultz! arch. des fl. dc fr. et d'Allem. p. 69), sepalis plurinerviis ovatis inæqualiter bifidis tubum corollæ dimidium æquantibus, corollâ tubuloso-campannatâ ad medium antrorsum arcuatim curvatâ, labiis inæqualiter denticulatis, superiore bilobo lobis patentibus vel revolutis, inferiore lobis ovatis denticulatis intermedio lateralibus paulo longiore, staminibus ad tertiam partem infer. tubi insertis basi pilosis apice sparsim glandulosis, ovario oblongo, stylo a basi acuato pallide ochraceo superne glandulosu snbrubescente, stigmate bilobo holosericeo cerino flavo.  $\mathcal{Z}$  In rupestribus Alsatiæ prope Dorlisheim (F. Schultz!) Lotharingiæ prope Nancy (Suard), ad Lugdnum (Jord!), Olmutz Moraviæ (Godron), Byzantium (Gren.!), Allen-dorf Hassiæ inferioris (Griseb.!), in Helvetie pago Neocomensi (h. neocom.!), in monte Saleve prope Genavam legi!, ad Sestri Liguria (Notar.) in radicibus Peucedani Cervaria (Schultz, Ego!) Libanotidis vulgaris (Griseb.) parasitica. O. Alsatica F. Schultz! fl. gall. et germ. exs. cent. 1. intro-

duct. et in Kirschleg. prodr. fl. als. p. 109 ex parte. O. Cervariae Suard, Gondron fl. Lorr. 2. p. 180. O. Bartlingii Griseb. ! spicil. fl. rumel. 2. p. 57. in adn. O. caudata Notar. prospetto dell. fl. ligust. p. 53. — Tota cerino-flava. Scapus pedalis sesquipedalis superne cum bracteis sepalisque glandulosu subvelutinus, inferne squamis laxis elongato-lanceolatis vestitus. Bracteæ lanceolatae flores subæquantes sepalaque cito fusco-marcescentes. Calyx interdum sepalò tertio dorsali prædictor. Corolla cerino-flava in specim. meis et in Franche-Comté (ex cl. Schultz in litt. ), flavo-violascens in Alsatiâ et Lotharingiâ. O. Buekianæ Koch valde affinis, differt tamen corollâ supra medium subito antrosum curvata, labio superiore bilobo, Iobis revolutis et staminibus altius insertis (ex Koch in litt. ad Schultz.) (v. v. et s.)

58. O. MACROSEPALA (F. Schultz! arch. des fl. de fr. et d'allem. p. 70), sepalis ex ovatâ basi longe subulatis obsolete plurinerviis ultra medium subinæqualiter bifidis, corollæ tubum superantibus, corollâ subhorizontaliter patente tubulosa dorso (ad basin) subarcuatâ apicem versus rectâ, labiis inæqualiter denticulatis, superiore emarginato, laciniâ mediâ labii inferioris lateralibus longiore, staminibus supra basin corollæ insertis laxe glanduloso-pilosiss, disco stigmatis...?  $\mathcal{U}$  In collibus calcareis prope Turckheim Alsacie (Kirschleger), Peucedano Cervariae insidens, prope Alendorf Hassia inferioris in Libanotide montanâ (Griseb.!). O. apiculata Griseb. spicil. fl. rumel. 2. p. 58 in adn. nou Wallr. O. Alsatica Kirchleg. prodr. fl. als. p. 109. Stigma atro-purpureum, flores fusco-rosei (Kirschl.). Affinis O. minori cui simillima (Schultz). (v. s. sp. imperfect.)

59. O. AMœNA (C. A. Mey. in Ledeb. ic. pl. fl. ross. illustr. t. 385), sepalis liberis plurinerviis bifidis tubo corollino duplo brevioribus, corollæ tubulosæ incurvæ ad fauces ampliate labiis æquilongis, lobis labii inferioris obtusiusculis obovato-ellipticis repando-denticulatis subcrispis intermedio sublongiore, staminibus infra medium tubi insertis basi hirsutiusculis apice styloque subglandulosis stigmate retuso-bilobo.  $\mathcal{U}$  In rupestribus montium Arkaul in deserto Soongarico-Kirghisico orientali, non procul a lacu qui Noor-Saisan vocatur Ledeb., in sterilissimis arenosis deserti Songoro-Kirghisici ad rivulum Donsyk non procul ab Ajagus (Karelîn et Kiriloff!) — Ledeb. fl. alt. 2. p. 457. Tota leviter glanduloso-furfuracea subglabra. Scapus semi-pedalis basi vix incrassatus, squamae sparsæ ovato-lanceolatae. Bracteæ ovato-acutæ vel acuminatae flore triplo vel duplo breviores. Corolla speciosa subpollicaris amœna saturata violaceo-corulea tenuis extus glandulis paucis adpersa, intus glaberrima. Antheræ subrotundæ niveæ margine villosulæ. Stigma magnum obtusum fuscum. (v. in h. DC.)

$\beta.$  calycina, sepalis majoribus ovalibus crebre nervoso-striatis apice breviter bifidis corollis majoribus. — In arenosis deserti Soongoro-Kirghisici ex Karelîn et Kiriloff! (v. in h. DC.)

- 60. O. SORDIDA (C. A. Mey. in Ledeb. ic. pl. fl. ross. alt. illustr. t. 386), pubescens, squamis floribus oblongo-lanceolatis flore duplo brevioribus, sepalis liberis bifidis lobis lanceolatis subæqualibus, corollæ cylindricaæ incurvæ labiis subæquilongis, lobis labii inferioris oblongis acutiusculis integrerrimis planis intermedio sublongiore, filamentis styloque subhirsutis, stigmate bilobo.  $\mathcal{U}$  Rarissima in locis rupestribus montium Arkaul in deserto Soongoro-Kirghisico orientali, non procul a lacu qui Noor-Saisan vocatur. — Ledeb. fl. alt. 2. p. 455. Scapus pedalis, crassitio digitii minimi, apice attenuatus, basi valde incrassatus, rufescens et pilis albis articulatis brevibus cum squamis et sepalis incanus. Squamae ovato-oblongæ, florales oblongo-lanceolatae flore duplo breviores sepalæ vero vix superantes. Sepala libera discreta ovato-oblonga corollâ duplo breviora. Corolla sordida flavescens vel dilute fuscescens extus glandulosa intus glaberrima. Filamenta glabra vel subglandulosa basi hirsutiuscula. Antheræ margine villosulæ efficiunt niveæ. Stigma fuscum? nutans magnum, profunde bilobum lobis rotundatis patulis. Affinis O. amœna.

61. *O. AMMOPHILA* C. A. Mey. in Ledeb. ic pl. fl. ross. alt. illustr. t. 389, albo-lanata, sepalis paucinerviis ovato-oblongis apice bifidis tubo corollino brevioribus lobis lanceolatis subæqualibus, corollâ tubuloso-infundibuliformi incurvo-ceruâ, labiis subæqualibus, superiore profunde emarginato-bilobo lobis rotundatis latissimis integrisculis, inferioris trilobi lobis æqualibus ovatis obtusis denticulatis, staminibus infra medium tubi insertis inferne styloque breviter piloso-hirsutis, stigmate magno flavido subbipartito-divaricato.  $\mathcal{Z}$  In arcrosis ad fl. Irtysch et Bekun in parte orientali deserti Soongoro-Kirghisici minime rara circa metallifodinaem Loktewsk ( Ledeb. ), in arenosis deserti Soongoro-Kirghisici inter Dschartasch et Arkat ( Karelîn et Kirilloff! ), in siccis Ircutie ( Turcz! in h. Boiss. ) — Ledeb. fl. alt. 2. p. 454. Scapus semipedalis vel pedalis superne cum bracteis sepalisque dense albo-lanata. Flores in spicam 2-4-pollicarem dense congesti. Bractea ovato-lanceolata florem æquantes. Corolla amœne saturate violaceo-cerulca fere 10 lincas longa vix 3 linea lata, fauce paulo ampliata extus albo et parce lanata intus glabra. ( v. in h. DC. )
62. *O. BOREALIS* ( Turcz. catal. pl. baik. Dah. n. 877 in bullet. soc. imp. natur. mosc. 15. n. 1. p. 722 ), albo-lanata, squamis floralibus ovato-lanceolatis illorem æquantibus, sepalis bifidis lobis lanceolatis subæqualibus tubo corolla cylindrica incurva brevioribus, labiis corollâ subæquilongis, superiore profunde bifido, inferiore trifido laciniis obtusis denticulatis subæqualibus, filamentis styloque glabris, stigmate subbipartito lobis patentissimis.  $\mathcal{Z}$  In montosis deserti Soongoro-Kirghisici prope Ajagus. Simillima *O. ammobilis* sed distinguitur genitalibus glabris atque labio superiore corolla bifido.
63. *O. CERNUA* ( Lœfl! it. p. 152 Linn. sp. p. 882 ), sepalis paucinerviis ovatis integris vel ad tertiam partem inæqualiter bifidis tubo corollino dimidio brevioribus, corollâ tubulosa glabrâ ad medium curvato-cernuâ labiis parvis subrepando-crenatis non ciliatis, superiore galeato lobis rotundatis contiguis portrectis, labii inferioris lobis ovatis obtusis æqualibus, staminibus glabris paulo infra medium tubi insertis, antheris parvis submuticis, stylo glabro apice incurvo, stigmatis lobis velutino-granulatis foraminulo separatis.  $\mathcal{Z}$  In collibus arenosis ad radices Artemisiae campestris, A. Arragonensis et A. Gallica parasitica, in Hispaniâ centrali prope Aranjuez ad lacum Ontigola ! ( Lœfl! ) in regno Granatensi ( Boiss! ), in arenis maritimis prope Monspelium ! prope Gap<sup>1</sup> ! h. Jordan!, ad lacum Ourmiahad radicis Achilleae santolinæ ( Aucher! n. 5878 ), in Yemen Arabia Felicis ( Botta! in h. mus. par. ), in Ægypto? Novâ Hollandiâ ad Swan-river ( Drummond! n. 198 ). — Benth. cat. pyr. p. 109. *O. Gallica* Gren. in bot. zeit. 22. p. 576. obs. pl. de Fr. p. 30. *O. Hispanica* Boiss! voy. bot. Esp. p. 478. *O. Cumana* Mutel fl. fr. 2. p. 52, non Wallr. *O. curviflora* Viv. pl. Ægypt. sec. 22. n. 29. t. 2. f. 17. *O. Grenieri* Fr. Schultz! in Florâ 1845. p. 739. Scapus a 3 poll. ad pedem altus basi subbulboso-incrassatus squamis ovatis obtusis laxis munitus. Bracteæ ovatae acutæ corollâ dimidio breviores cerulcae axique spicas pulverulento-scabri intus nervoso-striatae. Corolla superne corulea inferne pallescens ad medium tubi subconstricta. ( v. v. circa Aranjuez, et in h. DC. Boiss. Benth. )
- B. bicolor*, sepalis paucinerviis postice coalitis vel subcoalitis. — In deserto Soongoro-Kirghisico occidentali ad ripam rivuli Tschuganka versus radicem montis Tschingistan Ledeb. ad flum. Lepsa in Soongaria, in salcis inter Usunbulak et Gorkoipiket ( Karelîn et Kirilloff! ) *O. bicolor* C. A. Mey. in Ledeb. ic. pl. ross. alt. illustr. t. 390. fl. alt. 2. p. 458. *O. cernua* Pall. ind. taur. A plantâ Hispanicâ et Gallicâ sepalis minus nervosis postice coalitis bracteisque ovato-acuminatis tantum differt. Bracteæ

(1) Vide in h. amiciss. Jordan specimen prope Gap lectum cum descriptione cl. Schnitt-zii exante quadrantem; differt tantum a formâ vulgari Hispanicâ et Gallicâ, corollâ minus curvata et sepalis bracteisque sublongioribus, quæ diversitas a statu juniore provenit.

- in specim. Kirilowianis calycem subæquantes nec flore subduplo longiores sunt ut in florâ altaicâ dicitur! (v. in h. DC.)
- ✓ *Nepalensis*, scapo crassiore (in secco) angulato-striato atro-violaceo, saepè subfasciato floribus numerosissimis dense spicatis. — In Nepaliâ (Hayne! Wight!) — *O. indica* Wallich cat. n. 3966! non Roxb. (v. s. in h. DC. et Benth.)
64. *O. BERTHELOTII* (Webb phyt. canar. 3. p. 155), glabrescens, scapo pilis raris roridulo nitido cœrulecente squamis lanceolatis glabrescenti-nitidis coriacēis, spicâ cylindracea pallidâ laxiusculâ, bracteis lanceolatis acutis, calycis 2-phyllo foliolis lanceolatis 5-7-nerviis vel linearî-lanceolatis integris bifidis scariosis nervosis glabris albidis, filamentis sub medio tubi corollini affixis glabris, antheris albis nudis, stylo glabro fuscō, stigmate 2-lobo, capsula fuscâ elongato-ovatâ. — In Teneriffâ sub umbrâ Ericarum latitans leg. cl. Berthelot. Corolla perfecta iguota. Affinis *O. arenariae* Bieb. An *O. cernua* L.? (ex Reut.)
65. *O. CUMANA* (Wallr. orob. p. 58), sepalis plurinerviis lanceolato-acuminatis breviter bifidis integrisque tubo corollino multo brevioribus, corollâ glabratâ tubulosâ ad faucem vix ampliata medium versus incurvo-cernuâ, labii parvis subæqualibus, labio superiore emarginato, inferiore trilobo, staminibus infra medium in curvaturâ tubi corollæ insertis styloque glabris, stigmate retuso bilobo. 2<sup>o</sup> In arenosis Podolie, Bessarabiæ Tauriæ et Caucasi, prope Stanropolim! (C. A. Mey.! enum. cauc. casp. n. 892). — Rchb. pl. crit. 7. f. 926 et 927. *O. arenaria* Bieb. fl. taur. cauc. 2. p. 83 non Borkh. Scapus gracilis fuscescens 5-6-pollicaris. Squamae laxæ breves ovato-acuta. Flores lange spicati subhorizontalis. Bracteæ ovato-lanceolatae, calyce sublongiores, corollâ dimidio breviore. *O. cernua* affinis, differt scapo graciliore, corolla longiore et tenuiore, fauce vix apertâ, sepalis bracteisque longioribus. (v. in h. Boissier, comm. a cl. C. A. Meyer.)
66. *O. GLABRATA* (C. A. Mey. in Eichw. pl. casp. p. 16. t. 17), sepalis univariis e basi lanceolatis longe acuminatis corollâ duplo brevioribus integrerimis vel dente brevi obsoleto instructis, corollâ extus pilis raris brevissimis glandulosis adspersâ extus glaberrimâ inflato-campanulatâ faucom versus ampliatâ, labio superiore paulo inclinato longitudine labium inferius vix superrante obsoleto bilobo lobis latissimis brevissimis obtusissimis crispato-denticulatis marginâ reflexis, inferiore trifido lobis orbicularis obtusis crispato-denticulatis intermedio paulo longiore, staminibus basi glaberrimis superne styloque parce glandulosis, stigmate emarginato e secco fuscō. 2<sup>o</sup> In Kachetiâ. Scapus erectus 5 poll. altus, basi aequalis, cum squamis et sepalis pilis crassis articulatis brevibus glandulâ terminatis vestitus. Corolla in secco obscure rufa, semipollicem longa, 3 lineas lata.
67. *O. POGONANTHERA*, sepalis oblongo-lanceolatis parallele plurinerviis tubum dimidium corollâ aquantibus ad tertiam partem vel ad medium bifidis simplicibusve, corolla tubuloso-insudibuliformi subrectâ apice ampliatâ labiis obsoleto denticulatis non ciliatis superiore integro vel submarginato, inferioris lobis ovato-oblongis obtusis intermedio sublongiore, staminibus ad medium tubi insertis filamentis glaberrimis, antheris oblongis apice barbatis, stylo glabro; stigmate retuso-bilobo. 2<sup>o</sup> In Persiâ anstrali (Kotschy!) pl. pers. austr. exsicc. n. 949. — Scapus pedalis crassitudine digitî (in secco) cum bracteis sepaliisque fusco-violascens angulato-sulcatus, squamis laxis sparsis oblongo-linearibus vestitus, basi bulboso-incrassatus. Flores numerosi in spicam semipedalem cylindraceam dense congesti. Bracteæ oblongo-lanceolatae nervoso-striatae extus cum sepalis caulique parte superiore pilis articulatis furfuraceo-hirsutæ flores subæquantes. Corolla 6-7 lineas longa, pilis glandulisque sparsim adspersa, in secco inferne pallida superne fusco-subviolascens. *Anthera* effœta nivea. v. s. in h. Boiss.)
68. *O. KOTSCHYI*, sepalis oblongo-lanceolatis linearibusve plurinerviis tubum

dimidium corollæ aequalibus superantibus ad medium vel ad basin bifidis bipartitique vel simplicibus, lacinia linearis-subulatis, corolla tubuloso-infundibuliformi ad fauces valde ampliatâ dorso subarcuata, labiis obtuse et irregulariter repando-subcrenulatis, labio superiorc emarginato-bilobo, inferioris lobis ovatis obtusis intermedio majorc, staminibus ad medium tubi insertis basi subhirsutis, antheris ovatis ad suturam barbato-lauatis, stylo glabro, stigmate retuso-bilobo.  $\mathcal{L}$  In Persiaustrali (Kotschy!) pl. pers. austr. exsicc. n. 891, — capitis semipedalis pedalivis (in secco) sulcate-striatus pilis articulatis albidis turfuraceo-hirsutus, squamis laxis oblongo-lanceolatis vestitus. Flores dense spicati. Bracteæ hirsuta ovato-vel oblongo-lanceolatae corollam aequantes vel superantes. Corolla 9 lineas longa, (ex secco) superne rufescens inferne pallida, extus sparschirtula. Praecedenti valde affinis sed distincta videtur *sepalis angustioribus* sepe ad basin usque fisis, corollis majoribus superne valde ampliatis et staminibus basi subhirsutis nec glaberriminis. (v. s. in h. Boiss.)

69. *O. CERATEENS* (Steph. in Willd. sp. 3. p. 349) sepalis indivisis bifidis, que tubo corolla longioribus, corolla tubulosa, tubo curvato inferne ovato supra ovarium coarctato, lacinia labii inferioris concavis, staminibus supra medium tubi insertis, basi parce pilosis.  $\mathcal{G}$  Ad ripas Danubii prope Ratisbonam et Danzig, in Artemisia campestris parasitica. *O. ceralescens* Alb. Dicr. fl. boruss. t. 511. Flores c minoribus, cerulei. Spica lanato-villosa, in speciminiis exsiccati quasi mucore obducta. — Koch syn. ed. 1. p. 358. (v. s.).
70. *O. FRAGRANS* Koch Deutschl. fl. 4. p. 463), sepalis integris vel inaequaliter bifidis, corolla basi tubulosa superne scutis ampliatâ dorso curvata, staminibus in medio tubi insertis et basi arcuato-pateente ascendentibus interne pilosis superne glabris, sacculis antherarum breviter et tenuissime muconatis. — In Austrâ inferiore (Schide). — Koch syn. ed. 2. p. 619. Planta etiam exsiccata fragrans.

71. *O. CANESCENS* (Presl. dcl. prag. p. 72), pubescens squamis ovato-lanceolatis, sepalis integris semi-bifidisque, lacinia inaequalibus setaceo-acuminatis, bracteis ovato-lanceolatis, corolla tubuloso-incurva subaequalibus, labiis denticulatis, superiori emarginato, inferiore trilobo, lobo medio latiore ac longiore, staminibus basi villosis, stylo glabro. (1) In Sicilia, et insulis adjacentibus Saline, Lipari, Ustica, ad radices Chrysanthemi coronariae aliарumque compositarum. — Guss. prodr. 2. p. 179, syn. fl. sic. 2. p. 133. Scapi 1-2-pedales, rubescentes. Spica plus minus conferta. Bracteæ corollam aequantes vel illa parum breviores. Corolla carno-rubentes venis rubentibus saturatioribus notatae, sub limbo incurva, lobo medio labii inferioris reliquis longiore quibus characteribus facilime dignoscitur. Stigma flavescens, dilatatum, bilobum.

3. *pedicellata*, floribus flavidis, inferioribus longe pedunculatis. — Guss. 1. c. An sp. diversa?

72. *O. LITOREA* (Guss. prodr. 2. p. 184), pubescens, squamis oblongo-linearibus nervosis, floribus dense spicatis, bracteis obsolete nervosis corollâ brevioribus, sepalis integris vel basi unidentatis longe acuminatis bracteâ longioribus, corollis tubulosis crenulatis, labio superiorc emarginato-bilobo inferiore subaequaliter trilobo, staminibus basi villosis, stylo glaberrimo. (1) In salubris maritimis Sicilia ad radices compositarum uti Chrysanthemi coronariae, Anthemidis secundirameæ et A. maritima. — Guss. synops. fl. sic. 2. p. 130. Scapus 2-6-pollicaris, angulatus. Bracteæ ovato-lanceolate, acute, corollam excedentes, valde pubescentes, apice subreflexo. Sepala ex ovata basi inaequen longum producta. Flores inodori. Corolla rubescens, glabriuscula, nec inflata nec curvata. Stamina inclusa. Stylus apice incurvus. Stigma emarginato-bilobum purpurascens.

## + Species mihi ignotæ.

73. *O. GRANDISEPALA* (F. W. Schultz in florâ bot. zeit. 26. p. 128), sepalis plurinerviis ellipticis, apice tridentatis corollam æquantibus vel superantibus, dentibus subulatis, superiori inferioribus duplo vel quadruplo longiore, corollâ tubulosâ subcampanulatâ subarcuatâ, lacinias denticulatis, staminibus infra medium tubi insertis a basi ad medium parce pilosis. ♂? In Græciâ ad Naupliam crescit. Planta magna bipedalis et altior, flores magnitudine florum *O. minoris*, habitus *O. rubentis* et *O. Centaurei*.
74. *O. LYCICA* (F. W. Schultz in florâ bot. zeit. 26. p. 128), sepalis plurinerviis ovatis, bifidis dentibus lanceolato-subulatis tubum corollæ æquantibus longioribusque, rarissime dente altero sepalii unius truncato, corollâ tubulosâ campanulatâ dorso curvatâ, fauce ampliata, labiis inæqualiter acuteque dentatis, superiori bilobo, staminibus sub medio tubi insertis, a basi ad medium subvillosis. ♂ Ad Lycos in Atticâ. Habitus *O. rubentis* et *O. Epitbymi*.
75. *O. PARVILoba* (F. Schultz in fl. bot. zeit. 26. p. 128), sepalis obsolete 3-6-nerviis e basi ovatâ lanceolato-subulatis bifidis, rariissime indivisis, corollæ tubum superantibus, corollâ tubulosâ subarcuatâ, lacinias parvis obsolete denticulatis, staminibus infra medium tubi insertis sparsim villoso-pilosus. ♂ In Græciâ ad Naupliam. Habitus *O. Salviae*. Planta presertim in iuflorescentiâ pilis albidis subvillosa exsiccata griseo-ochroleuca.
76. *O. SUBVERTICILLATA* (F. Schultz l. c.), sepalis obsolete 5-nerviis ovatis inæqualiter bifidis vel indivisis tubum corollæ æquantibus, corollâ tubulosâ campanulatâ arcuatâ, labiis inæqualiter denticulatis, superiori vix bilobo, staminibus in curvaturâ corollæ insertis, a basi ad medium subvillosis. ♂ Crescit parasitice in radicibus Viciae cuiusdam prope Thebas in Græciâ. — Habitus *O. rubentis* sed flores paulo minores.
77. *O. LILACINA* (F. Schultz l. c. p. 129), sepalis obsolete 1-3-nerviis e basi ovatâ subito subulatis indivisis vel dente brevi auctis tubum corollæ æquantibus vel superantibus, corollâ tubulosâ campanulatâ dorso leviter arcuatâ, labiis obsolete denticulatis, lobis rotundato-truncatis subæqualibus, staminibus sub medio tubi insertis inferne pilosis. ♂ In Græciâ provinciâ Atticâ. Habitus *O. rubentis* sed minor.
78. *O. ARCUATA* (F. Schultz in fl. bot. zeit. 26. p. 129), sepalis obsolete 2-3-nerviis e basi ovatâ lanceolatis integris vel dente divaricato tenuissimo bifidis, tubum corollæ æquantibus, corollâ tubulosâ arcuatâ horizontaliter patente et pene sursum curvatâ, tubo supra ovarium vix coartato et fauce ampliata, lacinias denticulatis rotundatis, labio superiori altero multo majore, staminibus supra basin corollæ insertis et ultra medium villoso-pilosus. ♂ In Græciâ provinciâ Atticâ. Species parva, pilis albidis sparsim lanuginosa, floribus xerampelinis brevioribus quam *O. minoris* instructa.
79. *O. DIAPHANA* (F. W. Schultz in fl. bot. zeit. 26. p. 130), sepalis trinerviis diaphanis lanceolatis indivisis, corollâ tubum vix æquantibus, corollâ tubulosâ-campanulatâ, dorso vix curvatâ, labiis inæqualiter denticulatis, superiori paulo sursum curvato, staminibus supra basin corollæ insertis, basi subvillosis. ♂ In Græciâ (in Phtiotide). Habitus *O. Galii* cuius forte varietas.
80. *O. ANGUSTISEPALA* (F. W. Schultz in fl. bot. zeit. 26. p. 130), sepalis uni-vel obsolete 4-nerviis indivisis bifidisque, e basi subovatâ angustissime subulatis tubo corollâ brevioribus eumque æquantibus, corollâ campanulatâ, dorso subcurvatâ, fauce ampliata, labiis expansis undulato-plicatis obtuse et obsolete denticulatis, superiori subbilobo, lobis labii inferioris rotundatis, intermedio duplo majore, staminibus supra basin corollæ insertis, inferne villosis. ♂ Crescit parasitice in radicibus Orobii digitati in Hymetto monte Græciæ. Habitus *O. pruinosa*.
81. *O. BREVIFLORA* (F. W. Schultz l. c.), sepalis 3-5-nerviis e basi ovatâ lanceolato-subulatis integris, tubum corollæ æquantibus vel superantibus, corollâ

- a basi amplissimā campanulatā antice basi strumoso-ventricosō dorso curvata, labiis inaequaliter dentieulatis glandulosō-fimbriatis, superiore subenarginato. lacinia mediā labii inferioris lateralibus paulo longiore, staminibus corollæ in-ertis glabriusculis basi villosis.  $\Sigma$  In Graecia provinciâ Atticâ. Species dubia ex habitu affinis *O. cruentæ*. Stigma, stylus et stamina exserta.
82. *O. GRASSISTYLA* F. W. Schultz in fl. bot. zeit. 26, p. 131). sepalis obsolete plurinerviis a basi ovatâ lanceolato-subulatis indivisis vel dente brevissimo pluridis tubum corollæ aequalibus, corollâ campanulatâ dorso arcuatâ, extus glandulosō-pilosâ. labiis inaequalibus dentieulatis lobo intermedio labii inferioris lateralibus longiore, staminibus propo basin corolla insertis, inferne sparsim pilosis, stylo crasso.  $\Sigma$  Crescit parasitico Cisti cujusdam radicibus in Graecia. *O. comosa* Sprn. mss. Species dubia, habitu *O. Epithymi*. Tota planta in secco obscure fuso-nigrescens. Corollæ e majoribus. Bractæ late ovato-acutæ. Spica breviter ovata. Scapus subsemipedalis. (v. s. comm. a cl. Springer.)
83. *O. PUNCTATA* (F. W. Schultz l. e.), sepalis uni-vel obsolete pluri-nerviis ex ovatâ basi lanceolato-subulatis indivisis vel bifidis, margine fimbriato-glandulosis corollæ tubum aequalibus, corollâ campanulatâ dorso arcuatâ extus tuberculis atro-violaceis punctatâ pilisque glandulosâ et venis violaceo-purpureis longitudinaliter pictâ, labiis inaequaliter dentieulatis, lobo intermedio labii inferioris lateralibus longiore, staminibus propo basin corolla insertis inferne squamis pilosis, apice styloque glandulosō-pilosis.  $\Sigma$  Crescit parasitico in Cisto quodam in Graecia. Habitus *O. Epithymi* cuius forte varietas. (v. s. comm. a cl. Springer.)
84. *O. BRACTEATA* (Viv. in ann. di stor. nat. 4, p. 235), ealyzibus bipartitis, lacinia lanceolatis acuminato-setaceis corollam subæquantibus, bractæ antice lanceolato-acuminatâ florem superante, corollæ labio superiore indiviso ovato-rotundato undulato, inferiore trilobo, lobis subæqualibus ovato-subrotundis erecto-undulatis, staminibus styloque exsertis glabris. — In Corsicâ.
85. *O. FERRUGINEA* (C. Koch in linnæa 17, p. 291), simplex, superne pilis ferrugineis obtecta, squamis raris minutis, bractæ ovato-lanceolatis, sepalis lanceolatis corollâ ampliata minoribus minusque denticulatis, labio corollæ superiore galero truncato, inferioris lacinia subæqualibus, staminibus et pistillo glaberrimis.  $\Sigma$ ? In planitie ad Araxem sita.
86. *O. ALBO-LANATA* Steud. nom. bot., albo-lanata, squamis floralibus ovatis acuminatis florem excedentibus, sepalis postice basi connatis altero bifido altero trifido, lobis linearibus inæqualibus, corollæ cylindrica incurvæ labiis aequalibus superiori lato bilobâ inter lobos revolutos bidentato, lobis labii inferiori rotundatis denticulatis, filamentis styloque glabris, stigmate bilobâ.  $\Sigma$  In China borealis montosis Lun-Zyan-Ssy. *O. canescens* Bunge mém. des div. sav. de St.-Petersb. 2, p. 121. Flores intense caruleo-violacei. Typum novi generis præbere videtur, ab *Orobanchis* calycis sepalis altero bifido, altero trifido, et labio corollæ superiore inter lobos bidentato diversi.
87. *O. MEDIA* (Desf. fl. atl. 2, p. 50), scapo simplici piloso striato firme, squamis adpressis ovatis vel ovato-lanceolatis, floribus dense spicatis, bracteis ovatis concavis calyceam æquantibus, sepalis postice coalitis bifidis, lacinia anguste neutis. corollâ curvatâ calyceam duplo superante, labio superiore bifido, inferiore trifido, lobis rotundatis subæqualibus. staminibus inclusis.  $\Sigma$  In arenosis Barbaricæ prope Caffsan (Desf.) Scapus 2 decimetr. Corolla magnitudine *O. ramosa* pallide flavâ. An *O. cernua* L.?
88. *O. RIGENS* Loisel. fl. gall. p. 384, scapo glabro, squamis rigidis lanceolatis imbricatis putescentibus, floribus laxe spicatis, stylo staminibusque glabris, lacinia labii corollini inferioris acutiusculis, stigmatis bifidi lobis distantiibus.  $\Sigma$  In Corsicâ. Forsan *O. nudiflora* Wallr.?
89. *O. SANGUINELA* (Presl. delic. prag. p. 176 pubescens, scapo simplici

- squamoso, squamis floralibus flores subæquantibus, spicis densis, corollæ laciuiis æqualibus obtusis denticulatis, staminibus glaberrimis.  $\mathcal{L}$  In Siciliâ.
90. *O. PLATYSTIGMA* ( Rehb. plant. crit. 7. p. 31. fl. germ. excurs. 335. n. 2409 ), stigmatis lobis deplanato-securiformibus complicatis, stylo apice glandulifero, filamentis glabris, antheris in vertice atque fissurâ brevi villo dehiscentibus, corollâ brevi amplâ.  $\mathcal{L}$  In Germaniâ australi, Trattberg in Salisburgo. Scapus robustus atro-purpureus, bractæ remotæ, spica densissima, flores ampli e testaceo purpureo-striati glandulosi.
91. *O. NUDIFLORA* ( Wallr. schedul. crit. 1. 310. gen. orob. diasc. 34 ), scapo subæquali squamis bractisque ovatis parce hirsutiusculis, segmentis calycinis ovato-oblongis in dentes lineares subæquales bifidis, corollâ ventricoso-subcampanulatâ inclinata glaberrimâ, labio superiore rotundato emarginato crenulato, inferioris lobis lateralibus subrhombicis intermedio ovato porrecto brevioribus, staminibus styloque glaberrimis, stigmate emarginato inflexo.  $\mathcal{L}$  Parasitica in radicibus Pruni spinosæ prope Lausannum. — Rehb. pl. crit. 7. f. 883-884. 916. *O. rigens* Loisel. fl. gallic. 2. 384 ? supra sub n. 88. *O. minor*. fl. dan. t. 1216 ?
92. *O. CRENATA* ( Forsk. descr. Egypt. p. 113 ), caule pedali simplici villoso, corollâ albâ 5-lobâ denticulato-crenata, staminibus in ipsâ fance inclusis. — In Arabiâ.
93. *O. PURPUREA* ( Linn. fil. suppl. 228 ), caule simplici ramosoque, corollis quadrifidis, staminibus calcaratis. — In promontorio Bonæ Speci.

*Species exclusæ.*

- O. ABORTIVA* Leyss. = *Phelipaea arenaria*.
- O. ACAULIS* Roxb. = *Eginetia acaulis*.
- O. EGINETIA* L. = *Eginetia Indica*.
- O. ALECTRA* D. Dietr. = *Aulaya Capensis*.
- O. AMERICANA* Linn. = *Conopholis Americana*.
- O. ARENARIA* Borkh. = *Phelipaea arenaria*.
- O. BIFLORA* Nutt. = *Anoplanthus uniflorus*.
- O. BORKHAUSENI* Bess. = *Phelipaea arenaria*.
- O. BRASILIENSIS* Vell. fl. flum. 5. t. 63. = *Besleria* ?
- O. CÆSIA* Bieb. = *Phelipaea cæsia*.
- O. CALIFORNICA* Cham. et Schlecht. = *Phelipaea Californica*.
- O. CALOTROPIDIS* Edgw. = *Phelipaea Calotropidis*.
- O. CAPENSIS* Thunb. = *Aulaya Capensis*.
- O. CARNOSA* Vell. flum. 6. t. 61. = *Besleria* ?
- O. CERNUA* Vell. fl. flum. 6. t. 71. = *Gloxiniæ* sp.
- O. COCCINEA* Bieb. = *Anoplanthus Biebersteinii*.
- O. CŒLESTIS* Boiss. et Reut. = *Phelipaea cœlestis*.
- O. CŒRULEA* Bor. et Chaub. fl. pelop. = *Phelipaea lavandulacea*.
- O. CŒRULCA* Vill. = *Phelipaea cœrulca*.
- O. COMOSA* Hook. = *Anoplanthus comosus*.
- O. COMOSA* Wallr. = *Phelipaea arenaria*.
- O. COMPACTA* Viv. = *Phelipaea compacta*.
- O. CRENATA* Vell. flum. 6. t. 60. = ??
- O. DELILEI* Decsn. = *Phelipaea Egyptiaca*  $\beta$  Delilei.
- O. FASCICULATA* Nutt. = *Anoplanthus fasciculatus*.
- O. FISSA* Vell. flum. 7. t. 69. = *Hypocyrta* ?

- O. **EPIMINENSIS** Vell. fl. flum. 7. t. 62. = Besleria ?  
 O. **FORTIA** Vell. fl. flum. 6. t. 75. = Hypocyrta ?  
 O. **FRAASII** F. Schultz. = Phelipaea Fraasii.  
 O. **GLABRA** Hook. = Boschniakia glabra.  
 O. **HIGIA** Vell. fl. flum. 6. t. 79. = Gesneria allagophylla.  
 O. **INDICA** Roxb. = Phelipaea Caucasia.  
 O. **INDICA** Spreng. = Striga orobanchoides.  
 O. **INTERRUPTA** Pers. = Phelipaea ramosa.  
 O. **LEVIS** Ehrh. = Phelipaea arenaria.  
 O. **LEVIS** Lam. = Phelipaea cœrulea.  
 O. **LAVANDULACEA** Hohenack. pl. cauc. = Phelipaea India.  
 O. **LAVANDULACEA** Rehb. = Phelipaea lavandulacea.  
 O. **LONGIFLORA** Pers. = Phelipaea longiflora.  
 O. **LUDOVICIANA** Nutt. = Phelipaea Ludoviciana.  
 O. **MELANCHOLICA** Vell. fl. flum. 5. t. 77. = Hypocyrta ?  
 O. **MONANTHEOS** Vell. l. c. t. 66. = Hypocyrta ?  
 O. **MONTANA** Rudb. = Clandestina rectiflora.  
 O. **MUTELI** F. Schultz = Phelipaea Muteli.  
 O. **NANA** Noé = Phelipaea Mnteli β.  
 O. **PARVIFLOEA** E. Mey. = Harveya parviflora.  
 O. **PEDUNCULATA** Vell. fl. flum. 6. t. 73. = Gesneria.  
 O. **PEDUNCULATA** Roxb. = Eginctia pedunculata.  
 O. **PEDUNCLATA** Viv. = Phelipaea Egyptiaca.  
 O. **PERIANTHOMEGA** Vell. fl. flum. 6. t. 68. = Hypocyrta ?  
 O. **PHELIPPEA** Wallr. = Phelipaea violacea.  
 O. **PHELIPPEA** Willd. = Phelipaea tinctoria.  
 O. **PURPURASCENS** Gimel. = Phelipaea cœrulea.  
 O. **PURPUREA** Harv. = Aulaya purpurea.  
 O. **PURPUREA** Jacq. = Phelipaea cœrulea.  
 O. **RACEMOSA** Vell. fl. flum. 6. t. 72. = Rytidophyllum prasinatum.  
 O. **RAMOSA** Lam. = Phelipaea ramosa.  
 O. **RAMOSA** Hohen. pl. cauc. = Phelipaea Indica.  
 O. **ROBUSTA** Alb. Dictr. = Phelipaea robusta.  
 O. **Rossica** Cham. et Schlecht. = Boschniakia glabra.  
 O. **SCARLATINA** E. Mey. = Aulaya scarlatina.  
 O. **SCHULTZII** Mutcl = Phelipaea lavandulacea.  
 O. **SECUNDA** Clus. = Phelipaea cœrulea.  
 O. **SESPENS** Vell. fl. flum. 6. t. 67. = Hypocyrta.  
 O. **SICULA** Spenn. = Phelipaea Sicula.  
 O. **SPECTABILIS** E. Mey. = Harveya Capensis.  
 O. **SPICATA** Vell. fl. flum. 6. t. 78. = Gesneria allagophylla.  
 O. **SQUAMOSA** Thunb. = Aulaya squamosa.  
 O. **STRICTA** Moris = Phelipaea stricta.  
 O. **TINCTORIA** Forsk. = Phelipaea lutea.  
 O. **TINCTORIA** Willd. = Phelipaea tinctoria.  
 O. **TUBATA** E. Mey. = Harveya tubata.

- O. TUBEROSA Vell. fl. flum. 6. t. 70. = *Gloxinia* ?  
 O. TUBEROSA Hook. = *Boschniakia tuberosa*.  
 O. TUBULOSA Vell. fl. flum. 6. t. 76. = *Gesneria* ?  
 O. UITENHAGENSIS Ekl. = *Harveya purpurea*.  
 O. UMBELLATA Vell. fl. flum. l. c. t. 65. = *Gesneria*?  
 O. UNIFLORA Linn. = *Anoplanthus uniflorus*.  
 O. VAGABONDA Vauch. = *Phelipæa lavandulacea* ?  
 O. VARIA E. Mey. = *Harveya varia*.  
 O. VENTRICOSA Vell. fl. flum. 6. t. 74. = *Besleria* ?  
 O. VERTICILLATA Vell. fl. flum. 6. t. 64. = *Gesneria*?  
 O. VIOLACEA Wallr. = *Phelipæa violacea*.  
 O. VIRGINIANA Linn. = *Epiphegus Virginianus*.  
 O. Hall. n. 294. = *Phelipæa corulea*.  
 O. n. 964. E. Mey. in Dreg. = *Aulaya pauciflora*.  
 O. n. 7874. Dreg. = *Aulaya grandiflora*.

V. BOSCHNIAKIA C. A. Meyer mss. ex Bong. in mem. Acad. St. Petersb. nov. ser. 2.  
 p. 159. Endl. gen. pl. 727. — *Orobanche* sp. Cham. et Schlecht. in Linnae 3.  
 p. 132.

Flores hermaphroditici, ebracteolati. Calyx tubulosus substruncatus inaequaliter 5-dentatus. Corolla hypogyna, ringens, labio superiore erecto fornicate bifido, inferiore abbreviato subtrilobo. Stamina 4, corollæ tubo inserta, exserta, didynama. Antheræ biloculares, loculis basi discretis, muticis. Ovarium uniloculare, placentis parietalibus duabus profunde bifidæ. Glandula hypogyna obsoleta. Ovula plurima. Stigma capitato-bilobum, lobis erga axim lateralibus emarginatis. Capsula unilocularis, incomplete bivalvis, valvis basi et apice cohaerentibus, medio placentam tunc simplicem gerentibus. Semina plurima oblonga minima, testâ minute areolatâ. — Herbae tubere hypogeo nudo multicauli, scapis crassis simplicibus, squamis ovatis obtusis mucronatis, racemo spiciformi denso.

1. B. GLabra (C. A. Meyer mss. ex Bong. l. c. Walp. rep. bot. 3. p. 478), glaberrima, caule squamoso basi incrassato reticulato, squamis cordatis acutis (siccitate) intense fuscis opacis, calyce cyathiformi tridentato, corollæ tubo inflato, labio superiore elongato integro, inferiore abbreviato obscure trilobo. *U* In insula Chamissonis, ad Lenam et in Kamtschatkâ, in sylvis Dahuriæ ad flum. Argut ad radices Alni Sibiricae (Turcz.) et in America bor. a littore occid. ad orient. et Mexicanum (Hook.). *Orobanche glabra* Hook. fl. bor. Amer. 2. 91. t. 167. *Orobanche rossica* Cham. et Schlecht in Linnae 3. 132. *Stellaria latifolia* Fisch. mss. O. caule simplicissimo ultra dimidium floriferum Gmel. Sib. 3. 216. t. 46. f. 2. Tuber police saepè crassior difformis solidus. Spica densissima majorem partem canalis occupans. Flores intra squamas brevissime pedicellati. Calyx tubo corollæ brevior pilis albis crispato-ciliatus. Corolla glabra pilis crispatis ciliata. Staminum filaments basi dilatata subglandulosa, ceterum glabra. Antheræ muticæ. Stylus in labium inferum deflexus. Capsula subobliqua lentiformis. (v. s. in l. DC. etc.)
2. B. HOOKERI (Walp. rep. bot. 3. p. 479), glaberrima, scapo squamato basi tuberoso, tubere reticulato areolis tuberculiformibus pentagonis, squamis ovatis acuminatis (siccitate) intense fuscis opacis, spicæ densâ, calyce cyathiformi obliquo tridentato, corolla tubulosa bilabiata, labii erectis, superiore ovato integro, inferiore trilobo breviore, lobis ovatis oblongis obtusis erectis. *U* Parasita in radicibus...? in America borealis ora occidentali. *Orobanche tuberosa* Hook. flor. bor. amer. 2. 92. t. 168. Flores in spicam

elongatam congesti erecti paululum curvati. Stamina inclusa. Filamenta basi barbata. Antheræ apiculatae. Stylus supra curvatus.

**VII. CLANDESTINA** *Linn. inst. 952. Endl. gen. pl. p. 727. Meissn. gen. pl. rase. 1. p. 314. 2. p. 225. — Lathrea sp. Lin.*

Flores hermaphroditi ebracteolati. Calyx campanulatus 4-fidus. Corolla hypogyna ringens, labio superiore galeato, inferiore breviore trilobo. Stamina 4, corollæ tubo inserta, didynama, subexserta. Antheræ bilocularis, loculis discretis basi mucronatis. Ovarium glandulâ hypogynâ anticâ crassâ semiæreulari superne undulato-repandâ stipatum, uniloculare, placentis parietalibus duabus linearibus. Ovula pauca uniseriata. Stylus simplex. Stigma capitato-bilobum, lobis erga axim antice et postice sitis. Capsula unilocularis, apice bivalvis, valvis medio placentam linearem gerentibus. Semina 4 vel 5, majuscula, angulata, testâ coriaceâ crassâ lœvi. Herba Europæ australis parasitica; caudice hypogeo, ramoso, squamato, scapis brevissimis; squamis interne lacunosis, cum glandulis pedicellatis intra lacunas (Duchart, in ann. sc. nat. ser. 2. v. 20. p. 445); floribus ex axillis squamarum solitariis, longe pedunculatis, strictis.

C. RECTIFLORA *Linn. illistr. gen. t. 551. f. 1.* In locis umbrosis ad radices arborum in Galliâ austro-occidentali usque ad Picardiam et Puy de Dôme (Mut. fl. fr. 2. p. 353). Hispaniâ boreali prov. Leon et Burgos (Quer) et Italiâ. — Lathrea clandestina *Linn. sp. 843. Bertol. fl. it. 6. p. 309. Orobanchæ montana Rudb. Elys. 2. 233. f. 14. Dentaria aphyllos Ray hist. 1230. Quer fl. esp. 4. p. 345. t. 17. mala.* — Moris. Oxon. hist. 3. 503. s. 12. t. 16. fig. 15. Corolla sesquiplicaris substantiâ tenui papyraceâ glabratâ. Antheræ barbatæ. Stylus longe exsertus. Bractæ sessiles crassæ cordato-reniformes subtus ad marginem plicatae. (v. s.)

**VIII. LATHREA** *Linn. gen. n. 743. excl. sp. Gærtn. 1. p. 242. t. 52. Endl. gen. pl. p. 727. Meissn. gen. plant. case. 1. p. 314. 2. p. 225. Putterl. et Endl. in gen. germ. fasc. iv. fasc. 23. Bowman in Trans. linn. soc. 16. p. 399. t. 22 et 23. — Aublati sp. Bodou. pempt. 553. f. 1. — Squamaria Hall. Hebr. 297. — Clandestinæ sp. Lam.*

Flores hermaphroditi, ebracteolati. Calyx campanulatus 4-fidus. Corolla hypogyna, ringens, labio superiore subornicato integro, inferiore minore tridentato. Stamina 4 corollæ tubo inserta, subexserta, didynama. Antheræ bilocularis, loculis basi discretis mucronatis. Ovarium glandulâ hypogynâ anticâ id est versus labium inferius corollæ stipatum, uniloculare placentis parietalibus quatuor, geminatum approximatis, subconfluentibus, latis. Ovula plurima. Stylus simplex. Stigma magnum capitato-bilobum, lobis antice et postice sitis. Capsula unilocularis, bivalvis, valvis juxta axim placentas geminas latae confluentes gerentibus. Semina plurima subglobosa minima, testâ fungosâ areolatâ. — Herba gerontogæ; caule hypogeo, ramoso, squamis carnosis imbricato; squamis in scapo brevi paucis, alternis, interne lacunosis cum glandulis pedicellatis intra lacunas (Bowm. l. c. Putterl. et Endl. l. c.); racemo terminali denso, bibracteato, secundo, cernuo.

1. *L. SQUAMARIA* *Linn. sp. 514.* 2. Parasitica in radicebus arborum fruticumque frondosorum præsertim *Coryli Avellanæ* et *Juglandis* in Europâ a Sueciâ mediâ (Wahl. fl. 1. p. 381) et *Mosquæ* (Steph. en. p. 28), ad Galliam centralem (Boreau fl. centr.) et Siciliam (Guss. syn. 2. p. 132) in reg. sylvat. *Sabaudja* et *Gaviré* Aucher! n. 508), et in monte *Baytan Syriae* (Aucher! n. 2853), in Himalayaë montibus (Royle). — Smith engl. bot. t. 50. flor. dan. t. 136. Sehkuhr handb. t. 70. Alb. Dietr. fl. borussic. 2. t. 113.

Svensk bot. t. 316. *Clandestina penduliflora* Lam. Blackw. h. t. 430. *Squamaria Orobanche Scopol. carn.* 760. Rivin. monop. irregul. t. 89. f. 2. — *Anblatum Dodon. pempt.* 553. f. 1. (v. s. et s.)

*β. erecta* (C. Koch in *linnaæ 17. 291*), erecta (nec cernua) cœrulescens, bracteis ovatis, calyce piloso inflato, corollâ tubulosâ exsertâ, labio superiore galeato, inferiore erecto subtrilobo; staminibus exsertis, antheris albo-villosis, floribus densioribus horizontalibus nec cernuis.  $\mathcal{L}$  In Somchetie sylvis carpinea. Specie differre videtur.

2. L. *ANBLATUM* (Linn. sp. p. 844), corolla labiis indivisis. — In Oriente Anblatum orientale fl. purpurascente Tournef. cor. 48. t. 481. *Anoplanthus Tournefortii* Walp. rep. 3. p. 481, ex parte. *Calyx campanulatus* 4-lobus, corolla bilabiata labiis parvis indivisis, capsula calyce inclusa et eum subæquans ovata apice longe mucronata ad basin usque bivalvis, seminibus globosis! (Ex ic. cit.)

+ *Species exclusæ.*

L. *CLANDESTINA* Linn. = *Clandestina rectiflora*.

L. *PHELIPÆA* Forsk. = *Phelipæa ramosa*.

L. *PHELIPÆA* Linn. = *Phelipæa tinctoria*.

L. *PHELIPÆA* β Linn. = *Anoplanthus Biebersteinii*.

L. *QUINQUEFIDA* Forsk. = *Phelipæa lutea*.

VIII. *ANOPLANTHUS* Endl. gen. plant. p. 727. Meisn. gen. pl. vascul. 1. p. 314. 2. p. 225. Walp. rep. bot. 3. p. 480. — *Anoplion*, sect. *Orobanches* Wallr. *Orob.* p. 66, non *Zoolog.* — *Phelipæa* sp. Tournef. — *Anoplion* G. Don gen. syst. 4. 633.

Flores hermaphroditæ, ebracteolati. Calyx subcampanulatus, quinfidus. Corolla tubulosa, tubo brevi ventricoso, vel longo basi subincurvo, limbo æqualiter 5-fido, subbilabiato. Stamina 4 corollæ tubo inserta inclusa didyma. Antheræ biloculares, loculis basi discretis, mucronulatis. Ovarium uniloculare, placenta parietalibus quatuor, remotis. Glandula hypogyna obsoleta. Ovula plurima. Stylus simplex. Stigma capitatum, obsolete bilobum, lobis antice et postice sitis. Capsula unilocularis, bivalvis, valvis intra marginem utrinque placentiferis placentis convergentibus. Semina plurima minima. — Herbae parasiticæ, in Americâ boreali et regione Taurico-Caucasicâ observatæ, scapo basi squamis vaginato, apice nudo unifloro.

Sectio 1. *EUANOPLION* Endl. gen. pl. p. 727. Walp. rep. bot. 3. p. 480.

Corolla tubus longus incurvus, limbus patens. Scapus brevis vel obsoletus pedunculus elongatus graciles unifloros basi squamâ vaginatos promens.

1. A. *UNIFLORUS* (Endl. iconogr. gen. t. 72), pedunculis unifloris longissimis gracillimis hirtellis basi squamis vaginæformibus munitis scapum radicalem longe superantes, corollâ tubulosa incurvâ, labio superiore bifido, lacinia labium inferius trifidum æquantibus extus margineque ciliatis, staminibus styloque glabris, stigma capitulo emarginato.  $\mathcal{L}$  In Americâ borealis Canadâ, Pensylvaniâ, Virginîâ, Floridâ, Carolinâ septentrionali in radicibus Compositarum (presentem Solidaginum Rugel!), Oregon! (h. Benth.). *Orobanche uniflora* Linn. sp. 882. *O. biflora* Nutt. gen. amer. 2. p. 59. *Phelipæa biflora* Spreng. syst. 2. p. 818 Hook. fl. bor. amer. 2. p. 93. *Anoplion biflorum* G. Don 1. c. 634. n. 4. Scapus radicalis glaber brevissimus squamis ovatis paucis munitus. Pedunculi 1-4 uniflori 3-4-pollicares. Corolla longitudinaliter striata hirsuta pallide cœrulescens lobis ovato-oblongis. Antheræ glabrae. (v. s.)
2. A. *COMOSUS* (Walp. rep. bot. 3. p. 480), pubescens, scapo densissime fasciculatum ramoso, ramis squamosis, calyce 5-partito cbracteato, lacinij lanceo-

*latiss acuminatis*, *corolla tubo longe exerto curvato*, *labiis elongatis recurvis*, *superiore oblongo bifido*, *inferiore trifido*, *lacinia linearis oblongis apice bidentatis*, *antheris pilosis*.  $\mathcal{L}$  Ad ripas flum. Columbie versus Fort Vancouver ( h. Benth.!). Orobanche comosa Hook. fl. bor. amer. 2. p. 92. t. 169. Planta 3-policaris corymbo-ramosa. Scapus sesquiplicaris densissime squamatus. Squamae ovato-acuminatae breves. Pedunculi pollicares, squamæ linearis, calycis basi subattingente, supra medium vaginatim inclusi. Calyx fere ad basin usque 5-fidus breviter pilosulus, lobis non subulatis, ut ait auctor, sed acuminatis. Corolla calyce plus duplo longior, pollicaris, tubo parum incurvo. Labium superium breviter bifidum. Lacinia labii inferioris æquales ad labiorum incisuram usque sectæ, apice breviter bifidae patentim recurvæ. Stylus apice fere rectangule inclinus glaber. Stigma iufundibuliforme capitatum. Capsula ovata glabra. ( v. s. in h. Benth. )

3. A. FASCICULATUM ( Walp. rep. bot. 3. p. 480), pulverulento-pubescentis, caule brevi fasciculatum ramoso, ramulis seu pedunculis nudis unifloris, calyce 5-fido ebracteato, lobis triangularibus acutis, corolla tubo longe exerto curvato, labiis crecbris concavis brevibus obtusis, superiore bifido, inferiore trifido, lacinia integris, filamentis glandulosis, antheris glabris.  $\mathcal{L}$  In America boreali ad Saskatchewan, Carlton House ( Richardson! ), Oregon et in California ( Dougl.! ). Orobanche fasciculata Nutt. gen. amer. 2. p. 59. Hook. fl. bor. amer. 2. p. 93. t. 170. Phelipæa fasciculata Spreng. syst 2. p. 818. Anoplou fasciculatum G. Don I. c. 633. n. 3. Planta 2 $\frac{1}{2}$ -5-policaris. Scapus simplex squamatus. Squamae obtusæ, floriferæ acutinsoulæ. Pedunculi solitarii ebracteati pollicares ex axillis squamarum 4-6 ultimarum. Calyx brevis cupuliformi-campanulatus breviter 5-dentatus. Corolla calyce multoties longior tubulosa incurva. Lacinia tubo 4-5° breviores, superiores binas altius coalitis, cum tubo piloso - pubescentes. Stylus glaber, sub apice deflexus Stigma capitato-iufundibuliforme. ( v. s. in h. Benth. )

### Sectio II. MACRANOPLON Reut. — Anblatum Endl. gen. pl. 27.

Corolla ampliæ tubus brevis ventricosus, limbus patens, lobis subregularibus. Scapus squamis majusculis amplexicaulibus vaginatus, in pedunculum uniflorum desinens.

1. A. BIEBERSTEINII, scapo elongato tereti fistuloso tenuiter striato glabro vel apice subpuberulo squamis semi-amplexicaulibus vaginantibus remotis munito in pedunculum uniflorum terminalem extenso, calyce monophyllo ebracteato irregulariter 5-fido glabro, corolla inflato-ventricosa tubo brevi curvato limbi patentis lobis ovato-rotundatis subæqualibus.  $\mathcal{L}$  In Tauriâ (Bieb.), pratis montosis umbrosis Georgiae canecasicæ (Hohenaker!), circa Thermas constantino-montanas et in regione subalpinâ Caucasi occidentalis ( C. A. Mey. ), in Sibiria versus mare Caspium ( Walp. ). Phelipæa Biebersteinii Fisch. mss. Anoplou Biebersteinii C. A. Mey. enum. cauc. p. 104. Orobanche coccinea Pers. encl. 2. p. 181. Lathraea Phelipæa  $\beta$ . Linn. sp. 844. Guldenst. itin. s. 422. Phelipæa foliata Lamb. trans. linn. soc. 10. 260. t. 7. Orobanche Phelipæa Bieb. fl. cauc. append. p. 179. Scapus pedalis teres subflexuosus interdum apice bifidus superne subvelutinus. Corolla coccinea tubus subpollicaris, limbus diametro subpollicari, faux intus maculis 2 obovatis nigro-velutinis. Stamina infra medium tubi inserta, filamentis pubescentibus, antheris ad suturam pilosolanatis. Stigma late orbiculatum. ( v. s. )

$\beta$  Boissieri, scapo crasso breviore, superne præsertim glanduloso-asperulo subvelutino, squamis ampliis ovato-cucullatis approximatis. — In argilosis montis Cadmi ad orientem Denisleh ( E. Boissier! ) in Cariâ ( Pinard! ) ad radices Centaureæ sp. adhaerens. Orobanche coccinea Rehb. pl. crit. t. 699. 937. 938. Scapus 5-6 pollicis longus basi subattenuatus. ( v. s. a cl. Boiss. et Pinard. )

5. A. TOURNEFORTII ( Walp. rep. bot. 3. p. 48 ex parte), scapo basi involuto

simplici, villoso, superne nudo unifloro, corollæ lobis patentibus circinnatis.  $\mathcal{L}$  In Armeniâ (Tournef.), in Kurdistaniâ (J. Brant! Strangways in h. Benth!) ad radices Achilleæ vel Pyrethri adhæreens. Phelipæa Tournesfortii Desf. choix cor. Tournef. p. 16. t. 10. Anblatum Tournesfortii G. Don gen. syst. 4. p. 635. Phelipæa orientalis flore coccineo Tournef. cor. 47. t. 479. fl. et fr. Scapi plures simplices villosi pilis sparsis albidis obsti, bipollicares fere ad pedem usque longi, basi vaginis elongatis inæqualibus involuti. Calyx violaceus profunde 5-fidus villosus. Corolla coccinea. Antheræ luteæ. (v. s. in h. Bentham.)

*Genera affinia vel dubia.*

IX. ÆGINETIA Linn. spec. ed. 1. p. 632. Endl. gen. pl. p. 728.

Flores hermaphroditi, ebracteolati. Calyx spathaceus, laxus, antice fissus, postice acutus. Corolla hypogyna, tubo cylindrico, calycem parum superante, subincurvo, limbo subæqualiter quinquefido, bilabiato. Stamina 4, imo corollæ tubo inserta, inclusa, didynama. Filamenta teretia convergentia. Antheræ per paria cohærentes, loculis ex apice connectivi incrassati pendulis, apice truncatæ, basi acutâ dehiscentes, staminum inferiorum postice in calcar conicum obtusum productæ. Ovarium biloculare (1), placentis erga axim inflorescentiae lateralibus, in quo leve geminis, crassis, undulatis, versus dissepimentum planum basi et apice insertum marginibus liberum porrectis. Stylus simplex. Stigma magnum carnosum peltato-cordatum. Capsula bilocularis, irregulariter bivalvis, valvis placentiferis. Semina plurima minima. — Herbae Indicæ parasiticæ; scapo squamato, abbreviato, pedunculos unifloros nudos scapiformes, solitarios vel cæspitose confertos exserente, floribus majusculis speciosis.

1. *A. INDICA* (Roxb. pl. coromand. 1. p. 63. t. 91), scapo elongato subsimilie nudo, corollæ limbo breviter 5-fido.  $\mathcal{L}$  In Indiæ orientalis Nepaliâ, Silhet, Circars, Toong-Dong, Tavoy, Dheyra Dhoun, Kidarkonta, etc. ins. Philippinis (Cuming! n. 2046). — Wallich cat. 3964 Benth! Scrophul. ind. p. 55. Orobanche Æginetia Linn. sp. pl. 333. Tsiam-cumula Rheedæ hort. malabar. 11. 97. t. 47. Corolla curvata purpurea. Calyx flavescens. (v. in h. DC. et Benth.)

2. *A. PEDUNCULATA* (Wall.! pl. asiat. rarior. 3. t. 219), glabra, scapo simplici squamis paucis attenuatis instructo, squamis floralibus triangularibus, calyce spathaceo monophyllo interiore latere fisso, corollæ tubo inflato calycem æquante, limbo quinquepartito subæquali segmentis reniformibus denticulatis, filamentis glabris, stigmate magno cordato-peltato.  $\mathcal{L}$  In Bengaliâ parasitice crescit in radicibus Andropogonis muricati et Bambusarum complurium. Orobanche pedunculata Roxb. hort. bengal. 45. et fl. indic. 3. p. 29. Pedunculi uniflori scapus æquantes. Flores maximi. Corollæ tubus luteus, limbo obscure violaceo. Calyx liquore viscoso repletus. Stamina inclusa. Capsula ovata. (v. in h. DC. et Benth.)

3. *A. ABBREVIATA* (Hamilt. mss. in Wall. catal. 3965. Benth. 1. c.), scapo brevissimo ramoso vel simplicisquamato, corollæ amplæ limbo bilabiato, labio inferiore ampio trilobo.  $\mathcal{L}$  In peninsula Indiæ orientalis, Rangoon! Silhet! et in Manillâ. — Walp. nov. act. acad. cæs. leop. nat. curios. 19. suppl. 1. 400. (v. in h. DC.)

4. *A. ACAULIS* (Walp. rep. bot. 3. p. 481), acaulis, floribus in capitula irregu-

(1) Ex iconibus cit. uniloculare potius videtur, quod in speciminiis plerumque adulteratis in herbario rite observare non licet.

laria radicalia sessilia congestis, calycibus monophylitis spathaceis unilatera-  
liter nissis vel irregulariter bilobis, corolla laciniis crenatis, antheris simpli-  
liter oblongis, duabus interioribus glandulâ recurvâ ovali auctis, stigmate peltato. (I  
cibus, duabus interioribus glandulâ recurvâ ovali auctis, stigmate peltato. (I  
Crescit parasitice in radicibus Sacchari off. var. Sinensis ??) in horto botanico  
Calenttensi. Orobanche acaulis Roxb. fl. Ind. 3. 29. et pl. coronand. t. 292.  
Bracteae triangulares, pedicellum unum vel plures incurrentes. Corolla extus  
purpurea intus flava.

+ *Species exclusæ*

*E. CAPITATA* Grah. = *Liposma capitatum*.

*E. COCINEA* Juss. = *Anoplanthus Tournefortii*.

*E. LONGIFLORA* Cav. = *Bouvardia longiflora*.

*E. MULTIFLORA* Cav. = *Bouvardia Cavanillesii*.

X. *EPIRIZANTHIUS* Endl. gen. pl. p. 728. — *Epirixanthes* Blum. catal. hort.  
*Buitenzorg ex Flora* 1825. p. 133. — *Epirizanthe* Blum. flor. jar. prof. 7.

Calyx liber, inferus, turbinatus, quinque-dentatus. Corolla gamopetala,  
ventricosa, trifida, bilabiata; labio superiore concavo, bipartito, inferius  
brevis fornicatum integrum amplectente. Stamina monadelpha, inclusa;  
filamento membranaceo basi labii inferioris corollæ adnato stylum semi-  
vaginante; antheris quinque rarius quatuor, ellipticis, bilocularibus,  
in filamenti margine superiore in orbe dispositis. Ovarium globoso-  
ellipticum. Stylus longitudine filamenti. Stigma capitatum. Capsula glo-  
bosâ didyma, bilocularis, bivalvis, dissepiamento e valvarum margini-  
bus introflexis. Semina in loculis solitaria, globosa, dissepiamento adhae-  
rentia. Embryo. — Herbae Javanicae, in aliarum stirpium radicibus  
parasiticae; caulis squamosus, apice bi-trifurcatus, spicis terminalibus  
dense squamoso-bracteatis, bracteis unifloris.

1. *E. CYLINDRICUS* (Blume in florâ 1825. p. 134), spicis densis cylindricis,  
germine oblongo, stylo minimo.  $\mathcal{L}^?$  In insulâ Java.
2. *E. ELONGATUS* (Blume l. c.), spicis laxis elongatis, germine globoso, stylo  
simplici.  $\mathcal{L}^?$  In insulâ Java.
3. *E. LINEARIS* (Blume l. c.), spicis minimis tenuissimis, germine globoso,  
stylo setaceo.  $\mathcal{L}^?$  In insulâ Java.

XI. *OBOLARIA* Linn. gen. 102. Juss. gen. 101. Nutt. gen. p. 103. Barton  
Amer. 3. t. 90. *Darlingtonia cestr.* p. 21, t. 2. *flora cestr.* p. 112. D. Don  
in Edinh. phil. journ. 37. p. 113. — *Schultzia Rufa*, in N.-Y. med. reposit. 11.  
Her. V. 350 (ex Endl. rit.) Endl. gen. p. 695. Meisn. gener. pl. vasc. 1. p. 313.  
11. 223.

Calyx diphyllus, bracteiformis. Corolla hypogyna, campanulata, limbi  
quadrilobi laciniis subincisis. Stamina 4 inter corollæ lobos inserta, subdify-  
nana, filamenta filiformia, brevia, antheræ subglobosæ biloculares. Ova-  
rium uniloculare, placenis duabus parietalibus, multiovulatis. Stylus brac-  
vissimus. stigma bifidum, lobis erga axim lateralibus. Capsula ovata,  
unilocularis, bivalvis, valvis medio placentiferis. Semina plurima, minutissima. — Herba Boreali-Americanæ, subpaludosa, non satis nota et dubia  
affinitatis, fortasse ad Gentianeas depellenda, ab Orobancheis ut videtur  
aliena; cl. Don trib. inter Orobancheas constituit; cl. Meisner ad Scro-  
phulariaceas propæ Toreniam refert. Caulis simplex. Folia opposita sessilia  
subrotunda carnosula subtus purpurea. Flores terminales conferti, pallide  
cœrulei. — Iconem Bartonis non vidi.

O. VIRGINICA (Linn. sp. 881). *2* In Americā boreali, in Pensylvania, circa Philadelphiam raro, in Carolinā? prope West-Chester et frequenter in sylvis umbrobis ad lacum Erie. — Moris. Oxon. histor. 111. sect. 12. t. 16. f. 23. Flukens. alm. 273. phytogr. t. 209. fig. 6. O. Caroliniana Walt.-Car. p. 166? (veris. eadem ex phrasi breviss. auctoris). Herba 3-4-pollicaris, radice tenui ramosā; fol. crassi viridibus carnosulis, infra sēpē purpurascētibus; floribus sessilibus geminis vel ternis, versus apicem caulis cōrulescenti-albis vel pallide rubescētibus, bracteā foliacea suffultis. ( v. in h. DC. et Benth. )

Ordo CXLV ACANTHACEAE 1) R. Brown prodr. p. 472.  
*Bartl. ord. nat. p. 183. Nees in Wall. plant. As. rar. 3. p. 70.*  
*Bartl. ord. nat. p. 183. Nees in Wall. plant. As. rar. 3. p. 70.*  
*et in Endl. et Mart. fl. Bras. fasc. 7. p. 5 et 6. Lindl.*  
*introd. ed. 2. p. 284. Endl. gen. p. 696. Meisn. gen. p.*  
*293. 201 Royle ill. p. 296. — Acanthi Juss. gen. p. 102.*  
*Ann. Mus. 5. p. 251, 9. p. 251 14. p. 390.*

Calyx pentamerus, sepalis uno postico duobus anticis totidemque lateralibus, æqualibus vel inæqualibus, distinctis vel varie connatis, postico sæpiissime majore, nunc anticis duobus coalitis inæqualiter quadrifidus vel quadripartitus, interdum bracteolis inclusus, annularis, fere obsoletus, margine truncato, integerrimo vel irregulariter pluridentato. Corolla hypogyna, pentamera, petalis cum laciinis calycinis alternantibus in tubum quinquenervem connatis, limbo rarius æqualiter quinquepartito, sæpiissime bilabiato, labio superiore dimero, in nonnullis obsoleto, inferiore trimero. lobis plus minus distinctis vel cohærentibus, aestivatione contortis. Stamina corollæ tubo diversâ altitudine, nunc imâ basi, nunc medio, interdum prope faucem inserta, exserta vel inclusa, quinto postico semper sterili rudimentario in plerisque penitus oblitterato. nunc quatuor didyma, antica breviora, nunc anticis anantheris vel penitus oblitteratis nonnisi duo. Filamenta filiformia vel subulata; basi interdum per paria connexa. Antheræ nunc biloculares, loculis oppositis, parallelis, æqualibus vel inæqualibus, valvulis contiguis sæpius angustioribus ad speciem uniloculares, nunc loculis inæqualiter iuertis, obliquis, superpositis vel divaricatis, altero tunc, iuprimis in staminibus anticis, abortiente vel rudimentario unilocularis, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium liberum, dimerum, dissepimento e carpidiorum marginibus introflexis duplicato completo vel ad axim deliquescente biloculare, loculis anticum et posticum axeos floralis latus respicientibus, sæpius basi carpidiorum in unguem compressione oblitteratis, medio ad apicem turgentibus, nunc apice in rostrum angustatis. Ovula in loculis gemina, terna, quaterna vel interdum subindefinita, juxta medium dissepimentum biseriata, sessilia, processu placentari suffulta, amphitropa vel campylotropa. Stylus terminalis, filiformis, simplex. Stigma indivisum vel sæpius bifidum. Capsula membranacea, coriacea vel cartilaginea, sessilis vel unguiculata, obtusa vel rostrata, bilocularis (rariissime alterius loculi abortu unilocularis, indehiscens) elastice bivalvis, dissepimenti con-

1) Auctore ill. Chr. Gotofr. Nees ab Esenbeck, Acad. cœs. L. C. Nat. Clas. Præs.

trarii, integri vel medio deliquescentis, per axim bipartibilis segmentis valvis adnatis, persistentibus vel interdum ab iisdem dissilientibus valvis nunc integris, nunc medio demum bipartitis. Semina subrotunda, saepe compressa, in loculis gemina, quaterna vel subindefinite plura, interdum abortu solitaria, dissepimenti processibus subulatis vel uncinatis ( retinaculis ) subtensa, nunc iisdem obsoletis vel in cupulam testae adnatam contractis suffulta. Testa coriacea, fibrosa vel laxa, saepissime tuberculata, nonnunquam pilosa. Albumen nullum. Embryo curvatus vel rarius rectus. Cotyledones magnae, suborbiculatae plano-convexae, vel interdum contortuplicatae. Radicula teres, descendens et simul centripeta, curvata vel recta. Plumula vix conspicua. — Herbae basi suffruticosae, nunc suffrutescere vel frutescere caule ramisque nodoso-articulatis, pube duin adest simplici, rarius capitata, rarissime stellata. Folia opposita vel interdum geniculis abbreviatis ternatim quaternatimve verticillata, simplicia, integra, nunc integerrima, nunc crenata vel dentata; rarius spinoso-sinuata, sessilia vel petiolata, penninervia, ejusdem paris saepissime magis minusve inaequalia, singula basi plerunque nonnihil inaequilatera. Stipulae nullae. Flores hermaphroditi, irregulares, axillares vel terminales, spicati, racemosi, fasciculati, rarius solitarii, in spicis ut plurimum oppositi, interdum alterni, singuli bracteae bracteolisque geminis, nonnunquam obsoletis, quandoque maximis, calycis tunc fere obsoleti vices gerentibus, stipati. — Acanthaceae magno specierum numero inter tropicos totius orbis luxuriantes, in regionibus subtropicis multo rariores, in hemisphaerio boreali vix ultra 15° in australi non ultra 12° isotherm. reperiuntur. Affinitate inter Scrophulariaceas, mediante imprimis Melampyro et Bignoniaceas mediae, notarum summam, albuminis defectu constanti placentatione in axi dissepimenti bipartiti et ad interiorem segmentorum ejusdem marginem, radiculae descendantis directione centripetam, capsulae in plerisque dehiscentiam elasticam, retinaculorum in plurimis apparatus, denique habitu quodammodo proprio optime distinctae. Generum seriem, paucissimis ordinis stirpibus americanis accuratius adhucdum perpensis, incompletam, etiam e nostri herbariorum gazis brasiliensibus ab Acanthacearum Indicarum sospitatore augendum, perficiendam speramus.

## CONSPECTUS TRIBUUM.

## Subordo I. ANECHMATA CANTHE.E.

*Semina retinaculis non suffulta.*

Tribus I. THUNBERGIE E. — Semina pauca in capsula, crassa. Retinaculorum loco cupula basi seminum adnata. Plantæ scandentes.

Tribus II. NELSONIE E. — Capsula polysperma. Semina parva, funiculo papillæformi innata.

## Subordo II. ECHMATA CANTHE.E.

*Semina retinaculis uncinatis suffulta.*

Tribus III. HYGROPHILE E. — Calyx quinquefidus. Corolla ringens. Stamina 4 didynama, rarius duo sola fertilia. Antheræ loculi paralleli. Capsula angusta, a basi polysperma, in uno genere a medio oligospermia attamen basi laud contracta.

Tribus IV. RUELLIE E. — Calyx quinquefidus. Corolla subregularis, nec definite bilabiata, tubulosa infundibuliformis vel subcampanulata, tubo plus minus elongato. Stamina quatuor, didynama sed longitudine haud multum diversa, paucis abortu dno. Antherarum loculi paralleli. Capsula di-tetra-polysperma plerisque spatio aliquo a basi sterilis et angustior. Flores axillares, typice cymosi, abortu solitarii et plerumque bibracteolati, aliis evidenter cymosi vel ramo abortiente racemosi, racemo secundifloro.

Tribus V. BARLERIE E. — Calyx vel quadripartitus laciinis inæqualibus, vel bilabiatus. Corolla infundibuliformis vel bilabiata, tubo brevissimo, fauibus saepè elongatis. Stamina apici tubi inserta, quatuor didynama, altero pari brevissimo, vel abortu duo. Antherarum loculi paralleli. Capsula ad basin tetrasperma. Flores axillares, cymulosi, bracteolati, secundi.

Tribus VI. AGANTHE E. — Calyx quadripartitus, laciinis inæqualibus. Corolla unilabiata tubo cartilagineo. Stamina quatuor, didynama. Antheræ uniloculares. Capsula ad basin tetrasperma. Flores spicati, bracteati et bracteolati.

Tribus VII. APHELANDRE E. — Calyx quinquepartitus, regularis. Corolla bilabiata vel ringens, paucis subregularis et infundibuliformis. Stamina quatuor, subæqualia. Antheræ uniloculares, angustæ. Capsula a basi vel in medio tetrasperma, pancies in medio di- vel hexasperma. Flores spicati, bracteati et bracteolati.

Tribus VIII. GENDARUSSE E. — Calyx plerisque profunde quinquefidus et regularis, paucis laciiniæ dorsali minori vel deficiente quadridfidus subquadridfidusve. Corolla bilabiata vel ringens, paucis subinfundibuliformis limbo quadridido subæquali. Stamina e tubi basi orientia, paucis quatuor didynama plerisque duo tantum. Antheræ biloculares, loculis parallelis vel frequentius connectivo vario discretis, muticis

vel basi calcaratis, subinde abortu uniloculares. Capsula a basi fere ad medium usque angustior compressa et sterilis, hinc a medio di-pleiosperma. Flores e cymulis abortivis axillares sessiles vel subsessiles, frequentius spicati vel racemosi, spicis racemisve axillaribus subterminalibus. Bracteæ bracteolæque variae.

Tribus IX. ERANTHEMEE. — Calyx quinquefidus, regularis. Corolla subhypocraterimorpha, limbo vel regulari vel subbilabiato, labio superiore angusto, tubo longo. Stamina perfecta duo, tibi apici inserta. Antheræ biloculares, loculis parallelis. Capsula a basi usque ad medium vel ultra angusta depressa et sterilis, hiuc tetrasperma. Flores axillares sessiles, vel spicati.

Tribus X. DICLIPTEREE. — Calyx profunde quinquepartitus, regularis. Corolla vel bilabiata labiis subconformibus, vel iufundibuliformis limbo regulari. Stamina paucis quatuor didynamica, plerisque duo. Antheræ plerisque biloculares loculis vel parallelis vel uno super altero posito, generi Hypoesti uniloculares. Capsula in medio di-tetrasperma, dissepimento in nonnullis a valvulis solubili et elastice adsurgente. Flores collecti in capitula involucrata uni-pluriflora, pedunculata, axillaria, typice cymosa, cymis plus minus evolutis, subinde racemiformibus. Involucra saepe ad speciem bivalvia.

Tribus XI. ANDROGRAPHIDEE. — Calyx quinquefidus, regularis. Corolla bilabiata vel ringens. Stamina duo. Antherarum loculus inferior barbatus vel lanatus, subinde lanâ obliteratus. Capsula depressa, a basi polysperma. Flores axillares solitarii vel racemosi.

#### SUBORDO I. ANECHMATA CANTHEÆ.

Semina retinaculis destituta.

Tribus I. THUNBERGIEÆ Nees ab Esenb. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 74 et in Lindl. nat. syst. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 697. — Mendozieæ et Thunbergieæ Meiss. gen. p. 293.

Retinacula in cupulam corneam dilatata seminique adnata. Semina crassa, pauca. Fructus quibusdam drupaceus.

#### CONSPECTUS GENERUM.

I. *Mendoncia*. — Fructus drupaceus. — America calidior.

II. *Thunbergia*. — Fructus capsularis. Corolla regularis. Antheræ omnes basi uniaristatae. — Africa et India orientalis tropica.

III. *Meyenia*. — Fructus capsularis. Corolla subregularis. Antheræ hasi muticæ, staminum longiorum loculis obliquis. — India orientalis.

IV. *Hexacentris*. — Fructus capsularis. Corolla regularis. Antheræ superiores basi unicaricate, inferiores basi bicaricate. — India orientalis.

V. *Clistax*. — Fructus capsularis. Corolla ringens. Stamina duo. — Brasilia.

- I. MENDONCIA** Vellozo in *Vand fl. tuisit. et bras.* p. 43 f. 22. — Mendozaia Ruiz et Pavon prodr. fl. peruv. et chil. p. 89. t. 17. *Pers. synops.* 2 p. 175. *Endl. gen. p. 697. Mart. nov. gen. et spec. pl. 3 p. 20. t. 209-211. Poepp. et Endl. nov. gen. 3. p. 10. t. 208. Nees ab Es. *Mss. (1).**

Calyx brevissimus, cupuliformis, truncatus, corolla basi arcte adpressus. Bracteolæ duæ, parumper a calyce remotæ, calyce multo maiores, sub anthesi incumbentes, sub fructu patentes, florem ante anthesin valvatum tegentes, sub anthesi apice aut altero latere tantum deliquescentes. Corolla tubulosa, limbo brevi subæqualiter quinquelobo patente vel reflexo. Stamina quatuor, didynama, cum rudimento quinti; antheræ subulatæ, bilocularis, loculis parallelis glabris muticis, altero sœpe minore. Stigma breviter bifidum. Ovarium biloculare, bi-4-ovulatum. Drupa sicca, putamine osseo, abortu unilocularis monosperma. Retinacula nulla. Semen ovatum. Embryo chrysaloides. — Frutices Americæ tropicæ scandentes vel volubiles, hirti vel scabri. Folia petiolata, integrerrima. Pedunculi uniflori, axillares, solitarii vel aggregati. Flores nutantes. Bracteæ duæ exiguae oppositæ juxta florem. Bracteolæ hirsutæ vel tomentosæ.

### § 1. *Corolla (purpureæ) tubulosæ limbo brevi.*

1. **M. SCHOMBURGKIANA**, foliis ovalibus argute acuminatis supra strigoso-asperis subtus glabriusculis basi obtusis, bracteolis linear-i-oblongis cuspidatis pedunculis cauleque adpresso-strigilosis, pedunculis geminiis. ♂ (♀) In ripâ fluvii Pomeroon, Guiana anglicæ, Septembri (R. Schomburgk! n. 1431. in h. gen. Berol.). Flores intense rubri ex Schomburgk. Bracteolæ subfalcatae. Corolla angusta. Distinguitur a **M. Hoffmannseggianæ** et **squamuligeræ** foliis argutissime acuminatis et basi obtusis, a **M. squamuligeræ** etiam integumento caulin peduncularum brevi adpresso. (v. s.)
2. **M. HOFFMANNSEGGIANA** (N. ab E. in Endl. et Mart. flor. bras. fasc. 7. p. 9), foliis ovalibus obovatissimis brevissimæ acute cuspidulatis basi acutis supra hispidis subtus ramisque novellis bracteolisque linear-i-oblongis planis breviterque mucronulatis strigiloso-pubescentibus. (♀) In Brasilia (Comes de Hoffmannsegg! in h. Willd.), ad Babia (Blanchet!), Demerara in Guiana Anglicæ (Parker! in h. Hook.) Mendoza pubescens Hoffmannsegg! in h. Willd. Quod ad bracteolarum figuram M. pilosam fere refert, haec autem in nostrâ haud pilis longis patentibus hirsutæ sunt, sed breviribbus et subadpressis pilis densius vestitæ, omnino ut bracteolæ M. Vellozianæ et asperæ, etiam in mucronem brevissimum illarum ad instar exent. Folia cum petiolo 3-7 lin. longo 2 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa sunt, 1-2 poll. in medio vel citra medium lata, cuspidate brevissimæ acuta, subinde et obtusa, supra aspera setulisque sparsis rigidis hispida, subtus pubescenti-hirta, margine integrerrima. Bracteolæ 1 $\frac{1}{2}$  poll. longæ, 3 $\frac{1}{2}$ -4 lin. lateæ, basi obtusæ. Corolla elongato-infundibuliformis, purpurea. Drupa obovata, in statu siccæ rugis aliquot longitudinalibus undatis notata, 6 lin. longa. (v. s.)
3. **M. SQUAMULIGERA**, foliis ovalibus acute cuspidatis basi acutis supra squamu-loso-asperis hispidisque demum glabrescentibus et nitidis, subtus ramulis novellis pedunculis bracteolisque linear-i-oblongis planis breviterque mucronulatis hirsutis subtomentosis ciliatisque. ♂ Ad Cayenne (Perrottet et Martin! in h. DC. Martin! in h. Hook.). Differt a **M. Hoffmannseggianæ** foliis apicem versus haud latioribus, acumine paulo longiore præditis, et pedunculis bracteolisque patulo-hirsutis nec substrigosis. (v. s.)
4. **M. PILOSA** (Mart. nov. gen. et spec. 3. p. 21. n. 1. t. 209. Poepp. et Endl.

(1) Genus cuidam *Mendonca* a Vellozo et Vandelli dicatum; nempe ex Theis gloss. hot. nostro Rom. script. de plant. hisp. comiti de Mendonca. (Alph. DC.)

- nov. gen. 3. p. 11. n. 6), pilis longis patentibus hirsuta, foliis lato-ovatis acuminateis, bracteolis oblongis subfalcato-acuminatis longe cuspidatis planiusculis, corollâ anguste tubulosâ limbo brevi. ♂ In silvis aborigenibus fluvium Jabura innumbrantibus, ex. gr. prope Manacuru, Indorum Juri habitationes, et prope Porto dos Miranhas provincea fluminis Nigri, florens Decembri et Jan. (Martius!), in silvis Amazonicis circum Egam, Novembris (Poeppig!). — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 11. Mendoza granulosa Poepp. in h. acad. petrop. n. 2818. A reliquis satis differt bracteolis longe cuspidatis. Folia sunt latiora, argute cuspidata, Pedunculi plerumque solitarii, oppositi. Corolla, et latere infra apicem bracteolarum erumpens, harum apicem vix excedens, coccinea. (v. s.)
5. M. ASPERA (R. et Pav. fl. peruv. p. 158. prodr. t. 17), foliis ovalibus cuspidatis supra asperis subtus caule pedunculis bracteolisque hirsuto-sericeis, bracteolis ovato-oblongis apicem versus angustioribus mucronato-acutis, corollâ anguste tubulosâ limbo brevi. ♂ In Peruvia (Ruiz et Pav. et Mathews! n. 1232. in h. Hook.), Suruam (h. Benth! Hostmann! n. 44). — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 9. Differt a reliquis, presertim a M. Meyeniana, bracteolis apicem versus angustioribus, ipso apice acuto cum mucroulo haud raro subfalcato, una cum petiolis densissimâ hirsutie arcte incumbente flavicante sericeis. (v. s.)
- β. *rotundifolia*, foliis brevioribus magisque rotundatis. In silvis primævis ad Egam, Brasiliæ septentrionalis oppidum, Octobri (Poepp. in h. DC. n. 2194.), in Bahia (Blanchet! in h. DC. n. 1474). M. rotundifolia Poepp. et Endl. nov. gen. 3. p. 10. (v. s.)
6. M. RIEDELIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 12), ramis incumbenti-hirsutis, foliis ovalibus ovalive-oblongis ex apice obtuso aristulato-mucronatis supra pilosis subtus mucronuloso hirsutis, pedunculis axillaribus numerosis petiolo brevioribus bracteolisque oblongis mucronatis concavis hirsutissimis, corollâ tubulosâ incurvata. — Ad Castelvovo in Brasiliâ, Martio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 655.) Differt a M. multiflorâ bracteolis angustioribus et longioribus, eodemque etiam charactere a M. Schottiana et puberula; M. pilosa Mart. differt floribus solitariis longe pedunculatis, bracteolis apicem versus attenuatis. Folia alia macronata sunt, alia mutica et obtusissima, basi modo obtusa, modo acuta. Flores 8-10 in fasciculo. Bracteolæ fere pollicares, 3 lin. late, basi obtusa, flavo-hirsutissimæ mucronulo apicis in densa barba latente. « Corolla quinquefida, subæqualis, fusca aut ochracea. (Riedel in sched.) (v. s.)
7. M. SCHOTTIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 12), foliis ovalibus argute cuspidatis mucronatis, bracteolis ovatis ovalibus setaceo-cuspidatis, corollâ tubulosâ limbo brevi. — In Brasiliâ (Gardner n. 597 in h. imp. Vindob.). Foliorum et bracteolarum cuspide subtili satis distincta species; a M. pilosa Mart. bracteolis differt brevioribus, ad speciem latioribus. Pedunculi oppositi, solitarii geminive. Bracteolæ cum cuspide setacea 8 lin. longæ, 5 lin. late, basi obtusa, valde villosæ. Folia inferiora cuspide gaudent obtusiusculo cum mucrone, superiora regulariter cuspidata sunt. (v. s.)
- α. *villosa*, pilis mollibus incumbentibus vestita.  
 β. *glabrescens*, caule foliisque subglabris. In Brasiliâ (Schott). — Mendoza Schottiana (Pohl in h. imp. Vindob. n. 6118!).
- Var. α, quæ status plantæ est tenerior ante anthesin, omnes partes villositate eximia gaudent; in var. β pili in caule foliisque fere evanuere, in bracteolis minus densi resident, quæ bracteolæ paulo magis explicatæ, ad ovatam figuram penitus accedunt.
8. M. MEYENIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 11), pilis brevibus incumbentibus hirta, foliis ovato-oblongis ovalibus cuspidatis acuminatis, bracteolis ovato-oblongis planis obtusis breviter mucronatis, corollâ anguste tubulosâ limbo brevi. — In Peruvia silvis (Meyen!) M. aspera

- N. ab E. in Mey. it. in act. ac. uat. cur. 18. suppl. 1. p. 382 (excl. synon.) A M. Vellozianā (cujus probabiliter est varietas) differt foliis majoribus (3-5 poll. longis) angustioribus, longiore acumine et pubescentia breviore rariore que rigidore. (v. s.)
- β. glabra*, foliis glabris, bracteolis oblongis. In Brasiliā, provinciā non adnotatā (Riedel ! in h. acad. petrop. n. 0, 166.)
9. M. VELLOZIANA (Mart. nov. gen. et sp. 22. t. 210), pilis adpressis sericeo-volutina aut pilosa, foliis ovalibus ovatis cuspidatis, bracteolis ovatis ovato-oblongis planis breviter mucronulatis, corollā anguste tubulosā limbo brevi. (In Brasiliā prov. Sebastianopolitanā, ~ Pauli, Minaruu, Paraibā, etc., locis silvaticis, a Sept. ad Novemb. — Poepp. et Endl. nov. gen. 3. p. 10. Gardn. fl. bras. in London journ. of bot. 1. p. 505. Tweedie! n. 1345. in h. Hook. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 11. M. albida fl. flum. 6. t. 85. M. foliis ovatis acutis villoso, caule volubili, calycibus pedunculisque pilosis Vandelli in Roem. script. lus. min. p. 127. (v. s.)
- α. Sparatteria* (Mart. 1. c.), bracteis basi subtruncatis.
- β. sphingeria* (Mart. 1. c. Poepp. et Endl. 1. c.), bracteolis basi angustioribus. In Serrā dos Orgāos provinciæ Sebastianopolitanae (Vauthier ! in h. inpr. Vindob. ex h. Endlich. n. 251 et in h. DC. Martius!), in in-sulā S. Catharine Tweedie! in h. Hook., in silvarum marginibus provinciæ Maynas ad Yurimaguas, Januario (Poeppig !) Mendoncia coccinea Vell. fl. flum. 5. t. 86. Folia 1  $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, dense molliterque hirsuta. Pedunculi plerisque 2-4 aggregati. Flores coccinei. Variat foliis vel evidenter cuspidatis vel simpliciter acutis, bracteolisque magis ovatis ovato-oblongis, tum basi foliorum alii obtusissimā alii acutiusculā. Probabiliter species propria cst, media inter M. Vellozianam et puberulam. (v. s.)
10. M. MULTIFLORA (Poepp. et Endl. nov. gen. 3. p. 10. t. 208. f. 1-3), ramis pilosis, foliis ellipticis utrinque acuminatis supra glabris subtus strigoso-hirtis, pedunculis axillaribus numerosis petiolo brevioribus bracteolisque ovalibus mucronatis concavis strigoso-sericeis, corollis anguste tubulosis, drupā compressa. (In silvis primaveris circuū Egam in provinciā Paraënsi (Poeppig!) — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 12. M. strigosa Poepp. in h. acad. petrop. n. 2821. Corolla violacea, glabra. (v. s.)
11. M. TOMENTOSA (Poepp.), cano-tomentosa, foliis suborbiculatis mucronulatis subitus reticulatis, floribus aggregatis, bracteolis subrotundis. (Ad Egam in provinciā l'araënsi secus fluvium Amazonum, Novembri (Poeppig ! in h. acad. petrop. n. 2818, specimen valde incompletum). — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 12. Species, si revera sit hujus generis, distinctissima foliis subrotundis et tomento. An M. multiflora var., aut status luxurians? (v. s.)
12. M. HIRSUTA (Poepp. et Endl. nov. gen. 3. p. 10. n. 2), pilis longis patentibus hirsuta, foliis ovali-oblongis acuminatis, bracteolis ellipticis setaceo-mucronatis planiusculis, corollā.... (Ad Maynas et Yurimaguas in Peruviā (Poeppig !) M. angustifolia Poepp. in h. reg. Berol. n. 2252. ! M. pilosæ Mart. varietatem dices angustifoliam, sed differt bracteolis revera ovalibus mucrone setiformi terminatis, 1 poll. longis,  $\frac{1}{2}$  poll. latis, quæ illi cum mucrone sesquipollicaires et 3  $\frac{1}{2}$ -4 lin. latæ (in utrâque hirsutæ.) Folia M. pilosæ cum petiolo semipollicari 4-4  $\frac{1}{2}$  poll. longa, 2  $\frac{1}{2}$  poll. lata, M. angustifoliæ folia contra 3  $\frac{1}{2}$ -4  $\frac{1}{2}$  poll. longa 1-1  $\frac{1}{4}$  poll. lata. Flos et fructus desunt. (v. s.)
- § 2. *Corolla (sape pallide, infundibuliformis) limbo ampliore.*
13. M. GLABRA (Poepp. et Endl. nov. gen. 3. p. 10., glaberrima, foliis ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus gemini petiolati aquantibus, bracteolis ovatis acutis planis, corollæ angustæ tubulosaæ limbo lato. (In fruticetis

- Peruviae ad missionem Tocache, Julio (Poeppig), Ilheos (Blanchet in h. Moricand!), Limâ (Ruiz et Pav. in h. Hook.) Glabritia a reliquis differt. Flores præ cæteris parvi. Corolla pallide lilacina vel alba. Fructus subglobosi, dissite rugosi. (v. s.)
14. M. SELLOWIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 10), foliis elliptico-ovatis acuminatis basi rotundatis subcordatis supra hirtis subtus ramisque novellis hirsutis, bracteolis suborbiculari setaceo-mucronatis pedunculisque patenti-hirsutissimis, corollâ..., fructu obovato mucronato lenticulari-compresso marginibus acutis ad alteram marginem utrinque plicaturâ arcuatâ notato. In Brasiliâ (Sellow! in h. reg. Berol. n. 91). Quod ad bracteolas accedit ad M. puberula Mart., sed differt foliis minoribus, basi nunquam acute in petiolum desinentibus sed semper rotundatis atque subinde subcordatis (quintupli-septuplinervibus, longe et argute cuspidato-acuminatis supra asperis et pilis brevibus hirtis, subtus præsertim in costis petiolisque hirsutis) et bracteolis brevioribus. Pedunculi uniflori oppositi alterni solitarii, folio breviores. Bracteolæ fructu paulo breviores, obtusæ cum mucronulo exiguo setaceo. Corolla deest. Drupa unguicularis, nucleus Pruni domestici paulo brevorem et obovatum refert. (v. s.)
15. M. PERROTTETIANA, hirsuta, foliis ovalibus longe arguteque cuspidatis basi acutâ in petiolum decurrentibus, bracteolis brevi-ovalibus setaceo-mucronatis pedunculisque hirsutissimis, corollâ infundibuliformi, fructu ovali lenticulari-compresso marginibus rectis acutis, ad alterum marginem utrinque plicaturâ notato. Ad Cayenne (Perrottet! in h. DC.). A M. Sellowianâ facile distinguitur foliis in petiolum decurrentibus nec basi obtusis et bracteolis magis ovalibus. Planta undique pilis molliusculis patentibus flavicantibus, in pedunculis bracteolisque densissime confertis vestita. Folia mollia. Pedunculi sæpe gemini. (v. s.)
16. M. PUBERULA (Mart. nov. gen. et spec. 3. p. 24. n. 3. t. 211. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 10), pubescens, pubescenti-hirtula, vel villoso-tomentosa, foliis lato-ovalibus ovaliæ-oblongis acutis, basi acutis, passim et obtusis, bracteolis ovatis mucronatis concavis hirsutissimis, corollâ campanulato-tubulosa limbo latiusculo. In silvis primævis prope S. Crucis oppidum et alibi in montibus Serra dos Orgãos dietis, provinciæ Sebastianopolitanæ, ac similibus locis prope urbem Para Brasilie, florens et fructifera lecta mensibus nov., dec., jan. (Martius, Gardner! u. 597. in h. Benth. et Hook.), prope Llorena et Tejucu in provinciâ Minarum Generalium (Riedel! in h. acad. petrop. n. 1454 et 1221, Claussen! in h. Hook.), Rio grande de St. Paulo, Julio (h. Mart.! n. 384), in stagnis d'Olhor d'Agua provinciæ Bahiensis (Blanchet! in h. reg. berol. n. 3107 et in h. Hook.), Savanna in Guianâ Anglicâ, Febr. (R. Schomburgk! in h. gen. berol. n. 439). M. pubescens Poepp. et Endl. nov. gen. 3. p. 11. n. 7. M. albida Vell. fl. flum. 5. t. 85. Bracteolæ latiores et breviores quam in reliquis. Pedunculi vel solitarii vel gemini ternive, fasciculati, oppositi. Corolla brevior, alba, annulo vel circulo macularum corulearum circa fauces. (v. s.)
- sp. micropus* (Mart. l. c. Poepp. et Endl. l. c.), In silvis Amazonicis circum Egam, novembri (Poeppig!), in provincia Ecuador (Sinclair! in it. nav. Sulphur h. Benth.) et in promontorio Lalango Columbiæ (ibid!), in bambusetis ad Esequie Columbiæ reg. temper. Februario in Aprilē (Moritz! n. 1484 in h. gen. berol.), in ripâ fluvii Pomeroon Guianæ Aulicæ, Septembri (Schomburgk! in h. Nees. n. 125. 5., in h. gen. berol. n. 1446.)
- Adnot.* Specimina Schomburgkiana gaudent bracteolis apice in mucronem longiore magis coangustatis, in rel. autem congruent, præsertim quod ad corollam attinet. Fructus parvus, lenticularis, marginibus acutis, altero margine utrinque plicâ acuto, ut in M. Perrottetiâ, sed duplo fere minor est, quam hujus sp. fructus.

17. *M. SPECIOSA*, laxe hirsuta, foliis ovalibus brevi-cuspidatis longe petiolatis supra strigoso-asperis. bracteolis in tubum conniventibus ovalibus obtusissimis entm in cruce concavis pubescentibus, corolla ex infundibuliformi campanulata limbo ampio. ♂ ( ) Atangues in Peruvia (h. Hook.!). Calyx 1  $\frac{1}{4}$  poll., videtur tubulosus ore bilabisto. Corolla 2  $\frac{1}{2}$  poll. longa. Capsula obconica, an- ceps lateribus gibbis. Folia cum petiolo plus quam bipinnacari 8 poll. longa, 3-3  $\frac{1}{4}$  poll. lata. Pedunculi solitarii, 1-1  $\frac{1}{4}$  poll. longi. ( v. s. )

*Species dubia.*

18. *M. RACEMOSA* (R. et Pav. fl. peruv. p. 158, Pers. synops. 2. p. 175), scandens, floribus racemosis. ♂ ( ) in Peruvia nemoribus.

- II. *THUNBERGIA* Linn. f. suppl. p. 292, gen. ed. Schreb. p. 426. N. ab E. in Wall. pl. as. var. 3 p. 77, et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. 697. Meissn. gen. p. 293 (202).—Flemingia sp. Hamilt. Harvey gen. of south afric. pl. p. 276.

Calyx brevis cupuliformis, truncatus vel pluridentatus, dentibus tum pluribus quam decem. Bracteole dñe ad basin calycis, calyce majores floremque ante anthesin valvatum tegentes. Corolla campanulato-infundibuliformis, fauce inflata, limbo quinquefido patente subæquali. Stamina quatuor didynama. Antheræ erectæ, adnatæ, loculis parallelis margine ciliato-barbatis, altero basi paulo breviori ibidemque in calcar aristæ-forme producto. Stigma infundibuliforme, transversim emarginatum, subbilabiatum. Annulus nectariferus crassus, lobatus, ovarium cingens. Capsula ad basin globosa, bilocellata, di-tctrasperma, superiora versus rostrato-attenuata, depressa, commissura planâ contigua. Dissepimentum membranaceum, in centro cohærens, a valvis soluble. Retinacula nulla, quorum loco annulus cartilagineus basin seminum cingens, qui ex ambitu funiculi umbilicalis oritur. Semina globosa, basi callosa, perforata, funiculo umbilicali per foramen intrante. Cavum interius a parte bini convexum, post solutam partem callosam et fere osseam retinaculi vices gerentem extrinsecus marginatum. Membrana tenuis foraminis umbilicalis fundum investit. — Fructus vel herbae scandentes, pleræque Indiæ orientali insulisque Indiæ orientalis, aliae Africæ australi insulisque Mascarenis indigenæ. Folia plerisque angulata, sœpe, sicuti et bracteole hirta. Flores axillares pedunculati, solitarii, vel in racemum dispositi. Corollæ speciosæ, luteæ vel cœruleæ, fauce plerumque saturatori.

\* *Calycis limbus truncatus.*

1. *T. GRANDIFLORA* (Roxb. fl. ind. 3 p. 34, pl. corom. t. 67), scandens, foliis cordatis angulatis acuminatis hispidis, calycis limbo truncato integerrimo. ♂ ( ) Ad Madras (h. Hook.!), Assam (ibid.); in Tranquebariâ, Sillet (Guil. Gomez), montibus Hindustaniæ (h. Madr.!. h. Wight !).—Spr. syst. 2 p. 828 Link en. bort. reg. ber. 2 p. 132 n. 1493.—Bot. reg. t. 493. Wall. cat. n. 768 a, fol. 83 e, f, h (in scheis 2518 a, d, e, f, g, (c err.), h (d errore) (ad. 96) et 110. Wight. b. propr. n. 1923. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77. Flemingia grandiflora Rottler et Willd. in nov. act. nat. cur. 4, 1803. Tbnnergia et Flemingia grandiflora et Flemingia racemosa h. madr. Wall. cat. n. 766, e. Tota planta pilis parvis reversis in foliis incumbentibus scabra. Pedunculi axillares, solitarii, angulati, petiolo longiores, uniflori, vel elongati, semipedales et racemosi. Flos vix 1  $\frac{1}{2}$  polices altus, limbo 3 poll. lato, cœruleus. Calyx brevissimus, strigulosus. Bracteole oblongo-lanceolatæ, acuminatæ, pollicares et longiores. Capsula sublignosa, nigro-fusca, scabriuscula, 1  $\frac{1}{4}$  poll. longa. ( v. s. )

♂ *racemosa*, racemo terminali (h. Hamilt. Wall. cat. fol. 83. n. 768. g.)

Ad Katchulpur, Gualpara et Kuvarikot (Hamilt.)

- $\beta^*$ . *malyfolia*, foliis cordato-orbiculatis, grosse angulato-lobatis apice minus producto, floribus majoribus racemosis. Thunbergia malyfolia h. Hamilt. Wall. cat. fol. 83. n. 768 h.
- $\beta^{**}$ . *cuspidata*, foliis in acumen triangulare integerrimum productis basi angulatis minus hirsutis scaberrinis, floribus minoribus. — Hort. bot. calc., in Bengaliâ (Lechenault! in h. DC.), Macao (Callery! in h. mus. par. n. 83. h. Nees.) Thunbergia grandiflora Wall. in schedis n. 2518, nullâ additâ litterâ, ex h. calc. 2518 h, idem, qui numerus Thunbergiæ malvifoliae Hamilt. respondens, a litterâ e fol. 83 nunquam progediens in schedulis n. 2518 exprimitur; an Thunbergia malvifolia h. calc.? Th. grandiflora (h. DC.! n. 666.)
- $\gamma$ . *palmifolia*, foliis palmato-quinque-lobis lacinias acutissimis, floribus magnis solitariis axillaris. — In Dongtalâ (Hamilt.) Th. grandiflora h. Hamilt.! Wall. cat. fol. 83. n. 768 g (in schedis 2518 c.)
2. T. CHRYSOPS (Hook. bot. mag. 1844. t. 4119, Morr. ann. Gand 1845 p. 28), foliis cordatis angulatis, petiolo nudo, pedunculis axillaribus brevibus unifloris, calyce truncato, bracteis ovatis ciliatis, antheris sagittatis basi glandulosis glandulis pedicellatis, stigmate foliaceo bilobo, style apice barbato. (I) ( ) In Sierra Leone (Whitfield in hort. com. Derby et in hort. Kew. et Hamb.!) Caulis gracilis, herbaceus, puberulus. Folia cordata, infra medium plerumque angulato-bi-tridentata, obtusiuscula cum mucrone, pubescens-scabriuscula. Pedunculi solitarii, petiolo breviores. Bracteæ late ovatæ. Calyx subcarnosus, margine subrepandus. Corolla campanulato-infundibuliformis, tubo flavo basi valde contracto faucibus sensim expansis superiora versus cum limbo expenso lâte purpureis, ore saturate flavo annulo ceruleo cincto. Stigmatis lobi lati, plicati, flavi. (v. s.)
3. T. CORDIFOLIA, scandens, hirsuta, foliis profunde cordatis acuminatis integerrimis, calycis limbo repando-lobato, floribus axillaribus terminalibus que racemosis. ( ) ( ) Assam (h. Hook.!). Folia ampla, majora quam in Th. grandiflorâ breviori petiolo. Corolla grandis ut in illâ. Inflorescentia var.  $\beta$ . Tb. grandifloræ v. multifloræ. An hujus var.? (v. s.)
- \*\* *Calycis limbus pluridentatus*.
4. T. ANNUA (Hochst. in Kotsch. it. nubic. n. 109), caule erecto apicem versus involuerisque hirsutis, foliis lanceolatis obtusis glabris inæqualiter repando-dentatis, floribus oppositis brevipedunculatis. ( ) Ad montem Cordofanum Arasch-Cool in marginibus stagnorum pluvialium, Oct. 1839 (Kotschy), ibidem (Kotschy! n. 97 in h. Hook.) Caulis pedalis, simplex. Folia 2 poll. longa,  $\frac{1}{2}$  poll. lata, subsessilia, repando-dentata, dentibus obtusis, duobus inferioribus majoribus. Pedunculi axillares, solitarii, oppositi, erecti, 3-4 lin. longi. Bracteæ ovatæ, obtuse, ventricosæ, hirsutæ. Calyx 12-13-dentatus. Capsula globosa, rostrata, adpresso-pubescentia. Semina subglobosa, umbilicata, nigro-fusca. (v. s.)
5. T. CAPENSIS (Thunb. prodr. fl. cap. p. 106, fl. cap. 2 p. 488), caule procumbente foliisque subtordidis subdentatis obtusis brevissime petiolatis hirsutis, corollâ tubuloso-campanulatâ. (I) ( ) In collibus graminosis promont. Bon. Sp. (Thunb.! in h. Schreb., Ecklon, Drège!), terra Caffrorum (Gill.! in h. Hook.) — Bot. cab. t. 1529. Thunbergia humilis Eckl. et Z. ind. sem. fl. cap. (v. s.)
- $\beta$ . *grandiflora*, flore pollicari limbo latiore lâte ceruleo, bracteolis oblongis apice minus attenuatis minusque hirsutis. Th. Capensis h. Drég.! An distincta spec.?
6. T. CYANEA (Bojer! in h. DC. n. 108, et Lyell! in h. Hook.), caule procumbente foliisque ovato-subtordidis subcordatis integerrimis obtusis brevi-petiolatis hirsutis, corollâ infundibuliformi fancibus inflatis. ( ) ( ) In summis montibus provinciæ Emir Modag insule Madagascar inter gramina. A Th. Capensi differt caule tenuiore, foliis minoribus tenuioribus magis ovatis sub-

cordatisve, subtripli-neo trinervibus, imprimis autem corollæ unjore, evidenter infundibuliformi pulchre cyaneo tubo albo. ( v. s. )

7. T. ATRIPLICIFOLIA (E. Mey. ! in h. Drèg.), caule procumbente hirsuto, foliis sessilibus integerrimis subdentatisve trinervibus hispidis hirsuto-ciliatis, inferioribus ovatis obtusis cum mucronulo, superioribus oblongis acutisculis, corolla infundibuliformi tubo angusto brevi limbo patente. ♂ In prom. Bon. Speci (Drége!), Port Natal (Krauss ! n. 405 in h. Hook.) Affinis Th. Capensis, differt autem jam solâ corollæ structurâ. Pedunculi hirsuti, longitudo folii. ( v. s. )
8. T. ASPERA, caule procumbente strigoso-hirsuto, foliis sessilibus hastatis basi truncatis oblongis acutis subdenticulatis utrinque asperis pilisque raris coupersis, corollâ infundibuliformi. ♀ In terrâ Caffrorum prom. B. Sp. (Gill. in h. Hook.!) Th. Capensis var. h. Hook. l. c. Asperitate et figurâ foliorum, quæ basi truncata et utrinque dente grosso patente prædicta, hinc apicem versus leniter attenuata, utrinque tuberculata et imprimis circa margines setulis parvis strigosa sunt, satis distincta a Th. atriplicifolia; pedunculo folia subarquante et foliorum figurâ a Th. annuâ differt, a Th. Dregeana, cui foliorum asperitate congruit, recedit foliis angustioribus vix petiolo brevissimo præditis. ( v. s. )
9. T. LEVIS (Wall. Wight h. prop. n. 1924, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77), scandens, foliis hastato-scutatis subangulatis obtusis glabris, calyce 12-dentato. — In montibus provinæ Dindigul, alt. ped. 1000 (Wight!) Caulis ex opposito sulcatus, ad sulci margines hinc inde tuberculis exasperatus, glaber. Folia glabra, 3  $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, ad basin 2 fere poll. lata, angulato-hastata, obiter obtuseque repando-angulata, obtusa cum muerone, glabra, venosa, punctata; nonnulla minorâ, integrâ, Convolvuli arvensis similiter. Bracteolea ovatæ, 4-5 lin. longæ, pubescenti-hirtæ. Calyx ad medium usque duodecimdentatus dentibus subulatis, nonnullis basi conjunctis. Corolla  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, pubescens, lutea ? ( v. s. )
10. T. JAVANICA (Gaertn. fil. fruct. 3 p. 22, t. 183), scandens, foliis ovalibus oblongis subcordatis lobis rotundatis integerrimis pubescenti-scabris, calyce decempido limbo corollæ tubo breviori. ♀ In Javæ insulæ fruticetis et inter segetes frequens (Blume, Junguhluh, Zollinger pl. jav. n. 893 in h. DC. n. 814) et in Philippinis.—Blume Bijdr. p. 806. Hassk. cat. alt. h. bogor. p. 147. Th. subagittata Blanco fl. de Fl. p. 518. Primo adspectu Th. fragrantis varietatem censores, præsentim propter pubescenciam indolem simillimam. Differt autem evidenter: petiolis brevioribus, foliis basi nunquam hastato-angulatis sed modico sinu lohisque rotundatis cordatis, inferioribus ovatis aut ovalibus obtusisculis cum mucronulo, superioribus cordato-lanceolatis magisque acutatis, pedunculis brevioribus, bracteis ovali-oblongis minoribus, calycis dentibus paucioribus latioribus, corollæ tubo incurvo semipollicari, limbo quadrilineari. Corollæ color lutescens. ( v. s. )
11. T. HASTATA (Decne. h. timor. in nouv. ann. du mus. 3 p. 388), scandens, glaberrima, foliis subhastatis ovato-lanceolatis argute acuminatis lævibus glaberrimis lobis baseos subangulatis mucronatis, calyce 12-fido, bracteis oblongo-lanceolatis acuminatis corollæ tubo æqualibus. ♂ In insula Timor (Decaisne! iu h. mus. paris. n. 79. h. Nees. et 1856 in h. Benth.) Glabritie et foliis magis acuminatis differt a varietatibus glabrescentibus Th. fragrantis, foliorum lobis basilaribus mucronulatis a Th. Javanica. Folia inferiora subinde scutata. ( v. s. )
12. T. ANGSTIFOLIA (Ham. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3. p. 78). scandens, foliis cordato-lanceolatis sinuolatis antherisque glabris, calyce 12-fido. — Ad Jorogivari (h. Hamilt.!) Th. fragrans Wall. cat. fol. 83. n. 767 h., (in schedis 2519 d. ) Foliis internodis plus duplo breviora, opposita, cum pe. iolo angusto planiusculo 3 poll. longa, dimidio pollicis vix latiora, subcordata. lanceolata, acuminata, tenuia, margine sinulis distantibus remote et grosse

crenata undataque, trinervia, remote venoso-penninervia, glabra, supra tuberculis minimis sparsis asperula. Bracteola  $\frac{1}{2}$  poll. longæ, ovata, acutæ, venulosæ, extus et in margine sparsim pubescenti-scabré. Calyx ad medium 12-fidus, lacinias subulatis glabris asperulis. Corolla pollicaris, glabriuscula; tubus angustus, semipollucaris; faux dilatata; limbi laciniae quinque obovatae. Color corolla luteus?. Anthera violacea limbo pallido. Capsula glabra, basi depresso-globosa, tetrasperma, rostro conico obtuso, parte gibosa duplo longiore pallidiore. (v. s.)

13. T. FRAGRANS (Roxb. flor. ind. 3 p. 33, pl. corom. 1 p. 47 t. 67), scandens, foliis oblongis acutis cordatis basi angulato-subhastatis obtusisive confertissime pubescenti-vel muriculato-scabris, calyce 12-fido, corollæ limbo tubum sequante aut isto longiori. ♂ In fruticetis ad fluviorum ripas prope Samutocah (Roxburgh!), ad ripas fluviorum in nemorosis provinciarum Cirears, Tangore, Madure, Madras, etc. frequens (Wight!)—Willd. sp. pl. 3 p. 388. Pers. synops. 2, p. 179. Spr. syst. 2, p. 828. Willd. enum. hort. berol. 2 p. 659. Link. en. 2, p. 132. Wall. cat. n. 767. Wight h. prop. n. 1925. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77 et 78. Tota planta setulis exiguis rigidulis scabra. Folia diversiformia, 3  $\frac{1}{2}$ -3  $\frac{3}{4}$  poll. longa, 1  $\frac{1}{4}$ -1  $\frac{3}{4}$  lata, hinc modo elliptico-oblonga, modo (in var. 2) oblongo-lanceolata, basi cordata, vel etiam subtruncata, in aliis dente singulo vel binis acutis utrinque circa basin praedita, in aliis (var. 3), iisque angustioribus, basi magis rotundata vel leviter hastata, ambitu repanda; omnia autem acuta, 3-5-nervato-venosa. Bracteola ovata vel ovato-oblongæ, acutæ, pubescenti-scabré, canescentes. Calyx stellato-12-fidus. Corolla pollicaris, pallide lutea, fundo purpureo. Capsula  $\frac{3}{4}$  poll. longa, scabra, basi depresso-globosa, fusca, chartacea, rostro duplo longiore depresso griseo. (v. s.)
- α. foliis latioribus, basi utrinque acute bidentatis vel etiam hastatis. In Travancore (h. Madr.! h. DC.! n. 152 et h. Hooker!), Madras (Shute! in h. Hooker), Ceylan (Walker! in h. Hooker), in insulâ Timor (h. DC.! ex mus. paris. n. 667 et 668.) Th. fragrans Wall. cat. fol. 83 n. 767 e ex. h. Madr.! (2519 in schedula) 767 g in h. Hamilt. ex hort. bot. calc. 767 h (maximam partem), 267 k ex hort. bot. calc. (ad partem), h. Wight! n. 1925 Sieb. fl. mart. suppl. n. 11 in h. DC.! n. 149. Th. scandens Pers. encl. 2 p. 179 (forma foliis minus dentatis.) Th. cordata Coll. h. ripul. 139 t. 21.
- β. foliis angustioribus obsolete repandis subhastatis. In Hindustaniâ Wall. l. c. n. 767 a (h. DC.! n. 664), in Manillâ (var. foliis fere lanceolatis basi hastatis aut utrinque bidentatis) (Meyen!) Th. fragrans h. Schreb. Wall. cat. n. 767 a, (2519 a in schedis, g ex parte (in h. Hooker.), 767 k ex hort. bot. calc. (ex parte.)
- ? β\*. truncata, foliis oblongis integerim basi truncatis. In Philippinis (Cuming! n. 1287 in h. Hooker.)
- γ. foliis cordato-lanceolatis vel ovato-oblongis, subintegerim basi truncatis (N. ab E. l. c.) — In Hindustaniâ (h. Wall!), Mergui (Griffith! in h. Hooker.), insulâ Guadalupâ culta? (Balbis! in h. DC. n. 669, h. mus. paris. in h. Nees. n. 286), insulâ St.-Thomæ (h. berol!) Th. fragrans Wall. cat. n. 767 c et fol. 83 (in schedis, nec in cat.), ex hort. bot. calc. in h. Hamilt. l. DC.! n. 665. ? Th. flava (en. pl. hort. Hoffmannsegg 1841. p. 81, flor. 16 littbl. p. 273), bracteolis tubum corolla æquantibus, corolla cum tubo flava fundo fauaciaco. An species distincta?
- γ\*. glabrescens, solis costis foliorum scabris, venis hinc inde tuberculatis, aliis margine apiceque setulis raris adpersis. — India orientalis (Jaquemont in h. mus. paris. n. 188). Ambigit hæc forma inter Th. fragrantem et hastatam, sed illi tamen magis accedit. Folia basi iu aliis fere truncata, in aliis profunde sagittata.
- δ. restita, foliis ut in var. α, vel subintegerim basi truncatis, cauleque dense villoso-scribosis velutino-mollibus. — In Nelgherries (Adam! in h. Hooker.) Roxburglia

- rostrata h. Russell! Th. fragrans Wall. cat. fol. 83. n. 767 k (ex parte) 767 f. 2519 f in h. berol.! et Hooker.!)
14. T. DREGEANA N. ab E. in h. Eckl. et Drèg.), volubilis, pubescens, foliis cordato-hastatis triangularibus acutis angulato-dentatis hirtis, petiolis exalatis folium subæquantibus, pedunculis folio longioribus, calycibus 12-14-fidis, bracteolis integerrimis. ♂ (?) In promont. B. Spei inter frutices circum Ennon ad flumen Sontagsrivier (Uitenhage) Novembri cum fruct., inter arbores et frutices ad flumen Katrivier prope Castellum Beaufort, in terrâ Caffrorum), Julio deflorata tum ad Philippstowu in silvis montanis circa fontes Katrivier fluminis in ceded Territory Junio cum fruct. mat. (Drèg., Burchell). Th. fragrans h. Drèg.! Eckl. n. 38. b. in h berol. Similis maxime Th. alatae Hook., a qua differt imprimis: petiolis angustis nec alatis, pubescencia sparsa rigidula nec sericante, foliorum sinn baseos latiori, angulis laterum magis patentibus, capsulis glabris. (v. s.)
15. T. ALATA (Bojer, Hook. exot. fl. t. 17), volubilis, villosa-sericea, foliis cordato-sagittatis acutis alate petiolatis, calyce 1-2-fido, bracteolis repandis. ♂ (?) In Africâ orientali 5-6 lat. austr. (Hooker), serpens in pratis humidis insularum Zanzibar et Tombæ in orâ orientali Afrieæ (Bojer! in h. DC. n. 107 et in h. Hooker!), Assam (n. 1332. in h. Hook.!) — Spr. cur. post. ad syst. p. 237, Sims bot. mag. t. 2591, Wall. cat. n. 7141, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 78. Tota villosa-mollis, canescens, caule subherbaceo. Folia repanda, acuta, quintuplinervia, sinus latiusculo, lobis divergentibus acutis vel mucronatis. Bracteolæ ovatae, acutæ, repandæ, quinquenerves. Calyx hrevis, ultra medium 12-fidus. Corolla 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, tubo curvo, limbo campanulato, lutea, fundo purpureo. Antheræ basin versus longe ciliatobarbatæ, non mucronatæ; loculi subæquales, singuli basi calcarati. Stylus apendice dimidiato-infundibuliformi infra stigma, quasi stigmate prolifer. Stigma infundibuliforme, truncatum, integrimum, ciliatum. Capsula globosa, hirta, fusca, rostro longo angusto tetragono. (v. s.)
- $\beta$ . aurantiaca, flore intensius luteo. — Jacq. in ann. fl. et pom. 1840-41 p. 190. c. ic.
- $\gamma$ . alba, flore albo. — Bot. mag. t. 3512.
16. T. RETICULATA (Hochst. in Schimp. it. abyss. n. 758), volubilis, caule glabro, foliis cordato-sagittatis acuminate alate petiolatis integerrimis supra laxe strigoso-hirtis subtus in costis scabris, calyce 12-fido, bracteolis inflatis reticulatis basi quadrangulis. ♂ (?) Loci graminosis inter fruticetæ prope Gapidiam in Abyssinâ, Augusto (Schimper! l. c. in h. Hook.) Folia sunt Th. angulatae, petioli Th. alatae. Bracteolæ autem distinctæ, majores quam in illâ, glabrae, pulchre reticulatae basi in dentes 4 obtusos complicatae. (v. s.)
17. T. ROXBURGHIA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 78), scandens, hirsuta, foliis cordato-hastatis basi angulatis repandis dentatis, calyce ad medium usque 12-15-fido. — In Indiâ. Similis est quod ad hirsutiem et foliorum formam Th. tomentosæ, sed differt evidentissime: pedunonis tenuioribus, calyce ad medium usque 12-15-fido lacinias linearis-subulatis obtusiusculis glabris et scabriusculis, neque ad basin usque multiseto, setis subulatis elongatis ciliatis, bracteolis etiam brevioribus ovatis, nec oblongis pollicaribus. Capsula glabra, rostro crasso pyramidali obtuso. (v. s.)
- $\alpha$ . foliis hastato-oblongis ambitu leviter repandis. ♂ (?) In Indiâ orientali (h. Russell!) Th. fragrans Wall. cat. fol. 83. n. 767 f. (in schedis 2509 f.) Roxburghia rostrata h. Russell.
- $\beta$ . foliis cordatis ambitu infero grosse dentato. Ad Netti vatan in Nilgherris (Schmidt) Coonoor (Cunoor) (Perrottet! in h. mus. paris. n. 136 h. Nees.
18. T. TOMENTOSA Wall. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 78. Wight h. propr. n. 1926. scandens hirsuta, foliis cordato-vel triangulare-hastatis acutis, calyce multiseto. ♂ (?) In peninsula Indiæ. Folia (in var.  $\alpha$ ) 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa,  $\frac{1}{2}$  poll.

lata, inferiora longius petiolata, superiora brevipetiolata, acuta, cordata, lobis truncatis, denticuloque parvo acuto patente præditis, hinc subhastata, reliquo ambitu repanda et undata, trinervato-venosa; in var.  $\beta$  majora latioraque, scutiformia, subintegerrima; in var.  $\gamma$  1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, ovata. Bracteolæ pollicares, ovatae vel ovato-oblongæ, acutes, hirsutes, ciliatæ septemnervi-venosæ. Calyx solitus in lacinias 28-30, setaceas, hirsutus, subinæquales, quarum aliae ad basin discretæ aliae inter se altius connexæ, vel basi lacinulæ breviori præditæ sunt. Corolla purpleæ? tubus longus, bracteolas æquans, limbus latus, diâmetro 1  $\frac{1}{2}$ -1  $\frac{1}{2}$  pollis, laciinis obovatis obtusis. Faux tubi brevis, villis clausa. Capsula pollicem longa, basi depresso-globosa, dense pubescenti-tomentosa, rostro conico longo. ( v. s. )

$\alpha$ . foliis profunde cordato-hastatis. — E Nilgherry montosis (Wight!).

$\beta$ . foliis triangulari-hastatis basi subtruncatis scutiformibus, saepè crenatis. Th. fragrans Wall. cat. fol. 83. n. 767 i, k ad partem.

$\gamma$ . foliis ovatis integerrimis vel crenatis. Th. fragrans Wall. cat. l. c.

19. T. ANGULATA (Hils. et Bojer in Hook. exot. fl. t. 166 et 177 f. 3 4 5, scandens, pubescens-scabra, foliis cordato-sagittatis acuminatis longe petiolatis, calyce 12-partito brevi, laciinis linearibus.  $\delta$ ) In provinciâ Emirnâ insulæ Madagascar interioris prope Tananarivo (Bojer in h. DC! n. 35 et 109. Bojer et Lyell! in h. Hook. specimen caule glabro), in prom. Bon. Spei. (Drège.) — Spr. cur. post. in syst. p. 237. n. 6, Wall. cat. n. 770 in schediis 2515, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3. p. 78. Th. fragrans Drège! in h. reg. ber. Folia demotepetilo 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa,  $\frac{1}{2}$  poll. lata, sinu profundo cordata, laciinis truncatis submucronatis, longe acuminata, subrepanda et basin versus saepè repando-angulata. Bracteolæ ovatae, acuminatae, nervoso-venosæ, ciliatæ. Calyx virginalis, longus, ad basin in lacinulas duodecim lineares angustæ obtusas scabros fissus, interjectæ quandoque unâ vel alterâ membranaceâ. Corolla pollicaris, lutea, fauce violacea, tubo brevissimo, limbo campanulato-infundibuliformi laciinis rotundatis. Capsula globosa, fusca, circiter  $\frac{3}{4}$  poll. longa. Semina muricato-echinata. ( v. s. )

#### Species dubia.

20. T. VOLUBILIS (Pers. synops. 2 p. 179), foliis ovatis acutis obsoleto dentatis, floribus axillaribus longè pedunculatis, caule volubili. In Indiâ (h. Juss.) Var. Th. fragrantis?

- ? 21. T. AURANTIACA (Jacq. in ann. fl. et pomon. 1840-41. p. 190. c. ic. En. pl. hort. Hoffmannsegg suppl. p. 26. Flora 1842. Litbl. p. 280) conf. Th. alata n. 15.

#### Species mihi nomine solum notæ.

T. CORDATA Colla.

T. LEUCANTHA hort. Steud.

T. SALTIANA Steud. — Thunbergia angulata R. Brown in Salt voy. app. ed. N. ab E. l p. 249 (nec Hooker.)

#### Species exclusæ.

T. CAPENSIS Mont. — Gardenia Thunbergia.

T. COCCINEA Roxb. Wall. — Hexacentris coccinea.

T. CÆRULEA Wight — Meyenia Hawtayneana.

T. CORDIFOLIA herb. Madr. — Meyenia Hawtayneana.

T. DIPLOCALYMPNA Steud. — Diplocalymna volubilis Spr. syst. l. p. 586. DC. prodr. 9. p. 462.

T. HAWTAYNEANA Wall. — Meyenia Hawtayneana.

T. QUINQUENERVIS Hamilt. — Hexacentris dentata.

*T. REPENS* Pers. synops. 2 p. 179. — *Herpestis Monnieria*, prodr. N p. 400.

*T. STOLONIFERA* (Blanco fl. de Filip. p. 517) est generis incerti.

III. *MEYENIA* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 78 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285 Endl. gen. p. 697. Meissn. gen. p. 293 (202). — *Thunbergia* spec. *Wall. fl. nepal.* p. 49 et in pl. as. rar. 2 p. 52 t. 164.

Calyx parvus, quinquelobus, bracteolis duabus magnis inclusis. Corolla infundibuliformis, fauce sensim ampliata, tubo brevissimo intus annulo piloso clauso, limbo subæquali. Stamina quatuor, didynama; antheræ apice barbatæ, biloculares, superiorum loculis inæqualibus, altero magis supero divergente latere tomentoso, inferiorum parallelis subæqualibus basi muticis. Stigma membranaceo-dilatatum, bilabiatum, labiis bilobis. Capsula e basi tumidula conico-attenuata, ad basin bilocularis, tetrasperma, dissepimentum persistente valvis adnato ad axin lignoso dissolubili. Semina (immatura) strophiolâ cupulæformi solibili spongiosa suffulta. — Planta Indica. Caulis scandens. Folia opposita, integerrima. Flores axillares, pedunculati.

M. *HAWTAYNIANA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 78) scandens, foliis subsessilibus cordatis aentis. In umbrosis districtus Nilgherry (Wight), ex hort. b. calc. (Wall.), e Nilgherry (Hawtayne h. madr., Perrotet! in H. DC. n. 226.) Floret in hort. b. calc. tempore frigido (Martio). — Wight cat. n. 1927. *Thunbergia Hawtayniæ* Wall. tent. fl. nep. 1. t. 49, pl. as. rar. 2 p. 52 t. 164, cat. n. 769 a b fol. 83 c (in schedis n. 2516 a, b, c). *Thunbergia cordifolia* et erecta h. madr.! Wall. cat. fol. 83 n. 769 c. *Thunbergia cœrulea* h. Wight! Folia opposita, 2-2½ poll. longa, 1½-1¾ poll. lata, cordato-ovata, acuta, integerrima, glabra, subtus ad nervos hinc inde strigosula, rigidula, nitida, juxta basin quintuplinervia, venoso-reticulata. Bracteolæ æquales, pollicares, subcordatae, ovato-oblongæ, acutæ, septem-nervio-venosæ, ad nervos et margines securæ. Calyx brevissimus, glaber, obtuse quinquelobus. Corolla pollicie paulo longior, cœrulea, quinque nervis, extus ad nervos setulis hirta; tubus lineam longus, cylindricus; ubi tubus desinit intus annulus e setis confertis articulatis flavicantibus; faux anguste campanulata in limbum subæqualem quinquefidum patentem abit; lacinia obovatae, obtuse. Capsula pollicaris, e basi ventricosa sensim conico-attenuata, compressiuscula, glabra, rimuloso-striata, fusca, rigida, sublignea, in duas valvas dehiscentes. Dissepimentum persistens, circa axin crassius, lignescens, bilabiatum. Retiuacula? cupuliformia. v. s.)

IV. *PENACENTRIS* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 74 et 78. Lindl. intr. p. 285. Endl. gen. p. 697. Meissn. gen. p. 293 (202). — *Thunbergia* spec. Hook. exot. fl. t. 195. — *Flemingia* spec. Hamilt. in schedis.

Calyx pateræformis, parvus, limbo inæqualiter dentato repandove. Bractææ duæ, altero latere connatae, altero dehiscentes, valvatae, calycem tegentes. Corolla infundibuliformi-campanulata, tubo brevissimo, limbo subæquali oblique quinquefido. Stamina tubi faucibus annulo barbato limbatis inserta. Antheræ erectæ, biloculares, glabrae, loculis parallelis contiguis, superiorum staminum uno basi longissime calcarato, altero brevi-mucronulato, inferiorum utroque loculo longissime calcarato, calcariis flexuosis. Rudimentum staminis quinti sterilis breve, subulatum. Stigma bifurcum, laciñis truncatis complicate-canaliculatis basi angustioribus. Capsula bilocularis, tetrasperma, rostrata. Semina cristata. Dissepimentum a valvis solubile, integrum, ad axin bipartibile. — Fructus Indici, scandentes, foliis dentatis nervosis glabris. Racemii axillares

et terminales, multiflori, bracteis communibus parvis, floribus oppositis solitariis vel fasciculatis, bracteolis caducis. Corolla purpurea.

1. *H. COCCinea* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 78), foliis cordatis sagittato-cordatis obovatis repando-dentatis bracteolis ovatis. ♂ ♀ In Nepaliā (Hamilt., Wallich Don), in Punduā (M. R. S.), Ceylon (Macrae! n. 362 in h. Mart. et Benth.), Java? (Hasskarl), in hort. b. calc. (Wall. cat. fol. 83. n. 766 d.) e Nepaliā illata. (h. DC.!) n. 285. ex h. Moric., specimen Wallich.) Thunbergia coccinea Wall. tent. p. 49 et 58 t. 37. Hook. exot. fl. t. 195. Don. fl. nep. p. 120 n. 1. Graham in Ed. philos. journ. jan. 1826 p. 150, Lond. bot. cab. t. 1195. Spr. cur. post. in syst. p. 237. Wall. cat. n. 766 a, b et fol. 83 c, d (in schedis n. 2517 a-e). Thunbergia pendula Hassk. catal. alt. hort. bogor. p. 147. Flemmingia coccinea Hamilt. mspt. Folia cum petiolo 2½-3 pollices longa, 1 ½ poll. lata, polymorpha, alia cordata, lobis rotundatis, alia subsagittata, lobis parvis obtusis, alia basi substruncata vel et anguste rotundata, cuspidato-acuta, pleraque magis minusve repando-dentata, quinquenervia, venoso-reticulata, glabra, summa minora, repanda vel integerrima, brevius petiolata. Racemi axillares 2-4 poll. longi, terminales longiores. Bracteæ opposite, 6-8-lineares, inferiores ovatae, cuspidato-mucronatae, 5-nerves, brevissime petiolatae, superiores denique oblongæ et lanceolatae, sessiles. Bracteolæ ovatae ovato-oblongæ, acutæ, a margine superiori ad medium usque connatæ, ab inferiori tote partibiles, unam bracteolam late ovalem ad medium bifidam fingentes, margine scabriæ, venoso-striatae, deciduae. Calyx brevissimus, patulus, 12-dentatus. Corolla coccinea, bracteolis paulo longior; tubus vix lineæ longior; faux cylindraceo-conica in limbuni mediocrem quinquefidum laciniis rotundata dilatata. Capsula rigida, pollice longior, fusca, glabra, striato-rimulosa. (v. v. c. et sicc. sp.)
2. *H. DENTATA* (N. ab E. l. c.), foliis ovatis basi truncatis grosse dentatis, bracteolis oblongis. ♂ ♀ In Siupur (Hamilt.), Assam (h. Hook.!) Thunbergia quinquenervis h. Hamilt.! Thunbergia coccinea Wall. cat. fol. 83 n. 766 c. (in schedis 2517 c.) Differt ab Hexacentri coccinea: foliis (7-8 pollices longis, 3 poll. lati) basi non cordatis sed obtusis, plerumque recte fere truncatis et inæqualibus, ambitu remote grosse dentatis, sinibus interjectis setis regularibus repando-crenatis, bracteis longioribus (10-11 linearum) et angustioribus, etiam a parte dehiscentiæ parvo spatio ad basin cohærentibus, calyce repando quinquelobu, rostro capsulae triplo longiore, quod illi vix duplo longius capsulâ. Reliqua congruunt. (v. s.)
3. *H. ACUMINATA* (N. ab E. l. c.), foliis ovato-oblongis acuminatis remote dentatis. ♂ ♀ In montibus Sillet (Guil. Gomez), Mergui (Griffith! in h. Hook.) Thunbergia coccinea? Wall. cat. n. 7140. Differt ab Hexacentri coccinea: foliis 5-8 poll. (cum petiolo ¾-1 ½ poll. longo glabro trigono) longis, 1 ½-2 poll. latis, longissime acuminatis, basi non cordatis sed obtusis, remote dentatis vel integerrimis, bracteolisque brevioribus latioribus magis ovatis. Reliqua cognitionem probant. Folia valde reticulata sunt et distincte quinque-nervia. (v. s.)

V *CLISTAX* Mart. nov. gen. et spec. 3 p. 26. Endl. gen. n. 4102 (gen. dub. Acanth.) — *Corythacanthus* N. ab E. in Lindl. introd. ed. 2 p. 444. Endl. gen. p. 788. Meisn. gen. p. 293 (202).

Calyx brevissimus, cupuliformis, truncatus, corollæ basi arte adpresus. Bracteolæ duæ, parumper a calyce distantes, calyce multo majores, flore ante anthesin valvatum tegentes. Corolla ringens, labio inferiori amplio trilobo. Stamina duo, antheris biloculatis, loculis parallelis basi sagittatis subæqualibus. Capsula ad basin tetrasperma. Semina compressa, retinaculis laticucullatis subtensa. — Pedunculi axillares, furcatis pauciflori, bracteis divisionum exiguis a flore distantibus. Habitus generis Mendonciæ, sed caulis minus scandens. Frutices Brasilenses.

1. *C. SPECIOSUS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 14), foliis ovato-oblongis subrepandis, bracteolis pubescenti-tomentosis. ♂ (In Serra d'Estrella Brasiliæ in umbrosis silvarum, Februario (Beyrich), Serra grande (Schott! in h. imp. viudob.), Justicia megaphylla Pohl! in h. imp. vindob. n. 4730. Caulis procumbens bifarium pilosus. Folia ovato-oblonga, subrepanda, glabra. Calyx semipollucaris, ferrugineo-tomentosus, labiis oblongis obtusis usque ad basin fere discretis. Corolla pollice longior, fauce ampla. Labium superius brevius iuferiori, ovatum, fornicateum, emarginatum. Stamina exserta, nec corollâ longiora. (v. s.)
2. *C. BRASILIENSIS* (Mart. nov. gen. et spec. 3 p. 26), foliis oblongo-lanceolatis oblongisve subrepandis, bracteolisque glabris. ♂ (Brasiliæ in silvis aboriginibus ad S. Joannis Baptiste præsidium contra Indos provinciam Minarum, Aprili (Martius!), Facenda do Maxacaxa, Maio (Sellow! in h. reg. berol. n. 90 et 215). Schott! in h. mus. vindob. n. 4750. Riedel! in h. acad. petrop. Differt a præcedente, præter characteres, bracteolis paulo brevioribus. Corolla extus pallide rosea; labium superius intus et palatum intense roseum, hoc lineis albis pictum. (v. s.)

Tribus II. *NELSONIEÆ* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 74 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 697. Meisn. gen. p. 293.

Retinacula in papillæ formam contracta, semina ferentia nec fulcipientia. Semina parva, scrobiculata.

#### CONSPECTUS GENERUM.

VI. *Elytraria*. — Scapi squamosi. — America septentrionalis et media, India orientalis, Guinea.

VII. *Nelsonia*. — Calyx quadripartitus, inaequalis, laciniâ superâ majori, inferâ bifidâ. Stamina duo. — America meridionalis, Africa et India orientalis tropica et subtropica, Nova Hollandia.

VIII. *Adenosma*. — Calyx quinquepartitus subæqualis vel laciniâ superâ majore. Corolla ringens. Stamina quatuor, didynama; authera-ruin loculi paralleli. — India orientalis, Africa tropica.

IX. *Ebermaiera*. — Calyx quinquepartitus, laciniâ superâ majore, mediis angustioribus. Corollæ limbus quinquefidus, subregularis. Stamina quatuor, antherarum loculis deorsum divergentibus. — America et Asia tropica.

X. *Erythracanthus*. — Calyx quinquepartitus, subæqualis. Corollæ limbus quinquefidus, regularis. Stamina quatuor, antherarum loculis deorsum divergentibus. — India orientalis tropica.

VI. *ELYTRARIA* Vahl en. 1 p. 106 (ex parte). N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 79. Lindl. intr. ed. 2 p. 285 Endl. gen. p. 697. Meisn. gen. p. 293 (202). — Justiciæ spec. Roxb. pl. corom. t. 127.

Calyx vel quinquepartitus laciniâ superâ latiori, binis inferioribus basi paulo altius connexis, vel quadripartitus laciniâ superâ inferâque latioribus. Corolla bilabiata vel ringens, labio inferiori trifido (laciniis bifidis). Stamina duo fertilia, duo sterilia, inclusa. Antherarum loculi paralleli. Capsulæ loculi a basi pleiospermi (octospermi). Retinacula nulla. — Herbae Africanae. Americanæ et Indicæ acaules. Folia radicalia integra,

dentata, vel repanda. Scapi vel pedunculi foliis parvis squamiformibus sæpe arcte adpressis quadrifariam tecti. Bractæ oppositæ, unifloræ; bracteolæ duæ angustiores. Flores parvi.

1. *E. CRENATA* (Vahl. en. 1 p. 106), acaulis, foliis obovato-oblongis crenatis subtus ad costas villosis.  $\mathcal{L}$  In Indiæ orientalis pascuis maxime sub umbrâ arborum (Roxb.), frequens in collibus provinciarum Circars, Madras, Gengee, Madura, etc. (Wight), Sirhind prope Rajpur in aridis (Edgeworth), in arenosis siccis circa Tirmicaret (Perrottet, in h. DC. n. 225), (Grandmaison! in eod h. 649 ex parte), in Ceylon (Macrae! in h. Mart. h. Hook n. 258.) Reem. et Sch. syst. 1 p. 139 n. 1, Mant. 1. p. 126. Spr. syst. 1 p. 77; Willd. spec. ed. 2, 1. p. 420, herb. n. 277. Wall. cat. n. 2420. Wight herb. prop. n. 1528. Herb. gen. ber. ex h. Wall. n. 2420 D et ex h. Lindl., N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 79. *Elytraria Indica* Pers. synops. 1 p. 23 n. 1. *Justicia acaulis* Linn. suppl. p. 84. *Vahlia symb.* 2 p. 3. Roxb. pl. corom. t. 127, fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 139 n. 9. Herbb. Russell!, Madr.!, Rott.!, Wight!, Heyn.!, Wall. cat. n. 2420 a-e. Plantaginis facie Indiæ orientalis Nella Carumbee Malabarorum Plunk. amalthe. p. 175, t. 438 f. 1. Squamæ scapi lanceolatæ, ciliatae; bractæ spicas ovatæ, longius ciliatae. Calycis laciniae et bracteole villoso-ciliatae, ciliis cohaerentes, quo factum videtur, ut inferior lacinia simplex visa sit quibusdam, quæ certo in duas ad basin fere divulsa. Corolla alba, vix duas lineas longa. (v. s.)

$\beta$ . *lyrata*, foliis basin versus magis minusve sinuatibus. *Elytraria lyrata* Vahl en. 1 p. 106. *Justicia acaulis*  $\beta$  Vahl symb. 2 p. 3. Wall. cat. n. 2420 e (ex parte.)

2. *E. VIRGATA*, acaulis, foliis oblongis ovalibusve integerrimis repandisve scapis longissimis simplicibus monostachyis, squamis floriferis ovatis cuspidiatis ciliatis scapi lanceolato-subulatis apice patulis glabris. — Distinguitur ab *E. crenata* non solum foliorum formâ sed maxime etiam squamis scapi longioribus apice patulis.

$\alpha$ . *Vahliana*, foliis oblongis glabris.  $\mathcal{L}$  lu humidis Carolinæ inferioris (Walt., Gmel., Michx., Bosc), ad margines paludum et in pinetis St.-Marks, Florida, Julio (Rugel! in h. Shuttleworth!, Hook.! et DC. n. 857), h. Willd. n. 278 (ex hort. ber.!), h. DC. n. 649. (partim) ex h. Deless.! *E. Vahliana* (Michx. fl. am. 1 p. 9 t. 1 Vahl en. 1 p. 106. Pursh fl. am. 1 p. 13. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 421. *E. herbacea* Michx in h. DC.! *Justicia acaulis* var.  $\beta$  Willd. sp. pl. 1 p. 84. *Anonymos carolinensis* Walt. fl. car. p. 69. (v. s.)

$\beta$ . foliis oblongis hispido-tonentosulis integerrimis. (Kinn! in h. gen. berol.)

$\gamma$ . *latifolia*, foliis late ovalibus velutino-mollibus crenulatis. — Tampa Bay in Floridâ (Hooker! in h. gen. berol.).

3. *E. MARGINATA* (Pal. de Beauv. Vahl, en. 1 p. 108), acaulis vel caulescens, simplex, glabra, foliis ovali-oblongis basi cuneatis integerrimis, scapis simplicibus apiceve bifidis, squamis bracteisque conformibus laxiusculis patulis ovatis acutis integerrimis margine membranaceis ciliatisque.  $\mathcal{L}$  In Guineâ (Vahl), in littore insulae Fernando Po et ad Grand Bassa Jul.-Nov. (Vogel! n. 75 et 43 in h. Hook ex itin. ad Nigrum fl. explorandum), Oware (Beauvois! in h. DC. n. 650 ex h. Deless.) Calyx quinquepartitus, laciñiâ superâ oblongâ, reliquis lanceolatis. Rhizoma filiforme, repens. (v. s.)

4. *E. CAULESCENS* (Ledeb. ind. scm. hort. Dorp. 1820), caulescens, foliis in summo caule approximatis oblongo-ovatis repando-dentatis integerrimis in petiolum attenuatis utrinque pilosis, pedunculis axillaribus simplicibus ramulosive (bifidis), spicis solitariis, bracteis squamisque scapo conformibus oppositis (subinde ternis) ovatis acuminatis mucronatisque integris submarginatis ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Mexico (nec Manilla), in provincia Guadalaxarâ alt. 3000-4000 ped., a Novembri in Aprilem, rara (Galeotti n. 789. in h. Hook. et Benth.!).

Rœm. et Sch. syst. 1. maut. p. 128. *Verbena squamosa* Jacq. hort. Schoenbr. 1 p. 3 t. 5. *Stachytarpheta squamosa* Vahl en. 1 p. 209. R. et Sch. syst. veg. 1 p. 205. Icon. citata Jacquinii, quod ad habitum eximia, calycem seorsim pictum ad naturam monstrat; descriptio autem minus accurata calycem obiter tractat, pentaphyllum esse docet, ueque staminum sterilium in flore notitia additur. Icones et descriptio citatae, a plantâ cultâ desuntæ, duplo majorem sustinet plantam, quam spontanea appetat, cui folia sunt bipollicaria, pedunculi folia æquantes, vel simplices vel bifurci, spicæ 6 lin. longe. Differt a reliquo bracteis immarginatis longe ciliatis nec apice bifidis. Scapus inter squamas, bracteis dimidio miiores, lanato-hirtus. ( v. s. )

5. E. TRIDENTATA Vahl, N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 13), caulis caulescens, foliis lanceolatis oblongis integrerrimis longe petiolatis, pedunculis simplicibus mono-tristachyis, squamis ciliatis, floriferis superioribus tridentatis, inferioribus scapique e basi latiori subulatis.

$\beta$ . *caulis* N. ab E. l. c. 1) E. tridentata Vahl en. 1 p. 107. Rœm. et Sch. syst. 1 p. 139, mant. 1 p. 127. Spr. syst. 1 p. 77. Linn. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 421. E. imbricata Pers. synops. 1 p. 23. *Justicia imbricata* Vahl ecl. 1 p. 1. — In Brasiliâ et Sanctâ Marthâ.

$\beta$ . *caulescens* ( N. ab E. l. c. ), caule aphylio vel simplici vel prolifer-ramoso.—Ad Anta Brasilie (Pohl! in h. imp. vindob. n. 1703), in Serra dos Órgaos, Pernambuco (Gardner! pl. bras. n. 1108 in h. Moric. et Benth.) , in provincia Goyaz (idem ibid. n. 3947).

$\beta^*$  (N. ab E. l. c.) scapis plerisque sterilibus, spicæ florentis bracteis omnibus apice simpliciter subulatis.—Ad Cuyaba (Riedel! in h. acad. petrop. n. 44), Rio Coxim id. ibid.

Var.  $\beta$  non differt a var.  $\alpha$  nisi caule circiter semipedali eoque aphylio apice folioso scapigeroque subinde inter folia ramoso. Squamae tam scapi quam spicæ inferiores basi latiores margineque lato membranaceo cinctæ, hinc subulato-cuspidatæ, spicæ autem superiores loco cuspidis dentibus duobus membranaceis lanceolatis terminantur interjectæ his cuspide subulata pungente paulo longiore. Var.  $\beta^*$  potius status imperfectus est dicenda quam varietas.

6. E. FRONDOSA (H. B. et Kth. nov. gen. et sp. 2 p. 234), caulescens, foliis iu summo canle approximatis rhombeo-oblongis repando-crenatis (subinteger-rimis) basi longe attenuatis glabris ad costas hirtulis, pedunculis lateralibus et terminalibus simplicibus apiceve fasciculato-bi-quadrifidis, spicis solitariis, bracteis ovalibus basi et apice membranaceo-marginatis ciliatis bifidis inter lacinias aristato-mucronatis mucrone lacinias falcatas æquante. (○)? In regno Novo-Granatensi (Humboldt! in h. Willd. n. 279), in provinciâ Marthæ Americæ meridionali, locis aridis (Bertero! in h. DC. n. 644 ex h. Balbis.). Kunth synops. 2 p. 32. Rœm. et Sch. syst. p. 127. E. scorpioides Rœm. et Sch. mant. p. 128. Dicliptera ramentacea Spr.! in h. DC. Simillima E. apargiafolia et tridentata  $\beta$ , differt autem ab hac foliorum formâ, ab illâ glabritate. Calyx 4-fidus. Squamae scapi ovato-lanceolatæ, adpressæ, ciliatæ, apice subulatæ. Folia in specimine Humboldtiano haud integrerrima, ut in nov. gen. l. c. legimus, sed apicem versus repanda basin versus repando-dentata. Iluc referenda videtur: E. tridentata et ramosa, in St.-Martha, testibus Vahlio et Sprengelio lectæ. ( v. s. )

7. E. FASCICULATA (H. B. et Kth. n. gen. et sp. 2 p. 235), subcaulis, foliis oblongis repando-crenatis attenuato-sessilibus supra undique subtus in costis hirtis, pedunculis confertis simplicibus apice fasciculato-polystachyis, bracteis rhombeo-ovalibus basi et apice membranaceo-marginatis ciliatis bifidis inter lacinias aristato-mucronatis mucrone lacinias lanceolato-falcatas superante.  $\Sigma$  In Caracas ad Araguam (Humboldt! in h. Willd. n. 280), Carthagena de Colombia, in ruderatis (Billberg! in h. gen. berol.), in Manillâ (Chamisso! in h. gen. ber. n. 114.) — Kth. syn. 2 p. 32. Quod ad bractearum figuram similis E. frondosa, parte autem herbacea subrhombica, habitu autem longius

recedit propter spicas 6-11 in apice peduncolorum fasciculatum confertas. Calyx 4-partitus, lacinis apice barbatis. Squamæ scapi subulatae, ciliatae, adpressæ. ( v. s. ).

8. E. APARGIIFOLIA (N. ab E. ), caule brevi, foliis in summo caule approximatis oblongis obovatissimis basin versus repando-dentatis supra subtusque ad costas hirsutis, pedunculis lateralibus et terminalibus apicem polystachyis, spicis fasciculatim confertis, bracteis ovalibus basi et apice membranaceis bifidis (quandoque et quadrifidis) ciliatis inter lacinias aristato-mucronatis, mucrone lacinias falcatas æquante.  $\mathcal{L}$  In orâ septentrionali Columbiæ et Panamæ (Cuming et Lobl.), ad flumen La Plata (Tweedie in herb. Hook.). Similis E. frondosæ et ramosa differt autem foliis basin versus repando-dentatis nec integerrimis, supra dense hirsutis, subtus ad costas presertim, Apargia hirtæ foliis simillimis, spicis in apice pedunculi elongati squamosi (typo dichotomo quidem) fasciculatim confertis (2-10) inæqualibus, circiter pollicaribus. Bractea apice membranacea, bifida aut lacinis hisce ipsis partitis quadrifida, mucrone interjecto lacinias æquante. Calycis lacinia inferior apice bidentata. ( v. s. )
9. E. CUPRESSINA, subacaulis, foliis oblongis integerriinis subtus ad costas hispidulis, pedunculis aggregatis simplicibus apice fasciculato-ramosis, spicis solitariis, bracteis suborbiculatis membranaceo-marginatis apice rotundatis bifidisque interjecto mucrone aristiformi lobos æquante, scapi squamis artissime imbricatis ovatis apice angustioribus cum mucronulo margine subciliatis.  $\mathcal{L}$  In Americâ septentrionali (Michx.! in h. DC. n. 649 ex h. Delle. cum E. virgata). Ab E. frondosâ differt caule nullo et squamis orbiculatis, ab E. apargiifolia insuper foliis haud sinuatibus et bracteis non apice tantum sed undique membranaceis. Calyx 4-fidus. ( v. s. )
10. E. RAMOSA (H. B. et Kth. nov. gen. et sp. 2 p. 235, Kth. synops. 2 p. 33), acaulis, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis? subtus hispidis in petiolam attenuatis, scapis trichotomo-proliferis, spicis solitariis, bracteis obovatis basi et apice late membranaceo-marginatis margine nudiusculis bifidis inter lacinias aristato-mucronatis mucrone lacinias semiovatas æquante.  $\mathcal{L}$  In Mexico ad Acapulco (Humboldt! in h. Willd. n. 281 absque foliis). Scapi pedales, -bis terve proliferi, cum ramis squamis ovato-subulatis dense imbricatis vestiti. Rami elongati. Bractearum mucro candidus, laciniae repando-cuspidatae. Calyx quadrifidus, lacinis apice purpurascens barbatis. ( v. s. )

- VII. NELSONIA R. Br. prodr. fl. nov. Holl. 1 p. 480, ed. N. ab E. 3, 1 p. 336. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 79 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 14. Watt. cat. n. 2370 a, b. Wight! herb. n. 1129. Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 697. Meisn. gen. p. 293 (202). — Justiciæ sp. Roxb.

Calyx quadripartitus, inæqualis, lacinia supera majori, infera bifida. Corolla labiata vel sublabiata, labio inferiori trifido. Stamina duo; sterilia nulla. Antheræ inclusæ. Connectivum apice oblique lanceolatum, loculo uno super altero posito, inferiori mutico, æquali. Stigma bifidum, lacinis ovatis. Capsula e basi ovata attenuata, loculi octospermi a basi seminiferi. Retinacula O. — Herbæ diffusæ, stæpe tomentosæ, locis humidis depressis veteris et novi orbis crescentes. Folia mediocria aut parva latiuscula. Spicæ Origani vel Majoranæ. Spicæ terminales vel axillares. Flores solitarii, parvi, bracteâ magnâ tecti; bracteis lateralibus parvis vel nullis.

1. N. TOMENTOSA (Willd. sp. pl. ed. 2, 1 p. 419 n. 6, herb. n. 284 sp. Roxb!), herbacea, prostrata vel erectiuscula, villosa, foliis inferioribus petiolatis ellipticis obtusis, superioribus subsessilibus minoribus, spicis ovatis bracteis elliptico-subrotundis obtusis mucronulatis.—In Indiæ orientalis pascuis humidis pingibus ( Roxb.), in montibus Courtallum (h. Madr.!), Bangkok,

in regno Siam (h. Madr.), Dimlæ (Griffith! in h. Edgeworth), Gorakhpur (Hamilt.), Assam (h. Hook.) — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 79. *Justicia tomentosa* Roxb. fl. Ind. or. ed. Car. et Wall. 1 p. 132. *Nelsonia origanooides* Rœm. et Sch. syst. 1 p. 173. Willd. sp. pl. ed. Dietr. p. 419. *Justicia origanooides* Vahl! en. 1 p. 122. *Justicia vestita* Rœm. et Sch. syst. mant. 1 p. 145. *Justicia bengaleusis* Spr. syst. 1 p. 82. *Justicia pentasticha* h. Hamilt. Wall. cat. n. 2370 c. *Ruellia ciliata* h. Madr. Wall. cat. n. 2392 b (ad partem). *Justicia tomentosa* Roxb., et *Justicia lamiifolia* Koen. in h. Madr. Wall. cat. n. 2370 e. *Ajugam pyramidalem* refert. Caulis, petioli et costae foliorum subtus praesertim hirsutula, sordibusque villis adhaerentibus saepe quasi ramentacea; in var.  $\beta$ . rami flagellares, elongati et graciles. Folia 9-4 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, ovalia obtusa, basi acuta, longe petiolata, minute remoteque crenulata, supra magis minusve villosa vel tomentosa, qua maxima, ea minus vestita, superiora sensim decrescentia; in exemplis flagellaribus vix unguicularia, subsessilia, distantia. Spicæ semipollinaires, axillares, in pedunculis vel nudis vel in medio diphyllis, basi diphyllæ, foliis his unguicularibus hirsutis. Bractæ ovato-orbiculatae, obtusæ cum mucronulo exiguo, villosæ. Calycis laciniæ superior ovata acuminata, infera lanceolata bifida, laterales lineares, omnes villosæ. Corolla calyce paulo longior, violacea; tubus subitus gibbus, limbus planus subbilabiatus, labio superiore bi-inferiori trifido, laciniis oblongis obtusis. Antheræ inclusæ, loculis basi subdivergentes. Capsula longitudine calycis, pyramidalis, apice acuminata asperma, loculis basi octospermis; semina globosa, parva. (v. s.)

$\beta$ . (N. ab E. l. c.) caule quasi sarmentoso. — Ad ripas Attran fluvii, in Chappedong ad Cogun in ripis Saluen fluvii Martabaniae (Wall.), in Sillet (Fr. de Silva), Coromandel (Mæc in b. Nees. ex h. mus. paris. u. 113!), ad Mergui (Griffith! in h. Hook.). *Justicia tomentosa* Wall. cat. n. 2370 d. *Justicia lamiifolia* Roxb. fl. Ind. or. ed. Car. et Wall. 1 p. 136. Rœm. et Sch. syst. mant. 1 p. 137. *Nelsonia lamiifolia* Spr. syst. 1 p. 42. Willd. spec. ed. 2, 1 p. 420. *Justicia ajugoides* h. Hamilt. Wall. cat. n. 2370 c (ex parte).

$\gamma$ . *ajugoides* (N. ab E. l. c.), caule flagellari foliis radicalibus maximis superstitibus stipato. — Asormi (Hamilt. h. Ilook!). *Justicia ajugoides* h. Hamilt. Wall. cat. n. 2370 c (ex parte).

$\delta$ . *Spicis cylindricis elongatis paulo laxioribus, foliorum costis distinctioribus*. — India orientalis (h. Hook.!)

2. N. POHLII (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 15), herbacea, prostrata, caule villosa, foliis oblongo-ellipticis obtusis subcrenatis supra subtusque ad costas pilosis, superioribus subsessilibus minoribus integerrimis, spicis ovatis demum cylindricis, bracteis cuspidato-acuminatis villosis glandulosisque. (I.) Ad S. Felis Brasiliæ (Pohl in h. Imp. vindob. n. 2012) Pernambuco (Gardner ibid. n. 1110! et in h. Hook. Schornbaum! in h. Mart.) *Justicia pusilla*, an nov. genus, Pohl! icon. et h. imp. vindob. n. 2012. Zahlbrucknera repens Pohl! ic. n. 4747 in h. Imp. vindob. *Ruellia diffusa* Vell. fl. flum. 5 t. 94. A N. canescente differt bracteis inter villos glandulis capitatis vestitis. Est probabilitate una ex innumeris illis hujus stirpis varietibus. (v. s.)

3. N. ROTUNDIFOLIA (R. Br. prodr. 1 p. 481, ed. N. ab E. p. 337), foliis subrotundis pillosisculnis, bracteis acutis, calycis laciniis duabus latioribus et rollaque laciniis emarginatis. (O) In Nova Hollandia littore or. et septentr. intra tropicum (R. Brown). An varietas glabrescens N. nummulariæfolie?

4. N. NUMMULARIÆFOLIA (Rœm. et Scb. syst. 1. p. 173), villosa, caule procumbente di-trichotomo, foliis æqualibus cordato-suborbiculatis brevissime petiolatis integerrimis venoso-liueatis, spicis cylindricis, bracteis subrotundis argute cuspidatis. (O) In Portorico (Vahl! Plœe! in h. Mus. Paris. n. 276, h. Nees, h. DC. n. 580). *Justicia nummulariæfolia* Vahl! en. 1 p. 122,

Differt a *N. canescens* solummodo foliis brevioribus latioribus, ramis costalibus (3-4) supra impressis subtus prominulis lineatis minus incanis, spicis etiam paulo magis virescentibus. Calycis lacinia superior elliptica, mucronata ut in illâ; reliqua etiam utrisque congruant. An var.? (v. s.)

5. *N. CANESCENS*, cano-villosa, caule procumbente, di-trichotomo subinde simplici, foliis ovatis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus minoribus brevissime petiolatis sessilibus, spicis cylindricis, bracteis subrotundis argute cuspidis. ♂ Folia inferiora (in var.  $\alpha$ ) bipanicaria, longe petiolata, reliqua unguicularia, obtusa, cum mucrone, supra haud lineolata. Spica  $\frac{1}{2}$ -2 pollicares, axillares et ex dichotomia, brevi pedunculatae. Calycis lacinia superior ovalis mucronata 3-5-nervis, inferior oblonga apice bifida, laterales lanceolatae. Corolla rosea. Capsula 8-10-sperma. In var.  $\beta$  capsula paulo major est, quam in var.  $\alpha$ , sed hæc sola est utriusque formæ diversitas, nam folia in speciminibus originalibus h. Willd. non differunt; integerrima scil. sunt, aut subrepanda atque in sicco statu undulata, haud raro etiam casu erosula. (v. s.)

$\alpha$ . foliis inferioribus superioribus duplo et quod excedit majoribus. — Locus humidis ad ostia fluvii Sino juxta El Zapote (Humboldt), in Panamâ et Columbiâ occidentali (Cuming! n. 1145 in h. Benth. et Hook!), in ins. Antillis h. DC. n. 472! ex parte, in regno Fazokel (Kotschy n. 484 in h. Hook!). *N. albicans* H. B. Kunth in nov. gen. et sp. 2 p 234 (quod ad descriptionem). *N. origanoides* Hochst. in Schimp. it. abyss. 2 n. 900, nec Vahl.

$\beta$ . foliis subæqualibus omnibus parvis. — Ad flumen Senegal (Roussillon!) in h. DC. n. 472 ex parte, et in h. Willd. n. 282!, in Senegambâ in arenosis insulæ St Mariae et regno Cayor (Leprieur! in h. Nees. ex h. mus. paris. n. 24 et 27), in Sennar (Acerbi! in eod. h. n. 691), in limo exsiccato fluvii Tacaze (Schimp.), Bahr-el-Abiad ad Nilum superiorem (d'Arnaud! in h. Nees. ex h. mus. paris. n. 49), prope sinum Bombatok ora occident. ins. Madagascar (Bojer! in h. DC.), ad sinum Carpenteria Nov. Holland. (R. Br.! in h. DC. n. 663), in regno Fazokel (Kotschy! n. 484 in h. Hook!). *N. canescens* et *albicans* h. Willd. n. 282 et 283. *Justicia canescens* Lam. ill. 1 p. 41. Hochst. in Schimp. it. abyss. 2 n. 900. *N. campestris* R. Br. prodr. 1 p. 481 ed. N. ab E. p. 337. *N. origanoides* Hochst. in Schimp. it. abyss. 3 n. 1815! *Ruellia eriostachya* Bojer! in h. DC. n. 132. *Acanthodium spicatum* Acerbi.

$\beta^*$ . foliis omnibus longe petiolatis obtusis in petiolum angustum acute desinentibus. ♂ In Senegal (Jussien). *Justicia canescens* Vahl! en. 1 p. 22. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 418.

### Species alienæ.

*N. HIRSUTA* R. et Sch. = *Ruellia hirsuta*.

*N. LAMIFOLIA* Roxb. = *Nelsonia tomentosa*  $\beta$ .

VIII. *ADENOSMA* *N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 79. Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 698. Meisn. gen. p. 293 (202.), non R. Br. — *Cardanthera* h. Hamilt. in h. Benth.*

Calyx 5-partitus, æqualis vel superiori laciñâ majori. Corolla ringens. Stamina quatuor didynama, antheris biloculatis, loculis parallelis. Capsula angusta, rostrata, polysperma. Retinacula nulla. — Herbae vel suffrutices pleræque indicæ, aliæ africanæ, in uliginosis littoribusque crescentes, erectæ vel diffusæ; foliis serratis vel crenatis, pubescentibus glabrisve, subinde glandulosis; floribus mediocribus, purpurascensibus, in axillis foliorum superiorum minorum sessilibus, singulis vel ternis, oppositis, spicam foliosam formantibus. Differt hoc genus ab Ebermaierâ corollâ rini-

gente et antherarum structurâ. — Adenosma R. Br. sectionem esse generis Stenodiæ demonstravit Bentham in prodr. 10. p. 380. Igitur nomen, perperam olim a me in genus hoc Acanthacearum translatum, jam retinere quam penitus expungere malebam.

1. *A. BIPPLICATA* (Wall. cat. n. 7146, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 79), herbacea, canle erecto ramosissimo foliisque oblongis subsessilibus denticulatis hirsutis, floribus axillaribus sessilibus solitariis, palato biplicato, calyce quinquepartito. — In Promæ montibus regni Burmanici. Folia fere sesquipollucaria, ramorum florentium unguicularia, illa miuite subdeutata, haec serrulata. Bracteolæ propriae calyce breviores, lanceolatae. Calyx ad basin fere 5-partitus, lacinis linearis-lanceolatis villosis. Corolla fere personata, violacea. Tubus ad faucom gibbus. Labium inferius superiori adpresso, angustum, trifidum, lacinis lanceolatis, in palato plicis duabus longitudinalibus instrutum. Stamina inclusa. Antherae breves, ovatae, staminum breviorum duplo minores. Loculi basi modice divergentes. Stigma acute bifidum. Capsula oblongo-lanceolata, ad dissepsitum compressa, glabra longitudine calycis. Ovula plurima, retinacula parva, squamaeformia. Scuina matura non adsunt.
2. *A. BALSAMEA* (Spr. syst. 2 p. 829 n. 5), caule erecto foliisque lanceolatis calloso-dentatis glutinosis glabris, floribus axillaribus verticillatis, calycis lacinia superiori oblonga et reliquis linearibus obtusis. (In India orientalis agris oryzaceis post messem vulgatissima (h. Wight!), Karikal in Nilgheiris Perrottet! in h. Nees. et h. mus. paris. n. 129), (Klein! in h. Willd.) — Wight ic. 1 t. 446, cat. n. 1930 partim (v. c. in h. gen. Berol. et in h. Hook!) Ruellia balsamea Linn. suppl. p. 289, Willd. sp. pl. 3 p. 373, herb. n. 11652, h. Schreb.! et Vahl! Ruellia balsamica h. Vahl! spec. Koenig. et Tront.) except. fol. 2, quod specimen alius speciei ostendit mancum et vix unquam determinaudum. (v. s. )
  3. *pectinata*, foliis inferioribus ramulorumque nonnullorum pectinato-dentatis pinnatifidis. Wight! cat. n. 1930 in h. DC. n. 270. ic. 2 t. 447, h. Schreb.! in Courtallum (Wight!)
3. *A. TRIFLORA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 79), caule adscendente foliisque ovatis crenato-serratis glanduloso-pubescentibus, floribus axillaribus verticillatis ternis, calyce æquali, corollæ lacinis omnibus retusis (In fossis Bengalie (Roxb.!), Sillet (Wallich! in h. Benth.!), Coromandel (Macc! in h. Nees. ex h. mus. paris. n. 122!), prope Calcutta (Lady Dalhousie! in h. Hook.). Ruellia triflora Roxb. hort. b. calc. et fl. ind. 3 p. 52, Wall. cat. n. 7144! Nov. genus inter Ruelliam et Barleriam (Roxb.! in h. Wight et Arnott!). Cardanthera triflora et glutinosa h. Hamilt.! in h. Benth. Verbena auct. ign. in h. Hook!. Folia conferta, caulinæ ovalia vel elliptica, 1-1 ½ poll. longa, 9-6 lin. lata, ramea et floralia unguicularia, obovata vel subrotunda, omnia acutiuscula aut obtusa, apicem versus plus minus evidenter dentato-crenata vel crenato-serrata, basi cuncata, sessilia, utrinque dense pubescenti-glandulosa. Bracteolæ duæ trium florum communes, oblongæ, obtusiusculæ. Calyx 3 lin. longus, ad basin fere 5-partitus, lacinis linearis-acuminatis hirsutis glandulosisque, superiori vix paulo longiori. Corolla ringens, 5 lin. longa, purpurea?; tubus brevis; faux ampla; labium superius ovatum, concavum, bifidum, lacinis emarginatis; inferioris latum, rotundatum, convexum, apice anguste trifidum lacinis brevibus emarginatis; palatum sparse pilosum. (v. s. )
  3. *pectinata*, foliis inferioribus pectinato-pinnatifidis N. ab. E. l. c. Coromandel (Macé! in h. Nees. ex h. mus. paris. n. 121), in fossis ad Serampur. Ruellia uliginosa h. Mart. et Benth. ex h. Forsyth.! (spec. Roxburgh.). Ruellia tanacetifolia h. Vahl! (spec. Koenig.)
4. *A. VILLOSA* (Benth.! in h. reg. Mon.), caule erecto foliisque ovatis utrinque acutis acute serratis villosulis, floribus axillaribus. 2 In in montibus Sillet.

(Wall. cat. n. 3852 in h. Monac.) A reliquis in primis ab A. triflorâ differt foliis confertim acute serratis. (v. s.)

5. A. VERTICILLATA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 79), caule adscendente foliisque ovali-oblongis serrulato-crenatis hirsutis, floribus verticillatis, calycis aequalis laciniis linearis-spatulatis obtusis. — In Indiâ orientali, loco natali non acuratius indicateo. Ruellia verticillata Wall. cat. n. 2409. Blepharis verticillata h. Heyn.! Wall. l. c. Folia approximata, poll. longa, in brevem petiolum attenuata, obtusa, crenulata, crenis apicem versus inclinatis, utrinque minute punctulata et ad costas nervosque pubescenti-hirta. Bracteæ in ambitu verticillorum (8-10) 2 lin. longæ, et interiora versus aliquot minores, obovato-oblongæ, obtusæ, basi attenuatae, dense pubescentes. Bracteolæ ad basin ipsius calycis vel desunt omnino, vel minimæ lineares obtusa plerumque nonnisi singulæ. Calyx 2  $\frac{1}{2}$ -3 lineas longus, haud procul a basi divisus, aequalis, pubescens, laciniis a basi ad  $\frac{2}{3}$  linearibus pallidis, apice nonnihil dilatatis herbaceis obtusiusculis. Corolla 4 lin. longa, pubescens, purpurea; faux inflata; labium superius fornicatum, apice bidentatum et barbulatum; inferius latum, trifidum, laciniis conniventibus obtusis mediæ majori; palato gibbo densius pubescente. Capsula 3 lin. longa, dense pubescens, lanceolata, acuta, depresso, a basi ad apicem polysperma. (v. s.)
6. A. THYMUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 79) caule repente ramosissimo, foliis bracteisque lanceolatis integerrimis dense lineolatis glabris, floribus axillaribus sessilibus oppositis. — Ruellia cernua h. Heyn.! Wall. cat. n. 2380 b ad partem. Roxb. fl. iud. 3 p. 45 excl. syn. Rumph. amb. 6. t. 23 f. 1, quæ ad hunc ordinem non spectat. Proxima A. uliginosa, sed bene distincta. Folia 2  $\frac{1}{2}$  lin. longa, lanceolata, integerrima, glabra, crasse lineolata, in petiolum brevem attenuata, a basi ramorum per intervalla aequaliter disposita, in spicam non conferta, patula. Bracteæ calyce breviores, lineares. Calyx bracteæ paulo brevior, ultra medium quinquefidus, laciniis setaceo-acuminatis herbaceis margine scabrido-ciliatis. Corolla 4 lineas longa, pubescens, purpurascens; tubus brevis; faux ampla; labium superius oblongum, concavum, apice bidentatum, inferius latum, trilobum. Stamina longiora labium superius subæquantia; antheræ pallide violacea, lineares, basi sagittatae. Capsula 2  $\frac{1}{2}$  lineas longa, glabra, pallida, linearis, depressiusculo-tetragona, a basi ad apicem polysperma. (v. s.)
7. A. ULIGINOSA (R. Br. prodr. fl. nov. holl. ed. N. ab E. 1 p. 398), caule repente geniculato (erecto) ramosissimo superne piloso, foliis ovalibus crenatis integerrimis subsessilibus pubescenti-scabris, floribus axillaribus oppositis subsolitariis in spicam terminalem tetragonam dispositis. (In Tranquebaria et prope Allam-Parvam in agris oryzaceis vulgatissima (Koen. in Linn. suppl.) — H. Madr.!, Klein! in h. Willd. et Roxb.!, in h. Benth. ex h. Forsyth. Spr. syst. 2. p. 828. Wight! h. prop. n. 1931. Ruellia uliginosa Linn. suppl. p. 290. Willd. sp. pl. 3 p. 371 n. 37, herb. n. 11646 fol. 2! h. Schreb.! h. Vahl! (specim. Rottl.). Roth. nov. pl. sp. p. 306. observ. Wall. cat. n. 2378 a et c (maximam partem) Roxb. fl. ind. 3 p. 52. Blanco fl. philipp. p. 404. Ruellia ringens Linn. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 828 (excl. syn. fl. zeyl.) et herb. malab.! Osbek. it. p. 229? Cardanthera uliginosa h. Hamilt.! Wall.! in h. Benth. De hac plantâ egregie l. c. scripsit Rothius, neglecto tamen charactere generico maximeque ea spectans, quibus facilius possit a Ruelliâ polysperma sen Hemiadelphe polysperma nostrâ distingui, quæ quidem distinctio solo fructu comparato evidentissima. Folia caulina inferiora ex oblongo elliptica, obtusa, subsessilia, crenulata, crassiuscula, mox deperientia, glabra, vel sparsim pubescenti-scabra. Spicæ terminales et bracteæ seu foliis floralibus subtrotundis obtusis quadrifariam positis 2  $\frac{1}{2}$ -3 lin. longis, scabrido-ciliatis. Flores in axillis bractearum oppositi, solitarii, subinde bini, sessiles. Bracteolæ duas obovatae, longitudine calycis. Calyx 2 lin. longus, ad basin quinquepartitus, pubescens, laciniis aequalibus setaceo-acuminatis membranaceis. Corolla 3  $\frac{1}{2}$  liu. longa, pallida, glabra; faux inflata; labium superius planiusculum, e basi ovata

contractum, obtusum, bifidum, laciniis obtusis; inferius trifidum, laciniis rotundatis subaequalibus. Stamina longiora corollam subaequante; antheræ lineares, albidæ. Capsula duas lineas longa, lanceolata, depressa, obtusa neō acuminate, subtilissime pubescentia, pallida, a basi ad apicem fere polysperma, seminibus in utroque latere dissepimenti ejusque valvulae quindenis vel pluribus. ( v. s. )

*B. canæ erecto.* Willd. ! herb. n. 11646 fol. 1. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 79. Frequens in insula Javâ ad Dschanschor ( h. Hook. ! ).

### *Species dubia.*

8. A. CHÉNOPODIFOLIA ( Spr. syst. 2 p. 829 ), caule erecto, foliis petiolatis ovatis integerrimis pubescentibus, floribus verticillatis.—In Guadalupâ. Ruellia chenopodifolia Poir.

### *Species non nisi nomine nota.*

A. CUSPINATA Benth. in Wall. oat. n. 3852.

### *Species exclusa.*

A. FRAGRANS Spr. syst. 2 p. 829. = Herpestes fragrans Benth.

IX. EBERMAIERA N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 79 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 15. Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 698. Meisn. gen. p. 293 ( 202 ). — Stiftia Pohl ic. in h. imp. vindob. n. 3151. — Staurogynæ Wall. pl. as. rar. 2 p. 80 t. 86. Endl. gen. p. 708. Meisn. gen. p. 294 ( 203 ) ( 1 ).

Calyx 5-partitus, laciniæ superiore latiore, mediis angustioribus. Corolla infundibuliformis, limbo oblique quinquefido, laciniis duabus superioribus brevioribus. Stamina 4, tubo inserta, didyma, inclusa, minora subinde sterilia, accedente quandoque filamento sterili quinti staminis. Antherarum loculi ovati transversim patentes, retrorsum extrosunque dehiscentes. Stigma (probabiliter irritabile) breviter bilamellatum, lamellæ superiori truncatæ bifidâ ex utroque latere ad basin lamellæ inferioris superiore amplectentis prominente, hinc stigma, ubi duo stigmatis rami sibi incumbunt, ad speciem tridenticulatum. Capsula oblonga ovalis, obtusa, polysperna, a basi seminifera, valvulis dorso depresso. Retinacula seminum nulla. — Herbae aut suffrutices Americæ et Asiæ tropicæ, caule basi saepè repente hirsuto-tomentoso aut puberulo, foliis integris et integerrimis, saepè puberulis. Flores pallidi aut lutescentes, in axillâ folii floralis subsessiles aut brevipedicellati, pedicello bracteæ saepè adhærente, bracteolati, spicam aut racemum spiciformem in caule ramisque formantes. Contractam spicam capituli diceres inflorescentiam. Ubi vero in axillis foliorum floralium inferiorum ramuli florigeri brevissimi accedunt, spica ad basin subverticilliflora prodit. — Habitatio in locis uidis et uliginosis.

1. E. VAUTHIERIANA ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 15 ), villosa-tomentosa, foliis ovatis apice attenuatis basi in petiolum acute desinentibus repando-crenatis, floribus axillaribus oppositis pedunculatis, bracteolis linear-lanceolatis, corollâ.... 2 Ad villam Ricam provinciæ Minarum Generali ( Vauthier ! n. 182 in h. imp. vindob. ex h. Endlich. ). Caulis erectus, ramosus, dense villosa-tomentosus, rubiginosus. Folia cum petiolo 4 lin. longo 2 ½-2 ; poll. longa, 1 poll. circiter lata, utrinque pubescenti-villosa, subtomentosa. Flores in foliorum superiorum reliquis conformium paulo evidenter crenatorum axillis solitarii. Pedunculus usque ad bracteolas 4 lin. longus. Pedi-

( 1 ) Staurogynæ nomen a cl. Wallichio instructum , ab eodem postea , Ebermaiera generi in opus splendidum introducto , dimissum est .

- cellus a bracteis ad calycem 2-lin. Bracteolæ 4 lin. longæ. Calyx pollicaris; lacinia superior oblonga, obtusa; duæ inferiores oblongo-lineares acutæ, paulo longiores; duæ laterales linearis-attenuatae paulo breviores. Corollam et fructum non vidimus, sed de genere haud est dubitandum. ( v. s. )
2. E. MANDIOCCANA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 80, in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 16), foliis ovalibus oblongis utrinque attenuatis acumine obtuso glabris, caule tereti-compresso pulverulento-scabro, spicis axillaribus terminalique compositâ glandulosis, bracteis spatulatis. ♂ Ad Mandioccam securus margines silvarum, Augusto (Beyrich), prope Rio de Janeiro (Pohl! in h. imp. vindob.), in silvis Macahe, Maio et Junio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 797). Zahlbrucknera fruticosa Pohl! in h. imp. vindob. 4740. Folia opposita, 4-5 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, acutiuscula, in petiolum semipollic. semitereti-compressum pubescenti-scabrum cuneatim desinentia, integerrima vel obsolete subcrenata, glabra, obscure viridula, subtus ad costas scabra, nervis costalibus 11-12. Bractæ longitudine calycis vel paulo longiores, oblongo vel lanceolato-cuneatae, obtusæ, calyce breviores. Calyx 3 lin. longus, ad basin fere 5-partitus, inæqualis; lacinia superior et duæ inferiores lineares, obtusæ, aequales, illa paulo latior; duæ mediæ breviores, subulatae, tempore maturi fructus fere longitudine reliquarum strictioresque. Corolla 3 lin. longa, basi tubulosa, sursum oblonga, crassiœscula, subincurva, extus et limbi lacinii etiam intus intus pulverulento-tomentosa, pallida, maculâ fauacim inferâ violacea; lacinia ovatae, obtusæ; tres inferiores paulo breviores. Anthera transversim didynamæ, loculis cuculliformibus basi fuscis margine pallidis. Capsula 3 lin. longa, oblonga, depressa, mucronata, crassiœscula, pubescenti-scabra, ad basin bilocularis, ad  $\frac{2}{3}$  a basi polysperma. ( v. s. )
3. E. ANIGOZANTHUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 16), foliis oblongis utrinque attenuatis apice obtuso costis utrinque hirsutis, caule sub-tetragono spongioso-hirsuto, racemo terminali bracteato, bracteis subrotundis coloratis calyce brevioribus, corollâ tubulosâ, rudimento staminis quinti. ♂ In silvis ad præsidium S. Joannis Baptiste prov. Minarum Generalium, Aprili (Martius!), in umbrosis proprie Mariana Brasiliæ, Julio, et in umbrosis silvaticis montis Itacolumi, Augusto (Riedel! in h. acad. petrop. n. 5, 10, 348 et 464). Ab E. Minarum differt: caule maxime hirsuto pilisque intricatis tomentoso-spongioso, foliis apice angustioribus quidem neque acutis, inflorescentiâ discretâ, i. e. non sensim ex floribus axillaribus foliisque floralibus decrescentibus proficiscente, sed brevi pedunculo interjecto e bracteis coloratis floribusque constante oblonga densaque. Frutex bi-tripedalis. Bractæ pedicello adhærentes, 5-6 lin. longæ, ovato-orbiculatae, obtusæ, basi angustiores, trinerves, pubescentes, luteæ. Bracteolæ oblongæ, superiores linearis-spatulatae, calyce duplo breviores, obtusæ. Flores magni flori Anigozanthi flavi R. Br. similes. Calycis lacinia superior 10-11 lin. longa, obovato-cuneata, trinervis; reliquæ laciniaæ breviores (7 lin. longæ), cæterum ut in illâ constructæ. Corolla incurva, 11-12 lin. longa, colore integumento ut in illâ. Filamentum sterile rectum. Stigma ut in E. Minarum. Capsula oblonga, semipollicaris, dura. ( v. s. )
4. E. MINARUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 17), foliis ovali-oblongis oblongis lanceolatis utrinque acutis costis subtus hirsutis, superioribus brevioribus subovalibus, caule obtuse subtetragono superiora versus subtomentoso, racemo terminali folioso pubescenti-tomentoso, foliis floralibus ovato-lanceolatis, rudimento staminis quinti sterilis. ♂ In campis et ruderatis, in fauacibus ad Villam Ricam provinciam Minarum Generalium, Martio (Martius!) Ackermann, Gardner! n. 5129 in h. Hook. et Benth., Schüch! in h. imp. vindob.), in Serra de Itacolumi Brasiliæ, Martio et ad Suares Brasiliæ (Sellow! in h. reg. berol. n. 151, 210 et 233). Pœcilocnemis Minarum Mart.! in h. reg. mon. et in Obss. n. 943! Pluripedalis: caulis oblique obtuseque tetragonus, subinde subteres, apicem versus pilis brevibus crispis articu-

latis in statu sicco rufescentibus subtomentosus, ad axillas compressus, ramosus; rami basi aphylli, apicem versus florigeri. Folia inferiora hand examissim opposita, in formâ communî 5 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, brevipediolata, supra in juventute pilis sparsis plus minusve hirsuta, aetate proiectior levia et nitida, subtus ad costas 16-17nas rufo-strigosa; superiora folia decrescendo minora, 2  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, subsessilia, costis subtus hirsutioribus, ramis costalibus quius. Flores in foliorum superiorum axillis oppositi. Pedicellus 1-3 lin. longus, tomentosus, liber. Bracteolæ spatulate, calyce triplo breviores, uti calyx et corolla pilis crispis holosericeo-subtomentosæ. Calyx 2 poll. longus, profunde 5-partitus, flavus, lacinia superiori latâ obovatâ, duabusque inferioribus linearis-oblongis obtusis triuervibus venosisque pallide flavis limbo virescente, dnabus mediis linearis-lanceolatis uninervibus acutiusculis. Corolla longitudine calycis, cylindrica, basi ad ovarium paulo angustior, virescens, limbi laciniis viridibus ovatis obtusis subæqualibus. Rudimentum quinti staminis sigmaeum. Stigmatis structura in hac specie evidentissima est quam rami stigmatici plerunque divergent et dentes rami inferi breviorisque longiores sint; apex hujus rami truncatus nec bifidus. Ovarium conicum, glabrum, multi-ovulatum. Variat foliis supra hirsutulis glabrescentibus et undique hirsutis. ( v. s. )

*5. microphylla*, foliis duplo minoribus lanceolatis. — In eâdem provinciâ (Ackerman! in h. Mart.), in ripâ rivuli Timbopéba provinciæ Minarum Generalium, Augusto (Riedel! in h. acad. petrop. n. 6 et 467). Differt caule pedali, foliis omnibus minoribus 2-1  $\frac{1}{2}$  poll. longis 4  $\frac{1}{2}$  lin. latis, costis 7-8, apicem versus decrescentibus quidem nec vero quam pro longitudine latoerioribus, floribus luteis, reliquis ut in  $\alpha$ . ( v. s. )

5. E. ELEGANS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 17), foliis oblongis obtusis supra pulvraleto-tomentosis, costis subtus hirsutis, racemo terminali folioso, foliis floralibus oblongis ovalibusque obtusis calyce longioribus, corollâ tubulosa, rudimento staminis quinti.  $\heartsuit$  ad Viera do Mato (Pohl! in h. imp. vindob. n. 3151), ad Villam Ricam prov. Minarum Generalium (Vauthier! in h. DC. n. 682), in silvis montis Itacolumi, prov. Minarum Generalium, Augusto (Riedel! in h. acad. petrop. n. 348). *Stifia elegans* Pohl! in h. imp. vindob. n. 5151. Vauthier! h. du Brésil n. 182 ( in h. DC. ). E. Anigozantho propinquâ, differt autem foliis angustioribus neque apicem versus onubis attenuatis supra pulvraleto-tomentosis, tum vero racemo terminali et floribus axillaribus foliisque floralibus sensim, mediocriter tamen, decrescentibus proficiscente, quo charactere ad E. Minarum accedit, etiam si maxime ab istâ differat foliis angustioribus floribusque duplo majoribus. Folia inferiora circiter 5 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, ramis costalibus 9-10nis cum costâ subtus hirsutis, qua sensim decrescentia eâdem fere formâ persistunt et flores axillares pedicellatos promunt. Racemus lunc oritur foliosus, basi saepè ramosus, ramis simpliciter racemiferis. Suprema denique folia floralia 6-7 lin. longa, 2-2  $\frac{1}{2}$  lin. lata, sessilia, viscidio-pubescentia calycesque æquantia racemum angustiori acuminem terminuant. Pedicelli inferiores 3-4 lin. longi, viscidopubescentes uti et bracteolæ calycesque. Bracteis pedicello supra medium insertæ, 5 lin. longæ, lanceolato-lineares. Calyx 10-11 lin. longus, laciniis subacutis, superiori paulo longiori oblongâ, reliquis linearis-lanceolatis. Corolla plus quam sesquipollucaris, incurva, pubescenti-tomentosa, pallida, limbi obliqui laciniis ovatis obtusis. Filamentum accessorum sigmaeum. Capsula 5-6 lin. longa, rigida. ( v. s. )

6. E. SANCTÆ CATHARINÆ (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 17), caule angulato lineis hirsutis notato, foliis oblongis vel ovali-oblongis utrinque attenuatis hirsutis, racemo terminali brevi-pedunculato, bracteis oblongis villosis calyce longioribus.  $\heartsuit$  In insulâ S. Catharinæ Brasiliæ (Tweedie! in h. Hook.). Ab E. hirsutâ differt foliis plus duplo majoribus et racemo terminali discreto. neque ex apice caulis transitu leni oriente. ( v. s. )

7. E. HIRSUTA N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 18) foliis lan-

ceolatis cauleque hirsuto-tomentosis, racemo terminali sessili, bracteis oblongis hirsuto-tomentosis calyce longioribus, corollâ tubulosâ, rudimento staminis quinti.  $\delta$  Tejuco in provinciâ Minarum Generalium (Vauthier ! h. du Brésil n. 183 in h. DC., idem ! in h. mus. paris. n. 239, idem ! in h. Endl. et ex hoc in h. imp. vindob., Schlech.! in eodem h. ). E. eleganti conjunctior, differt foliis angustioribus,  $1\frac{1}{2}$  poll. longis, 4-6 lin. latis supra non pulvulenulo-tomentosulis, sed brevissima pubescentia veluti pulvulenta induitis, floribus magis ad apicem caulis et ramorum subspicatim inter bracteas 7-10 lin. longas collectis et corollâ paulo breviore ( $1\frac{1}{4}$  poll. longâ) minus incurvâ. Bracteolæ spatulatae. Rudimentum filamenti quinti rectum, capitatum. ( v. s. )

8. E. VERONICIFOLIA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 18), foliis ovali-oblongis basi cuneiformi attenuatâ subsessilibus obtusis apicem versus crenatis cauleque acute quadrangulari pulvulenulo-puberulis, spicâ terminali capitâtâ viscidulâ, bracteis calycisque lacinia superiori ovalibus.  $\mathcal{Y}$  in Brasiliâ (Sellow in h. reg. berol. n. 13!). Tota planta, maxime autem in foliis bracteis calycibus pubescentiis exigua nudo oculo, nisi in caule, inconspicua viscidula vestita, subincana, semipedalis, erecta, basi ramosa. Folia pollicaria, ramis costalibus quaternis, subtus prominulis pulvulenento-hirtis. Spica terminalis sessilis, densa, subglobosa. Calyces bracteæ longitudine, sessiles. Bracteolæ ovales, duplo breviores. Lacinia calycis 4, linearilanceolatae, acute, puberulo-glandulosæ, duas inferiores paulo latiores, dorsalis ovalis, obtusa. Corolla 3 lin. longa, tubo limbi longitudine, limbo (in unâ quam vidi) bilabiata, labiis ovatis obtusis venosis. Stamina conniventia, structuræ generice. Ovarium oblongum, pubescens. Sigmatis labia brevia, triangularia, obtusa. Fructus deest. ( v. specimen incompl. )

9. E. RIEDELIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 18), suffruticosa, foliis ovali-oblongis lanceolatis basi attenuatis supra punctulato-asperis, costis cauleque teretiunculo spongiosolo-pubescentibus, spicâ terminali sessili pubescenti-glandulosâ basi interrupta foliosâ et subcompositâ, bracteis ovalibus flores superantibus.  $\delta$  In collibus siccis prope Mandioccam prov. Sebastianopolitanæ, Aprili (Riedel ! in h. acad. petrop. n. 47), Bahiam (id. ! ibid. n. 0, 16.) Bi-tripedalis, ramosissima, ramis erectis, pubescentiâ brevi subpulvulenâ ferruginea dense vestita. Folia conferta,  $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$  poll. longa, 8-6 lin. lata, basi magis quam apice attenuata, in petiolum per se brevem decurrentia, subrepanda, apice plus minus obtusa, firma, supra tuberculis exiguis crebris tecta, subtus lævia pallidioraque; costæ 8-9, utrinque pubescenti-subferrugineaæ. Spica in apice caulis densa, semipollicularis, ovata, basi foliosa et infra hanc plerumque par spicularum globosarum parvarum axillarium. Bracteæ 4 lin. longæ, 2 latæ, obtusæ, basi cuneiformes, ciliatæ, trinerves, minus quam calyces glandulosæ. Bracteolæ parvæ, lineares. Calyx 3 lin. longus, lacinia acutiusculis, superiori oblongâ, duabus inferioribus linearibus, lateribus setaceis brevioribus. Corolla 3 lin. longa, tubuloso-infundibuliformis, pubescenti-viscidulâ, violacea, limbi lacinia rotundatis, duabus superioribus minoribus. Stamina inclusa, structuræ solitæ; rudimentum quinti nullum. Pistillum ut in reliquis. Fructum non vidimus. E. glauca proximâ affinitate conjuncta est. ( v. s. )

$\alpha.$  *salicifolia*, foliis lanceolatis, bracteis ovalibus.

$\beta.$  *latifolia*, foliis subovalibus oblongisve longiori petiolo, bracteis subrotundo-ovatis. In silvis prope Esperanca, Julio (Riedel ! in h. acad. petrop. n. 0, 70). Differt a formâ  $\alpha$  solummodo foliis latioribus cum petiolo semipolliculari 3 poll. longis et 9-11 lin. latis, spicâque unâ alterâve brevi axillari pedunculata infra spicam terminalalem. Corolla (ex Riedel) alba, basi rosea.

10. E. GLAUCA (N. ab E. in Wight cat. n. 1732), spicis (racemis) foliosis axillaribus terminalibusque, foliis oblongis in petiolum attenuatis glabris int-

gerrimis, caule superne rhachibus spicarum bracteis spatulato-lanceolatis patentibus calycibusque pubescenti-glandulosis. — Stemodia glanca herb. Klein ! in h. Wight. Caulis erectus, pedalis et sesquipedalis, pubescenti brevi crecta scaber. Folia regulari passu decrescentia, caulinata (media) a 2 poll. long. et 6-7 lin. latis oblongis in petiolum attenuatis glabris in 4 lin. longa 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin. lata, fere linearia puberula; ramea a pollicaribus 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3 lin. latis lanceolatis in 2-3 lin. longa, linearia; haec autem omnia pubescentia, subviscida. Rami inferiores oppositi, superiores alterni, erecto-patuli, folio suo longiores, a basi fere florigeri, spicas sicuti laxifloras. Flores brevissime pedicellati, sequidentes, alterni, in singuli folii bractealis axilla singuli. Bracteolæ propriæ calyce paulo breviores, anguste linearis, obtusa, uti calyx pilis glandulosis patentibus copersæ. Calyxis lacinia superior fere 2 lin. longa, lanceolata, acuta; reliqua setacea, vix 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. longæ. Corolla 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. longa, tubulos-infundibuliformis, glabra, alba ?, limbo brevi erecto patulo 5-fido, lacinias ovato-subrotundis obtusis, duabus superioribus paulo minoribus. Stamina inclusa; filamenta hirta; connectivum trigonum; loculi basi divergentes, pallidi. Capsula oblonga, obtusa, glabra. Semina multa, exigua, fusca. (v. s.)

11. E. POLYBOTRYA, caule erecto pubescenti-oano, racemulis axillaribus sessilibus alternis folio duplo brevioribus, foliis oblongis obtusiusculis glabris subtus pallidioribus et in petiolum breve incanum acute desinentibus, bracteis braetoleisque lanceolatis obtusiusculis calyce brevioribus calycibusque glanduloso-pubescentibus. (⊙) Ad Mergui Indiæ or. (Griffith ! in h. Hook.). Planta spithamea, habitu E. glauca, racemulis a basi fere ad apicem caulis alternatim orientibus in racemum terminalem subcompositum excurrentibus insignis. Corolla parva, 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2 lin. longa. (v. s.)

12. E. HUMILIS (N. ab Es. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 80. Wall. cat. n. 7148), floribus capitatis, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis glabris. (I) In montibus Promæ regni Burman. (Wall.). Folia remota, oblongo-lanceolata, circiter pollicaria, inferiora ramorum breviora. elliptica, omnia obtusa, in petiolum breve scabrum decurrentia, integrerima, remote penninervia, glabra, subtus ad nervos scabra, pallidiora, supra non lineolata minute punctulata. Bracteolæ due ad basin calycis ejusdemque longitudine, linearis, apice paulo latiora, obtusa, pubescenti-viscidulæ. Calyx 2-2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> lineas longus, ad basin quinquefidus, viscido-pubescentis; lacinia superior lanceolata; reliqua linearis, angustiores; omnes obtusa, ciliolata. Corolla 5 lin. longa, pubescens, purpurea ? parum incurva, subinfundibuliformis, tubo a basi continuo expanso in limbum subæqualem quinquefidum, laciinis obovatis rotundatis crenulatis. (v. s.)

13. E. ZEYLANICA, subacaulis, basi stolonifero-ramosa, hirsuta, floribus spicatis, spicas in caule stolonibusque terminalibus, foliis elliptico-oblongis obtusis in petiolum breve decurrentibus subrepandis, stolonum minoribus, inferioribus distantibus suborbicularis, bracteis oblongo-spatulatis calycibusque glandulosis. (U) Ad Kandy Warakapolly in Zeylano (Mc Rae ! n. 369 in h. Benth. et Hook. ex h. soc. hort. Lond. et in h. Mart.). Accedit E. humili, sed differt floribus spicatis aliisque. Folia caulis primaria (vix pollicaris) 2-2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> poll. longa, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> poll. lata, stolonum duplo minora. Spica primaria 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> poll. longa, terminalis, sessilis stolonum duplo minores. Corolla parva, tubulosa, incurva. Authoræ pilosa, loculis valde divergentibus. Capsula subovata. (v. s.)

14. E. SPATULATA (Hasskarl cat. hort. bog. alt. p. 147), caule herbaceo ascendente basi stolonifero ramoso glanduloso-pubescente, floribus spicatis spicas in caule stolonibusque terminalibus, foliis ovalibus obtusis in petiolum longum cuneatim longe decurrentibus integrerimis, inferioribus glabris, superioribus glanduloso-puberulis breviori petiolo, floralibus obovato-cuneatis sessilibus mucronato-acutis glanduloso-pubescentibus, bracteolis calycem sequantibus lanceolatis calycibusque glandulosis villosisque. (U) In India orient-

- tali (h. Vahl !), in nigrinosis Bataviae (Blume), in Philippinis (Cuming ! n. 1083 in h. gen. berol. et Hook.). Adenosma spatulatum Bl. Bijdr. p. 737. Ruellia obovata Vahl ! in herb. Accedit E. zeylanicae, sed foliis longe petiolatis bracteisque satis distinguitur. Ex omnibus axillulis inferioribus pullulant rami breves, microphylli, foliis subrotundo-spatulatis. Rami infimi nudi, flagellares. ( v. s. )
15. E. THYRSOIDEA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 80. Wall. cat. n. 7149), foliis petiolatis ovato-oblongis villosis, bracteis lanceolato-spatulatis calycisque laciniis linearibus longissime pilosis glandulosisque.  $\mathcal{L}$  In Moalmyne regni Burman. Planta herbacea, circiter digitalis, simplex. Caulis basi repens. Folia opposita, inferiora ovato-oblonga, superiore oblonga, 2-2  $\frac{1}{2}$  poll. longa,  $\frac{1}{2}$  poll. lata, obtusa, subrepanda et crenulata, penninervia, utrinque setis articulatis hirsuta. Bractea sub singulo flore floris longitudine, lanceolata, acuta, basi attenuata et magis minusve cum pedicello connata. Bracteolæ juxta florēm dūe, opposite patentes, lineares, acutæ, longitudine calycis. Calyx ad basi fere quinquepartitus, inæqualis, laciniæ dūe inferiores longitudine fere superioris linearifiliformes, duas mediæ bis dimidio breviores, linearisetaeæ, superior denique angustæ lanceolata, acuta, reliquis latior. Corolla longitudine calycis, pubescens, infundibuliformis, venosa (carnea ?), limbo brevi quinquefidus laciniis ovatis obtusis. Capsula calyce paulo brevior oblongoconica, obtusa, ad dissepimentum compressa, glabra. ( v. s. )
16. E. AXILLARIS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 80), foliis oblongis basi cuneatis repando-crenatis supra punctulato-asperis subtus pubescentibus, racemis circa apices ramorum axillaribus, solitariis terminalibus solitariis ternis nutantibus hirsutissimis, bracteis ovalibus lanceolatis. — In Penang. Ruellia? comosa Wall. cat. n. 2414. Caulis crassus, angulatus, compressus, hirtus, furcatis divisus; rami basi aphylli apice bi-tetraphylli et inter folia racemiferi. Folia 8-10 pollices longa, 2  $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, acuta, basi uneatim in petiolum decurrentia, repanda et crenata, supra punctis asperula, subtus, præsertim ad costas vénasque pubescentia. Bracteæ pedicello adnatae, pleraque lanceolatae, acuminatae, basi cuneatae, 5 lin. longæ, pennatim venosæ, undatae. Bracteolæ 5 lin. longæ, lanceolatae acuminatae, basi attenuatae. Calyx lacinia major 6 lin. longa, oblonga, acuta, trinervis, infera bracteolis æquales et conformes; mediæ breviores, lineares. Corolla vix semipollice longior, dense pubescens, in alabastro tomentosa (ferrugineoreticulata ?); limbus quinquefidus laciniis ovatis obtusis subæqualibus, duabus superioribus paulo latioribus. Capsula 4 lin. longa, fusca, obtusa cum mucrone.
17. E. STAUROGYNE, foliis oblongis subtus pallidioribus in petiolum acute desinentibus glabris, petiolo cauleque humili basi repente hirto-tomentosis, racemo terminali brevi, bracteis oblongis lanceolatibus basi attenuatis apice setaceis, bracteolis lanceolatis vel lanceolato-linearibus basi attenuatis calycisque laciniis apice longe setaceis pubescenti-scabri strictis, laciniâ superiore paulo latiore.  $\mathcal{L}$  In Sillet (Wallich), Simla (Fielding ! in h. Hook.). Staurogyne argentea Wall. cat. n. 4905 (ex parte, cum E. argentea), pl. as. rar. 2 p. 80 t. 186 (quod ad foliorum figuram et corollæ magnitudinem). Species sane distincta, licet similis. Folia paulo latiora, pleraque magis acuta, subtus vel paulo pallidiora vel rufescens, ad costas scabra, margine repando-subcrenata. Racemulus densior, rigidior, setis strictioribus incumbentibus rufescens scabris nec hirsutis. Corolla duplo longior (6 lin. longa) tenerior glabriuscula, cum bracteis diversissimis. Calyx lacinia dorsalis paulo latior est, at brevior inferioribus, quaæ quidem bracteolarum longitudine sunt. Corollæ limbus purpureus, lobis duobus inferioribus minoribus in disco albis. ( v. s. )

*ß. angustifolia*, foliis lanceolatis propterea que basi minus obtusatis. — In Tavoy Indiæ orientalis, Septembri (Wallieh.). Staurogyne angustifolia

Wall. cat. stirp. Birnau! ined. n. (294) 2050 in h. DC. n. 866 specim. alterum.

18. E. ARGENTEA, foliis lauceolato-oblongis subtus argenteo-candioantibus in petiolum acute desinentibus glabris, petiolo cauleque humili basi repente strigoso-hirsutis, racemis axillaribus terminali que brevibus erectis hirsutis, bracteis calycisque lacinia supera lanceolatis apice reliquisque lacinia calycis bracteolisque totis subulatis rigidis.  $\mathcal{L}$  In Sillet, Tavoy, Septembri (Wallich), Malaccâ (Griffith! in h. Hooker). Staugynæ argentea Wall. pl. as. rar. 2 p. 80 t. 186 (conf. E. Staugynam) cat. n. 4905 (ex parte scil. admixtis E. Staugynæ speciminibus). Staugynæ angustifolia Wall. cat. stirp. Birnau! ined. n. (294) 2050 . in h. DC. n. 866 (specimen alterum). (v. s.)
19. E. INCANA (Hasskarl cat. hort. bogor. alt. p. 147), caule herbaceo procumbente, foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis basi attenuatis utrinque pubescentia minutâ adspersis subtus canescensibus, spicis terminalibus brevibus, bracteis lanceolatis acuminatis calycibusque ciliatis.  $\mathcal{L}$  In umbrosis montanis et circa Buitenzorg locis humidis (Blume). Adenosma incanum Bl. bijdr. p. 756.
20. E. VELUTINA, caule herbaceo basi repente apice adscendente tomentoso, foliis oblongis obtusis basi attenuatis longe petiolatis supra pubescenti-velutinis punctulatis subtus puberulis concoloribus, racemulo terminali brevi denso composito, bracteis oblongis lanceolatis bracteolisque lanceolato-linearibus obtusiusculis calyce brevioribus pubescentibus, calycis pubescenti-ciliati lacinia superiori lanceolata inferioribusque duabus linearibus subæqualibus, lateralibus setaceis brevioribus.  $\odot$ ? Ad Mergui Indiæ or. (Griffith! in h. Hook.). Corolla calyce subdupo longior, anguste infundibuliformis. Capsula calyce brevior. Differt ab E. incana et lanceolata calycis lacinia paulo latioribus, bracteis bracteolisque brevioribus minus ciliatis. (v. s.)
21. E. LANCEOLATA (Hasskarl cat. hort. bog. alt. p. 147), foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis in petiolum longe decurrentibus supra glabriusculis subtus pube minutissimâ subvelutinis, petiolo cauleque humili basi repente tomentosis, racemis axillaribus terminali que brevibus simplicibus erectis densis glanduloso-pilosis et laxe setoso-ciliatis, bracteis linear-lanceolatis apice subulatis, bracteolis recurvo-patulis calycisque lacinia supera linearibus.  $\mathcal{L}$  Circ. Tjikao province Tjanjor in insula Javâ (Blume).—Zollinger pl. Jav. n. 591 et 596). Adenosma lanceolatum Bl. bijdr. p. 757. Similis E. argentea et Staugynæ, sed differt foliis subtus licet tenuissime subvelutinis bracteisque et calycibus minus ciliatis glandulosisque. (v. s.)
22. E. LONGIFOLIA, herbacea, caule procumbente adscendente, strigiloso-sericeo, foliis lanceolatis apice parum basi longe attenuatis et in petiolum longum decurrentibus integrerrimus subtus pubescentia subtilissimâ laxe inspersis glabrescentibus, racemis axillaribus terminalibusque brevibus trifidis brevisim pedunculatis, bracteis bracteolis calycisque lacinia dorsali lanceolatis subulato-acuminatis, reliquis lacinia subulatis, omnibus autem pubescenti-hirsutis.  $\mathcal{L}$  In Malaccâ (Cumiug! n. 2350 in h. Benth. et Hook., Griffith! in h. Hook.). Ab E. lanceolata differt inflorescentia, foliis longiori petiolo praeditis calycibusque longioribus. Folia subtus (in siccis) rufescens. (v. s.)
23. E. SETIGERA, herbacea, caule repente adscendente, foliis ovato-oblongis (summis oblongis) obtusis basi subacutis repandis supra glabris subtus pallidioribus et in costis hirsutis ètate glabrescentibus, spicis terminalibus brevibus capituliformibus sessilibus, bracteis calycisque lacinia superiori linear-subulatis, lacinia reliquis bracteolisque subulatis, omnibus elongatis subæqualibus setis undique longis bulbosis hirautissimis.  $\mathcal{L}$  In Malaccâ (Cumming! n. 2355 in h. Benth. et Hook.). Ab E. lanceolata et incana differt foliis latioribus, bracteis angustioribus omnique inflorescentia magis hirsuta. Folia juniora caulis sterilis costis subtus valde prominentibus subrugosa, subtilissime pubernula. Spica capituliformis. brevissimè petiolata, basi foliis

- binis lanceolatis sparsim pilosis spicæ longitudine suffultæ. Corolla 8 lin. longa.  
(v. s.)
24. *E. STOLONIFERA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 19), foliis lanceolatis glabris in petiolum attenuatis, floralibus villosis, caule subcompresso basi repente, apicem versus villoso, spicæ terminali bracteatâ glandulosâ-villosâ, bracteis oblongis, flores aut æquantibus aut superantibus, radice stolonifera.  $\Sigma$  In silvis arenosis prov. Paraensis Brasilia, Augusto et Sept. (Martius!). Distincta radice et caule ( $\frac{1}{2}$ -1 ped. alto) inferne repentibus, illâ stolones filiformes novos caules gigantescent emittentes. Caulis primum simplex dein ramosus, ramis gracilibus apice floriferis. Folia anguste lanceolata, 2-3 poll. longa, 2-3 lin. lata, utrinque attenuata, obtusiuscula, subsessilia, subrepanda, tenuia et mollia; inferiora glabra; superiora decrescentia villisque hinc inde adpersa, abeuntia in bracteas. Flores in spicam terminalem majorem caulis et in spicas minores ramos terminantes dispositi. Bracteæ inferiores 6-8 lin. longæ, oblongæ, obtusæ, superiores decrescendo 3-2 lin. longæ, lanceolatæ, omnes ut reliqua partes inflorescentiae villis glandulosis vestitæ. Flores in inferiori parte spicæ primariae fasciculato-aggregati, in superiori alterni, brevissime pedicellati, pedicello bractea adhærente. Calyx cum bracteolis binis 2 lin. longus. Bracteolæ calyci æquales, lineares, villosæ et glandulosæ, demum saepè deciduae. Calyx profunde 5-partitus, laciniaæ longitudine æqualibus villosis at minus glandulosis, superiori lanceolato-lineari trinervi, reliquis linearibus, latitudine parum diversis. Corolla 3 lin. longa, infundibuliformis, glabra, alba; limbi laciniæ erectæ, ovatae, obtusaæ; duæ superiores breviores. Filamenta glabra. Antheræ generis. Stigma tridenticulatum ut in reliquis. Calyx fructus paulo major et rigidior, præsertim ejus lacinia superior. Capsula 1  $\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, glabra, pallida. (v. s.)
- $\beta.$  *nana*, caule brevissimo, stolonibus pluribus magis villosis et foliosis, foliis stolonum oblongis, spicæ rarer glandulosâ magis villosâ. Ad flumen Amazonum (Poepig! h. reg. berol. n. 2554). Caulis 1-3 poll. longus, stolones canle longiores, validiores quam in var.  $\alpha$ , bracteæ paulo breviores ideoque ad speciem latiores, glandulæ in calyce bracteolisque rariores nullæve omnino; sed reliqua congrunt. (v. s.)
25. *E. FASTIGIATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 20), foliis præcipuis oblongis cauleque eretto trichotomo - ramosissimo villosulus et glandulos-pubescentibus, ramificationum altiorum foliis multo minoribus bracteisque subconformibus ovalibus aut ovali-oblongis alternis, floribus in ramulis racemulosis secundis, bracteis (plerisque oblongis) calycem æquantiibus, bracteolis lanceolato-linearibus calyce subbrevioribus, calycis laciniæ superâ oblongâ.  $\odot$  In provinciâ Goyaz Brasiliæ tropicæ (Gardner! n. 3414 in h. Benth. et Hook.). Caulis pedalis, erectus, a basi ramosus, ramis superioribus multis adproximatis iteratim tri- et denique dichotomis, extremis capillaris. Folia caulis et ramorum principalium 3-2 poll. longa, oblonga, basi attenuata, petiolata, quæ denique sequuntur per gradus suos in folia 1 poll. longa, petiolata, usque ad 4-2 lineas longa, sessilia, pleraque alterna, et ea denique in bracteas etiam alternas, oblongas, acutiusculas, magis ad proximas transeuntia, quo habitus plantæ exoritur singularis polyphyllus, microphyllus. Calyx ut tota planta laxe villosulus et pubescens exigua glandulosâ conspersus, brevipedicellatus; laciniæ quatuor inferiores subæquales, setaceaæ; dorsalis major, oblonga, 1  $\frac{1}{2}$  lin. longa. Corolla pallida, angusta, limbo evidenter bilabiata et capsula longitude calycis. (v. s.)
26. *E. REPENS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 20), hirsuta, caule repente diffuso, foliis oblongo-lanceolatis sessilibus obtusis subrepandis in bracteas lanceolatas transeuntibus, spicæ terminali laxiusculâ foliaceo-bracteata, calycibus hirsutis interjectis glandulis, laciniâ superiore lineari-lanceolata, reliquis æqualibus lineari-angustis, corollâ calycem æquante.  $\odot$ ? In humidis prope Cuyaba Brasiliæ (Kiedel! ex h. acad. petrop. n. 1, 15 et 1087).

Serra da Chapada (idem ! ibid.). Herba facie Nelsoniae, repens, ramis adscendentibus tetragonis. Folia 6-7 lin. longa, 2-2 $\frac{1}{2}$  lin. lata, inferiora in costis praesertim, superiore et bractealis undique hirsuta pilis patentibus albis molibus. Bracteae patulae 4 lin. longæ, lanceolatæ. Bracteolæ lanceolatae, calyce longiores. Calyx bilinearis. Corolla parva (2 lin. vix longa), alba fance fusco-violacea (ex Riedel), lacinias obtusis, duabus superioribus duplo brevioribus rotundatis. Capsula oblonga, obtusa, bilinearis, polysperma. (v. s.)

X. ERYTHRACANTHUS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 80. Lindl. intr.  
ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 698. Meisn. gen. p. 293 (202).

Calyx profunde quinque-partitus, lacinias subæqualibus lanceolato-subulatis. Corolla infundibuliformis, limbo æquali quinquesido obtuso. Stamina quatuor didynamia; antheræ biloculatae, loculis in connectivo securiformi oblique divergentibus muticis. Stigma bilamellatum, lamellis parallelis angustis, superiori paulo breviori truncata. Ovarium basi annulo constrictum, superne bilocular, locellis multiovulatis, ovulis dense seriatis horizontaliter patentibus obtusis. Capsula ovata vel oblonga, depressa, a basi bilocularis, polysperma, dissepimento bipartito. Semina parva compressa. Retinacula nulla. — Suffrutescens Indici. Folia pleraque subtus rubicunda. Racemus terminalis compositus, flores et bracteæ subalternæ. Bracteæ et bracteolæ parvæ, setaceæ, subæquales, calyce breviores. Flores mediocres. — Genus Ebermaieræ nimis affine, nec nisi calyce subæquali capsulaque brevioribus et quam pro longitudine latoribus, habitu denique proprio distinctum.

1. E. RACEMOSUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 80), fruticulosus ?, caule foliisque oblongo-lanceolatis utrinque acutis pubescenti-scabris, pedunculo terminali longo spicis brevibus. — In Penang (Wallich 1). Ruellia racemosa Roxb. fl. ind. 7 p. 42. Wall. cat. n. 2336 a, b. Folia conformia, opposita, cum petiolo  $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 poll. lata, oblongo-lanceolata, utrinque attenuata, obsolete repanda, tenuia, supra lineolata et pubescentiæ dispersa scabriuscula, subtus purpurea, ad costas scabra, nervis costalibus octonis novenivis. Bracteæ vix linearces, subulatae, patulæ, scabré. Bracteolæ due, duplo minores, subulatae ad basin calycis. Calyx lineam longus, ad basin quinque-partitus, pubescens, delapsò fructu patulo persistens rigidiorque; lacinias ovato-lanceolatas, apice subulatae, purpureæ, scabré, margine ciliatae superior et duæ inferiores paulo latiores; mediane paulo angustiores, intus lăves; superior trivittata; laterales bivittatae. Corolla 5 lin. longa, infundibuliformis, tubo limbo breviori, hoc non inflato, glabra, nervosostriata, rubra ?; limbi laciniae rotundatae, æquales. Capsula 2 $\frac{1}{2}$  lin. longa, ovata, depressa, mucronata, molliuscula, fusca. (v. s.)
2. E. GRIFFITHIANUS, herbaceus, caule basi repente dein erecto tomentosohirto, foliis ovatis ovalibus utrinque obtusis pubescenti-scabris, racemo terminali folio breviori laxifloro, bracteis pedicularibus oblongo-spatulatis obtusis, bracteolis lanceolatis a calyce distansculis cum calyce hirtis ciliatis, pedunculo communis brevis in medio bibracteato. (In Malaccâ (Griffith ! in h. Hook.). Similis E. elongata, sed differt non solum racemo breviori, sed etiam bracteis bracteolisque latoribus. An var.? Folia inferiora evidenter ovata, superiore ut in E. elongata. (v. s.)
3. E. OBTUSUS, foliis oblongis utrinque obtusis, costis caulinque petiolisque pubescenti-hirtis, racemis axillaribus terminalibusque compositis folia æquanteibus, caule basi repente. (In Mergui (Griffith ! in h. Hook.)
4. E. ELONGATUS, herbaceus, foliis oblongo-ovalibus oblongis utrinque obtusisculis pubescenti-scabris, racemis axillaribus terminaliæ vel simplici vel composito elongatis laxifloris, pedunculo communis brevissimo, bracteis pedicularibus lanceolatis, bracteolis linearibus a calyce distantiusculis, calycis

lacinia supera linearis parum latior. *2.* In Indiâ orientali (Trant! in h. Vahl.), Javâ in montosis umbrosis (Blume! Zollinger! pl. Jav. n. 1479 in h. DC. n. 835). *Adenosma elongatum* Bl. bijdr. p. 757. Capsula oblonga. (v. s.)

*3.* foliis angustioribus. — In Philippinis (Cuming! pl. ind. or. n. 1373). *Ruellia dubia* h. Vahl! Varietas haec petiolis brevioribus foliisque basi magis attenuatis diversa videtur species. (v. s.)

### Subordo 2. ECHMATACANTHEÆ.

Semina retinaculis uncinatis suffulta.

Tribus III. *HYGROPHILEÆ* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 95. Endl. gen. p. 698. Meisn. gen. p. 296.

Corolla ringens. Stamina vel 4 didynama, vel 2 rudimentis alterius paris adiectis. Antheræ biloculares, loculis parallelis basive divergentibus muticis calcaratis. Capsula angusta, a basi polysperma, paucis a medio oligosperma.

#### CONSPECTUS GENERUM.

##### Subtribus 1.

Capsula a basi seminifera.

XI. *Hemiadelphus*. — Stamina perfecta duo, dente medio setaceo armata. — India orientalis tropica.

XII. *Physichilus*. — Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla subpersonata, palato inflato dense bullato. Stamina quatuor. Capsula depressa a basi octosperma. — India orientalis et Africa tropica.

XIII. *Polyechma*. — Calyx quinquepartitus lacinia superiore paulo longiore et latiore. Corolla bilabiata, labio inferiore parum rugoso. Stamina quatuor. Capsula depressa, a basi polysperma. — Africa tropica.

XIV. *Glossochilus*. — Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla infundibuliformis subbilabiata, disco infero elevato. Stamina quatuor, antherarum loculo altero altius inserto. Capsula depressa, tetrasperma. — Africa australis.

XV. *Nomaphila*. — Calyx quinquepartitus, lacinia supera paulo longiore et latiore. Corolla subpersonata, labio inferiore trilobo, disco inflato hirsutoque. Capsula teretiuscula, a basi polysperma. — Insulæ Indiae orientalis et Senegalibia.

XVI. *Hygrophila*. — Calyx ad medium circiter quinquefidus lacinias æqualibus angustis. Corolla bilabiata, labio inferiori trifido, disco convexo. Stamina quatuor. Capsula teretiuscula, a basi polysperma. — America, Asia et Nova Hollandia calidior.

XVII. *Gymnostachyrum*. — Calyx quinquepartitus, subæqualis. Corolla bilabiata. Stamina duo. Antherarum loculi paralleli, basi niucronati. Capsula columnaris, tetragona, a basi polysperma. — India orientalis.

XVIII. *Cryptophragmum*. — Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla bilabiata. Stamina duo. Antheræ muticæ, ad speciem uniloculares, loculis antrorsum arctissime contiguis, septo recondito. Capsula columnaris, tetragona, a basi polysperma. — India orientalis.

XIX. *Belantheria*. — Calyx quinquepartitus, lacinia superiore longior. Corolla brevis, ringens, tubo crasso. Stamina duo, antheris saccatis muticis. Capsula polysperma. — Africa (Owarc.).

XX. *Leucorhaphis*. — Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla ringens, tubo brevi basi deorsum gibbo. Stamina fertilia duo, antheræ loculis parallelis suturæ dorsali dehiscentibus antrorsum revolutis; sterilia duo, brycia. Ovarium multiovulatum. — Africa occidentalis.

XXI. *Petracanthus*. — Calyx ad medium quinquesfidus subæqualis. Corolla bilabiata, labio inferiore trifido plano. Stamina duo, antherarum loculis parallelis muticis. Capsula columnaris, tetragona, a basi polysperma. — Java.

#### Subtribus 2.

Capsula a medio seminifera.

XII. *Sautiera*. — Corolla bilabiata, labio superiori obcordato basi angustato. Stamina quatuor monadelpha, tubo filamentorum antice fisco. — Timor.

#### Subtribus 1.

Capsula a basi seminifera.

XI. HEMIADELPHIS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 80. Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 698. Meisn. gen. p. 296 (204). — Ruelliae spec. Roth. — Justiciae spec. Roxb.

Calyx 5-fidus, laciniis æqualibus. Corolla ringens, clausa, labio superiori bidentato, inferiori trilobo. Stamina duo; filaments basi dilatata, supra medium dente setaceo (rudimento filamenti abortivi) instructa; antheræ biloculares, loculus parallelis muticis demum contortis. Capsula lanceolata, compressa, polysperma. Semina retinaculis subtensa, convexo-concava, marginata. — Herba Indica, in uliginosis et humidis crescents, repens, glabra, foliis subcrenatis, spicâ bracteis imbricata.

1. H. POLYSPERMA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 80), caule repente foliisque elliptico-oblongis glabris, spicis in ramis ramulisque terminalibus brevibus, bracteis communibus obovatis ovalibus hirtis. (In Bengaliâ locis incultis inter gramina tempore frigido (Roxb.), Nawabgung, Gualparae et Patnee (Hamilt.), Sillet, Oude, in Prome, alibi secus ripam Irawaddi (Guil. Gomez), ad canalem Delhiensem, Martio (Edgeworth), Selampur (h. Schreb.!), Assam (h. Hook.), Mergui (Griffith! ibid.) herb. DC. n. 393. Justicia polysperma Roxb. fl. ind. or. ed. Car. et Wall. 1 p. 120. R. et Sch. syst. mant. 1 p. 132, Willd. sp. pl. ed. 2 v. 1 p. 375, herb. n. 328. Spr. syst. 1 p. 79. Wall. cat. n. 2483 a-f et in h. gen. Ber. Ruellia polysperma Roth nov. pl. sp. p. 305. Adenosma polysperma Spr. syst. 2 p. 829. Ruellia uliginosa Wall. cat. n. 2378 b, c, a ad partem. Caulis palmaris et paulo longior, repens, plerumque (præsertim superiora versus) pubescens-hirtulus, quandoque glaber, ad genicula ciliatus, ramosissimus, ramis patentibus. Folia caulina pollicaria et longiora, ex oblongo lanceolata, mox emarginata, superiora et ramea inferiora 8-9 lin. longa, elliptica, obtusa, omnia in petiolam attenuata lineolata, glabra, obscure viridia, obsolete crenulata, sensim in

bracteas transeuntia. Spica in omnium ramorum apice sessiles, semipollicares-pollicares, obtusa. Bracteæ imbricatae, obovatae, obtusæ, herbaceæ, pubescentes vel hirsuta. Bracteolæ propriæ lanceolatae, calyce paulo longiores, ciliatae. Calyx basi tubulosus, ultra medium 5-fidus laciniis æqualibus linear-acuminatis pubescensibus. Corolla 2-3 lin. longa, pubescens, purpurascens? Labium superius bidentatum, inferius olausum, trilobum, lobis subæqualibus rotundatis. Stamina tubo infero inserta: filamenta basin versus ab altero latere membranacea, et ubi contrahuntur rudimentum alterius filamenti breve setaceum hirtum exserentia; antheræ oblongæ; loculi subæquales contigui. Stigma simplex, acutum. Capsula 4 lin. longa, lanceolata, glabra, depressa, 6-sulcata, a basi seminifera, 24-30-sperma. Semina ovata, utrinque convexa. Retinacula brevia, hamata. — Varietates ex eo derivandæ, quod foliis caulinis serius citius evanescensibus foliis bractealia hirsuta ac abbreviata magis minus in caule dominantur, microphyllam hirsutamque plantam, pro communi formâ, producant. — Similitudo Adenosma uliginosæ ad universum adspectum potius quam ad veram plantæ structuram interpretanda est. (v. s.)

XII. PHYSICHILUS (1) *N. ab E. in comp. bot. mag. 2 p. 310, Endl. gen. p. 698, Meisn. gen. p. 296 (204).*

Calyx profunde 5-partitus, æqualis, laciniis angustis. Corolla personata, palato dense bullato, labio superiori bilido integro, inferiori trifido, laciniæ mediæ minore. Stamina 4, basi geminatim conjuncta, didynama; filamenta inflexa; antheræ supra basin adfixæ, linear-oblongæ, loculis contiguis parallelis muticis, nunquam contortis; staminum breviorum minores. Capsula oblonga, deppressa, a basi octosperma. Semina retinaculis squamiformibus subtensa, orbiculata, convexo-concava, marginata. Herbae seu suffrutices Indici et Africani, foliis angustis, floribus violaceis vel axillaribus, subsessilibus in spicam terminalem subsecundam coeuntibus, vel verticillatis. Proxima Hemiadelphi, a quâ differt structurâ labii, staminibus quatuor perfectis et capsulâ tantum octospermâ.

1. Ph. SERPYLLUM, caule diffuso inferne repente, foliis strigoso-hirsutis, caulinis suborbiculatis, floralibus oblongis vel oblongo-lanceolatis, corollæ labio superiore bifido. *2.* In Mysoore peninsulae Indiae orientalis (h. Arnott! n. 8 et 37), in præsidio Madras (Campbell), ad Malwa prope Serungpur solo pingui, Decembri (Edgeworth! in h. Benth.). Jacquemont! in h. mus. paris. n. 198, Bombay in arvis oryzaceis (Law! in h. Hook.). Planta humilis, diffusa, ramosa. Folia opposita, subæqualia (3-3½ lin. longa, 1-1½ lin. lata), subsessilia, sepe secunda et reflexa, oblongo-lanceolata, acuta, intègerrima, utrinque uti et bracteolæ et calyces setis albis hirsuta, supra lineolata. Bracteolæ calycem æquantes, lanceolatae, obtuse. Calyx 2½ lin. longus, usque ad basin fere 5-partitus, laciniis æqualibus anguste linearibus obtusis. Corolla 5-5½ lin. longa, carnea?, pubescens, venulosa; tubus angustus, longitudine calycis; faux brevis, inflata; labium superius ovatum, latere reflexum, bifidum, laciniæ ovatis obtusis; labium inferius paulo longius, subrotundum, palato valde inflato fauces claudente undique supra bullulis obtusis subtus foveis obsito, limbo trifido laciniis brevibus subæqualibus obtusis. Capsula duas lineas longa, oblongo-lanceolata, acutiuscula, ad septum deppressa, pubescens, a basi bilocularis, septo persistente, a basi seminifera. Semina in loculo quoque 4, distantia, parva, orbiculata, hinc concava, inde convexa, margine angusto hyalino cineta. Retinacula brevia, obtusa. Variat foliis latioribus omnibus conformibus, quare flores cuncti axillares adparent. (v. s.)
2. Ph. SENEGALENSIS, caule ercto a basi brachiatu rigido humili quadrangulari glabro, foliis ramorum linearibus acuminatis scabris laxè ciliatis, caulinis (au semper?) pinnatifidis, bracteolis calycibusque hirsuto-ciliatis, labio

(1) A φυσιώ, infl., et χείλος, labium.

superiore bifido. ♂ In Senegal ( Riohard ! in h. Benth.), in inundatis Casamancæ in Senegambia ( Heudelot ! n. 7 in h. N. ab E. ex h. mus. paris. ), in hñmidis regni Bondu ( Heudelot ibid. n. 19 , Perrottet in h. DC. n. 179 ), Sahara ( Guillemin ! in h. Benth. ), in inundatis deserti Sahara, Senegambia ( forma foliis caulinis pinnatifidis ) ( Leprieur ! in h. mus. paris. in h. Nees n. 31 ). Barleria n. 38 Perrottet pl. exsicc. Planta spithamea. Folia 1-1 ; poll. longa, vix lin. lata. Flores axillares , oppositi , in spicam terminalem foliis floralibus decessentibus interstictam coentes. Corolla cœrulea ; labium inferius ad fauces biplicatum , plicis adproximatis ; lacinia media labii inferioris lateralibus duplo minor, triangularis. Filamenta incurva, longitudine labii superioris. Ovarium lanceolatum. Fructum non vidimus. — In formâ, foliis caulinis pinnatifidis lacinia foliorum inferiorum oblongæ et dentatæ, superiorum linearæ et integerrime. ( v. s. )

β. macer, caule simplici gracili. — In Senegambiam ( h. Hook. n. 1391 cum formâ communî. )

3. PH. BARBATUS, caule erecto à basi brachiatore rigido quadrangulari glabro, foliis linearibus obtusis hirtis, floribus verticillatis, calycibus hirsutis-ciliatis, labio superiore corollæ apice attenuato barbato. ♂ In Senegambiam, in humidis Casamancæ ( Heudelot ! in h. mus. paris. n. 5 ! h. Nees. ct in h. Hook. l. n. 573 ). Verticilli multiflori, setis albis hirsuti. Corolla parva , labio inferiori basi angustato apice trilobo setulis raris barbato, superiori apice barba densa albâ rigidâ coronato. Caulis circiter spithameus. ( v. s. )

### XIII. POLYECHMA Hochst. pl. nubica in Flora Ratiæ. 1841. v. 1 p. 376.

Calyx profunde 5-partitus 5-fidus, lacinia angustis, superiori paulo longiori et latiori. Corolla bilabiata, labio superiore bifido, inferiore trifido. Stamina quatuor discreta; filamenta inflexa; antheræ æquales, supra basin adfixæ, ovatae, loculis parallelis connectivo latiusculo discretis muticis. Capsula oblonga, depressa, a basi polysperma. Semina suborbiculata, compressa, retinaculæ brevibus squamiformibus subtensa, marginata. — Herbæ Africæ humiles, diffusæ, microphyllæ. Flores glomerati, subsessiles, axillares, supremi cum bracteis et bracteolis in capitulo formam saepe congesti, subsecundi, in unâ specie spicati, spicis axillaribus brevibus. — Proxima quod ad habitum Physichilo, a quo differt calyce inæquali, staminum omnium antheris æqualibus ovatis, capsula polyspermâ, inflorescentiâ. A Nomaphila Blume differt palato rugoso inflato, inflorescentiâ, habitu.

1. P. CŒRULEUM ( Hochst. in Florâ l. c. et in Kotschy it. Nub. n. 310 ), calyce quinquepartito, corolla faucibus inflatis, labii inferioris disco transversim undulato-rugoso. ♀ Ad ripam Nili albi prope montem Mussa in lîmo exsiccatum ( Schimper ), Babr-el-Abiad ad Nilum superiorem ( d'Arnaud in h. Nees. n. 34 ex h. mus. paris. ) Planta spithamea, ramosissima, pilis albis patentibus obsita. Caulis filiformis, tetragonus, inferne demum foliis exutus. Rami oppositi, divergentes, geniculati, di-tricbotomi. Folia superiore et bracteæ 6 lin. longa, lanceolata, apicem versus latiora, obtusiuscula, integerrima; inferiora circiter pollicaria, cum mediis acutiuscula. Flores tres in fasciculo, articulatim inserti, subsessiles. Bracteæ foliorum magnitudine sub flore medio, sub lateralium florum singulo singula paulo minor, lateralis. Bracteolæ binæ, oppositæ, lacinia superiori calycis subæquales et similes, linearæ, hirsute. Calyx lacinia 4, filiformes, 3 lin. longæ; dorsalis paulo longior et dimidio latior, linearis; omnes hirsutæ. Corolla cœrulea, extus pubescens, 5 lin. longa; tubus gracilis, incurvus, longitudine limbî; faux inflata; labium superius inferiori paulo brevius, bifidum, lacinia obtusæ; inferioris ovale, supra convexum, in disco arcuatim undato-rugosum, apice trifidum, lacinia brevibus obtusi; mediatâ emarginata. Stigma acutum. Cap-

sula 4 iin. longa, lanceolata, mucronata, depressa, pubescens. Semina in singulo loculo 34-35. Retinacula brevia at lata, obtusa, conferta. (v. s.)

4. P. ABYSSINICUM (Hochst.), omnibus partibus hirsuto-pubescentis, multicaule, caulinis subramosis 1-1 $\frac{1}{2}$  pedalibus, foliis lanceolatis versus basin attenuatis apice acutis, floribus verticillato-spicatis, verticillis paucifloris foliosis, versus apicem caulis et ramorum approximatis, bracteis calycibusque glandulosopubescentibus hirsutis, corollis calyce subdupo longioribus. (2)? In Abyssinia (Schimper), in regno Sennaar (Kotschy! n. 293 in h. Hooker.)

5. P. MICRANTHUM, calyce paulo ultra medium quinquefido, corollâ calyce paulo longiore bilabiata, labii inferioris disco æquali, 2? In Senegal (Perrottet! in h. DC. n. 477 et in h. Nees. ex h. mus. paris. n. 32, Kunth! in h. gen. berol.) Quod ad habitum in universum, calycem inæqualem et capsulam depressam P. ceruleo simile, ab alterâ autem parte Hygrophilæ, calyce haud profunde 5-partito et corollæ parvæ labio haud rugoso. Planta diffusa, ramosa, pilis patentibus hispida. Folia bractealia oblonga, obtusa, sessilia, unguicularia, integerrima. Glomeruli florum oppositi, alter pauci-uniflorus, alter pluriflorus, bracteas æquantes. Bractea ad basin floris singuli oblongo-lanceolata, obtusa, petiolata, longitudine calycis. Bracteolæ parvae, subulatæ. Calyx patentib.-hirsutus. Corolla alba. Capsula 16-20-sperma. (v. s.)

6. P. ODORUM, omnibus partibus hirsuto-pubescentis canescensque, caule adscendente elatiore, foliis lanceolatis obtusis in petiolum attenuatis, floribus verticillatis, verticillis multifloris, superioribus approximatis, bracteis calyce brevioribus calycibusque glandulosovallosis, corollis calyce subdupo longioribus. (3) In Fouta d'Hallion in Senegambiâ (Heudelet! in h. mus. paris. n. 12 herb. Nees.), in Senegambiâ (h. Hook! n. 807.) Præcedentibus fortior et altior: « Metralis, floribus violaceis. Mentham redolet. » (R. Heudelet in schedis.) (v. s.)

5. P. RADICANS, hirsuto-canescens, caule radicante, foliis ovalibus subsessilibus integerrimis internodiis brevioribus, spicis axillaribus sessilibus terminalibusque pendunculatis ovatis, bracteolis ovalibus, bracteolis multo minoribus oblongis, calycis lacinia superiore ovali oblongâ, reliquis linearibus. (3) Locus inundatis ad sinum Bombatock in insula Madagascar (Bojer! in h. DC. n. 89.) Calycis lacinia superior reliquis plus duplo latior et aliquanto longior. Capsula oblonga pubescens, 14-16-sperma. (v. s.)

#### XIV. GLOSSOCHILUS.

Calyx profunde 5-partitus, lacinias æqualibus linearibus inferius dense ciliatis. Corolla infundibuliformis, subbilabiata, labio superiori bifido, inferiorisque trifidi lacinias laterakibus subæqualibus, mediâ latiore, disco ingueformi inflato reticulato pubescente. Stamina quatuor, prope a basi corollæ inserta, per paria basi conjuncta, didynamæ; antheræ biloculares, loculis semiovalibus muticis parallelis, altero altius inserto. Stigma bifidum, lacinias æqualibus linearibus planis obtusis. Ovarium ovale, compressum, biloculare, loculis biovulatis. Capsula (immatura) membranacea, in medio tetrasperma. Semina compressa, cordata, retinaculis suffulta. Genus proximum Schwabeæ et Russeggeræ, diversum autem ovario quadriovulato, stigmate bilabiato, antheris distincte bilocellatis, locellis imberibus. — Suffrutex Africæ australis, humilis, glandulosopuberulus, foliis parvis crassiusculis integerrimis, floribus axillaribus subsessilibus ebracteatis.

G. BURCHELLII (Burch. cat. geogr. pl. Afr. austr. extratrop. n. 1976 et 2471 in h. DC. n. 620 et 354). Suffruticulus parvus, ramosus, inferne glaber, superne laxe pubescens pilis subcapitatis. Folia crassiuscula, integerrima, obtusa, caulina subspathulata unguicularia, floralia linearis-subcuneata, caulinis longiora, plus minus lanuginosa. Calyx 6 lin. longus, lacinias basi

ciliis albis longis densis veluti connexis. Corolla 7-8 lin. longa, ex campanulato infundibuliformis, puberula, laciniis labii obtusis, labii superioris inferiorisque lateralibus oblongis mediis inferiori ovata, a faucibus ultra medium in disco tumente, palati hujus circumscriptione linguam labio incumbentem referente, venoso rugoso et ad fauces reticulato atque plicis duabus longitudinalibus una utrinque praedito. Antherarum loculus superior duplo fere altius est insertus quam inferior. Ovarium apice, stylus basi hirsuta sunt. Fructus nos latet. (v. s.)

XV. NOMAPHILA Blume bijdr. p. 804. Decaisne in nouv. ann. du mus. 3. p. 387.  
Endl. gen. p. 4040, Meissn. gen. p. 296 (204).

Calyx 5-partitus, laeiniis angustis, superiori paulo longiori et latiori. Corolla subpersonata, labio superiore lato-concavo bilobo, inferiore trilobo diseo inflato earinato hirsuto. Stamina quatuor, labio superiori breviora, per paria basi connata; antheræ subæquales, ovatae, cordatae (violaceæ), loculis parallelis muticis antrorsum contiguis a tergo connectivo oblongo deseritis. Stigma simplex. Capsula angusta, teretiuseula, sexstriata, in dorso sulco notata, ad basin usque bilocularis et seminifera, polysperma. Semina parva, compressa, suborbiculata. Retinacula mediocria, obtusa. — Herbæ in-pascuis et arvis insularum Javæ et Timor atque in Senegambia ercentes. Hygrophile habitu et fructu, Physiehili fere corollæ. Cymulæ axillares, brevipedunculatæ, bisidæ, tri-plurifloræ et tunc capituliformes, floribus sursum secundis. Bracteolæ parvæ, ealyce breviores. Corolla purpurea, palato intensioris coloris. Calyees hirti, subinde glandulosi.

1. N. PETIOLATA (Decne. fl. tim. in nouv. ann. du mus. 3 p. 387), foliis ovalibus integerrimis apice et basi attenuatis longe petiolatis glabriusculis, calycibus pilosulis demum glabrescentibus.  $\mathcal{L}$  In insulâ Timor (Decaisne! l. c., herb. DC. ex mus. paris. n. 368, h. Necs ex ed. h. n. 72). Rami glabri, quadrangulares. Acumen folii obtusiusculum. Cymæ axillares, patentes, petiolum æquantes, pilosæ, pilis basi incrassatis. Bractæ partiales lanceolatae, parvæ. Laciniæ calycis lineares, obtuse; duea inferiores lateralibus paulo angustiores, dorsalis paulo longior et dimidio latior, omnes laciniæ plus minus pilosæ. Flores rosei, tubo calycem vix superante. Capsulæ longitudine calycis, 16-20-spermæ, dorso subtilissime puberulæ, luteæ, valvis post dehiscentiam recurvis. (v. s.)
2. N. STRICTA, foliis ovalibus vel ovali-oblongis repando-subcrenatis in petiolum longum decurrentibus in acumen obtusum attenuatis glabriusculis, cymis axillaris dichotomis calycibusque glanduloso-pilosis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali, loco natali speciatim haud adnotato (h. reg. Monac.!), in Malabarâ (Koenig, in h. Vahl.!), in insulâ Philippinis (Cuming n. 1631 in h. Bentham.!), in Javâ (Labillardière in h. Moricand!) Justicia stricta Vahl symb. 2 p. 6, en. 1 p. 129 et herb.! Justicia pubescens Lam. ill. 1 p. 40, R. et Sch. syst. 1 p. 149. Caulis acute quadrangulus, strictus. Folia cum petiolo  $1\frac{2}{3}$  poll. 5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata. Corymbi axillares, oppositi, petiolo longiores eumve æquantes, bis terni dichotomi, toti pilis patentibus plerisque glanduliferis vestiti. Laciniæ calycis 4 subulatæ, dorsalis linearis longior. Semina 44-48. Nomen strictæ aptius, quam pubescens quod in errorem ducere posset, quum calyces soli pubescentiâ glandulosâ investiantur. (v. s.)
3. N. CORYMBOSA (Bl. bijdr. p. 804), foliis lanceolatis longiter petiolatis utrinque acuminatis integerrimis glabriusculis, corymbis axillaribus dichotomis calycibusque glanduloso-pilosis.  $\mathcal{L}$  In graminosis humidis prope Tjikao provincie Tjanjur insulæ Javæ, Jun.-Septemb. (Blume.) — Hasskarl cat. hort. bogor. alter. p. 148. An eadem ac præcedens? Sunt enim qui folia utrinque attenuata, vel si  $1\frac{1}{2}$ -3 poll. longa et  $1\frac{1}{2}$  poll. lata sint, « lanceolata » appellant.

N. LÆVIS, glabra, foliis lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis sessilibus, cymis axillaribus oppositis gracilibus folia suberquantibus paucifloris calycibusque scabris. (?) In Senegambiâ, in præruptis regni Bondou (Heudelot! ex h. mus. paris. in h. Nees. n. 15). Glaucescens, erecta. Cymæ paucifloræ, bifidæ cum flore intermedio, involucro diphylo lanceolato ad basin divisionis primariae. Pedunculi et reliquæ partes inflorescentiæ pube subtilissimâ brevissimâ vestiti. Corolla 6-7 lin. longa, alba, violaceo-maculata (Heudelot l. e.!).

VI. HYGROPHILA R. Br prodr. fl. nov. holl. 1 p. 479, ed. N. ab E. 3, 1 p. 335, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 80, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 698, Meisn. gen. p. 296 (204). — Eherlea Riddell in h. Hook.!

Calyx tubulosus, ad medium circiter quinquesfidus, laciniis æqualibus. Corolla ringens, labio inferiori in medio convexo ruguloso trifido. Stamina 4, didynama, non exserta, basi subinde per paria connata; antheræ biloculares, loculis parallelis basi divergenti-sagittatis muticis vel submuronatis violaceis. Stigma simplex, subulatum, incurvum. Capsula angusta, teretiuscula, sexstriata, ad basin usque bilocularis et seminifera, polysperma. Semina parva, orbiculata, compressa, læviuscula. Retinacula revia, obtusa. — Herbæ in humidis uliginosis et ad ripas fluminum Americae, Indiae orientalis et Novæ Hollandiæ calidioris crescentes. Radix stolonifera. Caules erecti aut procumbentes, quadranguli. Folia integrerrima vel obliter crenata, supra dense lineolata, ramis costalibus sæpe pluribus lonata, pilosa vel glabra. Flores axillares, cymosoglomerati, verticillos limidiatos integrosve constructurentes. Calycis dentes hirti vel barbati. Corollæ purpureæ vel lutescentes.

#### § 1. *Verticillis florum completis.*

1. H. CONFERTA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 21), herbacea, caule erecto acute quadrangulo, foliis lanceolatis basi apiceque attenuatis longe petiolatis subrepandis glabris supra lineolato-scabris, juvenilibus subinde hirsutis, costis subdenis, verticillis completis, calycibus vix ad medium quinquefidis laciniis setaceis scabris. — Radix repens, stolonifera. Folia 5 poll. longa, 1 poll. lata, acuminata, in petiolum pollicarem decurrentia. Verticilli axillares, approximati. Calyx ad  $\frac{1}{2}$  ab apice quinquefidus, strigiloso-scaber. Corolla 3 lin. longa, tubo calyce paulo longiore. Capsula  $\frac{1}{2}$  poll. longa, lutea, 16-sperma. Ab H. salicifolia differt verticillis integris nec dimidiatis. (v. s.)

α. caule subsimplici ramoso. 2' In Brasiliâ ad flumen Rio dos Indios grande (Pohl! in h. imp. vindob. n. 2113 et 5003), in depressis humidis circa flumen Rio dos Velhas, prope Facenda da Piedade in provinciâ S. Pauli (Sellow! in h. reg. herol. n. 6, 23, 270 et 741, idem in h. Hooker!) Zahlbrucknera conferta Pohl! ic. in h. imp. vindob. n. 5003. Ruellia barbata Vahl! c Brasiliâ in h. gen. berol. Corolla 5 lin. longa. An forma glabra H. longifolia?

β. rubricaulis, caule toto bracteis corollisque purpureis, foliis paulo latioribus. — In Brasilia Februario (Sellow! in h. reg. berol., n. 21, 222 et 239); Bahiâ (Langsdorff in h. Riedel.)

2. H. GUIANENSIS (N. ab E. in Bentb. pl. Schomb. in Lond. journ. bot. 4. p. 634, herb. 291), caule erecto subsimplici profunde quadrangulari lateribus excavatis apice sparsim piloso, foliis lanceolatis basi apiceque modice attenuatis sessilibus subrepandis supra obsolete nec nisi secundum costam medium densius lineolatis basi ciliatis costis 7-8 debilibus subtus hirtulis, verticillis completis paucifloris, calycibus ultra medium 5-fidis laciniis subulatis

sparsim pilosus.  $\mathcal{U}$  In ripâ Essequibo fluvii Guianæ Anglicæ, Decembri (Schomburgk). Differt ab H. confertâ foliis haud petioli longi in speciem basi attenuatis, apice etiam minus attenuatis acuminatae obtusiori. Proxima sane accedit H. lacustri, caule etiam rubro, sed differt hirsutie, licet sparsâ, foliisque brevioribus (2-3 poll. longis 5-6 lin. latâ) statu sicco circa oostam in pagina superiori subinde tanquam nmbrit canesoente a lineolis confertissimis ortâ suffusis, calyce piloso aliisque. Corolla calyce paulo longior. Capsula fusoa. (v. s.)

$\beta.$  angustior, foliis linear-lanceolatis scabris supra indistincte lineolatis subtus basin versus hirtis. In Peruvia (Jussieu! in h. Vahl.) Justicia lithospermifolia Vahl en. 1 p. 151. Specimen herb. Vahl fructiferum sat completum, genus omni dublo soluto comprobat. An propria species sit, an varietas H. Guianensis, haud certo constat.

3. H. LACUSTRIS, caule erecto subsimplici obtuse quadrangulo costulato, foliis lanceolatis basi apiceque parum attenuatis sessilibus integerrimis repandisve glabris margine scabris supra obsolete lineolatis costis subduodenis debilibus, verticillis compleatis multifloris, calycibus ad medium usque quinquefidis lacinia subulatis glabris.  $\mathcal{U}$  In lacu (lagunâ) de Jalapa (Schiede! in h. gen. berol.), in Louisiana (Tainturier! in h. DC. n. 28. Drummond! et Gray! in h. Benth.), Madissonville (Riddell! in h. Hook) Ruellia justiciæflora Hook pl. Drummond in comp. 1 p. 170, Engelm. et Gray pl. Lindheim. p. 22 not. Ruellia lacustris Schlecht. in Linnae 5 p. 96. Eberlea glomerata Riddell! in h. Hook. Distincta ab H. confertâ foliis sessilibus utrinque modice attenuatis et corollâ minore (H. costatae orollâ haud majore.) Caulis crassiusculus, purpureus, basi radice comosâ longè instructus. Flores albi. Variat caule glabro et sparsim piloso. (v. s.)

4. H. OBLONGIFOLIA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 21), herbacea, caule erecto glabro acute quadrangulo lateribus profunde canaliculatis, foliis oblongo-ovalibus repando-subcrenatis costis 7-16-nis supra confertim lineolatis scabriusculis, verticillis compleatis, calycis lacinia setaceis scabris, corollâ calyce duplo longiore.  $\mathcal{U}$  In paludosis ad Capfrio « Braga vermnella » Brasilis (Luschmidt!) Febr. ad August. cum fructu maturo, h. acad. petrop. et Mart.) et circa Rio de Janeiro, Januario, Febr. (Pohl! in h. imp. vindob. n. 5009, Riedel! in h. acad. petrop. n. 1263.) Hygrophila acutangula N. ab E. in Mart. h. fl. bras. p. 265 n. 459. Zahlbrucknera oblongifolia Pohl! ic. in h. vindob. n. 5009 (fructu excluso.) Distinguendam esse consebam ab H. costata, tametsi multis congruat, sed differt caulis lateribus profunde acuteque excavatis angulis acutis, quum illi caulis anguli obtusiores et latera opposita alternatim depresso cum sulculo medio, foliis basi et apice minus attenuatis summis sessilibus obtusiusculis, costis lateralibus foliorum superiorum paucioribus debilioribus magis distantibus scabris strigosulisque, calycis dentibus setulis brevibus scabris nec longis pilis hirsutis (calyx sub anthesi ultra medium, dehiscente fructu sæpe ad basin usque discretis) et corollâ majore, 6-7 lin. longâ, que H. costatae calyce paulo est longior. Folia inferiora subinde pedalia, ramis costalibus 21-22. Capsula semipollicaris, a basi 20-sperma. Semina oompressa, epidermide pulposa dentata marginata et veluti cristata. (v. s.)

$\beta.$  laxior, caule virescente, foliis glabris, ramorum minoribus, verticillitis crebris. In provinçia Bahiâ (Guillot! in h. mus. paris. n. 252.)

5. H. LONGIFOLIA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 21), herbacea, caule erecto ramoso acute quadrangulo, foliis oblongis utrinque attenuatis in petiolum longum decurrentibus repando-crenatis hispidulo-scabris supra confertim lineolatis costis 15-nis, verticillios compleatis supremis in spicam foliosam coeuntibus, calycibus profunde quinquefidis lacinia setaceis pilosis.  $\mathcal{U}$  In Brasiliæ aquaticeis ad Lagoa Dourada provinciæ Minarum Generalium, Februa-

rio (Martius! Sellow! in h. reg. berol.) *Justicia costata* Mart.! in h. Mon. (1) *Ruellia verticillata* Spr. syst. 2 p. 822. Persimilis *H. costata*, sed differt (var.  $\alpha$ ) caule a basi ferme ramoso rami patulis, foliis longioribus utrinque valde attenuatis (fere ut *H. oblongifoliae*) 7 poll. longis 1  $\frac{1}{2}$ -1  $\frac{1}{2}$  poll. latis, et corollâ pallide carneâ nec luteâ. An varietas? *Caulis bipedalis*, succosus, ad nodos incrassatus, inferne rubens! ex Mart. in sohed. n. 864. (v. s.)

$\beta$ . *stricta*, caule strictiori ramisque coarctatis hirsuto. In Serra dos Orgãos provínciae Sebastianopolitanæ (Gardner! in eodem h. et in h. Moricand, Benth. n. 589 et Hook.), in Minis Generalibus, Aug.-Aprilii (Claussen! in h. Hook.), ad paludes prope Capim Fideles, Junio et ad Pau d'Acuscion in humidis provinciæ Montevidensis, Februario (Sellow! in h. reg. berol. n. 9 et 10.) Non differt nisi hirsutus in caule ramisque, etiam, licet rariori, in foliis obviâ et ramis (qui in specimine nostro cuncti florigeri sunt) breviribus erectisque.

$\gamma$ . *hirsuta*, labio superiori profundius (ad medium fere) bifido, reliquis ut in  $\beta$ . An distincta species? In Banda oriental (Tweedie n. 756 in h. Bentham! et Hook!) Consoquita in provínciae Vera Cruz. imp. Mexicanæ, Octobri (Linden n. 126 in h. Hook. et Benth!) Flores rosei.

1. *H. HISPIDA*, herbacea, hirsuta, caule erecto stricto ramoso superne acute quadrangulo, foliis oblongis basi cuneiformibus apice breviter attenuatis acumine obtuso in petiolum brevem decurrentibus subintegerrimis supra confertim lineolatis costis 11-13-nis, verticillis completis multifloris densissimis supremis approximatis, calycibus profunde quinquefidis laciniis setaceis pilosis.  $\mathcal{L}$  In insula Cuba ad S. Juan (Otto! in h. gen. berol. n. 107.) *Ruellia hispida* Rich. Poepp.! in h. Hooker. Proxime affinis est *H. longifoliae*  $\beta$  *hirsutæ*, differt autem staturâ majorâ et imprimis foliis apioem versus haud attenuatis sed in aoumen breve obtusumque coeuntibus, quo fit, ut ad cuneatam figuram magis acoendant. Corolla calyce vix longior, alba, labiis seque longis, superioré ovato apice obtuso bifido, inferiore profunde trifido laciniis subequalibus oblongis obtusis, mediâ glabrâ. (v. s.)

2. *H. RIVULARIS*, hirsuta, caule erecto stricto ramoso superne acute quadrangulo, foliis insimis ovali-oblongis superioribus lanceolatis utrinque argute attenuatis in petiolum longum decurrentibus subintegerrimis supra confertim lineolatis costis duodenis, verticillis completis, calycibus vix ad medium quinquefidis laciniis setaceis pilosis.  $\mathcal{L}$  In rivulis Cuesta grande de Chiconquaco, imperi Mexicanæ (Schiede! in h. berol.), Nova Granada ad ripas rivulorum, (h. Hooker!) *Ruellia rivularis* Schlechtend. Linn. 7 p. 396. Ab *H. hispida* differt foliis apice et basi valde attenuatis acumine acuto. Corolla lilacina (alba) calyce paulo longior. (v. s.)

3. *H. SCHOTTIANA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 22), herbacea, caule erecto obtuse quadrangulo lateribus sulcatis, foliis ovalibus utrinque angustioribus apice obtusis basi acutis repando-subcrenatis supra confertim lineolatis undique subtusque ad costas scabris costis novemis, verticillis completis glomeratis, calycibus profunde quinquefidis laciniis setaceis hirsutis.  $\mathcal{L}$  In Brasilia (Schott! in h. imp. vindob. n. 5972.), Serra La Santa Brida in prov. Goyaz, Februario (Gardner n. 3951 in h. Hook.) Species hinc *H. oblongifoliae* accedens, at diversa caule obtusangulo calycibusque hirsutis, illinc *H. costata*, a quâ differt costis foliorum paucioribus debilioribus præsertim in foliis inferioribus distantibus minus attenuatis, inferioribus penitus obtusis floribusque majoribus (*H. oblongifoliae*) labio superiori profundius bifido. Ab *H. helode* recedit foliis subtilissimis setulis scabris. Glomeruli axillares densi,

(1) Nomen triviale mutandum erat, quum pridem a nobis descripta extet species ejusdem omnino.

*multiflori*, bracteis cuneiformi-lanceolatis (iufmis oblongo-lanceolatis) calyces sequantibus. (v. s.)

9. *H. GLANDULIFERA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 22) herbacea, caule erecto tetragono apice foliisque superioribus pubescentibus, foliis oblongo-ovalibus utrinque angustioribus apice obtusis basi in petiolum acute decurrentibus integrerrimis, inferioribus glabris, costis quinis-septenis debilibus, verticillis completis glomeratis, calycibus glandulosis infra medium quinquefidis lacinias setaceis.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ : Cujabá, Mato Grosso (Manso ! in h. Mart. n. 220.) Ab H. Schottianâ et ostantâ differt costis foliorum debilioribus minus conspicuis paucioribus, venosis, ab II. oblongifolia et longifolia caule obtusangulo, lateribus planis, alternis angusto sulcule notatis, ab omnibus autem calycibus pilis capitatis vestitis. Caulis basi glaber, confertim lineolatus, superne patentius-pubescentis. Glomeruli verticillares densi, subinde opposito deficiente. Calyx 4 lin. longus. Corolla pallida, usque ad apicem labii superioris semilinearis, labio superiori profunde bifido lacinias obtusis. (v. s.)

10. *H. PUNESCENS*, caule acute quadrangulo lateribus profundis, foliis oblongis obtusiusculis subiugerrimis basi cuneatâ sessilis, ramis costalibus novenisi denisive debilibus, verticillis completis densis, bracteis oblongis flores aequantibus, calyce ad medium usque quinquefido pubescens-hirto lacinias setaceis, corollâ calyce paulo longiore angusta.  $\mathcal{L}$  In paludosis fluvii La Plata (Tweedie! in h. Hooker.) Similis *H. longifolia*, sed differt floribus minoribus, et II. costatae, cui foliorum costae sunt plures et validiores. Folia magis quam in utrâque sessilia. Pubescensia densa, at brevis et mollis. (v. s.)

11. *H. COSTATA* (N. ab E. in Amoen. bot. bonn. 2 p. 7 t. 3 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 22), herbacea, caule erecto subsimplici scabro quadrangulo angulis carinatis, foliis ovalibus acuminatis acumine saepè acuto repandocrenatis in petiolum attenuatis supra confertim lineolatis costis scabris 15-nis, verticillis completis, calycibus profunde 5-fidis lacinias setaccis hirtis.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ : ad rivulos in uliginosis juxta Rio Paquaquer, Januario (Max. Princ. Vid.), prope Rio de Janeiro (Schott ! in h. imp. vindob. n. 5008, 5964), in Bahia (b. DC.!), (Schlow! in h. gen. berol. n. 259.) Zahlbrucknera micrantha Pohl! ie. in h. imp. vindob. n. 5764. Ruellia salicifolia Salzmann ! in h. acad. petrop. Pedicularis sessilis Vell. fl. flum. 3 t. 103? Radix stolonifera. Flores lutescentes. Stamina minora majoribus basi adnata, anthera minori praedita. Variat foliis omnibus acutis superioribusque obtusis, qualia sunt in Zahlbrucknera micrantha Pohlii, tum etiam foliis latioribus et angustioribus. Distincta a reliquis plerisque affinibus corollâ duplo fere minore. (v. v. in h. boni. et s.)

$\beta.$  *angustifolia*, foliis lanceolatis. — In humidis provincie S. Pauli (Lund ! in h. DC. n. 12), Bahia (Blanchet pl. bras. n. 729 et 1130 in h. Moricand.), insulâ S. Catharinæ (Bacle ! in eod. h.), ad fossas prope Jllaos (Riedel ! in h. acad. petrop. n. 0,3), (Salzmann ! in eod. h.). Justicia Marrubiastrum Blanchet ! in h. Benth., Salzmann ! in h. Hook. Hahita notisque adlatiss. recedit, sed foliorum et florum verâ indeo congruit. Caulis est glaber. In hac solâ specie capsula semel occurrebat trivalvis, receptaculis seminum tribus, retinaculis etiam completis prædicta, qua sane aberratio solitâ structurâ cum costarum folii auctâ multitudine ad enndem fontem referenda esse videtur eoque magis mihi persuasit, ut varietatem ducere quam speciem propriam mallem.

$\gamma.$  *aurea*, foliis basi cuneatâ sessilibus argute acuminatis costis 15-21, caule apice ramoso, ramis microphyllis gracilibus florigeris. Prope Rio de Janeiro, prope Mandiocam ejusdem provincie, locis inundatis graminosis, Januario-Aprili (Riedel ! in h. acad. petrop. n. 0,50), in paludibus ad pedem montium Serra de Araripo et in ripis fluminis Aterato (Gardner ! n. 1812 et 1813 in h. Hook.) Flores parvi, cœrulei (Gardner !) An distincta species?

- δ.* *strobilantha*, foliis basi cuneatâ sessilibus apice obtusis in seculis cum caule scabriusculis, ramulis florigeris folio brevioribus apice subcapitato-specieris, foliis floralibus parvis oblongis imbricatis apice squarroso-patulis. In provinciâ Minarum Generalium (Claussen ! in h. mus. paris. n. 226). Est tanquam status juvenilis var. *γ.* *Caulis* versus apicem et petioli rubiginoso-puberuli.
- ε.* *H. HELODES* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 23), herbacea caule basi repente geniculato profunde quadrangulo pubescente (glabrescente ?), foliis ovalibus obtusiusculis obsolete crenulatis subtus confertim lineo-lato-punctatis utrinque strigiloso-velutinis in petiolum brevem attenuatis costis septenatis, infimis subtrotundis distantibus, verticillis completis, calycibus profunde quinquefidis laciniis setaceis hispidis. — In paludosis ad urbem S. Pauli provinciae ejusdem nominis, Januario (Martius ! planta imperf.), (Sellow ! in h. reg. berol. n. 18, 19 et 240). *H. costatae* similis statuque sterili Menthiam Nummulariam Schreb. fingit. Folia inferiora caulinumque sterilium distantia, suborbiculata, basi in brevem petiolum attenuata, integerrima, minus velutina et potius subvillosa; caulina media ovalia, obtusa, basi cuneata, in petiolum brevem attenuata; superiora approximata, brevissime petiolata, apice parum acutata at obtuso acumine aut omnino obtusa, basi subinde obtusa vel subacutata, inæqualia, ovata vel ovato-elliptica, setulis brevibus incumbentibus dense velutino-scabra, crenulata, costis apicem versus cyanescensibus. Calyces ut in *H. costatae*. Corolla paulo major. Variat foliis floralibus subtrotundis et in aliis fere lanceolatis, hic habitus plantæ eximie variabilis. (v. s.)
- β.* *multiflora*, caule inferne glabrescente, ramis elongatis, verticillis pluribus approximatim multifloris, foliis floralibus oblongis obtusis subrepandis laxe strigilosis saepè parvis, ramis costatis 4-6. — In Brasiliæ: provinciâ Cearâ (Gardner ! in h. Benth. n. 1813 et 1814), in Brasiliâ tropicâ (Boaz ! in h. Benth. ex h. Hook.). Forma dubia, sed, uti videtur, notis intermediiis formæ communi connexa. Folia primaria desunt. Verticilli in ramis et caulis summatibus 12-15, extremis confluentibus. Corolla ut in *α.* Capsula calyce paulo longior, lutea, 16-sperma. Calyces fructus maturi albi. An distincta species?
- δ.* *H. LATIFOLIA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 24), hirsuta, foliis ovatis acumine obtuso repando-crenatis basi acutis, inferioribus in petiolum longum decurrentibus, costis 13-8, verticillis completis multifloris, calycibus infra medium divisis laciniis subulatis. *Ζ.* In Brasiliæ prov. S. Pauli (Guillemin ! in h. mus. paris. n. 247). Differt a reliquis (exceptâ *H. hirsutâ*) hirsutis omnium partium, corollam si excipit, patente albâ e setis articulatis constante et foliis latioribus (infimis cum petiolo 1  $\frac{1}{4}$  poll. longo) 5 poll. longis 2 poll. et quod excedit latis. Caulis quadrisulcatus, angulis carinatis. Folia ramea minora, petiolo brevissimo, basi tamen acuta nec obtusa. Corolla calyce longior. Antherae violaceæ. (v. s.)
- ι.* *H. OVATA*, hirsuta, foliis ovatis acumine obtuso repando-crenatis costis octonis, verticillis completis multifloris, calycibus ad medium usque divisis laciniis subulatis. *Ζ.* in Brasiliâ (Schueh ! in h. imp. vindob. et h. DC. n. 568 absque annotatione). Differt a reliquis hirsutis omnium partium (exceptâ corolla) patente albida e setis articulatis constante et foliis revera ovatis 1  $\frac{1}{4}$ -2 poll. longis 1  $\frac{1}{4}$ -1 poll. latis basi obtusis. Petioli breves, hirsutissimi. Corolla generis 5 lin. longa. An forma minor praecedentis? (v. s.)
- ι.* *H. QUADRIVALVIS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 80, Wight ! h. propr. n. 1933 !), herbacea ?, caule erecto, foliis oblongis repando-subdentatis dense lineolatis supra punctulatis plus minus hirsutis, floribus verticillatis, verticillis completis, calycis ad medium fere quinquefidis laciniis subulato-attenuatis apice labioque corollæ inferiori barbatis. *Ζ.* In Indiâ orientali: Dhomhoa (Hamilt.), Tavoy (Wall.), Tingapur (Lobb ! n. 57, in h. Hook.), Pegu (Reynaud ! in h. Nees. ex h. mus. paris. n. 96), Mergui (Griffith ! in h. Hook.), Ceylon

(Walker! n. 14, 93 et 106 in h. Hook.), in Manillâ (Chamisso! in h. gen. berol.). *Ruellia quadrivalvis* h. Hamilt.! Wall. cat. n. 2374 a, c, d. *Ruellia salicifolia* h. madr.! (Wall. cat. n. 2374 b.). *Ruellia barbata* Vahl! symb. p. 83 et herb., Willd. sp. pl. 3, 1 p. 373? *Rami totragonii*, lateribus concavis, lineolati, glabri. Folia inferiora 6-7 poll., superiora 4-5 poll. longa, haec et illa 1  $\frac{1}{2}$ -1  $\frac{1}{2}$  poll. lata (in varietate  $\beta$  caulina angustiora sunt et fere lanceolata), in petiolum longum basi ciliolatum decurrentia, obtusa, subrepanda, quandoque evidenter denticulata, utrinque deuse lineolata, supra præterea punctulata, totū superficie hirsuta, vel ad costam et venas quandoque setulis dispersa hirsutula, margineque ciliato-scabra, quandoque omnino glabra, obscure viridia; vena approximator arcuata, simplices. Folia floralia minoria. Bractæ ad singulum florem duæ, opposite, calyce breviores, lanceolatæ, obtuse vel membranaceo-cuspidulatæ, cuspide in setulas albas dilacerato, vel etiam apice simpliciter barbata, ciliatae, lineolatae. Calyx cylindraceo-pentagonus, sub-5-fidus, lineolatus, glaber, lacinias æquilibus triangulari-subulatis ciliatis apice barbatis. Corolla oociter 9 lin. longa, glabra, purpurea; tubus cylindricus, fauce inflatæ; labium superius oblongum, bifidum, concavum, late reflexum; inferius latius, supra convexum et versus fauces pilis flavis barbatum, trifidum, lacinias obtusis media latiori. Capsula lanceolata, calyce longior, pallido fusca. Capsula hæo in specie non magis atque in aliis hujus generis quadrivalvis, nec nisi suturæ disseplnamenti et valvulis æque distinctis fngens ejusmodi dehiscentiam; nomen Itaque non optime congruum. (v. s.)

$\beta.$  *subhirta*, oaulis articulis superioribus sparsim pilosis foliisque floralibus superioribus hirtis, calycisque etiam lacinias magis hirsutis. In Pegu (Reynaud! in h. mus. paris. et Nees. n. 95). Folia summa ovata.

16. *H. ASSURGENS*, herbacea, caule basi repente dein erecto, foliis obovato-oblongis lanceolatibus integrerrimis undatoe subcrenatis dense lineolatis supra punctulatis, floribus verticillatis verticillis (plerisq[ue]) completis, calycis ad  $\frac{1}{2}$  quinquefidi lacinias lanceolatis acutis apice brevissime barbatis, corollæ labi inferiori barbato.  $\mathcal{L}$  In paludosis Bataviae et circa Buitenzorg (Labillardière Blume, Junghuhn!), in Philippinis (Cuming! n. 992 in h. gen. berol. e Benth.), Chiua (Staunton! h. DC. n. 176 ex h. Lambert), in Indiâ orientali (Schumacher! in h. Vahl). H. undulata Bl. bijdr. p. 803 (nec Vahl). Zollinger! pl. jav. n. 297 in h. DC. n. 815 et Benth., Cuming! n. 477 in h. gen. berol. et in h. Hook!. Variat foliis latioribus et angustioribus hirsutis et fere glabris, corollæ etiam magnitudine. Cante distinguenda ab *H. quadrivalvi* statu humiliore, caule basi valde repente hinc stricte arrecto, foliis minoribus (1-1  $\frac{1}{2}$  poll.) magis obtusis margine plerumque undulatis ibidemque semper plerumque et in costâ et venis subtus pilosis scabrisse, verticillis 6-floris quandoque et incompletis, capitulo alterius lateri solo obvio bi-trifloro, maxim antem calyce paulo ultra  $\frac{1}{2}$  a limbo diviso, laciiniis haud adeo attenuatis et fer setaceis, sed solummodo lanceolatis acutisque, neque apice evidenter barbatis. Corollæ et capsule structure et pubescencia illius, eadem omnino ac in *H. quadrivalvi*. *Hygrophila barbata* Vahl, utrum ad var. *angustifoliam* *H. quadrivalvis*, an potius ad nostram *H. assurgentem* pertineat, vix, nisi patru deuce, dijudicabis. (v. s.)

$\beta.$  *nana*, caule humili (1-2-pollicari), foliis utrinque hirtis obtuse mucronatis  $\frac{3}{4}$ -1 poll. longis, floribus solitariis oppositis alternis, labio inferiore sparsim pilosulo, capsula calyce vix longiore. In Philippinis (Cuming! n. 992 in h. Hook. etiam in h. gen. berol.).

17. *H. PHLOMOIDES* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 80), herbacea, basi repens; caule quadrangulo foliisque oblongo-ellipticis subcrenatis sessilibus hirsutis, floribus verticillatis, bracteis propriis calycibusque hirsutissimis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali ad Sillet (Wallich!). *Ruellia phlomoides* Wall. cat. 2376 a, b. *Hygrophila undulata* Wall. cat. suppl. n. 117 (olim). *Cardanthera longifolia* h. Hamilt.! in h. Bentham. Herba specie *Prunella vulgaris* vel *Marrubii* cujusdam. Folia sesquipollucaria, 8 lin. lata, elliptico-oblonga, obtusius-

cula, in brevem petiolum attenuata, integerrima vel denticulis parvis praedita, dense penninervia, utrinque hirsuta. Bractæ propriæ geminæ, glomerulum cingentes et interstingentes; quarum exteriores duæ vel quatuor majores, ovatae vel ovato-oblongæ, interiores lanceolatae, intimæ parvae, lineares, omnes subrotundatae, integerrimæ, dorso hirsutissimæ. Calyx 4 lin. longus, tubulosus, ad  $\frac{2}{3}$  quinquefidi, tubo inferne glabro, superne laciniiisque setis albis hirsutissimis; laciniae linearis-attenuatae, erectæ, 2 inferiores, tum 2 medie, suprema denique longiores. Corolla semipollucaris, ringens, purpurca; tubus pubescens, fauoc inflata; labium superius ovatum, bidentatum, apicem versus ad nervos hirsutum; inferius trilobum, lobis obtusis conniventibus, palato convexo, subitus ad nervos hirsutum. Capsula lanceolata, compressa, glabra, 4-5 lin. longa. ( v. s. )

$\beta$ . *longifolia*, foliis lanceolatis integerrimis apice magis basi parum attenuatis, verticillis subinde dimidiatis. In Assam superiori ( Jenkins ! in h. Hook. et Benth. ).

. H. INCANA, caule procumbente ramis adscendentibus erecto-tetragono geniculato adulta glabriuscule, foliis lanceolatis integerrimis subsessilibus incano-villosis, floribus verticillatis verticillis completis, bracteis propriis calycibusque hirsutissimis.  $\mathcal{C}$  In Indiâ orientali ad Chittagong ( Roxburgh , Klein ! in h. Willd. ). Ruellia hirsuta Roxb. fl. ind. 3 p. 51. Ruellia mollissima Klein ! in h. Willd. l. c. ( nec Vahl ). Similis H. phlomoidi, sed differt foliis angustioribus villis deusis tectis et propterea incanis. ( v. s. )

. H. ANGUSTIFOLIA ( R. Br. prodr. fl. nov. holl. p. 479, ed. germ. N. ab. E. 3. 1 p. 335 ), herbacea, foliis lanceolato-linearibus paribus approximatis, axillis pilosis, caulis internodiis superioribus corollâ brevioribus.  $\mathcal{C}$  In littoribus Novæ Hollandiæ intra tropicum tam orientalibus quam septentrionalibus ( Banks , R. Brown ), Port Essington , Raffles Bay ( Armstrong ! in h. Hook. et h. Benth. ), Van Diemens Gulf ( h. Hooker. ! ). Congruunt in hoc specimine characteres plurimi, a cl. R. Brown adnotati. Corolla et calyx omnino quales in H. adscendente, sed corolla paulo est angustior, labium inferius autem, ut illi, barbatum. Caulis et foœa glabra sunt. Folia angusta, longa, ut in diagnosi. Flores cerulei. ( v. s. )

### § 2. *Verticillis dimidiatis*.

. H. OBOVATA ( N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81 ), herbacea, caule erecto, foliis caulinis oblongis ramorum obovatis obtusis in petiolum attenuatis subintegerrimis supra subtus ad costas hirsutulis, floribus dimidiato-verticillatis, calycis quinquefidi lacinis apice labioque corollæ inferiori barbatis. — Ex hort. b. Calc. ( Hamilt. et Wallich ), Chittagong, locis uidis ( Roxburgh , Hornemann ). Mergui ( Griffith ! in h. Hook. ). Ruellia obovata Roxb. fl. ind. or. 3 p. 51, Wall. cat. n. 2375 a, b, Hornem. hort. hawn. suppl. p. 144. Nir-schulli Rheed. mal. 2 t. 46. Ab H. quadrivalvi præsertim differt verticillis dimidiatis nec florum oppositione completis, tum foliis minoribus 2  $\frac{1}{4}$ -2  $\frac{1}{2}$  poll. longis 7-8 lin. latis, ramorum duplo brevioribus obovatis, omnibus in petiolum brevem cuneiformi-attenuatis obtusis vix repandis vel crenulatis supra setulis dispersis hirsutulis subtus ad costas venasque pubescenti-hirtis. Bractæ exteriores ellipticæ, obtusæ, longitudine verticilli ; interiores oblongæ, obtusæ, calyce breviores, hæ omnes ciliolatae. Calyx ut in H. quadrivalvi , neque minus etiam corolla, quæ lutei coloris fuisse videtur. Antherae muticæ. Fructus deest. ( v. s. )

. H. UNDULATA ( N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81 ), herbacea, caule erecto, foliis ovatis obtusis repando-subcrenatis dense lineolatis supra punctulatis ad costas et nervos scabriusculis, floribus dimidiato-verticillatis, calycis quinquefidi laciniis ciliatis, labio corollæ inferiori barbato.  $\mathcal{C}$  In Promontoribus regni Avia ( Guil. Gomez ). Ruellia undulata Vahl ! symb. 3 p. 82 et h. Willd. sp. pl. 3 p. 369 , h. Willd. ! n. 11642 et h. Schreb. !

- H. dimidiata* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81, Wall. cat. n. 7150! (Klein! in h. Willd.). Simillima *H. quadrivalvi*; differt foliis ovatis 3 poll. (enm petiolo) longis, 1  $\frac{1}{2}$  poll. latis, in ramis minoribus ovato-subrotundis, costis et nervis non hirtis sed securifusculis setulis nudo oculo inconspicuis, verticillis dimidiatis scilicet floribus in alterius tantummodo folii axilla agglomeratis, pluribus (12-16) in singulo semiverticillo, corollis duplo minoribus 4-5 lin. longis. (v. s.)
22. *H. RADICANS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81), herbacea, caule procumbente repente foliisque oblongis utrinque acutis repando-subcrenatis lineolatis glabris, verticillis dimidiatis, calycis lacinii subulatis hirsutis.  $\mathcal{L}$  In Indiæ orientali ad Sillet. *Ruellia radicans* Wall. cat. n. 2410. *Ruellia salicifolia* Wall. cat. n. 2373 F., in h. gen. berol. Ab *H. salicifolia* differt: caule procumbente ad genicula radicante lineolato quidem attamen levi, foliis brevioribus 1  $\frac{1}{2}$  poll. longis 6-8 lin. latis utrinque minus acuminatis glabris, capitulis angustioribus plerumque trifloris, floribus minoribus angustioribus, antheris basi muticis. Menthæ arvensis, angustiori folio, sureolum haud male refert hæc planta! (v. s.)
23. *H. SALICIFOLIA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81), herbacea, caule erecto foliisque lanceolatis utrinque acuminitatis lineolatis circa costas securifusculis, verticillis dimidiatis, calycis lacinii subulatis hirsutis.  $\mathcal{L}$  In humidis et inundatis Indiae orientalis: in Gualpurā, in Sillet (Wall.), Assam (Jenkins! in h. Hook.), insula Ceylau (Walker! in h. Hook. et Benth.) *Ruellia salicifolia* Vahl! symb. 3 p. 84 et herb. Willd. sp. pl. 3, 1 p. 374, Spr. syst. 2 p. 822, Roxb. fl. ind. 1 p. 50, Wall. cat. n. 2373 a, b, c, d, f. *Ruellia longifolia* h. madr.! Wall. cat. n. 2373 b, Roth nov. pl. sp. p. 306, Spr. syst. 2 p. 825. Variat magnitudine palmari-pedali, foliis brevioribus vel longioribus. Folia infima et stolonum radicalium minor, quandoque vir  $\frac{1}{2}$  poll. longa, obovata vel oblonga, obtusiuscula. Omnia folia supra densissime lineolata et obsolete punctata. Capitulum axillare, ad typum 7-florum, tribus utrinque floribus et uno medio; terni laterales flores binis, medius singulū gaudent bracteæ oblongo-lanceolatæ ciliatæ calycis longitudine. Capitule oppositum plerumque nascitur ramus, brevi spatio florigerus; rarius ejus loco capitulum verticillum perficit. Bracteolæ sub singulo flore duæ, linear-acuminatae, carinate, calyce nonnihil breviores; medio flori desunt. Calyx ultra medium 5-fidus, lacinii anguste subulatis valde hirsutis, superâ paulo longiore. Corolla circiter 3 lineas longa, pallida; tubus longitudine calycis; labium superius et inferius subæqualia, margine reflexa, illud bidentatum, hoc trifidum lacinulis brevibus; palatum convexum biplicatum, plicis flavo barbatis. Antheræ violaceæ, locellis basi brevissime mucronatis. Capsula semipollucaris, angusta, comppresso-tetragona, acuta, glabra, punctulis præsertim in latere suturali exasperata. Semina in quoque loculo 7-8. Exempla ramosiora ad verbum fere respondent descriptioni *Ruellie longifoliae*, a cl. Rothio in novis plant. spec. p. 306 expositæ, repugnant autem verba: « calyx ad basin usque quinquepartitus foliola linearia, tereta, etc. » quæ prodere viderentur plantam Rothianam *Hygrophila* non esse generis, nisi ipsimet vidisset genuinum specimen *Hygrophila salicifoliae*, *longifoliae* nomine inscripto, ex Heynei herbario ad Schleymeyerum delatum. (v. s.)
- B. linearis*, foliis lanceolato-linearibus angustis. In Philippinis (Cuming!) n. 1661 in h. Benth. et Hook.)
24. *H. PORTORICENSIS*, glabra, caule erecto ramoso quadrangulo angulis acute costulatis, foliis oblongo-lanceolatis in petiolum brevem decurrentibus repando-crenatis margine lævibus supra sparsim lineolatis costis 12-15, verticillis dimidiatis?, calycibus ad medium usque quinquefidis lacinii subulatis securifusculis.  $\mathcal{L}$  In Portorico fossili (Bertero! in h. DC. ex h. Balbis). *Ruellia* ex Am. merid. (West! in h. Vahl). *Ruellia salicifolia* Bert! in h. DC. n. 533 et in h. gen. berol. *Ruellia Brasiliensis* Spr. syst. 2 p. 822? Similis *H. salicifoliae*, sed differt calycibus glabris. Caulis purpureus. (v. s.)

VII. GYMNSTACHYUM N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 106, Lindt.  
intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 705, Meisn. gen. p. 296 (204).

Calyx quinquepartitus, lacinia superiori subinde breviori. Corolla bilata, labio superiori angustiori bidentato, inferiori trifido. Stanina duo, ibo infra medium inserta, inclusa; sterilium rudimenta nulla. Antheræ loculares, loculis æquibus parallele contiguis altero aut utroque basi ucronatis, ubi unimucronatis ibi subinde antheræ uniloculares. Stigma fidum, lacinii compressis. Capsula tetragona, a basi ad apicem bilobata et seminigra, 42-sperma. — Herbae Indiae orientalis. Habitus ranthemi. Caulis humilis. — Racemus spiciformis, gracilis, subsecundus, mplex vel 2-3-fidus, e floribus distantibus brevissime pedicellatis. Bractæ exiguæ, subulatae, suboppositæ, altera sterili paulo inferiori. Bracteolæ illæ, in alterâ racemus similis e floribus fasciculato-ternis, lateralibus bracteolatis.

G. LEPTOSTACHYUM (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 106, Wall. cat. n. 7178), spicis terminalibus binis, floribus solitariis distantibus subsecundis, foliis oblongis utrinque attenuatis obtusis supra pilosis subtus glabris, superioribus acutis, antheris linearibus basi bicalcaratis.  $\mathcal{L}$  In India orientali ad Tavoy (Fr. Gomez). Caulis semipedatus, basi radicans, subtetragonous hirsutus. Folia inferiore 4-5 poll. longa, 1  $\frac{1}{4}$ -1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, oblonga, in longum petiolum decurrentia, infima obtusa, superiora acuminata, supra pilis inspersa, subtus ad costas prominulas scabra. Bractæ sub singulo flore singulæ, subulatae, pubescentes, calyce duplo breviores; laterales nulla. Calyx ad basin fere quinquepartitus, glanduloso-pubescent, lacinii angustis lanceolato-linearibus acuminatis; superiori angustiori magis patente. Corollæ alabastrum in nostris exemplis 4 lin. longum, calyce plus duplo longius, clavatum, pubescens-viscidum, purpurascens; limbus bilabiatus, labio inferiori superius amplectente. Filamenta linearia, glabra, tube medio inserta, ad basin tubi decurrentia; antheræ lineares, longæ, loculis parallelis inferne contiguis et basi in parvam aristam recurvam excurrentibus sursum acuminatis ideoque divergentibus, ut inter acumina spatium angustum obverse triangulare quasi locellus tertius medius sterilis reliquitur. Pistillum hirtum; ovarium oblongum; stylus longus, apice tenuior spiralis; stigma bifidum?. Fructus latet. ( v. s. )

. G. JAVANICUM (N. ab E. in Zollinger pl. jav. n. 1392), spicâ terminali solitariâ, floribus solitariis subdistantibus subsecundis, foliis ovali-oblongis obtusis basi acutâ in petiolum brevem decurrentibus utrinque pilosis.  $\mathcal{L}$  In Javâ (Zollinger in h. DC. n. 828.). Persimile G. leptostachyo, differt foliis minoribus 1  $\frac{1}{2}$ -3 poll. cum petiolo longis et 6-9 lin. latis, omnibus conformibus et superioribus tantum ad apicem paulo angustioribus neque tamen acutis, pilositate distinctiori et spicâ solitaria paulo densiore. ( v. s. )

. G. CEYLANICUM (W. Arn. et N. ab E.), floribus in racemo fasciculatis, fasciculis distantibus, pedicellis lateralibus bibracteolatis, foliis oblongo-ovalibus obtusis basi acutis subtus tenuissime pubescenti-tomentosis, antheris ovalibus basi unicarcaratis, caule calycibusque glanduloso-hirsutis.  $\mathcal{L}$  In Ceylan (Walker! n. 207 in h. Hook. et Arnott.). Adeo est simile G. leptostachyo ut generis typum e longinquò dignoscas. Caulis ut in illo humilis, 1-2 poll. longus, basi repens, dein ascendens, hirsutus. Folia infima spatulata, unguiculata, deinde paria 2-3 approximata, 2-3 poll. (cum petiolo 1-1-policari) longa, 1 poll. lata, obtusa, in petiolum attenuata, supra confertim lineolata et hinc inde setulâ adpressâ subtus dense et tenuissime cano-tomentosula, nervis costalibus 5-7-nis minus ac in illâ prominulis. Tum, ubi racemus terminalis dividitur, accedunt folia semipollicaria et subrotunda. Racemus terminalis vel simplex vel trifidus 2  $\frac{1}{2}$ -4 poll. longus, pedunculatus, cum pe-

dicellis bracteis floribusque cano-pubescentibus. Flores oppositi terni in fasciculo, paribus ejusmodi 6-8 distantibus. Bracteæ et bracteolæ linearæ, angustæ, bracteæ infimæ 2 lin., reliqua uti bracteolæ circiter lineam longæ. Pedicelli linearæ, calycæ 2 lin. longi; hi profunde 5-partiti laciniaæ equalibus subulatis. Corolla 5 lin. longa, tubo cum faucibus elongatis subcylindricis, limbo bilabiato, labio superiori breviori bifido, inferiori trifido, laciniaæ ovatis obtusis apice viridibus; reliqua corolla videtur purpurascens. Capsula 5 lin. longa, tetragona, angusta, pubescentia, a basi ad apicem bilocellata. Semina iu quoque loculo 6, a basi ad apicem aequidistantia, sed inferiora tria videntur abortiva retinaculis minimis, reliqua retinacula conica, brevia. (v. s.)

4. *G. CUMINGIANUM*, floribus in racemo fasciculatis fasciculis distantibus, pedicellis brevissimis lateralibus bibracteolatis, foliis ovalibus obtusis e basi rotundatæ cuneatim in petiolum longiusculum coeuntibus supra sparsim pilosulis subtus pubescentibus, antheris linear-lanceolatis uni-bilocularibus basi uni-bicalcaratis, calycibus glanduloso-scabris.  $\mathcal{U}$  In Philippinis (Cuming! n. 589, in h. gen. berol., Benth. et Hook.). Similis *G. Ceylanico*, a quo differt foliis basi rotundatis hinc abruptum in petiolum euueiformi-desinontibus mollioribus, calycibusque fere glabris. (v. s.)
5. *G. AFFINE*, caule herbaceo petiolisque tomentoso-hirtis, foliis glabris ovatis obtusis basi rotundatis vel in petiolum inæqualiter acutæque desinentibus, spicis axillaribus terminalibusque densis pedunculatis bi-trifidis folia æquantiibus, floribus oppositis, calycis ad medium quinquefidis glabri laciniaæ subulatis.  $\mathcal{U}$  In Philippinis (Cuming! n. 1719 in h. Hook.). Folia ampliora quam in *G. Cumingiano*, 5 poll. longa,  $2\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$  poll. lata, supra punctata. Labii inferioris corollæ laciniaæ acute. Antheræ basi inæqualiter bimucronatae. (v. s.)

XVIII. CRYPTOPHRAGMIUM N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 100, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 704, Meissn. gen. p. 296 (204). — Justiciæ spec. Wall.

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla vel bilabiata vel ringens, tubo recto aut incurvo. Stamina duo, latere infero tubi inserta. Antheræ bilocularis, antice maxime contiguae rimâque simplici dehiscentes, loculi fundo septo communi bilamellato diviso. Capsula tetragona, bilocularis septo adnato, polysperma, a basi seminifera. Semina retinaculis sustensa. — Ilcrbæ Indiæ orientalis, sæpe ramosissimæ, foliis dentatis vel repando-dentatis, floribus nutantibus purpurascens. Flores in cymulas parvas plus minus regulariter bifidos cum interjecto flore medio dispositi; cymulis rarius axillaribus maximeque perfectis, plerisque subglobulariformibus aut ad paucos flores unumve solum redactis racemos seu spicas subsecundas in speciem nudas caulem terminantes exstruentibus. Bracteæ et bracteolæ parvæ, subæquales.

1. *C. VENUSTUM* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 100), spicâ terminali compositâ brachiata, foliis ellipticis in petiolum alate decurrentibus denticulatis scabris, corollâ calyce multo longiore. — In Sillet (Guil. Gomez), Kasuga (Griffith! in h. Hook.) et in hort. bot. calc. Justicia venusta Wall. pl. as. rar. 3 p. 53 t. 66. Justicia venusta cat. n. 2470 a, b. Justicia amabilis Wall. cat. suppl. n. 71 et 111 (olim!), herb. gen. berol. et hort. bot. berol. Caulis (pars brevis adest) compresso-tetragona, canescensc-scabra. Folia cum petiolo laminam subæquante fere pedalia, in cultâ plantâ sesquipedalia,  $2\frac{1}{2}-4$  pollices lata, ovata vel elliptica, acuminata, minute denticulata, in petiolum brcvem carinatum hispido-tomentosum late decurrentia, multi-costata, ntrinque scabra, supra lineolata, costâ sulcatâ venisque arcuatis suboppositis hispido-scaberrima. Bracteæ sub ortu ramorum parvæ, spathulatae, acutæ, scabré; superiores linearæ; bractea infra glomerulum parva, subulata. Calyx sessilis infra medium ulteriusque quinquefidus, cum pedicello et bracteolis

dense glandulos-pubescent scaber. Bracteolæ ad basin calycis lateralis duæ exiguae, subulatae; medii floris nullæ. Corolla fere pollicaris, calyce multoties longior, pubescens, purpurea; tubus rectus, sursum conico-dilatatus; limbus ringens, labio superiori concavo bifido, inferiori trifido lacinia oblongis obtusis subæqualibus. Capsula circiter semipollucaris, angusta, columnaris, tetragona, quadrisulca, pallida, glandulos-scabra, mucronulata. Disseminatum adnatum. Semina (immatura) a basi pericarpii alterna, duodenæ circiter ex utroque latere, cordata. Retinacula subulata, patula. (v. s.)

*C. SERRULATUM*, spicis axillaribus trichotomis ramis secundifloris foliisque ovatis acutis in petiolum contractis crenato-dentatis pubescenti-scabris, capsulâ calyce triplo longiore. — Locus nat. non notatus est. Vidi ex herb. madr. et Heyne! *Justicia serrulata* h. Heyne! Wall. cat. n. 2452 a. *Justicia spec. h. madr.* ! Wall. cat. n. 2452 b. Tota planta pubescentiâ subtili densâ in inflorescentiâ capitato-glandulosâ vestita, scabriuscula. Caulis erectus, strictus, quadrangularis angulis obtusis. Folia inferiora cum petiolo 2  $\frac{1}{2}$  poll. 8-9 poll. longa, 3  $\frac{1}{2}$  poll. lata, superiora minora, omnia ovata, acuta, obtuse dentata, multi-costata costis arcuato-patentibus, basi rotundata et denique angusto spatio in petiolum cuneatim acutata. Foliola ad divisiones primarias parva, ovato-subrotunda, petiolata. Bracteæ et bracteolæ pedicello vix longiores, subulatae, uti calyces densissime glandulos-scabrae. Calyxis 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. longi ad basin fere divisi lacinia subulatae, æquales. Corolla 4  $\frac{1}{2}$ -5 lin. longa, glandulos-pubescent, pallide purpurea?; tubus subcylindricus; labiorum laciniaæ ovales, obtusæ, subæquales, superiores duæ paulo breviores minusque a se invicem separatae. Stamina longitndine corollæ, glabra, tubo inferius inserta; anthera coruleæ, omnino ut in reliquis constructæ. Capsula 7-8 lin. longa, columnaris, quadrisulca, glandulos-scabra, pallida, loculis a basi 12-spermis. Retinacula apicem versus dilatata, oblique truncata. Semina parva, subrotunda, basi truncata, compressa, impresso-punctata, fusca. Differt a *C. venusto* spicis axillaribus, foliis evidenter dentatis, basi rotundatis in petiolum cuspidatis et corollæ tubo duplo breviore; a *C. canescens* differet pubescentiâ rigidiore magisque scabriâ, foliis acutioribus dentatis, spicis magis compositis neque circa apicem tantum provenientibus, calycibus glandulos-scabris nec glandulos-hirtis, capsulâ majore. (v. s.)

*C. CANESCENS*, spicis axillaribus in terminalem transeuntibus bifidis secundifloris glandulos-hirtis, foliis ovatis acutiusculis basi cuneiformibus repandis pubescens, capsulâ calyce setaceo duplo longiore. — Vidi exempla h. Wight! et Heyne!, locus natalis speciatim non notatus est. *Justicia serrulata?* h. Wight! et Heyne! Wall. cat. n. 2452 c, d. *Justicia pubescens* Lam. ill. gen. I p. 40, Dietr. sp. pl. I. pars 1. p. 380, n. 44? A *C. serrulata* certis suis notis distinguitur: pubescentiâ tenui densâ molli subtomentosâ canescente omnes partes vestiente, foliis paulo minoribus obtusis vel parum acutis, non dentatis sed obiter repandis basi cuneatim vel leni sinu in petiolum descendantibus, spicis minoribus bifidis e foliorum superiorum axillis in spicam terminalem nudam microphyllam adscendentibus canescens, calycis lacinia angustioribus fere setaceis cum bracteis et bracteolis non pubescentiâ brevissimâ densâque glandulosâ sed longiori patente neque minus glandulosâ hirtis, capsulâ non ultra 4 lin. longâ plerumque dodecaspermâ (i. e. loculis hexaspermis). Corollæ structura et magnitudo non differunt. (v. s.)

*C. ELONGATUM*, racemis axillaribus secundis in terminalem compositum abeuntibus, floribus distantibus, foliis ovatis acutis supra punctulato-scabris, inferioribus subcordatis. — Frankenbar (Heyne in h. Mart. ex h. Moll. n. 774), in Courtallum (Wight I. c.). Vidi exempla h. Heyne!, Wight! et Russell!; ad pedem jugi Nilagirici, Februario (Schmidt!). *Justicia elongata* Vahl! en. 1 p. 131 et herb. (specimen Rottlerianum), h. Willd. n. 313. (spec. Klein). *C. cordifolium* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 100. *Justicia cordifolia* h. Heyne! Wall. cat. n. 2482 a, b, c. Justi-

- cia spec. pauciculatae affinis h. Wight ! propr., Wall. cat. n. 2482 c. *Justicia clandestina* h. Rnsell ! Wall. cat. n. 2482 b. Caules plures ex una radice pedales et altiores, quadrangulares, glabri, nodis non incrassatis, virgatim ramosi, ramis oppositis spicifloris rigidulis simplicibus vel compositis. Folia inferiora cum petiolo pollicari 4-5 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, ovata, acuminate, basi subcordata vel rotundata, in petiolam denique decurrentia, repando-subcrenata, superiora sesquipollucaria, ovata vel ovato-elliptica, acuta, basi in petiolum 4-5 lin. longum decurrentis, integerrima, omnia glabra, saturate viridia, supra lineolis brevissimis punctiformibus asperula, subtus pallidiora, penuinervia, in geniculis superioribus denique folia diminuuntur uvgularia ad bilinearia, ex spatulatis ovato-oblongis iu laeocolata abeuntia. Bractæ communes oppositæ, vix 1 lin. longiores, oblongo-lanceolatae, acutæ. Bracteolæ due ad basiu pedicelli, subulatae, glabrae, pedicello breviores. Pedicelli vix 1 lin. longiores et calyces dense pubescenti-lirti, glandulosi. Calyx pedunculi longitudine, ad medium quiuefidus, lacinias æqualibus subulatis. Corolla 2  $\frac{1}{2}$ -3 lin. longa, purpurascens ? Capsulæ cum pedunculo reflexæ,  $\frac{3}{4}$  poll. longa, lanceolatae, compresso-quadrangulæ, quadrisulcæ, glabrae. ( v. s. )
5. *C. AXILLARE*, cymis axillaribus regularibus glandulosis petiolam æquanti-bus, foliis late ovalibus utrinque acutis glabris punctulatis.  $\mathcal{U}$  In Ceylon, Martio mense (Wight !, h. Hook! n. 188, 208, 1043 et 1746, Capt. Champion ibid., Walker! n. 48 et 77 ibid.), insulis Philippinis (Cuming in h. Hooker! n. 1631). Caulis basi repens, sesqui-bipedalis, firmus, tetragonus, angulis a foliorum projecturis argutis, lateribus majoribus sub-sulcatis, erectus aut ascendens, lignescenti-herbaceus, glabor. Folia caulinam (cum petiolo  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longo) 3  $\frac{1}{2}$ -5 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$ -fere 2 poll. lata, in acumen obtusum producta, in petiolam attenuata, integerrima, nonnihil repanda, glabra rarius setula una alterave inspersa, subtilissime (fusco-) punctata, venis costalibus 6-7-nis arcuatis simplicibus. Folia ramea ejusdem formæ at minoria. Bractæ parvæ, subulatae, glabrae, extremæ ramifications bifloræ, abortiente crure altero; et tum vero ad florem, cruris perfectioris locum occupantem, bracteola (i. e. bractea superioris ordinis sterilis) accedit, namque flos ille, qui perficitur, medius est dichotomia hic evanescentis. Pedicelli longiores lineam longi. Calyx lin. paulo longior, subcampanulatus, ad  $\frac{1}{2}$  quinquefidus, glanduloso-pubescent, lacinias subulatis. Corolla semipollucaris, extus subtilissime pubescenti-glandulosa, purpurascens, tubo nonnihil recurvo, sursum obconico-dilatato, limbo brevi, bilabiato, labio superiori bilido, inferiori trifido, lacinias obtusis. Capsula 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, angusta, tetragona, 20-sperma. Tota planta (in statu sicco) purpureo-nigra. An igitur *C. sanguinolentum* hujuscem forma nacula, cymulis ad pedunculum uniflorum bracteolis sterilibus superiora versus vestitum reductis? ( v. s. )
6. *C. SANGUINOLENTUM*, pedunculis axillaribus unifloris folio breviribus infra florem bi-quadribracteolatis scabriusculis, foliis ovalibus obtusis apicem versus repando-subcrenatis cauleque basi repente glabris.  $\mathcal{U}$  In umbrosis Ceylonæ (Koenig in h. Vahl!). *Justicia sanguinolenta* Vahl symb. 2 p. 10, en. 1 p. 155, et herb. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 386. Planta sæpe tota purpurascens, humili. An forma emaciata *C. axillaris*? Sed calyces longiores sunt et corollæ tubus brevior, fauces contra ampliores. ( v. s. )

#### XIX. BELANTHERIA.

*Calyx* quinquepartitus, lacinias linearibus, superiori longiori. Corolla ringens, tubo brevi crasso æquali; labium superius forniciatum, obtuse bilobum, inferior breviter trifidum, palato convexo maculâ rugosâ sub-palmata notato. Stamina 2, tubi apici inserta, longitudine corollæ; antheræ biloculares, sagittatae, erectæ, loculis basi inermibus. Ovarium lineari-oblongum, compressiusculum, bisulcum, basi annulo cinctum, a basi biloculari, multi-ovulatum. Stylus mediocris; stigma anguste subu-

tum, recurvum, dorso in origine denticulo armatum. Fructus deest.  
- *Frutex Africanus?* Thyrus terminalis, ramis inaequilatero-trifidis, racteis sub ramis pedicellisve lateralibus parvis subulatis, bracteolis nullis. — Calyx est Nemophilæ, corolla et inflorescentia ferme Leucorhachidis, a quâ differt: antheris exquisite sagittatis erectis, staminodis efficientibus et foliis eidenter dentatis?.

. *BELVISIANA.* — In Oware? (Palistot de Beauv.! in h. gen. berol.). Adsunt folia duo, nescio an ejusdem plantæ, ovalia, acuminata, inaequaliter dentato-crenata, glabra, supra lineolata, subtus in costis (lateralibus 11-13) pubescenti-scabra, basi cuneata, integerrima, in petiolum longe decurrentia, 6 poll. longa, 2 ½ poll. lata. Panicula, maxime autem calyces, pubescentiā brevissimā rubiginosā subglandulosā dense vestita pilisque rarioribus mollibus conspersa. Corolla 6-7 lin. longa, pubescens, in alabastro haud adeo contorta, labiis fere valvatis, sed altero tamen latere multo magis inflexo. Ovarium glabrum est. Vidi autem fructum unum magis adultum, qui hirsutissimus erat, probabiliter statu morboeo. (v. s.)

## XX. LEUCORHAPHIS.

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla ringens, tubo brevi basi deorsum gibbo; labium superius falcatum, obtusum, inferius breviter trifidum, palato tumido. Stamina tubi apici inserta, fertilia duo longitudine labii superioris; antheræ lineares, longæ, dorso medio adfixæ, biloculares oculis parallelis muticis contiguis, singulo suturâ dorsali a connectivi inearis latere dehiscente dein antrorum revoluta. Filamenta sterilia duo, brevia, filiformia, singula singulo filamento fertili basi connata. Ovarium ineari-tetragonum, compressum, bisulcum, basi annulo cinctum, a basi oiloculare, multi-ovulatum, ovulis utrinque in quovis loculo 6-8 retinaculo donatis? Stylus longus, sparsim pilosus; stigma filiforme, recurvum, dorso in origine gibbulo notatum! Fructus deest. — Herbae Guineenses, erectæ, foliis ovatis subcordatis acuminatis longe petiolatis, summis ad basin paniculæ et infra paniculam minoribus subsessilibus. Panicula terminalis, secunda, ramis bifidis paucifloris, apice decrescens trifida. Bracteæ parvæ, lineares. Bracteolæ nullæ. Flores brevissime pedicellati, speciosi, pubescentes, purpurei, Salviæ cujusdam formæ, bini vel terni in apice ramulorum paniculæ. Calyces setis patentissimis laxè vestiti.

1. L. *LAMIUM*, foliis ovato-subcordatis repandis subcrenatis cauleque apice hirsutis, paniculæ ramulis longis subnudis.  $\mathcal{U}$  Ad Cap Palmas in Guineâ superiori, locis apertis (Ansell! in h. Benth.), ibidem in littore arenoso, Novembri (Vogel! in h. Hook.). Planta 1-2-pedalis. Caulis ruber. Corolla violaceo-purpurea. (v. s.)
2. L. *VOGELIANA*, foliis ovato-subcordatis dentatis cauleque glabris, paniculæ foliosâ decomposita ramulis brevibus, foliolis floralibus parvis obovatis sessilibus. (I) In insulâ Fernando Po, Novembri (Vogel! n. 145. in h. Hook.). Caulis basi radicans, erectus, glutinosus, pallidus, a medio et paulo inferius paniculato-ramosus. Corolla violacea, paulo minor quam in præcedente. Capsula 7-8 lin. longa, 20-24-sperma. (v. s.)

## XXI. PETRACANTHUS.

Calyx ad medium quinquefidus, subæqualis, bracteis bracteolisque parvis subulatis suffultus. Corolla ringens, labio superiore emarginato, inferiore plano trifido. Stamina duo, tubo ad latus inferius inserta; antheræ biloculares loculis parallelis muticis. Capsula linearis, quadrangularis, a basi

16-20-sperma. Semina aspera, retinaculis integris sussulta. — Herba Javanica humilis, scabra. Folia radicalia obtusa, repanda. Flores in ramulis brevibus simplicibus ramosissime oppositis secundi, erecti, inflorescentiam spicæformem terminalem nudam construentes. Corolla medio-cris.

P. JUNGHUHNII. 2<sup>o</sup> In fissuris rupium calcarearum humo repletis silvarum montanarum ad sinum maris Sudeng sociatum, Maio. Rhizoma præmorsum, pollicare, nodosum, recta descendens, fuscum, fibris fasciculatis flexuosis fibrillosis barbatum. Caulis brevissimus. Folia parium 2-3, approximata (radicalia), oblongo-ovalia, obtusa, subrepanda poll. 2 longa, in petiolum fere pollicarem attenuata, supra dense lineolata, subtus glabra, ad costam et venas pulvriente-scabra. Scapus (pedunculus) terminalis, apliyllus, angulatus, scaber, a medio floriger. Thyrus linearis, basi interruptus. Rami oppositi, brevissimi, cymoso-divisi, sursum secundi, densiflori. Bractea brevis subulata ad basin rami. Flores brevi-pedicellati, bracteæ brevi subulata magis deorsum patulæ binicis bracteolis æqualibus sussulti. Calyx vix lineam longus, ad inedium usque quinquefidus, laciniis æqualibus subulatis patulis, duabus paulo magis superis, 3 inferis. Haec partes omnes glanduloso-asperæ sunt. Corolla 5 liu. longa, in tubum attenuata, pubescens, cœrulea, 4-4 ½ lin. longa, lutescens, tuberculis raris inspersa, valvis maturis elasticæ recurvatis.

β. hirsutior, foliis majoribus subtus præsertim in costis hirsutis, spicæ ramulis brevissimis floribusque igitur glomeratis. In ins. Java (Zoll. pl. Jav. n. 2443 in h. DC.)

#### Subtribus II.

Capsula a medio seminifera.

XXII. SAUTIERA Decaisne in nouv. ann. du mus. 3 p. 383, Endl. gen. p. 4036, Meisn. gen. p. 297 (205).

Calyx tubulosus, ad medium usque quinquefidus. Corolla ringens, labio superiore bifido deorsum angustato, inferiori trifido plano. Stamina 4 didyma, labio superiore haud longiora; filamenta basi in tubum antice apertum postice labio superiori accretum connata; antheræ (flavæ) biloculares loculis parallelis muticis, valvis margine ciliolatis. Stylus longus, stigmate simplici acuto incurvo. Capsula angusta, teretiuscula, sexstriata, a medio bilocularis, tetrasperma. Semina ovata, subcordata, compressa. Retinacula obtusa. — Fruticulus Timoriensis, cortice glabro pallido, foliis ovatis glabris subtus præsertim in costis scabris. Inflorescentia subverticillata, id est cymulæ parvæ, paucifloræ, brevissimæ, axillares, oppositæ. Bracteolæ parvae. Corolla speciosa, labiis æqualibus, lobis obtusis, inferioribus palato maculâ croceâ.

S. DECAISNII. 3<sup>o</sup> In insulâ Timor (ex h. mus. paris. 1836 in h. DC. n. 369). Sautiera tinctorum Decaisne l. c. Spanocche prodr. fl. tim. in Linnæa 15 p. 328 (excl. syn. Rumphii). Ruellia bilabiata Reinw. cat. hort. bogor. Cymular 3-4-floræ, pedunculis petiolo brevioribus. Bracteolæ subulatae, calyce triplo breviores. Calycis laciniæ setaceaæ, æquales, scabré. Corolla subpollicaris luteæ? tubus subincurvus; labium superius basin versus linearis-complicatum, arcuatum, hinc apice obcordatum. Folia pollicaria, petiolata, in petiolum acute desineatia, ovata, apicem versus attenuata, acutiuscula, integer rima. — Nomen « tinctorum » excludendum erat una cum citato « folio tinctorum Rumphii », quippe quod ad Peristrophen tinctoriam spectet. (v. s.)

ibus IV. *RUELLIEÆ* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et in  
indl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 699, Meisn. gen. p. 294.

Corolla limbo regulari vel subbilabiato, tubo plerisque longiusculo anguste elongata. Stamina quatuor, didynama, paucis abortu duo; amenta haud raro per paria basi conjuncta. Antheræ biloculares, locu- in universum æqualibus contiguis, nonnullis basi calcaratis. Cap- la di-tetra-polysperma; ubi oligosperma ibi basin versus sterilis et pressa. Semina discoidea, magna. Inflorescentia varia; saepe flores nt axillares, sessiles vel cymosi, vel ad speciem racemosi, raro spiti et grandibracteati, aut si spicati, tum transitus appetet ex axilla- bus. Flores multis ampli et speciosi, cœrulei, rarius rubri aut albi. ibinde flores clandestini intercurrunt.

#### CONSPECTUS GENERUM.

1. *Calycis laciniis mediocribus aut parvis angustis (exceptis Diptera canthi aliquot speciebus).*

##### A. *Stamina duo.*

XXIII. *Phlebophyllum*. — Calyx 4-partitus, laciniâ superâ bifidâ. pica bracteata. — India orientalis.

XXIV. *Codonacanthus*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corollæ uces campanulatæ. Stylus liber. Racemi secuudiiflori. — India orien- lis.

XXV. *Endopogon*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla bilabiata. stylus in canali faucium barbato reconditus. Spicæ. — India orientalis.

##### B. *Stamina quatuor.*

XXVI. *Stenosiphonium*. — Calyx usque ad medium 5-fidus. Co- illæ fauces campanulatæ, tubus mediocris, gracilis. Antheræ muticæ. picæ axillares. — India orientalis.

XXVII. *Dyschoriste*. — Calyx usque ad medium 5-fidus. Corolla fundibuliformis. Antheræ muticæ vel basi bicalcaratæ. Capsula ope a basi 4-sperma, rigida, nutans. Flores in ramulo axillari brac- ato solitarii vel terni. — India orientalis, Africa.

XXVIII. *Calophanes*. — Calyx usque ad medium paulo profun- us 5-fidus. Corolla infundibuliformis. Antheræ basi bicalcaratæ (raro muticæ.) Capsula in medio 4-sperma. Flores axillares, oppositi, ple- sque cymuloso-aggregati. — America septentrionalis et tropica, frica, India orientalis.

XXIX. *Homotropium*. — Calyx ad medium usque 5-fidus. Co- illa tubulosa, sursum paulo latior, subbilabiata. Antheræ basi submu- onatæ. Capsula a medio 4-16-sperma. Cymæ axillares, bifidæ, ramis cundifloris. Flores pedicellati. — Brasilia.

XXX. *Fabria*. — Calyx bilabiatus  $\frac{3}{2}$ . Corolla infundibuliformis. ipsula a medio 8-12-sperma. Flores axillares, brevipedicellati, bi- acteolati. — Africa australis.

**XXXI.** *Petalidium*. — Calyx 5-partitus, æqualis, bracteolis 2 magnis valvatim inclusus. Corolla infundibuliformis. Capsula in medio 4-sperma. Pedunculi axillares 1-pluriflori. — India orientalis.

**XXXII.** *Dipteracanthus*. — Calyx 5-partitus, æqualis, raro minus profunde divisus (in divisione prima.) Corolla infundibuliformis. Stamina inclusa saltemve corollam æquantia. Antheræ muticæ, rectæ. Capsula a medio 2-16-sperma. Flores axillares, bibracteolati vel ebracteolati, pedunculo 1-cymoso-plurifloro. — America septentrionalis et media, Africa, Madagascar, Asia temperata et tropica, Nova Hollandia.

**XXXIII.** *Ruellia*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla infundibuliformis. Stamina inclusa saltemve corollam æquantia. Antheræ muticæ, rectæ. Capsula a basi 6-16-sperma. Spicæ axillares, sæpe capituliformes, foliacco-bracteatæ, paucis dichotomo-cimosæ et laxiores. — Asia et America tropica, Australasia, Nova Hollandia.

**XXXIV.** *Crabbea*. — Calyx 5-partitus, suhæqualis. Corolla tubulosa vel subcampanulata, limbo inæquali. Stamina inclusa. Antheræ rectæ, muticæ, basi inæquales. Capsula a basi 6-8-sperma. Spicæ axillares brevipedunculatæ, ratione plantæ magnæ, late bracteatæ bracteis ciliatis. — Africa australis.

**XXXV.** *Asystasia*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla infundibuliformis limbo subæquali. Stamina inclusa. Antheræ rectæ, basi callosæ. Capsula longe unguiculata, a medio 4-sperma. Racemi axillares et terminiales secundiflori, parvibracteati. — Asia tropica (cum Arabia), Africa australis (cum insulâ Madagascar.)

**XXXVI.** *Echinacanthus*. — Calyx 5-partitus, subæqualis sub fructu erectus. Corolla infundibuliformis, æqualis. Antheræ inclusæ, rectæ basi 1-2-calcaratæ. Capsula a basi polysperma. Cymæ axillares secundifloræ, in paniculam terminalem transeuntes. — India orientalis.

**XXXVII.** *Stachyacanthus*. — Calyx 4-partitus. Corolla (in nostris) clandestina. Stamina inclusa. Antheræ rectæ, muticæ. Capsula unguiculata, a medio 4-sperma. Spica terminalis floribus arcte adpressis, bracteis bracteolisque parvis. — Brasilia.

**XXXVIII.** *Triænacanthus*. — Calyx 5-partitus laciniâ superiore tridentatâ majore. Corolla infundibuliformis, brevis. Stamina inclusa. Antheræ muticæ. Capsula brevi spatio a basi 4-sperma. Spicæ axillares laxæ, parvibracteolatae, flexuosissimæ. — India orientalis.

**XXXIX.** *Leptacanthus*. — Calyx 5-partitus, laciniâ superâ sæpe longiore. Corolla infundibuliformis limbo subbilabiato. Stamina inclusa. Antheræ muticæ, semi-ovales, loculis antrorsum contiguis. Capsula in medio 2-sperma, basi parum coangustata. Panicula e ramis axillaribus terminalis, microphylla. Pedicelli graciles, secundi. — India orientalis.

**XL.** *Aechmanthera*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla infundibuliformis, æqualis. Stamina inclusa. Antheræ rectæ, basi muticæ apice mucronatae. Capsula a basi 8-sperma. Capitula bracteata, paniculato-vel corymboso-terminalia. — India orientalis.

SUPER 3A  
13883

**XLI.** *Goldfussia*. — Calyx 5-partitus, subæqualis. Corolla infundibuliformis, æqualis. Stamina inclusa. Antheræ breves, ovatae, connectivo ncinato obliquo. Stigma irritabile. Capsula 6-angularis, prope a basi -sperma. Spicæ axillares, saepe capituliformes, bracteatæ, subinde ixæ. — India orientalis.

**XLII.** *Strobilanthes*. — Calyx 5-partitus, subæqualis. Corolla infundibuliformis, subæqualis. Stamina inclusa, ad summum fauces æquantia, quibusdam monadelpha vel quinti staminis rudimento ucta. Antheræ rectæ, muticæ. Capsula tetragona, haud unguiculata, i medio 4-sperma. Spicæ axillares terminalesque, plerisque densæ, ite bracteatæ et strobuliformes, aliis laxiores. — India orientalis.

**XLIII.** *Buteraea*. — Calyx 2-partitus  $\frac{3}{4}$ . Corolla infundibuliformis, ubæqualis. Stamina inclusa. Antheræ rectæ, muticæ. Capsula 4-gona, rope a basi 4-sperma. Spicæ axillares, late bracteatæ, bracteis heracieis venosis. — India orientalis.

**XLIV.** *Adenacanthus*. — Calyx 3-partitus, laciñâ superiori trifidâ. Corolla infundibuliformis, subæqualis. Stamina inclusa. Antheræ ovæ, rectæ. Ovarium supra basin 4-ovulatum. Spica laxa, floribus oppositis, bracteis bracteolisque subconformibus angustis herbaceis. — India orientalis.

**XLV.** *Cryptiacanthus*. — Calyx 5-partitus, æqualis, sub fructu patens. Corolla infundibuliformis, æqualis. Stamina inclusa. Antheræ rectæ, muticæ. Capsula teres, a basi 12-16-sperma. Pedunculi cymoso-tridi, uni speciei flores axillares, solitarii. Pedicelli fructus incrassati. — America calidior, Nova Hollandia.

**XLVI.** *Siphonacanthus*. — Calyx 5-partitus, subinæqualis. Corolla tubulosa, sursu parum incrassata, limbo brevi. Stamina inclusa. Antheræ rectæ, muticæ. Capsula juxta basin 4-6-sperma. Flores axillares oppositi, brevipedicellati, ebracteolati, ad caulis apicem subspicati. — Brasilia.

**XLVII.** *Stephanophysum*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corollæ alicibus plus minus campanulato-inflatis deorsum gibbis, tubo limboque brevibus. Stamina corollam æquantia. Antheræ angustæ, muticæ, demum incurvæ. Capsula unguiculata, a medio 4-12-sperma. Cymæ axillares, subumbellares, 2-4-fidæ, dichotomæ, pedunculatæ. — America tropica.

**XLVIII.** *Stemonacanthus*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla subhypocrateriformis, limbo expanso. Stamina longe exserta. Antheræ angustæ, muticæ, semilunares. Capsula unguiculata, a medio 4-8-sperma. Cymæ axillares, longe pedunculatæ. — America tropica.

**XLIX.** *Paulo-Guilelmia*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla subinfundibuliformis, limbi laciñis æqualibus homonallis. Stanina exserta, adscendentia. Antheræ rectæ, muticæ. Capsula quadrangularis, deorsum angustior, ad basin 4-sperma. — Abyssinia.

**L.** *Eurychanes*. — Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla oolique campanulata, subbilabiata, tubo brevi, faucibus deorsum ventricosis. Sta-

mina longe exserta. Antheræ angustæ, rectæ. Capsula breviunguiculata, hinc 6-8-sperma. Flores axillares, pedunculati, verticillati. Pedunculi 1-flori. Brasilia.

L1. *Arrhostoxylum*. — Calyx 5-partitus, subæqualis (in una specie ad  $\frac{1}{3}$  a basi quadrididus). Corolla infundibuliformis, limbo sub-expanso. Stamina parum exserta. Antheræ rectæ. Capsula unguiculata, a medio 6-12-sperma. Cymæ umbellares, axillares, pedunculatæ, 2-4-fidæ, dichotomæ. — America tropica.

§ 2. *Macrostegia*. *Calycis laciniæ aut ratione habita corolla grandes et elongataæ, aut solito latiores neque admodum longæ, obtuse, plerisque herbaceæ, firmae.*

LII. *Onychacanthus*. — Stamina 4 perfecta. Calycis laciniæ latæ, obtusæ. Antheræ glabré, basi bicalcaratæ. Thysrsuli axillares. — America centralis, Mexico.

LIII. *Trichanthera*. — Stamina 4 perfecta, exserta. Calycis laciniæ oblongæ, obtusæ. Antheræ muticæ, margine ciliatae. Cymæ terminalis. — America tropica.

LIV. *Macrostegia*. — Stamina 4 perfecta. Calyx basi tubulosus laciniis acuminatis, duabus inferioribus majoribus. Antheræ breves, bicornes. Cymæ axillares. — Peruvia.

LV. *Sclerocalyx*. — Stamina 4 perfecta. Calyx basi tubulosus, laciniis acuminatis æquilibus coriaceis, extus canaliculatus, aestivation quinquangulari. Antheræ ovales, muticæ, glabré. Pedunculi axillares, trifidi, apice bracteati. — Mexico.

LVI. *Ophthalmacanthus*. — Stamina 5 perfecta! Calyx ad medium quinquesfidus. Antheræ angustæ, muticæ. Pedunculi axillares, bi-trifidi. — Mexico.

LVII. *Whitefieldia*. — Stamina perfecta 4, inclusa, rudiment staminis quinti obsoleto. Antheræ glabré, muticæ. Calyx coloratus membranaceus, subinæqualis. Pedicelli oppositi. Bracteolæ ad basi calycis grandiusculæ, uti bracteæ coloratæ. — Sierra Leone.

LVIII. *Ancylogyna*. — Stamina perfecta duo, exserta, anther hirsutis basi calcaratis, duo imperfecta inclusa. Calyx coloratus, membranaceus, subinæqualis. Spica terminalis ample bracteata. — Brasilia, Peruvia.

XXIII. *PHLEBORHYLLUM* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 83, *Linn. intr. ed. 2* p. 285, Endl. gen. p. 700, Meissn. gen. p. 294 (203).

Calyx profunde quadripartitus, laciniæ superiori profunde bifidæ. Corolla infundibuliformis, limbo quinquesrido, laciniis emarginatis repandisqu Stamina duo non exserta. Antheræ biloculares, loculis parallelis muticis. Stamina sterilia nulla. Stigma simplex, subulatum. Capsula ba compresso-asperma, apicem versus bilocularis, tetrasperma. — Spic bracteis imbricatis latis, bracteolis geminis angustis. Color corollæ luteo Folia serrata.

P. *KUNTHIANUM* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 83, Wight ic. 1 t. 448 foliis ovalibus serratis subtus albo-tomentosis. In Nilgherri (R. Noton, Wigl

Schmidt, de Hügel in herb. Mart., Perrottet! in herb. Nees. ex herb. mus. paris. n. 128 et 123). Ruellia Kunthiana Wall. cat. n. 2367, Wight herb. prop. n. 1942. Caulis fruticosus, quadrangularis, lateribus angustis excavatis, sparse hirsutus, nodosus, articulis elongatis. Folia opposita, ovalia, 1-2 poll. longa,  $\frac{1}{4}$ -1 poll. lata, utrinque acuta, undato-serrata serraturis incurvis, supra lineolata setisque acicularibus hirsuta, subtus venoso-reticulata, tomento tenui candido vestita, multiplinervipenninervia. Spicæ axillares, alternae, pedunculatae, ovatae, dense imbricatae, pollicares et ultra. Pedunculus 3-4 lin. longus, tetragonus, subtomentosus, aphyllus. Rhachis profunde quadrangularis, hirta, dentato-gradata. Bractæ 6-8 lin. longæ, oppositæ, rhombo-ovatae, longissime et fere aristato-acuminatae, integerrimæ, herbaceæ, apice nervosæ, dorso hirsuto-canæ, ciliatae. Flores oppositi sessiles, solitarii. Bracteolæ duæ, oppositæ, 4 lin. longæ, lineares, acuminate, carinatae, ad margines lanuginoso-villosæ. Calyx 6-8 lin. longus, profunde quadripartitus; tubus obconicus, glaber; lacinia lanceolatae, acuminatae, margine lanuginoso-ciliatae, apicem versus glandulosæ; superior ad  $\frac{2}{3}$  bifida. Corolla 9-10 lin. longa, pubescens, purpurea? vel lutea?, infundibuliformis; tubus brevis, faux cum limbo elongato-campanulata, lacinia quinque, inæqualiter repandæ, subæquales, alternæ leviter emarginatae vel retusæ. Stamina duo, corollâ paulo breviora; filamenta hirsuta; antheræ lineares, subsagittatae, loculis parallelis. Ovarium lanceolatum, apice barbatum, inferne annulo nectarii constrictum, superne bilobulare, quadri-ovulatum; ovula suborbiculata, compressa. Stylus longitudine corollæ, hirsutus, apice incurvus; stigma simplex, subulatum, incurvum, basi carinatum, lacinia superioris nullo vestigio. Fructus (ex ovario dijudicatus) capsula clavata, apice tetrasperma. (v. in h. Nees.)

XIV. CODONACANTHUS. — Asystasia sp. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 90.

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla e tubo brevi campanulata, nbo æquali quinquefido, laciniaæ ovatis obtusis. Stamina duo inclusa. Anteræ latiusculæ, ovales, biloculares loculis parallelis subæqualibus mutatis. Capsula.... Herbae Indiae orientalis, habitu Campanulæ rapunculoidis, icranthæ. Racemi in caule et ramis terminales, compositi, secundiflori, acteis bracteolisque parvis. Flores cœrulei, nutantes, mediocres.

C. PAUCIFLORUS, radice cauleque inferne repente, ramis diffusis, foliis oblongis utrinque acutis subrepandis glabriusculis, racemo terminali subdiviso paucifloro. — In Indiæ orientalis prov. Sillét et in vicinis montibus (Wall.) Asystasia pauciflora N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 90. Ruellia pauciflora Wall. n. 2369. (v. s. in h. Wall.)

C. ACUMINATUS, caule erecto ?, foliis oblongis acutis basi longe attenuatis repando-subcrenatis in costis hispidis, racemo terminali composito plurifloro.  $\mathcal{Z}$ . In Assam (Griffith! in herb. Hook.) An var. pauciflora? (v. in h. Hook.)

XV. ENDOPOGON N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 99, Lindl. intr. ed. 2, p. 285, Endl. gen. p. 704, Meisn. gen. p. 296 (204.)

Calyx regularis, quinquepartitus. Corolla in alabastro apice sæpe confluo-mucronata, bilabiata, fauce inflata, labio superiori lato bifido, ins. in canalem decurrentem utrinque barbatum stylum recipiente; inferi trifido. Stamina duo. Antherarum loculi duo, paralleli, æquales, muhi. Capsula depresso-quadrangularis, suturâ prominulâ, bilocularis, oxime a basi tetrasperma. Dissepimentum adnatum, superiora versus igustum et incompletum. Semina aut depresso-lenticularia, mucronata, utrinque juxta hilum areæ scutatæ insculpta, aut ovata, subcordata, tero latere carinata, laevia. — Frutices Asiatici, foliis serratis. Flores icati. Bractæ communes oppositæ, imbricatae latiusculæ, propriæ anstæ. Corollæ speciosæ, cœruleæ.

1. E. **DIGITALIS**, glaber, bracteis bracteolisque eglandulosis conformibus subangularibus calyce duplo brevioribus ovato-lanceolatis acumino obtusiusculo, foliis ovalibus cuspidatis dentato-serratis basi attenuatis. ♂ In ins. Ceylan (Walker! n. 1748 in b. Hook.) Corolla pollicaris. Calycis dentes ad medium fere ciliis connexi. (v. in h. Hook.)
2. E. **AMOMUM** (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 99, Wight cat. n. 1980), bracteis setaceo-cuspidatis pubescenti-glandulosis, foliis late ovatis dentatis glabris. ♂ In Indiâ orientali. Ruellia sesamoides Wall. cat. n. 2408 c et b ad partem minimam. Justicia venosa herb. Wight. in Wall. cat. l. c. Corolla speciosa,  $\frac{1}{2}$  poll. longa, cœrulea, tubo subincurvo, in faucem infundibuliformem ampliato, labio superiori lato bifido, inferiori non nihil breviori trifido, laciniis obtusis. Quod ad dentes foliorum magis vel minus prominentes, acutiores vel acutos valde variat hæc species. (v. in h. Wall. et Wight.)
3. E. **HYPOLEUCUS** (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 99, Wight cat. n. 1981), bracteis setaceo-cuspidatis pubescenti-glandulosis, foliis late ovatis crenatis subtus cano-tomentosis.
  - α. foliis supra glabris. Ruellia sesamoides Wall. cat. n. 2408 b (ex parte.) (v. in herb. Wight!)
  - β. foliis supra hirsutis tomentulo subtus magis fugaci, bracteis calycibusque glabriusculis. In Indiâ orientali, ad ripas rivulorum circum Kolymberris, Maio (Perrottet! in h. DC. n. 249). Justicia sesamoides herb. Madr.! Wall. cat. n. 2408 a (ex parte). Ruellia sesamoides Wall. cat. n. 2048 a (ex parte). Conferas Ruelliam spicatam Roth inter species dubias sub Ruelliâ. (v. s. in b. DC.)
4. E. **CONSANGUINEUS** (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 99, Wight herb. prop. n. 1982), bracteis ovato-ellipticis acutis hirsutis glandulosis, foliis ovato-ellipticis utrinque attenuatis glabris. In montibus Dindigul, Courtallum Negapatam (Wight l. c. et in h. Hook.), in ins. Ceylan (Walker! in h. Hook.). Ruellia secunda Wight! olim. (v. s. in h. Hook. etc.)
5. E. **ARGUTUS**, bracteis oblongo-lanceolatis acuminatis acumine obtusiusculo calycem æquantibus rigidis rhachique hirsuto-glandulosis, foliis ovalibus utrinque attenuatis minute arguteque denticulatis cauleque glabris margine sebris. ♂ In ins. Ceylan. Ab E. viscoso var. α differt foliis glabris argutius confertiusque denticulatis. An var.? (v. in h. Hook.)
6. E. **viscosus** (herb. Arn.), bracteis oblongo-lanceolatis (infimis quandoque ovalibus) obtuse unguiculato-cuspidatis carinatis calycem æquantibus rigidis rhachique hirsuto-glandulosis, foliis ovali-oblongis ovalibus utrinque attenuatis hispidis, seminibus ovatis. ♂ In ins. Ceylan.
  - α. *viscosissimus*, specie densissime villosa, foliis superioribus brevioribus ovalibus utrinque brevi-acutatis supra strigilosis. ♂? In insula Ceylon (Walker! in h. Arnott. et Hook.). E. viscosus h. Arnott. Justicia viscosa Moon cat. Ceyl. pl. (v. s. in h. Hook., etc.)
  - α\*. *humilis*, specie brevioribus magis compactis, bracteis infimis quibusdam ovalibus; reliqua ut in α. ♂ in Courtallum (Wight!) (v. in h. Wight.).
  - β. *hispidus*, specie hispidulo-viscosis, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis hispidissimis. ♂ In ins. Ceylon (Walker! in h. Arnott. et Hook.) (v. in b. Hook. etc.)
  - γ. *microphyllus*, foliis duplo minoribus, caule repente. In ins. Ceylon (Walker! in herb. Hook.)
7. E. **KHASSYANUS**, hirsutus, bracteis oblongis patulis calyce brevioribus, specie folio brevioribus, foliis ovatis acutis crenatis basi in petiolum hirsutissimum acute desinentibus. ♂? Khassy (Griffith! in herb. Hook.). Folia minus acuminata quam E. viscoso. Hirsutes subviscida. (v. in h. Hook.)
8. E. **MACROSTEGIUS**, glaber, bracteis ovatis cuspidatis calyce brevioribus, foliis oblongis acuminatis in petiolum brevem acute desinentibus medio subdentatis.

♂ In Assam, Khassyia (Griffith! in h. Hook.). Flores desunt. Folia 6 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata. Spicae axillares, subfasciculatae. Calyx pollicaris, lacinis lanceolato-linearibus. Capsula longitudine calycis, striata. (v. in h. Hook.)

9. E. DECURRENS, spicis tetragonis, bracteis ovalibus cuspidatis dense ciliatis basi decurrentibus dense imbricatis, foliis oblongis caudato-cuspidatis integrerimis margine scabris, seminibus cordato-orbiculatis. ♂ In Assam, Kassyia (Griffith!). Differt a reliquis spicis multo densioribus crassioribus nitidis, bracteis corollâ majoribus a medio pallidioribus et longe lateque decurrentibus altero latere paulo angustiore, hinc rhachi alatâ inter alas flores reconducente. Corolla generis, 3 lin. longa, limbi lacinis subæqualibus acutis. Filamenta hirsuta; anteræ breves et latae, subdidymæ. Capsula est structuræ communis hujus generis. Bracteæ juveniles rufæ, ætate fuscæ, nitore pingui splendentes. Bracteola minima nullæve. Caulis ramosissimus, tetragonus, glaber. (v. in h. Hook et Mart.).

XXVI. STENOSIPHONIUM N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 84, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 704, Meisn. gen. p. 296 (204).

Calyx quinquefidus, lacinis æqualibus, primum ultra medium marginibus membranaceis conjunctis, post anthesin ad basin discedentibus. Corolla infundibuliformis, tubo gracilimo, limbo inflato-campanulato quinquefido, lacinis æqualibus obtusis. Stamina vel quatuor didynama vel duo; anteræ angustæ, loculis parallelis arcte contiguis æqualibus muticis. Stigma dorso membranaceo-cristatum, apice subulatum. Capsula tetragono-columnaris, ad basin usque bilocularis, a basi ultra medium octosperma. Dissepimentum completum, adnatum. Semina lenticularia, mucronata, læviuscula.—Frutices Indie orientalis, foliis plus minus dentatis. Spicæ axillares et terminales. Flores discreti, oppositi, singuli vel aggregati. Bracteæ latiusculæ, appressæ, rigidulæ. Bracteolæ angustæ, calyci consimiles. Flores in fauce maculati.

1. S. DIANDRUM, foliis ovatis crenato-dentatis glahris, bracteis oblongis obtusiusculis calycibusque glanduloso-hirsutis, floribus solitariis diandris, filamentis basi lanatis. ♂ In ins. Ceylon (Walker! in herb. Hook.). Ambigit inter Endopogones et Stenosiphonia, sed calyx vix usque ad medium divisus. Spicæ terminales trifidae; axillares ad basin foliosæ, foliis minoribus subtrotundis. Accedit S. conferto. (v. in h. Hook.)
2. S. CONFERTUM, foliis late ovatis dentatis subtus nudis, bracteis ovato-lanceolatis oblongis obtuse acuminatis (calyce brevioribus) calycibusque glanduloso-hirsutissimis, floribus geminis ternisve. ♂ In Courtallum (Wight!), Bouton (Belanger! in h. DC. n. 32.) (v. in h. Wall., Wight et DC.)
3. S. RUSSELLIANUM (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 84, Wight herb. prop. n. 1944), foliis ovatis dentatis subtus nudis, bracteis rhomboideis obtuse cuspidatis calyces æquantibus. ♂ In Nepaliâ (Wallich! in herb. DC. n. 183), in Dindigul (Wight!), in insulâ Ceylon (Walker! n. 161 et 1227 in h. Hook.). Ruellia Russeliana Wall. cat. n. 2400. Ruellia arcuata Wall. cat. n. 2334 a, b. (v. in h. Hook. et DC.)
4. S. SUBSERICEUM (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 84, Wight h. prop. n. 1943), foliis ovatis dentatis junioribus subtus ramisque hornotinis albotomentosis, bracteis rbombeo-ovatis longe cuspidatis calyces æquantibus. ♂ In collibus apricis Madras et Chinglinul (Wight! l. c., herb. Wall. n. 2408 b, quo numero Ruellia subsericea, Endopogon Amomum et hypoleucus promiscue occurunt), Tranquebariâ (Rotel! in herb. Vahl.). Ruellia cordifolia Vahl! (1) symb. 3 p. 84 et herb., Willd! sp. pl. 3 p. 372. Ruellia

(1) Nomen cordifolia, etiamsi tempore prius, hoc loco haud retinui, quum ad fragmenta morum, foliis principalibus orbata respiciens, plantæ imaginem haudquaquam exprimat.

*subsericea* Wall. cat. n. 2416. *Ruellia sesamoides* Wall. cat. n. 2408 a (ex parte), b (ex parte). *Adhatoda maderaspatana* serratis foliis et junioribus subtus incanis Petiv. (Lamarck! in herb. Vahl.). An hæc et *Ruellia secunda* (n. l.) proprii generis sunt? (v. in h. Vahl., Wall., Wight. DC. etc.)

**XXVII. DYSCHORISTE N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 81 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 699, Meisn. gen. p. 294 (203.)**

Calyx tubulosus vix ad medium quinquefidus, æqualis. Corolla infundibuliformis, limbo obliquo quinquefido. Stamina quatuor didynama; antheræ biloculares, loculis parallelis æqualibus basi mucronatis raro muticis. Capsula oblonga, parum depressa, rigida, prope a basi tetrasperma, sursum asperma. Dissepimentum adnatum. Semina ovata, obtusa, immarginata, pelliculâ crassâ mucilaginosâ involuta. — Fruticuli Indiae orientalis, Africæ septentrionalis et Madagascar, parvi, depressi, microphylli. Flores axillares, mediores, corulei, in ramulo brevissimo terminales solitarii sessiles, basi bracteolis duabus foliis consimilibus præditi aut capitati, bracteolis bracteolique angustis cincti.

1. **D. DEPRESSA** (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81, Wight herb. prop. n. 1934), caule repente, foliisque obovato-orbiculatis obtusis retusis cum mucrone integerrimis glabris, floribus erectis. ♂ In prov. Tanjore (Wight!), Madras (Shuter! in h. Hook.), in Ceylonâ (herb. madr.). *Ruellia* depresso herb. madr.! Wall. cat. n. 2379. *Ruellia?* setigera Wight herb. prop. (v. in h. Wight., Wall., Hook., etc.)
  2. caule laxiore pubescente, foliis minoribus, ex obovato spathulatis. In h. Heyneano, loco natali non adscripto. *Ruellia cernua* herb. Heyn.! Wall. cat. n. 2380 b (ex parte; alterum exemplum est *Adenosma Thymii*) (v. in h. Hoyt.,)
2. **D. CERNUA** (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81), caule procumbente diffuso scabro, foliis spathulatis integerrimis glaucis, floribus fructibusque reflexis. (Vidi exemplum herb. madr., loco natali non adscripto.) *Ruellia cernua* herb. madr.! Wall. cat. n. 2380 a. *Justicia Meysorensis* Klein! in herb. Willd. n. 331. (v. in h. madr.)
3. **D. RADICANS**, caule suffruticoso (in cultis herbaceo) repente pubescenti-scabro, foliis obovato-spathulatis calycisque laciniis ciliatis, fructibus subreflexis.
  - α. *diffusa*, caulibus longioribus geniculatim flexis subherbaceis pubescens, foliis patentibus in petiolum longum attenuatis. E sem. abyss. un. itin. in hort. Vratisl. ann. 1841. (v. v. c.)
  - β. *minor*, caule rigidulo lignescente scabro, foliis minoribus floribusque adscendentibus. ♂ In vallis Entala prope Adoam', Octobri (Schimper.) *Ruellia radicans* Hochst. var. *minor* in Schimp. it. abyss. sect. 7 pl. Adoëns n. 17. (v. in h. Schimper.)
4. **D. LITTORALIS** N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81, Wight herb. prop. n. 1935, ic 2 t. 447, caule fruticuloso diffuso, foliis cuneiformibus retusis apicem versus dentatis glabris. ♂ In Madurâ (Petiv., Burm.), in aridis apricis et petrosis Madras, Chinghpur, Negapatam etc. (Wight! l. c.), Pondichery (Perrottet! in herb. DC. u. 270, in herb. mus. paris. et in herb. Delessert. et Benth.). *Ruellia littoralis* Linn. suppl. pl. p. 289, Roth. nov. pl. sp. p. 300, Wall. cat. n. 2381 a, b. *Ruellia* (*Justicia*) *Madurensis* herb. Vahl! (specim. Rottler.) *Ruellia microphylla* herb. Vahl! *Justicia Madurensis* Burm. fl. ind. p. 9 t. 4 f. 3, Vahl symb. 2 p. 17, Willd.! sp. pl. 1, 1, p. 98 et herb. n. 365! (spec. Klein.), herb. Schreb.! et Mart.! *Adhatoda Madurensis*, frutescens, sampsanchifolio, caule argenteo Petiv. gazoph. t. 3 f. 8, (v. in h. Vahl, Wall., Wight. DC.)

*D. GENICULATA*, caule herbaceo prostrato flexuoso ad genicula radicante glabro, ramlis brevibus adscendentibus secundis, foliis ovalibus obtusis in petiolum brevem desinentibus supra calycibusque scabris, fructibus roflexis, antheris muticis.  $\mathcal{Z}$  In axis locis humidis in ascensu montium juxta urbem Tananarivo insulae Madagascar (Bojer in h. DC. n. 125 ex parte.) *Ruellia geniculata* Bojer. Caules longi, toti prostrati, filiformes, ad genicula papillis suctoriis radioantes. Folia unguicularia. Flores axillares, solitarii opposite. Corolla parva vix calyce longior, pubescens. Antherarum loculi basi divergentes, omnino mutici. Capsula tenuior quam in reliquis, cito dehiscentia, sed reliqua structura congrua. Species est, à genere quidquam aliena. (v. in h. DC.)

XVIII. CALOPHANES Don in Sweet fl. gard. 2 t. 181, Endl. gen. n. 4046, Meissn. gen. p. 295 (203). N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 25.

Calyx a basi ad  $\frac{1}{2}$  aut paulo ultra coherens, lacinias setaceis. Corolla fundibuliformis, limbo quinquefido subregulari. Antheræ basi bicalcaratæ, ro muticæ, loculis parallelis planis membranaceis. Filamenta basi per tria connata. Capsula lanceolata, basi elocularis, hinc in medio tetraptera. Flores axillares oppositi vel 2-5 cymuloso-aggregati vel sessiles, acteis bracteolisque angustis. — Herbæ vel suffrutices Americani, enthae aut Pulegii habitu, plerique humiles, plus minus pubescentes, in Dyschoriste, Dipteracantho Hygrophilâ consociantes. Corolla cretea, fauce maculata.

C. CRINITUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 26), caule cresto hirsuto astate glabrescente, foliis oblongo-lanceolatis integerimis in petiolum brevem decurrentibus glabris margine costâ subtus subtus scabris, floribus verticillatis cymulis multifloris verticillis superioribus contiguis, bracteolis subulatis calycisque ad medium usque divisi lacinias hirsutissimis, corolla subbulbiatâ calyce haud duplo longiore, lacinias duabus superioribus paulo latioribus altiusque connatis, antheris basi bicalcaratis. — In prov. Goyaz (Gardner in h. Benth. n. 3951). Planta 1-2 pedes alta. Caulis ramosissimus. Folia (caulis superiora) 2 poll. longa, 8 lin. lata, suprema et ramea paulo minora et angustiora, caulina infima probabiliter latiora, omnia apicem versus nonnihil attenuata obtusaque. Calyces speciosi 5 lin. (fructiferi 6 lin. ) longi, a basi ad medium integri et glabri, lacinias setaceo-attenuatis pilisque flavescentibus patentissimis vestitis. Corolla 6 lin. longa, glabra, tubo gracili, incurvo, limbo infundibuliformi, lacinias obtusis, duabus superis ovalibus, tribus inferis oblongis a superis paulo magis debiscientibus. Stamina generis. Capsula laevis, tetrasperma, 4 lin. longa. (v. in h. Benth.)

. C. OBLONGIFOLIUS (Dou in Sweet fl. gard. 2 t. 181), herbaceus, dense pubescens, caulinis erectis adscendentibusve, foliis obovato-oblongis obtusis obtuse denticulatis basi angustata in petiolum brevissimum desinentibus, superioribus passim angustioribus, floribus axillaribus oppositis solitariis subsessilibus, bracteolis oblongis repandis calycem æquantibus, lacinias calycis profunde divisi filiformibus longitudine tubi corollæ.  $\mathcal{Z}$  In pincet sabulosis Georgiæ (Pursh, Beyrich! in herb. gen. berol. et Lehm., Curtis! et Wray! in h. Hook.), Tampa Bay in Florida (Hook.! in herb. gen. berol., Torrey! in herb. Lehmann.), Carolinæ (Elliott! in herb. DC. et Hook.). Dipteracanthus biflorus N. ab. E. in Linnaeâ 16 p. 294. Calophanes biflora Shuttlew. pl. Rugel. in herb. DC. n. 858. Ruellia biflora Linn. sp. pl. p. 886, herb. Vahl! Ruellia oblongifolia Michx. fl. am. bor. 2 p. 23, Pursh! am. sept. 2 p. 420, Le Conte in ann. of the Lyc. of New-York 1 p. 142, herb. DC. n. 571 et Elliot! ibid. n. 356, Lodd. cab. t. 1889. Ruellia parviflora herb. Baldwin! in herb. Hook. (v. in h. DC., etc.)

$\beta$ . acutiusculus, foliis bracteolisque acutiusculis. In Georgiâ (Torrey.) Ruellia strepens var. Torrey! in herb. Lehm. (v. in h. Lehm.)

- y. Texensis*, foliis superioribus oblongo-linearibus. In Texas ad San Felipe (Drummond!) n. 178 in herb. Benth. 178 et 256 in herb. Hook.). Dipteracanthus (*Calophanes*) linearis Torr. et Gray in Engelm. et Gray, pl. Lindheimer. p. 50 not. (v. in h. Benth., etc.)
3. C. *HUMISTRATUS* (Shuttleworth pl. Rugel. in herb. DC. n. 859), caule herbaceo prostrato diffuso repente quadrangulari glabro, foliis in petiolum attenuatis oblongo-ovalibus obtusiusculis integerrimis, floribus axillaribus subsessilibus solitariis binis ternis, bracteolis oblongo-spathulatis, calycis laciniai setaceis strictis brevioribus, capsula lanceolata glabra tetraptera.  $\mathcal{L}$  In graminosis Georgiae et Floridae (Michaux, Bosc in herb. DC. n. 560 et herb. Vahl., Rugel ibid.), in Carolinâ (Bosc ! in herb. Vahl.). Ruellia humistrata Mich. fl. am. 2 p. 23, Purb. fl. am. 2 p. 421, herb. Willd. n. 11630! herb. Vahl ! Ruellia biflora herb. Willd. n. 11640 ! ex herb. Panz. (ne Linn.). Ruellia biflora Bosc ! in herb. Vahl. Planta parva, foliis unguiculatis glabris. Calycis laciniae e basi subovatae margine membranacea subtillissime setaceae, scabre, 5 lin. longe. Capsula longitudine calycis. Errat Le Contius, quum R. humistratum Michx. varietatem facit Dipteracanthi stenopentis. (v. in h. DC.)
4. C. *OVATUS* (Benth. ! pl. Hartweg. p. 89 n. 501 [605 in herb. Hook.] sub *Ruellia*), herbaceus, hirtus, caulis erectis, foliis obtusis subcrenatis basi crenatae in petiolum brevissimum decurrentibus ad costas utrinque hirsutis, inferioribus obovatis superioribus oblongis, floribus axillaribus geminis ternis oppositis subsessilibus, bracteolis communibus oblongis propriis lanceolatis integerrimis calyccem equitantibus, laciniae calycis ad  $\frac{1}{2}$  divisi setaceis longitudine tubi corolla.  $\mathcal{L}$  In Mexico (Cavanilles), in montibus Sumpango, Guatemala, Julio (Hartweg ! in herb. gen. berol.), Texas (Drummond ! coll. 3 n. 256 in herb. Benth.). Ruellia ovata Cav. ic. 3 p. 28 t. 254, Willd. sp. pl. 3 p. 363. Persimilis *C. oblongifolia*, differt pubescenti longiore rigidiore magisque dispersa, foliis haud tota superficie pilis brevissimis tectis et itaque pubescenti-scabris, sed supra subtusque in costis pilis longiusculis rariores conspersis apicem versus obiter repando-crenatis neque evidenter remote denticulatis, floribus pluribus subverticillatis, calycis lacinias paulo brevioribus (6 lin. longis, isti 7-7  $\frac{1}{2}$  lin. longis). Corolla paulo minor est quam in hac. (v. in h. Benth., etc.)
5. C. *MARANHONIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 25), fruticosus, caule erecto pubescente, foliis repando-crenatis obtusis basi acutis petiolatis, caulinis ovato-oblongis glabrescentibus majoribus, rameis subovalibus utrinque pubescenti-hirtis, floribus axillaribus ternis quinise cymoso-glomeratis bracteis bracteolique interstinctis, calycibus glandulosis, lacinias setaceis basi ad  $\frac{1}{2}$  connexis, corolla infundibuliformi calyce haud duplo longiore, lacinias oblongis emarginatis, antheris basi bicaratis.  $\mathfrak{J}$  Ad Maranhão flumen (Pobl ! in herb. imp. vindob.), St. Ignacio in Brasiliâ (Sellow ! in herb. reg. berol. n. 59 et 185), in Peruvia (Pavon !) Zahlbrücknera Maranhonis Pobl ! ic. in herb. palat. vindob. n. 1765. Ruellia viscosa Pavon ! in herb. Moricand. Rami valde ramosi, purpurascentes, tetragonoi. Folia primaria rami 3  $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, 14 lin. lata, distincte repando-crenata, supra pilis rarioris adspersa, subtus fere glabra; ramea, que pleraque floralia, 13-14 lin. longa et 6 lin. lata. Bracteæ partiales lanceolato-spathulatae, argute cuspidate, birsuta, longitudine cymulae glomeruliformis. Bracteola filiformes, longitudine dimidiæ calycis. Calyces subsessiles, pilis glandulosis dense vestiti, laciniae linearis-subulatae, aequales, basi alte connexae. Corolla semipollucaris pubescens, tubo longitudine fauci obovatae, lacinias mediocribus oblongis emarginatis subæqualibus erecto-patulis. Stamina per paria basi connata. Antheræ oblongæ, basi bisetæ. Stylus pilosus. Capsula 5 lin. longa, lanceolata, glabra, a medio tetraptera. (v. in h. reg. vindob., berol. etc.)
6. C. *TWEEDIANUS*, fruticosus, caule adscendente apice pubescenti-scabro, fo-

liis repando-subcrenatis obtusis basi acutis brevipetiolatis glabris, floribus axillaribus 1-3 in pedunculo brevissimo aggregatis, calycis ultra medium divisi lacinias subulatis lanuginoso-ciliatis, bracteis oblongo-lanceolatis, corollæ in fuudibuliformi calyce duplo longiore, lacinias ovatis obtusis, antheris basi bimucronulatis. ♂ In silvis montanis siccis prov. Bonariensis ad Rio d'Achuhy (Tweedie! in herb. Hook.). Similis *C. Maranhonis*, at corolla duplo fere major. Antherarum mucronuloni conniventes. (v. in h. Hook.)

7. *C. HIRSUTISSIMUS*, suffruticosus ?, totus glandulosus hirsutus, caule adscendente, foliis omnibus ovatis acutiusculis subrepandis in petiolum brevem attenuatis, floribus axillaribus ternis quinise cymoso-gloemeratis, calycis ad  $\frac{1}{2}$  ab apice divisi lacinias setaceis, corollæ infundibuliformi calyce  $\frac{1}{2}$  longiore, lacinias emarginatis, antheris basi bicalcaratis. 2♂? In Mexico, supra Hacienda de Guadalupe, Decembri (Ehrenberg! in herb. gen. berol. n. 1223). A *C. Maranhonis* differt imprimis hirsutis densâ, foliis undique hirsutis subtusque subtomentosis, latioribus, calycibus minus profunde divisis. (v. in h. gen. berol.)
8. *C. PULEGIUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 25), suffruticosus, pubescens-canus, subvelutinus, caule erecto, foliis subrepandis obtusis basi attenuatâ sessilibus, inferioribus obovatis superioribus oblongis, floribus axillaribus geminis-quinis gloomeratis sessilibus, bracteolis setaceis calycibusque hirsutis, calycis lacinias setaceo-attenuatis basi ad  $\frac{1}{2}$  connexis, corollæ infundibuliformi calyce haud duplo longiore, lacinias rotundatis integris, antheris basi bicalcaratis. ♂ In Brasilâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 76), ad S. Paulo (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 70). Similis *C. Maranhonis*, differt staturâ humili digitali, pubescensia brevi densâ molli, calycibus eglan-dulosis, corollæ lacinias integris, foliis anguste sessilibus nec petiolatis. Capsula lanceolata tetrasperma? (v. in h. reg. berol. et petrop., etc.)
9. *C. HYGROPHILOIDES* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 26), suffruticosus, pubescens, caule erecto, foliis integerrimis obtusis in petiolum attenuatis inferioribus obovatis superioribus ovalibus, floribus axillaribus geminis-quinis gloomeratis, bracteolis setaceis calycibusque hirsutis, calycis lacinias a basi ad  $\frac{1}{2}$  connexis setaceo-attenuatis, corollæ infundibuliformi calyce haud duplo longiore, lacinias late ovalibus integris, antheris basi calcaratis. ♂ Pto Grosso in Brasilâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 75). Similis et fortassis varietas *C. Pulegium*, differt pubescensia caulis foliorumque longiore laxiore, foliis in petiolum angustum distincte attenuatis neque adeo cunei formi-sessilibus, magis ovalibus quam ex cuneatis oblongis, corollæ paulo ma-jore. (v. in h. reg. berol.)
10. *C. NAGCHANA*, caule procumbente basi radicante foliisque oblongis obtusis basi cuneiformibus repando-crenatis scabris, pedunculis axillaribus brevissimis trifloris, bracteolis spatulatis, corollæ calycis lacinias subulatis elongatis bre-viori, antheris basi bicalcaratis calcaribus indivisis. ♂ In India orientali ad Patna (Hamilton.) *Dipteracanthus Nagchana* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 82. *Ruellia Nagchana* h. Hamilt.! in Wall. cat. n. 2396.
11. *C. REPENS*, suffruticosus, caule procumbente repente geniculato dense pu-bescente, ramis brevibus adscendentibus dense foliosis, foliis subrepandis obtusis in petiolum decurrentibus, inferioribus obovatis glabrescentibus, superio-ribus ovalibus plus minus hirsutis, ramulorum brevius petiolatis, floribus axillaribus geminis ternis subsessilibus, hracteis oblongis, bracteolis setaceis calycibusque hirsutis, calycis lacinias ad medium usque a basi connexis setaceis, corollæ infundibuliformi calyce haud duplo longiore, lacinias late ovalibus emarginatis. ♂ Ad Cheuchin (?) Peruviaæ (Ruiz! in herb. gen. berol.), Amancaæ in Peruvia, Augusto (Mathews! n. 723 in herb. Hook.). *Ruellia repens* Ruiz! 1. c. *Proximus C. hygrophiloidi*, differt autem caule procumbente valde geniculato elongato et lacinias corollæ emarginatis. Typus ramificandi *C. Quitensis*, sed alii longius differt. Capsula longitudine calycis, tetrasperma. (v. in h. gen. berol. et Hook.)

12. *C. CILIATUS*, suffruticosus, caule procumbente glabrescente apice ramisque adscendentibus canescens puberulis, foliis repando-crenatis obtusis cum cuspidulo exiguo in petiolum longum decurrentibus basin versus ciliatis in costis scabris, inferioribus minoribus subspathulatis, superioribus majoribus ovalibus, floribus axillaribus geminis-quinis sessilibus, infimis glomeratis brevipedunculatis, bracteis oblongis ciliatis, bracteolis lanceolatis calyce multo brevioribus, calycis lacinias a basi usque ad medium connexis setaceis hirtis, tubo scabro, corollâ infundibuliformi calyce paulo longiore, lacinias obtusis, antherarum calcaribus exiguis. ♂ In Peruviâ ad Huanuco (Ruiz!). Ruellia ciliata Ruiz! in herb. gen. berol. Similis *C. repenti*, sed differt ramis longioribus adscendentibus erectis cum foliis fere glabris, foliis superioribus majoribus late viridibus evidenter repandis crenatis subinde subangulatis, antheris submuticis. A *C. ovato* et oblongifolio differt petiolis longioribus, floribus minoribus, antheris submuticis a reliquis cunctis sui generis ablutis. (v. in h. gen. berol.)
13. *C. AMENUS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 27), suffruticosus, caule erecto glabro apice puberulo, foliis oblongo-lanceolatis obtusis subsessilibus integerrimis glabris, floribus axillaribus ternis quinqueglomeratis, glomerulis oppositis bracteolis lanceolatis interstinctis, superioribus contiguis, corollâ infundibuliformi calyce hirsuto haud duplo longiore, lacinias oblongo-ovalibus emarginatis, antheris basi bicarparatis. ♂ In Brasiliâ (Sellow! in herb. reg. berol.). A *C. Maranonis* differt imprimis foliis vix petiolatis angustioribus glabris apice magis rotundatis et corollâ paulo magiore ( $\frac{1}{2}$  poll. longâ). Folia radicalia parva, spathulata. Planta spithamea. (v. in h. reg. berol.)
14. *C. SERPYLLUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 26), suffruticosus; caulinis erectis pubescentibus, foliis glabris obtusis integerrimis basi angustâ in petiolum brevissimum contractâ sessilibus punctulatis, inferioribus ovalibus, superioribus lanceolatis, floribus axillaribus oppositis solitariis sessilibus, bracteolis linear-lanceolatis calyce ad  $\frac{1}{2}$  basi gamosepalo glabro longioribus, lacinias calycis apice capillari-setaccis, corollâ infundibuliformi calyce paulo longiore, lacinias subtrotundis repandis, antheris basi bicarparatis setis exiguis. ♂ In Brasiliâ campis siccis ad Rio Pardo fluvium, Septembri (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 45, 71 et 463). Spithamea. Differt a praecedentibus foliis calycibusque glabris, a sequente caule pubescente et corollâ 6 lin. longâ. Folia ut in *C. Pulegio* sessilia, inferiora 4 superiora 5-6 lin. longa. Corolla pallide cœrulea. Antheræ inclusæ, oblongæ, calcaribus minimis. (v. in h. acad. petrop.)
15. *C. QUITENSIS*, suffruticosus, caule procumbente foliisque oblongis basi cuneatis obtusiusculis integerrimis pubernis, floribus axillaribus cymoso-aggregatis, lateribus cymulæ bibracteolatis bracteolis lanceolatis calyce longioribus, corollâ infundibuliformi calyce hirsuto haud duplo longiore, lacinias ovalibus rotundatis, antheris basi bicarparatis calcaribus bi-tridentatis. ♂ Prope Quito in radicibus Panecilli, alt. 1500 hexapod. (Humboldt!), in silvis Cordilleræ prov. Vera Cruz imperii Mexicanæ alt. 3000 ped., Aprili (Galeotti! n. 934 in herb. Hook. et Benth.). Ruellia Quitensis Humb. et Kth nov. gen. 2 p. 240, Kunth synops. 2 p. 37, herb. Willd. n. 11651! Calcar loculi antheræ basi dilatatum, hinc in dentes 1-3 parvos exicns. Flores lutescenti-rubri ex Galeotti. (v. in h. Willd., Benth. etc.)
16. *C. JASMINUM-MEXICANUM*, suffruticosus, caule adscendente pubescenti-canæ, foliis omnibus ovalibus obtusis in petiolum attenuatis integerrimis glabris in margine costisque scabris, floribus axillaribus solitariis geminis sessilibus versus apicem caulis in ramulis axillaribus brevissimis secundis collectis, bracteolis lanceolatis calyce paulo longioribus, calycis lacinias setaceis hispidulo-scabris tubum corollæ æquantibus, corollâ infundibuliformis tubo

faucibus longiore, limbi laciniis ovalibus integris, antheris basi bicalcaratis calcaribus indivisis, radice fasciculata fibris crassis. ♂ Prope Mexico urbem (Alaman! et Mairet! in herb. DC. n. 345 et 349, Graham in herb. Bentham.), Morelia in imp. Mexicano alt. 6000 ped., a Junio in Octobrem (Galotti! n. 935. in herb. Hook. et Benth.), Panama (Tweedie! in herb. Hook.). Jasmin mejicanum Alaman! in herb. DC. Differt a C. Schiedeano foliis omnibus revera ovalibus (7 lin. longis 3  $\frac{1}{2}$  lin. latis) et flore  $\frac{1}{2}$  maiore, caule etiam magis pubescente, quâ notâ et a C. adscendente disjungitur. A C. Quiteni et foliis differt latioribus et calcare antherarum simplici. Flores cerasi.

(v. in h. DC. , Hook., Benth. etc.).

*β. macranthes*, floribus majoribus, foliis oblongo-lanceolato-cuneatis ad costas paulo evidenter pilosis. In planicie sterili ad Aguas Calientes (Hartweg! n. 1617). (v. in h. Hartw.)

17. C. SCHIEDEANUS, suffruticosus, caule procumbente adscendente pubescenti-scabro, foliis obtusis basi cuneatis integerrimis in margine costisque scabris, inferioribus obovatis, superioribus lanceolatis et linearis-lanceolatis, floribus lateralibus solitariis subsessilibus, bracteolis lanceolatis calyce paulo brevioribus, calycis laciniis setaceis hispidulis tubum corollæ æquantibus, corollâ infundibuliformi calyce duplo longiore, laciniis subrotundis, antheris basi bicalcaratis calcaribus indivisis. ♂ In collibus apricis prope Jalapam Mexicanorum (Schiede! in herb. gen. berol.), Mexico, prope Regia (Ehrenberg! in herb. gen. berol.). Ruellia Quitenis? Schlecht. in Linnaea 5 p. 96. Probabiliter varietas C. Quitenis, a quâ, præter calcaria antberarum indivisa differt corollâ calycem magis superante, floribus solitariis haud aggregatis et foliis angustioribus, A.C. adscendente distinguitur colore non glaucescente et corollâ minore. (v. in h. gen. berol.)

18. C. ADSCENDENS (Hochst.), caule suffruticoso canescenti-scabro, foliis oblongis obtusis basi attenuatis glaucescentibus glabris in costis et marginis scabriusculis, floribus axillaris aggregatis solitariisque oppositis brevipedicellatis, bracteolis lanceolatis calycem æquantibus, calycis laciniis setaceis scabris ad medium divisis, corollâ infundibuliformi calyce paulo duplo longiore, laciniis limbi obovatis rotundatis, calcaribus antberarum indivisis. ♂ In Abyssinâ (Kotschy! in herb. Hochst.). Differt a C. Quiteni calcare antherarum simplici, a C. Schiedeano glaucedine quâdam, foliis magis oblongis quam cuneatis et corollâ dimidio saltem majore. (v. in h. Hochst.)

19. C. HYSSOPIFOLIUS, caule suffruticoso adscendente tetraquetro foliisque linearibus obtusis glaberrimis, floribus solitariis brevissime pedunculatis axillaribus, bracteolis propriis lanceolato-linearibus obtusis calyce setaceo-acuminato brevioribus, laciniis limbi obovatis rotundatis. ♂ In Abyssinâ (Kotschy! in h. Hochst.). Ruellia hyssopifolia Hochst. Similis C. adscendenti, sed diversus glabritate et foliis multo angustioribus. Specimen nostrum hinc inde glutinositens, nescio an naturâ suâ. (v. in h. Hochst.)

20. C. PERROTETII, glaber, caule suffruticoso adscendente obtuse tetragono lœvi inferne teretiusculo, foliis oblongo-lanceolatis obtusis in petiolum mediorum decurrentibus integerrimis margini lœvibus subtus evidentius lineolatis, floribus verticillatis fascicularibus, calycibus ad medium usque quinquefidis laciniis subulato-setaceis scabriusculis, capsula lanceolata glabra. ♂ Ad Seuegal fluvium (Perrottet! in herb. DC. n. 515 et in herb. Nees. ex herb. mus. paris. n. 28), in regno Fazohel (Kotschy! n. 558. in herb. Hook.). Flores parvi. (v. in h. DC. et Hook.)

21. C. GRACILIS, caule fruticuloso di-trichotome, gracili diffuso scabro, foliis ovalibus obtusis integerrimis in petiolum brevem attenuatis glabris, floribus fasciculatis ternis fasciculis oppositis alternis demum nutantibus, calycibus ad basin fere divisis laciniis e basi latiori arcte contiguâ subulatis hirtulis, corollæ tubo brevi, antheris subnudicis. ♂ In ins. Madagascar (Lyell! in h. Hook.). Folia 4-7 lin. longa, 4 lin. lata. Corolla 3 lin. longa, tubo cylindrico

- faucibus cum limbo breviore. Capsula calyce longior, glabra, 4-sperma, nutans. Similis sane C. Madagascariensi, sed floribus duplo minoribus aliisque characteribus satis ab eo diversus. (v. in h. Hook.)
22. C. MADAGASCARIENSIS, caule fruticoso dichotomo pubescenti-hirto, foliis ovalibus utrinque attenuatis obtusiunculis integerrimis in petiolum longum hirtum cuneatim decurrentibus glabris supra in costis scabris, ramorum foliis minoribus, floribus dimidiato - verticillatis, fasciculis alternis sessilibus, calycibus paulo ultra medium divisis mox ad basin fassis, lacinis subulatis patentibus hirtis, capsula lanceolata glabra, corollæ tubo gracili, antheris multiculis. ♂ In ins. Madagascar nemorosis circa Vohemar (Richard! ex h. mus. paris. iu herb. Nees. n. 62). Corolla tubo gracili, 6-8 lin. longa. Anthere basi obtuse mucronata, emiso semine ovales, planae. C. Perrottetii affinis, sed calyce profundi diviso, laciuiis hispidis foliisque latioribus sed satis differens. (v. in h. paris. et Nees.)
23. C. LAVANDULACEUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 27), glaber, foliis lanceolatis acuminatis sessilibus integerrimis, floribus axillariis ternis quinqueflos glomeratis glomerulis oppositis bracteolis setaceis ciliatis scabris brevibus interstinctis, corollâ calyce duplo longiore, laciuiis ovatis rotundatis, calyce glabro ad 1/4 basi quinquefidio, laciuiis lanceolatis ciliatis apice setaceis. ♀ ♂ ? In Brasiliâ, loco non indicato (Beyrich! in herb. Nees.), in campis siccis prope Rio Pardo Brasiliæ, Septembri (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 51 et 501). Calyx pro mole corollæ grandiusculus, glaber, laciuiis solis ciliatis. Caulis 6-8 poll. altus, quadrangularis, totus glaberimus, pedalis, in nostro specimine simplex. Folia (floralia) 1 1/4-1 1/2 poll. longa, 3-2 lin. lata, infima minora axillis nudis. Corolla pallide coerulea. (v. in h. petrop. et Nees.)
24. C. HEUDELOTIANUS, caule suffruticoso adscendente pubescenti-cano, foliis lanceolatis obtusis in petiolum brevem attenuatis subintegerrimis punctulatis scabriusculis, pedunculis axillariis 1-bifloris calyce plus duplo brevioribus calycibusque ad medium fere quinquefidis glandulosis, laciuiis subulato-setaceis, antheris longiter calcaratis. ♂ In Senegambia præruptis Bondou (Heudelot! in herb. mus. paris., in herb. Nees n. 18 et in h. Hook.). Pedunculi alterni patentes. Calyces crecti, 6 lin. longi. Corolla pollicaris, rubro-violacea (Heudelot). Autberarum calcaria longa, acutissima (v. in h. paris., Hook. Nees, etc.)
25. C. SIPHONANTHUS, caule fruticoso juvenili pubescenti-scabro dein glabrecente, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis acumine obtuso basi acute in petiolum mediocrem desinentibus integerrimis punctato-lineolatis scabriusculis subtus in costis pubescenti-scabris, pedunculis axillariis (oppositis alternis) petiolum æquantibus cymosis scabris calycibus ad medium fere quinquefidis laciuiis subulatis glandulosis, antheris basi brevissime bimucronatis. ♂ In versuris agrorum prope Emirnam insula Madagascan circa urbem Tananarivo. (Bojer in h. Hook.). Ruellia siphonantha Hilsenb. et Boj. in herb. DC. n. 116 et 136 et in h. Hook.! Nomen Madag. Vouën-ala-Keli. Peraffinis C. Heudelotiana, differt foliis longius petiolatis apice magis attenuatis et antherarum calcaribus brevissimis mucronuliformibus. Caulis acute tetragonous. Pedunculi bifidi ramis 2-3-floris. Bractea ad basin cymæ duæ opposite, petiolata, oblongo-lanceolata, obtusa, longitudine calycis. Calyces 6-lin. longi. Corolla sesquipollucaris, incurva, faucibus obconicis. (v. in h. DC. et Hook.)
26. C. SETOSUS, totus setis patentissimis hirsutus, caule procumbente, foliis linearibus obtusis sessilibus, floribus axillariis subsessilibus solitariis adscendentibus, bracteolis foliis conformibus calyce paulo longioribus, calycis ultra medium quinquepartiti laciuiis linearis subulatis hirsutissimis. ♂ Aapges River in prom. Bonæ Sp., Octobri (Burchell! in herb. Hook. cum Blephari setosâ), Grahamstown (herb. Hook.!). Blephari setosæ simillimus habitu et foliis, licet genere diversissimo. Planta humilis, inamoena, a basi ramosa et

florens. Calyx semipollucaris, basin versus glabrescens. Corolla semipollucaris, lacinii rotundatis. Capsula longitudine calycis. Setæ longiores et paulo laxiores quam in Blephari setosâ; folia longiora. (v. in h. Hook.)

*Species dubia.*

27. C. *MICROPHYLLUS*, caule prostrato, foliis ovatis (ex iconē ovali-oblongis) minutis, floribus axillaribus solitariis (oppositis) ebracteatis. *¶* In oppidis Chalma, S. Miguel, aliisque Novæ Hispaniæ, Augusto (Cavanilles). Ruellia microphylla Cav. ie. 6 p. 63 t. 586 f. 2, Spr. syst. 3 p. 821. Ex iconē persimilis C. Jasmino Mexicano, at, nisi error irrepererit, differt bracteolarum defectu. Planta tenera. Radix crassa. Petioli mediciores. Folia 2 lin. longa, integerrima, conformia, obtusa. Flores pallide cœrulei. Calycis lacinia haud profunde disretæ, apice subulatæ, basi ciliatae. Capsula calyce paulo brevior, tetrasperma (Cav.).

XXIX. HOMOTROPIUM N. ab. E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 47.

Calyx ad summum ultra medium quinquefidus, æqualis, lacinii lanceolato-subulatis sub fructu erectis. Corolla tubulosa, sursum paulo latior, limbo bilabiato, labio superiori bifido, inferiori trifido, lacinii æqualibus (oblongis) erectis. Stamina 4 didynama, subexserta, per paria basi connata; antheræ ovales, loculis in connectivo lanceolato parallelis discretis basi submucronatis. Stigma simplex, acutum. Capsula a basi ad medium compressa, asperma, hinc bilocularis, 4-16-sperma. Disseminationem completem. Semina ovata, subcordata, compressa, strigosa, retinaculis suffulta. — Fruticulus Brasiliensis. Cymæ axillares bifidæ, ramis secundifloris, defectu ramuli alterius simplicibus. Bracteæ parvæ, angustæ; bracteolæ nullæ. Flores brevi-pedunculati, adscendentes, speciosi, coccinei. Calyces grandiusculi. — A genere Echinantho, cui proximum, differt hoc nostrum calyce minus profundè diviso, corollâ bilabiata, et capsulâ tetraspermâ. Ab Asystasiâ dignoscitur calyce majore, corollâ tubulosâ bilabiata limbo erecto nec infundibuliformi limbo patulo.

H. *ERYTHRORHIZUM* (N. ab. E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 48), pubescens, foliis ovato-oblongis, calycibus undique glanduloso-pubescentibus.

α. foliis basi cuneatis oblongis ellipticis. *¶* In Brasiliæ silvis Catingas ad Formigas prov. Minarum Generalium, Augusto (Martius!) et in deserto Bahiensi (herb. Mart.! et ex eo herb. monac.!), Ribeiro Catinga (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 3079 et ex eod. herb. in herb. Mart.!) (v. in h. monac., vindob., Mart. etc.)

β. *latifolium*, foliis ovatis e basi rotundata in petiolum acutatis. — In prov. Goyaz Brasiliæ (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 5005). Zahlbrücknera pilosa Pohl! ic. fl. bras. in herb. imp. vindob. n. 5005. (v. in h. imp. vindob.)

XXX. FABRIA Meyer in cat. pl. Drèg. 1837. — Ruellia sp. Thunb. Linn. — Dipteracanthi sp. N. ab E. in Linnæa 15 p. 353, Meissn. gen. p. 294.

Calyx bilabiatus, labio superiori trifido, inferiori bifido. Corolla infundibuliformis, limbo subregulari quinquefido. Stamina 4, subæqualia, per paria basi conjuncta; antheræ biloculares, loculis parallelis muticis basi æqualibus alterove paulo altiore. Stigma bifidum. Capsula basi contracta, asperma, prope a medio 8-12-sperma. Semina compressa, retinaculis suffulta. — Suffrutices Capenses, valde ramosi, plus minus pilosi saltimve ad genicula et margines foliorum bractearumque ciliati. Folia ovata subcordata, coriacea, parva. Bracteolæ foliis angustiores, calyci saltem

æquales. Flores axillares, solitarii, brevipedicellati, bibracteati, medios, cœrulei. — Differt a Dipteracantho solummodo calyce subbilabiato, scil. laciinis duabus superioribus ad medium usque, inferioribus ad  $\frac{1}{2}$  a basi saepè coherentibus, divisurâ mediâ serè usque ad basin penetrante.

1. *F. PILOSA*, foliis ovatis subcordatisve apice angustioribus obtusiusculis obtusisve supra dense lineolatis glabris marginis subtusque in costis et ramorum geniculis hispido-ciliatis, bracteolis ovali-oblongis. ♂ In Africâ australi, in saxosis loco Kopje dicto, haud procul a flumine Kogarivier, in collibus inter Bosjesmansrivier et Karragarivier Octobri et Decembri, in monte Bothasberg, ad flumen Zwartkopsrivier juxta predium Pauli Mare (Uitenhage), ad flumen Katrivier ad castellum Beaufort (terra Caffrorum) (Ecklon! Drégo! Burchell!) Ruellia pilosa Linn. suppl. p. 290, Willd. sp. pl. 3 p. 371, h. Vahl! in fol. I spec. Thunberg. Ruellia cordata Thunb. fl. cap. ed. Schult. 2 p. 480. Ruellia ciliaris Pers. syn. 2 p. 176. Dipteracanthus pilosus N. ab E. in Linnaë 15 p. 353. Fabria rigida Meyer in cat. pl. Drieg. 1837 et in h. gen. berol. Flores in foliorum superiorum axillis, minime terminales. Corolla angusta,  $\frac{1}{2}$  poll. longa et ultra. Rami flexuosi, graciles, tetragonoi, sulcis oppositis alternatim profundiorebus. Folia semipollucaria, plerique ovata, basi obtusa aut subcordata, chartacea, in costâ marginaque albo-hirta, obtusiuscula, nonnulla subrotunda et obtusissima, supra grosse lineolata et fere glabra. Pedunculus petiolo brevi paulo longior. (v. s.)

2. *F. CORDIFOLIA*, foliis cordato-ovatis obtusis ramisque undique pubescentibus, bracteolis ovalibus. ♂ Ad Uitenhage (in herb. Necs.), Macahi Bay (Burchell in herb. Hook.). Dipteracanthus cordifolius N. ab E. in Linnaë 15 p. 354. Ruellia ovata Thunb. fl. cap. l. e. Ruellia pubescens Pers. syn. 2 p. 176. Species a *F. pilosa* distinctissima: foliis undique cum caule patenti-pilosis cordatis, infinitis subrotundis, corollis magis hirtis, antherarum loculis parallelis æqualibus (v. in h. Ecklon. et Hook.)

XXXI. *PETALIDIUM* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 82, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 699, Meisn. gen. p. 294 (203). — Ruelliae sp. Roth Wall. Heyne.

Calyx æqualis, profunde quinquepartitus, bracteolis duabus valvatim inclusus. Corolla infundibuliformis, limbo subæquali quinquefido. Stamina didynama, inclusa; antheræ oblongæ, sagittatæ, loculis parallelis æqualibus basi aristatis. Stigma bifidum, laciinis filiformibus. Capsula basi brevi spatio compressa, asperma, hinc in medio tetrasperma. Dissepimentum completum, adnatum, persistens. Semina retinaculis uncinatis subulatis suffulta, ovata, acuta, compressa, immarginata. — Frutex Indiæ orientalis specie Barleriae. Folia crenata. Flores pedunculati, axillares, solitarii vel in ramulo brevi fasciculum-axillarem exhibentes cœrulei, speciosi, bracteolis magnis valvatum contiguis Barleriam mentientibus.

*P. BARLERIOIDES* (N. ab E. l. c.), glaucescens, foliis oblongis crenato-dentatis. ♂ In Indiæ orientali, in Sheikpure et Monghir (Hamilt.!), in montibus valli Degræ viciniis (Wallich!), Hurdwar in montibus Sivalensisibus atque in hortis (Edgeworth!), Kcripasi in Canoor (Jacquemont! voy. n. 184 in herb. mus. paris.), Kaledunga (h. Hook.!). — Bot. mag. t. 4053. Ruellia barlerioides Roth nov. sp. pl. 310, Spr. syst. 2 p. 821, herb. Hamilt.! Wall. cat. n. 2389 a, b. Ruellia bracteata Roxb.! herb. et fl. ind. 3 p. 47, Wall. cat. n. 2389 c. Eranthemum barlerioides Roxb. fl. ind. cd. Car. et Wall. 1 p. 114, Dietr. sp. pl. p. 447 n. 25? Corolla pollicaris, extus glanduloso-pubescentis, intus circa fauces flavo-hirsuta, cœrulea; tubus brevis, limbus campanulatus, laciinis rotundatis patulis, tribus inferis nonnihil brevioribus. (v. in h. Wall., Edgeworth, DC., Hook.)

XXXII. DIPTERACANTHUS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 81, in Lindl. introd. ed. 2 p. 444 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 27, Endl. gen. p. 699, Meisn. gen. p. 294 (204). — Neowedia Schrad. in Maxim. Prince. it. bras. 2 p. 343 et in Gatt. gel. Anz. 1821, 1 p. 706. — Dizygandra Meisn. gen. pl. p. 294, Endl. mant. 1 p. 62.

Calyx æqualis, plus minus profunde quinquefidus. Corolla infundibuliformis, limbo subæquali quinquefido. Stamina didynama, inelusa, filamentis basi contiguis aut conjunctis; anthere linearis-sagittata, loculis parallelis æqualibus muticis. Stigma bilamellatum, basi nodulosum. Capsula basi compressa asperma, plerunque a medio, raro propius a basi 2-8-12-16-sperma. Disseminatum in medio membranacum, denique maximam partem evanescens. Retinacula uncinata, præmorsa. Semina orbiculata, compresca, margine tumido discreto cincta. — Herbae Americanæ, Asiaticæ, paucæ Africanæ et Australasicæ, repentes vel crectæ, molliusculæ, rarius frutices. Flores aut omnes aut inferiores saltem axillares, vel solitarii vel fasciculati, sessiles vel pedunculati, supremi subinde in racemum parvibracteatum collecti. Bractæ duæ majores foliaceæ, sæpe petiolatæ, subjectæ calyci vel fasciculo; in racemosis minores et angustiores. Bracteolaæ vel nullæ vel exiguae. Formæ anomalæ: capsula abortu-tetra- vel disperma, ovoidis tamen sterilibus adjectis semini.

§ 1. *Hygrophiloidei. Caulis herbaceus, glaber, quadriquetter, sæpe coloratus. Flores verticillati. Calyx minus profunde divisus ac in reliquis (ad  $\frac{3}{4}$ - $\frac{4}{5}$ ), laciniis angustis strictis. Capsula, saltem ab origine ovarii, 6-8-sperma.*

1. D. LAMIIFORMIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 43), herbaceus, caule glabro acute tetragono angulis submarginatis, foliis petiolatis apice attenuatis subintegerrimis supra strigosis demum glabrescentibus subtus in costis strigiloso-scabris, iufimis oyato-oblongis basi obtusis, superioribus basi acutis, floribus axillaribus aggregato-scissilibus verticillatis, bracteis partialibus bracteolisque lanceolato-linearibus linearibusque patulis calyce longioribus, calyce ad  $\frac{1}{4}$  quinquefido, corollâ infundibuliformi, fructu 4-6-spermo. 2 In Serra Grande Brasiliæ (Schott! in herb. imp. vindob. n. 4728). (v. in h. imp. vindob.)

2. D. MENTHÓIDES (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 44), herbaceus, caule glabro acute tetragono angulis submarginatis, foliis petiolatis apice attenuatis subintegerrimis supra strigosis demum glabrescentibus subtus in costis strigiloso-scabris, iufimis oyato-oblongis basi obtusis, superioribus basi acutis, floribus axillaribus aggregato-scissilibus verticillatis, bracteis partialibus bracteolisque lanceolato-linearibus linearibusque patulis calyce longioribus, calyce ad  $\frac{1}{4}$  quinquefido, fructu 4-8-spermo. ① In silvis ad lacum Tefé prov. fluminis Nigr. Brasiliæ, Novembri, Decembri (Martius!), prope Vargem in Brasiliæ, Maio (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 35), in silvis umbrosis humidiæculis Serra d'Estrella prov. Rio de Janeiro, Martio et Aprili (Riedel! ibid.), ad Rio de Jauéiro (Luschmath! in herb. acad. petrop.), ad Novum Friburgum prov. Rio de Janeiro (Claussen! in herb. mus. paris. n. 223). Differt hæc nostra species a D. lamiiformi, cui simillima est, foliis omnibus petiolatis, petiolo inferiorum 8-9 lin. longo, superiorum 4-3 lin.; superioribus et rameis haud basi ovata sessilibus sed lanceolatis basique acutæ in petiolum decurrentibus ( $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. longis 4-7 lin. latiss.), inferioribus autem cum petiolo 8 lin. longo  $4\frac{1}{2}$ -5 poll. longis et 1-1  $\frac{1}{2}$  poll. latiss., floribus absque pedicellis congestis, bracteis bracteolisque apicem versus haud latioribus. Calyx 3-5 lin. longus. Corolla anguste infundibuliformis, fere pollicaris, alba, venis violaceis; limbis laciniæ suborbicularis, rotundatae. Stamina per paria basi connata. Capsula omnino ut in D. lamiiformi, sed

paulo major. Calyces juniores in specimine herb. mouac. bilineares sunt. (v. in h. Mart. etc.)

3. D. **MICROCALYX**, herbaceus, caule juvenili pubescens-scabro adulto glabrescente quadriquattro divergenti-trichotomo, foliis brevissime petiolatis ovato-oblongis attenuatis repandis basi obtusis supra glabris lineolatis subtus in costis pubescenti-scabris, floribus axillaribus glomerato-binis ternisve sessilibus glomerulis alternis oppositivis, bracteis bracteolisque calyce parvo duplo brevioribus ovato-subulatis calycibusque ad  $\frac{1}{2}$  quinquefidis scabris, corolla infundibuliformi, lacinis rotundatis.  $\mathcal{L}$  In locis silvaticis Savannæ Guianæ Anglicæ, Aprili (Schomburgk! n. 1242 in herb. gen. berol.). Differt a D. lamiaefolio et menthoide bracteis brevissimis glomerulisque florum multo minoribus. Corolla ut in illis circiter 9 lin. longa, « violacea, basi albida, » ad originem faucium reflexa, tubo fauces cum limbo subaequante, limbo erecto regulari. Stamina inclusa, brevia, per paria basi conjuncta. (v. in h. gen. berol.)

4. D. **RUBICAULIS**, suffruticosus, glaber, caule erecto, ramis tetragonis angulis verrucosis foliis oblongo-lancolatis acutis basi angustatis subintegerrimis repandis succulentis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus vel in cymulas trifido-capitatas pedunculatas collectis, bracteolis lanceolatis vel linear-lanceolatis in petiolum attenuatis calyce longioribus, calycis paulo ultra medium 5-fidi lacinias lincari-subulatis glabris, capsula pruinosa tetrasperma.  $\mathfrak{z}$   $\mathcal{L}$ ? In littore Oceani pacifici prope Querelares et Acapulco Mexicanorum (Cavaniiles! Humboldt! Barclay!). Ruellia rubicaulis Cav. ic. 5 p. 10 t. 417, Pers. synops. 2 p. 176. Ruellia foetida Willd. en. 2 p. 656, herb. n. 11632, Kunth in Humb. et B. nov. gen. 2 p. 240, Kunth en. 2 p. 37. Folia obsolete rarerque crenulata, saepè et integerima vel undato-repanda, in sicco specimine veluti papulosa, opaca; venæ debiles. Caulis trichotomus, purpureus, verrucis albis. In speciminiis perfectioribus rami oriuntur ex foliorum angulis breves, apice 3-5-flori, folii floralibus reliquis similibus sed paulo minoribus; ramuli hi versus apices ramorum paulo longiores cymam bi-trimeram exhibent. Flores vel fasciculato-oppositi propterea que verticillati vocati, vel simpliciter oppositi. Calyx est Calophanis. Corolla infundibuliformis, lutea (!) limbo 5-fido regulari. Stamina 4, didynamia; antheræ oblongæ, biloœculatae, loculis parallelis basi muticis. Capsula pruinosa-albicans, a medio incrassata 4-sperma. (v. in h. Humboldt. etc.)

### § 2. *Calycosi. Calycis lacinia lata herbacea.*

5. D. **CALYCOSUS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 28), suffruticosus glandulos-hirtus, foliis ovali-oblongis apice attenuatis basi acutis repandis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis secundis, bracteolis ovali-oblongis acutis sessilibus calycem grandem æquantibus, corollæ tubo faucibus breviori, limbi lacinias rotundatis, capsula dodcaspermâ calyce tectâ.  $\mathfrak{z}$  In Brasiliâ, loco non adnotato (Sellow! in herb. reg. berol. n. 268). Caulis ramosus probabiliter diffusus, obtuse quadrangularis lateribus oppositis alternis sulco notatis, undique maxime ad genicula pilis brevibus rufescensibus capitatis vestitus. Folia cum petiolo 2-3-lineari 3  $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, basi acutâ in petiolum desinentia, subcuspidato-acuminata, repanda, costis 5 debilibus. Pedunculi ex axillis ejusdem lateris 2-3 lin. longi, hirsuti. Bracteæ cum calyce  $\frac{3}{4}$ -1  $\frac{1}{2}$  poll. longæ. Haec 3  $\frac{1}{2}$ -4 lin. latæ, dense pubescenti-hirtæ, minus glandulosæ. Calycis lacinia lanceolatae, acuminatae, herbaceo-tenues pubescenti-glandulosæ, nonnihil inæquales, duabus longioribus. Corolla 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa. Calyx fructifer fere bipollicularis, subfusciformis, clausus, fractum penitus includens. Capsula 9-10 lin. longa. (v. in h. reg. berol.)
6. D. **GARDNERI** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 28), caule fruticoso foliisque oblongis superioribus utrinque acutis integrerrimis sessilibus dense hirsutis, floribus axillaribus oppositis subsessilibus (inferioribus in ramulo nudo

terminali aggregatis), bracteolis linearis-lanceolatis obtusisculis sessilibus calyce grandi paulo brevioribus, calycis lacinias oblongis acutis herbacis extus hirsutis intus tomentoso-canis, corollæ tubo fauces obconicis breviori, limbi lacinias emarginatis. ♂ In prov. Piauhy et Goyaz Brasiliæ (Gardner! n. 3419 in herb. Mart. et Benth.). Folia 2  $\frac{1}{2}$ -2  $\frac{1}{2}$  poll. longa, 9-10 lin. lata, firma; inferiora minora, ovalia, obtusa, basi obtusissima, subcordata. Calyx cum pedicello vix  $\frac{1}{2}$  lin. longo crasso 10 lin. longus. Corolla 2  $\frac{1}{2}$  poll. longa. Fructus deest. Habitu accedit ad D. furcatum, sed calyce recedit ab omnibus solique D. calyco subsimilis est. (v. in h. Mart., etc.)

7. D. **LONGIFLORUS**, fruticosus, caule hirsuto, foliis ovatis obtusis basi rotundatis utrinque tomentosis pilis stellatis, floribus axillaribus solitariis alternis pedunculatis pedunculo petiolum eante edemate paulo longiore apice bicarpiolato, bracteolis foliis conformibus sed minoribus calyce grandi plerumque brevioribus, lacinias calycis ovatis acuminatis tomentosis, corollæ tubo longissimo, limbi lacinias rotundatis, capsulâ 4-spermâ inflatâ longitudine calycis. ♂ In Arabiâ Felici ad Taaes in montibus (Forskål! in herb. Vahl.). Ruellia longiflora Vahl! symb. 1 p. 45 t. 15 et herb., Willd. sp. pl. 3 p. 374, Spr. syst. 3 p. 821. Camellia longiflora Forsk. descr. p. 126. Tomento foliorum stellaris distincta a reliquis pluribus. Calyx rigidus. Corollæ tubus quadriplicaris, fauces breves obconicas, limbi erecto-patuli diameter  $\frac{1}{2}$  pollicis. Capsula pubescens (v. in h. Vahl).

### § 3. *Genuini. Segmenta calycis angusta aut mediocria.*

\* Bracteolati.

8. D. **NEESIANUS** (Martius in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 37), herbaceus, caule subsimplici stricto dense foliosis hirsuto, foliis ovalibus utrinque acutis repando-dentatis (subinde et integerrimis) hirsuto-tomentosis, floralibus superiores minoribus obtusis, floribus axillaribus solitariis oppositis in spicâ terminali dispositis, bracteolis linearis-lanceolatis obtusis calyce brevioribus, corollæ grandis infundibuliformis tubo fauces obconicas æquante. 2/ Villa Boa, Gamba Uba in Brasiliâ (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 2038), Caldas Velhas in Serra das Caldas (idem! ibid. n. 2642). Afinis D. macranthro. Caulis tetragonus, purpureus, pilis sparsis hirsutus. Folia inferiora 6-9 poll. longa, 2  $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, subacuminata, in petiolum brevem hirsutum decurrentia, ramis costalibus novenisi. Floralia abruptum minors, subsessilia, inferiors acuta, reliqua cuncta obtusa subinde cum mucronulo. Calyx pollicaris. Corolla 3 $\frac{1}{2}$  poll. longa, tubo 1  $\frac{1}{2}$  poll. longo hirsuto, faucibus ample obconicis pubescens, limbo erecto patulo, lacinias ovato-subrotundis emarginatis; color cernueus. Fructus (in var. β) pollicaris, oblongus, dense pubescens, in medio 8-spermus. (v. in h. imp. vindob. etc.)

? β. *subintegerrimus*, caule infra apicem ramum lignente, foliis subintegerrimis. — In Matto grosso prov. Cuiabensis (Sellow! in herb. reg. berol. n. 107), in saxosis umbrosis jugi Serra da Chapada, Maio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 67, 69 et 1006), Goyaz, in campis apertis siecis (Gardner! n. 3419 in herb. Hook.). Neowedia Neesiana Mart.! herb. fl. bras. n. 1117. Ruellia pilosa Vell. fl. fl. 5 t. 100. (v. in h. petrop., Hook. etc.)

9. D. **MACRANTHUS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 37), herbaceus, caule erecto glabro ad genicula barbata, foliis elliptico-oblongis oblongis utrinque mediocriter attenuatis, repando-dentatis obiterre repandis, supra strigosis subtus hispidulis, inferioribus floralibusque superioribus ovatis, floribus axillaribus solitariis, ad apicem caulis spicatum capitativem confertis, bracteolis oblongo-linearibus obtusis calyce brevioribus, corollæ grandis purpurea limbo campanulato. ♂ In Brasiliæ prov. Minarum Generalium (Gardner! n. 5132, in herb. Benth. et Hook.), in silvis umbrosis ad Mariana prov. Minarum, Martio, et supra Serra do Mar prov. S. Pauli (Martius!), in

éadem prov. (Ackermann! in herb. Mart.), in fruticetis umbrosis ad Cachoeira do Campo, Maio-Augusto et in nmbrosis Entre os Morros, Maio (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 66), Pôl! in herb. imp. vindob. n. 309 (loco non adnotato), Sabara in Brasiliâ (Vauthier! n. 181 in herb. imp. vindob. ex herb. Endl. et in herb. DC! n. 683), (Schott in eodem herb. n. 6127), Caxoeira et Sierra do S. Antouo in Brasiliâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 40, 49, 50), Cujaba (da Silva Manso! in herb. DC. n. 84), Rio de Janeiro (Raven! in herb. Bang.). Ruellia macrantha Mart.! in herb. reg. monac. Ruellia speciosa Schott! in herb. imp. vindob. n. 6127. Corolla triplicaris, limbi diametro sesquipollicaris, pubescens; tubus 12-14 lin. longus, incurvus, faux late obconica sive obovata, in lacinias transiens; limbi laciuitate subrotundæ, anguste emarginatæ, ciliatæ. Calycis laciniaæ pollicares, linearis-attenuatæ. Caulis 4-6 ped. altus, subteres, subtilissime striatus, glaber, medullâ spongiosa farctus. Folia media caulis 4-5  $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, apice attenuata acumine obtuso, basi acuta, supra plus minus strigilosa, ramis costalibus senis-novenis. Bractæ ad apicem approximatæ, sessiles, 1  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longæ, apice attenuatæ at vero obtusæ. (v. in h. Mart., monac., berol., vindob., DC. etc.)

$\beta.$  *magnificus*, foliis medii caulis oblongo-lanceolatis lanceolatisve densius strigosis. In montibus prope Villa Rica prov. Minarum, Aprili, Martio (Martius! Sellow! in herb. reg. berol. n. 33, Riedel in herb. acad. petrop. n. 72, Claussen in herb. mus. paris. n. 225 et in herb. Hook.). Ruellia magnifica Mart. herb. bras. n. 1043 et herb. reg. monac. Differt foliis angustioribus et minoribus (3 poll. longis  $\frac{1}{2}$  poll. latis) magis strigosis. (v. in h. monac. berol. Mart. etc.)

10. D. *SESSILIFOLIUS* (N. ab. E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 28), herbaceus, glaberrimus, caule erecto, foliis oblongis oblongo-lanceolatis apice attenuatis reprodidis basi obtusâ sessilibus, floribus axillaribus solitariis inter natum subsessilibus, bracteis ovatis sessilibus calyci longioribus, corolla infundibuliformi.  $\mathcal{Z}$  In silvis ad Maragosippe prov. Bahiensis, Novembri (Martius! Sellow! in herb. reg. berol.), in silvis prope Castel-Novo, Novembri (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 551). Caulis 6-8 pedes altus, simplex in nostro, cortice nitido, luteo, spongioso, inferne sulcato-angulato. Folia perfecte sessilia vel brevissime pectiolata, 5-6 poll. longa, 1-1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, acumine obtuso, ramis costalibus septenis-novenis. Bractæ propriæ pollicares, ovatae, apice attenuatae costis quinibus. Calycis laciniaæ linearis-acuminatae, glabrae. Corolla alba (Riedel), tubo cum fauce obconicæ confluenta, 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, limbis 1  $\frac{1}{2}$  poll. diametro, lacinia subrotundis obtusis vel retusis. Capsula  $\frac{1}{2}$  poll. longa, grossa, unguis brevi, glabra, 12-sperma. Gentianearum speciem refert. (v. in h. Mart. etc.)

11. D. *NEOVEDIA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 30), caule fruticoso, ramis flexuosis dependentibus tetragonis, foliis ovatis cordatis acutis glabris coriaceis, floribus axillaribus subscsessilibus vel brevipedicellatis, bracteolis ovatis sessilibus calyce duplo brevioribus, corollâ grandi infundibuliformi in limbum transeunte limbi lacinia subrotundis retusis paulo longiori.  $\mathfrak{Z}$  In silvis primevis umbrosis vallis Joaquim dos Santos ad flumen Ilheos, (Max. princ. Wied. in herb. Mart.), ibidem (Riedel! in herb. Acad. petrop. n. 274. Sellow in herb. reg. berol. ). Neovedia speciosa Schrad. in Max. princ. Wied. it. 2 p. 343 et in Goett. gel. Anz. 1821, 1 p. 706. A D. affini differt corollâ speciosiore, limbo cum tubo collato latiore, lacinia rotundatis et foliis cordato-ovatis acutis. Caulis 20 pedes altus, inter virgultas adscendens, acute tetragonos, lenticuloso-asper. Folia cum petiolo 4-5 lin. longo 5-pollicaria, 2  $\frac{1}{2}$  poll. lata, subcuspidato-acuta, pleraque basi distincte cordata, reticulata. Bracteola ovatae, 6-8 lin. longæ. Calycis lacinia lanceolatae, acuminatae, 1  $\frac{1}{2}$  poll. longæ. Corolla pubescens, coccinea, tubo 1  $\frac{1}{4}$  poll. longo, limbi diametro 2 $\frac{1}{2}$ -3 pollicum; lacinia suborbicularis leniter emarginatae. Stamina exserta. (v. in h. Mart., berol., petrop. etc.)

12. *D. AFFINIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 30), glaber, caule fruticoso, ramis flexuosis dependentibus teretiusculis, foliis ovalibus, inferioribus obtusis cum micronulo, superioribus acutis glabris basi acutiusculis petiolatis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, bracteolis ovatis sessilibus calyce duplo brevioribus, corollâ grandi infundibuliformi tubo in fauces transcente et cum iisdem limbi lacinia ovatis duplo longiore. ♂ In silvis primævis umbrosis ad viam Felisbertiam, Martio (Max.! princ. Wied. in h. Mart.), in silvis petrosis umbrosis inter Almada et Ferradas prov. Bahiensis, Decembri Martius! h. DC. n. 330), ad Ilheos, Jannario (Luschmath! in herb. Mart.), Nazareth de Farinas prope Bahiam (Blanchet). *Neovedia affinis* Schrad. in Götts. gel. Anz. 1821, 1 p. 706. *Neovedia speciosa* Mart. h. fl. bras. n. 1116. *Ruellia* (*Neovedia*) speciosa Mart.! obscurata in pl. bras. n. 2049 et in h. reg. monac. *Ruellia grandiflora* Salzm. Blanchet pl. bras. n. 677, 1056 et 1653 in h. Moricand. et DC. Corolla a basi ad introitum faucium metita  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, a basi ad limbi extrema 3  $\frac{1}{2}$  poll.; limbi diameter 2  $\frac{1}{2}$  poll.; tota pubescens coloris intense coccini. Limbi lacinia erecto-patentes, ovatae, rotundatae, subinde emarginatae; tubus curvatus, continuo in limbum transiens. Stamina faucibus longiora; filamenta purpurea; antheræ albae. Stylus purpureus. Bracteolæ propriæ ovatae, mucronatae, sessiles, calyci adpressa eoque plus duplo breviores. Calyx 1  $\frac{1}{4}$  in fructu 2 poll. longus. Frutex ad 20 pedes ascendens, late diffusus, sœpe etiam humilius, ramis subteretibus. Folia cum petiolo trilincari glabra, 4  $\frac{1}{2}$ -5 poll. longa, 1-1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, nitida, reticulata. Capsula pollicaris. (v. in h. monac., Mart. Moric., DC. etc.)
13. *D. SUBRINGENS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 31), glaber, caule flexuoso, ramis dependentibus acute tetragonis, foliis ovalibus basi acutis petiolatis, inferioribus in acumen obtusum micronulum productis, superioribus acutis angustioribus, floribus in apice ramulorum axillaribus solitariis geminis subsessilibus, bracteolis ovali-oblongis petiolatis calyce plus duplo brevioribus, corollâ grandi elongato-infundibuliformi, tubo in fauces transeunte, limbi subbilabiatis lacinia ovalibus tubo cum fauce triplo brevioribus. ♂ In silvis primævis prov. Bahiensis (Blanchet! pl. exsicc. n. 214 et 1674, Salzm.! in herb. acad. petrop.). *Ruellia grandiflora* Salzm.! in herb. acad. petrop. et Blanchet! in h. Benth.). Similis sane *D. affinis*, etiam quod calyces magnos lacinias lanceolatis instructos et corollæ colorem coccineum attinet, sed differt evidentissime tubo cum faucibus cum limbe collatis longioribus hujusquo lacinia angustioribus (apice integris), duabus sursum, tribus deorsum vergentibus. Tubus cum faucibus 3 poll. longus, incurvus, limbi laciniae pollicares. Corollæ species in universis fere *Stemonacanthum* refert. (v. in h. acad petrop.)
14. *D. SCHAUERIANUS* (N. ab E. acanth. hort. vratisl. in Linn. 16 p. 290, in ind. sem. hort. vratisl. 1838 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 29), fruticosus, glaber, foliis ovato-oblongis ellipticis oblongisve apice plus minus attenuatis obtusiusculis repandis nitidis recurvis, floribus axillaribus solitariis geminis oppositis brevissime pedicellatis, bracteolis ovali-oblongis lanceolatisve calycem excedentibus, corollæ tubo longo, fauce obconicâ tubum æquante. ♂ In Brasiliæ silvis (Max. princ. Wied.), in silvis aboriginibus ad Tejuco et prædium Comitis de Chestas prov. Rio de Janeiro (Martius!), in monte Corcovado et in silvis Macahé prov. Sebastianopolitanæ, Jan., Maio, Jul., Augusto, Septemb. (Riedel! in herb. acad. petrop.), ad Pillao in Peruvia, circa pontem Ruiz! in herb. gen. berol.), in Serra d'Estrella (Sellow! in herb. reg. berol. n. 122). *Ruellia Brasiliensis* Mart.! in herb. reg. monac. (nec. Spr.). *Ruellia liturata* hort. berol. in herb. gen. berol. *Ruellia glabrata* herb. imp. petrop.! *Ruellia solitaria* Vell. fl. fl. 5 t. 93. *Ruellia violacea* Ruiz! in herb. gen. berol. et ex h. Lambert! *Ruellia lilacina* Hook. bot. mag. t. 4147. Ad *D. Puri* accedit. Differt a plerisque foliis subcoriaceis nitidis recurvis, in speciminiibus spontaneis sœpe paulo latioribus et repandis aut repando-crenatis. Caulis glaber, rarius hirtus, ad latera alterna tuberculis exasperatus, subinde repens. Bracteolæ variant ovatae et ovato-oblongæ, integrimeras vel repandæ,

glaberrimæ vel setulis raris conspersæ, sicuti et ramuli juveniles. Corolla sessa, quipollicularis, diametro limbi 1-1 $\frac{1}{2}$  pollis, in var.  $\alpha$  cœrulea, in var.  $\beta$  alba, tubo ad fauces reflexo, pollicari, lacinia limbi ovato-subrotundis plus minus retusis, duabus superioribus paulo brevioribus, media inferiori paulo angustiore. Capsula a medio 12-16-sperma. Semina discoidea, marginata. (v. v. et sicc. sp. in h. monac., Mart., petrop., berol. etc.)

$\beta$ . *humilis*, semipedalis, bracteolis lanceolatis strigilosis. — Ad Parayba, Augusto, Camargas in Brasiliâ, Octobri (Sellow! in herb. reg. berol. n. 103, 140 et 218), Rio Janeiro (Tweedie! in herb. Benth.), in Serra dos Orgaos ad latera viarum alt. 1000 ped., Junio (Gardner! n. 585 in h. Hook.) A D. confini differt caule obtusangulo lateribus sulculo notatis nec tetraquatro, tum flore majore (v. in h. berol., Hook., Benth. etc.)

$\gamma$ . flore albo. — In umbrosis humidiusculis prope Mandioccam prov. Sebastianopolitanæ, Martio (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 59.) (v. in h. ac. petrop.)

$\delta$ . *Japurensis*, suffruticosus, basi repens, caule hirto, foliis ovali-oblongis oblongisve apice attenuatis obtusiusculis repando-crenatis supra nitidis, floribus inferioribus solitariis brevipedunculatis, bracteis oblongo-ovalibus obtusinsculnis, bracteolis subnubatis brevissimis, superioribus glomeratobinibis ternis in racemum terminali spiciformem bracteis lanceolato-linearibus interstinctum collectis.  $\delta$ . In silvis horrendis ad Manacura, ditionis Japurensis, prov. fluminis Nigrî, Januario (Martius!) Maynas (herb. imp. vindob. ex herb. Endlich!). Ruellia Japurensis Mart.! in herb. reg. monac. et in obss. n. 3077. Differt a var.  $\alpha$  caule basi fibris validis repente, a var.  $\beta$  floribus plerumque in racemum seu spicam terminali collectis. (v. in h. monac. et vindob.)

$\epsilon$ . *decipiens*, floribus duobus in ramo terminalibus ob continuationem rami terminalis derepente subtalam speciem capituli fingentibus. — Aldea dos Indos in prov. Sebastianopolitanâ, Junio (Luschnath! in herb. acad. petrop.). Bracteæ in his ovatae, subpetiolatae. (v. in h. acad. petrop.)

$\zeta$ . *nanus*, caule biumiciliato hirsuto, foliis parvis obtusis. — In Brasilâ. (v. in h. Benth.)

15. D. *CONFINIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 31), fruticosus, caule quadriquattro glabro (albo), foliis oblongo-lanceolatis in petiolum brevissimum attenuatis obtuse acuminatis subrepandis nitidis in costis supra hispidis, floribus axillaribus solitariis oppositis brevissimis pedicellatis, bracteolis linearilanceolatis obtusis hispidulis calycem excedentibus, calycis lacinia setaceis, corolla tubo longo fauces obconicas æquante.  $\delta$ . Campos Vellhos Brasiliæ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 24 et 123). D. Sebaucriano similis, differt imprimis caule tetraquattro, tum foliis minoribus angustioribus subsessilibus strictis in costis et margine hispidulis (juvenilibus saltem), 2 $\frac{1}{2}$  poll. longis, 1 poll. latis, bracteolis angustioribus hispidulisque floribusque minoribus ad os faucentem pollucem 1 longis, limbi diametro 8 lincarum. Calycis lacinia hispidulæ. (v. in h. reg. berol.)

$\beta$ . *minor*, caule humiliore magis diffuso, foliis anguste lanceolatis. — In Brasilâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 20, 230, 235 et 236.)

16. D. *CILIATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 87), caule erecto scabrido-pubescente, foliis ovatis utrinque acutis repando-crenatis hirtis hirsutis, floribus subterminali-axillaribus sessilibus capitatisve pedunculatis, bracteolis propriis spatulatis petiolatis.  $\mathcal{L}$ . In montibus prope Prome (Guil. Gomez), in hort. bot. calc. e regno birmanico introducta, Coromandel (Macc! ex herb. mus. paris. in herb. Nees.). Ruellia ciliata Hornem. h. havn. 2 p. 585, Spr. syst. 2 p. 820, herb. Willd! n. 11628 (specimen hortense). Ruellia Wall. cat. 7151 a, b. Rami erecti vel procumbentes, tetragoni, nodosi, scutulis minimis scabri. Folia cum petiolo poll. 5 longa, 2 $\frac{1}{2}$  lata, cuspidato-acuta, basi acutâ in petiolum desinentia, repando-crenata, petiolo 1 $\frac{1}{2}$  poll.

longo angusto ciliato. Flores 2-4 oppositi, sessiles, alii in ramulo semipollicari axillari capitulum tetraphyllum constitutus, foliis ovatis superioribus multo minoribus; alii simili modo in caule terminales. Calyx  $\frac{1}{2}$  poll. longus, paulo ultra medium quinquefidus laciniasque lanceolato-acuminatis hirtis. Corolla fere bipollucaris, cerulca. (v. in h. Wall., paris., Nees. etc.)

17. D. SIBUA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. p. 81), caulibus et rhizomate repente hrevibus apice dense foliosis foliisque ellipticis obtusis integerrimisque hirsutis, floribus solitariis subsessilibus, bracteis oblongis calyce longioribus.  $\mathcal{L}$  In India orientali, Sukanaghur (Hamilt.), in Dinaugore (Roxburgh.). Ruellia Sibua herb. Hamilt.! Wall. cat. n. 2384 f. Ruellia repeus Wall. l. c. Ruellia suffruticosa Roxb.! fl. ind. or. 3 p. 53 n. 23. Folia inferioris parvis parva, semipollucaria, spatulata, magis dissita, superiora parium aliquot approximata  $1\frac{1}{2}$ -2  $\frac{1}{2}$  poll. longa  $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, obtusa, integerrima, in petiolam  $1\frac{1}{2}$  poll. longum attenuata, hirsuta, supra lineolata cum ramulorum axillarum foliis brevioribus coronam terminalm constituentia. Flores axillares, fere sessiles. Bracteolæ obtusæ, elliptico-oblongæ, basi attenuatae, calyce longiores, hirtæ. Corolla sesquipollucaris, pubescens, alba, e tubo angusto sensim ampliata, limbo subæquali, lobis obtusis. Filamenta non exserta, glabra; antheræ lineares, pallidæ, basi apiceque bifidae. (v. in h. Wall. spec. culta.)
18. D. CYANEUS, caule herbaceo erecto glabro, foliis ovato-oblongis ovalibusve obtuse acuminatis integerrimis, juvenilibus supra sparse pilosis, floribus axillaribus brevipedicellatis oppositis, bracteolis oblongis lanceolatisve calycem æquantibus, calycis ad  $\frac{2}{3}$  divisi! lacinias subulatis hirsutis, capsula 8-10-spermâ.  $\mathcal{L}$  In locis saxosis humidiusculis ad ripas fluvii Chazok, juxta pagum Ramassina in insula Madagascar (Bojer! in herb. DC. n. 120, herb. Hook.). Ruellia cyanea Bojer! l. c. Similis D. ciliato, sed differt caule glabro foliis angustioribus pilisque rarioribus conspersis, calycis laciñis angustioribus et brevioribus minus profunde discretis. Corolla 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, tubo fancibus obconicus breviore hisque albis, limbo subbilabiato 5-lobo cyaneo. Antheræ ovales, muticæ. Stigma breviter bilabiatum. Capsula 6-7 lin. longa, glabra. (v. in h. DC.)
19. D. HYGROPHILOIDES, caule herbaceo erecto acute tetragono ad angulos scabriuscuso, foliis ovatis vel ovato-oblongis utrinque acutis repando-crenatis lineolatis glabriusculis, floribus axillaribus sessilibus ternis, bracteolis ovato-oblongis glanduloso-hirsutissimo subulato brevioribus.  $\mathcal{L}$  In regno Mexicano (Hænke). Differt a D. ciliato calycibus ternatim confertis sessilibus maxime glandulosis, bracteis diversis, nec foliis ciliatis. Variat foliis latioribus, pure ovatis. (in h. Hænke.)
20. D. STREPENS (Le Conte in ann. of the Lyc. of New York 1 p. 140, sub Ruellia), caule herbaceo erecto rariusve adscendente, foliis ovatis obovatoveoblongis subrepandis cuneatis in petiolum decurrentibus (glabriusculis pilosissive), pedunculis axillaribus brevissimis tri-(1- pluri-) floris, bracteolis ovalibus oblongis lanceolatisve subsessilibus calycem saltem æquantibus, calycis laciñis lanceolatis linearibusve acutis ciliatis tubo corollæ elongato-infundibuliformis paulo brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Carolinâ et Virginîa, præsertim solo sicco; in Pennsilvaniâ prope Lancaster (herb. Schreb.). Corolla cerulea, subinde alba, circiter 2-pollicaris, tubo longitudine faucis obconicæ.
  - $\alpha.$ . *calycinus*, caule erecto plus minus ramoso glabro, foliis subrugosis fere glabris margine scabris subciliatis, bracteolis ovalibus calyce longioribus, calycis laciñis latiusculæ lanceolatis patulis tubo corollæ paulo brevioribus. — A Pennsilvaniâ usque ad Georgiam (Beck), in Savannah Georgia (Torrey! in herb. Lehm. ex parte), New Orleans (Drummond), Kentucky (Hook.! in herb. gen. berol., Kinn ibidem, Mitchill! in herb. DC.), in Georgiâ (Wray! in herb. Hook.), Canada (Goldie! in herb. Hook.), in insula Santa Cruz (Isert in herb. Willd.). Dipteracanthus strepens N. ab E. in Linn. 16 p. 292. Ruellia strepens Linn. mant. p. 422 (excl.)

- syn. Dill.), Pursh fl. am. sept. 2 p. 420, herb. Willd. n. 11626. fol. 1, 2. *Ruellia biflora* Balbis! in herb. DC. n. 552. *Ruellia foliosa* Schweinitz! in herb. Hook. (v. in h. DC., berol. etc.)
- a.** \* *pedunculatus*, pedunculis ferme longitudine dimidii folii unifloris sub flore diphyllo. — Ad San Felipe in Texas (Drummond! n. 259 in h. Hook.), Lexington (Short! in herb. Hook.), Kentucky (Short!). *Ruellia strepens* herb. Vahl! *Ruellia oblongifolia* Kinn! in herb. gen. berol. *Ruellia vinciflora* DC.! in herb. n. 555. (v. in h. DC., Vahl, berol. etc.)
- β.** *strictus* (N. ab E. in Linu. l. c.), caule erecto stricto subsimplici foliisque ovato-oblongis oblongis laxe hirsutis, floribus saepè solitariis oppositis sessilibus, bracteolis ovali-oblongi ovalibusque, calycis laciniis anguste lanceolatis tubo corollæ (paulo brevioris et amplioris) nonnihil brevioribus. — Ad Kentucky river (Petter! in herb. Bentb. et Hook.), Texas (Drummond! coll. 2. n. 202 et 259 in herb. Bentb. et Hook.), Lindheimer! fl. tex. exs. 2 n. 290). *Ruellia strepens* herb. do La Roche! in herb. DC. n. 363 et herb. Schreb.! n. 213. *Dipteracanthus micranthus* Engelm. et Gray pl. Lindheim. p. 49 n. 290 (planta clandestina florens). Variat caule late chalybæo. (v. in h. Hook., Bentb. etc.)
- γ.** *Dillenii*, caule erecto ramoso foliisque ovato-oblongis oblongis magis acutis dissimili hirsutis, floribus subternis in pedunculo brevissimo, bracteolis lanceolatis linearive-lanceolatis acutis, calycis laciniis e basi lincari-lanceolata filiformi-attenuatis magis hirsutis tubo corollæ vix brevioribus. — Locus natalis ut in var. **α.** *Dipteracanthus bybridus* N. ab E. in Linu. l. c. p. 293 (excl. syn. Pursh fide Le Conte). *Ruellia strepens* Beck bot. p. 285, Torrey! in herb. Lehmann., Hook.! Drummond! in herb. gen. berol. et Bentham., Dill. hort. elth. p. 330 t. 249, herb. Willd. n. 11626 fol. 3, herb. DC. n. 513. *Ruellia hirsuta* Elliot. apud Le Conte l. c. *Ruellia triflora* herb. DC. n. 548 ex herb. Thibaud. *Ruellia biflora* herb. Schreb.! et probabiliter Linn. (v. in h. Hook., berol., DC. etc.)
- γ.** \* *latifolius*. Texas (Drummond! coll. 3 n. 200 et in herb. Bentb.! n. 260 bis in herb. Hook.) (v. in h. Bentham etc.)
- γ.** \*\* *oblongifolius*. Variat: 1º floribus in apice caulis subcapitatis. *Ruellia capitata* herb. Willd. n. 11629. — 2º gracilior, plus minus pubescens, bracteolis lanceolatis. In Carolinâ (Bosc et Fraser! in h. DC. n. 561). *Ruellia strepens* herb. Vahl (specim. Bosc.). *Anonymous* n. 250 Bosc in herb. DC.! herb. Schreb.! cum var. **β** absque nomine. — 3º gracilis, multicaulis, strictus, foliis distantibus oblongis obtusis, corollâ minore. *Ruellia strepens* obtusifolia herb. Hook.!.
- δ.** *clandestinus*, corollâ tubulosâ trilineari, reliqua ut in var. **γ** *Dillenii*, sed folia minora. *Ruellia ovata* herb. do La Roche! in h. DC. n. 362 (planta culta).
- 21.** *D. CILIOSUS* (N. ab E in Linn. I6 p. 294), albo-hirsutus, caule herbaceo adscendente erecto, foliis infimis obovatis, superioribus ovali-oblongis obtusiusculis subrepandis subsessilibus, floribus axillaribus subsessilibus oppositis. bracteolis oblongis lanceolatisve calycem sequantibus eovo brevioribus, calycis laciniis setaccis hirsutis tubo corollæ elongato plus duplo brevioribus, faucibus corollæ brevibus obconicis. **22** Prope Savannah Georgiæ (Pursh), in collinis aridis ad Castellum S. Louis Am. sept. prope Missouri fluvium, Julio (Riedel! in herb. DC!) Drummond! in herb. Bentb. 258 in herb. Hook.), Texas ad S. Felipe (Drummond! in herb. Bentb., idem! sect. 2 n. 219 in h. Hook.). *Ruellia ciliosa* Pursh! fl. am. sept. 2. p. 420, Spr. syst. 2 p. 822, *Ruellia strepens* Engelmann 2. 823! in herb. reg. berol. Riebe! n. 122 in herb. Mart., Engelm. et Gray pl. Lindheim. p. 22 n. 158. Corolla 1-2 poll. longa, tubo poll. 1-1 ½ longo, fauce basi conicâ brevi. Foliiis confertis oblongo-lanceolatis. (v. in h. berol., DC., Bentb., Hook. etc.)

- β. hybridus*, caule humiliore (2-3-pollicari) subinde decumbente, hirsutis densiore, tubo corolla sæpe breviore. Prope Savannah in sabulosis Georgiæ (Pursh! Beyrich! in herb. gen. berol., herb. DC. n. 45). Ruellia hybrida Pursh fl. am. sept. 2 p. 420 (fide Le Conte l. c.). Ruellia oblongifolia Rafinesque in herb. Moricand. Ruellia longiflora Drummond in herb. Hook. et Benth. n. 258 et 259, nee Linn. (v. in h. DC., Hook., Benth., Moricand. etc.).
- β. \* dentatus*, foliis undulato-dentatis lanceolatis oblongisve.— Prope Savannah, Georgiæ (herb. Moricand!), Kentucky, Ohio (Rafinesque! in herb. Moricand).
- γ. parviflorus*, corollâ vix pollicari, foliis paulo longiori petiolo (3-6-pollicari).— Ad Ky fluvium, Julio (Short! in herb. Hook.).

22. D. DRUMMONDIANUS, caule erecto cano-pubescente, foliis ovatis acutis sub-integerrimis utrinque laxè pubescentibus in petiolum brevem decurrentibus, costis subtus hirsutis, floribus geminis ternisve subsessilibus, bracteis oblongis acutis calyce longioribus, calycis laciniis subulatis pubescenti-canis, tubo corollæ triplo, faucibus obconicis eodem duplo brevioribus.  $\mathcal{L}$  In prov. Texas inter Brazosia et San Felipe (Drummond! sect. 3 n. 260 in herb. Hook.). Folia D. strepens ε, sed calyx subulato brevi stricto incano a confinibus satis differt. Calyx 4-4½ lin. longus, tubus corollæ polliearis. (v. in h. Hook.)
23. D. MITCHILLIANUS, caule erecto cano-pubescente hirsutoque, foliis ovalioblongis oblongisve obtusiusculis irregulariter repando-subcrenatis utrinque laxè hirsutis in petiolum brevem decurrentibus, floribus geminis ternisve subsessilibus, bracteis oblongo-lanceolatis ealyce longioribus, calycis laciniis linear-setaceis albo-hirsutissimis tube corollæ dimidio brevioribus, faucibus tubum subæquantibus.  $\mathcal{L}$  In Floridâ orientali lat. 29° 20' (Mitchill! in herb. DC. n. 641). Ruellia ciliosa Le Conte in ann. of the Lyc. of New York 1 p. 141 (nec Pursh). Ruellia ciliosa herb. reg. monac. Differt a D. cilioso foliis in petiolum longitudine  $\frac{1}{2}$  folii anguste decurrentibus et caule pube albâ densâ incano pilisque patulis hirsuto, tum vero et tubo corollæ breviore, licet fau-ebus aliquanto longiore. (v. in h. DC.)
24. D. NOCTIFLORUS, hirsutus aut glabrescens, caule herbaceo erecto subramoso, foliis oblongis repandis integerrimis undulatis plerisque subsessilibus, floribus axillaribus oppositis brevipedunculatis solitariis, laciniis calycis linear-lanceolatis tubo corollæ elongato triplo brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Savannahs Alatamahæ Georgiæ (Le Conte l. c.), in campis graminosis inter S. Marks et Port Leon Floridæ (Rugel! in herb. DC. n. 862), Texas (Drummond, n. 220 et 258 coll. 3 ex parte, in herb. Benth. et Hook.). Dizygandra noctiflora Shuttlew. in pl. Rugel. Ruellia tubiflora Le Conte in ann. of the Lyc. of New York 1 p. 142. Dipteraanthus Drummondii (Torr. et Gray mss.) Engelm. et Gray pl. Lindheim. p. 50 not. Distinguunt divisionibus calycis latioribus et tubi corollæ (albæ) longitudine eximia ex Le Conte. Quæ nisi obstarent, vix a D. cilioso Purshii differet. (v. in h. DC. et Benth.)
- β. humilis*, caule 2-3-pollicari. Covington in Louisianâ (Drummond! in herb. Hook. et Benth.), Arkansas (herb. Hook!). Ruellia humilis herb. Hook! Ruellia strepens var. Hook. l. c. (v. in h. Hook. et Benth.)
25. D. PARVIFLORUS, pubescens, caule herbaceo procumbente geniculato, foliis oblongo-lanceolatis inferioribus basi attenuatâ sessilibus repando-crenatis, floribus axillaribus solitariis sessilibus, bracteis lanceolatis acutis subpetiolatis calyce longioribus, calycis laciniis subulatis glabriusculis corollâ paulo brevioribus, capsulâ superne tetraspermâ.  $\mathcal{L}$  Mexico (Ortega! in herb. DC. n. 426, Schott in herb. Willd.). Dipteraanthus vagans N. ab E. in Linu. I6 p. 295. Eranthemum parviflorum R. Br., Spr. syst. 1 p. 88, Dietr. sp. pl. 1 p. 443, herb. Willd! n. 269. Justicia parviflora Vall en. 1. p. 166, Ortega dec. 1 p. 1. Ruellia parviflora hort. Tonell. in herb. Benth.! D. lanceolata si-

milis, differt foliis in petiolam attenuatis, caule non repente, corollâ minimâ generis ( $3\frac{1}{2}$  lin. longâ) tubo brevi, faucibus limboque campanulatis. Variat caule creto vel magis minusve diffuso, tum vero corollâ clandestinâ, exigua, tubo ovato limbo brevissimo, quæ vera est *Justicia parviflora* Orteg. (v. v. et sicc. in h. DC., Wild., Vahl., etc.)

26. D. LANCEOLATUS (N. ab E. in pl. Hænk. ined., in Wall. pl. as. rar. 3 p. 82 et in Linn. 16 p. 295), caule herbaceo repente apice foliisque (superioribus) lanceolatis petiolatis supra hirtis, floribus axillaribus solitariis brevissime pedicellatis, bracteolis duabus ovalibus oblongis petiolatis, capsula pubescente subtetraspermâ.  $\mathcal{L}$  In insulâ Luzone (Haenke), in ins. Java (Zollinger n. 482 in herb. DC. n. 846), in insulis Philippinis (Cuming! n. 1315). Ruellia repens Liun. mant. p. 89, Burm. fl. ind. p. 135 (excl. icon.), Blume bijdr. p. 794. Similis D. dejecto et ventricoso. Folia articulis breviora, ab infimis vix tres lineas longis suborbiculariis rotundatis brevipetiolatis per ovata obtusaque in ovato-lanceolata et fere lanceolata denique transeunte, quæ posteriora  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longa,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. lata sunt. Bracteæ calyce paulo longiores, sub fructu cum petiolo trilineari novem lin. longæ, ovaes, obtusiusculæ, hirtulae, petiolis ciliolatis. Corolla semipollucaris subincurva, tubo in fauces obconicas transeunte. Capsula 4 lin. longa. (v. in h. DC.)

$\beta.$  *erectus*, caule simplici erecto stricto gracili. Java (Zollinger pl. jav. n. 3060! in h. DC.)

27. D. PROSTRATUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 81, Wight herb. prorr. n. 1937), caule herbaceo prostrato foliisque ovatis obtusis subintegerrimis parvulis pubescenti-hirtis canescens, floribus axillaribus solitariis brevipedunculatis, bracteolis ovalibus petiolatis calyce longioribus, corollâ infundibuliformi, capsula pubescente pliospermâ.  $\mathcal{L}$  In India orientali. Folia petiolata, petiolo cano-pubescente, ovata, minora ex ovato subtorta, obtusa, utrinque hirtula et subcanescens, in nostris non crenulata, sed vel omnino integerrima vel obiter repanda. Calycis foliola subulata, hirsuta. Corolla pollucaris, infundibuliformis, pubescens, limbo quinquefido obtuso regulari. Capsula calyce triplo longior, fere pollucaris, clavata, acuta, pulegens, basi ad  $\frac{1}{2}$  compressa, asperma, superius depresso-uscula.

$\alpha.$  *parvifolius*, foliis  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longis. — In pascuis et sepibus ad Negapatam (Wight l. c.) Nilgherry, ad pedem montium (Schmidt). Ruellia prostrata Poir. enc. meth. 6. p. 349. Ruellia repens herb. Madr. Wall. cat. n. 2384 a, herb. Wight! (?) Wall. cat. 2384 d et herb. Heyn! c. Ruellia Wightiana Wall. cat. n. 2397, herb. Vahl! (spec. Sonnerat). (v. in h. Vahl, Wallich, Wight, etc.)

$\beta.$  *macrophyllus*, foliis caulinis 2-2  $\frac{1}{2}$  poll. longis. — In umbrosis India orientalis septentrionali-occidentalis et montium Sivalensis et Himalayensis, ubique (Edgeworth! in h. Nees. n. 206), Trankenbar (herb. Schreb!), Madras (Schuter! in herb. Hook.). Dipteracanthus dejectus Edgew! herb. n. 206, herb. Schreb! (v. in h. Edgew. etc.)

28. D. DIFFUSUS, pubescenti-scaber, caule herbaceo procumbente diffuso, foliis brevi-ovatis obtusis cuneatim in petiolam decurrentibus integerrimis, bracteolis spathulatis calycem subæquantibus, floribus solitariis geminisve sessilibus, calycis lacinias lanceolato-setaceis hirsutis, corollâ angustâ parvâ, capsula in medio tetraspermâ.  $\mathcal{L}$  In S. Domingo (Bertero! in herb. gen. berol. et in herb. DC. n. 529, Thouin! in herb. Vahl.). Caules filiformes, parum ramosi. Folia parva, cum petiolo 1  $\frac{1}{2}$ -2 lin. longo 5  $\frac{1}{2}$ -5 lin. longa, 2  $\frac{1}{2}$ -3 lin. lata, pilis brevissimis deuse vestita, canescens costis 2-3. Bracteoleæ rotundæ, in petiolam attenuatae. Calyx 3-3  $\frac{1}{2}$  lin. longus, sub fructu patulus, lacinias e basi linearis-lanceolata arete contiguae longe setaceis. Alabastrum floris anthesi proximi calyce brevius. Capsula lanceolata, glabra, lutea, 2-2  $\frac{1}{2}$  lin. longa. (v. in h. DC. berol., Vahl etc.)

29. D. PUMILIO, caule herbaceo diffuso glabro, foliis glabris oblongis obtusi;

repandis in petiolum angustum decurrentibus, bracteolis lanceolatis calyce duplo brevioribus, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, calycis lacinia lanceolatis glabris, corollæ tubo brevi, fructu. . . .  $\mathcal{L}$  In viciniâ urbis Port Jackson Novæ Hollandiæ (R. Brown! in herb. DC. n. 446 ex herb. Thibaud. ex parte). Ruellia Pumilio R. Rr. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 479, ed. N. ab E. p. 335. Ruellia australis Cav. ic. 6 p. 62 t. 586 f. 1, Pers. syn. 2 p. 176. Planta gracilis, parce ramosa, glabra. Folia unguicularia, distantia. Corolla semipollicaris paulo longior, infundibuliformis. (v. in h. DC.)

30. D. MONANTHOS, caule repente, foliis ovalibus obtusis in petiolum attenuatis integerrimis hirsutis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, bracteolis spathulato-lanceolatis calyce brevi longioribus ciliatis, calycis lacinia subulatis pilosulis, capsula 4-8-sperma, seminibus nitidis.  $\mathcal{L}$  Ad viarum pubicum margines in prov. Emirna insulæ Madagascar (Bojer! in herb. DC. n. 126, herb. Willd. n. 11631 et in h. Hook.). Ruellia uniflora Bojer! in herb. DC. n. 138 (1833) et reg. monac. Ruellia monanthos Bojer! in eod. herb. n. 126 (1839). Planta humilis. Folia 4-5 lin. longa,  $2\frac{1}{2}$  lin. lata. Bracteola foliorum longitudine at angustiores. Calyx sesquilinearis. Capsula 5 lin. longa, flavescens, glabra. Corolla circiter semipollicaris, infundibuliformis, tubo brevi, limbi lacinia ovatis obtusis. Semina margaritaceo-fusca. (v. in h. DC., Willd., Hook. etc.)

$\beta.$  *nummulariaefolius*, foliis inferioribus suborbiculatis glabris, superioribus bracteolisque ciliatis. In ins. Madagascar. (v. in herb. DC. ! n. 442.)

31. D. SERPYLLIOLIUS, pubescenti-scaber, caule adscendentem, foliis ovalibus obtusis in petiolum brevem attenuatis integerrimis, floribus axillaribus geminis ternis sub sessilibus, bracteolis lanceolatis calycem æquantibus, calycis lacinia c basi lanceolata setaceis corollæ infundibuliformis tubum faucesque æquantibus, capsula in medio tetraspermâ.  $\mathcal{L}$  In dumetis locis lapidosis circa urbem Tananarivo in insulâ Madagascar (Bojer! in herb. DC. n. 125 ex parte). Ruellia geniculata var. Bojer! (ex parte) in herb. DC. Thymo Serpylo simillima stirps. Differt a D. monantho integrum brevissimo scabro, calycis lacinia plus duplo longioribus, corollis minoribus angustioribus, capsula parvâ lanceolatâ prope a basi tetraspermâ. Accedit ad Dyschoristen geniculatam, quâcum fors novi denique generis typum exhibebit. (v. in h. DC.)

32. D. DEJECTUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 82, Wight herb. prop. n. 1936), caule herbaceo basi suffrutescente et repente tunc vel procumbente vel adscendente erecto, juvenili strigoso-hirto, adulto glabrescente, foliis ovato-ellipticis longe petiolatis utrinque acutis subintegerrimis lineolatis et in costis sub hirsutis strigosive, floribus axillaribus sessilibus solitariis, bracteolis ovalibus petiolatis calyce longioribus, lacinia calycis subulatis elongatis, corollæ faucibus æqualibus tubo longioribus.  $\mathcal{L}$  In prov. Tanjore (Wight! l. c.), in Munghir (Hamilt.!), Singapur (Loth. ! in herb. Hook.), in cœmterio christianorum prope Bataviam et ad ripas fluviorum prope Rompier in ins. Java (Blume), in viciniâ Batavie urbis in insulâ Java (Ad. Delessert! in herb. DC. n. 261). Ruellia repens Wight Wall. cat. n. 2384 b, Blume bijdr. p. 794. Ex affinitate est D. prostrati, sed diversus: foliis longe petiolatis ex ovato ellipticis, laminâ  $2\frac{1}{4}$ -3 poll. longâ,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. latâ. Folia supra undique et subtus ad venas et costam setis inspersa, adulta fere glabra, plurimque integerrima, raro repando-crenata. Bracteola spathulata, acutæ, petiolata, hirtæ, calyx longiores. Calyx petiolò brevior, profunde quinque-partitus, lacinia linearifiliformibus attenuatis hirsutis æqualibus. Corolla circiter  $\frac{1}{2}$  poll. longa, incurva, minute puberula, purpurca; tubus angustus, cylindricus, longitudine limbi; limbus (cum fauce) campanulatus, subæqualis quinquefidus, lacinia rotundatis. Capsula oblonga, basi angustata, in medio dodescasperma, circiter semipollicaris. (v. in h. Wallich, Wight, Hook. DC. etc.)

$\beta.$  *floribus solitariis ternis verticillatis brevipedicellatis.* — In lapidosis

septentrionalibus partis superioris montis Scholoda Abyssinie, Octobri (Schimper). *Ruellia ringens* Roxb. fl. ind. or. 3 p. 44 et herb.! Wall. cat. n. 2403 et herb. Vahl! ex herb. Roxb.! Wall. cat. n. 2384 b, hcrb. Willd.! (Klein) n. 11645, herb. Schreb.! *Ruellia Methia* herb. Hamilt.! Wall. cat. n. 2384 l. *Ruellæ* species repenti quam maxime similis, sed caulis errectus Klein! in herb. Willd. n. 11634. *Ruellia pallida* Willd.! l. c. *Ruellia multicaulis* Hochst. in Schimp. it. Abyss. un. it. n. 43. Sem. n. 5882. Non differt nisi caule magis erecto folijsque saepe minoribus et pedicellis bi-trifidis bi-multifloris. — *Ruellia multicaulis* Hochst. ejusmodi forma multiflora est, quæ sata iu horto berolinensi, transit in formam 3 pedunculis 1-3 floris. (v. iu h. Roxburgh!, Vahl, Willdenow, Hochstett. etc.)

33. D. **PALLIDUS**, caule herbaceo erecto? glabro obtuse quadrangulari lateribus sulco notatis, foliis ovatis obtusiusculis basi acutiusculâ in petiolum mediocrem desinenteribus inaequaliter undulato-crenatis glabris margine subtusque in costis scabris supra lineolatis, floribus axillaribus sessilibus solitariis alternis, bracteolis oblongo-lanceolatis subsessilibus repando-subdentatis pubescentibus calyce multo longioribus, laciniis calycis lanceolato-subulatis ciliolatis tubo corolla brevioribus, corollæ faucibus æqualibus campanulatis tubo longioribus.  $\mathcal{L}$  In Arabiâ Felici (Forskal!). *Ruellia pallida* Valh symb. 2 p. 72 et herb.! Willd. sp. pl. 3 p. 564. *Ruellia strepsis* Forsk. descr. cent. 4 p. 114. Est planta tenera, foliis cum petiolo 5 lin. longo sesquipollicaribus pallidis (in secco). Corolla pollicaris, cœrulea. (v. in h. Valh.)
34. D. **VENTRICOSUS**, caule e basi surfrutescente repente erecto, juvenili pubescenti-hirto attate glabrescente, foliis oblongo-ovalibus basi acutis apicem versus plus minus attenuatis petiolatis integrerrimis lineolatis in costis substrigosis, floribus axillaribus sessilibus solitariis, bracteolis lancolatis linearive-lanceolatis obtusis petiolatis calyce longioribus, laciniis calycis subulatis, corollæ faucibus hinc ventricosis tubo longioribus.  $\mathcal{L}$  In ins. Java (Zollinger! pl. jav. n. 988 et 483). Faucibus corollæ (ovalibus equidem) latere inferno magis tumentibus et igitur limbo ejus obliquo, a D. dejecto facile distinguitur, tum et aliis characteribus. Variat major, magis lignescens foliis apice magis attenuatis (Zolling.! n. 988, herb. DC. n. 836), et minor, foliis apice vix attenuatis (Zolling.! n. 483, herb. DC. n. 820). Lepidagathis. Moritzi in pl. Zolling. p. 47. Capsula brevis, 6-8-sperma, retiuaculis arte congestis. Semina margiata. (v. in h. DC.)
35. D. **DUBIUS**, caule erecto foliisque ovalibus oblongis acutiusculis basi acutis longe petiolatis cano-puberulis, floribus fasciculato-ternis quinise brevissime pedicellatis, bracteolis lanceolatis petiolatis calyce longioribus, corolla inflato-infundibuliformi tubo faucibus breviori.  $\mathcal{L}$  *Ruellia patula* hort. par. olim (herb. de La Roche in herb. DC. n. 361 et L. Bouton (1839) in cod. herb. n. 41 nomine Barleria foetidæ). A D. erecto differt foliis angustioribus apice etiam magis acutatis et petiolis longioribus (laminam subæquantibus). An varietas? (v. in h. DC.)
36. D. **PATULUS**, caule erecto foliisque ovatis ovalibus ovaliæ-oblongis obtusis basi plus minus acutis cano-puberulis, floribus fasciculato-ternis quinise (solitariis) brevissime pedicellatis, bracteolis ovalibus oblongis calyce longioribus.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali. Capsula sursum parum depressa, glabra, inferne ad medium fere compressa et sterilis; pars spermophora basin versus utrinque hexasperma, superius cava, dissepimenti vestigio parietali. Semina convexo-concava, laevia, viuida, concavitate puberula, areâ oblongâ obsoleta circa basin in utroque latere. Corolla alba? Flores tempore matutino aperiuntur, sed illoco corollæ delabuntur. (v. in h. Wallich, Wight, DC., Vahl etc.)  
 a. *obtusior*, corollâ inflato-infundibuliformi. — In Tanjore ad oppidum Ne-gapatam (Wight!), ad pedem Nilgherry jugi in silvaticis abunde (Schmidt!, Perrottet, in herb. DC. n. 230), in Novâ Hispaniâ (?) prope

Mexico (Cav.), in palmetis humidis Pagi Unser in valle Fatme Arabiæ Felicis, Februario (Schimper, Fischer), in rupestribus montis Cordofani Arasch Cool, Octobri (Kotschy!) in herb. un. itin. et in herb. Hook. n. 119 ubi cum Barleria Kotschyana mixta exstat, in monte Maamara Arabia Felicis (Botta!) ex herb. mus. paris. in herb. Nees. n. 200, forma grandiflora). Dipteracanthus patulus N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 82, Wight herb. prop. n. 1939, delect. sem. h. vratisl. ann. 1841. Ruellia patula Jacq. mise. 2 p. 358, ic. rar. 1 t. 119, herb. Vahl! Willd. sp. pl. 3, 1 p. 364, herb. n. 11633!, herb. Schreb., Wall. cat. n. 2385 (ex parte) Roxb. fl. ind. 3 p. 45, Hochst. in Kotschy it. abyss. n. 159 β. Ruellia erecta var. α Roth nov. sp. pl. p. 308 n. 9, Spr. syst. 2 p. 823. Ruellia matutina Hochst. et Stend. pl. æg.-arab. un. itin. n. 874 (planta perennis elatior), Fischer in herb. reg. monac. n. 196. Ruellia concavifolia Ortega! Ruellia ocyoides Cav. ic. 6 p. 9 t. 416, Spr. syst. 2 p. 820. Ruellia ovata Gouan! in herb. Hook.

α. \* *humilior*, floribus solitariis. Ad pedem Nilgerry jugi (Schmidt), abunde in sylvaticis Nilgherrie, Martio (Perrottet! in herb. DC. n. 230), in Novâ Hispaniâ? (hort. madrit. in herb. DC.! n. 566 ex herb. Dumeril.). Ruellia aromatica Roxb. in herb. madr., Wall. cat. n. 2385, ad partem. (v. in h. DC. et Schmidt)

β. *erecta*, foliis basi evidenter acutis, caule strictiore, corollâ tubuloso-infundibuliformi. — In Indiâ orientali (Wight! herb.), in Paghamew (Guill. Gomcz.), Pondichery (Bouton! in herb. DC. n. 35), Madras (herb. Hook.!), in Africâustrali ad Olifants-Bay (herb. Hook.!). Dipteracanthus crectus N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 82, Wight herb. prop. n. 1938. Ruellia erecta β elongata Roth nov. pl. sp. p. 308 n. 9. Ruellia axillaris Wall. mss. Ruellia strepsis Wight! herb. n. 31 ad partem cum Ruellia crispa β mixta. Ruellia erecta Roth var. α eadem ac Dipteracanthus patulus. (v. in h. Wall., Wight., DC. etc.)

37. **D. CHAMÆDRIS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 31), canle herbaceo procumbente hirsuto, foliis ovalibus et oblongo-ovalibus obtusis repando-subcrenatis utrinque pilosis basi acutâ in petiolum brevem desinentibus, floribus axillaribus subsessilibus solitariis alternis, bracteolis elliptico-oblongis obtusis basi cuneatis calycibusque hirsutis, lacinias calycis lanceolatis obtusiusculis bracteolis longioribus, fause corollæ obconico-elongata incurvâ tubo multo longiore.  $\mathcal{L}$  Aro da Penha in Brasiliâ (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 3632). Foliis parvis et tubo corollæ ratione faucium brevissimo a confinibus D. bifloro, heterophylo, hirsuto etc. facile distinguitur. Folia inferiora 1-I ½ poll. longa, 7 lin. lata, subovovata, petiolo 1 lin. longo; media 2-2 ¼ poll. longa, 10-11 lin. lata, petiolo 2 lin. longo hirsuto; utraque folii pagina pilis raris adspersa; apex obtusus, ramo costales 3-5; crenæ in aliis foliis iisque latioribus distinctiores, in aliis nullæ. Flores omnes in nostris absque altero opposito. Calyx 7 lin. longus, bracteola unâ lineæ breviores. Lacinia calycis lin. fere latea, valde hirsutæ et ciliatae. Corolla cœrulea, subbiplicaris, pubescens, tubus vix 3 lin. longus, ubi stamina inseruntur; hinc fauces sensim sensimque obconico-dilatatae modico arcu incurvantur; limbi laciniæ patentes, ovatae, obtusaæ, subæquales. Stamina exserta. (v. in h. imp. vindob.)

38. **D. PILOSTUS** (N. ab E. in Benth. pl. Hartw. n. 1616), herbaceus, laxe hirsutus, caule erecto, foliis ovalibus obtusis repando-subcrenatis basi acutâ vel sessilibus vel in petiolum brevem desinentibus, floribus axillaribus solitariis sessilibus oppositis, bracteolis ovalibus in petiolum attenuatis calyce paulo brevioribus, lacinias calycis linearibus angustis hirsutis elongatis, fause corollæ obconico tubo breviore.  $\mathcal{L}$  In Peruvia (Pavon!), Leon (Hartweg!). Ruellia pilosa Pav. in herb. Moricand. Quod ad habitum accedit D. Chamætri, sed longissime distat corollæ, quæ regularis, poll. I-1 ½ longa, cœrulea, faucibus obconicis brevibus ampliuseculis, limbi laciniis rotundatis. Est ex affine D.

- prostrati, dejecti et ciliati. Omnes partes pubescens satis longa at molli parte laxe vestiuntur. (v. iu h. Moricand. et Beuth.)
39. *D. RUBLÆFORMIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 32), caule herbaceo quadriquetro glabro apice pilosulo, foliis oblongo-lanceolatis in petiolum brevissimum attenuatis obtuse acuminatis subrepandis, juvenilibus supra subtusque in costis hispidis, adultioribus glabrecentibus, floribus axillaribus glomerulato-subsessilibus solitariis, bracteolis lanceolatis obtusis hispidulis calyce longioribus, calycis lacinias linearis-subulatis, corollæ tubo fauces obconicas subæquante.  $\mathcal{U}$  Prope Vargem in prov. Minarum Generalium (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 4 ex parte, scil. Dicliptera squarroso adjecto uno hujus plantæ specimine. Accedit ad D. confinam, a quo differt foliis juvenilibus hispidis, calycis lacinias haud setaceis sed ex lincaribus subsubulatis et corollâ a basi ad limbi marginem 8 lin. longa incurvâ albâ venis violaceis; a D. calvescente distinguitur corollæ lacinias rotundatis nec emarginatis. (v. in h. acad. petrop.)
40. *D. TUBIFLORUS*, caule herbaceo erecto, ramis quadrangularibus scabriusculis, foliis oblongis acuminatis basi in petiolum valde angustatis integerimis junioribus supra scabriusculis, floribus axillaribus solitariis sessilibus, bracteolis. . . . , calycis brevissimi (bilincaris) lacinias lanceolatis glabris, corollâ grandi.  $\mathcal{U}$  Locus umbrosis prope Honda, in ripâ fluminis Magdalenaë alt. 130 hexap. (Humboldt). Ruellia tubiflora H. et Bonpl. nov. gen. pl. 2 p. 241, Kth. synops. 2 p. 37. Species elegantissima, corollâ coccinea? Ruellia macrophylla Vahl similis. (v. s.)
41. *D. LEUCANTHUS* (N. ab E. in Benth. pl. Hartweg. p. 236 n. 1268), caule herbaceo erecto quadrangulari angulis obtusis apicem versus scabriusculo, foliis ovato-oblongis apice attenuato-acuminatis cuneato-sessilibus repando-subcrenatis in costis scabriusculis, floribus in apice caulis approximatis axillaribus opposite subsessilibus, bracteolis lanceolatis calyce paulo longioribus calycisque lacinias linearibus obtusis scabris, corollæ tubo faucibus obconicas duplo breviore.  $\mathcal{U}$  In silvis umbrosis Haciendaæ de Palmar ad Guaduas in prov. Bogotæ (Hartweg.). Herba sesquipedalis. Corolla alba (Hartweg.). Proximus sanc D. tubiflora H. et K., sed diversus foliis majoribus (8 poll. longis 2 $\frac{1}{4}$  poll. latius) basi haud longe attenuatis, calyce haud brevissimo, sed fere sexlineari, corollâ albâ 2 poll. longa, nec triplicata. An var.? (v. in h. Benth.)
42. *D. CALVESCENS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 32), caule suffruticoso basi repente glabro candicante, juvencili apice hirsuto, foliis elliptico-oblongis acuminatis basi acutis brevipctiolatis repandis, juvenilibus supra undique subtus ad costas hirsutis, adultis glabrecentibus, floribus infraterminali-axillaribus geminis (ternisve) subsessilibus, bracteolis inferioribus ovalibus obtuse cuspidatis, superioribus oblongo-lanceolatis obtusis calyce longioribus hirsutis, corollæ tubo longo fauce obconica tubum subæquante.  $\mathcal{U}$  In silvis ad Sebastianopolim prov. Rio de Janeiro, Aprili (Martius!), ad pedem montis Corcovado (Riedel! in herb. acad. petrop. et Nees), in Brasiliâ, loco non adnotato (Schott! in herb. imp. Vindob. n. 6129, Sellow! in herb. reg. berol. n. 94, 153 ex parte et 216, Gardner! 805 in herb. Hook.). Caule inferne glabro et candicante facile distinguitur. Affinis primo loco D. geminiflora Kunth, qui differt foliis minoribus pubescens nec hirsutis glabrisve laciniasque corollæ rotundatis, neque, ut in nostro, emarginatis, bracteis autem minoribus; D. dejectus distinguitur foliis apice haud attenuatis et petiolo longo; dein D. ciliata, cui folia sunt latiora, longe petiolata, et bracteæ propriæ spathulatae; a D. Schaueriano differt hirsutie partium floralium et corollæ limbo minore. Variat caule vix semipedali simplicissimo. (v. in h. monac., vindob., petrop., Mart. etc.)
43. *D. SCHOTTIANUS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras fasc. 7 p. 32), caule herbaceo ad genicula infracto obtuse quadrangulo subtilissimo tomentoso, foliis ovalibus oblongisve in petiolum acute desinentibus apice obtusiusculis

repando-subcrenatis supra laxe strigosis subtus holosericeo-mollibus ad costas hirsutis, floribus axillaribus oppositis solitariis subsessilibus circa apicem caulis magis confertis, bracteolis spathulatis calyce longioribus, corollæ tubo faucibus elongato-obconicis breviore, limbo brevi.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ loco non adnotato (Schott! in herb. imp. vindob. n. 6132), in umbrosis prope Rio de Janeiro (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 802, forma foliis ex elliptico oblongis). Differt a D. calvescente et affinibus caule incano subtilissime tomentoso et foliis subtus inter costas papillis mollibus confertissimis minutis tectis ad tactum holosericeis, tum vero ab omnibus sui generis limbo corollæ (rubræ) faucibus triplo breviore. (v. in herb. vindob. et petrop.)

44. D. DISSITIFOLIUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 33), hirsutus, caule herbaceo simplici, foliis ovalibus obtusis subcrenatis brevipetiolatis, inferioribus minoribus maxime distantibus, floralibus approximatis, floribus solitariis oppositis sessilibus, bracteolis oblongo-spathulatis sublineariibus calycem æquibus, corollæ infundibuliformis tubo in fauces obconicas longas transeunte.  $\mathcal{L}$  Padrocinio in Brasiliâ (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 635 et in herb. Mart. ex eod. herb.). Radix videtur stolonifera. Caules pedales erecti, flacci. Folia radicalia desunt in nostris, caulinorum inferiorum duo paria, alterum juxta basin, alterum iu medio caule vel paulo altius situm; haec folia 9-10 lin. longa, 6 lin. lata, gemmata rami axillarem nutrientia; ad apicem caulis plerumque paria tria foliorum floralium inter se approximata, que folia 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 poll. fere lata, obovata vel elliptica, obtusa, in petiolum brevem cuneatim desinente, hirsuta, juniora supra hirtovulina, repanda vel, summa praesertim, crenata. Calyx cum bracteolis 10 lin. longus. Corolla dilute cœrulea, 2  $\frac{1}{2}$  poll. longa, obconica, in tubum transiens, limbi lacinii ovato-subrotundis. (v. in h. vindob. Mart. etc.)

$\beta.$  humilior, foliis supra velutino-hirtis. — Ad Puerto Grosso Brasiliæ in Campo (Sellow! in herb. reg. berol. n. 74), in campis prov. S. Pauli vulgaris, floret Novembri (Lund! n. 733 in herb. DC. n. 4), in prov. Minarum Generalium (Claussen! in herb. mus. paris. n. 232.) (v. in h. berol. paris. et DC.)

$\gamma.$  nanus, caule vix digitali, foliis ut in  $\alpha$ , floribus  $\frac{1}{3}$  minoribus. — In fructicetis umbrosis prope Bordo do Campo prov. Minarum Generalium, Maio (Riedel! in herb. aead. petrop. inter specinina D. Puri n. 52).

45. D. MULTIFOLIUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 33), hirsuto-tomentosus, caule herbaceo, foliis ovatis ovalibusve basi obtusa subsessilibus æquidistantibus approximatis inferioribus obtusis superioribus acutiusculis, floribus solitariis binis ternis glomerato-sessilibus oppositis, bracteolis oblongis calycem subæquibus deciduis, calycis laciñiis setaceis hirsutis, corollæ infundibuliformis tubo fauces obconicas æquante, capsula hirsutâ.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 65, 275 et ? 189; Klotzsch! ibid. fide hort. bot. berol.). Differt a D. dissitifolio caule plurinodi, sæpe ramoso, articulis subæqualibus, foliis, plerisque saltem, basi nec apice versus latioribus, bracteolis angustioribus, corollis brevioribus, 2 poll. longis (a basi ad marginem limbi metiendo), ealyce magis setaceo. D. tomentosus longius distat foliis inferioribus majoribus longiori petiolo, bracteolis nullis, calycis laciñiis latioribus, corolla coccinea. (v. in h. reg. berol.)

$\beta.$  multiflorus, verticillis multifloris, foliis subangulatis. — Ruellia subdennata Klotzsch! in herb. gen. berol. ex hort. berol.? (v. in h. gen. berol.)

46. D. BEYRICHIANUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 33), hirsuto-tomentosus, caule herbaceo apice ramoso (simplicie?) acutangulo eretto, foliis æquidistantibus approximatis ovalibus obtusis sessilibus, inferioribus basi cuneatis, floribus in angulis foliorum superiorum sessilibus solitariis germinis ternis oppositis, bracteolis linearisubulatis ealyce brevioribus ?, calycis hirsutissimi laciñiis linearisetaceis, corolla infundibuliformis tubo fau-

cem obconicam æquante, capsulâ hirsutâ.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ? (Beyrich in herb Nees absque loco natali). Differt a D. multifolio imprimis foliis superioribus minime apicem versus angustioribus sed vere ovalibus obtusis aut brevissime acutiusculis, tum vero et bracteis linearibus. Flores cœrulei. (v. in h. Nees.)

?  $\beta$ . *angustiar*, caule simplici trifidove, foliis lanceolato-oblongis acutiusculis, juvenilibus albo-hirsutissimis, adultioribus pilosis. — In prov. Ceara, Novembri (Garduer! n. 1801 in herb. Benth. et Hook.); in Serra de Natividade prov. Goyaz (idem! n. 3417 et 3955 in herb. Hook.). Flores purei (Garduer). An distincta species? (v. in h. Benth. etc.)

47. D. GLANDULOSO-PUNCTATUS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 34), hirsutus immixtis pilis glandulosis, caule herbaceo ramoso, foliis ovalibus utrinque obtusis apice obtuse cuspidulatis brevissime petiolatis aequidistantibus glanduloso-punctatis, floribus axillaribus solitariis oppositis sessilibus, bracteolis oblongis calyce paulo brevioribus, corollæ infundibuliformis tubo faucibus obconicis longiore.  $\mathcal{L}$  Ad S. Ignacio in Brasiliâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 73 et 212). Semipedalis. Folia 14-16 lin. longa, 9 lin. lata, internodiis longiora, subsessilia, hirsuto-glandulosa, glandulisque punctiformibus depressis præsertim subtus et in statu juvenili veluti lepidota; superiora apice obtuse acutata. Bracteolæ dense glanduloso-punctatæ. Calyx 6 lin. longus, lacinias linear-attenuatis hirsutis parce glandulosis. Corolla violacea?, usque ad limbi marginem 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa; tubus 10-11 lin., fauces 6-7 lin. longæ. A D. viscosissimo distinguitur punctis glandulosis foliorum, pilis glandulosis parciорibus, corollâ dimidio fere minore, alia ut taceam; a D. multifolio viscositate, foliis apice parum vel non attenuatis, corollâ minore, tubo longiore, etc. (v. in h. reg. berol.)
48. D. LANATO-GLANDULOSUS (N. ab E. in Aschenborn pl. Mex. exsicc. n. 591), caule herbaceo foliisque ovatis obtusiusculis repando-crenatis longe petiolatis lanatis subglandulosis, floribus axillaribus oppositis sessilibus, bracteolis lanceolato-linearibus calyce brevioribus calycisque longi lacinias linearibus hirsuto-glandulosis, corollâ (clandestinâ?) calyce breviore ovato-urceolata, capsulâ oblongâ lœvi glabrâ tetraspermâ. (1)? Å Puebla in regno Mexicanō, inter Rio grande et Zücultepēc, regni Mexic. Decembri (Ehrenberg! in herb. gen. herol.). Caulis humilis probabilitate procumbens, tenuis, dense foliosus. Folia cum petiolo 5-4 lin. longa 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, supra basin 8 lin. lata, apicem versus leniter attenuata ipso apice obtuso basi obtusa, undique, uti caulis, lanoso-incana. Calyx fructus 10 lin. longus et bracteolæ  $\frac{1}{2}$  breviores hirsutie patenti longâ glandulosâ vestiuntur. Corolla (deforata) 3 lin. longa, ovato-urceolata, limbo brevi tubo angustiore connivente, lacinias ovalibus retusis. Stamina inclusa, antheris ovalibus. Capsula 7 lin. longa, testacea. Semina discoidea fusca. — D. viscosissimo et glanduloso-punctato est affinis, sed una ex distictissimis hujus generis speciebus. (v. s. in h. gen. herol.)
49. D. HOOKERIANUS, caule herbaceo adscendente pubescens brevissimâ densâ canescens, foliis ovalibus utrinque acutis repando-subcrenatis breviter petiolatis hirtis squamułoso-punctatis, floribus axillaribus oppositis subsessilibus, bracteolis oblongo-lanceolatis calycem æquantibus, calycis lacinias setaceis patentibus hirsutis eglandulosis, corollæ infundibuliformis magnæ tubo faucibus obconicis longiore.  $\mathcal{L}$  Mexico, in montibus Sierra San Pedro Nolasco, Talea, etc. (Jurgensen! n. 598 in herb. Hook.) Ab affinibus D. lanato-glanduloso et glanduloso-punctato differt caule non hirsuto et corollâ (cœruleâ) majore bipollari, tum et calycis formâ, etc. — Corollæ laciniae latæ, retusa. (v. in h. Hook.)
50. D. VISCOSISSIMUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 n. 34), glanduloso-pubescentis, caule herbaceo a basi ramoso, foliis ovalibus utrinque acutiusculis brevipetiolatis æquidistantibus, floribus axillaribus solitariis oppositis sessilibus, bracteolis lanceolatis calycem subæquantibus, corollæ infundibuliformi-

formis tubo faucibus obconicis paulo longiori.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 1413). Rhizoma flexuosum, fibris radicalibus apice fusiformibus. Caules semipedales, erecti, tetragoni, ramosi, cum foliis bracteolis calycibusque pubescentiâ densâ molli glandulosâ vestiti et arenâ adglutinatâ inquinati. Folia 1-1  $\frac{1}{2}$  poll. longa et 6-7 lin. lata, in petiolum brevissimum acute desinentia, superiora magis acuta. Flores in nostris 2, infra apicem caulis oppositi, fere sessiles. Calyx 6-7 lin. longus, laciinis fere setaceis valde glandulosis. Corolla violacea, usque ad limbi marginem 2  $\frac{1}{2}$  poll. longa, tubo gracili pollicari. (v. in h. reg. berol.)

51. D. BRACHYSIPHON (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 34), hirsutus, caule herbaceo subramoso, foliis ovatis obovatise repando-crenatis basi cuneatâ in petiolum brevem decurrentibus, inferioribus distantibus obtusis, superioribus acutisculis approximatis, floribus axillaribus solitariis geminis oppositis subsessilibus, bracteolis linearibus lanceolato-spathulatis calyce brevioribus, corollæ infundibuliformis tubo faucibus triplo breviore.  $\mathcal{L}$  Ad Puerto Alegro Brasilie in Campo, Octobri (Sellow! in herb. reg. berol. n. 68). Quod ad foliorum figuram D. dissitifolio valde similis differt inferioribus foliis haud multo minoribus, imprimis tamen tubo corollæ brevi; quo charactere D. brevicauli similis est, sed differt foliorum formâ et hirsutie non undique sparsâ sed solis in costis dispositâ, tum etiam corollâ 1 $\frac{1}{2}$ -1  $\frac{1}{2}$  poll. longâ, breviori igitur ac paulo magis turgidâ. (v. in h. reg. berol.)
52. D. BREVICAULIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 35), caule humili foliisque supra subtusque in costis hirsutis, foliis superioribus ovali-oblongis obtusis repando-dentatis crenatis in brevem petiolum acute desinentibus, inferioribus obovatis aequidistantibus, floralibus approximatis, floribus solitariis oppositis subsessilibus, bracteolis lanceolato-linearibus calyce brevioribus, corollæ infundibuliformis tubo in fauces obconicas ipso duplo longiores transeunte.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 3190). Differt a D. dissitifolio caule circiter spithameo, foliis inferioribus haud adeo distantibus neque magnitudine valde diversis, foliis omnino minus, subtusque non nisi in costis hirsutis, denique tubo corollæ ad fauces commensurato breviore. Corolla a basi ad limbi marginem 2  $\frac{1}{2}$  poll. longa. Rhizoma lignosum, subterraneum. An var. D. dissitifoli? (v. in h. reg. berol.)
53. D. FURCATUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 35), hirsutus, caule herbaceo apice bi-tri-furco, foliis brevissime petiolatis subsessilibusque repandis, inferioribus ovatis superioribus floralibusque lanceolatis, infimis minoribus valde distantibus, floribus solitariis geminis ternis congestis oppositis subsessilibus, bracteolis ovalibus calycem æquantibus, corollæ infundibuliformis tubo fauces obconicas æquante.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ (Sellow! in herb. reg. berol. n. 2 et 266). Similis D. dissitifolio, quin ejus forsitan forma perfectior, sed differt caule ad apicem diviso, foliis ramorum inferioribus ovatis apicem versus attenuatis paulo majoribus acumine obtuso, neque ovalibus obtusis, tum superioribus plerisque ovato-oblongis, oblongis lanceolatis, floralibus aggregatis, bracteolis latioribus, corollâ denique duplo fere minore, cum limbo circiter pollicari. (v. in h. reg. berol.)
54. D. PURI (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 35), herbaceus, pubescens, caule acute tetragono, foliis ovalibus oblongis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimi, floribus axillaribus oppositis brevissime pedicellatis, bracteolis oblongo-lanceolatis calyce longioribus vel subæqualibus, corollæ tubo longissimo, faucibus brevibus.  $\mathcal{L}$  vel  $\odot$ . In silvis a gente Puri habitatis, ad praesidium S.-Joannis Baptista et in Serra de S.-Geraldo prov. Minarum Generalium, Aprili (Martius!), in silvaticis jugi Serra da Chapada Brasilie et in fructicetis umbrosis prope Bordo do Campo prov. Minarum Generalium, Maio, tum in locis umbrosis Ijtu, Februario, et in fructicetis Serra da Mantiqueira, Maio (Riedel! in herb. acad petrop. n. 52, 64, 1986 ex parte et n. 76?). Ruellia Puri Mart.! in herb. reg. monac. Caulis 3-

4-pedalis, nodulosus, articulis plerisque brevibus. Folia 3-4 poll. longa, 1-1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, apice magis quam basi attenuata, pilis molliusculis patulis plus minus dense vestita, subinde canescens, etate glabrescentia, ramis costalibus 6-10-nis rectiusculis subtus prouinuluis magis pubescentibus. Bracteæ 6 lin. longæ, subspathulateæ. Calyx 5 lin. longus, lacinis setaceis bistrutis. Corolla rubro-cœruleus; tubus sæpe 1  $\frac{1}{2}$  poll. longus; limbus patens 14 lin. latus, laciñiis retusis; faux brevis obconica. Capsula 7 lin. longa, lanceolata. (v. in h. mouac. petrop. berol. etc.)

3. *angustifolius*, foliis lanceolatis cauleque apicem versus lanatis. — Folia sunt 2  $\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, 8-9 lin. lata, plus minus repando-crenata utrinque sicuti et caulis dense lauata, etate subtomentosa. Reliqua ut in formâ communis. Hujus subvarieties sunt: 1<sup>o</sup> *ampliflorus*, corollæ limbo ut in faucibus longiore. — Ad Allegres (Pohl! in herb. palat. vindob. n. 6036. — 2<sup>o</sup> *angustiflorus*, corolle limbo fauces æquante. — Ad ripas rivulorum prov. Vera-Cruz ad Puerto Nacional in imperio Mexicanâ (Linden! n. 194 in herb. Hook. et Benth.), in præruptis Cordilleræ prov. Vera-Cruz alt. 2000 ped., a Junio in Octobre (Galeotti! n. 927 in eod. herb.). In hac flores inferiores longius pedunculati bracteolisque majoribus predditi sunt; superiorum bracteolæ linear-lanceolatae. Corolla rosea vel cœrulea, 1  $\frac{1}{2}$ -1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, limbi diameter 7 lin. (v. in h. Benth. Hook. etc.)

7. *gymnoladus*, ramosior, ramis basi nudis articulo imo elongato, apice subcapitato-floriferis. — In prov. Minarum Generali Brasiliæ (Gardner! n. 5130 in herb. Benth. et Hook.). Bracteolæ calyci sunt vel æquales vel eo paulo breviores. (v. in h. Benth. et Hook.)

55. D. *HELIANTHEMUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 36), suffruticosus, hirsutus, foliis oblongis basi obtusis subsessilibus integerrimis juvenilibus subtus tomentoso-canis, floribus infraterminali-axillaribus aggregatis, bracteis propriis lanceolatis calyce brevioribus, calycis laciñiis linear-lanceolatis attenuatis hirsuto-tomentosis, corollæ infundibuliformi. ♂ In silvis Catingas ad montem Sanctum prov. Bahiensis, Aprili (Martius!), ad Rio Preto fluvium (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 1998). Hirsutæ longæ patente flavidâ insignis. Caules lignosi, erecti aut adscendentes, incurvi, tetragonii, purpurascentes, pedales, simplices vel ramosi. Folia 1  $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, 6-8 lin. lata, brevissime petiolata, obtusiuscula, flavescenti-hirsuta, juniora subtus incana et ad nervos hirsuta. Ramulorum folia similia, at duplo minora magisque hirsuta, subtusque tomentosa, marginibus sæpe revolutis. Calyx 5 lin. longus, laciñiis plus minus attenuatis obtusis. Bracteolæ lanceolatae, obtusæ, duplo fere breviores, hirsuto-tomentosæ. Corolla cœrulea, biplicatæ, infundibuliformis, tubo fauces obconicas æquante. (v. in h. monac. et vindob.)

56. D. *VINCIFORMIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 36), suffruticosus, caulis e rhizomate calloso nodoso pluribus simplicibus apice ramosis erectis subdiffusis lauiginoso-pubescentibus, foliis obtusis margine subtusque puberulis basi cuneatis, inferioribus obovatis, superioribus plerisque ovalibus oblongis, floribus axillaribus geminis ternisve subsessilibus, bracteolis oblongis obtusis ciliatis calyce anguste linear-i hirsuto brevioribus, corollæ infundibuliformi tubo in fauces obconicas transeunte. ♂ In Brasiliâ (Comes ab Hoffmannsegg in herb. Willd.!), in silvis ad flumen Rio de Caxoeira ad Almada prov. Bahiensis, Januario (Martius!). Ruellia vincoïdes herb. Willd. n. 11650. Similis D. patula et erecto, sed differt ab hoc corollæ limbo ampliore et uti ab illo foliis plerisque angustioribus ubi vero latiores tunc basi cuneatis. Caules e rhizomate lignoso nodoso (repente?) plures, 1-1 pedem alti. Folia superiore 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa,  $\frac{1}{2}$  poll. lata, supra glabra et lævia costis scabris, juniora autem tota scabra; rami costales 5. Folia inferiore et surculorum teneriorum omnia magis ovata vel obovata, 1-1  $\frac{1}{2}$  poll.

- longa (cum petiolo) 8-10 lin. lata, cuneatim in petiolum longum decurrentia. Flores gemini vel etiam solitarii. Bracteolæ 2  $\frac{1}{2}$ -3 lin. longæ, oblongo-lanceares, pubescentes. Calyx 6 lin. longus, lacinis perangustis linearibus patenti-hirsutis. Corolla, a basi ad limbi apicem 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, pubescens, coerulea ? tubo in fauces anguste obconicas transeunte, limbi lacinii rotundatis. Capsula oblonga, 3-4 lin. longa, pubescens, 8-sperma ? (v. in h. berol. et monac.)
57. D. SCHLECHTENDALIANUS, suffruticosus, canibus elongatis ramosis subdiffusis apice subpuberulis, foliis ovato-oblongis obtusis basi in petiolum brevem acute desinenteribus repando-denticulatis supra confertim lineolatis margine subtusque in costis scabris, floribus axillaribus solitariis oppositis subsessilibus, bracteolis (inferioribus saltem) oblongo-lanceolatis obtusis ciliatis calyce longioribus, calycis lacinii setaceis hirsutis, corolla infundibuliformi tubo faucibus ample obconicis longiore.  $\mathcal{Z}$  vel  $\mathfrak{z}$  ad Hacienda de la Laguna in imperio Mexicano, Julio (Schiedel in herb. gen. berol.). Ruellia affinis vincoidei Schlecht. in Linn. 7 p. 397. Differt a D. vineiformi non solum corollâ duplo fere majore, scil. bipollicari, sed etiam limbi ejus late cœrulei amplitudine et tubo longiore a faucibus magis discreto. Caulis plurium pedum est longitudine, obsolete tetragonum angulis subtiliter carinulatis. Folia cum petiolo 2 lin. longo 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, 6 lin. lata. Bracteolæ petiolatæ, 7-8 lin. longæ, pulchre ciliatæ, cæterum fere glabrae. (v. in h. gen. berol.)
58. D. PROCUMBENS, suffruticosus, procumbens, pubescens, foliis parvis, inferioribus ovalibus, superioribus oblongis, omnibus obtusiusculis in brevem petiolum attenuatis subtus pallidis lineolatis et præter costas glabriusculis, floribus axillaribus oppositis sessilibus solitariis, bracteolis oblongis petiolatis calyce longioribus, calycis lacinii linear-lanceolatis ciliatis apice setaceis, corollâ. . .  $\mathfrak{z}$  In imperio Mexicano, Tampico de Tamaulipas (Berlandier! in herb. Moricand. n. 192). A D. Schlechtendaliano differt foliis parvis, inferioribus unguicularibus, superioribus dimidio longioribus at angustioribus, et calycis lacinii brevioribus haud setaceis sed basi linear-lanceolatis. Capsula 3 lin. longa, glabra. Semina muricata. (v. in h. Moricand.)
59. D. CANUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. faso. 7 p. 38), herbaceus, caule obtuse tetragono pubescenti-canæ, foliis ovatis ovatoe oblongis acutis repando-suberrenatis longe petiolatis utrinque canescenti-pubescentibus, floribus axillaribus geminis ternisve glomeratis, bracteis propriis bracteolisque setaceis calycibusque albo-villosis, corollâ tubo in fauces obconicas longas transeunte, limbo brevi.  $\mathcal{Z}$  In Serra da Viura (Schott in h. imp. vindob.). Affinis D. erecto et patulo. Caulis pubescentiæ brevi retrorsum incumbente tomentoso-canus, angulis obtusissimis, ad genicula in statu secco collapsus. Folia inferiora petiolo bipollicari, lamina 5 poll. longa, ad basin 2 poll. lata, superiora in petiolo 9-7 lin. longo 4  $\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata; omnia basi rotundata et ad petiolum breviter acutata. Flores versus apicem caulis magis aggregati. in pedunculo communis brevissimo, 2, 3, raro plures arte conferti. Bracteæ ad basin talis fasciuli duæ, setaceaæ, calyceæ plerumque longiores; duæ ad basin calycis calyce breviores. Calyx 6 lin. longus. Corolla 2 poll. longa, tubo sursum in fauces elongato-obconicas transeunte. Antheræ exsertæ. (v. in h. vindob.)
60. D. PAVONIANUS, herbaceus, caule tetragono pubescentiæ brevissimæ retrorsum falcatæ canescente, foliis oblongis in petiolum brevem decurrentibus repando-crenatis supra dissite hirsutulis, floribus axillaribus geminis in pedunculo brevissimo sessilibus, bracteis lanceolatis, bracteolis linear-lanceolatis, calycibus hirsutis, lacinis subulatis, corollæ infundibuliformis tubo fauces late obconicas æquante.  $\mathcal{Z}$  In Peruviâ (Pavon! in herb. Moricand). Ruellia biflora Pav. I. c. nec Linn.). Caulis pedalis, supra genicula tumens. Folia cum petiolo 2 poll. longa, 8-6 lin. lata, inferiora obtusa, suprema acuta, subtus pallida, ad costas scabra. Pedunculi oppositi, petiolo duplo breviores. Bracteolæ calycem reuantes. Corolla 8-9 lin. longa. Floribus geminis

distincte licet breviter pedunculatis inter species affines, v. g. *D. patulum*, *orectum*, *canum*, cæt. distinctior, prætereaque foliorum formæ. (v. in h. Moricand.)

61. *D. GRANDIFLORUS*, herbaceus, caule quadrangulari subhirsuto, foliis ovatis cuspidato-acuminatis e basi rotundata in petiolum attenuatis repando-subcreuatis supra lineolatis subtus lævibus glabris, capitulis axillaribus pedunculatis trifloris terminalique plurifloro bracteatis, bracteis ovatis cuspidatis capitulum includentibus, bracteolis duorum parum similibus inclusis subciliatis, calycis scabri lacinii subulatis, corollæ infundibuliformis tubo fauces obconicas æquante, capsula 16-sperma.  $\mathcal{L}$  Ad Pueblo Nuevo et Lima Peruviaæ (Ruiz!), Pangoa, Julio (Mathews! n. 1212 in herb. Hook.). *Ruellia grandiflora* cum iconæ 47 Ruiz! in herb. gen. berol. *Ruellia candida* fl. per. c. ic. 47 ex herb. Ruiz. et Pav. in herb. Hook. Speciosæ stirps. Folia 6-7 poll. longa,  $3\frac{1}{2}$ - $3\frac{3}{4}$  poll. lata, supra inter lineolas parvas subtusque obsolete glandulosæ-punctata. Capitula ovata, bracteis  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{4}$  poll. longis inclusa, in pedunculo petioli longitudine opposita; terminale è tribus capitulis conflatum magnitudine pomi minoris. Bracteoleæ bracteis similes, at minores tenerioresque. Calyx ratione brevis. Corolla bipaniculare, candida (Ruiz), lacinis rotundatis. Capsula 9 lin. longa, oblonga, pubescens, ad  $\frac{1}{2}$  a basi clausa. (v. in h. berol. Hook. etc.)

$\beta$ . *clandestinus*, minor, capitulis duplo triplove minoribus paulo longiori pedunculo præditis abortu bi-trifloris et ad speciem simplicibus, bracteis evidenter micanti-punctatis præsertim in paginâ inferiore, corollis claudestinis clausis calyce hand longioribus. — Maynas (Peppig! n. 2394 in herb. acad. petrop. ).

62. *D. TOMENTOSUS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 38), fruticosus, tomentosus, foliis ovatis acutiusculis in petiolum brevem acute desinentibus integerrimis, floribus axillaribus cymoso-congestis bracteis interstictis, fasciculis oppositis densis, bracteis partialibus spathulato-lanceolatis bracteolisque linearì-filiformibus brevibus tomentosis, calycibus confertissime hirsuto-glandulosis, corollæ infundibuliformis fauce obconicâ tubum æquante, limbo patente. ♂ A prom. Vinzente ad Larinhas Brasiliæ (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 1812). Speciosus. Caulis di-trichotomus, ramis strictis. Folia approximata, inferiora 2-3 superiora  $1\frac{1}{2}$ -1 poll. longa et breviora  $1\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. lata, basi acuta, apice breviter acuta aut obtusiusecula, subtus tomentoso-cana, supra hirto-tomentosa. Petiolus vix  $\frac{1}{2}$  poll. longus, hirsutus, superiorum foliorum brevissimus. Cymulae axillares imbricatae, brevissime pedunculatae, folio breviores, paucifloræ. Pedicelli breves, bracteis blinis parvis linearì-filiformibus juxta basin stipati. Calyx dehisssime glandulosus, pilis capitatis rigidis; lacinia lanceolata, linearì-attenuata, obtusa. Corolla rosea?; tubus superioris nonnihil incrassatus, pollice longior; limbis patens, tubi longitudine dimidiata, lacinis ovalibus obtusa. (v. in h. vindob. )

\*\* *Ebracteolati.*

63. *D. HYPERICOIDES* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 39), caulinis herbaceis adscendentibus erectisve teretiisculis pubescenti-scabris, foliis distantibus ovatis obtusis, infimis subrotundis mediisque glabris, floribus ovali-oblongis pubescentibus, floribus ad apicem caulinis axillaribus solitariis sessilibus, bracteolis nullis, calycis lacinii subulatis hirsutulis, corolla infundibuliformi, tubo fauces late obconicis longiori.  $\mathcal{L}$  Rio Grande, in campis Brasilie, Decembri (Sellow! in herb. reg. berol. ♂. 1215; herb. mus. paris. n. 244). Caules probabiliter cespitosi, graciles, striati, 6-7 poll. longi, pubescentia brevissima dense vestiti. Foliorum paria 3 inferiora distantia, reliqua ad apicem conferta, haec paulo angustiora, media ovata, basi acute in petiolum brevem desinentia, subinde fere truncata fere glabra, pollicaria (cum petiolo), 6-8 lin. lata, obtusissima; paris infimi foliis suborbicularia, basi cuneata; rami costales debiles. Calyx 2 lin. longus, basi angulatus,

parum pilosus. Corolla fere ut in D. Puri, sed minor, a basi ad limbi marginem paulo ultra pollicem extensa, tubo 6 lin., faucibus 3 lin. longis; limbi laciniae subrotundæ, nonnihil retusæ. Stylus hirsutus. Quod ad characteres D. geminifloro propinquior, quod ad speciem in universum vinciformi. (v. in h. berol. et paris.)

64. D. BAHIENSIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 39), fruticosus, caulinus geniculato-effusus, articulis longis tétragonis, adultioribus glabrescentibus ad angulos tuberculatis, juvenilibus dense pubescenti-velutinis, foliis ovatis ovali-ovatoe-oblongis obtusis in petiolatum brevem decurrentibus, juvenilibus subtilissime holosericis, adultis glabrescentibus, floribus axillaribus géminis sessilibus, bracteolis nullis, calycis laciñis setaceis pubescentibus, corolle tubo faucibus anguste obconicis paulo breviore. ♂ In aridis argilloso prope Moritiba prov. Bahiensis (Blanchet! n. 262 et 466 in herb. Moricand., eadem in herb. Benth., ibid. Salzmann! in herb. acad. petrop.), Pernambuto in prov. Bahensi et illis locis ejusdem prov. frequens (Gardner! n. 901 in herb. imp. vindob., Hook. et Benth.), in prov. Ceará (Gardner! n. 1802 in herb. Benth. et Hook.). Ruellia patula Salzmann! in herb. acad. petrop. Ruellia trivialis Blanchet! in herb. DC. n. 329, 446 et in herb. Benth., Salzmann! in herb. Hook. Differt a D. geminifloro et canescente foliis distincte petiolatis, a D. porrigente integumento foliorumque floralium formâ, a D. Schottiano bracteolarum defectu et corollâ breviori. Frutex circiter bipedalis. Flores pallide cterulei. (v. in h. Moricand., Hook., Benth., petrop.)
65. D. BLANCHETIANUS (Moricand ic. ined., N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 39), caule humili hirsuto, foliis oblongis obtusis in petiolatum brevem attenuatis repando-subdentatis, infimis obovatis supra subtusque ad costas pilosis, floribus axillaribus subgemini sessilibus, bracteolis nullis, calycis laciñis linearis-setaccis hirsutissimis, corolla infundibuliformi, tubo faucies æquante, fructu oblongo pubescente 4-spermo. ♀ Egreja Velha Brasilie (Blanchet! n. 3454 in herb. Willd. et Moricand.). A D. geminifloro evidenter differt foliis angustioribus non undique pilosulis sed solummodo ad costas et in margine setis longis patentissimis ciliatis; statim denique nanâ, in specimenibus herbariis Wildenovianî ad summum sesquipollucari. Corolla pollices 1-1 $\frac{1}{2}$  longa. (v. in h. Willd. et Moricand.)
66. D. CANESCENS (N. ab E. in Benth. pl. Schomb. in Lond. journ. bot. v. 4 p. 635), cano-pubescentis, caule herbaceo procumbente adscendente erecto, foliis oblongo-lanceolatis sessilibus obtusiusculis repando-crenatis integrermissis, floribus axillaribus oppositis solitaris geminis subsessilibus, bracteolis nullis (aut caducis?), calycis laciñis linearis-sublatiis hirsutis, corolla infundibuliformis tubo faucies amplas obconicas æquante, limbi laciñis ovatis. ♀ In glareosis circum Angustura in planitiâ Llanos de Baradana (Moritz! in herb. gen. berol.), in Guyanâ Anglicâ (Schomburgk! n. 377 in herb. DC., n. 293, 295, 477 B et 5\* in herb. Benth.), in Jamaicâ (Fadyen in herb. Hook., culta e seminibus ab eodem lectis, in herb. Hook.). Ruellia strepens Swartz! in herb. Schreb. A D. geminifloro differt pubescentia densiori incanâ, foliis angustioribus, corolla faucibus paulo magis inflatis, etc., An var.? Ad basin calycis cicatricule lineares transversales bracteolarum sedem prodere videntur; in multis tamen, quæ examini subjeci, bracteola reperi frustra laboravi. Specimina Guianensis pube longiori gaudent; an species distincta? (v. in h. berol., DC., Hook., Benth. etc.)
67. D. DOMINGENSIS, caule fruticoso erecto dichotomo, juvenili hirsuto, adulto glabro subquadriquetro, foliis ovatis anguste obtusis brevissime petiolatis repando-subcrenatis utrinque hirsuto-tomentosis, floralibus superioribus minutibus in apice caulis coufertis; floribus axillaribus solitaris sessilibus, bracteolis nullis, calycis laciñis linearis-sublatiis hirsutissimis, corolla infundibuliformi, tubo faucies obconicas æquante calyce longiore, fructu pubescenti-

tomentoso. ♂ In S. Domingo (Balbis! in herb. gen. berol.), in Antillis (herb. mus. paris. n. 282. in herb. Nees.). Ruellia strepens Bertero! Balbis in herb. DC. n. 228. Affinis est D. geminiflora, canescens et similibus, differt autem foliis basi obtusis in petiolum lineam longum acutiuscule desinenteribus apicem versus attenuatis sed ipso apice obtuso. Caulis pedalis et bipedalis, inferne glaber, rufescens. Folia floralia superiora imbricata, spicam brevem basi interruptam struentia, 1½-1 poll. longa, 7-8 lin. lata. Calyx 5 lin. longus. Corolla sesquiplicaris, limbi laeiniis rotundatis. Capsula 4 lin. longa, dense pubescentia, tetrasperma, seminibus ad basin ejusque loculi suboppositis. (v. in h. berol., DC. et paris.)

β. foliis paulo angustioribus basi acutis presertim superioribus. — In S. Domingo (Bertero! in herb. DC. ex herb. Balbis. n. 527). Ruellia Dominicensis Spr. in herb. DC. l. c. (v. in h. DC.)

68. D. GEMINIFLORUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 40), caule procumbente adscendente erecto hirsuto glabrescente, foliis ovalibus subovatis brevipetiolatis subsessilibus obtusis vel obtusiusculis subintegerrimis supra subtusque præsertim in costis plus minus hirtis, floribus axillaribus subgeminis subsessilibus, bracteolis nullis, calycis laciniis linearie-setaceis hirsutissimis, corollâ infundibuliformi, tubo fauces subæquante, fructu pubescenti-tomentoso. Folia distantia, 1½ poll. longa, ½ poll. lata; inferiora ovalia, superiora apice paulo magis angustata, acumine autem obtuso, subinde et folia basi magis quam apice attenuata apice tum minus obtuso, nusquam autem revera acuta sunt. Petiolus raro distinctius longiusque protractus; rami costales 5. Flores ex axillis foliorum plerorumque. Calyx hirsutissimus, inæqualis, laciniis subtiliter acuminatis, una 5 lin. longa, tum 2, iterumque 2 paulo minoribus. Bracteola nulla omnino. Corolla 1-1½ pollicaris, pallide violacea (in var. β et γ alba, secundum adnot. Maxim. princ.), faucibus oblongis. Capsula ovalis, superne inflata, dense pubescentia, Semina 4, supra unguem capsulae brevem inserta.

α. procumbens; — In America meridionali, ad Itaparica prov. Bahiensis (Blanchet! in herb. Moricand), in silvis ad villam Ricam prov. Minaurum Generalium, Aprili (Martius!), Congonhas do Campo in eadem prov. (Stephan! in herb. Mart., Claussen! in herb. mus. paris. n. 224), Registo Velho et Patrocínio (Pohl! in herb. Mart. ex herb. imp. vindob.), locis temperatis siccis prope S.-Ana et Ibagué Novo-Granatensis alt. 500-700 hexap., Julio-Octobr. (Humboldt), Venezuelâ, in montosis siccis, Febrero (Otto! in herb. gen. berol.), in Bolivia prov. Chiquitos (d'Orbigny! in herb. Mart.), ad flumen Amazonum (Poeppig! in herb. reg. berol. n. 1439), Cayenne (herb. DC. n. 576), in Peruviâ (Pavon! in herb. Moric., Ruiz! in herb. berol.). Ruellia geminiflora H. B. et Kth. gen. et sp. 2 p. 240, Kunth syn. 2 p. 37 n. 5. Ruellia hirsuta Vell. fl. flum. 5 t. 96. Ruellia strepens Pavon! in herb. Moricand. Ruellia bicolor Ruiz! in herb. gen. berol. (v. in h. monac., Mart. vindob., berol. DC. etc.)

β. hirsutior, caule ramosissimo, foliis minoribus ovato-subrotundis. Ad Capo Frio prov. Bahiensis (Max. princ. Wied.! in herb. Mart.), in campis ubique inter Taubaté et S.-Paulo, Novembri (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 29 et 1676), Congonhas do Campo (Stephan! in herb. Mart.), Minas Geraës Claussen! in herb. Hochst. n. 638 et mus. paris. n. 233 (ex parte), Mato Grosso (herb. mus. paris. n. 242), Mexico (Hartweg! n. 1616 in herb. Hook.). (v. in h. Mart., petrop., paris., Hochstett., Hook. etc.)

γ. erectus, caule e recte stricto acute tetragono. — In Campos dos Goaytacoses (Max. princ. Wied.! in herb. mart.), Padrocinio (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 673), Campos de S.-Bernardo, inter Vittoriam et Bähiam, ad Faeenda da S.-Anna, Facenda da S.-Riotta et Bom Reteiro (Scullow! in herb. reg. berol.), in prov. Bahiensi (Lhotzky! in herb. DC.

- n. 25). *Ruellia hispida* herb. Vahl! e Guyanâ Richard, specimen maius. (v. in h. Vahl, Mart., vindob., berol. et DC.)
- ð. *subacaulis*, caule brevissimo, foliis obovatis subtomentosis. — In Minis Generalibus (Claussen? n. 638. in herb. Moricand et Hook.), in campis siccis petrosis prope S.-Luciam?, Junio, et prope Barbacenam (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 54 et 139. *Ruellia hispida* herb. Vahl! (ex parte). (v. in h. berol. DC., Moricand. petrop. etc.)
- ε. *angustifolius*, foliis lanceolatis oblongo-lanceolatis paulo evidenter repando-denticulatis laxe hirsutis. — Prope Valenciam in prov. Venezuela (Moritz! in herb. gen. berol.), Trinidad in Savannah (Lockhart! n. 362. in herb. Hook.), Surinam (in herb. Hook!). *Ruellia Moritziana* Klotzsch! in herb. berol. Non differt a reliquis, nisi foliis paulo angustioribus. Caulis videtur erectus, ad summum semipedalis. (v. in h. berol. et Hook.)
69. D. *NANUS*, pubescenti-subtomentosus, canescens, radice fasciculata, caule herbae erecto, foliis elliptico-subrotundis obtusis brevipetiolatis integerimis, floribus axillaribus subsessilibus, bracteolis nullis, corollæ infundibuliformis tubo fauce longiore subtransiente.  $\mathcal{L}$  In ins. Cuba locis argillaceis aridissimis Savannæ ad Macariges, Aprili. Similis est D. *geminiflora*, differt autem caule humili, vix bipanicari rhizomate crassiusculo torto (repente) fibris crassis subcylindricis radicante. Folia unguicularia, inferiora minora et distantia. Calyx laciniæ lineares, hirsutæ. Corollæ pollicaris tubus 6 lin. longus. (v. in h. Mart.)
70. D. *PORRIGENS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 41), caule suffruticoso acute tetragono geniculatum diffuso, juvenili hirsuto, foliis primariis oblongo-ellipticis utrinque angustioribus supra hirtis subtus punctatis subtomentosis demum denudatis, floralibus oblongis, floribus ex axillaribus in spicam terminalem transeuntibus, bracteolis nullis, corollæ infundibuliformis tubo longo, fauce obconica tubum æquante.  $\mathfrak{Z}$  In silvis Catingas ad Maracás et ad flumen Peruaguacanga prov. Bahiensis, Octobri, Novembri, et in umbrosis silvis primævis ad Taraucoacanga prov. Minarum Generalium (Serro Frio), Aprili et Maio (Martius!), Gama (Sellow! in herb. reg. berol. n. 67, 27 et 87), in siccis prope Cuyaba, Chapada et alibi (Riedel! in herb. acad. petrop. n. 63), in prov. Piauhy locis aridis (Gardner! n. 2712, in herb. Benth. n. 2712 et 2713 in herb. Hook.). *Ruellia porrigena* Mart. in herb. reg. monac. Canales plurimum pedum longitudine, procumbentes, geniculatum adscendentem, trichotomi, tetragoni aut quadrangulares, angulis acutis asperis. Folia (primordialis 4-2½ poll. longa, 12-10 lin. lata, basi cuneata in petiolum brevem decurrentia, apice æquo modo angustiora at acumine obtusiusculo, integerima, primum canescientia, supra hirta-tomentosa, dein magis vel plane denudata, subtus saepè venoso-reticulata; rami costales 6-9. Folia ramea et floralia inferiora minora, oblongo-lanceolata, obtusa, saepè incana, 1½-1 poll. longa, 5-6 lin. lata, salicina folia quadammodo referentia. Flores inferiores subinde axillares, oppositi; reliqui decrescentibus foliis floralibus spicati. Spica terminalis aut sessilis aut pedunculata, modo oblonga aut subrotunda brevis, modo longior floribus distantibus, foliis floralibus seu bracteis oblongis sessilibus obtusis, 4-6 lin. longis tomentosis glabrescentibus. Calyx 4 lin. longus, laciniis subulatis hirsutis, basi tomentosis. Corolla cœrulea, pubescens, 1½ poll. longa, limbo erecto? obtuso. Capsula tomentosa, tetrasperma, basi brevi spatio contracta et elocularis. Planta polymorpha, subinde tomentosostrigosa, foliis omnibus forma floralium minoribus oblongis subsessilibus. (v. in h. reg. monac., petrop., berol. etc.)
- β. *triflorus*, floribus ternis. In prov. Ceara (Gardner! pl. bras. exscice. n. 1802).
71. D. *NITENS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 41), fruticosus, glaber, foliis ovatis brevissime acutatis subsessilibus integerrimis, floralibus minoribus oblongis obtusis, bracteolis nullis, floribus in apice caulis ramo-

rumque confertis oppositis sessilibus solitarii spicam brevem bracteatam efficienibus, corolla infundibuliformis tubo faucibus æquali, capsula sursum inflata pubescent tetraspermæ. ♂ Ad Pilar (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 1861). Folia rigidula, inferiora in aliis ovata,  $2\frac{1}{2}$ -3 poll. longa et  $2\frac{1}{2}$  poll. lata, in aliis magis ovato-oblonga, 3 poll. longa et  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, apice brevissime acuta, subinde obtusa, basi rotundata vel subcordata, supra nitida, ramis costalibus septentris. Petiolus vix lineatum longus, crassus. Inflorescentia in caulis ramorumque axillarium apice spicas breves, subrotundatae aut ovales refert: Folia floralia imbricata, 3-4 parium, sessilia, ovato-oblonga, oblongave, 9 lin. longa, obtusa. Calyx sessilis, haud ad basin partitus, 4 lin. longus, lepidotus, lacinias linearis-subulatis ciliatis. Corolla  $1\frac{1}{2}$  poll. longa. Stamina inclusa. Capsula 6-7 lin. longa, grisea, pubescens, ovata, ungue brevi, 4-8-sperma. (v. in h. vindob. et monac.)

72. D. TUBEROSUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 42), suffruticosus, glaber, radice tuberosa, foliis oblongis obtusis in petiolum brevissimum contractis, floribus axillaribus sessilibus, bracteolis nullis, capsula sursum ovata brevi unguiculata scabriæ tetraspermæ. ♂ In Brasiliâ (Sellow! in herb. reg. berol.). Propter similitudinem D. nitentis hue retuli, etiam si flore careat. Ex tubere magnitudine nucis Juglandis basi fibroso rufo surgunt canaliculi plures, adscendentes, vix semipedales, simplices, acute quadranguli. Folia subcoriacea, nitida,  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 7-9 lin. lata, integrerrima, nervis costalibus 4-6 venoso-reticulatis. Petiolus linea brevior. Flores axillares, alterni, subinde ad speciem flos terminalis. Calyx 3 lin. longus, lacinias subulatis, scabris, haud ad basin discretis. Corolla deest. Capsula fete 4 lin. longa, punctato-scabra, asperula. (v. in h. reg. berol.)

73. D. CAPREÆFOLIUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 42), fruticosus (arborescens?), ramis junioribus tomentosis, foliis ovalibus obtusis in petiolum breve acute desinuentibus integerrimis supra scalbris subtus tomentosis costis prominentibus, floralibus minoribus spatulatis calycibusque glandulosis, bracteolis nullis, corolla infundibuliformi; tubo fauci oblonga æquale. ♂ Inter Rio Jiquetay et Manoel da Souza in Brasiliâ (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 3176 et in h. Mart.). Ramus teres, lignosus, crassus, cortice purpureofusco, superue confertim ramosus, ramulis patulis tetragonis hirsuto-tomentosis brevibus iterum ramosis. Folia rigida, ramulorum majorum 2 poll. longa, 1 poll. lata, ovalia, obtusa, basi acuta, brevipetiolata, subtus dense tomentosa, costis quinis-septenis, subtus valde prominulis. Flores in ramulis brevibus approximati, subsessiles, solitarii, oppositi, ebracteati. Folia floralia  $\frac{4}{5}$ - $\frac{1}{2}$  poll. longa, brevi-ovalia, cum petiolo 9-3 lin. longa, in petiolum longitudine fere laminæ attenuata, tenuiter tomentosa, glandulisque conspersa. Calyx 6 lin. longus, glandulosus, lacinias linearibus angustis obtusis. Corolla pollicaris et paulo longior. (v. in h. vindob. et Mart.)

74. D. HUMILIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 39), caule herbaceo geniculato procumbente adscendentevi foliisque oblongis lanceolatisve subsessilibus obtusis repandis supra subtusque ad costas scabris, floribus axillaribus subgeminis subsessilibus, bracteolis nullis, calycis lacinias linearis-setaceis scabris, corollæ infundibuliformis tubo fauces æquante. ♂ Differt a D. geminifloro caule foliis calycibusque haud pilosis hirsutisve sed setulis exiguis declinatisque scabris, vel calycibus etiam omnino glabris nec nisi margine baseos ciliatis, superficie lineolatis, tum foliis angustioribus (2 poll. longis 8-4 lin. latis, superioribus  $1\frac{1}{2}$ -1 poll. longis  $3\frac{1}{2}$ -2 lin. latis) supra saturate viridibus subtus pallidioribus. Floris partes et fructus uti in D. geminiforo. Flores late cœrulei (albi ex Gardner ad n. 3418; purpurascens ex Gardner ad n. 4345).

$\alpha$ . minor, canibus et rhizomate pluribus circiter semipedalibus erectis subsimplicibus, foliis inferioribus minoribus spatulatis, floribus omnibus axillaribus oppositis solitarii geminisve. — Ad S.-Pedro prov. Rio

Grande (Pohl), Facenda da Piedade et Baréna da Paxa in Brasiliâ (Sowell ! in herb. reg. berol. n. 70, 184 et 186), in umbrosis Ytu, Februário (Riedel ! in herb. acad. petrop. n. 1986 ex parte, cum D. Puri), in prov. Goyaz (Gardner ! n. 4345 in h. Bentham et Hook., et n. 3418 in herb. Hook.). Ruellia humilis Pohl! ic. fl. bras. in herb. imp. vindob. n. 683. (v. in h. reg. vindob., berol. etc.)

*β. diffusus*, caulis longioribus flexuosis ramosis (floribus subinde in ramulo axillari ex foliorum floralium minorum angulo solitariis alternis). — Ad Piccadá in Brasiliâ (Pohl ! in herb. imp. vindob. n. 683 et 3285), in savannis aridis Guyanae Anglicæ (Schomburgk n. 5); in prov. Minarum Generalium (Claussen ! in herb. mus. paris. n. 235, herb. DC. n. 871 et in herb. Hook.). Ruellia strepens Swartz ! in herb. Schreb. (v. in h. vindob., Schomb., DC. etc.)

75. D. VINDEX (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 42), caule herbaceo foliisque linearis-oblongo lanceolatis sessilibus hirsutis, floribus axillaribus attenuatis sessilibus solitariis geminis, bracteolis nullis, corollæ infundibuliformis faucibus tubum æquantibus. ♂ In Campis ad Contendas quotannis ambustis prov. Minarum Geueralium Brasiliæ, Maio (Martius !), in Brasiliâ loco non adnotato (Pohl ! in herb. imp. vindob. n. 6037), in campis siccis prope S.-Luciam, Septembri, Octobri (Riedel ! in herb. atad. petrop.), Campo Assayas Brasiliæ, Aprili (Gardner ! n. 3954 in herb. Hook.), in solo savannarum lapidoso ad Apata in districtu Guyana prov. Venezuelæ, Novembri (Otto ! in herb. gen. berol.), savanna in Guyana Anglicæ (Schomburgk ! n. 477 in herb. gen. berol., n. 377 in herb. Hook.). Ruellia vindex Mart.! in herb. reg. monac. Caules plures ex uno rhizomate, geniculati, adscendentes, varie ramosi. Ramorum articuli inferiores longi, superiores repente decrescentes. Folia inferiora 1 ½ poll., superiora 2-3 poll. longa, 2-3 lin. lata, ramulorum folia angustiora et paulo minora, magis conferta, infima obovata vel oblonga. Flores vel iu opposito angulo 1-2 sessiles, vel in altero ramus floriferus floribus alternis. Calycis laciniæ linearis-setaceaæ, hirsutæ, tubum sequantes. Corolla 1 ½ poll. longa, cœrulea, limbi laciniis subtrotundis emarginatis. Capsula 6 lin. longa, pubescens, ungue brevi. (v. in h. monac., vindob. petrop., berol. etc.)

76. D. POHLII (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. 7 p. 43), fruticosus, glaber, foliis lanceolato-linearibus sessilibus obtusis per arcus ramorum costatum marginales subtrinervibus, floribus terminalibus oppositis, bracteolis linearibus nullis, calyce scabro, corollæ infundibuliformis tubo faucibus obconicus longiore. ♂ In vertice montium de S.-Felis ad S.-Ana in Brasiliâ (Pohl ! in herb. imp. vindob. n. 1977). Fruticulus humilis, elegans, Neri angustis foliis rigidis, cortice rubro. Folia bipinnicaria, lineam, ad summum lineam sesquialteram lata. Flores plerumque duo in apice rami, subsessiles. Calycis laciniæ 3 lin. longæ, linearis-subulataæ, scabré. Bracteolæ vel nullæ, vel alterius tantum floris tina, linearis, calyce longior. Corolla 1 ½ poll. longa, glabra, rosea ?, tubo in fäuces sät amplas sensim transeunte; limbi laciniæ rotundataæ. (v. in h. vindob.)

77. D. ROsmarinus, fruticosus, ramosissimus, caulis tetragoni attingulis calloso-tuberculatis, foliis linearibus obtusis eveniis rigidis subsessilibus cauleque scabriusculis, floribus axillaribus subsessilibus, bracteolis nullis, calycis laciniis scabriusculis, corollæ tubo brevi. ♂ In Serra do Mato grosso prov. Rio Preto Brasiliæ (Gardner ! n. 2920 in herb. Hook.!) a Tripedalis. Flôres cœrulei » (semipolícares?) Gardner. l. c. Ani hujus generis? Corollam unam chartæ arte adglutinatam vidi, neque exâminare potui. Rigiditate foliorum a reliquis longe recedit, sed subsimilis est D. Pohlii. (v. in h. Hook.)

§ 4. *Subspicati. Flores in axillis foliorum floralium minorum sessiles, spicam terminalalem foliosam exhibentes.*

. D. JAMAICENSIS, glaber, caule erecto obtuse quadrangulari, foliis oblongis longe acuminatis subrepansis basi acutâ in petiolum desinentibus, floribus terminalibus spicatis, bracteis ovato-oblongis acutis basi-bracteolatis lanceolatis obtusiusculis calyce longioribus undique calycisque laciniis ciliatis, corollæ infundibuliformis tubo fauces obconicas æquante. 2 $\zeta$  In Jamaicâ (h. Hook!). Folia cum petiolo 5-6 poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, apice valde attenuata. Spica terminalis subovata, brevipedunculata, cum pedunculo pollicaris. Calycis laciniæ subulatæ. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, rubra?. Quod ad habitum Scorodoxyo coccineo subsimilis est. Fructus deest. (v. in h. Hook.)

1. D. GUTTATUS, caule erecto quadrangulari alternis lateribus et circum genicula plus minus piloso, foliis ovato-lanceolatis oblongis integerrimis margine scabris subtus in costis supra sparsim pilosis, floribus terminalibus spicatis, bracteis bracteolitis lanceolatis ciliatis calyce longioribus, corollæ infundibuliformis tubo faucibus obconicis breviore. 2 $\zeta$  In monte Chadra Arabiæ Felicis (Forskal), Haquef Arabiæ Felicis (Botta ex herb. mus. paris. in herb. Nees n. 206). Ruellia guttata Vahl symb. 2 p. 72, Willd. sp. pl. 3 p. 366. Ruellia foliis ovato-lanceolatis, flore albo-guttato Forsk. descr. p. 114. Folia 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longa. Bractea herbacea, bracteolis longior et latior, folio caulinò minori similis; bracteolæ teneriores. Calycis laciniæ linearis-subulatæ, scabré. Corolla pollicaris. Stigma obtuse bilobum! Capsula pollicaris, acuminata, a dorso superius constricta, tetrasperma. Semina tuberculata. Soli D. elongato quod ad inflorescentiam comparanda. (v. in h. paris.)

1. D. ELONGATUS, glaber, caule erecto foliisque ovali-oblongis cuspidatis integerrimis glabris, floribus racemoso-spicatis terminalibus, bracteis bracteolisque ovalibus, calycis laciniis linearibus pubescens, corollæ infundibuliformis tubo faucibus plus duplo longiori. 2 $\zeta$  In regni Owarc interioribus (Palis. de Beauv.! in herb. DC. n. 539 et ex herb. Delessert in eod. herb. n. 538). Ruellia longiflora Palis. de Beauv. fl. d'Own. et de Ben. 1 p. 45 t. 26. Foliorum lamina 5-6 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, utrinque punctato-asperula. Bracteæ inferiores majores, oblongæ, acutæ, reliquæ decrescentes, ovales, obtusæ, 8 lin. longæ, plus minus glandulos-pubescentes. Flores oppositi, inferiores pedicellati, superiores sessiles. Bracteolæ sub calyce ovales, 4-lineares. Calyx 8 lin. longus, mollis, dense glandulos-pubescentes. Corolla pubescens, corulea, tubo cylindrico, 12-20 lin. longo, faucibus ovalibus 4-8 lin. longis cum limbo campanulatis, limbi laciniis ovatis obtusis erecto-patulis. Stamina quatuor exserta, limbo tamen breviora; antheræ biloculares, compressæ, loculis antrorum contiguis, connectivo convexo punctulato-aspero. Stigma bilabiatum. Fructus adhuc latet. (v. in h. DC.)

5. *Paniculati. Pedunculi axillares, dichotomi, floribus in dichotomia sessilibus. Bracteæ divisionum foliaceæ, foliis dissimiles; bracteola nulla. Capsula vel prope a basi 12-16-sperma vel a medio 8-4-2-sperma. Species America tropicæ et temperatae subtropicæ. — Aphragmia N. ab E. in rel. Hænk. et in Lindl. intr.*

1. D. INCOMTUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras fasc. 7 p. 44), suffricticosus, caule erecto ramosissimo inferius glabriuscule superne hirtò viscidoque, foliis superioribus pubescenti-viscidis, caulinis oblongo-ovalibus ovalibus obtusis cuneatim in petiolum decurrentibus, floralibus lanceolato-spathulatis pedunculisque axillaribus cymulosè-subbifloris divaricatis glandulosis, pedunculis superioribus unifloris, bracteolis linearis-lanceolatis calycem æquantibus patulis calycibusque hirsutis glandulosisque, corollæ infundibuliformi. 3 In silvis Catingas prov. Bahiensis ad Caxoeiras et ad Maracas, Novembri

- (Martius!), Caldas in Brasiliâ (Pohl!) in herb. imp. vindob. n. 2653, 6029 et 3652, herb. Nees), prope Catalao in prov. Goyaz, Augusto (Riedel!) in herb. acad. petrop. n. 2480), in viciniâ Serra Acuriæ prov. Bahiensis, locis inundatis! (Blanchet! pl. bras. exsicc. n. 2888). Foliissuperioribus, bracteis bracteolisque valde viscidis viscositate suâ sâpè incomite coherentibus, et pedicellis axillaribus solito longioribus satis distincta species, soli D. viscidulo similis, a quo tamen differt viscositate multo intensiori, foliis floralibus angustioribus et corollâ plus duplo majore biplicari, si limbum in censum voces, alba, maculâ faucium dilute violaceâ. (v. in h. monac., vindob., petrop.)
82. **D. FLORIBUNDUS**, ramis teretibus glanduloso-pubescentibus, foliis ovatis obtusis integerrimis viscoso-pubescentibus, pedunculis axillaribus dichotomis, bracteis subrotundis, capsule loculis mono- vel dispermis.  $\mathcal{L}$  In regno Peruano (herb. Haenk!, Lobb! n. 190 in herb. Hook.), prope Guayaquil (Sinclair! et herb. Hook.) Santa Rosa de Quivi in valle Cantæ (herb. Hook! ), Columbia (Cuming! n. 1239 in h. Hook.). Ruellia floribunda Hook. in bot. miscell. 2 p. 236. Aphragmia rotundifolia N. ab. E. in pl. Haenk. et in Benth. bot. of the Sulph. p. 146. D. viscidus differt ramis teretibus, foliis minoribus obtusis, pedunculis crassioribus bracteis subrotundis floribusque majoribus. (v. in h. Haenk! et Hook.)
83. **D. VISCIDUS**, ramis tetragonis glanduloso-pubescentibus, foliis ovato-ellipticis utrinque acutis hirsutis, pedunculis axillaribus dichotomis divaricatis, bracteis oblongis, corollæ tubulosæ incurva limbo brevissimo, capsule loculis dispermis.  $\mathcal{L}$ ? In Chile (herb. Haenk! ), Lima et Peruviâ septentrionali (Cuming! n. 1002 in herb. Benth. et Hook., Matbews!), Guayaquil (Gaudichaud! in herb. DC. n. 672). Ruellia paniculata herb. Vahl! fol. 2 (specimen superius Rohr!). Similis Ruelliae paniculatae (viscosa H. et Kth.), sed flore fructuque diversus. (v. in h. Hænke, Benth., Hook., DC.)
84. **D. HÆNKEI** (N. ab E. Acanth. Haenk. et Benth. in pl. Hartweg, p. 122 n. 688), ramis tetragonis foliisque ovato-ellipticis repando-subcrenatis hirsutis, superioribus ovatis breviter acutis integerrinis, bracteis lanceolatis calycibus glandulosis.  $\mathcal{L}$ ? — Caulis fruticosus?, ligno subtili albo. Folia ramorum principaliū magna, 6-7 poll. longa,  $2\frac{1}{4}$ - $2\frac{1}{2}$  lata, longe petiolata, ex ovato elliptica, apice attenuata nec acuta, basi acutiuscula, obiter repando-crenata vel subdentata, utrinque hirsuta; superiora et ramea minora magisque ovalia, breviter acutata et integerrima. Bracteæ 4-3 lin. longæ, subæquales, patentes ad bifurcationes oppositæ, acutiusculæ. Bracteole nullæ. Calyces in dichotomia sessiles, 4-lineares, ad basin fere quinquepartiti; laciniae lineares, in modo angustiores paulo latiores et tunc præsertim obtusæ; superior et duæ inferiores longiores et paulo latiores. Corolla 7-8 lin. longa, anguste infundibuliformis, pubescens, limbo æquali, laciñis ovalibus obtusis, duabus inferioribus retusis. Capsula longitudine calycis, glabra, a basi ad medium fere unguiculato-coangnata, compressa, asperma, valvis contiguis, superne incomplete bilocularis, dissepimento angusto, ad basin loculi 2-4-sperma. Semina orbiculata, compressa, pellicula mucilaginosâ induta.
- $\alpha$ . pedunculus vix pollicaribus. — In regno Mexicano ad Acapulco (Hænke! et Sinclair! in herb. Beuth.), in Sierra San-Pedro Nolasco (Jurgensen! n. 514 in herb. Hook.), ad Guayaquil (Hartweg), in oris occidentalibus Columbiæ et Panamæ (Cuming! n. 1163), ad S.-Martham Columbiæ (Bertero! in herb. gen. berol. et in herb. DC. n. 512). Ruellia albicaulis Bertero! Spr. syst. 2 p. 822. Ruellia paniculata herb. Vahl! fol. 2 spec. inf. (spec. Rohr!). (v. in h. Hænke, Benth., Hook., berol. et DC.)
- $\alpha^*$ . caule a basibus crebris setarum deflorentium aspero, foliis et inflorrescentiâ magis hirsutis et glandulosis. — Tepeniola hurca ad oras Oceanii, Septembri. (v. in h. Hook.)
- $\beta$ . pedunculus longioribus. — Locus natalis ut in var.  $\alpha$ . Ruellia inun-

- data Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. pl. 2 p. 239. *Ruellia rhamnifolia* herb. Willd. n. 11654! (v. in h. Willd.)
- γ. ramis florentibus in paniculam terminalem parvam foliosam collectis. — Nicoza in Americâ meridionali (Sinclair), (v. in h. Hook.!).
85. D. *VISCIDULUS* (N. ab E. in ind. sem. hort. vratisl. ann. 1838 et 1840, in Linnaeâ 16 p. 291 et in Endl. et Mart. fl. bras. faso. 7 p. 45), caule erecto inferius glabro superne puberulo, foliis oblongo-ovalibus ovntis utrinqe attenuatis saltemve subacutis in petiolum decurrentibus, inferioribus glabris superioribus hirsuto-pubescentibus glandulosisque, cymis axillaribus oppositis dichotomo-divaricatis gracilibus glandulosis, bracteis lauceolato-linearibus linearibusve et calycibus hirsutis glandulosisque, calycibus subsecundis, corollâ infundibuliformi.  $\mathcal{U}$  In silvis Catingas ad Contendas prov. Minarum Generalium, Augusto (Martius!), ad Rio Maranhão fluvium Brasiliæ (Pohl! in herb. imp. vindob. n. 2378). *Ruellia viscidula* Schrank, Mart.! in herb. reg. monac. *Ruellia pilosa* Vell. fl. flum. 6. t. 100. Dichotomia rami florantis ortum dicit ex alâ alterius folii bractealis ramuliferâ, alterâ abortivâ, progrediente ulterius axi; ubi autem dichotomia in ramo axive exhausturit, oritur flos ad speciem pedicellatus, revera autem sessilis, adjectâ ad unum latus bracteâ exigua setacea, oppositâ evanescente. Hinc qua vere dicantur bractcole desunt. Ubi flos intermedius in dichotomiâ nasci videtur, eum accuratius examinatum ad basin rami axillaris oriiri reperies, qualis ipsa cymula integra ad basin rami primordialis generatur. Omnes autem flores, sursum spectant. Corolla fere pollicaris, pubescens, pallide corulea; tubus fauce obovatâ longior, calycis lacinias setaceas hirsutas intersparsis glandulis sequans. Capsula prope a basi octo-dodecasperma. Varietates ex cymis contractis compactioribus multi- vel paucifloris oriuntur. (v. v. c. et s. sp. in h. monac. et vindob.)
- β. *glomeratus*, cymis glomerato-contractis multifloris. — Serra Jacobina in prov. Bahiensi (Blanchet! pl. bras. n. 2542. in herb. imp. vindob. et in herb. Willd.), in prov. Alagoas (Garduer! n. 1382. in herb. Benth.), in umbrosis sciccis insulæ Hamanæa prov. Pernambuco Brasiliæ (Gardner! n. 1109. in h. Hook.), ad Rio Maranhão (Pohl! in h. imp. vindob. n. 5004), in prov. Goyaz (Gardner! in herb. Benth. et Hook. n. 4342), in fruticetis humidis prope urbem Alagoas, Aprili (idem! n. 1082 in h. Hook.). *Ruellia Maranonis* Pohl ic. in herb. imp. vindob. n. 5004 (aulalysi fructus haud bonâ). (v. in h. vindob., Benth. et Hook.)
- γ. *abortivus*, fasciculis subbifloris axillaribus brevipeduculatis foliosis, foliis ovatis magis pubescentibus. Status juvenilis. In horto Vratislavieni occurrebat. *Dipteracanthus viscidulus* N. ab. E. in Schlecht. Linn. 16 p. 291).
86. D. *PANICULATUS*, caule erecto tetragono glanduloso-villoso ætate cano, foliis oblongo-ovalibus utrinqe attenuatis in petiolum decurrentibus hirsuto-pubescentibus glandulosisque, inferioribus subinde argute denticulatis, cymis axillaribus oppositis dichotomo-divaricatis rigidulis folium sequantibus, bracteis oblongo-lanceolatis lanceolatis subspathulatis calycibusque hirsuto-glandulosis, calycibus subsecundis, corollâ infundibuliformi.  $\mathcal{U}$  In Jamaicæ australis collibus aridis (Swartz! herb. Willd. n. 11638. fol. 1), (Fadyen in herb. Hook.), in ripâ fluminis Apures et in silvis Orinoccensisibus juxta pagum Carichana (herb. Willd. n. 11638 fol. 3 et n. 817), ad S.-Martham Columbiæ (Bertero!), in regione calidissimâ imp. Mexicanæ inter Laguna Verde et Actopan (Sebiede! in herb. gen. berol.), ad missioñem Angostura in Llano de Barachana imp. Mexicano (Moritz! in eodem herb.), in apriis sciccis ad Oritaco, Mexico (Otto! ibid.), ad Caracas (herb. DC. n. 344), Caracas et Altamira (Berlandier, u. 2191 et 2192 in herb. DC. n. 295 b et 305). *Ruellia paniculata* Linn. sp. pl. p. 885, Willd. sp. pl. 3 p. 307, herb. Vahl! (specimen Banks! et herb. Hook.!), Schlechtend. in Linnaeâ 6 p. 1370. *Ruellia dichotoma* Bertero! in herb. gen. berol. et in herb. DC. n. 511.

*Speculum Veneris majus impatiens Sloane hist. 1 p. 158 t. 100 f. 2. Ruellia viscosa Kunth in H. et B. nov. gen. 2 p. 239, Kunth synops. 2 p. 36. Folia inferioria argute denticulata (spec. Swartz l. c.), vel integerrima spec. Humboldt.). Corolla semipollucaris. Capsula 8-12-sperma. (v. in h. Willd.! Vahl! DC. berol.)*

87. D. TURBACENSIS, caule erecto obtuse tetragono foliisque ovali-oblongis basi attenuatis in petiolum decurrentibus subintegeritinis pubescenti-hirtis, cymis axillaribus oppositis dichotomo-divergentibus rigidulis folio longioribus pubescenti-scabris subglandulosis, bracteis lanceolatis, calycibus subsecundis, corolla infundibuliformi.  $\mathcal{L}$  Prope Turbaco Novo Granatucium ( Humboldt ! in herb. Willd. n. 11638 fol. 2). Ruellia paniculata Kunth in H. et B. nov. gen. 2 p. 239, Kunth syn. 2 p. 36 excl. syn. Differt a Ruelliâ paniculatâ pubescentiâ brevissimâ vix glandulosâ et paniculâ ad speciem ampliore, bracteis etiam paulo angustioribus. (v. in h. Willd.)

### § 6. Inaequifoliæ.

88. D. INAEQUIFOLIUS ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 43), suffruticosus, pubescens, foliis sessilibus inaequalibus altero oblongo apice attenuato altero ovato-cordato subrotundo, floribus axillaribus solitariis ternisve subsessilibus, corolla. . . , bracteolis subulatis calycem parvum subæquantibus, capsula a medio tetrasperma.  $\mathcal{Z}$  Prope Rio de Janeiro ( Karwiuski ! in herb. Mart.). Incertæ est sedis donec corollæ structura innoscatur. Ramus compresso-tetragonus, articulatus, supra genicula incrassatus, geniculis compressis, lutescens, pubescens. Folium alterum cujusque paris 2-2  $\frac{1}{2}$  poll. longum, 8-9 lin. latum, in acumen obtusum excurrens, basi in speciem petioli brevisimi contractum, repando-subdentatum vel et integrimum, supra lineolato-scabrum setulisque raris præsertim apicem versus inspersum, subtus præsertim in costis pubescens, tenui, costis quinque supra magis conspicuis scabrisque; alterum 3-7 lin. longum, ejusdemque fere latitudinis vel latius, cordato-ovatoe-subrotundum brycissimo petiolo sub sessile, obtuse subeuplatum, reliquis alteri folio simile. Flores in majoris folii angulo, vel unus fere sessilis, vel tres in pedunculo brevissimo. Bracteolæ parvæ, hirsutæ. Calyx 1  $\frac{1}{2}$  lin. longus, haud longa a basi divisus, laciniis setaceis hirsutis. Capsula  $\frac{2}{3}$  poll. longa, tetrasperma. (v. in h. Mart.)

### Species non rite cognita.

89. D. MICROPHYLLUS, caule prostrato, foliis parvis oblongis integerrimis petiolaris, floribus ebracteatis, calycibus tubum corollæ æquantibus.  $\mathcal{L}$  In Novâ Hispaniâ ( Cavanilles ). Ruellia microphylla Cav. Spr. syst. 2 p. 821. An idem ac D. procumbens ?

### Species dubia.

90. D. BRACTEATUS, floribus axillaribus, bracteis foliaceis magnis deciduis !, corolle tubo elongato, limbo subæquali, capsulis unguiculatis, foliis oblongis ellipticis, caule erecto.  $\mathcal{L}$  In littoribus Novæ Hollandiæ intra tropicum ( R. Brown ). Ruellia bracteata R. Br. prodr. 1 p. 479, ed. N. ab E. 3 p. 335.

XXXIII. RUELLIA Linn. ex emend. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 82, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 699, Meisn. gen. p. 294 (203).

Calyx ad basin quinquepartitus, laciniis vel inæqualibus superiore altiore vel subæqualibus linearibus apice subdilatatis herbaceis vel æqualibus acuminatis. Corolla infundibuliformis, tubo in limbum anguste campanulatum quinquefidum continuo transeunte, laciniæ æquales, obtusæ. Stamina quatuor, didynama, basi fauciū inserta. Antheræ oblongæ, biloculares, loculis parallelis contiguis æqualibus muticis vel basi mucronulatis. Stigma subulatum, spirale, dorso spongiosum, canaliculatum, basi denticulo

auctum. Capsula angusta, quadrangularis, ad basin usque bilocularis, a basi ultra medium 6-8-16-sperma. Dissepimentum completum, adnatum. Semina retinaculis mediocribus suffulta. — Herbae et suffrutices pubescentes vel hirsutæ, Indiæ orientali, pauciores, eæque alienæ formæ, Americæ tropicæ indigenæ. Spicæ plerumque in capitulorum formam contractæ, foliaceo-bracteatae ideoque rudes et parum conspicuae vel, ubi inflorescentia magis perficitur, dichotomæ vereque cymosæ. Bracteolæ nullæ vel angustæ. Flores mediocres.

**§ 1. Flores spicati, spicis axillaribus terminalibusque. Bracteæ calyce latiores, imbricatae. Raro spicæ ad pedunculum triflorum redactæ. — Veteri orbi adscripta.**

1. R. PRIMULÆFOLIA (N. ab E. pl. Meyen. in nov. act. nat. cur. 19 suppl. 1 p. 382), subacaulis, hirsuta, foliis ovato-ellipticis obtusis duplicato-crenatis breviter petiolatis, spicis radicalibus densis, bracteis solitariis spatulatis, bracteolis nullis.  $\mathcal{L}$  In Manillâ, ad Sarzagon (Hænke!), ad Hali-Hali, insulæ Manillæ (Meyen, Chamisso! in herb. gen. berol.) Radix ramosa, fusa, ratione habitâ plantæ magna. Caulis brevissimus, vix semi-uncialis, hirsutus. Folia revera opposita, sed adeo approximata ut omnia radicalia videantur, 15 lin. longa, 8 lin. lata, petiolo duas ad tres lineas longo hirsuto, basi rotundata, vel subcordata, supra setis albis hirsuta, subtus pallidiora, pubescentiâ et ad costam venasque hirsuta. Spicæ terminales singulæ vel plures, alio subsessiles, alias pedunculo  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  poll. longo hirsuto præditæ, foliis sæpe multo breviores, subcapitatae, dense, longitudine calycis. Bracteola nulla. Corolla 4 lin. longa, infundibuliformis, coerulea, limbi subregularis laciniis brevibus rotundatis. Capsula longitudine calycis, lanceolata. (v. in h. Hænk. et berol.)
2. R. RAVACCENSIS, glabra, caule filiformi repente, foliis longe petiolatis cordato-ovalibus obtusis grosse repando-crenatis, pedunculis axillaribus 1-3-floris folium æquantibus, bracteis linearis-cuneiformibus patulis, bracteolis nullis, corolla infundibuliformis ore barbato.  $\mathcal{L}$  In insulâ Rawak (Gaudichaud! in herb. DC. n. 216). Folia pollicaria in petiolo 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longo. Flores in pedunculo trifloro duo, oppositi, tertius paulo altior, terminalis. Calycis laciniæ subulatae, pubescenti-ciliatae. Corolla 4 lin. longa, tubo fauces æquante, limbi laciniis ovatis obtusis. Stamina inclusa, antheris oblongis, filamentis brevibus. Fructus deest, hinc genus incertum. (v. in h. DC.)
3. R. PARABOLICA, caule filiformi repente hirsuto, foliis longe petiolatis cordato-oblongis obtusis grosse repando-crenatis supra hirsutis subtus in costis pubescens, spicis axillaribus folio paulo longioribus longe pedunculatis paucifloris laxiusculis, bracteis inferioribus parabolicis in petiolum longum attenuatis obtusis ciliatis patulis, bracteolis obsoletis.  $\mathcal{L}$  In insulis Philippinis (Cuming! n. 571 in herb. Hook., Benth. et in herb. gen. berol.!). Similis Ruellia Ravaccensis, differt hirsutie et foliis angustioribus. Spica primo capituliformes et veluti involucratæ, deinceps laxiores, floribus oppositis 4-6. Calyx birsutus. Corolla 6 lin. longa. (v. in h. Hook., Benth. et in gen. berol.)
4. R. REPANDA (Linn. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 370), foliis lanceolato-linearibus obtusis in costis sparsim hirsutis basi acutâ brevi in petiolum longiusculum desinentibus sinuato-dentatis dentibus inæqualibus grossis obtusis acutisve, caule gracili repente laxe hirsuto, spicis axillaribus pedunculatis brevibus pedunculo folio breviore, bracteis lanceolatis ciliatis calycem ciliatum æquantibus, bracteolis nullis, corollâ anguste infundibuliformi, faucibus barbatis.  $\mathcal{L}$  In silvis lapidosis insularum Indiæ orientalis, Moluccis, Amboina (Burmann! Rumph.). Burm. fl. ind. p. 134 t. 40 f. 2, herb. Vahl spec. Burmann!

*Prunella Molucca hortensis angustifolia* Rumph. amb. 6 p. 30 t. 13 f. a, b (folia). *Ruellia difformis* Linn. suppl. p. 289, Willd. sp. pl. 3 p. 374 (excl. syuon. Nir-Schulli Rhed. hort. mal.). Foliis singulari irregulari modo sinuatis dentatisque satis est distincta a reliquis omnibus. Fibrae radicales simplices ex omnibus fere proveniunt geniculis caulis. Genicula sunt barbata. Corolla alba. Stamina inclusa; antheræ loculi basi mucronulati. Ovarium oblongum, pluriovulatum. Colitur in hortis ad lavacra contra incantamenta in usum vocata. (v. in h. Vahl.)

5. *R. REPTANS* (Forster prod. p. 44 et herb. Schreb.!), caule reptante hispido, foliis longe petiolatis ovalibus obtusis crenatis glabriusculis ætate supra bullatatis, pedunculis subterminalibus geminis folio brevioribus nudis, floribus spicatis, spicis brevibus subinvolucratis, bracteis oblongo-cuneiformibus hirtulis, bracteolis nullis.  $\mathcal{L}$  In insulâ Tannâ (Forster! in herb. Schreb., Hinds! in herb. Beuth.). — Willd. sp. pl. 3 p. 372. Gaudich.! in herb. DC. n. 190, Benth. in Lond. journ. of bot. 1843 p. 230). Caulis 3 poll. longus, in nostro specimine, fibris longis e ventre articulorum crebro emergentibus radicans. Folia cum petiolo 9 lin. longo  $2\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, 9-12 lin. circiter lata, in margine et costis hispidula, adulta bullato-rugosa et nitida, basi evidenter inæqualia. Pedunculi ad apices ramorum gemini, graciles, adjectæ ad latus innovatione terminali, revera igitur laterales dicendi. Flores in spicâ oppositi, approximati. Calyx fructus patulus, lacinias anguste linearibus pilosulis. Capsula a basi 6-8-sperma, longitudine calycis. Bracteæ calyce longiores, deciduae; infimæ majores. (v. in h. Schreb. et Benth. etc.)
6. *R. COLORATA* (Blum. bijdr. p. 795), caule herbaceo-recente petiolisque laxè hirsutis, foliis cordato-ovatis in apicem obtusum attenuatis grosse crenatis sparsim præsertim in costis hirtis marginè scaberrimis subtus purpureo coloratis, spicis terminali tetragonâ pedunculatâ, bracteis oblongis obtusis ciliolatis inferioribus deciduis, bracteolis exiguis setaceis.  $\mathcal{L}$  In hortis Javanensis (Blume, Zollinger!). *Goldfussia colorata* Moritzi in Zoll. pl. jav. p. 47 n. 544. *Ruellia Hamiltoniana* Steud. nom., Hassk. cat. hort. bogor. alt. p. 148. *Prunella Molucca silvestris rubra* Rumph. amb. 5 p. 32 t. 13 f. 3. Foliis cordatis basi æqualibus sat distincta. Folia cum petiolo sesquipollari 4  $\frac{1}{2}$  poll. longa et 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata. Corolla angusta, 6-7 lin. longa. Calycis lacinias basi lineares, apice setaceo-elongatae, hirsutæ. (v. in h. DC.)
7. *R. JACQUEMONTIANA*, foliis oblongis acutiusculis breviter petiolatis dense serratis supra hirsutis subitus cauleque dichotomo pubescenti-canis, spicâ terminali breviter pedunculatâ capituliformi pauciflorâ, bracteis foliaceis oblongis serratis petiolatis, calycis lacinias linearibus obtusis hirsutis brevioribus, bracteolis linearibus calyce triplo brevioribus, corollæ elongatae lacinias emarginatis.  $\mathcal{L}$  In Caschemyr (Jacquemont! ex herb. mus. paris. in herb. Nees. n. 148). Accedit ad *R. diffusa*, a quâ integumento caulis subtili subsericante et corollâ bipolllicari tubo fauces oboconicas æquante, facile distinguitur. (v. in h. paris.)
8. *R. SERPENS*, caule herbaceo prostrato repente foliisque ovatis utrinque acutis dense crenato-serratis hirtis, capitulis axillaribus alternis oppositis paucifloris bracteatis hirsutis, pedunculo petiolum subæquante, bracteis obovatis hirsutis exterioribus apice crenatis involucrantibus, corollâ suburceolatâ.  $\mathcal{L}$  Tjiseræ in ins. Java (Blume!). Similis *Ruellia hirta* et crispæ, differt caule filiformi ex omnibus geniculis radicante, pedunculis gracilioribus, capitulis laxis, corollâ 3 lin. longâ tubulosa infra limbum constrictâ, limbi lacinias brevissimis rotundatis. (v. s.)
9. *R. HIRTA* (Vahl symb. 3 p. 84 t. 67 et herb.!) foliis ovatis petiolatis apicem versus crenato-serratis internodis brevioribus cauleque repente hirsuto-canis. spicis axillaribus pedunculatis capituliformibus, bracteis foliaceis oblongis, bracteolis nullis, capsula dodecaspermâ.  $\mathcal{L}$  In Indiâ or. in Sukanaghur et in Kuwarikot (Hamilt.!), Coromandel (Macé! in herb. mus. paris. et Nees,

n. 140). — Willd. sp. pl. 3 p. 371. R. latebrosa Wall. cat. n. 2382 a, b, Roxb. fl. ind. 3 p. 46 et in herb. Willd.! R. sarmentosa N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 83. R. hirta? herb. Hamilt.! Wall. cat. n. 2382 e ad partem (1, herb. Willd. n. 11647. R. diffusa Wall. cat. ex parte. Caulis gracilis, geniculatus, ad genicula radices agens, tetragonus, ut folia, bracteæ et calyces setis patentibus candidis articulatis hirsutus. Folia 8-9 lin. longa cum petiolo 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. longo, intermedio duplo breviora, 4 lin. lata, ovato-elliptica, obtusa, basi acutiuscula, crenulata-serrata; petioli angusti, valde ciliati. Bracteolæ plerumque nullæ, interdum singulæ vel binæ exiguae, setaceæ inter villos latentes. Corolla circiter 6 lin. longa, infundibuliformis, tubo glabro, fauce cum limbo campanulato, laciniis late ovatis obtusis æquilibus extus puberlis. Capsula calycis longitudine, lanceolata, glabra, a basi dodecasperma; latera facile a dissepimenti carinâ solvuntur. (v. in h. Vahl, Willd., Wall. etc.)

$\beta$ . urens (N. ab E. 1. c.), foliis bracteisque magis rotundatis undatisque, his hirsutissimis. — Ad Ambula in Sirhind, Maio (Edgeworth). R. urens Roth nov. pl. sp. p. 302 n. 3, Roxb.! herb. n. 18. R. diffusa Wall. cat. n. 2383 ex herb. Roxb., adjectâ schedulâ, nomine R. urentis Roxburghii manu inscriptâ. R. hirta herb. Mart.! et Schrb.! et R. latifolia Roth ibid.! (v. in h. Wall., Roxburgh Schreb. etc.)

10. R. CRISPÀ (Linn. sp. pl. p. 886), caule herbaceo basi repente foliis que ovatis utrinque acutis undulato-crenatis lineolatis hispidis, capitulis axillaribus oppositis bracteatis hirsutis, pedunculo petiolum subæquante, bracteis obovatis apice crenatis, corollâ brevi, fauicibus campanulatis.  $\mathcal{U}$  In Indiâ orientali (Wight!), loco non indicateo. — Osb. it. p. 240, Mill. dict. n. 4, Burm. fl. ind. p. 134, Willd. sp. pl. 3 p. 368, Spr. syst. 2 p. 824, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 83, Wight h. prop. n. 1941. Caulis procumbens, basi repens, tetragonus, lineolato-scaber et setis articulatis hirsutus. Folia cum petiolo pollicari et longiori triplicaria, pollicem lata, apice acuto-obtusata, basi acuta, apicem versus inæqualiter undato-crenata. Bracteæ infimæ obovatæ, reliqua e cuneiformibus interiora versus in lineares abeuntes; exteriores apice crenatae, omnes obtusæ hirsutæque. Bracteolæ lanceolatae, longitudine calycis. Corolla 4-linearis, purpurea? (flava Linn.), e tubo brevi campanulata, glabriuscula, limbo quinquefido subregulari laciniis obtusis. (v. in h. Wight.)

$\beta$ . capitulis subsessilibus. R. strepens h. Wight ad partem. (v. in h. Wight.)

11. R. DURA (N. ab E. in herb. Wight n. 2325), foliis oblongis obtusiusculis subrenatis in petiolum attenuatis cauleque procumbente adscendente hispidis, spicis axillaribus brevissime pedunculatis terminalibusque adscendentibus capituliformibus, bracteis quatuor majoribus subovatis acutiusculis crassis e tuberculis hirsutis subtusque tomentosus involucratis, interioribus oblongo-lanceolatis, bracteolis linearibus nullisve, capsula octospermâ calycis breviori.  $\mathcal{U}$  In præsidio Madras (Campbell! herb. Wight, h. Campbell n. 94), Chunchucacherla in ditione Massulipatam (Wight!), in Indiâ centrali solo pingui, Decembri (Edgeworth! in herb. Benth., Jacquemont! in herb. mus. paris. et Nees n. 182, Voyage! n. 110, in herb. mus. paris. n. 174). Caulis procumbens, adscendens, flexuosus, quadrangulus, lateribus alternis canalieulatis, setulis callo impositis hispidis. Rami divergentes. Folia caulina cum petiolo 3 poll. longa, 8-9 lin. lata; obsolete crenulata, rigidula, glauca, undique præsertim in margine costisque setulis rigidis hispida; ramea obtusa, 1 poll. longa, 5 lin. lata. Bracteæ exteriores 4-5 involucrum efficiunt, 8 lin. longæ, 4 lin. late, ovatae, acutiusculæ, subintegerrimæ, supra dense strigoso-hirsuta, subtus pubescenti-tomentosæ, canescenti-glaucæ, sparsim setulosæ, costâ elevatâ divisæ, margine recurvæ venis costalibus ante marginem in plexum tenuem arcuatam coeuntibus. Bracteolæ calycis longitudine, plerumque ex altero latere tantummodo positæ, quandoque et omnino deficientes. Corolla 6 lin. longa, infundibuliformis, fauce brevi parum inflato, limbi laci-

(1) Altera pars est Ätheilema reniforme Wall.

niis suborbicularibus æqualibus. Capsula 4 lin. longa, octosperma. (v. in h. Wight, Edgeworth et paris. etc.)

12. R. ? PUNCTATA (N. ab E. in herb. Wight n. 656), foliis ovalibus utrinque attenuatis integerrimis subrepandis glanduloso-punctatis cauleque herbaceo tetragono hirsutis, capitulo terminali bracteato pubescente, bracteis foliaceis acutis, bracteolis linearis-oblongis confertim ciliatis, calyce 4-fido.  $\mathcal{L}$  Ad Courtallum. Strobilanthes ? Wight herb. n. 656. Caulis pedalis et altior, tetragonus, angulis acutisculis, dense at molliter hirsutus, ramosus, patulus. Folia inæqualia, altero duplo fere minore, cum petiolo in majoribus 1-1½-pollicari 5-6 pollices longa, 1 ½ poll. lata, acuta aut acuminata acuminé obtuso basi longè attenuata, integrifima aut obiter repanda, cum petiolo utrinque molliter hirsuta, glandulæ micante punctiformi in singulâ retis venosi maculâ lineolisque in paginâ superiori vix conspicuis substellatis conspersa, viridia, mollia. Bracteolæ 2 lin. longæ, linearis-oblongæ, obtusiusculæ, unerves, pilis articulatis longis mollibus confertissimis patentibus ciliatae, glanduloso-punctatae, unerves, pallidæ, submembranaceæ. Calyx profunde quadrifidus, lacinias linearis-subulatis acutis ciliatis æqualibus. Corolla 4 lin. longa, infundibuliformis, extus pubescens-scabra, subtiliter glandulosopunctata, purpurascens aut cœrulea ?, tubo brevi, limbo regulari quinquelobulo lobis rotundatis, superioribus paulo profundius discretis, intus glabra, barbulâ alba ad basin laciniaæ mediæ inferioris. (v. in h. Wight.)
13. R. CHINENSIS, caule fruticoso trichotomo-ramoso aspero basi repente, juvenili hirsuto, foliis superioribus oblongis acutisculis in petiolum attenuatis undulato-dentatis laxe hirsutis, spicis axillaribus terminalibusque tetragono-subglobosis, bracteis hirsutis ovalibus rostrato-cuspitatis, rostro linearis obtuso longitudine bracteæ, bracteolis linearis-angustis calycem æquantibus.  $\mathfrak{z}$  In Chinâ (Parker! in herb. soc. horticult. Lond. et Benth.). Strobilanthes refert primæ divisionis, sed capsula figurâ ad Ruellias reducitur, quæ quidem columnata-tetragona, a basi ad medium est octosperma. Semina alba. Calycis laciniaæ linearis-angustæ, bracteolis conformes. (v. in h. Benth.)
14. R. QUADRIFARIA (Wall.! cat. n. 7152. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 83), caule fruticoso dichotomo-divaricatis scabro, foliis ovatis utrinque acutis serratis hirsuto-incanis, spicis axillaribus terminalibusque ovatis tetragonis, bracteis oblongis apice serrulatis, bracteolis nullis.  $\mathfrak{z}$  In jugo montium Taon-Dong dicto regni Ávæ (Wall.). Radix articulato-subgrumosa, fibras deorsum emittens. Caulis pedalis vel sesquipedalis, adscendens, glaber vel setulis densis scaber, simplex vel statim furcatim divisus, apice plerumque semel furcatim dividitur in ramos geniculato-divergentes strigoso-tomentosos subtetragonos. Folia inferiora rami minora, orbiculato-obtusa, basi acutâ in petiolum decurrentia, superiora 3-3 ½ poll. longa, 2 poll. fero lata, acuta, in petiolum vix semi-pollicarem decurrentia, dense dentato-serrata, utrinque confertim hirta et canescens, rigidula, ovata, ovalia oblongave. Bracteæ ½ poll. longæ, acutisculæ, hirsutissimæ, penninerviæ, costâ basi dilatatâ rigente. Calyx ultra medium quinquefidus, hirtus. Corolla ½ poll. longa, violacea, pubescens; tubus longus gracilis, incurvus; limbus cum fauce cylindro-campanulatus, lobis rotundatis subæqualibus. (v. s.)

$\beta$ . *Nepalensis*, omnibus partibus minor, foliis superioribus semipollicaribus.  
— In Nepaliâ (herb. mus. paris. in h. Nees).

15. R. ASPERA, foliis oblongis obtusis repando-crenatis in petiolum brevem acute desinentibus subtus crassinervibus cauleque laxe hirtulis, floralibus lanceolatis sessilibus integerrimis piloso-scabris, spicis axillaribus subclongatis ad apicem ramulorum in spicam compositam coenuntibus glanduloso-hirsutis, bracteis vel linearis-spathulatis vel linearis-lanceolatis, lacinias calycis linearibus obtusis, corollæ lacinias rotundatis, tubo incurvo.  $\mathcal{L}$  In insulâ Timor (Decaisne), in Sillet et in hort. b. Calc. et Sillet (Wall!). Strobilanthes scaber var.  $\beta$  N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 84. Ruellia scabra Wall. cat. n. 2393 a, b. Strobilanthes aspera Decaisne! h. Tim. in nouv. ann. du mus. 3 p. 385,

- herb. Benth. ex herb. paris. Corolla 6 lin. longa. Rudimentum staminis quinti brevissimum adest (Decaisne). Capsula 6-perma (ex eod.) (v. in h. Wall. et paris.)
16. *R. STRIGOSA*, caule herbaceo erecto strigoso, foliis ovalibus utrinque attenuatis acumine obtuso basi passim inæqualibus magisque attenuatis obiter repando-crenatis concoloribus, supra confertissime lineolatis subtus scabris, spicis terminalibus 1-3-ovalibus brevipedunculatis tetragonis fructiferis squarrosois, bracteis oblongis acutiusculis basi attenuatis foliaceis hirsuto-ciliatis, bracteolis nullis.  $\mathcal{L}$  In Philippinis (Cuming! n. 588 in herb. Benth. et Hook.). Ruellia bicolor accedere videtur, sed folia vix subtus purpurea, sed potius (in sicco specimine) utrinque pallida et opaca. Corolla semi-pollicaris, incurva. Capsula 8-10-sperma. (v. in h. Benth. et Hook.)
17. *R. CUMINGIANA*, caule herbaceo erecto glabro, foliis ovalibus utrinque acuminatis acumine obtuso basi attenuatis æqualibus obiter repando-crenatis supra confertissime lineolatis subtus pallidioribus utrinque glabris, spicis axillaribus terminaliæ oblongis brevipedunculatis tetragonis, fructiferis subsquarrosois, bracteis ovalibus obtusissimis sessilibus submembranaceis glabris ciliatis, bracteolis nullis.  $\mathcal{L}$  In insulis Philippinis (Cuming! n. 1310 in herb. gen. berol. et Hook.). Similis *R. strigosa*, sed differt imprimis bracteis majoribus obtusissimis neque basi attenuatis sed sessilibus et in angulos acutissimos racheos veluti decurrentibus. Rhachis et calycis laciniae pubescentes. Corolla vix bracteis longior. Capsula 8-sperma. (v. in h. gen. berol. et Hook.)
18. *R. BICOLOR* (Blum. bijdr. p. 795), caule herbaceo adscendente, foliis ovato-oblongis acuminatis basi interdum obliquis integrerrimis discoloribus (subtus purpureis) subtus scabris, spicis axillaribus terminalibusque tetragonis, bracteis oblongo-lanceolatis acutis foliaceis ciliatis.  $\mathcal{L}$  In silvis montanis Javae, Maio-Augusto (Blume). Affinis *R. elongata* Blume l. c.
19. *R. HIRSUTA*, foliis oblongo-lanceolatis oblongis inferioribusve ovalibus utrinque attenuatis obtusis plus minus repando-crenatis in petiolum brevem decurrentibus supra undique subtus præsertim ad costas pubescentiæ brevi scabriæ etate glabrescentibus, caule decumbente adscendente apice subtiliter pubescente vel subhirsuto, spicis in ramis elongatis geniculatis terminalibus 1-3 brevipedunculatis, bracteis ovalibus obtusis hirsutis, bracteolis linearibus.  $\mathcal{L}$  Tykandee in insulâ Java, Decembri (Blume herb. DC.), insulâ Timor (herb. DC.! ex herb. mus. paris. n. 537). Justicia hirsuta Vahl symb. 2 p. 3, eu. 1 p. 122. Nelsonia hirsuta Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 419. Justicia prunelloides Lam. ill. gen. 1 p. 40, Vahl herb.! (var. spicis brevioribus circiter pollicaribus). Foliis minoribus minus pubescentibus, pubescentiâ caulis et foliorum brevissima, tum spicis tantum terminalibus in ramis elongatis, qui, ubi folia defluxerunt, pedunculos elongatos singunt, a R. Blumeana recedit. (v. in h. DC.)
- $\beta$ . *latifolia*, foliis inferioribus ovalibus, reliquis, exceptis supremis, oblongo-ovalibus hisque glabris subtus in costis hirtulis, supremis ut in  $\alpha$ , bracteis late ovalibus, caule inferne glabro setuloso raris erectis consperso, apice hirsuto. — In Java (Labill.! in herb. Moricand.)
20. *R. CONFINIS*, foliis ovali-oblongis oblongis in petiolum attenuatis caueisque basi repente adscendente pubescenti-scabris, spicis in ramis longis geniculatis axillaribus terminalibusque tetragonis, bracteis ovalibus acutis hirsutis, bracteolis linearibus.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali. A *R. hirsuta* differt imprimis bracteis acutis nec obtusis, basi cuneiformi sessilibus, spicam quadrangularem seu acute tetragonam exstrentibus, et foliis latioribus in petiolum latiusculum attenuatis. Folium alterum cujusque paris duplo fere minus. Calycis laciniae et bracteolæ lineares, acutæ, hæ calyce duplo breviores, illæ inæquales, dorsali paulo longiore. Bracteolæ inferiores ad acumen sæpe utrinque unidentatæ. An hujus loci Ruellia Pavala Roxb. fl. ind. or. 3 p. 47?
- $\alpha$ . foliis acutis undulato-crenulatis, spicis longioribus.  $\mathcal{L}$  In ins. Butu

Cawanes insulæ Pulo Pinang ex opposito sita (herb. DC.! ex herb. Delessert n. 258). R. venosa Blum. bijdr. p. 795? (v. in h. DC.)

$\beta$ . foliis obtusis, spicis brevioribus, caule magis pubescente. — Malacca (Cuming! n. 2354 in herb. Benth., Hook. et in herb: gen. berol.; Griffith in h. Hook. (v. in h. Benth. et Hook.)

21. R. GRIFFITHIANA, foliis lanceolatis repando-dentatis obtusiusculis in petiolum brevem attenuatis glabris margine scabris, caulinibus e rhizomate crasso nodoso erectis apice hirtis, spicis in ramis longiusculis geniculatis terminalibus solitariis brevipedunculatis ovatis, bracteis oblongis acutiusculis hirsutis, infinis longioribus lanceolatis involucrantibus, bracteolis linearibus calyce brevioribus, corollâ bracteas vix superante.  $\mathcal{L}$  Mergui (Griffith! in herb. Hook.). Similis R. hirsuta et confini, differt foliis angustioribus, floribus minoribus (3-3  $\frac{1}{2}$  lin. longis), spicis magis hirsutis, caule stricte erecto (apice trifido), gracili. Capsula 8-sperma. (v. in h. Hook.)
22. R. DISCOLOR, foliis oblongis obtusis repando-obtuse dentatis basi cuneatâ in petiolum brevem decurrentibus, juvenilibus subtus incano-pubescentibus discoloribus, caule erecto trichotomo ramis  $\infty$  geminis inferne glabro, spicis axillaribus terminaliue brevipedunculatis, bracteis ovali-oblongis acutiusculis villoso-incanis, infimis majoribus involucralibus, bracteolis linearibus calyce brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Javâ (Moritzi in Zolling. pl. Jav. p. 47 n. 730, herb. DC.! n. 826). R. uliginosa herb. vet. absque loco natali in herb. Nees. R. alternata Burm. fl. ind. p. 135. Prunella Molucca silvestris alba var. foliis subtus albis Rumph. Amb. 5 p. 31. t. 13. f. 2. Affinis esse videtur R. venosa Bl. Folia teneriora supra sparsim lineolata, vetustiora fere punctato-aspera. (v. in h. DC.)
23. R. SUMATRENSIS (Roth nov. pl. sp. p. 311), setis articulatis aspera, caule repente adscendente simplici, foliis ovali-lanceolatis subintegerrimi petiolatis, floralibus retusis submarginatis, floralibus terminalibus fasciculatis sessilibus, bracteis ovali-lanceolatis serrulatis imbricatis.  $\mathcal{L}$  In Sumatra (herb. Heyn!). Folia obsoleta denticulata, saturate viridia, margine setulis crebrioribus subalbida, subtus pallidiora; inferiora  $\frac{1}{2}$  superiora 1 poll. longa; floralia 4, oblonga, submarginata. Petioli semiunciales. Fasciculus 3-4-florus. Bracteæ imbricatae, subpetiolatae, setosæ. Calyx profunde 5-partitus, setosus, lacinia unâ dinidio fere breviore (Roth l. c.). R. discolori affinis videtur. (v. in h. Wallich.)
24. R. TRICHOTOMA, foliis lanceolatis obtusis in petiolum attenuatis repando-subcrenatis in costis marginibusque scabris, caule erecto trichotomo scabriusculo, spicis terminalibus brevipedunculatis, bracteis patulis lanceolato-oblongis obtusis scabris, bracteolis linearibus, calycibus quadripartitis (!) lacinias linearibus obtusis, superiori latiori bifida.  $\mathcal{L}$  In ins. Java (Zollinger! pl. Jav. n. 1838 in herb. DC.). Dipteracanthus lanceolatus Moritzi in Zoll. pl. Jav. p. 47. Species dubia, qua forte proprii generis. Caulis et rami trichotomi fastigiati lateribus oppositis alternatim strigosis. Folia 1½-1¾ poll. longa, 4-4½ lin. lata, crenis seu denticulis rarissimis, subinde nullis. Spicas ob bracteas foliis similes transeuntes et ad speciem sessiles. Calyx bracteolarum longitudine at minus scaber, in floralibus a me examinatis cunctis quadripartitus, lacinia suprema evidenter et binis conflatâ plus minus bifida interdum tantum emarginata. Corolla  $\frac{1}{2}$  poll. longa, lacinias ovatis obtusis, tribus inferioribus basi albo-hirsutis mediâque earum paulo angustiore. Stamina per paria basi connata, longiora fauces æquantes; anteriores oblongæ, loculis basi acutis altero paulo demissiore. Ovarium et stylus basi pubescentia; stigma subulatum, recurvum, supra scabrum, basi sursum denticulo instructum. Fructus deficit. An potius Strobilanthes? Ob similitudinem quamdam R. hirsuta hue retuli. (v. in h. DC.)
25. R. BLUMEANA, foliis oblongis apice attenuatis obtusiusculis repando-crenatis repandisive basi acutâ in petiolum brevem desinentibus subtus magis

hirsutis, caule repente subinde adscendente patente-hirsuto, spicis axillaribus terminalibusque, pedunculo folio breviore, bracteis oblongis utrinque at tenuatis hirsutis, bracteolis linearibus.  $\mathcal{L}$  Tyiangassa in insula Javā (Blume!) in eadēm insula (Zollinger! pl. Jav. n. 343 in herb. DC.). R. repanda Bl. bijdr. p. 794 (nec Linn.). Prunella Molucca silvestris alba Rumph. amb. 5 p. 31 deser., nam figura t. 13 f. 2 ad var. foliis subtus albo-sericeis, quæ R. discolor nob. facta esse videtur. Similis R. De-caisniana, sed differt foliis haud tuberculatis, tenuius crenatis, hirsutie omnium partium eximia, et bracteis paulo latioribus basin et apicem versus magis attenuatis. (v. in h. DC. et Junghuhn.)

$\beta$ . caule magis totoque tractu repente. In Ins. Java (Zollinger! pl. Jav. n. 66 et 660 in herb. DC., tum in herb. Benth!). R. repanda Moritzi in Zoll. pl. Jav. p. 47. Variat præcerea foliis integrerrimis et leniter tantum repaudis. (v. in h. DC.)

26. R. DECAISNIANA, foliis ovatis oblongisve obtusis repando-crenatis basi attenuatis petiolatis supra lineolatis tuberculato-asperis subtus spicisque hirsutis, caule procumbente suffranticoso glabriuscule, spicis axillaribus terminalibusque brevipedunculatis oblongis, bracteis oblongis obtusissimis, bracteolis linearibus.  $\delta$  In Indiâ orientali. Bracteæ plerumque flavo-hirsutæ, subglandulosæ. Corolla tubus angustus, limbus brevis irregularis. Capsula generis, 8-sperma. Caulis glaber, vel pubescenti-scaber. Pedunculi foliis breviores.

$\alpha$ . foliis oblongis.  $\mathcal{L}$  In montosis ad rivulos insulæ Javæ (Blume, Junghuhn!), in insula Timor (Gaudichaud! in herb. DC.). Strobilanthes hirsuta Sessnae herb. timor. in nouv. ann. du mus. 3 p. 386 (excl. synon.). Spanoghe in Linnaea. 15. p. 328. R. scabra Gaudichaud! in herb. DC. n. 338. (v. in h. DC. et Junghuhn.)

$\beta$ . foliis latioribus ovatis. In insula Timor (Gaudichaud! in herb. DC.), Bazaar Gedée et in silvis montis Brambanan insulæ Jayæ (Junghuhn!) (v. in h. DC. et Junghuhn.)

27. R. RHYTIPHYLLA, foliis oblongis in acumen mediocre obtusiusculum attenuatis in petiolum brevem acute desinentibus rigidis glabris supra lineolis elevatis intricatis rugoso-asperis subtus glancescentibus, inferioribus repando-sinuatovc-crenatis superioribus subintegerimis, caule procumbente geniculato glabro asperulo, spicis terminalibus ternis pluribusve congestis brevibus brevipedunculatis ovatis hirsutis, bracteis ovato-oblongis acutis hirsutis ciliatisque, bracteolis calyce brevioribus calycisque laciniis lanceolato-linearibus acutis villosis subglandulosis, filamentis apicē lanatis.  $\mathcal{L}$  In insulis Philippinis (Cuming! n. 1016 in herb. Hook. Benth. et gen. berol.). Accedit ad R. De-caisnianam, sed differt rugositate singulari foliorum aliisque characteribus. Corolla anguste infundibuliformis, incurva, tubo faucibus oblongis intus hirsutis breviore, limbo brevi laciniis rotundatis subinæqualibus. Antheræ angustæ loculis arcte contiguis. Capsula angusta, octosperma. (v. in h. Benth. etc.)

28. R. INVOLUCRATA (Vahl symb. 3 p. 83 et herb.!), foliis lanceolatis utrinque attenuatis acumine obtusiusculo brevissime petiolatis integrerrimis cauleque fruticoso erecto trichotomo glabris, spicis terminalibus capituliformibus brevissime pedunculatis hirsutis, foliis quaternis parvis ovatis sessilibus minus hirsutis involucratis, bracteis imbricatis ovatis apice attenuatis calycem æquantibus, bracteolis linearibus obtusis calyce brevioribus.  $\delta$  In Indiâ orientali (Koenig! in herb. Vahl). — Willd. sp. pl. 3 p. 370. Quod ad habitum in universum simillima Gendarussæ vulgari. Folia 6-8 poll. longa, 1- $\frac{1}{2}$  poll. lata, nitida, supra grosse lineolata. Spicæ in caule ramisque terminales, ratione plantæ parvæ (Avellanæ nucis magnitudine), globosæ. Bracteæ et bracteole valde hirsute et ciliatae. Corolla fance hirsuta. Antheræ basi subsagittatae. Stigma basi dente distincto sursum adspicente præditum. Ovarium pluriovulatum. (v. in h. Vahl !)

29. R. LUZONA (N. ab in E. in pl. Hænk.), caule fruticoso, foliis inæqualibus ex oblongo et obovato cuneatis grosse serratis glabris, spicâ terminali villosâ imbricatâ, bracteis ellipticis acutis subserratis. § In insula Luzonâ (Hænke). Rami a projecturis asperis tetragonoi, nodosi, incurvi, glabri, juniores inter projecturas strigosi et èlinci fimbriâ geniculari. Folia opposita, valde inæqualia, alterum a  $2\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  poll. longum, oblongum vel ex obovato cuneatum, alterum ab  $1\frac{1}{6}$  poll. longum, ex obovato cuneiforme, cæterum utrinque coriaceum, nitidum, acutiusculum (suprema obtusa et subtruncata), apicem versus grossa obtuse serratum, in petiolum brevem crassum rugulosum supra canaliculatum angustatum, supra grosse lineolatum undecupulinerve. Bracteæ oppositæ, subæquales, ellipticæ, acutæ, membranaceæ, venoso-penninerviæ, sessiles, villosulæ, semipollucares, persistentes. Altera oppositarum paulo latior et versus apicem subserrata, altera integerrima. Bracteolæ et calycis ad basin quinquepartiti laciniaæ æquales et subconformes, villosæ, acuminatæ, uninerves, membranaceæ; illæ linear-lanceolatae, ha lineares. Corolla deest. Capsula 3 lin. longa, columnari-tetragona, compressula, pubescens, pallida fusca, a basi octosperma. (v. in h. Hænk.)

30. R. DECIPiens (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 83), caule fruticoso tetragono foliisque ovali-oblongis utrinque acuminatis repandis subtus asperis, spicis terminalibus compositis elongatis, bracteis imbricatis ovalibus mucronatis ciliatis deciduis. § Ad Sarzagona ins. Luzon (Hænke). Est planta primo adspctu Justicieæ Ecbolio aut Gendarussæ ventricosæ var.  $\alpha$  fragili similis. Caulis flexuosus, breviarticulatus, projecturis scabris punctulatis exasperatus, supra genicula corrugatus. Folia 4-7 poll. longa  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  poll. lata, glabra, supra leviter subtus fortius punctato-exasperata et lineolata; inferiora magis ovata, suprema basi ounearia. Bracteæ 5 lin. longæ, ovali-oblongæ, aoutiusculæ vel mucronatæ, asporulæ et subvillosæ, ciliatæ, sessiles, integerrimæ. Calyx  $1\frac{1}{2}$  lin. longus, paulo ultra medium divisus, pubescenti-scaber, laciniaæ æquilibus apice barbatis. Corollæ alabastrum, extus tomentosum, intus a tergo et ad basin staminum hirsutum, limbo contorte quinquefido æquali. (v. in h. Hænk.)

### § 2. *Laxæ. Flores axillares vel inflorescentiæ laxiori vel subverticillari, bracteæ angustæ.*

31. R. AUSTRALIS (R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 479, opp. ed. N. ab. E. 3 p. 335), caule subdiffuso erecto foliisque lanceolatis ovalibusve calycibusque hirsutis, floribus axillaribus sessilibus solitariis ternisve, bracteolis linearibus calyceum æquantibus. (I) Ad Port Jackson et in oris Novæ Hollandiæ intra tropicum (Rob. Brown, et ex specimin. hort. soc. horticul. Londin. in herb. Benth.). Folia repando-denticulata integrave. Corolla 4 lin. longa, intus præsertim inferne ad fauces hirsuta. Filamenta brevia, per paria basi connata, hirsuta. Capsula tenera, 6-8-sperma. Quod ad habitum refert Dipteracanthum parviflorum. (v. in h. Benth. etc.)

32. R. HYGROPHILA (Mart.! herb. fl. bras. n. 580), subacaulis, foliis oblongis obtusis in petiolum attenuatis supra undique subtus ad costas hirsutis, scapis apice cymoso-bifidis paucifloris glanduloso-hirtis folia subæquantibus, bracteolis nullis, calycis laciniaæ linear-setacea hirsutis, corollâ infundibuliformi, tubo fauces subæquante. (U) Ad Cujaba in Brasiliâ (Manso in herb. Mart.). — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 56. Planta humilis habitu Hieracii cujusdam scapigeri. Radix fibrosa fibris longis validis. Folia cæspitosa, 2-3 poll. longa;  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{4}$  poll. lata, basi cuneatim in petiolum attenuata, subintegerrima. Scapi graciles, foliis majoribus per sese breviores, sed cyma additâ subinde iis longiores, alii duplo breviores, cuncti inferius pubescentes, in ramis pilosi, immixtis pilis raris glanduliferis. Cyma bifida interjecto flore brevipedicellato; rami inæquales, bifidi, vel alter etiam simplex, uniflorus. Bracteæ parvæ, lincari-subulatae sub bifurcationibus. Bracteolæ nulla. Corolla a basi tibi ad limbi apicem 14 lin. longa, pubescens. Echinacanthis accedit

hæc species, differt autem antheris muticis, stigmate et probabiliter fructu.  
( v. in h. Mart. )

33. R. ALBA ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 55 ), foliis ovali-oblongis repando-subcrenatis in petiolum longum attenuatis subtus caule quo ramoso geniculato pubescenti-canis, spicæ terminali simplici interruptâ pubescenti-glandulosâ, floribus in pedunculis brevissimis oppositis ternis, bracteis bracteolisque subulatis calyce multo brevioribus, calycis lacinia linearibus æqualibus dense pubescenti-glandulosis, corollâ infundibuliformi, tubo faucibus hinc ventricosis duplo longiore subregulari.  $\mathcal{L}$  Bejar ( herb. DC. ! et herb. Moricand ! utroque loco addito n. 1586 (1) ). Caulis ramosissimus quadrangularis. Folia obtusa vel acutiuscula, supra parum puberula. Spica pedunculata, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, ex fasciculorum triflororum paribus 2-4 parum distantibus constans. Bractæ 2 lin. longæ. Bracteolæ ( florum laterali ) exiguae. Calyx 8 lin. longus. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, alba, tubo pollicari. Antheræ oblongæ. Stigma bilabiatum, revolutum. Ovula 8, a basi ovarii disposita. ( v. in h. DC. et Moricand. )
34. R. TETRAGONA ( Link en. hort. berol. 2 p. 133 ), foliis ovatis repando-crenatis acuminatis acumine saepe acuto caule quo erecto tetragono hirsutis, petiolis angustis, spicis interruptis paucifloris glanduloso-hirsutissimis et foliorum superiorum angulis in spicam terminalem compositam abeuntibus, bracteis lanceolatis, bracteolis linearibus calyce brevioribus, calycis lacinia æqualibus setaceo-acuminatis, corollâ subbilabiata, faucibus campanulato-ventricosis.  $\mathcal{L}$  Lagoa de Aldea prope Cap Frio et Cruz de Cosmo prov. Bahiensis in paludibus, Julio ( Luschnath ! in herb. Mart. et acad. petrop. n. 232 ), Bahia ad Cruz de Cavona, Julio ( Luschnath ! pl. bras. l. c. ) — Spr. syst. 2 p. 825, herb. Mart. ! n. 458, N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 55. R. Neesiana Klotzsch ! in herb. Luschnath n. 232. R. Crucis Steud. nomenc. ed. 2 p. 481. Bractæ obtusiusculæ, lanceolatæ, basi attenuatæ, inferiores calycc saepe longiores, superiores calycem florentem æquantes. Bracteolæ calyce breviores, lineares aut lanceolato-lineares. Corolla 4 lin. longa, infundibuliformis, faucibus campanulato-ventricosis deorsum magis ventricosis, glabra, limbo subbilabiato, labio superiori bilobo paulo breviori, inferiori trilobo lobis ovatis obtusis, medio in facie superiori barbato. Capsula 5-6 lin. longa, a basi 8-sperma. ( v. v. cult. et sicc. sp. in h. Mart., Petrop. etc. )
35. R. OCHROLEUCA Mart. ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 56 ), foliis ovatis repando-crenatis acumine obtuso caule quo stricto tetragono hirsutis, petiolis angustis, spicis corymbosis interruptis, floribus fasciculatis subverticillatis, bracteis brevibus oblongis, bracteolis lanceolatis calyce brevioribus calycisque lacinia setaceo-acuminatis æqualibus hirsutis, corolla subbilabiata, faucibus campanulato-ventricosis.  $\mathcal{L}$  In silvaticis umbrosis, suburbanis uidis Soteropolos prov. Bahiensis vulgaris, Decembri ( Martius ! ), Pernambuco, Bahia ( Gardner ! n. 900 in herb. pal. vindob. etc. Lhotzky ! in herb. DC. ), Moritiba in prov. Bahiensi ( Blanchet ! pl. bras. et sicc. n. 235, 1725 et 2017, in herb. Moricand ), Schlow in h. gen. berol. n. 108 et 270. Ruellia flava Salzmann ! Blanchet ! in herb. DC. et Benth. A R. tetragona imprimis differt : foliis obtusis et ramis floriferis ex aliis foliorum provenientibus longis strictis, inferne bifidis proper folia florali oblonga fasciculos florum parum aut non omnino superantes spicas verticillato-interruptas exhibentibus, tum colore floris ochroleuco ( Mart. in adnot. ! ) Corolla 5 lin. longa, glabriuscula. R. tetragona similis. Capsula subsexangularis, 4 $\frac{1}{2}$  lin. longa, pallide fusca, a basi fere usque ad medium octosperma. ( v. in h. DC., vindob., berol. Moricand, etc. )
36. R. OBTUSA, foliis ovatis repando-crenatis obtusissimis basi subtruncatis utrinque hirsutis, petiolis brevibus angustis, caule profunde quadrangulari inferne glabro, spicis corymbosis interruptis, floribus fasciculatis subver-

(1) Ex patriâ Mexicanâ numerus videtur Berlandieri. ( Alph. DC. )

ticillatis, bracteis brevibus lanceolatis, bracteolis subulatis calyce duplo brevioribus calycisque laciniis setaceis æquibus hirsutis, corollâ subregulari faucibus obovatis.  $\mathcal{L}$  In Novâ Granadâ, Carthagena, Septembri (Goudot! in herb. Hook.). R. clandestina herb. Hook.! Caulis bipedalis, apicem versus laxe hirsutus. Folia cum petiolo 6 lin. longo 4 poll. longa et 3 fere poll. lata, apice rotundata. Spicæ tres. Corolla  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, lutea. Capsula 18-20-sperma. (v. in h. Hook.)

*Species incertæ sedis et parum cognitæ.*

\* *Asiaticæ.*

37. R. JAPONICA (Thunb. fl. jap. p. 254), foliis ellipticis, floribus spicatis, bracteis oblongis obtusis.  $\mathcal{L}$  In Japaniâ (Thunberg). Caulis herbaceus, tetragonous, erectus. Folia subpetiolata, obtusiuscula, integrerrima, glabra, unguicularia. Spicæ florum plures, terminales, alternae, glabræ, digitales. Bracteæ imbricato-patulæ, longitudine tubi corollæ. Corolla campanulata, limbo æquali, lutea.
38. R. OBLIQUA (Pers. synops. 2 p. 177), foliis ovatis basi obliquis crenato-dentatis scabris petiolatis strobilisque pubescentibus.  $\mathcal{L}$  In insulâ Java. R. scabra herb. Juss.
39. R. CHENOPODIFOLIA (Poir.), caule erecto, foliis petiolatis ovatis integrerrimis pubescentibus, floribus verticillatis.  $\mathcal{L}$ ? India orientalis, Guadalupa? Adenosma chenopodifolia Spr. syst. 2 p. 829. Videtur species Hygrophilæ.
40. R. DIGITALIS Koen. (Spr. syst. 2 p. 825), caule erecto herbaceo foliisque ovatis acuminatis integrerrimis longe petiolatis glabris, spicæ terminali laxâ, foliis alternis remotis erubracteatis, corollâ ventricosâ. — In Indiâ orientali. (Koenig apud Spr. l. c.)
41. R. REPENS (Blanco fl. philipp. p. 493), foliis lanceolatis integrerrimis glabris supra confertim lineolatis brevissime petiolatis, spicis terminalibus fasciculatis, floribus distantibus oppositis, bracteolis angustis lanceolatis, calyce profunde quinquefido, laciniis angustis attenuatis, corollâ campanulata, staminibus quatuor basi corollæ insertis, filamentis brevissimis, antheris grossis, stigmate simplici, capsulâ angustâ longitudine calycis hexaspermâ, seminibus compressis. — Cabu Philippinarum. Siccata nigrescunt.
42. R. FLAVA (Roxb. fl. ind. 3 p. 43), fruticosa, glabra, foliis petiolatis oblongis ventricosis basi valde attenuatis subintegerrimis, spicis terminalibus, corolla anguste campanulata subæquali.  $\delta$  Rangoon in Pegu (Carey). Corollæ limbus obliquus, laciniæ rotundatis. Stamina basi per paria conjuncta. Filamenta longiora, extrorsum valde barbata (Roxb.)
43. R. GLANDULOSA (Roth nov. pl. sp. p. 312), vallis brevissimis pubescens, foliis ovali-lanceolatis obsolete serratis petiolatis, racemis axillaribus brevibus subsecundis, bracteis minutis linearis-subulatis patulis cum calycibus subulatis glanduloso-villosis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali (Heyne). R. glabra Heyne. Pedunculus communis vix petiolo longior. Corolla calyce vix longior (Roth).
44. R. FLAGELLIFORMIS (Roxb. fl. ind. 3 p. 47), herbacea, ramis diffusis, foliis radicalibus oblongis obtusis petiolatis, caulinis distantibus subtrotundis subsessilibus, floribus axillaribus glomeratis sessilibus, capsulâ linearis polyspermâ.  $\mathcal{L}$  In Moluccis (Roxb. l. c.).
45. R. SPICATA (Roth nov. pl. sp. p. 310), foliis ovatis acuminatis serratis petiolatis supra setis adpressis scabris, spicis axillaribus et terminalibus subpanniculatis oblongis pedunculatis paucifloris, floribus cum bracteis sessilibus oppositis. — In Indiâ orientali (Heyne). Glabra, solis geniculis caulis et foliis in paginâ superiore setulosis. Folia 3 poll. longa, 2 poll. lata, subtus pallidiora. Spicæ  $1\frac{1}{2}$  poll. longæ, laxæ, 6-8-floræ. Bracteæ lanceolatae, trinerviae, calyce paulo breviores. Corollæ subcampanulatae tubus calyce brevior, laciniæ limbi ovatae, acuminatae. (Roth. l. c.). — An idem ac Endopogon hypoleucus var.  $\beta$ ?

\*\* *Africana.*

46. *R. HUMIFUSA* Juss. (Pers. synops. 2 p. 177), geniculis radicantibus, foliis oppositis ovatis crenatis, floribus terminalibus. — In umbrosis et silvaticis insularum Praslin (Commerçon in herb. Juss.)

\*\*\* *Nova Hollandiae.*

47. *R. ACAULIS* (R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 479, opp. ed. N. ab E. 3 p. 335), caule abbreviato, foliis cuneato-oblongis obtusis, pedunculis axillaribus unifloris capsula aliquoties longioribus, calycibusque glabriusculis ebracteatis.  $\mathcal{L}$  In littore Novæ Hollandiæ intra tropicum (Banks). — An Cryphiacanthi species?

\*\*\*\* *Patria ignota.*

48. *R. ACHYRANTHIFOLIA* (Desf. cat. hort. paris. ed. 3 p. 391), foliis ovato-ellipticis obtusis integris, floribus axillaribus subsessilibus, lacinia calycinis subulatis corollam æquantibus. — Canis herbaceus, subpedalis, tetragonus, ramosus. Folia glabra, lin. 7-12 longa, 5-10 lata, petiolata. Flores axillares subsessiles. Calyx quinquefidus, lacinia subulata, corollam adæquantes. Corolla parva albo-violacea, bilabiata. — Propter corollam bilabiatam Hygrophilis insonerenda esse videtur haec species.

*Species non nisi nomine nobis notæ.*

*R. CAROLINENSIS* Steud. nom. ed. 2 p. 481, = Patersonia Carolinensis Walt.

*R. FORMOSA* Ledeb. apud Steud.

*R. GRAVEOLENS* Hoffmannsegg Verz. 2 p. 202. (I) Nepal (Steudel nom. ed. 2 p. 481.)

*R. INAPERTA* Spr. Dietr. apud Steud. nom. ed. 2 p. 481.

*R. NOVA*? Colla hort. ripul. append. 2 p. 356 (sine descr.) ex hort. vindob. 5. Forsan R. discolor ex Lecchi in lit. ad Colla.

*R. NUBICA* Caill. Delile Egypt.

*R. OBOVATA* Blum. apud Steud. nom. ed. 2 p. 482. — Java.

*R. SEMITETRANDRA* Jacq. (ex Sweet) 5. Steud. nom. ed. 2 p. 483. "

*R. TETRAGONA* Blum. hort. buitenz. p. 85. = *R. Blumei* Steud. nom. p. 480

*R. THOMANA* Spreng. apud Steud. l. c. p. 483.

*Species alienæ.*

*R. REPENS* et *R. ERECTA* Burm. fl. ind. t. 41 f. 2 et 3 (icones certo, nescio autem characteres). — *R. neglecta* Steud. Due illæ figuræ eamdem speciem foliis paulo angustioribus paulo latioribus sistere videntur.

*Species exclusæ.*

*R. ACICULATA* Roth. = Haplanthus tentaculatus.

*R. ACUTANGULA* Mart. fl. bras. = Arrhostoxylum acutangulum.

*R. ADHÆRENS* Forsk. = Forskahlea, an tenacissima?

*R. ALATA* Wall. cat. = Strobilanthes Walliohii.

*R. ALBICAULIS* Bert. = Dipteracanthus Hænkei.

*R. ALOPEOUROIDEA* Vahl = Teliostachya alopeuroidea.

*R. AMPLECTENS* Wall. cat. = Strobilanthes amplexens.

*R. AMYGDALIFOLIA* hort. = Goldfussia anisophylla.

- R. ANAGALLIS Burm. fl. ind. == Bonnaya grandiflora prodr. 10 p. 421.
- R. ANGUSTA Bojer == Rhaphidospora angusta.
- R. ANGUSTIFOLIA Sw. == Blechum angustifolium R. Br.
- R. ANISOPHYLLA Hook. == Goldfussia anisophylla.
- R. ANTIPODA Linn. == Bonnaya veronicæfolia.
- R. ARCUATA Wall. cat. == Stenosiphonium Russellianum.
- R. ARGENTEA Wall. == Strobilanthes Sabinianus.
- R. ARISTATA Vahl == Lepidagathis aristata.
- R. AROMATICA Roxb. == Dipteracanthus patulus.
- R. ATROPURPUREA Wall. cat. == Strobilanthes atropurpureus.
- R. ATROVIRIDIS Wall. == Verbenacearum species.
- R. ATTENUATA Wall. cat. == Ecbinacanthus attenuatus.
- R. ATTENUATA Wall. cat. == Strobilanthes attenuatus.
- R. AURICULATA Wall. cat. == Strobilanthes auriculatus.
- R. AURICULATA Wall. cat. n. 2341 (bis) == Asystasia Næsiana.
- R. AUSTRALIS Cav. == Dipteracanthus Pumilio.
- R. AUSTRALIS R. Br. == Gryphiacanthus australis.
- R. AXILLARIS Steud. == Ebermaja axillaris (1).
- R. BALSAMEA Linn. == Adenosma balsamea.
- R. BALSAMICA Vabl == Adenosma balsamea.
- R. BARBATA Sieb. == Gonzalagunea Coccocypsilum.
- R. BARBATA Vabl == Hygropila quadrivalvis.
- R. BARBATA Wall. cat. == Strobilanthes barbatus.
- R. BARLERIOIDES Roth et Wall. cat. == Petalidium barlerioides.
- R. BICEPS Steud. == Goldfussia biiceps.
- R. BICOLOR Ruiz == Dipteracanthus geminiflorus.
- R. BIFLORA Bosc == Calophanes humistratus.
- R. BIFLORA Linn. == Calophanes oblongifolius.
- R. BIFLORA herb. Willd. == Calophanes humistratus.
- R. BILABIATA Reinw == Sautiera Decaisnii.
- R. BLECHIODES Juss. Sw. == Blechum laxiflorum Juss.
- R. BLECHUM Linn. == Blechum Linnæi.
- R. BLECHUM Sw. == Blechum Brownei.
- R. BRACTEATA R. Br. == Dipteracanthus ? bracteatus.
- R. BRACTEATA Roxb. == Petalidium barlerioides.
- R. BRACTEATA herb. Vahl == Blechum Brownei.
- R. BRACTEATA Wall. cat. == Goldfussia bracteata.
- R. BRACTEATA herb. Willd. == Hygrophila quadrivalvis.
- R. BRASILIENSIS hort. == Dipteracanthus Sohauerianus.
- R. BRASILIENSIS Spr. == Hygrophila Portoricensis ?
- R. BRUNONIANA Wall. cat. == Strobilanthes Brunonianus.
- R. CALLOSA Wall. cat. == Strobilanthes callosus.
- R. CALYCINA Wall. cat. == Asystasia calycina.
- R. CANDIDA fl. per. == Dipteracanthus grandiflorus.

(1) Ruellia « axillaris » Wall. cat. n. 2414 errore calami loco Ruellia « comosa » legitur.

- R. CAPITATA Don. = *Goldfussia pentstemonoides*.  
 R. CAPITATA Wall. cat. = *Goldfussia capitata*.  
 R. CAYENNENSIS Spr. plane est delenda.  
 R. CEPHALOTES Wall. cat. = *Goldfussia pentstemonoides*.  
 R. CERNUA herb. Heyn. (bis) = *Adenosma Thymus*.  
 R. CERNUA herb. Madr. = *Dyschoriste cernua*.  
 R. CERNUA Roxb. = *Adenosma Thymus*.  
 R. CERNUA Heyn. Wall. cat. = *Dyschoriste depressa*.  
 R. CHELONOIDES Wall. cat. = *Asystasia chelonoides*.  
 R. CILIARIS Hamilt. = *Hygrophila ciliaris*.  
 R. CILIARIS Linn. = *Acanthodium spicatum*.  
 R. CILIARIS Pers. = *Fabria pilosa*.  
 R. CILIATA Hornem. = *Dipteracanthus ciliatus*.  
 R. CILIATA herb. Madr. = *Nelsonia tomentosa*.  
 R. CILIATA Ruiz = *Calophanes ciliatus*.  
 R. CILIATA Wall. cat. = *Strobilanthes ciliatus*.  
 R. CILIATA Wall. suppl. in sched. = *Barleria ciliata*.  
 R. CILIATIFLORA bot. mag. = *Scorodoxylum ciliatiforme*.  
 R. CILIOSA Lecomte = *Dipteracanthus Mitchillianus*.  
 R. CILIOSA Pursh = *Dipteracanthus ciliosus*.  
 R. CIRSIOIDES N. ab E. = *Crabbia cirsoides*.  
 R. CLANDESTINA Linn. = *Cryphiacanthus clandestinus*.  
 R. COCCINEA Vahl = *Arrhostoxylum coccineum*.  
 R. COLLINA Wall. cat. = *Strobilanthes collinus*.  
 R. COLORATA Velloz. = *Lagochilum montanum*.  
 R. COLORATA Wall. cat. = *Goldfussia colorata*.  
 R. COMMUTATA Steud. = *Dyschoriste cernua*.  
 R. COMOSA Velloz. = *Aphelandra squarrosa*.  
 R. COMOSA Roxb. = *Budderæa ulmifolia*.  
 R. COMOSA Wall. cat. = *Ebermaiera axillaris*.  
 R. CONCAVIFOLIA Ort. = *Dipteracanthus patulus*.  
 R. CONTORTA Blanco = *Hypoestes contorta*.  
 R. CORDATA Thunb. = *Fabria pilosa*.  
 R. CORDIFOLIA Vahl = *Stenosiphonium subsericeum*.  
 R. COROMANDELIANA herb. Madr. = *Asystasia Coromandeliana*  $\alpha$ .  
 R. CURVIFLORA N. et M. = *Arrhostoxylum curviflorum*.  
 R. CUSIA Wall. cat. = *Goldfnssia Cusia*.  
 R. CUSPIDATA Wall. cat. = *Lepidagathis cuspidata*.  
 R. DENTICULATA Wall. cat. = *Asystasia denticulata*.  
 R. DEPENDENS Roxb. et Wall. cat. = *Lepidagathis hyalina*  $\beta$  dependens.  
 R. DEPENDENS ANGUSTIFOLIA Wall. cat. = *Lepidagathis semiherbacea*.  
 R. DEPRESSA Thunb. = *Aptosimum depresso* prodr. 10 p. 345.  
 R. DEPRESSA Wall. cat. = *Dyschoriste depressa*.  
 R. DICHOTOMA Bert. = *Dipteracanthus paniculatus*.  
 R. DICHOTOMA Bert. = *Dipteracanthus dichotomus*.  
 R. DIFFUSA Velloz. = *Nelsonia Pohlii*.

- R. DIFFUSA Wall. = *Hemigraphis elegans*.  
 R. DIMIDIATA N. ab E. = *Hygrophila undulata*.  
 R. ? DISTICHA Wall. cat. = *Lepidagathis hyalina*.  
 R. DIVARICATA Hoffmsegg. = *Cryphiacanthus lacteus*.  
 R. DIVARICATA Wall. cat. = *Goldfussia divaricata*.  
 R. DORSIFLORA Retz. = *Ætheilema reniforme*.  
 R. DULCIS Cav. = *Stenandrium dulce*.  
 R. DULCIS Wall. cat. = *Lepidagathis dulcis*.  
 R. DULCISSIMA Steud. = *Lepidagathis dulcis*.  
 R. ECHINATA Wall. cat. = *Strobilanthes echinatus*.  
 R. ELEGANS bot. mag. = *Hemigraphis elegans*.  
 R. ELEGANS Poir. = *Arrhostoxylum formosum*.  
 R. ELONGATA Pal. de Beauv. = *Dipteracanthus elongatus*.  
 R. ERECTA herb. Hamilt. in Wall. cat. = *Hemigraphis latebrosa*.  
 R. ERECTA  $\alpha$  Roth = *Dipteracanthus patulus*.  
 R. ERECTA Roxb. = *Dipteracanthus patulus  $\alpha$  erectus*.  
 R. ERIOSTACHYA Boj. = *Nelsonia canescens*.  
 R. EUCOMA Steud. = *Budderæa ulmifolia*.  
 R. FASCICULATA Roxb. = *Lepidagathis fasciculata*.  
 R. FILIFORMIS Heyn. = *Asystasia Coromandeliana  $\alpha$* .  
 R. FIMBRIATA Wall. cat. = *Strobilanthes fimbriatus*.  
 R. FLAVA Juss. = *Eranthemum flavum*.  
 R. FLEXUOSA Wall. cat. = *Goldfussia flexuosa*.  
 R. FLORIBUNDA Hook. = *Dipteracanthus floribundus*.  
 R. FUTIDA Humb. = *Dipteracanthus rubicaulis*.  
 R. FOLIOSA Swartz = *Dipteracanthus strepens  $\alpha$* .  
 R. FORMOSA Andr. = *Arrhostoxylum formosum*.  
 R. FORMOSA H. et B. = *Aphelandra formosa*.  
 R. FRAGRANS Forst. = *Herpestis species*.  
 R. FULGIDA Andr. = *Arrhostoxylum fulgidum*.  
 R. GAIRE Rohr in herb. Vahl. = *Blechum Brownii*.  
 R. GEMINIFLORA Kunth = *Dipteracanthus geminiflorus*.  
 R. GEMMIPARA N. ab E. in herb. Hænk. = *Ophthalmacanthus gemmiparus*.  
 R. GENICULATA Vellozo. = *Stenandrium mandiocanum*.  
 R. GENICULATA Boj. = *Dyschoriste geniculata*.  
 R. GENICULATA var. Boj. = *Ætheilema rupestre*.  
 R. GIGANTEA Humb. = *Trichanthera gigantea* Kunth.  
 R. GLABRATA hort. = *Dipteracanthus Schauerianus*.  
 R. GLABRATA Wall. cat. = *Strobilanthes glabratus*.  
 R. GLAUCESCENS Wall. cat. = *Strobilanthes glaucescens*.  
 R. GLOMERATA Wall. cat. = *Goldfussia glomerata*.  
 R. GLUTINOSA Roxb. in h. Willd. = *Ætheilema reniforme*.  
 R. GLUTINOSA Wall. cat. = *Strobilanthes glutinosus*.  
 R. GOSSYPINA Wall. cat. = *Echmanthera Wallichii* var.  $\beta$ .  
 R. GRANDIFLORA Pers. = *Dipteracanthus longiflorus*.

- R. GRANDIFLORA Poir. = *Arrhostoxylum grandiflorum*.  
 R. GRANDIFLORA Ruiz herb. = *Dipteracanthus grandiflorus*.  
 R. GRANDIFLORA Salzm. = *Dipteraeanthus affinis*.  
 R. GUTTATA Forsk. = *Dipteracanthus guttatus*.  
 R. HIRSUTA Velliozo. = *Dipteracanthus geminiflorus*.  
 R. HIRSUTA Roxb. = *Hygrophila hirsuta*.  
 R. HIRTA Don = *Goldfussia nutans*.  
 R. HISPIQA herb. DC. = *Cryphiacanthus lacteus*.  
 R. HISPIDA Rich. = *Hygrophila hispida*.  
 R. HISPIDOSA Bojer = *Ætheilema reniforme* β *hispidosum*.  
 R. HOCHSTETTERI Steud. = *Dyschoriste radicans*.  
 R. HOFFMANNSEGGII Steud. = *Cryphiacanthus lactens*.  
 R. HOMONYMA Steud. = *Asystasia Kunthiana*.  
 R. HUMBOLDTIANA Klotsch = *Stemonacanthus Humboldtianus*.  
 R. HUMILIS Pohl = *Dipteracanthus humilis*.  
 R. HUMISTRATA Michx. = *Calophanes humistratus*.  
 R. HYBRIDA Pursh = *Dipteracanthus strepens* var. γ.  
 R. HYSSOPIFOLIA Hochst. = *Calophanes hyssopifolius*.  
 R. IMBRICATA Forsk. = *Ætheilema imbricatum*.  
 R. IMBRICATA herb. Hook. = *Strobilanthes imbricatus*.  
 R. IMBRICATA Roxb. = *Ætheilema reniforme*.  
 R. IMBRICATA Wall. cat. = *Strobilanthes imbricatus*  
 R. IMBRICATA Vahl = *Ætheilema reniforme*.  
 R. INCANA Bl. = *Lepidagathis incana*.  
 R. INFFLATA Rich. = *Arrhostoxylum inflatum*.  
 R. INFUNDIBULIFORMIS Roxb. = *Crossandra infundibuliformis*.  
 R. INTRUSA Forsk. = *Asystasia intrusa*.  
 R. INUNDATA Kunth = *Dipteracanthus Hænkei* β.  
 R. INVOLUCRATA Wall. cat. = *Strobilanthes involucratus*.  
 R. ISOPHYLLA Steud. = *Goldfussia isophylla*.  
 R. JUSSIEUOIDES Schlechtend. = *Arrhostoxylum jussieuoides*.  
 R. JUSTICÆFLORA Hook. = *Hygrophila lacustris*.  
 R. JUSTICIOIDES Wall. cat. suppl. = *Ætheilema reniforme*.  
 R. KUNTHIANA Wall. cat. = *Phlebophyllum Kunthianum*.  
 R. KUNTHIANA Wall. cat. n. 2419 = *Asystasia Kunthiana*.  
 R. LACTEA Cav. = *Cryphiacanthus lacteus*.  
 R. LACUSTRIS Schlechtend. = *Hygrophila lacustris*.  
 R. LAGOPODES Ryan in h. Vahl = *Teliostachya alopecuroides*.  
 R. LAMIIFOLIA Wall. cat. = *Goldfussia lamiifolia*.  
 R. LATEBROSA Roxb. = *Hemigraphis latebrosa*.  
 R. LEPTOSTACHYA Wall. = *Leptostachya Wallichii*.  
 R. LILACINA Hook. = *Dipteracanthus Schauerianus*.  
 R. LITTORALIS Heyn. = *Dyschoriste littoralis*.  
 R. LITURATA hort. = *Dipteracanthus Schauerianus*.  
 R. LONGIFLORA Drumm. = *Dipteracanthus ciliosus* β *hybridus*.  
 R. LONGIFLORA Pal. de Beauv. = *Dipteracanthus elongatus*.

- R. LONGIFLORA Rich. = *Arrhostoxylum longifolium*.  
 R. LONGIFLORA Vall. = *Dipteracanthus longiflorus*.  
 R. LONGIFOLIA h. Madr. = *Hygrophila salicifolia*.  
 R. LONGIFOLIA Roth = *Hygrophila salicifolia*.  
 R. LONGIFOLIA Roxb. = *Asteracantha longifolia*.  
 R. LONGIFOLIA Thunb. = *Strobilanthes cernuus* Bl.  
 R. LUPULINA Hassk. ( nec Wall. ) = *Strohilanties involucratus*.  
 R. LUPULINA Wall. cat. = *Strohilanties lupulinus*.  
 R. MACROCARPA Wall. cat. = *Asystasia macrocarpa*.  
 R. MACROCARPA Wall. cat. = *Strohilanties Sabinianus*.  
 R. MACROPHYLLA Vahl = *Stemonacanthus macrophyllus*.  
 R. MACROPHYLLA h. Willd. = *Arrhostoxylum fulgidum*.  
 R. MACULATA Tafella = *Stenandrium maculatum*.  
 R. MACULATA Wall. = *Strobilanthes maculatus*.  
 R. MADERENSIS hort. = *Dipteracanthus Schauerianus*.  
 R. MADURENSIS h. Vahl = *Dyschoriste littoralis*.  
 R. MAGNIFICA Mart. h. bras. = *Dipteracanthus maeranthus*  $\beta$  *magnificus*.  
 R. MARANHONIS Pohl = *Dipteracanthus viscidulus*.  
 R. MATUTINA Hochst. = *Dipteracanthus patulus*.  
 R. METHIA Wall. cat. = *Dipteracanthus dejectus*.  
 R. MICROPHYLLA Cav. = *Calophanes microphyllus*.  
 R. MICROPHYLLA h. Vahl = *Dyschoriste littoralis*.  
 R. MOLLISSIMA Klein = *Hygrophila incana*.  
 R. MOLLISSIMA Vahl = *Hypoestes mollissima*.  
 R. MONADELPHA Wall. cat. = *Strohilanties monadelphus*.  
 R. MONTANA ? Wall. cat. = *Peristrophe montana*  $\beta$ .  
 R. MONTANA Wall. cat. = *Barleria montana*.  
 R. MORITZIANA Klotzsch = *Dipteracanthus geminiflorus* var.  $\epsilon$ .  
 R. MUCRONATA Wall. cat. ( ex parte ). = *Lepidagathis ustulata*.  
 R. MUCRONATA Wall. cat. = *Lepidagathis mucronata*.  
 R. MUCRONATA Wall. cat. ( ex parte ). = *Lepidagathis purpuricaulis*.  
 R. MULTICAULIS Hochst. = *Dipteracanthus dejectus*.  
 R. MYSORENSIS Roth = *Strobilanthes Mysorensis*.  
 R. NAGCHANA Wall. cat. = *Calophanes Nagchana*.  
 R. NANA N. ah E. = *Crabbea nana*.  
 R. NANA E. M. = *Craheea cirsoides*.  
 R. NEESIANA Wall. = *Asystasia Neesiana*.  
 R. NEMORALIS H. et Boj. = *Khytioglossa nemoralis*.  
 R. NEMORUM Wall. cat. = *Asystasia nemorum*.  
 R. NILBUTIA Hamilt. = *Lepidagathis purpuricaulis*.  
 R. NUTANS Steud. = *Goldfussia nutans*.  
 R. OBLIQUA Wall. cat. = *Asystasia Coromandeliana*  $\gamma$ .  
 R. OBLONGIFOLIA Michx. = *Calophanes oblongifolius*.  
 R. OBOVATA Roxb. Wall. Hornem. = *Hygrophila obovata*.  
 R. OCIMOIDES Vahl = *Dipteracanthus patulus*.  
 R. OVATA Cav. = *Calophanes ovata*.

- R. OVATA Thunb. = *Fabria cordifolia*.  
 R. OVATA hort. et herb. Willd. = *Cryphiacanthus lacteus*.  
 R. PALLIDA Vahl = *Dipteracanthus pallidus*.  
 R. PANICHANGA Wall. cat. = *Asystasia Panichanga*.  
 R. PANICULATA Kunth. = *Dipteracanthus Turbacensis*.  
 R. PANICULATA Linn. = *Dipteracanthus paniculatus*.  
 R. PANICULATA herb. Vahl = *Dipteracanthus viscidus*.  
 R. PANICULATA Wall. cat. = *Barleria paniculata*.  
 R. PANICULATA Rohr in herb. Vahl = *Dipteracanthus Hænkei*  $\beta$ .  
 R. PATULA Jacq. Roxb. = *Dipteracanthus patulus*.  
 R. PATULA Salzm. = *Dipteracanthus Bahiensis*.  
 R. PAUCIFLORA Wall. cat. = *Asystasia pauciflora*.  
 R. PAVALA Roxb. = *Lepidagathis Pavala*.  
 R. PECTINATA Wall. cat. = *Rungia parviflora*.  
 R. PEDUNCULOSA N. ab. E. = *Arrhostoxylum pedunculosum*.  
 R. PENTSTEMONOIDES Wall. cat. = *Goldfussia pentstemonoides*.  
 R. PERSICA Burm. = *Acanthodium spicatum*.  
 R. PERSICIFOLIA Lindl. = *Goldfussia anisophylla*.  
 R. PETIOLARIS Boj. = *Ætheilema imbricatum*.  
 R. PHLOMOIDES Wall. cat. = *Hygrophila phlomoides*.  
 R. PILOSA Vellozo. = *Dipteracanthus Neesianus*.  
 R. PILOSA Vellozo. = *Dipteracanthus viscidulus*.  
 R. PILOSA Linn. = *Fabria pilosa*.  
 R. POLYSPERMA Roth = *Hemadelphis polysperma*.  
 R. PRISMATICA Vellozo. = *Strohlorhachis prismatica*.  
 R. PROSTRATA Pav. = *Cryphiacanthus lacteus*.  
 R. PROSTRATA Poir. = *Dipteracanthus prostratus*.  
 R. PUBESCENS Pers. = *Fabria cordifolia*.  
 R. PULCHELLA Schott = *Dipteracanthus rubicaulis* (fide Steud.).  
 R. PUMILIO R. Br. = *Dipteracanthus Pumilio*.  
 R. PURPURICAULIS Cav. = *Lepidagathis purpuricaulis*.  
 R. QUADRANGULARIS Vellozo. = *Aphelandra sciophila*.  
 R. QUADRIVALVIS Wall. cat. = *Hygrophila quadrivalvis*.  
 R. QUATERNA Schuhm. = *Asystasia quaterna*.  
 R. QUITENSIS Kunth = *Calophanes Quitensis*.  
 R. QUITENSIS Schlechtend. = *Calophanes Schiedeanus*.  
 R. RACEMOSA Roxb. = *Erythracanthus racemosus*.  
 R.  $\beta$  RADICALIS herb. Hamilt. = *Lepidagathis Hamiltoniana*.  
 R. RADICANS Hochst. = *Dyschoriste radicans*.  
 R. RADICANS Wall. cat. = *Hygrophila radicans*.  
 R. RADICIFLORA herb. Vahl = *Lepidagathis rupestris* var.  $\beta$  *Rottleriana*.  
 R. RENIFORMIS Wall. cat. = *Ætheilema reniforme*.  
 R. REPENS Linn. Burm. et Bl. = *Dipteracanthus lanceolatus*.  
 R. RHAMNIFOLIA herb. Willd. = *Dipteracanthus Hænkei*  $\beta$ .  
 R. RINGENS Linn. et Burm. fl. ind. = *Adenosma uliginosa*.

- R. RINGENS Roxb. = *Dipteracanthus dejctus*.  
 R. RIVULARIS Schlechtend. = *Hygrophila rivularis*.  
 R. ROHIRII herb. Vahl = *Blechum Brownei*.  
 R. ROSEA Wall. cat. = *Strobilanthes roseus*.  
 R. ROTUNDIFOLIA Don = *Goldfussia lamiifolia*.  
 R. RUBICAULIS Cav. = *Dipteracanthus foetidus*.  
 R. RUBICUNDA Wall. cat. = *Leptacanthus rubicundus*.  
 R. RUBRA Aubl. = *Arrhostoxylum rubrum*.  
 R. RUBRA N. ab E. in herb. Hænk. = *Arrhostoxylum Hænkeanum*.  
 R. RUBRA herb. Willd. = *Arrhostoxylum Willdenovianum*.  
 R. RUFESCENS Roth = *Budderea ulmifolia*.  
 R. RUPESTRIS Sw. = *Stenandrium rupestre*.  
 R. RUSSELLIANA Wall. cat. = *Stenosiphonium Russellianum*.  
 R. SABINIANA Lodd. = *Strobilanthes Sabinianus*.  
 R. SALICIFOLIA Bert. = *Hygrophila Portoricensis*.  
 R. SALICIFOLIA Roxb. et Wall. cat. = *Hygrophila salicifolia et radicans*.  
 R. SALICIFOLIA Vahl = *Hygrophila salicifolia*.  
 R.? SAXICOLA Boj. = *Hypoestes saxicola*.  
 R. SCABRA et SCABRIDA Wall. cat. = *Strobilanthes scaber*.  
 R. SCABROSA Sw. = *Stenandrium scabrosum*.  
 R. SCARIOSA Wall. cat. = *Lepidagathis scariosa*.  
 R. SCARIOSA Wall. cat. = *Lepidagathis falcata*.  
 R. SECUNDA Blanco = *Lepidagathis secunda*.  
 R. SECUNDA Vahl = *Asystasia Coromandeliana* var.  $\beta$ .  
 R. SECUNDA Wight = *Endopogon hypoleucus*.  
 R. SERRATA Thunb. (in nov. act. ups. 7 p. 143 t. 4 f. 3) = *Bonnaya penicillata* N. ab E.  
 R. SESAMOIDES Wall. cat. = *Endopogon Amomum et hypoleucus et Stenosiphonium subsericeum*.  
 R. SESSILIS Balbis = *Cryphiacanthus lacteus*.  
 R. SETIGERA Pers. = *Chætacanthus Personii*.  
 R. SOLITARIA Velloz. = *Dipteracanthus Schauerianus*.  
 R. SPECIOSA Mart. = *Dipteracanthus affinis*.  
 R. SPICATA Velloz. = *Geissomeria distans*.  
 R. SPICATA N. ab E. in herb. Hænk. = *Lagochilium spicatum*.  
 R. SPINESCENS Thunb. = *Aptosimum spec. An idem ac Aptosimum abietinum?*  
 R. STREPENS Forsk. = *Dipteracanthus pallidus*.  
 R. STREPENS Linn. = *Dipteracanthus strepens*.  
 R. STREPENS Pav. = *Dipteracanthus geminiflorus*.  
 R. STROBILINA Wall. cat. = *Goldfussia nutans*.  
 R. SUBDENTATA Klotzsch = *Dipteracanthus multifolius*.  
 R. SUBSERICEA Wall. cat. = *Stenosiphonium subsericeum*.  
 R. SUFFRUTICOSA Roxb. = *Dipteracanthus Sibua*.  
 R. TENTACULATA Linn. = *Haplanthus tentaculatus*.  
 R. TENUIS herb. Hamilt. = *Lepidagathis purpuricaulis*.

- R. TETRAGONOSTACHYA Wall. cat. == *Neuracanthus tetragonostachyus*.  
 R. THYMIFOLIA herb. Vahl == *Chætacanthus Persoonii*  $\beta$ .  
 R. TOMENTOSA Wall. cat. == *Echmanthera Wallichiana* var.  $\alpha$ .  
 R. TRIFLORA Roxb. == *Adenosma triflora*.  
 R.? TRINERVIS herb. Hamilt. Wall. cat. == *Lepidagathis trinervis*.  
 R. TRIVIALIS Blanchet == *Dipteracanthus Babiensis*.  
 R. TUBEROSA Linn. == *Cryphiacanthus Barbadensis*.  
 R. TUBIFLORA Bonpl. == *Dipteracanthus tuhiflorus*.  
 R. TUBIFLORA Lecomte == *Dipteracanthus noctiflorus*.  
 R. ULIGINOSA Linn. == *Adenosma uliginosa*.  
 R. UMBROSA herb. Madr. == *Asystasia nemorum*.  
 R. UNDULATA Vahl == *Hygrophila undulata*.  
 R. UNIFLORA Boj. == *Etheilema rupestre*.  
 R. UROPHYLLA Wall. cat. == *Strohilanthes urophyllus*.  
 R. URTICIFOLIA Wall. cat. == *Strohilanthes alatus*.  
 R.? USTULATA Wall. cat. == *Lepidagathis ustulata*.  
 R. VARIABILIS Macrae. == *Asystasia Coromandeliana*  $\gamma^*$   
 R. VARIANS herb. Heyn. apud Wall. == *Eranthemum montanum*.  
 R. VARIANS Vent. == *Eranthemum nervosum*.  
 R. VENTRICOSA Humh. == *Stephanophysum ventricosum*.  
 R. VERTICILLATA Pav. == *Cryphiacanthus lacteus*.  
 R. VERTICILLATA Spr. == *Hygrophila longifolia*.  
 R. VERTICILLATA Wall. cat. == *Adenosma verticillata*.  
 R. VERTICILLIFLORA Stend. == *Adenosma verticillata*.  
 R. VINCOIDES herb. Willd. == *Dipteracanthus vincoides*.  
 R. VIOLACEA Auhl. == *Arrhostoxylum violaceum*.  
 R. VISCIDULA Schrank == *Dipteracanthus viscidulus*.  
 R. VIScosa Kunth == *Dipteracanthus viscosus*.  
 R. WIGHTIANA Wall. cat. == *Dipteracanthus prostratus*.  
 R. ZEYLANICA Roxb. == *Asystasia Coromandeliana* var.  $\beta$ .

XXXIV. CRABBEA Harvey (1842) in *Hook. Lond. Journ.* 1 p. 26 (*non alibi*),  
*Meissn. gen. p. 367.* — *Ruellia* spec. *N. ab E. in Linnaea* 15 p. 354.

Calyx quinquepartitus, subinæqualis, laciniis apicem versus subulatis. Corolla tubulosa vel subcampanulata, limbo quinquefido, laciniis tribus superioribus minoribus. Stamina quatuor tubi apici inserta, inclusa; filamenta curvata; antheræ biloculares, loculis contiguis basi inæqualibus margine connectivi in dorso pubescenti-hirtulis. Stigma infundibuliforme, bilabiatum, labio altero brevi angusto, altero dilatato ovato membranaceo ciliolato. Capsula teretiuscula, dorso depresso-sulcata, bilocularis, a basi 6-8-sperma. Semina compressa, membranaceo-marginata, retinaculis validis suffulta. — Suffrutes Africæ australioris, humiles, sæpe procumbentes foliis confertis subintegerrimis, spicis axillaribus brevipedunculatis capitatis, bracteis imbricatis magnis venoso-reticulatis margine vel spinoso vel simpliciter ciliato. — Genus proximum Ruelliae, at habitu diverso.

1 C. NANA, bracteis ciliolatis rarius exterioribus margine hinc inde setosis, corollâ infundibuliformi-campanulata, antheris intra fauces latentibus, foliis

- oblongo-lanceolatis glabriusculis. ♂ In mimosetis ripæ fluminis Zwarteky Rivier (Tambuki Land), Africæ australioris (Ecklon ! in herb. Nees. et in herb. gen. berol.). Ruellia nana N. ab E. in Linn. 15 p. 355. Differt a C. cirsoidi foliis magis glabris, solâ costâ mediâ subtus parce pilosâ, capitulis subnutantibus minoribus, floribns fere duplo latioribus, limbi laciniis ovatis, tum vero bracteis setulis brevibus ciliatis. (v. in h. Nees, DC., berol.)
2. C. CIRSIODIES, bracteis setoso-ciliatis, corollâ tubulosâ limbo brevi antheras subcrequante, foliis oblongo-lanceolatis glabriusculis. ♂ In rupestribus ad pedem montis Chumi prope Castellum Beaufort ad flumen Katrivier (Terra Caffrorum) in Africæ australi, Julio (Ecklon ! in herb. Nees, Burchell ! in h. Hook.), ad Seven Fountains, Kuul Rivier etc. (Burchell ! in h. Hook.) Ruellia? nana E. Meyer in cat. pl. Drèg. ann. 1837 (h. gen. berol. ! et h. DC. n. 807). Ruellia cirsoides N. ab E. in Linn. 15 p. 354. — Planta 3-6 poll. alta. Folia oblongo-lanceolata in petiolam attenuata, subcrenata, costâ sepe hirta, subinde et margine. Capitula magna, bracteis pallidis spinis longis ciliatis. Corolla explicata semiplicaris, clandestina 2-3 lin. longa, deflorata limbo clauso in capsulâ residens. Variat caule glabro, et plus miuuus hirsuto setis dispersis. (v. in h. Eckl., Drèg., Hook. etc.)
3. C. HIRSUTA (Harvey gen. s.-afr. pl. in Lond. journ. bot. I p. 27), dense setoso-pubesces, bracteis spinoso-ciliatis hirsutis marginatis, corollâ infundibuliformi, foliis lanceolatis acutis. ♂ Ad Port Natal Africæ austral. (Harvey!) Folia late lanceolata, brevipetiolata. Bracteæ ovato-lanceolatae, acuminatae. (v. in h. Hook.)
4. C. ANGUSTIFOLIA, molliter hirsuta, bracteis setoso-ciliatis immarginatis, corollâ tubulos - infundibuliformi, foliis lanceolato - linearibus obtusis. ♂ Macalis Hug in Prom. Bon. Spei, Decembri (Burchell ! n. 405 in herb. Hook.). Bracteæ ovato - lanceolatae, acuminatae, confertim ciliatae spinis mollibus setiformibus. (v. in h. Hook.)

XXXV. ASYSTASIA Blume bijdr. p. 796, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 89 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285. — Ramusia E. M. in cat. pl. Drèg. ann. 1837. — Ruellia sp. Linn. et auct.

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla subinfundibuliformis, limbo quinquefido, subæquali, lacinia superâ concaviusculâ. Stamina 4 didynamia, inclusa, per paria basi connata. Antheræ biloculares loculis parallelis basi callosis vel appendiculatis. Stigma capitatum, bilobum vel bidentatum. Capsula basi compresso-attenuata, asperma, superiorius depresso-tetragona, bilocularis, tetrasperma. Semina retinaculis sustensa, discoidea, lobata, basi angulo prominenti. — Plantæ Indiæ orientalis, Asiæ et Africæ calidioris et temperatae, herbaceæ vel fruticulosæ, laxæ, diffusæ, subsarmentosæ. Racemus spiciformis, secundus, axillaris vel terminalis. Bractea communis et propriæ exiguae, æquales. Flores cœrulei vel luteocœruleo-æ varii, sat speciosi.

- ? 1. A. KUNTHIANA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 89), caule fruticoso tereti foliisque oblongis subtilissime lineolato-scabriusculis, floribus axillaribus fasciculatis suboppositis, calycibus pubescenti-scabris. ♂ In Penang (Wallich!). Ruellia Kunthiana Wall. cat. n. 2419. Fruticulus-2-pedalis. (v. in h. Wall.)
2. A. MACROCARPA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 89), caule obtuse tetragono elongato geniculato, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subrepandis utrinque hirtulis, spicis terminalibus solitariis geminis ternisve, floribus inferioribus oppositis, superioribus secundis, corollæ lacinis integris. ♂ In Nepalia (Wallich!), prope Sirinbagad in Himalaya alt. 3000-4000 pcd., in um-

brosis, Maio (Edgeworth! n. 221). Ruellia macrocarpa Wall. cat. n. 2343 (ex parte). Corolla 8-12 lin. longa. Antheræ basi cristatae. Capsula pollinaria et major, clavata. (v. in h. Wall. et Edgeworth).

*β. alba*, floribus omnibus secundis, corollâ albâ.

3. A. PLUMBAGINEA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 89), caule obtuso tetragono foliisque trapezoideis repandis acutis supra punctato-asperis glabris, spicis terminalibus ternis, floribus inferioribus oppositis superioribus secundis, corollæ angustæ lacinii integris.  $\mathcal{L}$  In herb. madr.! ex hort. gubernatoris Madraspatanae urbis. Justicia plumbaginea Wall. cat. n. 2487. Corolla 6-7 lin. longa. (v. in h. Wall.)

4. A. NEEIANA (Wall. pl. as. rar. 3 p. 89), caule quadrangulari ercto foliisque amplis ovato-oblongis acutis in petiolum breve in acute desinentibus integrermis glabris, racemis terminalibus solitariis ad basiu bifidis, floribus alternis secundis glandulosu-pubescentibus, corollæ lacinii integris.  $\mathcal{L}$  In moutibus prov. Sillet (F. D.). Florit Octobri, fructificat Decembri. Ruellia Neesiana Wall. pl. as. rar. I p. 73 t. 83, cat. n. 2342. Ruellia auriculata Wall. cat. n. 2341 (bis) in herb. Hook. Eminet inter congeneres foliorum amplitudine, quorum inferiora pedalia sunt, 4 poll. lata, superiora versus parum diminuentia, cæterum mollia, late viridia; petioli pollice sunt breviores. Rami terminantur racemo spiciformi cum pedunculo uno, pedali fere, longe pedunculato, ad originem pierunque altero breviori socio auto, circa originem florum infracto, bifido, ramo accessori breviori, ipsi parte florente 3-4 pollicum, cum bracteis et calycibus subtiliter pubescenti-glandulosâ. Pedicelli distantes, duas lin. longi, bracteas et bractolas duplo superantes. Calyx 3 lin. longas. Corolla in var.  $\beta$  pollicaris, in var.  $\alpha$  bipollicaris, extenuato-infundibuliformis, rosca, faux intus pallida, punctata. Antheræ cordatae, elliptico-ovatae, loculis basi nonnihil inæqualibus ibidemque mucronulo parvo albo armatis. Capsula clavata, longe unguiculata, acuta, tapersperna, fere 1  $\frac{1}{2}$ -pollicaris. Semina orbiculata, retinaculis longe sustenta. (v. in h. Wall.)

*β. minor*, floribus tertia parte minoribus. — E montibus prov. Sillet confinibus adlata est.

5. A. DENTICULATA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 89), caule quadruplicato flexuoso pubescenti-scabro, foliis oblongis denticulato-crenatis cuspidatis basi cuneiformibus glabris, spicis axillaribus oppositis trifidis, floribus oppositis, corollæ lacinii emarginatis, filamentis birsuntissimis.  $\mathcal{L}$  In Punduā (Wall.). Ruellia denticulata Wall. cat. n. 2418. — Herbacea, pedalis et altior. Corolla 6 lin. longa, extns dense pubescenti-tomentosa, flavescens. Filamenta barbata. Antheræ muticæ. (v. in h. Wall.)

6. A. CHELONOIDES (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 89. Wight h. prop. n. 1952), caule dichotomo subpiloso, foliis elliptico-oblongis acuminatis basi acutis repando-crenatis supra marginaque pilosulis glabris, racemis axillaribus terminalique simplicibus trifidis secundis, calycibus glandulosu-scabris, pedicellis calyce paulo brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali, in insulâ Ceylon (Walker! in herb. Hook. et Benth.). Ruellia Coromandeliana Wall. cat. n. 2399 e, ex herb. Wight, f ex part., ex herb. Heyn. Corolla 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, purpurea, subbilabiata. Antheræ basi callose. (v. in h. Wall.)

*β. foliis minoribus glabris basi cunctatim attenuatis*. — In Neelgherries (Noton), abundat in silvaticis humidis circa Condas in jugo montium Neelgherries, floret Octobri (Perrottet! in h. DC.). Ruellia chelonoides. Wall. cat. n. 2335 a, b. Ruellia sp. h. Wight, Wall. cat. n. 2335 b. (v. in h. Wall. et DC.)

*γ. foliis evidentius crenatis, corollâ albâ*. — Neelgherry Cunnur Februario (Schmidt), in silvaticis circa Kolyrgherries (Perrottet! in herb. DC. (v. in h. Schmidt et DC.)

*δ. arabica*, caule foliisque glabris, his apice haud subcuspidato-productis, sed vel simpliciter acutis vel acuminé obtusato-præditis, calycibus glabris

scabrisve. — Bahr-el-Abiad et Djennah in Arabiâ Felici (d'Arnaud et Botta! n. 201 in herb. mus. paris. et Nees), in regno Fazohel (Kotschy! n. 423 in herb. Hook.). An potius ad A. intrusam revocanda? (v. in h. paris. et Hook.)

Var.  $\beta$  et  $\gamma$  differunt caule humiliore (pedali) glabro, foliis minoribus 3-3 $\frac{1}{2}$  poll. longis  $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. latis sereque oblongis basi cuneatim in petiolum longum concurrentibus saepe penitus glabris vel setulis rarissimis in pagina superiori strigilosis ambitu scabris, in  $\gamma$  evidentius crenulatis. An propria species? Corolla in  $\beta$  pallide coerulea, in  $\gamma$  alba.

7. A. COROMANDELIANA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 89), caule ramoso, ramis diffusis, foliis cordato-ovatis suborbiculatis supra lineolato-asperis, racemis axillaribus elongatis secundis strictis, calycibus acuminatis. — Corolla pollice longior, infundibuliformis, basi lutea, limbo cœruleo. Capsula pollicaris.

$\alpha$ . caule foliisque glabriusculis vel totis glabris, foliis subcordato-orbiculatis cuspidatis, calycibus glandulosis hirtulisque pubescentiâ brevi.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientalis sepius frequentissima. Vidi exempla Hamilt. et Wall. ex hort. b. calc., herb. madr. Wight, Heyne, Wight, h. propr. n. 1951 Jacquemont voy. n. 674 ex herb. mus. paris. in herb. Nees n. 155, Selampur (herb. Schmidel), Nilgherri (Schmidt!), Ceylon (Walker! in herb. Hook. et Benth., Reynaud in herb. mus. paris. n. 99 et 100). Ruellia Coromandeliana herb. madr.! Wall. cat. n. 2399 a (ex parte). Ruellia secunda et filiformis Klein! in herb. Willd. n. 11649, herb. Schmidel in herb. Schreber, Heyne in Wall. cat. n. 2401 a, b, (ex parte), herb. Hamilt. et Wight. Ruellia nemoralis herb. Vahl! Justicia gangetica Linn. amoena. 4 p. 290 (excl. omn. syn.?) (v. in h. Wall. Wight etc.)

$\alpha^*$ . *micantha*, corollâ capsulâ dimidio minoribus, foliis contra paulo majoribus quam in  $\alpha$  et in reliquis.  $\mathcal{L}$  In Sennaar Africæ umbrosis (Acerbi! in herb. DC. n. 687). (v. in herb. DC.)

$\beta$ . caule pubescenti-scabro vel subvilloso, articulis elongatis, foliis minoribus magis ovatis, inferioribus præsertim basi acutis, calyce hirto, basi tantum glanduloso. — In Indiâ orientali, in Senegambiâ ad flumen Gambia (Leprieur! in h. paris. et Nees). Ruellia secunda Wall. cat. n. 2401 d ex h. bot. calc., a (ex parte) Roxb. fl. ind. 3 p. 42. Ruellia secunda Vahl! synib. 3 p. 84 et herb.!, Willd. sp. pl. 3 p. 372. herb. n. 11648 (ex herb. Vahl), Forsk. descr. p. 113. Valli-upu-Dali Rheed. h. mal. 9 p. 85 t. 45. (v. in h. Vahl, Willd. Wall. Wight, etc.)

$\beta^*$  tota glabra, foliis apicem versus magis attenuatis basi acutis subrepandis, calycibus scabriusculis.  $\mathcal{L}$  Columbo in Ceylon (Macrae! n. 353. in herb. Benth., Col. Walker! in herb. Hook.) (v. in h. Benth. et Hook.)

$\gamma$ . caule, præsertim apicem versus, petiolis calycibusque hirsutis, foliis cordato-orbiculatis saepe obliquis aliis obtusis, aliis breviter obtuseque cuspidatis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali (herb. Madr.!), Port Natal in Africâ australi (Krauss! in h. Benth.). Asystasia Coromandeliana  $\beta$  Wight! herb. propr. n. 1953 b. Ruellia obliqua herb. Wight, Wall. cat. n. 2399 d. Ruellia Coromandeliana Wall. l. c. (v. in h. Wall. Wight, Benth. etc.)

$\gamma^*$ . *variabilis*, glabra, foliis polymorphis rigidis, inferioribus ovatis basi acutieusculis apice parum attenuatis, rameis subrotundis obtusissimis minoribus.  $\mathcal{L}$  In Ceylon ad Paradenia (Macrae! in herb. Benth. ex herb. soc. hort. lond.). Ruellia variabilis Macrae l. c. n. 422. (v. in h. Benth.)

$\delta$ . *tomentosa*, foliis paulo minoribus tomentosis, corollis flavis.  $\mathcal{L}$  Frequentis ad oras maris, Naliar? dicta, floret a Septembri in Novembrem (Perrottet! in h. DC.).

8. A. QUATERNA, scandens, racemo terminali subquadriifloro, bracteis quaternis.  $\mathcal{L}$  Frequens in Guiné danicā (Thonning). Ruellia quaterna Schuhm. pl. guin. sect. 2 in Kongl. Dansk. Videnskab. Selsk. Afhandl. 4 p. 58. Ruellia spec., quæ non nisi bractearum numero a R. intrusā Forsk. discrepat Hornem. pl. guin. in annivers. eto. (1819). Rob. Br. ed. germ. N. ab E. I p. 256. Vix diversa ab A. Coromandelianā var.  $\beta$ . Bractearum distributione eadem omnino in omnibus hujus generis speciebus, scil. bractea fertili cum binis bracteolis in uno latere rhacheos et altera sterilis illi opposita; in aliis autem, v. g. A. intrusā, bracteola pedicello altius imposita calyci proprius site sunt, in aliis, ut in A. Coromandelianā, Capensi etc., ad basin pedicelli posita sterilis bractea propemodum opponuntur. Ceterum canalis litor virginita laxe adscendens, neque revera sarmenitus est, talisque et in hac ab auctore describitur. Différre videtur ab A. Coromandelianā racemo quadrifloro et corollis albis. Tubus corollæ longitudine calycis pilosusculi. Capsula pollicaris. Folia biplicaria, ovata vel subcordata, obtusa, supra subpresa, subtus in costis pubescutia.
9. A. INTRUSA, caule trichotomo dichotomo anguloso angulis hirtis, foliis ovatis acuminatis integerrimis supra subtusque in costis hirtis margine scabris, basi obtusis brevissime petiolatis, racemis axillaribus elongatis secundis recurvis, calycibus acuminatis sebris, pedicellis calyce duplo brevioribus, corolla laciniā inferiore introrsum gibbosā.  $\mathcal{L}$  In Arabiae Felicis montibus altioribus (Forskål), Bahr-el-Abiad (Botta n. 52 in herb. Nees, ex herb. mus. parisi.). Ruellia intrusa Vahl symb. 1 p. 45, Willd. sp. pl. 3 p. 367. Ruellia corolla laciniā intrusā forniciata Forsk. doser. p. 113. Ab A. Coromandelianā imprimis differt foliis hand cuspido-attenuatis sed simpliciter acuminatis, infimis minus attenuatis brevi-acutis vel et obtusis subsessilibus ambitu late ovatis. Corolla structure a Forskalio paucis verbis indicata in eo rcedit, quod lacinia inferior, a latere exteriore profunde canaliculata, gibbo oblongo hac sulci impressione provocato et colore pallido? insigni introrsum inter fauces promineat. (v. s. in h. paris.)
10. A. BOJERIANA, caule repente adscendente foliisque superioribus ovato-attenuatis integerrimis supra hirsutis, racemo terminali laxo subcernenti, calycibus hirsutis, bracteis bracteolisque brevissimis subulatis, tubo corollæ in fauces obconicas paulo longiores transeunte.  $\mathcal{L}$  In dumetis solo arenoso ad littora maris circum pagum Tamatawe in insulâ Madagascar (Bojer! in h. DC.), ad sinum Delagoa Africæ australis (Forbes! in herb. soc. bort. Lond. et in DC.). Ruellia secundiflora Bojer l. c. et Coromandeliana l. c. atque in h. reg. monac. Differt ab A. Coromandelianā foliis angustioribus et basi rotundatâ sensim attenuatis, breviori petiolo præditis et corolla minori, ab A. Capensi hirsutis, ab A. Blumeana corolla tubo minus gracili. — Caulis sulcatus, purpureus, pilis patentibus hirsutus. Folia inferiora ovata, obtusa, superiora ex ovato subtruncatoe basi magis attenuata. Petioli vix lin. 1 longi. Bractea et bracteola pedicello lin. longo duplo breviores. Corolla pulchra lilacina, 8 lin. longa, limbo brevi, laciniis retusis. Capsula pollicaris, mucronata, pubescens, ungue 7-8 lin. longo. An var. A. Capensis? (v. in h. DC., monac. etc.)
- $\beta$ . decipiens, foliis omnibus ex oblongo-ovalibus obtusis 10-12 lin. longis 5-6 lin. latis, superioribus inferioribusque vix ab invicem diversis. — In Madagascar (h. DC. et h. Hook.; Lyell! n. 343. in h. Hook.) (v. iu h. DC. Hook.)
11. A. COMORENSIS (Bojer), caule diffuso adscendente pubescente, foliis anguste cordatis ovato-oblongis apice attenuatis brevipetiolatis glabris, racemis axillaribus terminalibusque laxis pubescentibus, tubo corollæ fauibus obconicis breviore.  $\mathcal{L}$  In fructicetis humidis convallium silvarum insulæ Johannæ Comores prope insulam Madagascaram (Bojer! in herb. DC.). Accedit ad A. Coromandelianam, sed differt foliis angustioribus breviori petiolo inci-

surâque baseos tam angustâ et clausâ prædictis, ut subpettata ea diceres, tum et corollâ minore, corollæ A. Bojerianæ similitudine. Folia summa oblonga, basi aequitiuscula. (v. in h. DC.)

*β. humilis*, glabra, caule erecto  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  pedem alto, folijs omnibus ovalibus obtusis acutiusculis supra punctulato-scabris. — In locis inundatis sinus Bombatok. Asystasiæ spec. Bojer! in h. DC. An spec. distincta? (v. in h. DC. )

12. A. CAPENSIS (N. ab E. in Linnæ. 15 p. 356), glabra, caule adscidente ramoso tetragono, folijs ovatis obtusis superioribusque oblongis e basi subcordata angustatis obtusiusculis, supra minutum lineolatis margine scabris, racemo terminali solitario brevi, bracteis calycibusque subulatis.  $\mathcal{U}$  In collibus inter flumina Boschesmanrivier et Karregarivier (Albany), ad Castellum Beaufort in finibus Terræ Cafrorum (Ceded Territory) Octobri cum floribus (Ecklon! Drèg! ), ad sinum Delagoa (Forbes! in herb. soc. hort. Lond. et ex eodem in herb. Mart. et Benth.). Ramusia nyctaginea E. M.! in cat. pl. Drèg. ann. 1837 et in herb. gen. berol. Species ab Asiaticis hujus generis speciebus satis distincta follis superioribus a basi fere triangulari-attenuatis basi latiuscula nec profunde eordatis brevissime petiolatis 1  $\frac{1}{2}$ -2 poll. longis  $\frac{1}{2}$  ad basin latis. Corolla  $\frac{1}{2}$  poll. longa, dense viscidulo-pubescent, tærula? (v. in h. Ecklon, Drèg., Mart., Benth.)

13. A. BLUMEI, caule erecto dichotomo-ramosissimo, foliis ovato-oblongis acuminatis obsolete crenatis supra punctatis sparsimque et in margine pilosis, racemis axillaribus terminalibusque laxis nutantibus, calycibus hispidulis sub-sessilibus, tubo corollæ gracili faucibus longiori.  $\mathcal{U}$  In umbrosis humidis circa Buitenzorg insulæ Javæ, omni fere tempore florens (Blume), Gunong Randjinnang, Aprili (Junghuhn!). Asystasia intrusa Bl. bijdr. p. 796 (nec Forsk.). A reliquis, praesertim a specie sequente, cui habitu proxima, differt corollæ tubo, si limbum et fauces spectas, longiore et graciliore. (v. in h. Junghuhn ).

14. A. NEMORUM (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 90), caule erecto dichotomo, foliis elliptico-oblongis acuminatis obsolete crenatis supra pilosulis, racemis axillaribus terminaliisque secundis subspicatis, calycibus hispidulis, corollæ tubo faucibus inflatis breviori.  $\mathcal{U}$  In Indiâ orientali, in insulæ Javæ umbrosis humidis, circa Buitenzorg, floret omni tempore (Blume). Ruellia nemorum h. Russell, Wall. cat. n. 2399 c. Ruellia umbrosa h. madr. Wall. cat. n. 2399 b. Ruellia secunda var. h. Heyn., Wall. cat. n. 2399 f (ex parte). Ruellia Coromandeliana Wall. cat. n. 2399 b, e, f. Simillima A. chelonoidi, sed differt caule laxiore plerumque ex toto glabro, pedicellis spicæ brevioribus bracteas æquantibus, nec iis duplo vel ultra longioribus, floribus capsulisque duplo minoribus, calycibus a setulis hispidis, nec pubescenti-tomentosis. (v. in h. Wallich. etc.)

15. A. PANICHANGA, caule trichotomo foliisque ovalibus acuminatis serratis subtus ferrugineo-subtomentosis, paniculæ axillaribus trichotomis, floribus sessilibus secundis, corollæ laciniis lunatis.  $\mathcal{Z}$ ? in Sillet (Hamilton! et Wall!). Ruellia Panichanga h. Hamilt., Wall. cat. n. 2387 a, b. Ruellia corymbosa Wall. in h. Mart. Caulis fruticulosus, pennâ scriptoriâ crassior, quadrangularis ad nodos compressus, pubescentiâ densâ rigidulâ articulatâ viscidulâ ferrugineâ brevissimâ tectis, subtomentosus, trichotomus; rami longi, geniculati. Folia 5-7 poll. longa, 2 $\frac{1}{4}$  poll. lata. Flores secundi, sessiles, distantes, progracilitate ramuli grandes. Corolla 1  $\frac{1}{2}$  pollices longa, dense pubescens, ecrulea?; limbus tubum superans, anguste campanulatus; laciniæ oblique emarginata sinu lunato lobulo longiori acuto breviori rotundato. Antherarum loculi semi-elliptici, glabri, utrinque rotundati, albi. Capsula semipollice longior. (v. in h. Wallich. etc.)

#### *Species exclusa.*

A. CALYCINA N. ab E. — *Echinacanthus calycinus*.

XXXVI. ECHINACANTHUS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 90 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 701, Meisn. gen. p. 294 (203). — Ruellia spec. Wall.

Calyx profunde quinquefidus, subæqualis, sub fructu erectus. Corolla infundibuliformis, limbo æquali. Stamina 4, didynama, inclusa, per paria basi connata. Antheræ sagittatæ, ovales, oblongæ, hirtæ, loculis parallelis basi vel uni- vel bicalcaratis. Stigma simplex. Capsula teretinscula, bilocularis, a basi polysperma. Dissepimentum completum, adnatum. Semina cordato-subrotunda, compressa, retinaculis sustensa. — Herbae Indiæ orientalis, habitu laxo, foliis plus minus denticulatis. Cymæ vel axillares bifidæ cum intermedio flore, ramis sursum secundifloris, vel in paniculâ terminali dispositæ. Bracteæ angustæ. Bracteolæ nullæ. Flores mediocres glandulosi. — Genus hoc inter Ruellias Hygrophileis respondet. Differt a Ruellia antheris basi aristatis et inflorescentiâ. Ab Asystasiâ et reliquis capsulâ pleiospermâ, inflorescentiâ, antheris calcaratis.

1. E. ATTENUATUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 90), paniculâ terminali subnudâ glanduloso-pubescente, foliis inferioribus oblongo-ovalibus basi cuneiformibus subdentatis glabris, floralibus lanceolatis.  $\mathcal{L}$  In Nepaliâ (Wallich), Assam ( Jenkins! in h. Hooker ). Ruellia attenuata Wall. cat. n. 2345 bis. Planta herbacea,  $\frac{1}{2}$ -1 ped. alta, erecta, simplex, pyramidalis. Radix præmorsa. Caulis obtuse tetragonii articuli inferiores breves, quibus folia majora, caulem quandoque fere æquantia insident, tum sensim elongati paniculam exhibent, plurimam partem plantæ occupantem. Calyx 7-8 lin. longus, dense glanduloso-pubescent; laciniae linearis-subulatæ; inferiores duæ longiores. Corolla pollice nonnihil brevior. Filamenta per paria basi distincte connata, hirsuta; antheræ magnæ, oblongæ, obtusæ, pallide. Loculi undique hirti, basi aristâ patulâ prædicti. Pollen album. Capsula 6-7 lin. longa. Semina in singulo loculo 7-8. (v. in h. Wallich ).
2. E. BRUGMANIANUS, cymis axillaribus oppositis folio brevioribus hirsutis glandulosisque, foliis oblongis utrinque attenuatis repando-subcrenatis hirsutotomentosis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali? (ex h. Royenii, dedit Brugmans, b. Vahl!) Calycis laciniae paulo breviores minusque attenuatæ quam in præcedente. (v. in h. Vahl).
3. E. LYELLIANUS, cymis axillaribus oppositis folium æquantiibus vel eo longioribus hirsutis glandulosisque, foliis lanceolatis obtusiunculis supra cauleque gracili pilosulis, summis repando-denticulatis, antheris staminum longiorum basi unicaratis, breviorum submitticis.  $\mathcal{L}$  In ins. Madagascar (Lyell! in h. Hook.). Planta debilis. Antheræ ovales, loculis margine hirtis apice commiventi-mucronulatis; loculus alter antheræ staminum longiorum basi longe calcaratus, alter et staminum breviorum cuncti basi vix mucronulati. Capsula depression quam in reliquis, 8-sperma, fusca. (v. in h. Hook.)
4. E. CALYGINUS, glaber, foliis oblongis serratis, spicis axillaribus terminibusque flexuosis, calycibus magnis subulato-cuspidatis libracteatis, bracteolis nullis.  $\mathcal{L}$  In montibus prov. Sillet ( Wall.! ) Asystasia calycina N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 90. Ruellia calycina Wall. cat. n. 2417. Bracteolæ nullæ. Calyx 8 lin. longus, glaber; laciniae in cuspidem convoluto-subulatum attenuatæ. Corollam non vidi. Ovarium 4-ovulatum. (v. in h. Wall.)

XXXVII. STACHYACANTHUS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 65.

Calyx profunde quadripartitus, laciñis subæqualibus, duabus inferis paulo latioribus, superiore deficiente. Corolla (in nostris speciminiibus)

clandestina, calyce minor, tubuloso-cylindrica, clausa, limbo quadrifido. Stamina quatuor, didynamica, inclusa. Antheræ ovales, biloculares supra basin adfixæ, loculis contiguis parallelis muticis. Stigma simplex, basi paulo crassius, acumine incurvo. Capsula a basi ad medium depressa, elocularis, asperma, hinc bilocularis, tetrasperma. Semina compressa, retinaculus obtusus suffulta. — Herba Brasiliensis, humilis, hirsuta, ramosa. Folia angusta. Spica terminalis, longiuscula, rhachi compresso-triquetrâ. Flores solitarii, sessiles, suboppositi, rhachi adpressi, bracteâ bracteolatisque binis parvis subulatis suffulti. — Similis quod ad characteres Dipteronantho capsulæque structurâ conjunctissimus, differt antem calycis lacinia superiore suppressâ et inflorescentiâ spicata Eranthemi sectionis alterius.

S. RIEDELIANUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 66). *2* Ad fluvium Rio Coxim Brasiliæ (Riedel!). Herba tri-quadruplicaris, pilis omnium partium patentibus hirsuta. Caulis acute quadrangulus, basi simplex, sursum confertim ramosus. Folia linear-lanceolata, sessilia, acuminata, 2-2  $\frac{1}{2}$  poll. longa, 2 lin. lata, supra undique subtus in costis hirsuta, costis paucis, acutissimo angulo crenulatis. Spica in ramis terminalis, 1-2 poll. longa, brevipedunculata, laxiuscula, hirsuta. Bracteæ bracteolæque calyce duplo breviores, subulatæ. Calyx omnino sessilis, rbacheosque lateri planiori adpresso, sub anthesi 2-2  $\frac{1}{2}$  lin. longus, lacinia 4 ad basin fere discretis linearis-subulatis, sub fructu 5 lin. longus lacinia tum patulis lanceolatis apice subulatis. Corolla in nostris calyce duplo brevior, subcylindrica, tubo fauicibusque subæqualibus, limbo clauso hirsuto. Capsula 4 lin. longa. (v. in h. petrop.)

### XXXVIII. TRLÉNANTHUS.

Calyx quinquepartitus, lacinia superiore majore ad medium usque trifida lacinia mediâ longiore. Corolla infundibuliformis, limbo regulari quinquefido, tubo brevi. Stamina quatuor didynama, basi per paria contigua; antheræ biloculares, loculis parallelis glabris, basi sagittatae, muticæ. Stigma truncatum. Capsula a basi brevi spatio sterilis, hinc in medio tetrasperma. Semina retinaculis suffulta. — Herba Indiæ orientalis. Folia latiuscula, subserrata. Spicæ axillares, simplices, laxæ, valde flexuosaæ, bracteis angustis longiusculis, bracteolais nullis. Flores alterni subsecundi. Echinacantho affine genus, et imprimis E. calycinæ differt autem præclare calycis lacinia supera trifida et antheris muticis.

T. GRIFFITHIANUS. — *2* Khassyia (Griffith ! in h. Hook.). Folia ovata, glabra. Spicæ oppositæ, folio breviores, in paniculam terminalem trifidam abeuntes. Bracteæ lineares, calyce duplo longiores, glanduloso-pubescentes. Calyceis lacinia setaceo-acuminatae, parcus subtiliusque pubescenti-glandulosæ. (v. in h. Hook. specimen imperfectum.)

XXXIX. LEPTACANTHUS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 90 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 701. Meisn. gen. p. 295 (203).

Calyx profunde quinquepartitus, lacinia angustis, supera sœpe longiore, mediis brevioribus, alii æqualibus. Corolla infundibuliformis, limbo quinquelobo inæquali, lacinia duabus superioribus majoribus adscendentibus. Stamina 4 didynama, non exserta. Antheræ primum cordatae, demuni semi-ovales, loculis antrorum parallele contiguis. Stigma subulatum, basi supera retrorsum hamatæ. Ovarium a basi ad medium quadriovulatum; ovula orbiculata, retinaculis crassis subtensa. Capsula oblonga, a tergo depressiuscula, a basi bilocularis, in medio tetrasperma, semiinibus

retinaculis suffultis. — Plantæ herbaceæ Indiæ orientalis, elegantiores. Flores in paniculâ terminali foliis parvis interstinctâ trichotomâ dispositi, secundi, opposito ramulo paniculæ. Pedicelli graciles ex axillis foliolorum floralium. Bracteolæ ubi calyx valde inæqualis, nullæ, ubi æqualis, duæ, angustæ, calycis basi adnatæ. Corolla speciosa, cœrulea, Fructus pendui. — Genus *Asystasiæ* propinquum et forte, ut subgenus, isti adjungendum.

1. *L. RUBICUNDUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 90), paniculâ laxe villosâ, perianthii laciniis linearibus, superiore sub duplo-longiore rectâ, foliis caulinis oblongis glabris, floralibus ovato-acuminatis minimis. ♀ In Indiâ orientali. *Ruellia rubicunda* h. Wight., Wall. cat. n. 2337. (v. in h. Wall.)
2. *L. WALKERI*, paniculâ dense glanduloso-villosâ, perianthii laciniis linearifiliformibus, superiore paulo longiore, foliis caulinis ovali-oblongis subtus pubescentibus, floralibus salem primariis ovato-acuminatis minimis. ♀ In Insulâ Ceylon (Walker! in h. Arnott, Hook. et Benth.). In Indiâ orientali. *Leptacanthus species* W. Arn. h. Differt a *L. rubicundo*: caule superne hirsuto, foliis subtus pubescentibus cum petiolo  $1\frac{1}{2}$  poll. longo 6-7 poll. longis  $1\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. latis, caudato-cuspidatis cuspidé perangustâ obtusiusculâ, basi longe cuneatis repando-crenatis supremis ad basin paniculæ haud linearibus sed oblongo-lanceolatis, paniculâ bracteis calycibusque pilis capitatis confertim villosis; pedicellis brevioribus et erassioribus (quippe qui isti 2-3 lin., illi 3-5 lin. longi), calycis laciniis angustissimis villosissimis, superiore a basi calycis metiendo 7 $\frac{1}{2}$  lin. longo, reliquis 6 lineas longis, cum illi laciniis calycis lineares et strictiusculas, superior 4 lin., inferiores 2-2 $\frac{1}{2}$  lin. longæ, multo minus villosæ; corollâ majore, 9-10 lin. longâ, post tubum brevissimum subcylindrico-ventricosâ nec sensim dilatata, limbi laciniis subrepandis.
  - α. foliis subtus undique pilosis, foliis floralibus omnibus acutis. (v. in h. Arnott, Hook. et Benth.)
  - β. foliis subtus nonnisi in costis pilosis, foliis floralibus extremis suborbiculatis obtusis, eum vel sine mucronulo. (v. in h. Arnott, etc.)

3. *L. HELICOIDES*, paniculæ gracillimæ ramis superioribus pedunculisque pubescenti-visoidis, periantibil laciniis linearibus obtusis æqualibus glabris, bracteolis duabus linearisubspatulatis calycis basi adnatis ejusque laciniis brevioribus, foliis caulinis oblongis glabris, floralibus oblongis, superioribus omnibus obtusis minimis. ♂ In ins. Ceylon (Walker in h. Hook.). Cymuleæ helicoideæ, laxæ, filiformes, flexuose et regularior recurvæ. Pedicelli calyce duplo et triplo longiores, graciles. Calyx 3 $\frac{1}{2}$  lin. longus, laciniis in statu siccо apice recurvis, sicuti et bracteolis. Corolla (destructa) videbatur 6-7 lin. longa, violacea. Capsula nutans vel et pendula, dorso leniter depressa, a latere compressior, propria a basi 4-sperma. (v. in h. Hook.)

*XL. ÆCHMANTHERA* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 87 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 701. Meisn. gen. p. 294 (203).

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla infundibuliformis, limbo regulari quinquesido. Stamina 4 diodyna, inclusa; antheræ biloculares, apice mucronatae, loculis æqualibus parallelis basi muticis. Stigma simplex, dorso carinatum. Capsula tetragona, a basi ad medium octosperma. Semina lenticularia, lævia, basi subtruncata, retinaculis acutis subtensa. — Frutices Indiæ orientalis subalpini, tomentosi. Folia dentata. Capitula bracteolisque subæqualibus cincta, paniculato- vel corymboso-terminalia.

A. *WALLICHII*, lanuginosa, foliis ellipticis denticulatis. ♂ In Nepaliâ

(Wallich), in Kamoon (Blinkworth), Himala (lady Dalhousie ! in h. Hook.). E rhizomate crasso sublignoso caules assurgunt 1-2 ped. alti et altiores, obtuse tetragoni, lanuginoso-tomentosi, medullâ amplâ faret. Folia inferiora cum petiolo teretiusculo 2-2  $\frac{1}{2}$  poll. longo  $\frac{1}{4}$ -1 pedem longa, 2  $\frac{1}{2}$  poll. lata, elliptica, obtusa, basi inaequali rotundata, parvis denticulis cincta, costis plurimis parallelis penninervia, supra lineolata et hirtula, subtus pubescentia et ad costas hirsuta. Superiora versus folia magis decrescant, et denique intra ulteriores paniculæ ramifications in spathulata et oblongo-spathulata, 1  $\frac{1}{2}$  poll. longa, et ea quidem petiolata magisque lanuginosa trahent. Panicula terminalis pedalis, sesquipedalis, secunda. Capitula piso duplo vel triplo majora, 3-7-flora, hirta. Calyx longitudine bractearum. Corolla pollicaris, pubescens, violacea. Faux a tergo staminum barbata. (v. in h. Wall. et Hook.)

$\alpha^*$ . *tomentosa*, corymbo terminali supra decomposito. — Cum reliquis promiscue occurrit locis apertis apricis et in rupibus siccis Masuri, Bhursyn, Khiri Pass, floret post temporis certi spatium ab Aprili in Octobrem.  $\beta$ . *tomentosa* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 87 Wall. cat. n. 2333 a, b. Differt caule  $\frac{1}{2}$  ped. alto, foliis minoribus; capitulis propter pedunculos breviores subaggregatis. — Variat: 1<sup>o</sup> floribus subglomeratis; 2<sup>o</sup> caule foliisque glabriusculis, que ex Mussoonee et Peer Punga, Cachemere (Royle). Ruellia diffusa h. Royl. ex parte. (v. in h. Wall. Royl.)

$\beta$ . *gossypina*, caule foliisque novellis gossypino-tomentosis niveis, foliis subcordatis, cymulis axillaribus subtrifloris in racemum terminalem paniculam coeuntibus. Caulis inferne digitis minimis fere crassitie, lignosus, medullâ amplâ faretus, erectus, tetragonous, ad genicula non incrassatus, tomento denso crasso candido gossyptium subtilissimum referente undique vestitus; fila hujus tomenti fortissimâ lente visi vix pilis humani crassitudinem ostendunt, tereta sunt, longa, dense implexa, remote articulata, articulis tumidulis. (v. in h. Wall. et paris.)

$\beta^*$ . *leuconeura*, foliis subtus non nisi in nervis venulisque tomentosis. — Ruellia leuconeuron h. Royl.

$\beta^{**}$ . *fomentaria*, maxime tomentosa. — In Nepaliâ inferiori juxta ripam fluminis Rapti (Wallich!), prope vallem Degra, in monte Charculi, in Pingee, in viciniâ imaginum rupibus insculptarum (Guil. Gomez!), Musoore (Royle), (Jacquemont! voy. n. 157 in h. mus. paris.), prope Murvou, Octohri (Edgeworth). Ruellia gossypina N. ab E. l. c. Wall. pl. as. rar. t. 1 p. 38. t. 42, cat. n. 2332 a, b.

XLI. GOLDFUSSIA N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 87, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 701, Meisn. gen. p. 295 (203), Morren in bull. ac. brux. 1839 p. 59. — Ruellia spec. Wall.

Calyx quinquepartitus, subæqualis. Corolla infundibuliformis, limbo quinquefido obtuso æquali. Stamina inclusa, didynama, humiliora, sepe brevissima, reflexa. Antheræ nutantes; loculi in connectivo uncinato glanduloso obliqui, ovati, membranacei. Stigma simplex, subulatum, altero latere crenatum, irritabile. Capsula sexangularis, bivalvis, a disseimento facile solubilis, loculis inferius dispermis. Semina discoidea, retinaculis subtensa. — Frutices Indiæ orientalis, foliis serratis penninervibus curvinervibus, nervis omnibus apicem potentibus, nec vero attingentibus. Flores pauci in capitulo, bibracteolati bracteis deciduis, rarius spicati; spica post delapsa bracteas magis elongata. Capitula pedunculata, pedunculo simplici vel diviso.

1. G. LAMIIFOLIA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), foliis subrotundis euspidatis æqualibus crenatis decuplinerviis, spicis terminalibus ovalibus casu

- bractearum mox denudatis elongatisque, caule fruticoso repente. ♂ In Nepalia ( Wallich ). *Ruellia lamifolia* Wall. cat. n. 2347. *Ruellia rotundifolia* Don ! fl. nep. p. 120, ( h. Mart. ex h. Lambert ! ). Caulis 1-2 pedes longus, geniculatus, ad genicula repens. Folia circiter 2  $\frac{1}{2}$  pollices ( cum petiolo  $\frac{1}{4}$ -poll.) longa, 1  $\frac{1}{2}$  pollicem lata, subrotunda, breviter cuspidata, crenata. Corolla speciosa, sesquipollucaris, subpubescens, forma floris *Digitalis* purpureæ, purpurascens. ( v. in h. Wall. et Mart. )
2. G. ZENKERIANA, caule fruticoso, foliis ovatis acuminatis basi acutis callososerratis glabris, spicis axillaribus oppositis oblongis subinvolucratis pedunculatis, bracteis oblongis calycisque laciniis subulato-acuminatis glabris subciliatis, corollâ regulari, staminibus secundi paris brevissimis. ♂ In silvis umbrosis montium Nilagiricorum, Septembri ( Schmidt in h. Zenker. ! Perrottet ! n. 257 ex h. mus. paris. in h. Nees. n. 127 ), Magabmanî ( Sir Adam ! in h. Hook. ). *Canlis quadrangularis*, glaber, laevis, minute lineolatus, ad genicula infractus. Folia nonnihil inæqualia, cum petiolo  $\frac{1}{4}$  poll. longo tripollucaria, 1  $\frac{1}{4}$  poll. lata, cuspidato-acuminata, basi acuta in petiolum canaliculatum desinentia, dense callososerrulata, supra nitida minute lineolata. Corolla pollicaris, cerulea. ( v. in h. Schmidt, Paris., Hook. )
3. G. LESCHENAULTIANA, caule herbaceo adscendentem foliisque ovatis obtuse acuminatis basi obtusiusculis callososerrulatis glabris, spicâ terminali subcylindrica brevipedunculata, bracteis e basi subovatâ linearis-caudatis obtusis retusivis acumine recurvo calycisque laciniis lanceolatis trinervibus pubescenti glandulosis, corolla. . . . ♂ In montibus Neelgherries Indiæ orientalis ( Leschenault ! in h. DC. ). Proxima G. Zenkeriana, differt spicâ terminali bracteis singularibus e basi ovata vel obovatâ in acumen lineare latiusculum squarroso-patulum productis hisque et calycibus multo latioribus glanduloso-puberulis. Bractæ infimæ lanceolatae, sessiles, involucrum exhibent. Caulis 8-10-pedalis. Folia supra densc lineolata. Capsula calyce paulo brevior, in medio 4-sperma. ( v. in h. DC. )
4. G. BICERPS ( N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88, Wall. cat. n. 7161 ), foliis ellipticis brevicuspatis basi cuneatis petiolatis crenatis glabris inæqualibus multiplinerviis, spicis axillaribus terminalibusque geminis ovatis, bracteis oblongo-lanceolatis spicam æquantibus, bracteolis calycibusque hirtis, caule fruticoso. ♂ Ad Toongdong regni Avæ ( Wall. ! ). *Ruellia glomerata* Wall. mss. Rami lignosi, divaricato - dichotomi, nigro-fusci, articulati. Folia 3  $\frac{1}{2}$ -8 pollices longa, 1  $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, brevicuspidata in petiolum longum angustum cuneatim desinentia, inæqualiter crenata, nervis costalibus 7-9. Pedunculi circiter unciales, glabri, inferne nudi, superne spicis geminis, quarum altera inferior, ovatis semipollucaribus pedunculo 2-3 lin. longo innixis prædicti. Corolla pollicaris. ( v. in h. Wall. )
5. G. SESSILIS, glabra, foliis valde inæqualibus ovato-orbiculatis breviacutis apicem versus serratis basi cuneatâ sessilibus, pedunculis axillaribus folium equitantibus mono-tristachyis, spicis globosis cernuis, bracteis fugacibus, calycibus glandulosò - hirsutis. ♂ In Assam ( Griffith ! ). Caulis adscendens, angulosus. Folium alterum duplo triplave minus. Rami costales 6-7. Color lâte viridis. Corolla pollicaris, cerulea, faucibus inflatis. Bractæ parvæ, oblongæ, obtuse. ( v. in h. Hook. )
6. G. DISCOLOR, foliis ellipticis longe cuspidato-acuminatis basi cuneatis callososerratis glabris subtus glaucis vel purpurascensibus inæqualibus multiplinervibus, pedunculis axillaribus terminalibusque mono-tristachyis folio brevioribus, spicis subglobosis, bracteis oblongo-lanceolatis fugacibus calycibusque glandulosò-hirsutis. ♂ In valle Gangetis, inter montes Himalayæ alt. 4000-6000 ped., Novembri ( Edgeworth ! ), Khasya ( Griffith ! in h. Hook. ). Similis G. bicipiti, a quâ imprimis differt capitulus ( spicis ) minoribus calycibusque glandulosis. Caulis videtur herbaceus, glaber, quadrangulus. Folia majora cum petiolo 7-5 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 2 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, basi cuneatâ in

petiolum currentia, cuspidato-acuminata, acuminatè angusto integrerrimo falcato, reliquo ambitu dense obtuseque serrata, angulis callosis subtus glauca; nervi septeni. Pedunculi raro simplices, plerique trifidi, tristachyi, terminales trichotomii. Spicæ subglobosæ, plerique 5-floræ, nudaæ. Calyces semipolligares, glanduloso-hirti, lacinias linearibus acutiusculis, tribus majoribus. Corolla fere sesquipolligaris, cœrulea, tubo incurvo. Capsula calyce brevior, sexangularis. (v. in h. Edgeworth et Hook.)

7. G. EDGEWORTHIANA, foliis ellipticis acuminatis basi cuneatis calloso-serratis supra et margine scutulis adspersis inæqualibus multiplinervibus, pedunculis axillaribus terminalibusque trichotomis foliolosis simplicibusve folio brevioribus, spicis ovalibus denum vel magis elongatis basique interruptis vel capitatis brevibus paucifloris, bracteis ovalibus fugacibus calycibusque pubescentibus eglandulosis.  $\mathcal{L}$  In valle Adek Himalayæ alt. 5000-7000 ped. Septembri (Edgeworth!) in Indiâ orientali loco non indicato (Jacquemont! in h. Mus. paris. n. 150, voy. n. 1509). Similis est G. discolori, sed videtur differre non solum characteribus supra adiatis, sed in universum etiam staturâ graciliiori, pedunculis præsertim iisque magis divisis, calycis lacinias magis attenuatis minoribus, corollis angustioribus. (v. in h. Edgeworth et paris.)
8. G. GLOMERATA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), caule fruticuloso hirsuto, foliis inæqualibus, altero ovato cuspidato inæqualiter dentato-crenato multiplinervi, altero multo minore ovato subrotundo, basi obtusis valde inæqualibus spicisque axillaribus oppositis solitariis globosis brevissime pedunculatis hirsutis, bracteis lanceolatis integrerrimis, interioribus capitulum superantibus.  $\mathfrak{L}$  In montibus Sillet (Fr. de Silva!), ex hort. bot. paris. (h. Mart.) — Bot. mag. t. 3881. Ruellia glomerata Wall. cat. n. 2361 bis. A G. capitata differt: caule omnium maxime geniculato nodoso atque distorto setis rigidis longis hirsutissimo, nec pilis mollieribus vestito, foliis latioribus (ubi 6 poll. longa,  $3\frac{1}{3}$ - $3\frac{2}{3}$  poll. latis) basi obtusa valde inæqualibus, neque in petiolum breveni decurrentibus, utrinque setis longis hirsutissimis, supra lineolatis nec tuberculatis, capitulus vix pollicaribus globosis brevissime pedunculatis, inferioribus omnino sessilibus, solitariis in summitate ramorum, ubi folia floralia deflexuere, quasi spicam glomeratanam interruptam constituentibus, bracteis interioribus  $\frac{1}{4}$  pollices longis lanceolatis obtusis integrerrimis erecto-patulis, capitulum (i. e. calyces cum bracteolis) superautibus, exterioribus oblongis obtusis apice patulis integrerrimis brevioribus. A G. bicipite differt hirsutie, foliis basi obtusis inæqualibus grosse dentato-crenatis latioribus neque basi attenuata in petiolum descendenteribus, bracteis interioribus longioribus fastigiatisque, ramis florigeris magis elongatis. (v. s. in h. Wall. Hook. et Mart.)
9. G. CAPITATA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), caule fruticuloso hirto, foliis ellipticis acuminatis basi acutis subduplicato-serratis inæqualibus multiplinervis spicisque axillaribus et terminalibus fasciculatis globosis hirtis, bracteis ovalibus apice dentatis spicam æquantibus.  $\mathfrak{L}$  In Nepaliâ (Wallich, h. Bentham, specim. cultum). Ruellia capitata Wall. cat. n. 2351. A G. bicipite differt: caule foliisque brevibus hirsutulis, foliis supra papillulis exiguis asperis vel minutim nec consertim lineolatis subserrato-dentatis dentibus haud raro alternis sat regulariter minoribus, pedunculis sëpe compositis fasciculatis vel umbellaribus, bracteis majoribus ovalibus obtusis apicem versus dentato-serratis, bracteolis oblongis obtusis membranaceis calyce triplo fere brevioribus birtulis nec setoso-ciliatis, calycis lacinias brevioribus, superiore paule longiore. A G. glomerata imprimis foliis basi acutis nec obtusis, et spicis axillaribus pluribus longius pedunculatis bracteisque brevioribus latioribus dentatis imbricatum tectis distinguitur. (v. in h. Wallich et Bentham.)
10. G. BRACTEATA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), caule erecto quadrialato hirto, foliis ellipticis cuspidatis basi cuneiformi sessilibus æquali-

bus serratis multiplinerviis pubescenti-scabris, capitulis axillaribus aggregatis terminalibusque umbellatis.  $\mathcal{L}$  (Ex h. fere toto indicō Heyne!). Ruellia bracteata h. Heyuc Wall. cat. n. 2357. Caulis herbaceus, bipedalis et altior, erectus, strictiusculus, quadrangularis, angulis alato marginatis. Folia 9 poll. longa,  $3\frac{1}{2}$  lata, brevi sed angusto cuspidé, basi cuneatim in petioli formam attenuata, mucronato-serrata, serraturis incurvis. Pedunculi axillares, gemini vel terni, inæquales; medius sub divisione foliis duobus oblongis præditus, reliqui breviores monocephali aphylli. Capitulum medium bracteis duabus majoribus longe acuminatis quasi involucratum. Corolla  $\frac{3}{4}$  pollices longa, pubescens. (v. in h. Wallich).

- 11. *G. BIBRACTEATA*, herbacea, caule ramosissimo divaricato procumbente, foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis serratis puberulis in petiolum mediocrem desinentibus multiplinervibus, capitulis axillaribus terminalibusque brevipedunculatis bifloris, bracteis duabus (foliis floralibus) ovalibus foliaceis serratis valvatim tectis.  $\mathcal{L}$  Iu ins. Java (Blume! Zollinger! pl. jav. n. 1272 in h. DC.). Strobilanthes bibracteata Bl. bijdr. p. 799. Folia mollia, inæqualia, majus 4-5 poll. longum et  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  poll. latum. Rami spiciferi breves, patentes, foliorum parvorum jugo præediti. Folia involucrata parum inæqualia, 1 poll. longa, 6 lin. lata, acuta, apicem versus obtuse serrata. Bracteæ communes duæ, suboppositæ, lineari-oblongæ, venoso-nervosæ, 6-7 lin. longæ, glabrae, membranaceæ, apice nonnihil dilatatae teneriores obtusæ, acute 5-6-dentatae. Bracteolæ calyce breviores. Calyx laciniaæ membranaceæ, lineari-lanceolatae. Corolla anguste infundibuliformis, longa. Antheræ ovales, breves, cordatae, obtusæ, valvulis margine membranaceis. Fructum non vidi. (v. in h. DC.)

- 12. *G. MYRTINIA*, herbacea, glabra, caule ramosissimo, foliis æqualibus lanceolatis acumine obtusiusculo inæqualiter undulato-crenatis multiplinervibus, capitulis axillaribus terminaliæ brevipedunculatis bifloris, bracteis quatuor cruciatis integerrimis obtusis, exterioribus oblongis interioribus ovatis duplo brevioribus.  $\mathcal{L}$  Paradenia in Ceylon (Macrae!). Myrtinia lanceolata Macrae! n. 373 in h. soc. hort. Lond. et ex eo in h. Benth. Accedit ad *G. bibracteata*. Involuci foliis exteriora  $\frac{3}{4}$  poll. longa. Calyx coloratus, chartaceus, semiopercularis, laciiniis lineari-lanceolatis canaliculatis acutiusculis glabris. Bracteolæ calyce duplo breviores, lanceolatae, obtusæ, teneriores. Corolla opicularis. Stamina perfecta non vidi. (v. in h. Benth.)

- 13. *G. NUTANS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), foliis ovalibus basi apiceque acutis inæqualibus serratis multiplinerviis hirsutis spicis axillaribus terminalibusque oblongis glabris nutantibus fructiferis sæpe erectis, bracteis ovatis deciduis, caule fruticuloso basi repente.  $\mathcal{L}$  In montibus prov. Sillet et Nepaliâ (Wallich!), (h. DC.). Ruellia glomerata Wall. cat. n. 2361 ex parte. Ruellia strobiliua Wall. cat. n. 2362. Ruellia hirta Don! fl. nep. p. 119 n. 1 (nec Vahl). Fruticulus parvus, 1-2 pedes altus, a basi trichotomoramosus, teretiusculus, cortice aspero tuberoso cinereo, inferne procumbens et hinc iude fibri singulâ repens, nodosus, nodis annulo ciuctis; rami juniores quadrangulari, compressifusculi, hirsuti. Folia superiore majora, 4-5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, utrinque acuta nec valde attenuata, apicem versus satis grosse serrata, serraturis latiusculis callo mucronatis, utrinque scitis conicis hirsuta. Calyx  $2\frac{1}{2}$  lin. longus. Corollæ pollicaris, faux a tergo barbata. (v. in h. Wall., Lambert, Mart., DC., berol. etc.)

- 14. *G. DALHOUSIANA*, foliis ovalibus basi apiceque acuminatis inæqualibus serratis cauleque herbaceo hirsutis, spicis terminalibus (axillaribusque?) ovalibus glabris, pedunculis erectis strictis, bracteis subrotundidis concavis caducis.  $\mathcal{L}$  Ad Simla Indiæ or., Septembri (lady Dalhousie! in h. Wight). Accedit maxime *G. nutanti*, a quâ differt: caule herbaceo erecto foliisque strictioribus, spicis brevioribus in pedunculis validis strictis erectis, bracteis duplo minoribus subrotundidis. (v. in h. Wight).

15. *G. FLEXUOSA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis inæqualibus serratis multiplinerviis, capitulis terminalibus, caule repente. ♂ (Ex h. Wight! loco natali accuratus non notato). *Ruellia flexuosa* Wall. cat. n. 2412. Fruticulus  $1\frac{1}{2}$ -2-pedalis et forte major, a basi divisus, procumbens. Folium alterum 3 poll. circiter longum, 1 poll. latum, in acumen obtusum attenuatum, in petiolum brevem cuneatim decurrens, in medio obtuse calloso-serratum, supra dissidente lineolatum, utrinque ad nervos pubescenti-scabrum; ramis costalibus quinis sensive, alterum duplo fere minus, petiolo breviori, acumine quam pro magnitudine reliquæ partis longiore, cæteris consimile. Pedunculus in ramis terminalis, solitarius, interdum et geminus. Capitulum subglobosum, piso duplo fere majus. (v. in h. Wight.)
16. *G. PENTSTEMONOIDES* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis inæqualibus serratis multiplinerviis, spicis terminalibus primum capitatis demum elongatis denudatisque, caule erecto stricto tetragono. ♂ *Gregaria*, floret quotannis (Edgeworth!): in Nepalia (Wall. h. Mart. ex h. Lambert!, h. DC. a Wall. miss.), in Himalayâ, Massuri, alt. 6000-8000 ped., Septembri (Edgeworth!). *Ruellia pentstemonoides* Wall. cat. n. 2340. *Ruellia cephalotes* Wall. cat. n. 2352 (planta incunite florescentia, ubi spicæ adhuc clausæ et globosæ sunt). *Ruellia capitata* Don! fl. nep. p. 120 (folia autem pilosissimæ dicuntur; an cum G. capitata confusis speciminiibus?). Similis *G. flexuosa*, sed differt caule erecto stricto alternatim profunde quadrangulo purpurco glabro, foliis glabris, capitulis in caule ramisque geminis ternis longius pedunculatis subcorymbosis, bracteis trapezoideis (concavis at in illâ) mucronatis, nec orbiculatis emarginatis, bracteolis ex oblongo cymbiformibus incurvis, bracteis duplo minoribus. Corolla pollicaris longiorisque laciniae emarginatae sunt; color cœruleus. Reliquis omnino fere cum dictâ specie convenit. (v. in h. Wall., DC., Edgew. etc.)
- $\beta.$  *monocephala*, spicâ solitariâ terminali. — In Nepal (Wall.! n. 2352 in h. Hook.). *Ruellia pentstemonoides* affinis Wall. l. c. (v. in h. Hook.)
17. *G. PANICULATA*, caule herbaceo tetragono foliisque ovalibus caudato-acuminatis inæqualiter erenato-denticulatis glabris, spicis subglobosis parvis in ramis paniculatis trifidis, bracteis parvis ovali-oblongis bracteolique et calycis lacinii lanceolato-oblongis obtusis rigidis apicem versus lacero-ciliolatis, corollæ lacinias bifidis. ♂ In insulâ Javâ (Horsfield! in h. Arnott, lady Dalhousie! in h. Hook.), in silvis septentrionalibus montis Banggerango alt. 5000 ped., Martio (Junghuhn!). Species similis *G. pentstemonoides* Wall., sed diversa ramis floriferis oppositis longis semel bisve trifidis, ramulis fere pollicaribus spicâ parvâ ovato-subrotundâ terminatis, quarum bracteæ rigidæ cum bracteolis calyceque ciliatae periclinium Synanthera cujusdam optime referunt. Corolla pallide azurea, pubescens,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longa, fance inflatâ, lacinias limbi ovatis bifidis obtusis. Stamina 4, didynama ut in Strobilanthe; anthera ovales, muticæ. Ovarium quadriovulatum. Folia majora 6 poll. (cum petiolo pollicari) louga, 2 poll. lata, minora (cum petiolo  $\frac{1}{2}$ -pollicari) 4 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  vix lata, omnia in acumen (seu cuspidem) longum angustum excurrentia, glabra aut setulâ hinc inde adpersa. (v. in h. Arnott et Hook.)
- $\beta.$  *alata*, pedunculus crassioribus subtetrapteris, bracteis apice subintegerrimis. In ins. Java (Blume!, Zollinger pl. jav. n. 2021, Moritzi in Zoll. pl. jav. p. 47, in h. DC. n. 847). *Strobilanthes?* *alata* Bl. bijdr. p. 748. (v. in h. DC.)
18. *G. CUSIA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), foliis ovato-ellipticis æqualibus dentatis multiplinerviis, capitulis racemosis. ♂ Ad Gongachora (Hamilt.!). *Ruellia Cusia* h. Hamilt. Wall. cat. n. 2386. Caulis crassus; rami glabri, lenticellati, fusi, tetragonoi, ex opposito canaliculati, juveniles vittis pulverulento-tomentosis a foliorum decussatione descedentibus

- instructi, apice in paniculam trichotomam soluti. Folia subæqualia, 6-7 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{4}$  poll. lata, exquisite acuminatis, in petiolum acute desuentia, toto ambitu confertim dentata. Capitula triflora, pedunculata, opposita racemulos 1-1  $\frac{1}{2}$  poll. longos spiciformes construant. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, anguste infundibuliformis, glabra, cœrulea ?. (v. in h. Wall.)
19. G. ANISOPHYLLA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), foliis oblongis caudato-acuminatis, opposite minimo. ♂ In Sillet (Wall.), Assam (Griffith! in h. Mart. et Hook.). — Bot. mag. t. 3404. Ruellia anisophylla Hook. exot. fl. t. 191, Spr. cur. post. p. 236, Wall. cat. n. 2349 a, b. Ruellia lanceifolia ? Car. in h. Arnott. Kuellia amygdalæfolia hort. apud Steud. nomenc. ed. 2 p. 480. (v. v. c. et sicc. in h. DC. cte.)
20. G. ISOPHYLLA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88), foliis lanceolatis æqualibus remote serrulatis septuplinerviis. ♂ (Ex hort. bot. calc. c montibus Sillet introducta, ex horto Pamplemousse in h. DC.!), Assam (Griffith! in h. Hook.). Ruellia Wall. cat. n. 7162. Gendarussa Neesiana h. Pamplemoussensis in insulâ Mauritiî in h. DC. ex hort. bot. Calc. Similis G. anisophyllæ, sed ramis foliisque gracilioribus differt. Folia cujusque paris æqualia, 2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 5 lin. lata, lanceolata, acuminata, basi attenuata, in petiolum 2-lineareum decurrentia, remote appresso-serrulata, utrinque confertim lineolata, glabra. Pedunculi oppositi, plerique trifidi. Corolla pollicé longior. (v. in h. Wall., DC., et Hook.)
21. G. FILIFORMIS, foliis ovali-oblongis candato-acuminatis glabris basi longe attenuatis calloso-serrulatis inæqualibus petiolatis multiplinerviis, pedunculis axillaribus simplicibus trifidisve apice diphyllos, floribus brevispicatis cito denudatis, bracteis fugacibus calycibus glanduloso-pubescentibus. ♂ In silvis altioribus montis Burangrang, etc. Java, Augusto (Blume, Junghuhn). Strobilanthes filiformis Bl. bijdr. p. 800. Foliorum cujusque paris alterum cum petiolo fere tripolligarc,  $\frac{1}{2}$  poll. latum, alterum duplo minus. Spica primum subcapitata, niox cadentibus bracteis rhachique paulo crescente circiter semipolligares, cernuæ. (v. in h. Junghuhn).
22. G. DIVARICATA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 89), foliis oblongis acuminatis serratis inæqualibus subsessilibus multiplinerviis, pedunculis axillaribus trifidis, floribus disse spicatis, fructibus reflexis. ♂ In Nepaliâ summa ad Emodum (Wall.). Ruellia divaricata Wall. cat. n. 2372. Fruticulus, ramis tortuosis flexuosis articulatis ad articulos nodosis tetragonis glabris, circa basin ob articulos primordiales breviores elevato-annulatis, medullâ inultâ refertis, pallidis. Corolla  $\frac{3}{4}$  poll. longa. Capsula 4 lin. longa. (v. in h. Wall.)
23. G. COLORATA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 89), glabra, foliis ovato-oblongis acuminatis calloso-crenato-serratis, opposite minore, capitulis paniculatis paniculæ ramifications glabris. ♂ In Borgorâ, Novembri (Hamilt.), Assam Griffith! in h. Hook.). Ruellia colorata h. Hamilt. Wall. cat. n. 2388. Tota glabra, lœvis. Caulis herbaceus, erectus, simplex, quadrangulus. Folia inferiora 7-8 polices longa,  $2\frac{1}{2}$  lata, quæ sequuntur decrescent paulatim breviorique gaudenti petiolo basique magis obtusa, sumnum denique fere sessile,  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{4}$  pollicum longitudine, oppositum quodque folium dimidio minus est. Panicula caulem terminans pedalîs, supra decomposito-trichotoma, ramis erectis gracilibus, extremis fere filiformibus. Calyx ad  $\frac{1}{2}$  quinquefidus, glaber; laciniae lanceolato-lineares vel oblongo-lineares, obtusæ, emarginatæ, chartaceo-membranaceæ. Corolla pollicé longior, purpurea ? elongato-infundibuliformis. (v. in h. Wall. et Hook.)
24. G. CRINITA, foliis oblongo-ovalibus acuminatis calloso-serratis basi attenuatis congruis cauleque glabris, pedunculis axillaribus trichotomis gracilibus patenti-hirsutis in terminalem nudam coeuntibus, pedunculis unifloris clonatis, calycibus nudis glabris. ♂ Assam (Griffith!). Similis G. colo-

ratæ, differt floribus non capitatis laxissime paniculatis. Rami costales foliorum septeni. Calycis lacinia lanceolatae, obtusiusculæ. Corolla elongato-infundibuliformis, pollicaris. (v. in h. Hook.)

XLII. STROBILANTHES Blume bijdr. p. 781 et 796, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 84, Endl. gen. p. 700, Meisn. gen. p. 295 (203.) — *Martynia Moon cat. pl. ceyl.*

Calyx subæqualis, ad basin quinquepartitus, laciñiis herbaceis linearibus apicem versus quandoque latioribus. Corolla infundibuliformis, tubo in limbum campanulatum non abrupte transeunte; laciñiæ æquales vel subæquales limbo raro subbilabiato, rotundatae vel emarginatae. Stamina quatuor, didynama, faucium medio inserta, plerumque non prominentia. Filamenta omnia in quibusdam basi membranâ conjuncta, monadelpha; in unâ specie (Str. recurrente) accedit rudimentum filamenti quinti. Antheræ oblongæ, muticæ, loculis parallelis contiguis æqualibus in quibusdam basi divergentibus, connectivo latiore unde anthera sagittata. Stigma subulatum, incurvum vel involutum, dorso spongiosum, canaliculatum. Capsula columnaris, tetragona, fere ad basin bilocularis, in medio tetrasperma. Dissepimentum tenue, sursum incompletum, adnatum, a valvulis quandoque solubile. Semina discoidea, angulata, in ambitu utrinque areolata, angulo juxta hilum magis prominulo, retinaculis uncinatis suffulta. — Frutices et herbae Indiae orientalis. Spicas magis minusve densæ, axillares, terminalesque, erectæ, cernuæ vel nutantes. Bracteæ foliaceæ vel foliaceo-membranaceæ, persistentes vel caducæ floresque denudantes. Bracteolæ parvæ, quandoque nullæ. Flores e majoribus teneri vel albi.

#### A. GENUINI. *Spicæ densæ strobiliformes.*

##### § 1. *Bracteis herbaceis rigidulis. Spicis erectis.*

\* *Staminibus monadelphis.*

1. S. SESSILIS (N. ab E. in h. Wight. n. 1936 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85), suffruticosus hirsutissimus, caule erecto quadrangulari, foliis sessilibus ovatis acuminate crenatis, spicis axillaribus oppositis terminalique, bracteis ovatis cuspidatis. ♂ In Indiâ orientali (Russell! in h. Benth.) Nilgherry (Wight! Schmidt), copiose in silvaticis circa Atacamundi in Neelgherries, floret ab Oct. in Dec. (Perrottet! in h. DC. n. 231 et 235). — Hook. bot. mag. t. 3902. Caulis 2-3-pedalis circiter. Folia virg. pollicaria, ovata vel subcordata, confertim crenata. Spicæ pollicares. Calyx 6 lin. longus, laciñiis lanceolatis, duabus infimis angustioribus. Corolla pollicaris, pallide cœrulea. Stamina basi brevi spatio monadelpha, membranâ conjuncta. Capsula oblonga, lœvis, obtusa, basi parum attenuata, elocularis, in medio 4-sperma. (v. in h. Wight.)

\*\* *Filamentis basi liberis.*

2. S. ROSEUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 84), fruticosus, foliis lanceolatis subtus lanuginoso-canis, spicis terminalibus corymbosis glandulosohirtis. ♂ Ad Tbaong dong regni Avæ (Wall.). Ruellia rosea Wall. cat. suppl. n. 7154. Rami tetragoni, glabri, ad genicula fimbriati. Folia 3½-7 poll. longa, 8 lin.-1½ poll. lata, acuminata, rigida, supra lineolata, glabra, subtus lanuginoso-cana. Corymbus terminalis, trichotomus, foliis in lanceolato-linearia et linearia de crescentibus interstitiis. Spicæ vix pollicares, ovatae. Bracteæ 3 lin. longæ, ex ovario oblongæ, setaceo-cuspidatae. Bracteolæ calycis longitudine, lanceolatae. Corolla pollicaris, rosea ex Wall. (v. in h. Wall.)

3. S. SCABER (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 84, Wight h. propr. n. 1945),

fruticosus, caule hispido, foliis obovato-ellipticis dentato-crenatis supra lineolatis exasperatis setulosis dissitis hirtis subtus subtilis, spicis infraterminibus oppositis, terminalibus teruis glandulosis, bracteis lanceolatis, acumine obtuso. ♂ In Indiâ orientali. — Bot. reg. 1811. app. p. 32. Caulis quadrangularis, setulis parvis crassis scaberrimus. Folia 6-8 poll. longa, 3 poll. lata, inferiora obovata, obtusa, cuncta obuse nec profunde dentata vel crenata. Inflorescentia terminalis, 1  $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, rhachi pedunculisque lanatis et glanduloso-viscidis. Spicæ vix semipollulares, ovatæ. Bracteæ quadrifariam imbricatæ, vix semipollulares, ex oblongo lanceolata, longe cuspidato-acuminatae, acumine obtusiusculo, extus donec glanduloso-hirtæ. Corolla pubescentia, purpurascens, limbi lacinias ovatis, tribus superioribus paulo majoribus; faux lineis quinque villosis cum staminibus alternantibus tubusque quatuor ejusmodi lineis a filamentis descendantibus notatus. Capsula semipollularis, oblonga, acuta, tetragona, pubescens, nitida, ferruginea, ad basin bilocularis et prope ad basin tetrasperma. Retinacula maxima, conica, supra excavata. Semina ovata, compressa, levula.

α. foliis supra setulis inspersa, inflorescentiâ lanuginosâ. — In collibus Promæ oppositis regni Avæ. Ruellia scabrida Wall. cat. n. 2393 c. (v. in h. Wall.)

β. foliis aspermis. Ruellia scabra h. Wight. Wall. cat. n. 2377. Foliis differt supra aspermis quibusdam late ovatis, aliis rugosissimis simulque aspermis, spicis terminalibus ternis basi duobus communibus oblongis basi augustioribus quasi involucratis. (v. in h. Wall. et Wight.)

4. S. TIMORENSIS, sufruticosus, caule erecto apice corymboso, foliis lanceolatis acumine obtuso grosse repando-serratis in petiolum attenuatis supra dissite hirtis demum glabrescentibus, spicis circa apices caulis et ramorum alternis oppositivè brevipedunculatis subglobosis basi foliaceo-involucratis, bracteis ovato-lanceolatis acumine obtuso glanduloso-villosis. ♂ In insulâ Timor (h. Nees). Similis S. scabræ, sed differt foliis minoribus multo angustioribus, grossius repando-dentatis. Caulis obtuse tetragonus, lateribus sulco notatus, juvenilis pubescens. (v. in h. Nees.)

5. S. CRISPUS (Blume bijdr. p. 798), fruticosus, hispidulo-scaberrimus, caule adscendente, foliis ovalibus utrinque angustioribus apice obtuso undulato-dentato-crenatis supra lineolatis exasperatis setulosis dissitis scabris, spicis infra-terminalibus oppositis, terminalibus ternis hirsutis, bracteis ovatis obtuse acuminatis. ♂ In umbrosis montanis prov. Tjanjor et Cheribon insulae Javæ, floret toto anno (Blume! Junghuhn!), in dumetis umbrosis Ronkop montis (Junghuhn!) — Hassk. hort. bog. cat. alt. p. 149, Zollinger pl. jav. n. 2342. Differt a S. scabro imprimis bracteis duplo latioribus spicisque propterea densius imbricatis. A S. glaucescente distinguitur statuâ minore, foliis brevioribus et latioribus, bracteis non tam evidenter costatis, corollæ limbo longiore. Corolla cornuta, 9 lin. longa. (v. in h. Jungh. et Nees.)

6. S. GLAUCESCENS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85), fruticosus, caule erecto teretioso scabro, foliis oblongis utrinque attenuatis crenulatis subtus ad costas scabris glaucescentibus, spicis terminalibus, bracteis ovatis obtuse cuspidatis hispidis. ♂ E montibus Promæ regni Avensis (Wall.). Ruellia glaucescens Wall. cat. n. 7155. Caulis stricte trichotomus, cortice albido minute scabrat. Folia 3  $\frac{1}{2}$ -5 poll. longa, supra dense lineolata, rigidula, glaucescentia, subtus ad costas scabriuscula. Spicæ 1  $\frac{1}{2}$ -1  $\frac{1}{2}$  pollices longæ, ovato-cylindricæ, in apice ramorum sessiles, solitariae vel geminæ, tetragonæ, foliorum pari angustiorum vel singulo folio dense crenato aspero stipatae. Bracteæ ovatæ vel subcordatæ, basi contractæ, in acumen obtusiusculum longum productæ, 7-9-nerves, herbaceæ. Bracteole calyce quadruplo breviores. Corolla circiter 1 poll. longa, purpurea, anguste infundibuliformis. Filamenta brevia, hirsutissima, per paria basi connata, staminum minorum adeo contracta, ut antheram oblique basi filamenti majoris inhærente arbitreris. (v. in h. Wall.)

7. S. BARBATUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85, Wight h. propr. n. 1947), caule fruticoso, foliis ovalibus utrinque acuminatis crenulatis glabris, spicis axillaribus oppositis ovatis brevissime pedunculatis, bracteis orbiculatis linearis-cuspidatis, corolle bilabiata labio superiore barbato. ♂ E montibus Courtallum (Wall.). Ruellia ciliata h. Madr. Wall. cat. n. 2392 (ex parte). Caulis quadrangulus, glaber, angulis inferis geniculorum marginatis. Folia fere S. ciliati, sed majora et latiora, glaberrima. Spicæ petioli longitudine, axillares, oppositæ, erectæ, ovales, capituliformes, cum pedunculo linearie vix semiuncia longiores, squarroso-imbricate. Bracteæ glabrae, nervoso-venosæ, serrulato-ciliatae, 5-6 lin. longæ, inferiores parum majores, subrotundo-cuspidatae, superiores orbiculatae ex apice obtusissimo acumen fere filiforme longitudine ipsius bracteæ recurvum emitentes. Bracteolæ longitudine calycis. Calyx 5-6 lin. longus, glaber, ad  $\frac{2}{3}$  fissus, interstitiis demum profundius dehiscentibus. Corolla  $\frac{5}{4}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longa, limbo subbilabiato; lacinia supera latior, bifida, intus albo hirsuta et ad incisuram barbata; lacinia tres inferiores subæquales, ovato-oblongæ, obtuse. Faux et filamenta hirsuta. (v. in h. Wall.)

§ 2. *Bracteis herbaceis rigidis, spicis cernuis.*

\* *Staminibus monadelphis.*

8. S. PERROTETIANUS, fruticosus, ramis rufo-hirsutissimis, foliis ovatis caudato-cuspidatis undato-crenatis hirsutis supra rugosis asperrimitis, spicis axillaribus oppositis secundis ovalibus nutantibus densis hirsutis, bracteis ovatis acutis interioribus majoribus tenerioribus coloratis, staminibus monadelphis. ♂ Frequens in sylvaticis circa Utacamund prov. Nilagiricæ in Indiâ orientali, floret a Martio in Majum (Perrottet! in h. DC., in h. mus. paris. ! n. 258 [126]), Mayaburam (Sir F. Adam! in h. Hook.). Quod ad habitatum accedit S. lupulinum, sed distinguitur ab hisce staminibus basi membranâ conjunctis omnique flore omnino ad typum floris S. Brunonianæ et monadelphi constructo. Frutex erectus, dumosus, 3-8 pedes altus, setis fusco-purpureis dense vestitus, astate glabrescens. Folia 6-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 2-1 $\frac{1}{4}$  poll. lata, hirsuta. Pedunculi 1 $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longi, simplices vel bi-trifidi, nudi, rarius diphylli. Spicæ pollicares, densæ, hirsutæ. Corolla pallide cœrulea, circiter 9 lin. longa, tubo angusto, faucibus inflatis. Stamina intra fauces latentia, membrana hirsuta conjuncta; filamenta gracilia, villosa; antheræ ovales. Capsula 6 lin. longa, oblonga, acuminata, basi in unguem brevem contracta, compressa, lateribus planis chartaceis, in medio disperma. (v. in h. DC., Mus. paris., Hook. et Nees.).

\*\* *Filamentis basi liberis.*

9. S. ARNOTTIANUS, totus e tuberculatis hispidus, caule herbaceo geniculato-erecto, foliis ovalibus denticulatis acuminatis acumine obtusiusculo basi obtusis, pedunculis axillaribus folio longioribus geniculato-flexuosis foliosis simplicibus trifidis, spicis ovalibus cernuis, bracteis ovalibus obtusis herbaceis calycibusque densius strigosis. ♂ In ins. Ceylon (Walker! in h. Arnott). A reliquo Indicis, excepto S. punctato, quos vidi, jam solis foliis basi obtusis, strigositate eximiâ ramulisque spicigeris sive pedunculis geniculato-infractis affatum distinguuntur. Tota planta setulis albis radicatis patentibus hirsuta et aspera. Folia floralia 2 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{4}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, ovalia, basi obtusa, apice cuspidato-attenuata, acumine angusto quidem at obtuso. Petioli graciles, pollicares, hirsuti. Alterum folium cujusque paris minus. Rami florentes axillares, oppositi, inæquales, 2 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ -1 poll. longi, bi-trinodes, ad genicula infracti, foliisque minoribus ovatis subserratis sessilibus prædicti, ex axillis ramuliferi aut saltē gemmuliferi. Spicæ nunc in apice rami solitarie, nunc, ubi ramus dividitur, in singulo ramulo singulæ, brevi-pedunculatae, cernue,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longæ. Calyx 6 lin. longus, usque ad basin quinquepartitus, laciinis æqualibus lineari-lanceolatis obtusiusculis extus et in ambitu dense strigoso-hirsutis. Corolla calyce paulo longior, conico-infundibuliformis, lutea. (v. in h. Arnott.)

10. *S. FIMBRIATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86), caule fruticoso, foliis oblongis utriusque acuminatis denticulatis glabris, spicis axillaribus alternis sessilibus hirsutis, bracteis ovatis cuspidiatis inciso-serratis, duabus inferis truncatis, corolla regulari. ♂ In montium Sillet iuglo Ruellia fimbriata Wall. cat. n. 2363. A *S. barbato* differt caule superne hirsuto basin versus aspero, nodis geniculorum altero latero maxime tumidulis, angulis inferis eorum non alatis, foliis oblongis  $4\frac{1}{2}$  poll. longis  $1\frac{1}{2}$  latis longe acuminatis distincte et confertim denticulatis, spicis alternis rufo-ciliatis et ob bracteas inciso-serratas apice patulas subcristatis, corollis multo majoribus. Folia supra confertissime lineolata. Spicæ alternæ, ovatae, sessiles, cernuæ, subsecundæ, solitariae, semipollicares. Bracteæ quadrifariam imbricate, patulae, herbaceæ, dorso lineolato-scabreæ, semipollicares, margine setis e fusco ferrugineis ciliatae, apicem versus inciso-serratae, serraturis angustis obtusis, venoso-nervosæ; infimi paris latiores, truncato-retuseæ, toto margine supero incisulae, tum reliquæ ex ovatis cuspidiatis basi cuneatis in oblongas acuminatas transeuntes. Bracteoleæ bractearum longitudine et structurâ, lanceolatae, acuminatae. Corolla fere sesquipollucaris, purpurea. (v. in h. Wall.)
11. *S. WIGHTIANUS* (Wight cat. n. 1980), hirsutissimus, caule erecto tetragono, foliis ovatis petiolatis undulato-crenatis rugosis, spicis axillaribus oppositis terminalique, bracteis foliaceis ovatis, corolla bractea paulo longioris laciniis emarginatis. ♀ In Nilghery (Wight !), Utacamund in Nilghery (Perrottet! n. 188 in h. mus. paris. n. 132). Caulis pedalis et altior, strictus, crassiusculus, setis crassis longis articulatis patentibus vel reclinatis hirsutissimus uti tota planta canescens, Marrubium fingens. Folia opposita, 2 poll. longa, petiole  $\frac{1}{3}$  poll. longo addito, 1 poll. fere lata, undique hirsutissima, venis multis arcuatis supra immersa penninervia; ramca minora, subtundata. Pedunculi axillares,  $1\frac{1}{2}$  poll. longi, hirsutissimi. Spicæ magnitudine cerasi medocris, ovatae vel subglobosaæ, cernuæ. Bracteæ dense imbricate, apice patulae, foliaceaæ,  $\frac{1}{2}$  pollicem longæ et paulo longiores, ovato-acuminatae, obiter crenulatae, nervo medio basi incrassato, cæterum foliis similes magisque etiam hirsutæ, intimæ denique submembranaceaæ. Corolla 8-9 lin. longa, ignea-aurantiaca; limbus quinquefidus, subæqualis, laciniis obovatis emarginatis, laciniulis rotundatis alternantem ciliatis extus hirsutulis. Fauces intus hirsutæ. (v. in h. Wight. et paris.)
12. *S. VESTITUS*, herbaceus, hirsutus, caule erecto, foliis ovalibus vel ovali-oblongis argute acuminatis basi obtusiusculis vel acutiusculis minutim denticulatis serrulatis utrinque hirsuto-subtomentosis, spicis in ramis geniculatis subsessilibus oblongis hirsutis, bracteis ovalibus sessilibus acuminatis apicem versus subserratis calyce longioribus, calycis grandiusculi laciniis lato-lanceolatis acutiusculis hirsutis, bracteolis calyci conformibus subduplo brevioribus. ♀ In ins. Ceylon (Walker! in h. Benth. et Hook.). Accedit ad *S. parabolicum*, sed differt foliis angustioribus, bracteis simpliciter acuminatis acumine passim obliquo, calyce majore, etc. Capsula fusca, nitida. (v. in h. Benth. etc.)
13. *S. PARABOLICUS*, fruticosus, hirsutus, caule erecto, foliis ovatis acuminatis acuminie obtuso basi acutiusculis dense crenatis, spicis axillaribus terminalibusque ternis capitatis globosis hirsutis, pedunculo communis petiolum subæquante erecto, bracteis superioribus parabolicis (subrotundis in acumen breve obtusum repente contractis), bracteolis brevissimis hirsutissimis. ♂ In ins. Java, in silvis lateris septentrionalis montis Panggerango alt. 7000 ped., Aprili (Junghuhn!). Differt a *S. criso* hirsutie omnium partium, saturâ altiore, spicis globosis bractearum acumine duplo breviore, bracteolis hirsutie tectis calyce apice hirsutissimo multo brevioribus. — Stamina hirsuta, majora limbum æquantia. Antheræ late sagittatae, breviorum staminum inæquilateræ. Ovarium apice barbatum. Faux corolla hirsuta. (v. in h. Junghuhn.)
14. *S. EROSUS*, caule suffruticoso foliisque oblongis utrinque acutis breviter petio-

- latis denticulatis asperulis, spicis axillaribus terminalibusque pedunculatis basi foliis duobus caulinis conformibus sessilibus stipatis ovalibus, bracteis foliaceis ovalibus oblongis obtusis apice repando-crenatis scabris inferioribus sterilibus. ♂ In ins. Java (Zollinger ! pl. jav. n. 2027 in h. DC. n. 848). Similis *S. echinato*, a quo differt foliis non evidenter crenatis, spicis majoribus, bracteis apice haud serratis. An hujus loci *S. bibracteata* Bl.? Capsula subsexangularis. An Goldfussiæ generis? (v. in h. DC.)
15. *S. ECHINATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85), caule fruticoso foliisque oblongis utrinque acuminate mucronato-serratis setuloso-scabris spicis axillaribus alternis terminaliisque breviter pedunculatis bracteis ovalibus obtusis serratis hispidis, bracteolis calycibusque linearibus apice serratis. ♂ In montibus prov. Sillet. *Ruellia echinata* Wall. cat. n. 2356. *Ruellia pectinata* Wall. in h. gen. berol. n. 2356. Modo crescendi habituque similissimus *S. fimbriata*, differt caule setis rigidis multiarticulatis incurvis hispidissimo setis que ejusmodi in omnibus partibus viridibus ovulis in foliis circa nervos et margines dispersis in bracteis confertioribus, spicis duplo fere majoribus pollicaribus in pedunculo  $\frac{1}{4}$  pollicis longo cernuis oblongis inferne saepè sterilibus, bracteis majoribus obtusis superiore parte dense serratis serraturis apice glandulosis, hispidulis quidem, nec vero rufo-ciliatis, bracteolis et calycibus linearibus hirtis apice serratis, serraturis calycis paucis. (v. in h. Wallich.)
16. *S. VERRUCULOSUS*, fruticosus, caule inferue glabrescente ad angulos tuberoso apicem versus incano pubescenti-glandulosus, foliis ovali-oblongis acuminatis in petiolum brevem acute desinentibus crenatis supra subtusque in costis laxe hirsutis, spicis axillaribus oppositis ovatis folio brevioribus, pedunculo infra apicem diphylo infracto, bracteis oblongis obtusis dense pubescenti-glandulosis, inferioribus patentibus magis herbaceis crenatis saepè sterilibus, bracteolis calyce linear-lanceolato brevioribus angustioribusque. ♂ In Indiâ orientali (h. Hooker!). *Ruellia imbricata* h. Hooker. *S. Timorensi* affinis videtur. Ovarium 4-ovulatum videbatur; sed unum tantum examinavi idque imperfectum, ut igitur dubia restent, numne sit *Ruellia* generis civis. Corolla pollicaris. (v. in h. Hooker.)
17. *S. WALKERI* (h. Aruott.), caule fruticoso glabro aspero, foliis ovalibus acuminatis basi acutis undulato-crenulatis utrinque scabris, capitulis axillaribus oppositis terminalibusque spicatis nutantibus ovatis breviter pedunculatis pauciifloris, pedunculis 1-3-stachyis, bracteis ovalibus bullato-rugosis, glabriusculis, staminibus exsertis. ♂ In ins. Ceylon (Walker! in h. Arnott, Hooker et Bentham). Caulis fruticosus, medullâ sat amplâ, tetragonus, glaber, punctato-asper, purpureus; rami longi, flexuosi. Genicula tumidula. Folia inæqualia, cum petiolo  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$  poll. longo aut paulo longiore hispidulo 4-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, ovalia, acuminata, basi acuta, margine minutim undulato-crenata, rigidula, supra setulis in callis radicantibus aspera subinde bullato-rugosa, subitus ad costas venasque scabra; costæ 5-6næ et venæ conjunctivæ arcuatæ, prominulæ. Pedunculi axillares plerumque simplices, oppositi, 3-4 lin. longi, crassi, sulcato-striati, hirti, 1-3-flori; superiores subinde et axillares elongati, flexuosi, recurvi, nudi, spicati, spicis 4-10 secundis sessilibus cernuis. Spicæ ovales, 6 lin. longæ, 4-3-floræ. Bracteæ 4-6 arcte cruciatim imbricatae, 5 lin. longæ, 3 lin. latæ, ovales, obtusæ, herbaceæ, apicem versus crenato-serrulatae, glandulos-punctatae et in dorso hispidulæ, costâ mediâ basi maxime dilatata venisque costalibus 4-5nis in superiori paginâ quam maxime prominentibus, quo fit, ut ab alterâ parte bullæ intercostales geminæ ternæve concatenatae eleventur. Corolla 6 lin. longa, reticulata et glandulos-punctata, extus glabra, pallida, limbo æquali patente laciniis ovatis acutiusculis fauce barbatâ. (v. in h. Arnott, etc.)
18. *S. LANCEOLATUS* (Hooker), glaber, herbaccus? caule erecto profunde quadrangulari, foliis oblongis caudato-acuminatis acumine obtuso, obiter

repandis glabris in petiolum longe decurrentibus, pedunculis axillaribus terminalibusque folio brevioribus monostachyis apice compressis, spicis subglobosis paucifloris, involucro diphyllo capitulo longiore, foliolis bracteisque oblongis obtusis glabris.  $\mathcal{L}$  In ins. Ceylon (Walker ! n. 187. in h. Hooker). Est species distinctissima, bracteis duabus capitulum 2-3-florum involucrantibus. Folia cum petiolo semipollicari  $3\frac{1}{4}$  poll. longa,  $\frac{1}{2}\frac{3}{4}$  poll. lata, acumine linearie angusto obtuso. (v. in h. Hooker).

§ 3. *Bracteis tenerioribus sœpe et latioribus.*

19. S. PUNCTATUS, caule herbaceo adscendente scabriuscule, foliis ovatis subcordatis obtusis subsessilibus integerim marginे scabris subtus pallidis glanduloso-punctatis, pedunculis axillaribus folio longioribus foliosis simplicibus (trifidisve ?), spicis terminalibus globosis paucifloris, bracteis exterioribus suborbiculariis obtusis ciliatis glandulosi-punctatis herbaceis, calycis laciniis linearibus obtusis coloratis longe ciliatis.  $\mathcal{L}$  In ins. Ceylon (Walker ! in h. Hooker). Folia parva,  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$  poll. longa, 5-3 lin. lata, qua longiora, ea apice magis attenuata. Petioli brevissimi. Spicæ vix semipollicares. Corolla 6-7 lin. longa. Glandulae foliorum subtus prominulæ. Soli S. Arnottiano est confinis. (v. in h. Hooker).
20. S. ADENOPHORUS, herbaceus, glaber, caule teretiusculo ad genicula nodoso, foliis oblongo-ovalibus utrinque acutis integerim lineolatis 9-duplinervibus, spicis axillaribus oppositis pedunculatis subglobosis paucifloris, pedunculo articulato folio breviore monostachyo, bracteis obovato-cuneatis calycisque laciniis late linearibus obtusis apicem versus glandulosi-hirsutis, bracteolis nullis.  $\mathcal{L}$  In ins. Ceylon (Walker ! in h. Arnott. G. 201 et Hooker). Martynia lanceolata Macrae n. 373 in h. Hooker. Caulis, si ramos omnes in unum latus conversos spectas, procumbens fuisse videtur, sesquipedalis, haud crassus, vix manifeste tetragonus, lœvis, glaber, articulis  $1\frac{1}{2}$ -2-pollicaribus basi incrassatis. Folium cum petiolo vix 3 lin. longo angusto canaliculato 3 poll. longum,  $\frac{1}{2}$  poll. latum, acuminatum, basi acutum, glaberrimum, lineolatum, integerimum et subrepandum. Pedunculi oppositi, inæquales,  $1\frac{1}{2}$  poll. longi, glabri, apice monostachyi, aut longiores et compositi, ramulis tunc monostachyis brevioribus. Spicæ semipollicares, subglobosæ, 2-4-flora. Bractæ obovato-cuneatæ, obtuse, 6 lin. longæ, glandulis pedicellatis hirsutæ, rufæ, basi glabriuscule; pars inferioris patentæ. Bracteolæ nullæ. Calyx fructus 6 lin. longus, laciniis æqualibus latiuscule linearibus apicem versus paulo latioribus obtusis inferne pallidis glabris superiora versus rufis et glandulosi-hirsutis. Capsula 7 lin. longa, glabra, rigida, ad medium dissite tetrasperma. (v. in h. Arnott et Hooker.)
21. S. CERNUUS (Bl. bijdr. p. 797), caule suffruticoso basi procumbente ad angulos aspero, foliis ovali-oblongis ntrinque attenuatis dentatis supra puberulis, spicis axillaribus terminalibus subpaniculariis ex subrotundo ovalibus juvenilibus cernuis, bracteis obovatis ventricosis obtusis nervoso-venosis glabriusculis, calycis laciniis lanceolato-subulatis obtusiusculis apice barbatis.  $\mathcal{L}$ ? in montosis Salak insulæ Javæ (Blume), in silvis lat. septentr. montis Pangrango alt. 4-6000 ped. (Junghuhn!), in Javâ (Thunberg!). Ruellia longifolia Thunberg in h. Vahl! A S. involucrato differt statutâ majore, spicis bracteisque duplo minoribus in pedunculis trifidis casu foliorum demum denudatis fere paniculatis, bracteis illis sterilibus ad basin spicæ paulo laxioribus involucrum fingentibus deficientibus. Flores parvi staminibus exsertis, filamentis basi hirsutis. Capsula ovalis, acuta, glabra, sœpe disperma. Caulis latera excavata; anguli obtusi, tuberculato-asperi. (v. s.)
- $\beta$ . *laxiflorus*, spicis oblongis erectis. Bl. I. c. p. 798. — Ad cataractas fluvii Tjapus ejusdem montis (Blume, Junghuhn!)  
 $\gamma$ . *multiflorus*, caule defluxu foliorum subnudo foliisque minoribus hirsuto, spicis plurimis confertis glabris. — In Javâ (Zollinger! pl. jav. n. 2023 in h. DC. Junghuhn et Nees.)

22. *S. HIRTUS* (Bl. bijdr. p. 797), suffruticosus, caule basi repente adscendente quadrangulari ad angulos asperulo, foliis ovalibus utrinque acuminatis, crenatis supra lineolatis, spicis axillaribus ovatis cernuis pedunculo trifido, bracteis obovatis ventricosis obtusis venosis undique vel margine supero saltem albo-hirsutis, calycis laciniis lanceolato-subulatis obtusiusculis apice barbatis. ♂ In Javâ. A *S. cernuo*, cuius probabiliter var. est, differt spicis bracteisque minoribus albo hirtis. Reliqua fere congruunt. Corolla parva. Stamina exserta. •Capsula fere disperma.
- α. bracteis dorso et apice hirsutis. ♂ In umbrosis montanis provinciarum occidentalium insulæ Javae (Blume). *Strobilanthes hirta* Bl. bijdr. p. 797 excl. syn. *Ruellia hirta* Vahl. *Justicia hirsuta* Hornem. in h. DC. (v. in h. DC.)
  - β. *crenulata*, bracteis margine supero solo hirsuto. — In Lacou monte Javae 3000-6000' alt. (Junghuhn!). *Strobilanthes crenulata* Hassk. hort. Bog. cat. alt. p. 148.
23. *S. CILIATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85, Wight h. pr. n. 1949), caule fruticoso verruoso, foliis oblongis acuminatis in petiolum longum attenuatis mucronato-serrulatis glabris, spicis axillaribus oppositis in pedunculo refractis, bracteis orbiculatis basi cucullato-coniventibus contiguis, ramis supra genicula fibroso-fimbriatis. ♂ E montibus prope Courtallum (Wight!). *Ruellia ciliata* Wall. cat. n. 2415. Rami adulti teretes, nodosi, lignosi, lenticellis granuliformibus subseriatim lineati, glabri, juniores quadrangulares, quandoque supra genicula epidermide exuta et fibrillis sublignosis planis apice laceris erecto-patulis albis spicatum cincti. Folia 5-6 poll. longæ,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, minute et confertim serrato-denticulata, denticulis calloso-acutis. Spicæ axillares oppositæ, subsecundæ, semipollicares, subcylindricæ. Pedunculi  $1\frac{1}{2}$  poll. longi, ex opposito unisulci, glabri, infra medium geniculo prædicti bracteæ duabus parvis linearibus instructi; ex hoc geniculo angulo obtuso refracti. Bracteæ vix 3 lin. longæ, orbiculatæ, obtuse mucronatae, glabrae. Calyx glaber, profunde quinquepartitus laciniis lanceolatis aoutis. Corolla calyce paulo longior, glabra. (v. in h. Wight et Wallich.)
24. *S. ASPERRIMUS*, caule herbaceo? rigido tuberculato-aspero ad genicula hirsuto, foliis ellipticis acutis in petiolum folio breviore latim decurrentibus crenatis setoso-hispidis, pedunculis axillaris folio longioribus breviribus trichotomis, spicis ovatis, bracteis late ovalibus ventricosis glabris, inferioribus remotioribus minoribus, divisionum pedunculi reflexis, rhachi hirsutæ. ♀ In ins. Ceylon (Wight! 776 bis, Walker!). *Strobilanthes purpurea* h. Hook. n. 198. A *S. trifido*, cuius probabiliter est varietas, non differt, nisi staturâ proceriore firmiore, caule tuberculato acutis valde exasperato ad nodos tumentes hirsuto, foliis majoribus supremo quadam cum petiolo  $6\frac{1}{2}$  poll. longo et  $1\frac{1}{2}$  poll. lato, setis erectis conicis rigidis tuberculo papuloso insidentibus et post lapsum foraminulum relinquuntibus, in pagina supinâ magis sparsis et rigidioribus, in pronâ pagina densioribus et mollioribus vestitis, pedunculis in nostro specimine secundis seu adscendentibus rigidioribus crassioribus ad angulos et genicula pilis longis hirsutis spicisque plurifloris rhachi dense hirsutâ. — Flos ut in *S. trifido*. Bracteæ fructus obtuse naviculares, confertim lineolate. Calycis laciniæ lineares, obtusæ, glabrae, lineolatæ, fructu duplo breviore. Capsula 5 lin. longa, obtuse sexangularis, rigida, levigata, lutescens, ad basin tetrasperma, retinaculis validis aduncis. (v. in h. Wight et Hook.)
25. *S. GLABRATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85), fruticosus, glaber, caulis geniculis apophysatis, foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis, capitulis oblongis pedunculatis axillaribus oppositis terminalibus quaternis nutantibus, bracteis oblongis imbricatis obtectis, corollæ subæqualis laciniis emarginatis. ♂ In montibus prov. Sillet? (Wall.!), Khasiyya (Griffith! in h.

- Hook.). *Ruellia?* *glabrata* Wall. cat. n. 2390. Rami flexuosi, dichotomi, inferne teretiuseculi, superne quadranguli, glabri, lenticuloso-asperi, epidermide flavescente; genicula compresso-dilatata, callo annulari utrinque cicatrice folii truncata aucto in apice ramulorum semilunari cinota. Folia 3-4 poll. longa, 1 poll. lata. Corolla pollicaris, infundibuliformis, glabra cœrulea?, in alabastro angulata. Capsula calyce paulo longior. (v. in h. Wall. et Hook.)
26. S. *LUPULINUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85), caule herbaceo glabro, foliis ellipticis acutis in petiolum desinentibus crenatis glabris confirmis lineolatis, spicis axillaribus fasciculatis ovatis hirsutis, bracteis ovalibus ventricosis emarginatis, infimis oblongis remotioribus patulis, calycis lacinias apice bidentatis.  $\mathcal{L}$  Prope Courtallum (Mitchell!). *Ruellia lupulina* Wall. cat. n. 2355. a. *Ruellia* spec. h. Madr. Wall. I. c. Afinis est S. *Heyneano*, at differt caule glabro nec strigoso, foliis majoribus 6-7 poll. longis  $2\frac{1}{2}$  poll. latis basi apiceque minus attenuatis obtuse crenatis glabris supra confertissime lineolatis nervis costalibus octonis spicis in pedunculis axillaribus oppositis semipollericaribus bisulcatis pubescentibus teruis pedicellatis, pedicello pedunculi communis longitudine magis hirsuto, ovatis duplo majoribus hirsutis, bracteis ovalibus apice acute emarginatis venosis, venis propter hirsutum minus conspicuis, calyx majore, lacinias linearis-oblongis apice bidentatis. Corolla perfectior deest. Capsula  $3\frac{1}{2}$  lin. longa, oblonga, tetragona, glabra, prope a basi tetrasperma. (v. in h. Wall.)
27. S. *INVOLUCRATUS* (Blume bijdr. p. 799), caule suffruticoso glabro, foliis oblongis utrinque attenuatis serrato-dentatis repandisive, superioribus ovatis brevibus, spicis axillaribus terminalibusque solitariis subrotundis glabris, bracteis ovalibus ventricosis venoso-reticulatis apice emarginatis, calycis lacinias obtusis.  $\mathcal{L}$   $\mathcal{L}$ ? In montanis Salak, Seribu insulae Javæ (Blume). N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85, Wight h. prop. n. 1948. Differt a S. *lupulino*, cuius probabiliter est varietas, caule humiliore divaricato ramosissimo nondoso-geniculato, foliis multo minoribus cum petiolo fere sesquiplicari 3-3 $\frac{1}{2}$  poll. longis 9-10 lin. latis oblongis, in nostris omnibus supra setulis raris inspersis margineque setulis ciliolatis septuplinervibus, pedunculis brevioribus, saepè simplicibus, spicis minoribus brevioribus, bracteis ratione longitudinis latioribus obiter emarginatis glabris evidenter venoso-reticulatis, calycis ante anthesin vix bilinearis lacinias apico integris obtusis vel submucronulatis. Flores et fructus desunt. (v. in h. Wight et Wall.)
- b. foliis apicem versus dentatis crenatis, supra margineque hispidulis. Blume I. c. — In montos prov. Tjanjor insulae Javæ (Blume). *Ruellia lupulina* h. Wight, Wall. cat. n. 2355 b.
28. S. *HEYNEANUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85), caule herbaceo strigoso, foliis ellipticis cuspidatis in petiolum longum decurrentibus crenato-serratis hirsutis, spicis axillaribus compositis folio brevioribus glabris subgibbosis, bracteis orbiculariatis ventricosis, inferioribus remotioribus ramuligeris reflexis, calycis brevis lacinias oblongis obtusis glabris.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali (ex h. *Heyneano*!). *Ruellia involucrata* h. Heyn. Wall. cat. n. 2357. Caulis humilis, quadrangularis, ad genicula compressus, tuberculis piligeris strigosus, versus summitatem hirsutus. Folia 4-5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, in petiolum pollicarem acute decurrentia, argute cuspidata, confertim crenato-serrata, supra lineolata, utrinque setis hirsuta. Pedunculi pollicares, oppositi, hirsuti et asperi, graciles, inferne aphylli, apicem versus bractearum pari minore spathulatum uno altero oblongarum remotiusculo reflexo prædicti. Spica terminalis globosa, cerasi minoris crassitie, dense imbricata. Bracteæ amplæ, orbiculariatis, ventricosæ, obtuse, membranaceo-herbaceæ, nervoso-venulosæ, glabrae. Bracteolæ desunt. Calyx,  $2\frac{1}{2}$  lin. longus. Corolla semipollucaris. (v. in h. Wall.)
29. S. *TENER*, caule herbaceo quadrangulari lœvi glabro, foliis oblongis acumi-

natis in petiolum mediocrem cuneatim decurrentibus obsolete crenulatis tenuibus supra sparsim setulosis margine petioloque ciliatis, pedunculis axillaribus petiolo paulo longioribus trifidis spicisque globosis paucifloris glabris, bracteis suborbiculatis ventricosis, inferioribus remotioribus minoribus patentibus, ramuligeris spatulatis reflexis.  $\mathcal{L}$  In ins. Ceylon (Walker! n. 1747 in h. Hook.). A S. trifido pedunculis brevioribus foliisque mollioribus, a S. Heyneano spicis minoribus, ab utroque foliis ciliatis differt. (v. in h. Hook.)

30. S. TRIFIDUS, caule herbaceo strigoso, foliis ellipticis acutis in petiolum folio breviori latim decurrentibus crenatis supra glabris scabris subtus ad venas pilosis, pedunculis axillaribus folio longioribus trichotomis, spicis ovatis paucifloris, bracteis late ovalibus ventricosis, inferioribus remotioribus minoribus, ramuligeris reflexis.  $\mathcal{L}$  In Ceylon (Walker! in h. Arnott. lit. N, et Hook.). Differt a S. Heyneano foliis crassioribus rigidioribusque cum petiolo  $\frac{3}{4}$  poll. longo  $2\frac{1}{2}$  poll. longis  $\frac{1}{2}$  poll. latis minus acuminatis in petiolum anguste cuneiformem ciliolatum attenuatis supra omnino glabris lineolatisque subtus ad venas pilis brevibus adpersis nec utrinque hirsutis, tum vero pedunculis multo longioribus  $2\frac{1}{2}$  poll. longis hispidulis bis terve trichotomis vel bifidis hirtulis, spicis in ramis pedunculi communis terminalibus paulo minoribus magis ovatis quam globosis, bracteis magis ovalibus et corollâ majore  $\frac{1}{2}$  poll. longâ quæ illi semipollucaris. Bracteæ inferiores (non illæ remotiores a spicâ tantummodo, sed et imbricatarum pleræque) abortivæ, ut spica tantum circa apicem aliquot floribus gaudeat. Bracteæ ad pedunculi divisiones unguiculares, subrotundæ, sessiles, uti folia inæquales. (v. in h. Arnott.)

31. S. CALLOSUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 85), caule fruticoso verrucoso, foliis ellipticis cuspidatis in petiolum longum decurrentibus callosodenticulatis marginis scabris, spicis axillaribus compositis folio brevioribus, bracteis orbiculatis ventricosis, inferioribus remotioribus sterilibus.  $\mathcal{L}$  In India orientali. Rami crassitie pennæ scriptoriarum quadrangulares, lateribus sulco excavatis, glabri, lenticellis verruciformibus punctulisque griseis saepè exasperati, ad genicula compressi. Folia conformatia, 7-10 poll. cum petiolo 2-3-pollucari longa,  $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$  poll. lata, acumine angusto cuspidata, in petiolum longum anguste decurrentia, minutim confertimque repando-dentificulata, denticulus obtusus calloso parvo et venulæ apice tumente orto instructus, toto ambitu setulis exiguis ciliolata, cæterum in  $\alpha$  glabra, in var.  $\beta$  setis brevibus præsertim supra hirta. Spicæ axillares oppositæ, 2-2' poll. longæ, digitæ crassitie, glabrae. Pedunculus 2-3 lin. longus. Bracteæ inferiores duorum vel trium parium minores, distantes, patulæ, ex ovalibus in subrotundas increscentes; reliquæ imbricatae, perfecte orbiculatae, ventricoso-concavæ, integerrimæ, nervoso-venosæ nervis parum conspicuis, læves, glaberrimæ, virentes, apice albido-membranaceæ. Bractæ exiguæ, vix semilineares. Calyx semipollucaris. Corolla fere sesquipollucaris, extus glabra, cœrulea. (v. in h. Wall. et Hook.)

$\alpha.$  *glaber*, foliis glabris. — Hagpur, in Ind. or. occident. (Barstow, Wall. n. 89 in h. Nees. ex hort. bot. calc.), Ceylon (Walker! in h. Hooker). Ruellia callosa Wall. cat. n. 2359.

$\beta.$  *hirtus*, foliis supra pilis brevibus hirtis. — Hort. bot. calc.; in India orientali (Jacquemont! in h. Nees. ex h. mus. paris. n. 170).

32. S. HOOKERI, caule herbaceo, foliis oblongis ovalibus acuminatis in petiolum brevem decurrentibus crenato-denticulatis, spicis axillaribus simplicibus ovalibus erectis etate nutantibus glabris, pedunculo crasso petiolo longior, bracteis late orbiculatis patulo-ventricosis amplectentibus, infimis minoribus cuspidatis reflexis, lacinii lanceolatis acutis dorso medio inferius hirsuto.  $\mathcal{L}$  In India orientali. A S. Heyneano, cui similis, differt mole omnium partium majore, foliis longioribus angustioribus, floribus plus duplo majoribus, calycis lacinii majoribus latioribus. A S. calycinò distinguitur

non solum mole partium et flore majore, sed maxime bracteis omnino sessilibus basi hand cuneiformibus sed amplectentibus, quā notā S. Heyneano magis accedit hæc species.

*α. hirtus*, caule aspero ad genicula hirsuto, foliis bracteisque supra sparsim subtus densius hirsutis. — In ins. Ceylon, *Masra Ellia* (*Macrac!* in h. Arnott n. 3 et in h. Benth. ex h. Hook. n. 449). *Martynia* sp. *Macrac* l. c. *Walker!* in h. Hook. (v. in h. Arnott, Hook. Benth.)

*β. glaber*, caule brevi foliis bracteisque omnino glabris, bracteis inferioribus magis cuspidatis. — In ins. Ceylon (*Walker!* in h. Hook. n. 1744). Bracteæ sicut folia subtus punctis exiguis albis squamiformibus conspersæ. (v. s. sp. in h. Hook. et v. cult.)

33. *S. CALYGINUS*, caule suffruticoso strigoso, foliis subovalibus acuminatis in petiolum mediocrem decurrentibus obiter crenato-denticulatis hirsutis, spicis axillaribus brevipedunculatis nutantibus dein erectis ovalibus simplicibus, pedunculo bibracteato petiolo breviore, bracteis omnibus imbricatis, basi cuneiformibus, apicem versus coloratis mucronulato denticulisque nonnullis exiguis prædictis, calyce corollam æquante, lacinias æquilibus latiusculæ lanceolatis acutis. ᢂ In ins. Ceylon (*Walker!* in h. Arnott). Folia minora sunt quam *S. Heyneani* folia, petiolo breviore prædicta, denticulis minus distinctis, 2 fere poll. cum petiolo semipollicari longa et 8 lin. lata. Pedunculus petiolo brevior, erectus, bracteis supra medium duabus oppositis parvis subspatulatis patentibus. Spica ovalis, pollicaris, glaberrima. Bracteæ subrotundæ quidem, at basi distincte cuneatæ et hac parte rigidiiores; denticuli exigui cum mucronulo apicis obtusi quandoque desunt. Color in siccō rufus est. Calyx 6 lin. longus, glaber. Corolla calycem vix excedens, brevi-infundibuliformis, glabra, lutea? limbo æquali, lacinias ovatis. Capsula oblongo-lanceolata, calyce paulo brevior, acuta. (v. in h. Arnott et Hook.)

*β. caule lœvi et glabro*. — In ins. Ceylon (*Walker!* in h. Arnott et h. Hook. n. 127). *Strobilanthes trifidus* h. Hook. nec N. ab E. (v. in h. Hook. etc.)

34. *S. COLORATUS*, herbaceus, erectus, caule glabriuscule, foliis ovalibus utrinque attenuatis crenatis hirsutis, spicis axillaribus oppositis pedunculatis ovatis simplicibus folio brevioribus, bracteis obovato-cuneatis glanduloso-hirsutis superne coloratis. ᢂ In ins. Ceylon (*Walker!* in h. Arnott). Accedit ad *S. echinatum*, at inflorescentia magis cum *S. calycinum* congruit. Folia floralia 1- $\frac{1}{2}$  poll. longa,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. lata, inæqualia, ovalia, acuminata, basi acuta in petiolum angustum supra canaliculatum  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longum parce hirsutum desinentia, margine obtuse crenato-subserrata, utrinque setulis rigidis hirsuta, supra lineolata, obscure viridia. Pedunculi oppositi, petiolas æquantes, semi-teretes, striati, setulosis reversis hirti. Spica ovata aut ovalis,  $\frac{5}{6}$ - $\frac{11}{6}$  poll. longa, erecta, basi bracteolis minoribus obovatis aut ovalibus sessilibus stipata, dein imbricata, bracteis  $\frac{1}{4}$  poll. longis obovatis rotundatis basi cuneiformi-attenuatis integrerrimis in siccō rufescitibus utrinque setis capitatis hirsutis nervoso-venosis. Calyx fructus 7 lin. longus, usque ad basin fere quinquepartitus, lacinias æquilibus lanceolato-linearibus  $\frac{1}{4}$  lin. latis acutis glanduloso-ciliatis dorso lineolatis. Capsula 5 lin. longa, compresso-tetragona, lœvis, pallide brunnea, ad basin bilocularis, in medio fere tetrasperma. (v. in h. Arnott.)

35. *S. IMBRICATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86 excl. syn. *S. hirtus* var. *β Bl.*), caule herbaceo erecto scabro, foliis oblongis utrinque acuminatis crenatis hirtis, spicis axillaribus terminalibus fasciculatis brevibus, bracteis obovato-cuneatis apice paleaceo hirsutis. ᢂ In India orientali, in montium jugo Tong dong dicto, regni Avensis, ad Pingee circa simulacra rupibus insculpta (Wall.). *Ruellia imbricata* Wall. cat. n. 7156. Caulis profunde quadrangularis. Folia dense crenata, utrinque hirto-subincana. Spicas breves, 2-3 in fasciculo, pedunculis aphyllis. Folia floralia parva, cuneiformia ad divisiones. Bracteæ obovato-cuneatæ, imbricatae, basi glabriuscule, versus apicem setulis

compressis articulatis imbricatis quasi paleaceæ. Calycis laciniæ et bracteolæ propriæ linearis-subspathulateæ, apicem versus paleaceo-hirsuta, purpurascentes. Corolla 3 lin. longa, violacea; limbus cum fauce campanulatus, laciniis subæqualibus obtusis. Stamina basi libera corollam æquantia vel superantia, æqualia; filamenta hirsuta. Capsula longitudine calycis, depressa, oblonga, acuta, apice barbata, parietibus præsertim circa basin tenuibus; dissepimento tenui; locelli juxta basin dispermi. Semina utrinque lamellâ scutiformi tecta. (v. in h. Wall.)

36. S. HIRSUTISSIMUS (N. ab E. et W. A. in h. Walker.), herbaceus, erectus, undique densissime glanduloso-hirsutus, foliis floralibus ovali-oblongis sessilibus, spicis axillaribus terminalibusque erectis globosis sub fructu laxis, floribus oppositis secundis, calycibus articulos subæquantibus bracteâ ovali duplo longioribus.  $\mathcal{Z}$  In ins. Ceylon (Walker! in h. Arnott et Hook n. 195). Folia 1- $\frac{1}{2}$  poll. longa, sessilia. Tota planta undique setis patentibus capitatis rufis dense vestita. Caulis aliquot pedum altitudine, erectus, strictus, inferne glabreens. Spicæ in ramulis terminales, 1- $\frac{1}{2}$  poll. longæ, tri-quadrifariae. Bracteæ duæ, opposite, ovaleæ, obtuseæ, sessiles, 2 lin. longæ. Flores oppositi, sessiles. Bracteolæ et calycis laciniæ conformes, latiuscule lineares, obtuseæ. Capsula calyce paulo brevior, ovali-oblonga, compressiuscula, lœvis, fusca, basi tetrasperma. (v. in h. Arnott. et Hook.)

#### § 4. *Spicis sursum secundis.*

37. S. SEXENNIS, caule fruticoso tetragono, articulis inferius cingulato-rugosus, foliis oblongis utrinque attenuatis sessilibus basi subdilatata amplectentibus acute serratis, pedunculis axillaribus bi-trifidis folium subæquantibus spicisque oblongis subsecundis setoso-glandulosis, bracteis ovatis acutis, corollâ calyce subtriplo longiore incurvâ laciniæ emarginatis.  $\mathcal{Z}$  In ins. Ceylon (Walker! in h. Arnott et Hook.). « Non nisi sexto quoque anno floret, dein perit. » Walker in schedis. — Caulis fruticosus, rigidus, tetragonous, glaber, articulatus, geniculis incrassatis et quasi duplicitis, articulis præsertim in parte inferiori verrucis transversalibus rugiformibus interruptis confertis veluti cingulatis. Folia superiore 4 $\frac{1}{2}$  poll. longa, paulo ultra pollicem lata. Pedunculi seu rami florentes axillares, oppositi, inæquales, ad  $\frac{1}{4}$ -1  $\frac{1}{2}$  poll. a basi glabri, rugosi, dein bifidi aut trifidi, folioli floralibus duobus ovato-oblongis sessilibus subintegerrimis prædicti, di-tristachyi, in paniculam terminalem transeuntes. Pedunculi proprii spicæ suâ breviores, setis patentibus capitatis confertissimis luteis hirsuti, inæquales. Spicæ  $\frac{1}{4}$ -1  $\frac{1}{2}$  poll. longæ, oblongæ, erectæ, densæ, ob bracteas et flores adscendentibus subsecundæ. Bracteæ late ovatae, acutæ, in dorso parce in margine confertim setoso-glandulosæ et ciliatæ, herbaceæ. Bracteolæ linearis-aut lanceolato-spatulatae, obtuseæ, calycem æquantes et ejus laciniis latiores, confertim setoso-glandulosæ. Calyx 5 lin. longus. Corolla police longior, purpurascens, extus glabra, intus pilosula, tubo brevi, laciniis limbi patentibus retuso-emarginatis. Capsula calycis longitudine, rigida, glabra, oblonga, acuminata, loculis circa basin dispermis. Partes quæ glandulæ odore quoque gaudent aromatico haud ingratis. Folie plantæ juvenilis cum petiolo triplicari pedalia, 5 poll. lata, ovalia, acuminata argute mucronato-serrata, utrinque hirta, novella subtus cano-hirsutissima. Caulis ad angulos grosse verrucosæ. (v. in h. Arnott et Hook.)

38. S. NOMOTROPUS, fruticosus, erectus, caule superne ramisque inflorescentiae pubescenti-glandulosis, foliis oblongis acuminatis repando-subserratis basi angustiore subcordatâque amplectentibus glabris, spicis in ramis cauleque terminalibus compositis dissimilatoribus, floribus oppositis secundis, calycibus articulos æquantibus bracteâ ovali paulo longioribus.  $\mathcal{Z}$  Copiose in marginibus silvarum circa Utacamund Indiæ or., florens a Nov. in Martium usque (Perrottet! n. 119 ex h. mus. paris. n. 137 et in h. DC.). S. hirsutissimo eique fere soli comparandus est. Speciosa stirps, 3-6-pedalis, floribus pollicaribus

cœruleis subcampanulatis tubo brevissimo , antherarum loculis maxime contiguis a basi ad medium a connectivo discretis. Bracteolæ oblongæ , obtusæ , fere glabrae . Calycis laciniaæ oblongo-lanceolataæ , obtusæ , laxe pubescenti-glandulosæ . (v. in h. DC. et Mus. paris.)

39. S. ARGUTUS , caule fruticoso quadrangulari foliisque oblongis acutis argute remote serrulatis utrinque hirtis , iuferioribus in petiolum cuneiformem longe attenuatis , superioribus sessilibus minoribus , pedunculis axillaris oppositis recurvis folio longioribus simplicibus bifidive glanduloso-hirsutis , spicis spicatis sursum secundis globosis parvis paucifloris subglobosis , bracteis glanduloso-ciliatis , exterioribus ovatis obtusiusculis , interioribus subspathulatis . ♂ In ins. Ceylon (Walker! in h. Hook.). Accedit ad S. sexennem , sed spica duplo fere minores , 6-8 in pedunculo , regulariter secundæ . Corolla pollicaris . (v. in h. Hook.)

### B. SQUARROSI.

\* *Staminibus monadelphis.*

40. 'S. BRUNONIANUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 87) , fruticosus , foliis lanceolatis in petiolum attenuatis repandis glabris , spicis axillaris terminatim compotis secundis laxiusculis hirtis , bracteis oblongis , staminibus monadelphis . ♂ In montibus prov. Sillet ( Wall ! ) , in Assam et Khassyia ( Griffith ! Mark ! in h. Hook. et Mart. ). Ruellia Brunonianana Wall. cat. n. 2368. Caulis ramosus , ramis gracilibus glabris , adultioribus tetragonis , junioribus alternatim ex opposito canaliculatis et intra canalem hirtis . Folia tres circiter pollices longa , 4 liu. lata , exquisite lanceolata , in formam petioli longe attenuata , apicem versus repanda , glabra . Spicæ cum pedunculo quadrangulo ramuli similitudine basi bi-quadrifolioloso 3-4 poll. longæ , axillares , alternae vel oppositæ , ipsæ 1-1½ pollicares , basi plerumque compota , apice propter folia diminuta spicam terminalem compotis minus magisve densam quandoque dichotomam et subcorymbosam constituentes , laxiusculæ , magisve compactæ , secundæ . Rhachis quadrangularis cum bracteis calycibusque pilis brevibus rigidulis erectis hirtula et subsericeo-canescens . Bracteæ circiter bilineares , calycem vix aequantes , ex oblongo subspathulataæ , obtusa , dense pubescenti-birtæ , herbacea . Flores plerumque ob oppositum deficientem alterni , secundi , quandoque oppositi , sessiles . Calyx cum bracteolis tres lin. longus . Bracteolæ recurvo-patulæ , spatulataæ . Corolla 7-8 lin. longa , pubescens , corulea . Stamina corollam subæquantia ; filamenta glabra , basi hirta decurrentia , membranæ communi ad basin conjuncta . Capsula tres lin. longa , oblonga , tetragona , parietibus tenuibus a dissempimento dehiscentibus ad basin bilocularis et prope basin tetrasperma . (v. in h. Wall. , Hook. et Mart. )

41. S. MONADELPHUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 87, Wall. cat. n. 7159) , fruticosus , foliis ovalibus utrinque acuminatis crenato-serratis supra setulis sparsis hispidis , spicis axillaris terminalibusque bifidis subsecundis hirsutis , bracteis ovatis recurvo-patulis , staminibus monadelphis . ♂ In montibus Sillet ( Wall ! ) . Caulis purpureus , obtuse quadrangulus . Folia longe petiolata , 3-pollicaria , in medio grosse crenato-serrata . Rami axillares spicigeri inferne pari foliorum uno altero , quæ folia semipollucaria , subsessilia , ovalia , integrerrima ; dein ramus bifidus , spicæ altera longiore bipollucari , altera breviore vix pollucari . Omnes spicarum partes setis flavis hirsutissimæ . Bracteæ ovatae vel obovatae , obtusæ , apice reflexæ , integrerrimæ , hirsutæ . bilineares . Calyces alterni , sessiles , laciñiis linearibus apicem versus nonnihil dilatatis obtusis hirtis glandulosisque . Bracteolæ oppositæ , calycem subæquantes , linearispathulataæ , formâ fere laciniarum . Corolla purpurea , pubescens , circiter pollicaris . Stamina longitudine corollæ , tubo infra ventrem inserta ibidemque membranæ nervosâ ciliatâ lato tractu connexa ; filamenta gracilia , filiformia , glabra . (v. in h. Wall.)

42. *S. PETIOLARIS*, fruticosus, foliis ovatis acuminatis in medio crenato-serratis in petiolum longum cuneatim decurrentibus supra setulis rarissimis hispidis, spicis axillaribus ramosis inferne foliolosis in spicam terminalem confluentibus, bracteis recurvo-patulis, inferioribus ohlongo-linearibus remotiusculis, superioribus obovato-spathulatis imbricatis, calycis lacinias densissime strigoso-hirsutis, staminibus monadelphis. ♂ In Assam, Khassyia (Griffith!). *S. monadelpho* similis. Caulis acute quadrangulus, lateribus profundis. Folia majora inferiora cum petiolo  $2\frac{1}{2}$  poll. longo 7 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  poll. lata. Spicæ folio breviores, alternatim ramosæ, rhachi hirsutæ profunde acuteque quadrangulæ. Foliola bractealia infra ramos spicæ bracteis inferioribus similes ex oblongis linearia, obtusa, parva. Bractæ calycem æquantes paulo longiores. Calyx ut in *S. monadelpho*, densiore hirsutie canus. Corolla ut in illo. (v. in h. Hook.)

\*\* *Filamentis basi liberis.*

43. *S. DECURRENS*, herbaceus, caule quadrisulcato velutino-scahero, foliis ovalibus utrinque acutis subdentatis glabris confertim lineolatis, spicis axillaribus ternis terminalibus pedunculatis oblongis nutantibus, bracteis oblongo-ellipticis obtusis late decurrentibus glahris lineolatis, rudimento filamenti quinti. ♀ In Courtallum Indiæ or. (Wight! h. n. 669). Caulis plurimum pedum altitude, flexuosus. Folia patentia, cum petiolo  $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ -poll. 5-8 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. lata, oposito minore, in acumen mediocre obtusiusculo producta, basi acuta, margine subrepando-denticulata denticulis hrevissimis crassiuseculis. Pedunculi communes axillares oppositi, terminales terni, inæquaes,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longi, circa medium hibracteati et trifidi, plerique tamen propter pedunculos laterales ahortivos monostachyi. Folia floralia ad trichotomiam minima, 1-2 lin. longa, obovata, patentia. Pedunculus proprius  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longus, suhinchinatus, acute 4-6-angularis, scaher. Spica circiter pollicaris, subcernua, sursum paulum incrassata et densior, pollicaris, ohtusa. Bractæ oppositæ; paris inferioris remotæ, ohlongæ, ohtusæ, 2-3 lin. longæ, projecturâ angustâ in pedunculum totum decurrentes ejusque angulos quatuor distinctiores efficientes; quæ insequantur, et eæ quidem steriles, magis approximatæ superioribus,  $\frac{1}{2}$  poll. longa, elliptico-ohlongæ, obtusæ, ad primum par late decurrentes; reliquæ aliquot parium pollicares, subovales, obtuse, in rhachi compressâ ita ad præcedentium paria decurrentes, ut ala cum bracteâ in circumscriptionem ovalem transeat. Flores solitarii, subsessiles. Pedicellus brevissimus, compressus, utrinque hracteolâ brevissimâ dentiformi præditus. Calyx 4 lin. longus, subcampanulatus, membranaceus, glaber, pallidus, paulo ultra medium quinquefidus! lacinias æqualibus lanceolato-acuminatis. Corolla  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, purpurea? Stamina per paria hasi conjuncta et in alam foliacem ciliatam decurrentia. Structurâ calycis ahh affinis valde recedit. (v. in h. Wight.)

44. *S. ANCEPS*, fruticulosus?, foliis primordialibus ohlongis acuminatis hasi acutâ in petiolum longum desinentibus, superioribusque ovatis acuminatis acumine obtusiusculo basi obtusis repando-subdenticulatis dentatis supra scabris subtus pilosis hracteisque et calycibus glanduloso-punctatis, pedunculis axillaribus terminalibusque simplicibus trifidise superne bialato-ancipitibus stricte erectis, spicis suh cylindricis, bracteis ovatis late petiolatis apice squarroso patentibus calycibusque hirsutis, capsulis setoso-glandulosis. ♀ an ♂? In ins. Ceylon (Walker! in h. Arnott. Hook. et Benth.). Caulis tetragonus angulis acute prominulis, lateribus oppositis alternis hirtis et minute tuberculatis ac glahris, ad genicula infractus. Rami folio longiores, hasi binodes, tetragonoi, birti, paribus totidem foliorum minorum instructi, axillis gemmiparis, apice monostachyi. Folia inæqualia, ovata cum basi obtusa, apice attenuata acuminata obtusiusculo; alterum folium  $2\frac{1}{2}$ -3 poll. longum, alterum minus, ac conforme. Spicæ in ramis terminalibus, solitariae, in apice caulis aggregatae, erectæ, conico-cylindricæ,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longæ. Pedunculus  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. longus, strictus, hir-

tus, a projecturis primi paris bractearum quasi bialatus. Bractæ herbaeæ, approximate, quadrifariae, inferiores late ovatae, acutæ in petiolum latum erecto-adpressum brevissimum contractæ, 5-6 lin. longæ, patentes; reliquæ ejusdem longitudinis et petiolo laminam æquante adpresso, hæc autem obtusa squarroso-reflexa, igitur spathuliformis; omnes autem bractæ cum bracteolis et calycibus subtus glandulis crebris sessilibus punctiformibus rufis micantibus pilisque albis adspersæ et inferius ciliatae, integrerimæ. Corolla  $\frac{3}{2}$  poll. longa, purpurea, limbo brevi obliquo, laciñiis obtusis. (v. in h. Arnott, Hook., et Beuth.)

45. S. SABINIANUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86), herbaceus, foliis ovatis acuminatis in petiolum attenuatis repando-subcrenatis glabris opposito minore, summis cordatis amplexicaulibus, spicis axillaribus terminalibusque laxiusculis viscido-pubescentibus, bracteis orbiculatis basi cuneiformibus.  $\mathcal{L}$  In Punduā et Nepalā (Wall.), Khassyā (Griffith! in h. Hook.) — Bot. mag. t. 3517. Ruellia Sabiniana Wall. cat. n. 2338. Ruellia macrocarpa Wall. cat. n. 2348 (ex parte). Folia inferiora 8-9 poll. longa, 3-3½ poll. lata, ovata, argute acuminata, in petiolum longe decurrentia, late repando-crenata, flaccida, glabra. Spicæ axillares, oppositæ, inæquales, altera 4-5 altera 3-3½ poll. longæ, pedunculo seu rhachi tetragonæ, apicem versus pubescente, inferne pari uno altero ve foliorum seu bractearum exiguum orbicularium patentium dissitarum, quandoque et juxta basin folioli duobus cordatis unguicularibus prædictus. Bractæ 2  $\frac{1}{2}$  lin. longæ, orbiculares, rotundatæ, basi breviter cuneiformes, patulæ, viscido-pubescentes, subtiliter venulosæ cum calyce camphoræ odorem spirantes. Corolla 1½ poll. longa. Capsula lougitudine calycis. In Caldario per hiemem clandestine floret, calyce subbilabiato colorato, corollæ minimæ oblongæ lævi utriculum obtusum referente, antheris ab utriculo inclusis parvis, pistillo inconspicuo.

$\beta$ . *argenteus*, spicis minoribus maxime pubescentibus viscidisque, foliis minoribus. — In Nepalā (Wall.), Khassyā (Griffith! in h. Hook.). Ruellia argentea Wall. cat. n. 2339. Ruellia Sabiniana Lodd. bot. cab. n. 1717, bot. reg. n. 1238. (v. in h. Wall. et Hook.)

46. S. MACULATUS, fruticosus, foliis oblongo-lanceolatis caudato-acuminatis obtuse serratis utrinque attenuatis alternis cujusque paris longe petiolatis majoribusque adspresse pilosis supra albo-maculatis, spicis axillaribus terminalibusque laxiusculis pubescentibus, braeteis oblongo-cuneatis obtusis sessilibus.  $\mathfrak{Z}$  In montibus Silet confinibus, Julio (Smith in hort. bot. calc., Wall.). Ruellia maculata Wall. pl. as. rar. 3 p. 33 t. 250. Singularis foliorum maculis albis irregularibus utrinque secus costam una serie dispositis. Corolla corulea, 1½-1¾ poll. longa. Bracteolæ oblongæ, obtuse. Propinquus S. Sabiniano var.  $\beta$  argenteo Wall.

47. S. EDGEWORTHIANUS, herbaceus, foliis inferioribus subæqualibus lanceolato-oblongis acuminatis basi cuneiformi-attenuatæ auriculato-amplectentibus denticulatis hirtulis, summis cordato-ovatis amplexicaulibus inæqualibus, spicis axillaribus brevipedunculatis densis basi interruptis, bracteis obcordato-cuneiformibus mucronulatis longe ciliatis apice patentibus.  $\mathcal{L}$  In montibus Dhun, Martio (Pakenh. Edgeworth!). Accedit ab alterâ parte S. Sabiniano ab alterâ S. plumuloso, differt ab utroque bracteis majoribus emarginatis interjecto mucronulo reflexo foliisque angustioribus, alia ut taceam. Caulis tetragonous, glaber, ad genicula incurvus. Folia inferiora æqualia, 6 poll. longa, 1½-1¾ poll. lata, caudato-acuminata basique amplectenti attenuata. Superiora inæqualia, altero ovali, mox utroque ovato-cordato minus denticulato vel subintegerrimo, minore 1- $\frac{1}{2}$  poll. longo semper cordato, majore duplo longiore. Spicæ in pedunculo  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longo 2-3½ poll. longæ, cylindraceæ, bractearum inferne paribus 2-3 sterilibus distantibus, que bractæ subcordatæ, acutæ, reflexæ. Reliquæ bractæ imbricatae, 4½ lin. longæ, 3½ lin. infra spicem latæ, emarginatae lobis rotundatis mucronulo parvo reflexo e

sinu emergente, nervoso-striatæ, basi cuneatæ, intus pubescentes, in dorso hirsutæ, margine longe ciliatæ, intermixtis pilis glandulosis minoribus. Corolla 6-8 lin. longa, glabra, cerulea. Capsula longitudine calycis, lanceolata, pallida, basi angustior, in medio tetrasperma. (v. in h. Edgeworth.)

48. *S. PLUMULOSUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86), herbaceus, foliis ovato-ellipticis acutis basi cuneiformi-attenuatâ auriculato - amplectentibus inæqualiter serratis supra hirtis, spicis axillaribus terminalibusque sessilibus, bracteis cuneiformibus obtusis longe ciliatis.  $\mathcal{U}$  In Promæ montibus regni Avæ (Wall.!). Ruellia Wall. cat. n. 7157. A S. amplectente differt caule acutangulo lateribus profunde canaliculatis, foliis subtus, præter margines, glabris, bracteis cuneiformibus obtusis longe ciliatis, nec vero tomentosis. (v. in h. Wallich).

49. *S. AURICULATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86, t. 295), fruticosus, ramosissimus, foliis elliptico-oblongis basi cuneiformi auriculatâ amplexicaulibus, spicis axillaribus terminalibusque tomentosis, bracteis ex subrotundo cuneatis mucronatis squarrosis.  $\mathfrak{F}$  Ex hort. bot. Calc., introducta e Nepaliâ, in Belem (Hamilt.!), Sirmoor, in Himalayâ, alt. 3000', Septembri (Edgeworth !), in Indiâ orientali (Jacquemont! voy. n. 2468 in h. Mus. paris. n. 168). Ruellia auriculata Wall. cat. n. 2341 b. Justicia auriculata Wall. cat. Crossandra? spicata h. Hamilt. in Wall. cat. sub n. 2341 b, (n. 2341 e in h. Hooker ad Aystasiam Neesianam pertinet). Rami inferne tetragoni glabri, superiorius quadriquetri, scabriuscui. Folia inferiora 6-7 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  poll. lata, oblonga, acuta, dense dentato-serrata, basi cuneiformia, dein auriculis subrotundis amplectentia, supra subtusque ad venas hirsuta, superiora  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, sessilia, amplexicaulia, rigida, recurva, ovata, acuta, minute serrulata, supra hispida. Spicæ in ramis, basi uno altero per foliorum orbicularium patentium instructis, axillares, 1-3 poll. longæ, tetragone. Rhachis profunde quadrangularis, nodosa. Bracteæ dense quadrifariam imbricatae, orbicularis, cuspidato-mucronatae, basi angustiore rigidæ amplectentes, apice squarrospatulæ, rigidæ, hirsuto-tomentosæ. Flores ebracteolati. Corolla speciosa, 9 lin. longa, infundibuliformis, fauce inflata, pubescens, purpurea, subbibrata, labio superiori bi-inferiore trilobo. Capsula longitudine bracteæ, subclavata, compressa, tetrasperma. (v. in h. Wallich, Edgeworth, etc.)

50. *S. AMPLECTENS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86), herbaceus, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis dentatis hirtis basi auriculatâ amplectentibus, spicis axillaribus terminalibusque tomentosis, bracteis spatulatis acutis squarrosis longe ciliatis.  $\mathcal{U}$  In Tong dong regni Avæ (Wall.!). Ruellia amplectens Wall. cat. n. 7158. S. auriculato simillimus. Differet videtur : caule herbaceo quadrangulari lateribus excavatis glabro, foliis amplioribus, inferioribus 10-12 poll. longis 2  $\frac{1}{2}$ -3 poll. latis acuminatis grossius dentatis, superioribus denique sessili-amplexicaulibus, bracteis angustioribus basi magis contractis apice magis cuspidulatis longioribusque pilis ciliatis sed minus tomentosis, filamentis basi tantummodo hirsutis. (v. in h. Wallich).

### C. DENUDATI.

- ? 51. *S. LANATUS*, caule herbaceo? erecto profunde obtuseque quadrangulari, spicis foliisque lanato-tomentosis, foliis ovatis acuminatis integerimis supra glabris basi obtusiusculis petiolatis petiolo tomentoso, spicis axillaribus oppositis terminalibus tornis cylindricis densis, bracteis oblongis obtuse cuspidatis supra glabris lineatisque.  $\mathcal{U}$ ? In Neelgherries (Perrottet! n. 121. in h. mus. paris. n. 143). Tomento denso molli caulis petiolorum foliorum paginae inferioris et omnium partium inflorescentiae distinctissima species! Tibus corollæ pollicaris, gracilis, fauces versus magis etiam attenuatus; fauces cum limbo campanulatae, quâ notâ ad Stenosiphonium genus accedit. Calyx laciniæ autem ab origine profunde discretæ sunt, lineares, obtusius-

culæ, valde villosæ. Folia multiplinervia. Bractæ molles, nescio an persistentes? Incerta hujus generis species, quam propter similitudinem quandom S. Mysurensis hoc retuli. Fructus latet. (v. in h. mus. paris.)

52. S. MYSURENSIS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86. Wight h. prop. n. 1951), caule erecto profunde quadrangulari, foliis ovatis crenulatis supra hirsutis, spicæ terminali, bracteis oblongo-lanceolatis acuminatis villosis dense ciliatis deciduis.  $\mathcal{U}$  In Indiâ orientali (Heyne!). Ruellia Mysurensis Roth nov. pl. sp. p. 303. Spr. syst. 2. p. 825. Wall. cat. n. 2402 (ex h. Heyn.). Calyx est regularis, laciiniis linearibus glandulosis sœpe adhaerentibus, sed basi stipitum bracteolis duabus lanceolatis acuminatis membranaceis calyce duplo longioribus, quarum alteram forsitan pro laciñia calycis sumpsit Rothius. Bractæ quoque tenues sunt, fere membranaceæ, flore longiores, margine valde lanatae. Capsula clavata, basi compressa et apice depressa et bi-ventricosa, acuminata, glabra, tetrasperma. Valvulae apice bifidae a dissepimento dehiscentes. Semina magna, angulata, in ambitu utrinque areolata, in disco areolata. Retinacula valida. (v. in h. madr. p. ct Heyn.)

53. S. COLLINUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86), caule erecto quadrangulari foliisque oblongis basi apiceque acuminatis utrinque lincolatis repando-crenatis glabris, spicæ terminali trichotomâ casu bractearum cito denuo glanduloso-pubescentes, bracteis lanceolatis caducis.  $\mathcal{U}$  In Penang (G. Porter!). Ruellia collina Wall. cat. n. 2343. Caulis aliquot pedes altus, herbaceus, erectus, nodosus, glaber, lenticellis inspersus, sulcis quatuor angulatus angulis obtusis. Folia speciosa 7-8 poll. longa, 2 poll. lata, acuminata, basi cuneiformi integerrima, in petiolum pollicarem anguste acuteque marginatum subtus carinatum decurrentia, crenata cum mucronulo calloso, utrinque glabra et confertim lineolata, rigidula, versus apicem parum decrecentia. Pedunculi terminales tres, cum spicis 5-nis 3-6 poll. longi, acute quadranguli, apicem versus ut rami, bractæ et calyces dense glanduloso-pubescentes; laterales breviores trifidi ramis simplicibus, medius trifidus, ramis bi-trifidis. Bractæ superiores 6-7 lin. longæ, lanceolato-attenuatae, obtusiusculæ, obsolete quinqueverves, mox emarginatæ. Flores oppositi, sessiles, post bractæ delapsas nudi, remotissimi, in spicis 1-4 poll. longis dispositi. Bracteolæ duæ exiguae, setaceaæ paulo infra basin calycis, cito aufgiientes vel etiam deficiente. Calyx 5 lin. longus, dense glanduloso-pubescentis, non omnino ad basin divisus!, tubo brevissimo cyathiformi relicto; laciñia linearie-acuminatae, æquales. Corolla pollicaris, extus pubescens, purpurea, intus in fauce a tergo et palato barbata. Capsula 8 lin. longa, a basi ad medium fere compressa, asperma, hinc oblonga, obsolete hexagona, acuta, tetrasperma. (v. in h. Wallich).

D. PTERACANTHI. *Spica laxa, foliosæ, flexuosaæ canaque sœpe alata vel subalatae.*

54. S. UROPHYLLUS, fruticosus, glaber, foliis oblongo-lanceolatis caudato-cuspidatis serratis, spicis axillaribus oppositis, bracteis bracteolisque foliaceis spathulatis petiolatis, corollæ incurvæ laciñia duabus superioribus brevioribus.  $\mathcal{J}$  In Punduā (F. D.!). Ruellia urophylla Wall. cat. n. 2344. Diptericanthus urophyllus N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 82. Rami lignosi, glabri, projectari foliorum præsertim in novellis prominentibus quasi alati, geniculati. Folia inferiora cum petiolo 1½-poll. 6-7 poll. longa, 2 lata, superiora modice decurrentia, omnia oblonga, in cuspidem lineare obtusum producta, basi cuneatim in petiolum desinente, apicem versus mucronato-serrata, glabra, nec lineolata. Spicæ ex pluribus axillis, simplices, glabrae, 2-pollicares, flexuosaæ, subsessiles, floribus æque distantibus oppositis. Rachis fere quadrialata. Bractæ oppositæ, inæquales, conformes, patentes, ovatae, obtusaæ, subserratae, petiolatae, petiolo scabriuscule; major 5 lin. longa, petiolo bilinear. Calyx brevissime pedicellatus, pedicello bractæ adnato, laciñia lanceolato-linearibus strictis æqualibus. Bracteolæ calycis longi-

tudine, patentes, orbiculate, subserratae, petiolo linearis laminam exquante. Corolla semipollucaris vel paulo longior, extus intusque pubescens. (v. in h. Wallich).

55. S. WALLICHII (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 87), caule alato subalatoe, foliis inaequalibus ovali-oblongis utrinque acuminatis serratis supra hirtis, floralibus subcordatis, spicis axillaribus flexuosis foliosis.  $\mathcal{U}$  In Nepaliæ monte Sheapore, alt. 10,000 ped. (Wallich!), in Kamoon (R. Blinkworth), etiam e regionibus magis adhuc elevatis versus Gossain Than Himalayæ, Mahasco, in montibus Himalaya, alt. 9000' (Edgeworth) (1), floret Julio, fructum maturat Octobri (Wallich, Edgew.). Caulis herbaceus, basi denique durescens, teres, superiora versus tetragonos, superne ramosissimus, dichotomus, ramis fastigiatis herbaceis glabris, projecturis plus minus foliaceis continua ciliatis duplicitis bifariam alatum, subinde tantummodo acutangulus, geniculis distantibus compressis. Folia inferiora 5 poll. longa, 1-1 $\frac{1}{4}$  poll. lata, in petiolum longum anguste alatum attenuata, serrata, serraturis ovatis subincumbentibus mucronulatis aequalibus, supra sparsim lineolata setulisque dispersis hirta, subitus ad costas et venas scabra, pallidiora, margine ciliata, flaccida, multiplinervia, nervis utrinque 5-7 curvatum apicem petentibus; oppositum minus. Spicæ axillares, folio suo paulo longiores vel idem aequantes, 1 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longæ, oppositæ, inaequales, simplifices; rhachis flexuosa, alata, ciliata, in alijs longiore tracta a basi aphylla et nuda, in alijs mox a basi florifera. Folia floralis opposita, patentia, ovato-vel et cordato-acuminata, subsessilia vel sessilia, serrata, supra hirta, inaequalia, altero duplo minore. Flores in axillis foliorum sessiles. Bracteolæ calyce quadruplo breviores, lineari-oblongæ, subspathulatae, obtusæ, ciliatae. Calyx semipollucaris; laciniæ lanceolato-lineares, obtusæ, in var.  $\alpha$  glabre, barbulatae, in var.  $\beta$  glanduloso-hirtæ et longiores. Corolla extus alba, intus purpureo-violacea (var.  $\alpha$ ),  $\frac{3}{4}$  poll. longa, e tubo brevi infundibuliformis. Capsula (in var.  $\beta$ ) semiuncialis, columnaris, tetragona, glabra, ad basin fere bilocularis. (v. in h. Wallich, Hooker, Edgeworth, etc.)

$\alpha$ . calyce apice barbato.

$\beta$ . calyce glanduloso-hirta. Ruellia ampliata (Pear scented Ruellia) Edgeworth in sched. n. 214.

$\gamma$ . *microphylla*, foliis parvis lanceolatis subserratis calycibusque glabris. — Simla (Fielding! in h. Hooker). Ruellia alata Wall. pl. as. rar. 1 p. 26. t. 31, cat. n. 2371 a, b. (v. in h. Hooker).

56. S. ATTENUATUS (Jacquemont voy. n. 2299 in h. Mus. paris. sub n. 151 et 152), foliis cordatis serratis caudato-acuminatis plus minus hirtis, petiolis alatis, pedunculis axillaribus terminalibusque trifidis hirsutis, spicis brevibus interruptis calycibusque hirsutis et glandulosis, bracteis bracteolisque lanceolato-linearibus obtusis, calycis laciniæ superfl. longiore.  $\mathcal{U}$  in Nepaliæ (Wallich!), in Himalayæ montibus gregarius, alt. 5-7000' (Simla Musoni, Fielding! in h. Hooker, flore Augusto, Septembri; Edgeworth! n. 210). Ruellia attenuata Wall. cat. n. 2345? N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 83? Caulis herbaceus, quadrangularis, plus minus hirsutus, setis validis. Folia inferiora cum petiolo 3-4-pollicari 7-8 poll. longa, 2 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{4}$  poll. lata, ovata, cordata, in cuspidem angustum integrerrimam producta, dense obtusaque serrata, serraturis incurvis, utrinque lineolata et hirta. Petioli hirsuti, ala angustâ herbacea prædicti. Summa folia sessilia sunt. Flores in spicis oppositi, sessiles, terminales, terni, hirsuti, glandulisque stipitatis glutinosi. Bractea calyce paulo brevior, lanceolato-linearis, trinervis et bracteolæ magis linearces, uninerves, obtusæ, glanduloso-hirsutæ. Corolla pollucaris, extus et intus glabra, purpurea? (v. in h. Wallich, Hooker et Edgeworth).

$\beta$ . foliis supra setulis rariis inspersis subtus glabris. — Cachemyr (Jacque-

(1) Planta gregaria, quæ zeylonensem quarumdam hujuscæ generis more, haud quotannis, sed periodo quadam annorum recurrente floret. » (Edgeworth in sched.)

mont ex h. Mus. paris. n. 152 in h. Nees n. 149 n. 156 in h. Mus. paris. (v. in h. paris.)

57. *S. ALATUS*, foliis cordatis cuspidatis obtuse lateque serratis supra plus minus hirsutis, petiolis alatis inaequalibus, foliorum supremorum brevissimis, pedunculis axillaribus terminalibusque trifidis hirsutis, spicis brevibus interrumpitis, bracteis oblongis, bracteolis calycis que laciniis linearibus obtusis, laciniâ superâ longiore, corollâ incurvâ.  $\mathcal{L}$  Simla (lady Dalhousie) in h. Hooker. *Ruellia alata*  $\beta$  petiolata Royle mss. *Ruellia urticifolia* Wall. cat. n. 2346? Similis *S. attenuato*, sed differt foliis brevioribus latioribus in cuspidem breviorem protractis serraturisque latioribus paucioribus neque adeo confertis praeditis, tum floribus dimidio majoribus corollisque incurvis. (v. in h. Royle et Hooker).
58. *S. REFLEXUS*, foliis superioribus subsessilibus cordato - subrotundis breviuspidatis grosse patulo-serratis reflexis oualeque tetraptero pubescenti-soabris, paniculâ terminali trichotomâ villosoglandulosâ, spicis brevibus paucifloris, bracteis parvis oblongis bracteolique cuneiformi-oblongis brevibus deciduis, calycis laciniis linearibus obtusis subæqualibus, corollæ limbo subcampanulato.  $\mathcal{L}$  In Himalayæ jugo (Royle!). *Ruellia reflexa* h. Royle  $\Delta$  *S. alato* differt: staturâ minore, caule pilis brevissimis incumbentibus scabro canescente, foliis (saltēm superioribus, sola quæ vidi) minoribus pollicem vix longis ejusdemque latitudinis serraturis aliquot grossis obtusis patulisque apicem versus instructis reflexis supra confertim lineolatis subtus et in margine pilis rarī brevissimis conspersis, inflorescentiâ magis compositâ trichotomâ ex omni parte pilis molibus patentibus capitatis glandulosâ, floribus minoribus ( $\frac{1}{2}$  poll. longis). Bracteæ oppositæ, oblongæ, obtusæ,  $1\frac{1}{2}$  lin. longæ, bracteolæ paulo minores basin versus magis angustatæ et obtusissimæ, citius quam bracteæ defluentes. Flores oppositi aut altero abortiente subsecundi, sessiles. Calyx vix 3 lin. longus, laciniis subæqualibus latiuscule linearibus obtusis glutinosus. Corolla cœrulea tubus brevis angustus, limbis tuboduplo longior conico-campanulatus; lobi obtusi. (v. in h. Royle).
59. *S. FLACCIDIFOLIUS*, glaber, caule fruticoso, juvenili profunde quadrangulari superne scabriuscule, foliis ovali-oblongis brevi-acutis in petiolum longe cuneatimque decurrentibus apicem versus obiter serratis glabris tenuibus, spicis axillaribus folio brevioribus pedunculatis simplicibus, bracteis oblongis obtusis in petiolum attenuatis inconstantibus, calycis glabri laciniis linearibus, superiore paulo longiore.  $\delta$  In Assam (Griffith!). Corolla 1 poll. longa, cœrulea. Spica 6-flora. (v. in h. Hooker).
60. *S. GLUTINOSUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86), hirsutissimus, caule fruticoso teretiusculo, foliis ovalibus utrinque acuminatis serratis spicis axillaribus oppositis terminalibusque ovatis hirsutis subglandulosisque, corollæ bracteâ multo longioris laciniis retusis.  $\delta$  In Nepaliâ (Wallich, Jacquemont voy. n. 496 ex h. Mus. par. in h. Nees n. 156), Masuri in Himalayâ, alt. 4.600', Novembri (P. Edgeworth! subglandulosus). *Ruellia glutinosa* Wall. cat. n. 2350. Similis in universum *S. Wightiano*, his notis differt: caulis est fruticosus, lignosus, nec herbaceus, medullâ succulentâ farsctus, fere teres nodis incrassatus, setis in summitate plerisque glanduloso-capitatis hirsutus. Folia cum petiolo angusto fere pollicari 4 poll. longa, duos lata, acuminata, in petiolum attenuata, mucronato-serrata, hirsuta quidem et aspera nec vero rugosa. Pedunculi axillares, oppositi absque ramulo pollicares, plerique trifidi, foliis duobus pollicariibus ovatis vel, si simplices sunt, foliis duobus circa basin, instructi; spicæ erectas et minus dense; bracteæ ovali-oblongæ, obtusæ, repando-subdentatae, ut calyces multis glandulis conspersæ et glutinosæ, nervo ad basin non ita crasso; bracteolæ spatulatae, vel linearis-patulatae, obtusæ, submucronatae, calyce plus duplo breviores; calyx semipollicaris laciniis linearibus, apicem versus paulo latioribus obtusis, superiore longiore; corolla sesquipollicaris, elongato-infundibuliformis, extus parum pubescens, cœrulea; laciniis latis retusis, intus glabra,

ad staminum basin tantum hirta. Capsula 6 lin. longa, parum compressa, pubescens, in medio tetrasperma. Variat pilis capitatis glandulosisque in caule et calycibus vcl raris vel frequentibus. ( v. in h. Wallich, Edgeworth, paris. )

? 61. S. ATROPURPUREUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 86), caule herbaceo, basi repente, foliis ovatis in petiolum anguste conicum contractis-acutis serratis supra hirtis, capitulis axillaribus pedunculatis foliaceis, bracteolis oblongi obtusis calyce multo brevioribus, corolla incurva lacinia duabus inferis minoribus.  $\mathcal{L}$  In Nepaliâ (Wallich!) (de Hügel! in h. Mart.). Ruellia atropurpurea Wall. cat. n. 2398. Caulis basi procumbens, dein erectus,  $\frac{1}{2}$ -1 ped. longus, quandoque diffusus, laxior et microphyllus, quadruplicatus, articulis longis glabris in superiore parte pilosis. Folia inferiora subrotunda, obtusa, crenato-serrata, superiora ovata, 2 poll. longa, 1  $\frac{1}{2}$  poll. lata, acutiuscula, grosse serrata, supra pilosa, in petiolum  $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{2}$  poll. longum e basi rotundata abrupte cuneatim attenuata, internodis plus duplo breviora. Rami oppositi, erecti, inaequales, altero florente longiore 2 $\frac{1}{2}$ -2-pollicari, basi aphylli, apice tetra- vel diphylli; ubi tetraphylli, ibi foliorum paria sunt approximatæ et flores ex inferioris paris axillis singuli proveniunt. Folia hæc sessilia sunt, serrata, inferiora pollicaria, ex ovato subrotunda obtusa, superiora capitulum terminale fulcientia,  $\frac{1}{2}$  poll. longa, ovata, apicem versus magis attenuata. Capitulum terminale majus et pluribus verticillis conflatum foliisque cinctum amplioribus, 3-5-florum et ultra. Bractæ propriæ nullæ, nisi folia floralia admodum contracta, ovata, subintegra. Flores sessiles. Bracteolæ calyce sextupo breviores, oblongæ, obtusæ, ciliatæ. Calyx 6-8 lineas longus, ad  $\frac{1}{2}$  quinquepartitus. Corolla sesquipollucaris, incurva, glabra, atropurpurea. (v. in h. Wall. et Mart.)

62. S. EXTENSUS, foliis cordatis acuminatis in medio grosse serratis hirsutis inæqualibus, superioribus sessilibus, spicis ex axillaribus terminalibus simplicibus trifidisve pedunculatis paucifloris, pedunculis hirsutis, bracteis ad divisionem ovato-acuminatis septuplinervibus, partialibus lincari-lanceolatis caducis.  $\mathcal{L}$  In montibus prov. Sillet (Wall!), Assam et Khas (Griffith! in h. Hook.). Goldfussia extensa N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 88 n. 2. (Ad exemplum imperfectum descripta.) Caulis erectus tetragonus, inferne glaber, superiora versus sœpe hirsutus, prnpureus. Apicem versus folia breviora evadunt et quam pro longitudine latiora; decrescent autem petioli et folia tum sessilla sunt, cordata, amplexentia, infra divisiones peduncularum autem ovata; in his denique nervi ad basin confertiores evidentes nervosum exhibent folium, superius pauciores nervi e mediâ costâ excurrent. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. fere longa, nonnihil incurva, cœrulea, basi pallida, glabra. Capsula  $\frac{1}{2}$  poll. longa. Variat calycibus minoribus linearibus et majoribus laciniis lanceolatis. (v. in h. Wall. et Hook.)

#### *Species incertæ sedis.*

63. S. SPECIOSUS (Bl. bijdr. p. 799), caule suffruticoso erecto geniculato-nodoso, foliis subsessilibus lanceolatis utrinque attenuatis argute serratis villosiusculis, capitulis subquinquefloris casu foliorum racemosis axillaribus terminalibusque bracteis lanceolatis trinerviis externe pubescentibus.  $\delta$  In umbrosis montis Megamendong (Blume). — An Goldfussiaæ species?

64. S. GLANDULOSUS (Bl. bijdr. p. 800), caule ascendente geniculato ramoso, foliis inferioribus petiolatis ovato-oblongis crenulatis, superioribus sessilibus ovatis, spicis brevibus subpaniculatis axillaribus et terminalibus et bracteis parvis linearibus calycibusque glanduloso-viscidis.  $\mathcal{L}$  In silvis altioribus montis Gede insulæ Javæ, Junio (Blume). — Hasskarl hort. bogor. cat. alter. p. 149.

65. S. MOSCHIFERUS (Bl. bijdr. p. 800), caule herbaceo inferne radicante, foliis oblongo-lanceolatis crenulatis hirtis, spicis axillaribus terminalibusque densis.

bracteis calycibus glanduloso-pilosis. 2/4 In declivitatibus montosis Solassie prov. Tjanjor insulae Javae.

*Species non nisi nomine nota.*

S. VIRGATA Bl. (Zippelius in Florâ 1829 1 p. 284.)

*Species exclusæ.*

- S. ALATA Bl. == Goldfussia paniculata  $\beta$  alata.
- S. ASPERA DCSNE == Ruellia aspera.
- S. BIBRACTEATA Bl. == Goldfussia bibracteata.
- S. HIRSUTA DCSNE == Ruellia Decaisneana.
- S. SCABER  $\beta$  N. ab E. == Ruellia aspera.
- S. n. 1272 Moritzi pl. Zoll. == Goldfussia bibracteata.

XLIII. BUTERÆA N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 83, Lindl. intr. 2 p. 285, Endl. gen. p. 700, Meisn. gen. p. 294 (203).

Calyx bipartitus, labio superiore breviore trifido, inferiore bifido vel bipartito. Corolla infundibuliformis, limbo subæquali quinquefido laciniiis emarginatis. Stamina quatuor didynama, non exserta; antheræ lineares, loculis parallelis æqualibus muticis. Stigma acutum. Capsula tetragona, prope a basi tetrasperma, dissepimento completo a parietibus solubili. Semina subrotunda, compressa, retinaculis subtensa. — Frutex Indiæ orientalis, rufo-hirsutus. Rami diffusi. Folia dentato-crenata. Spicæ axillares, imbricatae, bracteis oppositis latis herbaceis venosis. Bracteolæ parvae. Flores mediocres.

B. ULMIFOLIA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 84), ramis novellis spicisque rufo-hirsutis, bracteis rhombo-ovatis. ♂ Ex h. bot. Calc.! Ruellia ulmifolia Wall. cat. n. 2360. Ruellia comosa Roxb. fl. ind. 3 p. 43. Ruellia eucoma Steud. nomencl. Ruellia rufescens Roth nov. pl. sp. p. 304. Rami divisi, novelli setis rigidis patentibus rufis, in summitate foliisque novelli confertissimis hirsutissimi. Folia inæqualia, alterum 3-5 pollices longum, 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. latum, alterum duplo minus, ovalia, breviacuminata, in petiolum angustum rufo-hirsutissimum basi saepè inæquali desinentia, grosse crenato-dentata, supra asperissima. Spicæ axillares, oppositæ, subsecundæ, solitariae, pedunculis vix bilineariibus hirsutissimis suffultæ, pollicares, alteraque paris minore. Bracteæ 5 lin. longa, in medio latiores, basi et apice brevi spatio attenuatae, acutiusculæ, subdentalatae, pennatim venose, setis articulatis hirsutissimæ, subviscosæ. Bracteoleæ calyce tripli breviore, conico-lineares, uti calyx hirsutæ et glandulosæ. Calyx ad basin fere bipartitus; laciniaæ obconicae; superior brevior, trinervis, ad  $\frac{1}{2}$  ab apice trifida, inferior 4 lin. longa, binervis, ad  $\frac{1}{6}$  ab apice bifida; laciniaæ omnium obtuse. Corolla semipollicaris, apicem versus hirsutula, pallide violacea. Capsula 3 lin. longa, tetragona, pubescenti-scabra. (v. in h. Wall.)

XLIV. ADENACANTHUS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 84, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 700, Meisn. gen. p. 294 (203).

Calyx tripartitus, lacinia superiore trifida. Corolla infundibuliformis, limbo subæquali, quinquefido, lacinia obtusis. Stamina quatuor basi per paria conjuncta, didynama; antheræ biloculares, magnæ, loculis parallelis. Ovarium biloculare, supra basin quadriovulatum; ovula compressa. — Herbae Indiæ orientalis, foliis dentatis crenatisve glabris, inflorescentia spicata pubescente et plus minusve glandulosæ, bracteis floribusque oppositis. Bracteæ communes et bracteolæ subconformes, herbaceæ. Corolla satis magna, cœrulea.

1. *A. ACUMINATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 84 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Wall. cat. n. 7152), foliis oblongis acuminatis repando-dentatis glabris, rhachibus, bracteis calycibusque glanduloso-hirtis.  $\mathcal{L}$  In regno Birmanno, sed locus incertus (Wall.). Ruellia Sabiniana Lodd. bot. cab. t. 1712. Caulis erectus, obtuse tetragonus, purpureus, lineolis elevatis confertissimis exiguis asperulus. Folia opposita, 4-5 poll. longa, 1½-1½ poll. lata, opposito dimidio minore, oblongo-lanceolata, longe angusteque acuminata, acuminis integerrimo, basi in petiolum  $\frac{3}{7}-\frac{4}{7}$  poll. longum canaliculatum decurrentia, repando-dentata, dentibus apice callosis, penninervia, glabra, supra lineolata, utrinque praesertim subtus glanduloso-punctata. Spica terminalis, 1-3-polligaris. Rhachis profunde quadrangularis. Bractæ oppositæ, ovato-oblongæ ovatæ, acutisulcæ, basi ventricosæ, rigidæ, subenerves, setis capitatis glandulosæ et ciliatæ, calyc breviores. Bracteolæ oblongæ, obtusæ, trinerves, setoso-glandulosæ. Calyx subbilabiatus, tripartitus, 4 lin. longus; lacinia superior cuneiformis, margine reflexa, trinervia, nervo medio tenuiore, ad  $\frac{1}{4}$  trifida, lacinii obtusis glanduloso-ciliatis; laciniaæ due inferiores æquales, lineares, obtusæ, uninerves, glanduloso-ciliatæ. Corolla glabra,  $\frac{1}{2}$  poll. longa vel longior, tubulosa ?, limbo quinquefido subæquali, laciniaæ obtusiusculis. Ovarium lanceolatum, apicem versus glandulosum. (v. s. in b. Wall.)
2. *A. LATIFOLIUS*, foliis ovalibus brevicuspidatis repando - crenatis glabris, rhachibus, bracteis calycibusque glanduloso-hirtis.  $\mathcal{L}$  Patria ignota. Differt ab *A. acuminato* et foliorum formâ et corollâ ampliore, sesquipollicari, faucibus cum limbo campanulatis. (v. in h. Hook. ex hort. Kew. )

XLV. CRYPTIACANTHUS N. ab E. in Linnæa 16 p. 298 et in ind. sem. hort. vratisl. ann. 1841, in Lindl. intr. ed. 2 p. 285 et in Mart. et Endl. fl. bras. fasc. 7 p. 48, Endl. gen. suppl. 2 p. 106, Meisn. gen. p. 367. — Ruellia spec. Linn. et auct.

Calyx profunde quinquepartitus, subæqualis, sub fructu patentissimus. Corolla campanulato-infundibuliformis, limbo æquali. Stamina quatuor, didynama, inclusa. Antheræ sagittatae. Stigma simplex. Capsula oblonga, teretiuscula, bilocularis, a basi fere 12-16-sperma. Dissepimentum completum, adnatum. Semina cordato-subrotunda, compressa, laevia, sericeonitentia, retinaculis subtensa. — Herbae pleræque Americanæ, erectæ vel subacaules, villosæ, radicis fasciculatae fibris crassis subbulbosis. Folia undulato-crenata, latiuscula. Pedunculi trifidi, triflori, vel terminales plus minus elongati, subinde brevissimi, vel axillares, subinde radicales. Pedicelli fructus incrassati. Bracteæ et bracteolæ angustæ.

1. *C. BARBADENSIS* (N. ab E. del. sem. hort. vratisl. ann. 1841 et in Linnæa 16 p. 299), caulescens, pedunculis subcymosis petiolo longioribus vel et folium æquantibus superantibus, foliis subovatis basi cuneatâ in petiolum attenuatis integrerimis crenatis undatato dentatis aut glabriusculis aut pilosis, calycis laciniaæ subulato-acuminatis glandulosis plus minus hirsutis, corolla tubo faucibus breviore.  $\mathcal{L}$  In Americae calidioris tam insulis (Barbados, S.-Domingo, Guadalupe, Jamaicâ, Cubâ, Ins. Trinitatis, S.-Crucis), quam terrâ continente, inde a prov. Virginiam, Carolinam et Texas, in terris Mexicanis, Peruviam, Columbiâ, Guianam utrâque neque alterius meridiem versus. Ruellia clandestina Linn. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 365, h. Willd. n. 11636 fol. 1-6, h. Vahl! et Schreb.! Ruellia tuberosa Linn. Willd. I. c. p. 368, h. Willd. n. 11639, h. Vahl! Schreber! Sieber! h. ins. Trinit. n. 91! Schlechtend. in Linn. 6 p. 749. Ramon de la Sagra, Hist. Nat. de Cuba. Ruellia lactea h. Willd. n. 11635 fol. 2 (nec Cav.). Ruellia paniculata Scop.! in h. DC., Pavon ! in h. Moricand. Gentianella flore cœruleo.... Sloane Jam. 1 p. 149 t. 95 f. 1, Dill. h. eltb. p. 328 et 248 f. 320 planta humilis foliis luxurians. (v. v. et sicc. in h. DC. etc.)

2. foliis plerisque obtusis majoribus minoribusve. — Variat : 1° pedunculis longioribus subinde in summo caule paniculam nudam strucentibus  
— 2° pedunculus superioribus brevibus in speciem spicæ nude verticillatae confluentibus. (spec. e Vera Cruz, Schiede! in h. reg. berol., h. Hook.!)  
— 3° pedunculus omnibus axillaribus folio brevioribus paucifloris.
3. foliis plesiisque acutiusculis. — In insulâ Portorico. (v. in h. DC.)
7. foliis undulato-crenatis saepè acutis minoribus, calycibus densius glandulosis. — Variat : 1° foliis minoribus, pedunculis longioribus, floribus clandestinis. In Peruviâ. Ruellia clandestina (Pavon! in h. Moricand). — 2° hirsutis, pedunculis folia æquantibus cum calycibus dense glandulosis, floribus perfectis. In Peruviâ. Ruellia triflora Pavon! in h. Moricand. Ruellia paniculata h. Schreb.! (sp. c.) Ruellia tuberosa h. Benth.! (sp. c.). Ruellia Lysimachia hort. monsp. in h. Benth.! h. Willd. n. 11636 fol. 4 et 6 (sub R. clandestinâ). Ruellia strepens hort. Madrit. in h. DC. Dipteracanthus nudiflorus Engelm. et Gray pl. Lindheim. p. 21 n. 157.
5. humilis, caule brevissimo, foliis subintegerrimis, pedunculis 1-2-floris folia æquantibus. — In ins. Cuba, Venezuela. (v. s. c. ex hort. berol. et sp. in h. DC.)
2. C. LACTEUS (N. ab E. del. sem. hort. vratisl. auu. 1841 et in Linnaea 16 p. 299), caulescens, floribus in capitulum terminale congestis, pedunculis axillaribus, ubi adsumtis, brevissimis plerisque petiolo brevioribus, ad summum ejusdem longitudine, corollæ tubo fances subæquante.  $\mathcal{L}$  In imperio Mexicano (Cavanilles), inter Acatlan et Chila in ditione de Puebla, Maio (Andrieux! pl. mexic. exsicce. n. 134 in h. DC.), ad Regla, Ocotegez, Iguala (Erenberg! n. 164, 667 t. E. in h. reg. berol. ! specimina capitata), in Peruviâ (Pavon! in h. Moricand). Ruellia lactea Cav. ic. 3 p. 28 t. 255, Willd. sp. pl. 3 p. 365. Ruellia ovata h. Willd. n. 11627 (spec. cult.), Schlechtend. in Linnaea 5 p. 96, h. DC.! n. 547 (ex h. Thibaud) et 567 (nec R. ovata Cav.). Ruellia sessilis cum synon. R. ovata Willd. Balbis! in h. DC., h. Willd. n. 11626 fol. 4, h. Vahl! ex hort. paris. Ruellia hispida h. DC. ex hort. com. de Harrach. Ruellia prostrata Pavon! in h. Moricand. Ruellia verticillata Pavon! ibid. Ruellia divaricata Hoffmannsegg verz. 1 p. 195. Ruellia Hoffmannseggii Steud. nomencl. ed. 2 p. 481. Variat caule ramosissime diffuso, tum vero floribus in caulis apice capitulum evidenter construentibus, quæ est R. ovata h. Willd. et R. sessilis Balb. — Corolla saturata crerulea vel alba. (v. v. c. et s. in h. DC. etc.)
- $\beta$ . acaulis, caule subnullo, foliis unguicularibus, floræ totâ reliquâ plantâ majore. — Mexico ad Regla (Erenberg! n. 627 in h. gen. berol.), in planitie siccâ et sterili Oaxacensi alt. 5000', a Novembri in Aprilem (Galeotti! n. 913 in h. Hook. et Benth.)
3. C. MACROSIPHON, caulescens. pedunculo brevissimo, tubo corollæ faucibus subduplo longiore.  $\mathcal{L}$  Circa Oaxacam, Julio (Andrieux! pl. mex. exsicce. n. 132 in h. DC. et in h. reg. monac. et Hook! n. 132), Bejar (Berlandier! n. 1586, n. 316 in h. Hook.!) cum C. Barbadensi var.  $\gamma$  mixtus). Quod ad folia, cum caule subhirsuto, undulato-dentata, obtusa, in petiolam longum decurrentia, similis est C. lacteo Cav., sed distinctus ab hoc est et a reliquis tubo corollæ longo pollicari, faucibus autem semipollicaribus angustisque. Corolla alba! (v. in h. DC. et Hook.)
4. C. AUSTRALIS, caulescens, pubescens, caule subdiffuso vel erectiusculo, floribus axillaribus subsessilibus solitariis ternis ebracteatis, foliis lanceolatis ovalibus obtusis subrepandis.  $\mathcal{L}$  In Novæ Hollandiæ littore orientali et septentrionali inter tropicum et in agro urbis Port Jackson (R. Brown! in h. DC. ex h. Thibaud n. 446 ex parte). Ruellia australis R. Br.! prodr. fl. Nov. Holl. 1 p. 479, ed. N. ab E. p. 335. Planta palmaris, C. lacteo macro sub-

similis. Calycis lacinia subulata, hirsutæ. Capsula oblonga, tereti-compressa, laevis. (v. in h. DC.)

5. C. ANGUSTIFOLIUS, caule herbaceo humili foliisque oblongo-lanceolatis obtusis basi acutâ in petiolum longiusculum decurrentibus integerrimis laxe hirsutis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus alternis, bracteolis linearibus obtusis (infinis lanceolato-spathulatis) calyce duplo brevioribus calycisque laciniis lineari-attenuatis hirsutis.  $\mathcal{U}$  In præruptis Cordilleræ prov. Vera Cruz alt. 2000 ped., a Junio in Octobre et Xalape (Galeotti! n. 933 in h. Hook. et Benth.). Afinis C. lacteo et australi. Corolla pollicaris cœruleescens (Galeotti). Capsula prope a basi 16-20-sperma. (v. in h. DC. et Benth.)
6. C. DIPTERACANTHUS, caule herbaceo humili foliisque oblongo-lanceolatis obtusis basi acutâ in petiolum longiusculum decurrentibus integerrimis laxe hirsutis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus alternis, bracteolis linearibus obtusis (infinis lanceolato-spathulatis) calyce duplo brevioribus calycisque laciniis lineari-attenuatis hirsutis.  $\mathcal{U}$  In præruptis Cordilleræ prov. Vera Cruz alt. 2000 ped., a Junio in Octobre et Xalape (Galeotti! n. 933 in h. Hook. et Benth.). Afinis C. lacteo et australi. Corolla pollicaris cœruleescens (Galeotti). Capsula prope a basi 16-20-sperma. (v. in h. DC. et Benth.)
7. C. PUMILUS, subacaulis pubescenti-tomentosus, pedunculo bi-trifloro petiolo longiore, calycis laciniis subulatis villosulis.  $\mathcal{U}$  In Peruvia (Pavon!). Ruellia pumila Pavon! in h. Moricand. Folia ovalia, obtusa, repanda, basi cuneatâ in petiolum attenuata, undique cano-tomentosa, juvenilia subtus albida. Pedunculi pollicares, folio duplo breviores. Flôres in apice pedunculi sessiles, calycibus haud glandulosis, quâ notâ insuper a varietatibus C. Barbadiana differt, neque solâ pubescentiâ densiore brevioreque tomentum efficiens. (v. in h. Moricand.)
8. C. ACAULIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 49), acaulis, pedunculo communis petiolo breviore hirsutissimo calycis laciniis linearibus.  $\mathcal{U}$  In convallibus ad Puerto Alegro in prov. Rio-Grande et in ripâ S.-Barhani in Campo (Sellow! in h. reg. berol. n. 81, 82, 83), in summis montibus prov. Rio-Grande ad Jacuhy (Tweedie! in h. Benth. et Hook.), Uruguay (Baud! in h. Hook.) (in h. mus. paris.! n. 246). Gerardia tuberosa Linn. sp. pl. Willd. 3. 1 p. 221 n. 1. Habitus Primulae. Folia ovata, obtusa, repando-subcrenata, in petiolum longum attenuata, supra setulis sparsis hirtula, vcl etiam glabra, subtus ad oostas, medium præsertim, hirsuta, 3-4 poll. longa, 1½-1½ poll. lata. Calycis laciniæ lineares, obtusæ, hirsutæ, longiores quam in precedentibus, quarum calyces fere glabri. Corolla bipollicularis, subtiliter cœruleo-striata. Capsula 10-12-sperma. (v. in h. reg. berol. paris. Hook. etc.)
9. C. UDUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 49), acaulis, foliis subsessilibus, pedunculo glabriusculo folium subæquante, calycis laciniis linearibus subulatis.  $\mathcal{U}$  Prope Cujaba, locis humidis post tempus pluvium exsiccantibus, Februario (Riedel! in h. acad. petrop. n. 56). Folia oblonga, obtusa, subrepanda, in petiolum brevissimum attenuata, ciliata, supra (præsertim in costâ media) plus minus hirsuta, 2-3½ poll. longa, ½-1 poll. lata. Scapi radicales, graciles, pilis rarís adspersi, 2-4-flori. Flores distantes, alterni. Bracteæ subulatae, parvae. Pedicelli calyces æquantes vel breviores, pilis rarís adspersi. Calyx 5 lin. longus, hirsutus, laciniis angustis. Corolla pollicaris, pallide cœrulea, faucibus anguste oboconicis. Capsula 6 lin. longa. (v. in h. petrop.)

#### XLVI. SIPHONACANTHUS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 45.

Calyx quinquepartitus, laciniis subinæqualibus linearibus herbaceis. Corolla tubulosa, limbo brevi subæquali, fauibus parum inflatis elongatis. Stamina quatuor, didynama, basi fauicum inserta. Antheræ oblongæ, biloculares, loculis parallelis contiguis æqualibus muticis. Stigma subula-

tum, uncinatum. Capsula brevis, bilocularis, prope basin tetra-hexasperma. Dissepimentum completum. Semina orbiculata, retinaculis suffulta. — Herbae Brasilienses, saepe pubescentes hirsutae, inflorescentia tum glandulosâ; ubi reliqua partes magis glabrae, ibi saltem bracteæ calycis que laciniæ hirsutæ sunt. Flores axillares, oppositi, brevipedicellati, solitarii ad apicem caulis denique magis conferti, spicati subspicative. Bracteolæ nullæ. Corolla (Geissomeriae sere) coccinea. Differt hoc genus a Ruellia formâ corollæ et fructu crassiore oligospermo, tum et inflorescentia.

1. S. VILLOSUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 46) hirsutus, foliis ovatis.  $\mathcal{L}$  In Brasilie provinciâ Para, Minas Geraes, etc. (Martius! Pohl! Riedel! Vauthier!). Ruellia villosa Pohl! ic. in h. imp. vindob. n. 3204. Dicliptera villosa Mart.! in h. reg. monac. Justicia villosa Mart. in observ. n. 1529. Caulis subinde valde ramosus, flexuosus, subinde simplex et strictus, uti foliis et bracteis patulo-hirsutus, adscendens scandensque, divisus in ramos erectos. Folia caulinae pollicem longa  $\frac{1}{2}$  poll. lata, obtusa, in breve petiolam acute desinens, integerrima, ramis costalibus 4-5; superiora et ramea minora et saepe subrotunda. Flores in apicibus ramulorum sursum decrementum subcapitati, brevissime pedicellati oppositi, 2-4. Bractea una vel duæ ad basin capituli majores, ovales, obtusæ, breviter petiolatae, 6 lin. longæ, hirsutæ; reliqua orbiculata, subsessiles, hirsutissimæ. Calycis laciniæ 4 lin. longæ, nonnihil inæquales, lineares, obtusæ et apice paulo latiores, piloso-glandulosæ, basi hirsutissimæ. Corolla coccinea, pubescens, pollicem paulo longior, laciniæ brevibus retusis. Stamina et pistillum generis. Capsula ovalis, pubescens, prope a basi tetrasperma. (v. in h. DC., monac., vindob., petrop. etc.)
2. S. PUBENS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. 7 p. 46), pubescens, foliis oblongis supra punctato-asperis et pubescenti-hirtis.  $\mathcal{L}$  In silvis districtus adamantium, provinciâ Minarum Brasilie, Maio (Martius! et Guillemin! in h. Mus. paris. n. 251), in silvis Catingas provinciâ Bahiensis (Pohl! in h. imp. vindob.), in umbrosis subhumidis prope Barbacena provinciâ Minarum, Maio, Junio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 12 et 164). Ruellia pilosa h. imp. vindob. Totus pubescens, magis minusve glandulosus. Caules 2-2 $\frac{1}{2}$  ped. alti, erecti, subscandentes, ramosi. Folia utrinque attenuata, obtusiuscula obtusave, 1-2 poll. longa  $4\frac{1}{2}$ -6 lin. poll. lata, repanda aut integerrima, septupo-undecuplinervia nervis supra magis conspicuis, supra aspera et pilis brevissimis vestita, subtus punctata, brevipetiolata, floralia unguicularia, integerrima. Flores oppositi. Pedunculus 2 lin. longus. Calyx 3 lin. longus, laciniis 2 superioribus paulo longioribus, cunctis autem æquilatis. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, pubescens, recta; fauces oblongæ, cum limbo tubi longitudine: laciniæ breves, ovatae, obtusæ, magis pubescentes. Capsula oblonga, subteres, pubescens, mucronata. Semina orbiculata, mucronulata, sericea. (v. in h. monac., vindob., petrop. et paris.)
3. S. RUBIGINOSUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 46), pubescenti-tomentosus, foliis oblongis costis pluribus, rameis et floralibus ovatis.  $\mathcal{L}$  In Brasilie ad Parana fluvium, Octòbri (Sellow!). Similis S. puberulus nisi ejus est varietas. Differt pubescenti fere tomentum rufescens construente, in superiore caulis parte et præsertim in calycibus valde glandulosâ et foliis diversiformibus. Caulis erectus vel etiam adscendens. (v. in h. berol.)
4. S. DIFFUSUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 46), caule suffruticoso ramoso adscendente ramis elongatis geniculatis foliisque elliptico-oblongis in costis pilosis.  $\mathfrak{Z}$  In Brasilie, Ribeiro Catinga (Pohl! in h. imp. vindob. n. 5040). Proximâ affinitate conjungitur cum S. pubente, sed differt caule ramisque elongatis adscendentibus neque erectis, foliis majoribus latioribus supra haud punctato-asperis et dense pubescientibus sed subtilissime lineolatis fere levibus nec nisi in costis pilosis, ramis costalibus 7-5nis nec

- ternis solummodo. Caulis tetragonus, angulis acutis. Folia apice magis quam basi attenuata sunt, apice tamen obtusa, margine saepe repanda. Calyx 5 lin. longus, pubescens, vix glandulosus. Corolla incurva, 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. longa. (v. in h. vindob.)
5. S. DENSUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 47), caule fruticoso ramoso, ramisque erectis apicem versus foliisque oblongis basi acutis supra in costis subtusque pilosis. In Brasiliâ, Rio d'Andrade (Pohl! in h. imp. vindob. n. 6035), in Minas Geraes (Claussen! in h. Mus. paris. n. 229). A S. diffuso recedit habitu rigidiore, caule lignoso inferne subtereti superne obtuse tetragono, ramis brevioribus crebris ad angulum acutum erectis fusco-purpureis, foliis paulo minoribus apioem versus minus coangustatis magisque obtusis. calycibus brevius pedicellatis multis subsessilibus evidentiusque glandulosis, corollâ præsertim basin versus angustiore, lacinia magis emarginatis. Probabiliter S. pubentis est forma. (v. in h. vindob. et paris.)
6. S. ERYTHROPUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. 7 p. 47), caule suffruticoso glabro, ramis erectis fastigiatis, foliis ovatis bracteisque basi ciliatis floribus superioribus capitato-spicatis, bracteis subcordatis. In limitibus paludum ad S. Laurenço, a Puerto Alegro versus Rio grande (Sellow! in h. reg. berol. n. 8). Caulis stricte erectus, levis, tri-dichotomus. Folia Organii, basi acute in petiolum hirsuto-ciliatum brevem desinentia, apice angusto obtuso, margine subrepanda et præsertim ad basin ciliata. Flores inferiores axillares, solitarii vel gemini, oppositi, pedicello hrevissimo, rubro! suffulti; reliqui ad apicem ramorum in spicam subglobosam foliosobracteatum conferti. Folia floralia superiora 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, subsessilia, cordata, basi petiolaque valde ciliatis. Calyx 3 lin. longus, strigiloso-canus. Corolla calyce paulo longior, subcylindrica, limbi lacinia rotundatis parvis. Capsula 4 lin. longa, glabra. (v. in h. berol.)
7. S. REPENS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 47), dense pubescens, foliis ovali-oblongis repando-denticulatis supra pubescenti-hirtis, ramis costalibus 6-10nis, floribus axillaribus terminalibusque spicatis bracteis lanceolatis calyces hirsutissimos vel æquantibus vel iis duplo brevioribus. In Brasiliâ ad Meritiba in provinciâ Bahensi (Blanchet! in h. Moricand). Differt a reliquis inflorescentiâ propter folia floralia omnia parva spicas interruptas exhibente. Rhaches pubescenti-glandulosæ. Corolla 8-9 lin. longa, coccinea. Quod ad integumentum S. pubentem refert. Caulis 1-1 ped. altus, basi procumbens fibrisque validis repens, apice ascendens. (v. in h. Moricand).
- $\beta.$  major, floribus axillaribus nullis, spicâ terminali trifidâ basi interruptâ, bracteis omnibus calyce duplo brevioribus. In Brasiliâ (Swainson! in h. Hook.)

XLVII. STEPHANOPHYSUM Pohl pl. bras. 2 p. 83, Endl. gen. p. 700, Meisn., gen. p. 294 (203), N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 49.

Calyx quinquepartitus, lacinia angustis æqualibus. Corolla tubo brevi, faucibus in plerisque campanulato-inflatis deorsum ventricosis, aliis ovalibus oblongisve æqualibus, limbi lacinia brevibus æqualibus erectis. Stamina quatuor, didynama, faucibus inserta, corollam plerumque æquantia; filamenta per paria basi connata; antheræ bilocularis, loculis parallelis, lineares, basi sagittatae, demum recurvæ. Stigma bilabiatum, labiis planis acuminatis, superiore breviore. Capsula a basi ad medium contracta, elocularis, hinc bilocularis tetra-dodecasperma. Semina plana, orbiculata, retinaculis fulcrata. — Herbae Americæ tropicæ, foliis plus minus dentatis. Cymæ umbellares, laterales, pedunculatæ, quadrifidæ, abortu bifidæ, radis bifidis, bracteis parvis subulatis, bracteolis nullis; abortu evadunt pedunculi uniflori, sub flore bipartite, vel flores termi-

nali-aggregati, subracemosi, pedicellis ebracteatis. Corolla digitaliformis, coccinea. — Quod ad stigma minime differt a Ruelliâ Stephanophysum genus, sed omnino corollâ. — Inflorescentiæ typus derivandus est a ramorum indole, quippe qui tæpe gemini oriuntur ex ejusdem folii angulo. Igitur totidem utrinque in apice pedunculi provenientibus completior illa exoritur umbellæ quadriradiata figura, scil. deficiente jam apice ramo inter utraque ramulorum paria antea sito. Tum vero et radiis numero variantibus, umbella fit vel trifida, vel frequentius tamen bifida, et ramos, ubi alterius dividuntur, semper bifidos invenies. Accedit tum subinde flos intermedius terminans, haud raro vero etiam deficit. Vidi etiam cymam umbellarem primariam quadrifidamque cum flore intermedio.

### § 1. *Floribus solitariis axillaribus.*

1. S. QUADRIFARIUM, glabrum, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis brevi-petiolatis, pedicellis in apice caulis et ramorum quadrifariam approximatis bracteis linear-lanceolatâ paulo longioribus calycisque lacinias pubescenti-glandulosis.  $\mathcal{L}$  In Peruviâ (Ruiz! in h. gen. berol. Macrostegiae Ruizianæ admixta specimen). Rami acute quadrangulares. Folia suprema 5 poll. longa,  $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. lata, repando-crenata, tenuia, laxe venosa, aëcunine obtusiusculo. Pedicelus circiter 4 lin. longi, valde approximati, oppositi. Calyx  $\frac{1}{2}$  poll. longus, lacinias linearibus obtusiusculis. Corolla pollicaris, pubescens, faucibus æqualibus oblongis, lacinias obtusis ovalibus. Stamina limbo paulo breviora. Capsula pubescens, 4-sperma. Delapsis pedicellis bracteisque axis quadrifariam verrucoso-cicatratus relinquitur. ( v. in h. berol. )
2. S. HIRSUTUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 50), patentihirsutum, foliis oblongis, floribus axillaribus alterius subsessilibus, bracteolis lanceolatis lanceolato-linearibus obtusis calyce setaceo-acuminato hirsuto brevioribus, corollæ faucibus subæqualibus oblongis.  $\mathcal{L}$  In Brasilæ silvis ad Rio Belmonte (Max. Princ. Wied.! in h. Mart., Riedel! in h. acad. petrop.). Est Stephanophysi species habitu Dipteracanthi aut vice versâ, transitu a Stephanophyso tubulato. Frutex 4-5 ped. altitudine, ramis longis simplicibus obscure tetragonis, uti reliquias partibus pilis longis patentissimis albis vestitis. Folia cum petiolo trilineari  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 9-10 lin. lata, repanda, basi obtusa, subinde acutiuscula, apice attenuata, ipso apice obtuso, superioribus autem acuto. Pedicellus  $\frac{1}{2}$  lin. longus. Bracteolæ ad ejus basin 9 lin. longæ. Calyx 12 lin. longus. Corolla rubra,  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, subdecurva, a tubo brevissimo ad medium fere obconico dilatata, hinc ovali-oblonga; limbi lacinias subæquales, erectæ, subrotundo-ovatae, obtusæ. (v. in h. Mart. et petrop.)
3. S. TUBULATUM, pubescens, foliis ovatis, pedunculo axillari folium subæquante unifloro, bracteolis sub flore linearibus patentibus calyce hirsuto brevioribus, corollæ faucibus æqualibus oblongis.  $\mathcal{L}$  in Peruviâ (Pavon!). Ruellia tubulata Pavon! in h. Moricand. Folia longe petiolata, utrinque acuta, integerrima. Corolla coccinea,  $1\frac{1}{2}$  poll. longa. Calyx 9 lin. longus. (v. in h. Moricand).

### § 2. *Floribus cymoso-umbellatis.*

4. S. BREVIFOLIUM (Pohl plant. bras. 2 p. 84 t. 155 et in h. imp. vind.), glabrum, foliis ovato-attenuatis obtuse dentatis, corollæ lacinias obtusis cum apiculo.  $\mathcal{L}$  In Brasilâ inter frutices prope Sebastianopolin prov. Rio de Janeiro (Schott! in h. imp. vindob. s. n. et Schüch! in eod. h., Karwinski! in h. Mart.), in umbrosis ad vias prope Campos et alibi in prov. Rio de Janeiro, Julio (Riedel in h. acad. petrop. n. 783), prope Paraiba, Septembri, Octobri

(Max. princ. Wied ! in h. Mart.) — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 50. (v. in b. vindob., petrop. et Mart.)

5. S. **LONGIFOLIUM** (Pohl plant. bras. 2 p. 85 t. 156 et in h. imp. vindob. n. 3027 et 6038), glabrum, foliis oblongo-lanceolatis oblongis utrinque attenuatis repando-denticulatis repandis, corolla laciniis retusis.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ: in umbrosis inter frutices ad Rio Pirahi Capitaniae Rio de Janeiro et in Serra de Cumbuco Capitaniae Minas Geraes, Martio et Julio (Pobl ! in h. imp. vindob. n. c., Claussen! in b. Hook.), in silvis ad Caité et in silvis primævis supra Serra do Mar prope Bananal prov. Sebastianopolitanæ, Decembri (Martius !), in nemoribus ad Rio Paquaque fluvium, Januario (Beyrich !), in Peruviâ (Pavon ! in h. Moricand), in Boliviæ prov. Chiquitos ad S.-Cruz (d'Orbigny ! in h. Mart.), Ixu Pangoa (Matthews ! n. 1234, 1536 et 3148 in h. Hook.) — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 50. Cyrtacanthus corymbosus Mart.! in b. reg. monac. et obs. n. 1220. Ruellia sp. nova Pavon ! in h. Moricand et in b. Mart. ex h. berol. Ruellia amœna N. ab E. in h. Beyrich ! Specimen Peruvianum non differt nisi foliis minus conspicue dentatis et tantummodo leviter repandis, sed talia et in Brasiliensibus subinde conspicuiuntur folia. (v. in b. vindob., monac., berol., Mart., Hook. et Moricand).

$\beta.$  *microphyllum*, foliis minoribus (2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longis  $\frac{1}{2}$  poll. latis).  $\mathcal{L}$  In Brasilîa. (v. in h. Mart.)

6. S. **MOLLE**, pubescenti-tomentosum, foliis oblongo-ovalibus acuminatis in petiolum brevissimum decurrentibus repando-subcrenatis, caule acutangulo, lateribus alternis latioribus convexis alternis angustioribus profunde excavatis, corolla. .  $\mathcal{L}$  In Peruviâ ad Cucero (Ruiz ! in h. gen. berol.). Ruellia flore coccineo Ruiz ! in b. gen. berol. (ex parte). Differt a reliquis pubescenti tomentiformi molli et caulis structurâ. Folia 5 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, longe acuminata, ramis costalibus 12-13nis, subtus præsertim prominentibus magisque birsutis. Cymæ umbellares 4-fidæ, bifidæ, folium vix æquantes, pedunculo quadrangulari crassiusculo. Bractæ lanceolatae. Bracteolæ lineares. Calycis laciniæ subulatæ. Corolla et fructus deficiunt. (v. in b. berol.)

7. S. **VENTRICOSUM**, pubescens, foliis oblongis acutis basi angustatâ in petiolum brévem decurrentibus integerrimis, caule tetragono erecto, pedunculis folio brevioribus apice diebotomis paucifloris, tubo corollæ fauibus inflatis elongatis breviore, limbi laciniis rotundatis subemarginatis.  $\delta$  In ripâ obumbrata fluminis Chamayæ prope Chavico in prov. Jaen de Bracamoros Columbiæ, floret Augusto (Humboldt!). Ruellia ventricosa Kunth in Humb. nov. gen. et sp. 2 p. 241, Kuauth synops. 1 p. 38. — An eadem species, ac nostrum S. molle ? Sed corolla « incarnata » describitur ab auctoribus libri cit.

8. S. **RUIZIANUM**, pubescenti-tomentosum, foliis ovatis acuminatis repando-crenatis e basi obtusa in petiolum acutatis, caule acutangulo, lateribus alternis angustioribus concavisque, calycis laciniis linearisubulatis, tube corollæ fauibus duplo triplove breviore, limbi laciniis ovatis obtusis.  $\mathcal{L}$  Ad Aluna Peruviæ (Ruiz ! in b. gen. berol. et in Lambert), etiam in Chili (Ruiz ! ibid.). An var. præcedentis ? differt autem foliorum latiorum formâ, quæ non ad basin fere petioli cuneatim descendunt, sed basi rotundatâ, quin subinde subcordatâ, in petiolo sinuatim acuteque desinunt. Reliqua ut in illo. Pedunculi cum floribus folia sœpe æquant. Corolla pùnicaea, 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, tubo apice incurvo trilineari. Capsula 4 lin. longa, pubescens, 4-8-sperma. (v. in h. berol.)

9. S. **FLAVUM** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 51), tomentosum, foliis ovatis acutis obtusata repando-subcrenatis e basi obtusa in petiolum acutatis, caule quadrangulari, lateribus alternis angustioribus, calycis laciniis oblongo-linearibus obtusis, tubo corollæ fauibus late inflatis duplo triplove breviore, limbi laciniis ovatis obtusis.  $\delta$  In Brasiliâ : in silvis Capaô prope Capellinha in prov. Goyaz, Augusto (Riedel ! in h. acad. petrop. n. 2517). A S. Ruizianum differt imprimis calycibus obtusis, laciniis latioribus et floribus brevioribus, fauibus magis ventricosis, tubo breviore crassiore rigido, tum et

corollæ colore flavo. Capsula pollicaris , octosperma, pubescens. Frutex 3-4-pedalis. Folia inferiora cum petiolo sesquipollucari 8 poll. longa, 4 poll. lata. (v. in h. petrop.)

10. *S. CORDIFOLIUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 51), foliis elliptico-oblongis acuminatis repando-crenatis basi inaequalibus subcordatis, pedunculis calycibus pubescentibus tubo corollæ longitudine faucium, limbi laciniis acutis.  $\mathcal{V}$  In Brasiliâ : in uidis silvis prope Para prov. Paraensis, Augusto, et in silvis ad flumen Japura prov. fluminis Nigri, Novembri, Decembri (Martius!). Cyrtanthus cordifolius Mart.! in h. reg. monac. et obs. n. 2594. Caulis tetragonus, glaber, sed pedunculi et calyces cano-pubescentes. Folia basi angustiora ibidemque obtusa, inaequalia, saepius evidenter cordata, acuminata, 5-5½ poll. longa, 1½-1¾ poll. lata, in costis et margine puberula. Pedunculi folium maternum æquantes superantesve, saepè bifidi cum flore intermedio, radis bifidis inaequalibus paucifloris, floribus secundis. Subinde pedunculi et uni- et biflori sunt. Bractæ oblongæ. Pedicelli breves. Calyx pollicaris, laciniis linearibus acutis. Corolla bipollucaris, tubo pollicari recto cylindrico; limbi laciniæ patentes, ovato-triangulares, tres sursum, duæ deorsum spectantes. Stamina exserta, adscendentia. Stigmatis laciniæ apice involutæ. Capsula longitudine calycis, a medio 8-12-sperma; abortu etiam 6-sperma. (v. in h. monac.)
11. *S. ANGUSTIFLORUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 51), caule adultiore glabro tetragono, angulis carinato-acutis, ramulis novellis petiolis pedunculisque pubescentibus, foliis inferioribus ovato-oblongo-attenuatis repando-crenatis longe petiolatis, superioribus oblongis, corollæ subventricosæ laciniis retusis.  $\mathcal{V}$  In Brasiliae prov. Rio grande de S.-Pedro, ad Porto Alegro (Sellow! rev. Joannes de S.-Barbara! Twcedie! Isabelle!). Forma corollæ fere Siphonacanthi, sed reliqua maximeque inflorescentia hujus generis. Folia caulinæ inferiora cum petiolo 6-7 poll. longa, 1½-2-2½ poll. lata, cuspidato-attenuata, acumine obtuso integerrimo, juniora subtus ad costas puberula, floralia plus duplo minora et angustiora. Pedunculi graciles, foliis floralibus saepè longiores, haud fastigati, umbellatim quadrifidi. Corolla coccinea, pollicaris. Stamina corollam æquantia. Variat foliis undique puberulis et fere totis glabris, tum et calycibus pubescentibus glabrisve. (v. in h. Hook., Mart. et reg. berol.)
12. *S. CILIARE* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 52), caule quadrangulari glabro, foliis ovalibus brevicuspidatis subrepandis glabris basi acutâ in petiolum brevem ciliatum desinentibus, junioribus ciliatis, floralibus axillaribus, aliis pedunculatis pedunculo folio breviore paucifloro, aliis solitariis sessilibus, calyce hirsuto, tubo corollæ longitudine faucium hinc ventricosarum, limbi laciniis ovatis obtusis, iufinâ majore. ♂ Prope Rio de Janeiro (Riedel! in h. acad. petrop.). Caulis ramosus, ramis divergentibus ad angulos in nostro tuberculatis. Folia inferiora cum petiolo trilineari 4 poll. longa, 1½ poll. lata; superiora ramorum duplo fere minora. Pedunculi communes 6-9 lin. longi, apice bi-triflori, floralibus cymoso-capitatis. Flores superiores solitarii, sessiles. Calyx 9-10 liu. longus, laciniis linear-attenuatis hirsutissimis. Corolla sesquipollucaris, cerulea? (v. in h. petrop.)
13. *S. ASPERULUM* (Mart. et N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 52), pubescens vel hirsutum glandulosumque, foliis ovatis utrinque acutis, cymis dichotomis brevipedunculatis, tubo corollæ longitudine faucium aut paulo breviore, laciniis limbi oblongis obtusis, capsulâ tetraspermâ. ♂ In Brasiliâ. Accedit quod ad formam corollæ *S. cordifolium*, sed differt hirsutis glandulosâ in inflorescentiâ maxime obviâ et pedunculis semper folio brevioribus saepè vix petiolum superantibus, in var. β divergenti-divisis et in ramo (seu caule) confertis, primo adpectu Dipteracanthi inconti imaginem fingentibus. Fructulus inter frutes adscendens. Folia 2½ poll. (cum petiolo trilineari) longa, poll. lata. Bractæ breves, oblongæ, patentes. Corolla 1½ poll. longa, roseo-

coccinea ?, faucibus versus tubum coangustatis, quo fit, ut tubus sœpe faucibus longior esse videatur. Flores rubri, subinde flavi. (v. in h. monac.)

$\alpha.$  *majus*, cymis minus divisus, pubescentia molliori. — In silvis ad Villa de Cachoeira prov. Bahiensis, Januario. — Stephanophysum asperulum Mart. in h. reg. monac.

$\beta.$  *hirsutulum*, foliis subtus tomentosis hirsutisque, cymis crebrius divisus, integumento magis hirsuto et glanduloso. — In silvis Catingas ad Alto dos Boys Minarum Novarum prov. Minarum Generalium, Augusto (Martius!), Montagne Soledade (Blanchet! n. 3284 in h. Willd. et in h. Moricand), in silvis Catingas prov. Ceara, Augusto (Gardner! n. 1814 in h. Benth.! Hook.! et Moricand!). Stephanophysum hirsutulum Mart. l. c. (v. in h. monac., berol., Hook., Benth. et Moricand).

### *Species exclusæ.*

S. ATTENUATUM Mart. = Geissomeria longiflora var.  $\beta$ .

XLVIII. STEMONACANTHUS N. ab. E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 53.

Calyx supra basin quinquepartitus, æqualis. Corolla ex infundibuliformi hypocrateriformis, id est faucibus elongatis obconicis, limbo patentissimo reflexo. Stamina quatuor longe prominentia, tubi mediocris apici inserta, basi per paria connata faucibusque longiore tractu adnata; antheræ bilobulares, connectivo latiusculo demum sœpe complicato et tum loculis arcuatis contiguis secundis, dorso antheræ carinato, antheram unilocularem fingentibus, loculis margine membranaceis. Stigma bilabiatum, labiis planis acutis crassiusculis, superiore breviore. Capsula ad basin brevi spatio contracta et aspera, hinc magis inflato-ovata vel oblonga et ad basin cavi tetra-octosperma. Semina retinacula subtensa, plana. Retinacula apice tridentata. — Frutices Americani speciosi, foliis medii caulis sœpe ternis. Inflorescentia plus minus glanduloso-pilosa, raro glandulosa; vel panicula terminalis, trichotoma, bifida, floribus sœpe alternis brevipedicellatis vel abbreviatis ramis inflorescentia thyroidea; vel denique flores in axillis foliorum superioribus solitarii sessiles. Bractæ parvæ, lineares, angustæ, obtusæ, patentes vel reflexæ persistentes rariorive exemplo deciduae. Bracteoæ nullæ. Flores coccinei.

### § 1. *Capsula 4-sperma, ovata, panicula laxior, saltem haud thyroidea. Pleraque Brasilienses.*

1. S. MACROPHYLLUS, caule fruticoso erecto, ramis foliisque ovatis ovato-oblongis apicem versus attenuatis basi acutis repando-crenatis petiolatis utrinque subtilissime puberulis, pedunculis vel folia aquantibus bifloris, vel umbellatim quadrididis multifloris folio longioribus, bracteis lanceolatis pedicellis æquantiibus, calycibus ad  $\frac{4}{5}$  fidis basi bibracteolatis glabriusculis, corolla tubulosâ. § In S.-Marthâ Americae meridionalis (v. Rohr! in h. Vahl!), Jamaicâ (h. Hook!), in Valencâ et Porto Cabello imperii Mexicanî (Moritz! in h. gen. berol.), Novâ Grauadâ (Goudot! in h. Hook. cum sched. Humboldt Magdaleine), ad Caracas (Vargas et Bertero in h. DC.). Ruellia macrophylla Vahl! symb. 2 p. 72 t. 39, et h. Willd. spec. pl. 3 p. 366. Justicia rubra v. Robr n. 72 in h. Vahl! Ruellia macrophylla  $\beta$  pubescens Moritz! in h. gen. berol. bot. reg. 1846 t. 7. Distinctissimum a S. fulgidio, quocum in tortis vulgo confunditur, sicuti a reliquis omnibus speciebus hujus generis, calyce haud ad basin fere usque sed vix usque ad medium quinquefido, tum caule foliisque pubescentia licet brevissimâ sat dense vestitis. Corolla speciosa, bipinnatis, incurva, coccinea, lacinias oblongo-ovalibus apice emarginatis. Variat pedunculus magis explicatis quaternis in singulo pedunculo communi folio paulo breviore umbellaribus plus minus elongatis,

exterioribus 1-2-floris mediis 3-4-floris secundifloris, pedicellis apicem versus decrescentibus et folia æquantibus bifidis bifloris, ramulo singulo fere pollari apice bibracteolato. ( Hujus loci est icon Vahliana et specimen h. Willd. supra citatum ). In hac forma laciniae calycis apice pubescenti-tomentosæ. (v. in h. Vabl, Willd. et Hook.)

2. S. **HIRSUTUS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 53), foliis ob-ovatis sessilibus ternis hirsuto-tomentosis. ♂ In Brasiliâ : in Serra de S.-Felis prope Rio Trabiras fluvium (Pohl ! in h. imp. vindob. n. 2237). Folia  $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$  poll. longa, hirsutis tomentiformi crassæ tecta, micantia, integerrima. Panícula glandulosa, corymbosa. Calyx 8-9 lin. longus. Corolla a basi tubi ad os faucium 16 lin. longa, limbi diametro 16 linearum, tube faucibus breviore viscidulo, lacinii ovato-subrotundis obtusis. Stamina lacinias limbi æquantia, erecta. Capsula sericeo-pubescentis 7 lin. longa, grisea. (v. in h. vindob.)
3. S. **MULTIFLORUS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 54), foliis ovato-oblongis ovatis subitus albido-tomentosis in petiolum acute desinentibus, panícula densissimâ brevi. ♂ In Brasiliâ : in Serra do Toçantines (Pohl ! in h. imp. vindob. n. 1918). Caulis valde ramosus, ramis fastigiatis foliosis apice floriferis. Folia vel ternis vel opposita,  $3\frac{1}{2}$ -4 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, apice magis quam basi attenuata, tamen obtusiuscula circumscriptio valde irregulare, in ambitu repanda, subitus tomentulo tenui molli albiorantia, supra aspera; petiolus semipollucaris, angustus. Panículae rami breves, glandulosi, fere intertexti. Calyx 3 lin. longus, villosus. Corolla usque ad os faucium poll. longa, limbo æque lato, tubo faucibus breviore. Capsula 7-8 lin. longa, crassa. (v. in h. vindob.)
4. S. **ANGUSTIOR** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 54), foliis oppositis ternis elliptico-oblongis subtus pubescentibus in petiolum decurrentibus, panícula angustâ, ramis paucifloris. ♀ In Brasiliâ ad S.-Felis prope Rio Trahiras fluvium (Pohl ! in h. imp. vindob. n. 1907). Differt a S. multifloro foliis utrinque attenuatis in petiolum multo magis decurrentibus, subtus viridibus pallidiorebus quidem neque candicibus et panícula angustâ, ramis brevibus 3-2-floris. Caulis apice angulatus. Folia supra aspera setuligique scabra, subtus reticulata brevi pubescentia tecta, inferiora 4 poll. longa et  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, superiora decrescentia et angustiora; in vâr. β folia caulina cum petiolo trilineari  $1\frac{1}{2}$  poll. longa sunt, 9 lin. lata; ramea subsessilia. Caulis 5-pedalis. Calyx 3 lin. longus, villosus. Corolla scarlatinæ tubus cum faucibus 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longus, faucium fere longitudine; limbi diameter  $1\frac{1}{2}$  poll. in β 1 poll. (v. in h. petrop., Moricand, et Hook.)
- β. *microphyllus*, panículæ ramis brevissimis, unde flores (1-3) axillares sub-sessiles apparent, foliisque minoribus. — In Campos prov. Goyaz, Aprili (Gardner ! pl. exsicc. n. 3957). (v. in h. Moricand et Hook.)

5. S. **SALVÆFOLIUS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 54), foliis oppositis ternis oblongo-lanceolatis obtusis subtus pubescenti-tomentosis in petiolum decurrentibus, panículæ ramis virgatis. ♂ In Brasiliâ Serra de S.-Felis prope Rio Trabiras fluvium (Pohl ! in h. imp. vindob. n. 1920). A. S. angustiore differt in primis habitu panículæ propter ramos elongatos dissitifloros virgato, et foliis quidquam angustioribus in petiolum longiore basi teretiusculum decurrentibus subincanis, subtus magis pubescentibus. (v. in h. vindob.).

## § 2. *Capsula oblonga, octosperma, Inflorescentia thyrsoidæ, bracteis deciduis.*

6. S. **HUMBOLDTIANUS**, glaber, foliis ovato-oblongis in acumen angustum obtusum plus minus attenuatis, thyrs terminali nndo, bracteis partialibus brevissimis ovatis, pedicellis calycibnsque canescenti-scabris subglandulosis. ♂ Valles de Aragua, Hacienda de Materolla / Humboldt ! in herb. gen. berol.

n. 709). *Ruellia Humboldtiana* Klotzsch! in Moritz plantæ Cubenses. Caulis adulterior obtuse tetrâgonus fusius; ramuli graciliores quadrangularares angulis obtusis. Folia 3 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, infra medium 9-12 lin. lata, basi acuta, sœpe repando-subcrenata. Thyrsus pedunculatus, uni-tripollicaris, Rhabdachis communis glabra. Pedicelli calycem subæquantes. Calycis laciniæ apice subulate. Corolla coccinea, sequi-bipollicaris, faucibus elongatis angustis; laciniæ tres inferiores angustiores, oblongæ, emarginatæ. Capsula sericea.

$\alpha$ . caule rachique thyrsi crassioribus, thyrsolongiore densiore, cymulis partitibus magis explicatis plurifloris ternis oppositisve, calycis laciniæ lancéolato subulatis evidentius canescentibus minusque glandulosis. — In Novâ Granadâ (Humboldt, Linden n. 1526 in h. Hook.). Hujus loci sunt specimenina Humboldtiana et Cubensis. (v. in h. berol. et Hook.).

$\beta$ . caule rhachique thyrsi teniорibus foliisque laxioribus magisque semper ovali-oblongis utrinque æquiter acutis, thyro 1 $\frac{1}{2}$  poll. longo, propter cymulas partiales depauperatas in specim. subsimplici, calycis laciniæ linearisubulatis minus canescentibus et evidentius glanduloso-asperulis, corollis paulo gracilioribus et brevioribus 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. longis. — In montosis prope Hyacoa Coloras in Guianâ anglicâ (Schomburgk n. 97. 5). Anthere in utrâque varietate glanduloso-punctata.

7. S. SELLOVIANUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 54), caule acutangulo foliisque ovali-oblongis basi acutis apice obtuse attenuatis ad costas hirsutis, floribus juxta apices ramorum solitariis axillaribus subsessilibus, bracteolis spathulatis calyce brevioribus, corollæ limbo obliquo. ♂ In Brasiliâ ad Serra do S.-Antonio (Sellow! in h. reg. berol.). Rami adulti fusi, subtetragoni, glabriuscui, rugosi, juveniles tetraquetri, patenti-hirsuti. Folia cum petiolo 2-lineari 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 3 $\frac{1}{2}$  poll. lata, integerrima, utrinque ad costas hirsuta et in pagina superiori pilis rarís conspersa, ramis costalibus quinis. Corolla bipollicaris fere, pubescens, incurva, faucibus longis obconicis, limbo obliquo, laciniis erectis ovalibus emarginatis, infimâ breviore. Stamina parum exserta. Connectivum dorso hirsutum. Stylus hirsutus; stigma subulatum? (v. in h. berol.)

8. S. RADICANS, glaber, foliis oblongis ovali- ve oblongis plus minus acuminatis repandis basi acutâ in petiolum brevem decurrentibus, thyro terminali nudo glabro pubescenti-scabro subglanduloso, bracteis partialibus brevissimis subulatis, pedicellis calycibusque scabriusculis, horum laciniis subulatis, corollâ elongatâ angustâ, limbo bilabiato, caule ex articulis radicante. ♀ In Guianâ anglicâ (Schomburgk). Thyrsus terminalis brevis. Distinctus radicibus solitariis crassis simplicibus inter folia orientibus.

$\alpha$ . foliis acutis, apice parum producto, corolla 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. longa. — *Hyacora Coloras* in Guianâ anglicâ (Schomburgk n. 97. 5 in h. Nees).

$\beta$ . longifloris, foliis longe acuminatis paulo angustioribus, corolla 2 $\frac{1}{2}$  poll. longa. — *Essequibo* in Guianâ anglicâ, Januario (Schomburgk! n. 330 in h. gen. berol.). Flores albi ex Schomburgk J. c. An spec. distincta? (v. in h. berol.)

9. S. THYRSACANTHOIDES, caule strioto canescenti-puberulo, foliis oppositis ovato-oblongis acuminatis subtilissime puberulis in costis hirtis, thyro terminali nudo, bracteis partialibus brevissimis ovatis, pedicellis calycibusque canis. ♀ Escuque in Columbiâ ad. margines arbustorum locis humidis, Octobri (Moritz! n. 1274 in h. gen. berol.). S. Humboldtiano var.  $\alpha$  simillimus et probabiliter ejusdem var., differt in primis foliis magis acuminatis cauleque puberulis. Corolla pallide coccinea ex Moritz. (v. in h. berol.)

10. S. WILLDENOVIANUS, foliis ovatis oblongisve longe acuminatis glabris, fasciculo terminali abbreviato. ♂? Patria ignota. *Ruellia macrophylla* h. Willd. n. 11637 fol. 3. Thyrsis terminalis (nisi fallimur specimenine incomplete), subsessilis, bi-tri-fidus, ramulo principali 5-floro. Pedicelli breves, bracteis ad basin brevissimis squamiformibus. Calyx 2 $\frac{1}{2}$  lin. longi, laciniis

subulatis. Corolla  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, coccinea, limbi lacinias patentibus ovato-oblongis obtusis, duabus emarginatis. Stamina longitudine limbi, subdecurva. (v. in h. Willd.)

**XLIX. PAULO-WILHELMIA** Hochst. in Flora 1844. 1. Beil. p. 4. — Episanthera Hochst. olim in litt. (Nec vero Paulo-Wilhelmia Hochst. in Flora 1844. 1 p. 17.)

Calyx quinquepartitus, lacinias linearibus obtusiusculis subæqualibus. Corolla infundibuliformis, tubo longo angusto æquali, limbo quinquefido, lacinias æqualibus obtusis homomallis (omnibus anticis). Stamina quatuor, utrinque ad fissuram posticam tubi inserta, æqualia, filamentis exsertis erectis; antheræ oblongæ, biloculares, loculis parallelis contiguis æqualibus muticis. Stylus filiformis, exsertus, stigmate subulato. Capsula angusta, quadrangularis, ad basin usque bilocularis, tetrasperma; semina retinaculis uncinatis acutis suffulta, compressa, subulato-marginata. — Frutex AbyssinicuS. Inflorescentia subverticillato-spicata, foliosa; pseudoverticilli approximati, e pedunculis brevibus simpliciter dichotomis axillaribus oppositis formati, multiflori. Bracteæ subnullæ vel binæ, minutæ, oppositæ ad flores extimos.

**P SPECIOSA** (Hochst. l. c.), caule tetragono erecto superne hirsuto, foliis longe petiolatis magnis ovatis basi cordatis grosse vel erose dentato-serratis glabriusculis vel subtus pilosiusculis, pedicellis calycibusque glandulosopubescentibus, floribus ultrapollicaribus, roseis, si ex sicco judicare licet.  $\mathcal{L}$  In Abyssiniâ (Schimper !)

**L. EURYCHANES N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 52.**

Calyx quinquepartitus, lacinias æqualibus latiusculis herbaceis. Corolla obliqua campanulata, tubo brevi, fauce inflatâ deorsum ventricosa, limbo subtiliabato, labio superiore bisido, inferiore trifido, lacinias latis, superioribus paulo brevioribus. Stamina quatuor, didynama, apici tubi inserta, basi per paria membranaceo-conjuncta; filamenta longa, exserta, deorsum arcuata; antheræ biloculares, sagittatae, loculis parallelis contiguis. Stylus longitudine staminum; stigma bifidum. Capsula basi brevi spatio contracta, asperma, hinc ventricosa, 6-8-sperma. Semina discoidea, retinaculis bidentatis fulcrata. — Herba ? Brasiliensis, verbasciformis, caule stricto, basi diviso, ramis elongatis, foliis (in specie unâ, quam observavimus) sessilibus ternis oppositivo tomentosis. Flores axillares, pedunculati, verticillati, foliis floralibus decrescentibusstellatis racemum caulis terminalem struentes. Bracteolæ duas ad basin pedicelli, calyce breviores.

**1. E. VERBASCIFOLIUS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc 7 p. 53).  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ: Trahiras, ad Rio Bagagem fluvium (Pohl! in h. imp. vindob. n. 2221), Cujaba (h. Mart.!). Caulis 3-4-pedalis, quadrangularis, hirsuto-tomentosus. Folia infima subinde opposita, reliqua et bracteæ ternæ, sessilia, utrinque tomentosa, ovalia acutiuscula, integerrima, crassa; inferiora 3- $2\frac{1}{2}$  poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, in floralia 8-5 lin. longa, subrotunda, tomentosa et glauca decrescentia. Flores axillares solitarii, hinc verticillato-terni. Pedicelli 3-4 lin. longi, uti calyces et bracteæ pilis glandulosis dense vestiti. Bracteolæ ad pedicelli basin duæ, oppositæ, oblongæ, obtusæ. Calyx 7-8 lin. longus, lacinias oblongo-lanceolatis obtusis, superioribus paulo longioribus. Corolla bipaniculata, puberula purpurea; tubo vix 3 lin. longo, incurvo; reliqua pars ventricosa-campânulata; limbi laciniae fauce triplo breviores, ovatae, obtusæ, labii superioris latere reflexæ. Stamina glabra, corolla duplo longiora, a labio superiori areu decurva. Stylus apice in spiram convolutus, stigmatis ramus

superiori brevior. Capsula 8 lin. longa , calycem auctum æquans , griseo-pubescentia . (v. in h. vindob. et Mart.)

LI. ARRHOSTOXYLUM Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 57. — Scordoxylum N. ab E. in Benth. pl. Hartw. p. 236 et in h. plur.

Calyx quinquepartitus, lacinii subæqualibus linearibus obtusis, in una specie ad  $\frac{1}{3}$  quadrifidus. Corolla subhypocrateriformis, tubo incurvo in fauces transeunte vel anguste obconico, limbo vel amplio quinquepartito, lacinii patentibus ovatis, vel minore magisque erecto et tunc quidem corollæ anguste infundibuliformi. Stamina quatuor, parum exserta, raro faucibus paulo breviora, tubi brevis apici inserta, sed usque ad limbum fere per paria inter se membranaceo-connata tuboque simul accreta, prope a limbi divisurâ a faucibus soluta spatioque brevi adhuc diadelpha; antheræ oblongæ, loculis in connectivo mediocri sagittato, basi divergentibus. Stigma validum bilabiatum, labiis crassis planis, superiore breviore. Capsula a basi ad medium contracta, elocularis, asperma, hinc hexadodecasperma. Semina retinaculis fulcrata emarginato-bi-tridentatis, plana. — Herbe vel suffrutescens Americæ tropicæ. Caulis quadrangulus. Folia latiuscula, repanda crenatavate. Cymæ umbellares, laterales, pedunculatæ, bi-quadrifidæ, radiis dichotomis (abortu subinde paucifloræ in capitulum redactæ unifloræ, vel thrysulum terminalem exhibentes), bracteis parvis deciduis, bracteolis nullis. Flores amœni. — In specie anomalâ flores axillares subsessiles, alterni, bibracteolati, bracteolis latis. — Genus hoc quod ad corollas formam Stemonacantho subsimile, differt staminibus haud ita longe exsertis, antherarum structurâ, et capsulâ longiore pleiospermâ; quod ad inflorescentiam Stephanophyso congruum, differt corollâ haud inflatâ, limbo explanato. — Species una Dipteracantho quod ad inflorescentiam similis, corollæ antherarumque structurâ tamen reliquis conveniens.

1. A. RUBRUM, glabrum, caule fruticoso erecto, ramis tetragonis angulis lineâ argutâ notatis, foliis oblongis repando-crenatis longe acuminatis basi in petiolum brevem marginatum acute desinentibus venoso-reticulatis, cymis subdichotomis cum pedunculo longo folium æquantibus paulo superantibus, bracteis brevibus calycisque lacinii subulatis scabris, corollæ infundibuliformis limbo intus hirsuto, lacinias rotundatis brevibus. ♂ In Guianâ Gallicâ (Aublet! Leprieur! in h. DC.), Surinam (Hostmann! n. 22 in h. Benth. et Hook.). Ruellia rubra Aubl. Guian. 2 p. 666 t. 270, Willd. sp. pl. 3 p. 366. Differt a reliquo colore, saltem in statu sicco, glaucescente, foliisque venis intercostalibus crebris transversalibus solito magis tumentibus reticulatis. Costæ 7 haud validæ. Caulis latera convexiuscula. Icon Aubletiana quod ad floris figuram pessima, folia bene exprimit, quæ quidem licet « sessilia » in descriptione, a pictore petiolata petiolo latiusculo delineata sunt. (v. in h. DC., Hook. et Benth.)
2. A. WILLDENOVIANUM, glabrum, caule fruticoso erecto, ramis acute quadrangulis lateribus profundis, foliis ovalibus repando-crenatis cuspidato-attenuatis basi in petiolum brevem decurrentibus, floribus fasciculatis, pedunculo folium æquante paulo superante, bracteis brevibus calycisque lacinii subulatis pubescenti-scabris, corollæ infundibuliformis limbo intus hirsuto. ♂ In Indiâ occidentali. Ruellia rubra h. Willd.! n. 11655. nec Aubl. (v. in h. Willd.)
3. A. HARTWEGIANUM, caule herbaceo erecto argute quadriquetro scabriuscule, foliis oblongis in petiolum alatum attenuatis obtuse acuminatis ad costas scabriusculis, floribus in ramis basi nudis capitatis involucratis, involucri foliis ovatis obtuse acuminatis subsessilibus, calycibus approximato-oppositis subsessilibus, lacinii brevibus lanceolatis obtusis tuboque squamuoso-punctatis, bracteolis nullis, corollæ faucibus tubulosi, limbi lacinii ovalibus reticulatis,

superioribus brevioribus.  $\mathcal{L}$  In umbrosis prope vicum Guaduas in prov. Bégo-tensi ( Hartweg! ). Scorodoxylum Hartwegianum N. ab. E. in Benth. pl. Hartweg. p. 236 n. 1269. Caulis bipedalis. Rami floriferi oppositi, longi, stricte patuli, nudi, apice paribns duobus foliorum approximatorum, quorum duo ( paria ) involucrum constitunt, capitulum obtengens. Bractæ inter flores interiores breves, trigonæ, squamiformes. Calyx brevis. Corolla bipollucaris, lœte rubra, tubo subincurvo anguste obconico. Capsula semipollucaris, ungue brevi lato, hinc ovalis, 6-8-sperma. ( v. in h. Benth. )

4. A. LAXUM ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 57 ), caule fruticoso diffuso, ramis foliisque ovatis ovato-oblongis apicem versus obtuse attenuatis basi obtusis in petiolum acute desuentibus glabris, pedunculis axillaribus folio brevioribus uni-trifloris, bractæs inferioribus ovari-oblongis majoribus, superioribus oblongo-cuneiformibus, calycibus quinquepartitis, laciniis subulatis pubescenti-scabris, corolla infundibuliformi regulari, limbi laciniis integris.  $\mathfrak{Z}$  In Brasiliâ : in silvarum prope montem Tribuni Joaquim palidibus, d' Olhos d'Aqua dictis, et Villa do Bana ( Blanchet! pl. bras. exsicc. n. 3106 in h. Moricand, Benth. et Hook. ). Quinque ad sex palmorum altitudine. Rami graciles, geniculati, articulis teretiunculis striatis, apice canescentes. Folia nitida, tenuia, laxe reticulata; majora cum petiolo 8 lin. longo 4 poll. longa; superiora minora, apice magis attenuata basique acuta. Pedunculi  $1\frac{1}{2}$  poll. longi, graciles, patentes. Flores, nisi unus solus adest, alterni, sessiles. Bractæs infimæ fere pollicares, brevipetiolatae, obtuse, nitidæ; reliquæ duplo minores, oblongæ, obtusæ, basi angustiore sessiles. Calyx bracteis brevior. Bracteolæ nulle. Corolla cerulea aut violacea,  $1\frac{1}{4}$  poll. longa. Capsula 8-sperma. ( v. in h. Moricand, Benth. et Hook. )

5. A. ACUTANGULUM ( Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 58 ), caule acutangulo foliisque elliptico-ovatis utrinque attenuatis longe petiolatis glabris hirsutissive, cymis dichotomis, calycibus glanduloso-hirsutis, corollæ laciniis integris.  $\mathfrak{Z}$  In Brasiliâ. Caulis erectus, 2-3-pedalis, in sulcis imprimis hirsutus. Folia ampla; inferiora 9 poll. longa, 3 poll. lata, in petiolum alatum decurrentia; superiora 6-5 poll. longa, 2 poll. lata, minus in petiolum decurrentia. Corolla pollicaris, purpurea. Capsula 12-sperma, glabra.

$\alpha$ . glabrescens, foliis glabris, cymæ geniculis barbatis. — In prov. Parayba, Augusto ( Sellow! in h. reg. berol. n. 44 et 99 ), in silvis umbrosis prope Mandioccam prov. Sebastianopolitanæ, Novembri ( Riedel! in h. acad. petrop. ), Ruellia acutangula N. ab E. in Mart. h. fl. bras. n. 233. Pedicularis Scepstrum Marianum Velloz. fl. flum. 3 t. 104. ( v. s. )

$\beta$ . hirsutum, foliis cymisque hirsutis. — In umbrosis Serra d'Estrella ( Beyrich ), in silvis cæduis ad Troxal ( Lhotzky ! n. 172 in h. DC. ), ad Rio de Janeiro ( Paulo Barboza! in h. Mart. ), Organ Mountains ( Lobb! in h. Hook. ), ad Engenho da Cebola ( Sellow! in h. reg. berol. n. 47, 246, 247 et 257; Schott in h. imp. vindob. n. 6133 ), in silvis Paraybæ ( Gardner n. 5529 in h. Benth. et Hook. ). ( v. var.  $\alpha$  et  $\beta$  in h. DC., Benth., Mart., Beyrich, Hook., berol., vindob. et petrop. )

6. A. GLABRUM ( Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 58 ), caule erecto obtusangulo, foliis oblongis utrinque attenuatis in petiolum decurrentibus, cymis dichotomis glanduloso-hirtis, pedicellis ancipitibus, corollæ laciniis integris.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ : Serra do Chumbo ( Pohl! in h. imp. vindob. n. 3283 ), Bahia, Ilheos ( Blanchet! pl. bras. exsicc. in h. Moricand, Benth. et DC. n. 3540 ). Ruellia longiflora Salzmann! Blanchet! in h. Benth. et Hook. Zahlbrücknera lutea Pohl! ic. n. 3283 in h. palat. vindob. ( pesima! ) et in h. Mart. Inflorescentia sœpe dichotoma. Pedunculus communis apice et partiales dilatati, ancipites, hi breves. Bractæ linearispathulatae, cum reliquis inflorescentiae partibus plus minusve piloso-glandulosæ. Caulis obtuse quadrangularis, sulco laterum hirsuto. Folia cum petiolo bipollucari 7-8 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, margine et in costis hirtula, repando-subcrenata, cuneatim in petiolum plus minus decurrentia; superiora minora; rami

costales 8-13. Corolla pollice paulo longior, incurva, cœrulea (luteam dicit Pohlius). (v. in h. DC., vindob. et Benth.)

7. A. SUBSESSILE (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 58), caule obtuso quadrangulo piloso, foliis oblongis acutis basi longe cuneiformibus in petiolum brevissimum obtuse desinentibus, cymis fasciculis bifidis alatis, bracteis calycisque laciniis latiusculæ linearibus apicem versus paulo latioribus, corollæ laciniis integris.  $\Sigma$  In Brasiliâ. Differt ab A. glabro foliis hand in petiolum longiusculum acute decurrentibus, sed basi cuncatis in petiolum brevein crassumque, vix lin.  $\frac{1}{2}$  longum obtuse desinentibus rarius omnino in petiolum anguste cuneiformem attenuatis. Caulis pedaljs. Pedunculi rigidj, incurvi, folium suum æquantes. Calyx laciniæ latiusculæ, in var.  $\alpha$  fere glabra. Cymæ rami in  $\alpha$  magis elongati, pluriflores, floribus subsecundis; in var.  $\beta$  breves, fasciculum exhibentes. Corolla rubra.
  - $\alpha$ . bracteis calycibnsque glabris. — In silvis ad Villa do Principe, Serro Frio, prov. Minarum Generalium, Maio (Martius! Sellow!) (v. in h. monac. et berol.)
  - $\beta$ . bracteis calycibusque hirsutis glandulosisque. — In Serra de S.-Geraldo (Sellow!), in silvis prope Præsidio in prov. Minarum Generalium; Julio (Riedel!) (v. in h. berol. et petrop.)
8. A. HÆNKEANUM, glaberrimum, caule acutissime quadrangulo, foliis oblongis in petiolum brevem decurrentibus longe acuminatis, cymis dichotomis, corollæ laciniis brevibus retusis.  $\Sigma$  In Peruvia montosis Orinocensis (Hænke!), Maynas (Pœppig! Add. n. 170 in h. acad. petrop.). Ruellia rubra N. ab E. Acanth. Hænk. in h. mus. prag. (excl. syn. Aubl.). Distinctum ab A. pedunculoso ramis crassiùculis lævibus tetrapteris (purpureis), foliis longe acuminatis, neque ut in illo cuspidatis, et corollæ tubo (cum faucibus confluenti) obconico-elongato incurvo ratione limbi longiore; ab aliis plerisque calycis laciniis linearis-subulatis scabris. Pedunculi folio breviores, Corolla a basi ad os faucium bipollucaris, diameter limbi 9 lin. Capsula brunnea, 9 lin. longa, octosperma. (v. in h. Hænk. et petrop.)
9. A. PEDUNCULOSUM, glabrum, caule obtusangulo, foliis oblongis in petiolum brevissimum attenuatis cuspidato-acuminatis, cymis dichotomis longe pedunculatis, corollæ laciniis brevibus obtusis.  $\Sigma$  In Peruvia montosis Orinocensis (Henkel!), ad Casapè et Cuchero Péruvia (Ruiz! in h. gen. berol., Mathews! n. 2007 et 2335 in h. Hook.), in Chili (Pœppig!). Ruellia pedunculosa N. ab E. in Acanthac. Hænk. herb. mus. prag. ined. Ruellia spec. Ruiz! in h. gen. berol. (ex parte). Justicia filiformis fl. peruv. Rniz! in h. gen. berol. Justicia longistaminea Pœpp.! (nec R. et Pav.) pl. chil. n. 39 in h. gen. berol. et in h. DC. Rami tetragnoni angulis obtusis, nodosi, glabri. Folia palmaria, repando-crenulata. Pedunculi tereti-compressi, folio longiorcs, basi long spatio nudi et simplices, apice bis terque furcatim divisi bracteisque sub divisuris oppositis linearis-pathulatis obtusis prædicti, pauci-flori. Pedicelli calyce breviores, basi bracteis duabus linearibus instructi. Calyx laciniæ linearis-subulate, subæquales, tubo corollæ parum breviores, scabriæ, basi paulo altius concretæ. Corolla uncialis, coccinea. Capsula oblonga, grisea, 8-12-sperma. (v. in h. DC., Hænk., Hook., berol.)
10. A. NITIDUM (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 59), glaberrimum, caule quadriquetro angulis marginatis, foliis oblongo-lanceolatis repando-crenatis nitidis apice longe attenuatis basi in petiolum brevissimum decurrentibus, pedunculis folio longioribus glabris, paniculâ trichotomâ calycibusque glandulos-pubescentibus, corollæ incurvæ faucibus subinflatis tubum æquantibus.  $\Sigma$  In Brasiliâ (Riedel!). Ab affinis differt foliis eximie attenuatis sessilibus et paniculis fere ut in A. pedunculoso constructis. (v. in h. petrop.)
11. A. AMPLEXICAULE (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 59), glaberrimum, foliis sessilibus acuminatis repando-subcrenatis, inferioribus oblongis

basi attenuatis amplexicaulibus superioribus ovato-subcordatis brevioribus, corollæ obconico-tubulosæ lacinia brevibus obtusis, capsula octospermâ.

♂ In Brasiliâ (Sellow!). Caulis lignosus, altus, obtuse tetragonus, lœvis. Folia chartacea, caulina 6 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, ramis costalibus 8-9; floralia (scil. e quorum angulis pedunculi communes proveniunt) 4-1 $\frac{1}{4}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, basi rotundata vel subcordata. Pedunculi communes folio suo multo longiores, tri-bifidi, paniculam amplam struentes. Bractæ involucrales vel ovatæ vel lanceolatae. Ramuli sëpe uniflori, sed bracteati. Bractæ partiales lineares, parvæ. Calyx cernui, brevipedicellati, 6 lin. longi, glaberrimi, lacinias linearis-subulatis strictis. Bracteolæ propriæ nullæ. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, incurva, coccinea. Capsula calyce paulo longior, fusca, basi ad  $\frac{1}{3}$  sterilis. (v. in h. berol.)

12. A. FULGIDUM (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 59), caule fruticoso erecto, ramis tetragonis subtilissime pubescentibus, foliis ovato-oblongis ovatis apice longe attenuatis basi acutis longe petiolatis lineolatis margine scabris, floribus capitatis, pedunculis folio longioribus, bracteis duabus lanceolatis falcatis capitulum æquantibus eovo longioribus, corollâ tubulosâ. ♂ Locus temperatis prope Turbaco Novo-Granatenium (Humboldt!), in umbrosis humidis ad rivum montanum in prov. Caracas, Jan., Aprili (Moritz! et Otto! in h. gen. berol., Linden! pl. Am. merid. n. 5 in h. Hook.), in Buenos Ayres (Bléche! in h. Moricand). Ruellia fulgida Andr. rep., Spr. syst. 2 p. 824. Ruellia macrophylla h. Willd. n. 11637 fol. 1 et 2 h. gen. berol. (spec. Caracas.) h. Schreb. Distinctum a reliquis floribus subcapitatis capitulo 5-floro bibractato; ab A. splendidulo differt foliis apice longe attenuatis. Bractæ communes falcato-lanceolatae, partiales lanceolatae calycis vix longiores, cum calyci puberulae. Flores coccinei. Capsula 16-sperma. (v. v. et s. in h. berol., Willd., Schreb., Hook.)

β. bracteis capitulo duplo longioribus in petiolum attenuatis. — Caracas (Moritz! in h. gen. berol.)

γ. pedunculo apice dichotomo. — Prope Turbaco Novo-Granatenium (Humboldt!) in h. gen. berol. fol. 1), in insulâ S. Vincent. (L. G. in h. Hook.). Ruellia macrophylla Kunth in H., B. nov. gen. 2 p. 241, synops. 2 p. 37.

13. A. AFFINE (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 59), glaberrimum, caule fruticoso erecto stricte dichotomo, ramis tetragonis, foliis oblongis utrinque attenuatis in petiolum angustum decurrentibus nitidis, floribus capitatis, pedunculis gracilibus folio brevioribus, bracteis duabus lineari-spathulatis subfalcatis (subinde oblongis petiolatis) capitulum superantibus, reliquis angustis floribus interjectis, corollâ infundibuliformi. ♂ Circa Bahiam (Blanchet! pl. bras. exsicc. n. 1433 et 1501 in h. Moricand). Differt ab A. fulgidio glabritie, foliis angustioribus, pedunculis gracilioribus brevioribus ramo plerumque oppositis, corollâ minus tubulosâ, roseâ (9 lin.-1 $\frac{1}{2}$  poll. longa). Folia cum petiolo semipollicari 3 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 12-9 lin. lata, tenuia, reticulata, valde nitentia, apice attenuata acuminata angusto obtuso, repanda, ramis costalibus quinis sensive. Calyx brevis lacinias subulatis pedunculoque pubescenti-scabris. Capitula minora quam in A. fulgidio. Capsula 6 lin. longa, 6-sperma. (v. in h. Moricand).

β. anomalam, floribus aliis capitatis aliis axillaribus glomerato-sessilibus. — Prope Rio de Janeiro (Sellow! in h. gen. berol. n. 256.)

14. A. JUSSIEUOIDES, caule herbaceo acute quadrangulo hirto, foliis oblongo lanceolatis oblongis utrinque attenuatis in petiolum mediocrem decurrentibus subrepandis subtus pubescenti-hirtis, pedunculo folio breviore, floribus fasciculatis, bracteis communibus oblongis partialibusque lanceolatis obtusis fasciculum æquantibus, corollas elongato-infundibuliformis tubo faucibus longiore. ♂ In Mexico ad ripas fluminis Misantlensis prope Misantlam (Schiede! in h. gen. berol.), in Serra San Pedro Nolasco, Taleo, etc. imperii Mexicanii (Jürgensen).

**ARRHOSTOXYLUM. ACANTHACEÆ (AUCTOR NEES AB ESENBECKI). 213**

coll. 1843-44 n. 942 in h. Hook.). *Ruellia Jussiaeoides* Schlechtend. in Linn. 6 p. 370. Quod ad inflorescentiam ad *A. fulgidum* accedit, differt autem foliis angustioribus et corollâ violaceâ perfecte infundibuliformi, tubo elongato. (v. in h. berol. et Hook.)

15. *A. SPLENDIDULUM* (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 60), caule fruticoso? glabro tetragono, foliis longe petiolatis repando-crenatis supra subtusque ad costas strigilosо-scabris in petiolum cuneatim desinentibus, inferioribus ovatis obtuse brevicuspidatis, superioribus elliptico-oblongis acuminis longiusculo obtuso, floribus capitatis, pedunculo foliò longiore, bracteis communibus capitulum superantibus falcato-lanceolatis, corollâ tubulosâ.  $\frac{5}{2}$  In Brasiliâ (Sellow!). Ab *A. fulgidum* imprimis differt foliis haud anguste acuminatis. Stamina basi alte connata corollâ breviora; anthereæ lineares, loculis contiguis basi mucronatis. Stigma bifidum, cruribus subæqualibus, inferiore paulo longiore plano. (v. in h. berol. )
16. *A. REPENS* (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 60), caule basi repente adscendente geniculato tetragono, foliis oblongis utrinque attenuatis in petiolum decurrentibus, cymis paucifloris pedunculis biforis glanduloso-hirsutis folio brevioribus, corollæ lacinii rotundatis.  $\frac{2}{2}$  In Brasiliæ fruticetis jugi Serra dos Orgãos prov. Sebastianopolitana, prope Mage, etc. (Sellow! Riedel! Gardner! n. 584 in h. Hook., Lhotzky). Simile *A. glabro*, sed differt caule gracili geniculato flexuoso (purpureo), foliis minoribus, corollæ  $1\frac{1}{2}$  poll. longæ limbo minus patente et magis regulari fere ut in *A. microphylla*, cui accedit et aliis notis. Corolla cœrulea. Capsula a medio 8-sperma, pubescens. Anguli caulis juvenilis acuti. (v. in h. DC., Hook., berol. et petrop.)

17. *A. ALBUM* (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 60), glabrum, caule ramosissimo inferne tetragono superne quadrangulari angulis acutis, foliis ovato-oblongis in petiolum mediocrem acute desinentibus obtuse acuminatis inæqualiter repando-dentatis, cymis vel paucifloris vel multifloris dichotomique folia æquantibus superantibusve cum calycibus glanduloso-hirsutis, corollæ infundibuliformis lacinii late retusis.  $\frac{2}{2}$  In Brasiliâ ad S. Augustin prope Victoria, Martio (Max. Princ. Wied.! in b. Mart.), in umbrosis Macalé, Maio, Junio, cum *A. repente* (Riedel! in h. acad. petrop., loco non adnotato). Simile *A. repenti* et forte varietas, differt autem foliis in universum, præsertim basin versus latioribus evidenter subduplicato-obtuse dentatis, corollis albis lacinii retusis etc. Corolla  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, incurva. Folia subinde supra setulis raris conspersa, subtus semper glaberrima. (v. in h. Mart. et petrop.)

18. *A. SILVACCOLA* (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 60), caule obtusangulo, foliis ovatis e basi rotundata in petiolum acute desinentibus supra sparsim pilosis, cymis hirsutis subglandulosis, corollæ lacinii integris.  $\frac{2}{2}$  In Brasiliâ. Accedit ad *A. acutangulum*, sed differt staturâ humiliore, foliis basi haud cuneatim in petiolum attenuatis sed ex rotunditate repente acuteque in petiolum desinentibus, in var.  $\alpha$  subtus glabris,  $3\frac{1}{2}$  poll. longis  $2\frac{3}{4}$  poll. latis. Caulis sulci in var.  $\alpha$  hirti. Calyx laciniae valde hirsutæ immixtis glandulis, lineares, apice paulo latiores obtusæque. Corollæ tubus (cum fance)  $1\frac{1}{2}$  poll. longus, incurvus, a basi ad limbum leniter increscens neque a fance externe discretrus; limbi laciniae ovales, rotundatae. Color corollæ (in var.  $\beta$ ) albus, maculae laciniarum mediâ rhombæ viridi marginè roseo-punctatae. Capsula 8 lin. longa, dorso depressiuscula, glabra, a medio 6-8-sperma.

$\alpha$ . cymis dichotomis multifloris, caule glabriuscule. — In monte pulchro S. Morro Ferromo, locis silvicis prov. Sebastianopolitanae cum pr. Paulina in confiniis, Decembri (Martius!). *Ruellia silvaccolla* Mart. in h. reg. monac. et in obss. n. 400. (v. in h. monac.)

$\beta$ . paniculâ terminali trifida, ramis subtrifloris decrementibus. (v. c. ex hort. edinb. in h. Hook.)

7. *montanum*, hirsutum, cymis paucifloris, foliis brevioribus magis obtusis. Mart. I. c. u. 392. — In silvis primævis ad Marianæ prov. Minarum Generalium, Aprili (Martius! in l. monac., Langsdorfl in h. Hook., Sellow! in h. reg. berol. n. 104 et 263, Lund in h. DC. Ni fallor, specie differt, caule humiliore est, eoque cum folijs patentí-hirsuto, foliis duplo fere brevioribus magisque obtusis, pedunculis folio multo longioribus subinde bis bifidis, subinde tantummodo fasciculo florum (2-3) terminatis, calycis denique laciniis angustioribus. In hanc varietatem valere puto, quæ de floris colore iu antecedentibus adducta sunt e schedis Martianis, et nisi haec de flore observata obstant, A. formosum salutare haud hæsitarem. (v. in h. DC. Hook., monac. et berol.)
19. A. *COSTATUM* (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 61), glabrum, caule acutangulo, foliis oblongis lanceolatis utrinque acuminatis in petiolum late decurrentibus, cymis bi-trifidis radiis subsecundifloris inæqualibus, calycis laciniis linearí-angustis pubescenti-glandulosis, corollæ elongato-infundibuliformis laciniis retusis, fauce apice inflatâ.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ. Folia in var.  $\alpha$  5-7 poll. longa, 1-2 poll. lata, in var.  $\beta$  9-10 poll. longa, 1 poll. lata, saepe nitida, reticulata, propter ramos costales 9 juxta margines confluentes subinde ad speciem marginata, obiter repanda, subtus in juventute puberula. Pedunculi 2-6 poll. longi, tetragoni, glabri, apice bifidi vel trifidi, altero ramo longiore iterumque bifido, ramis et floribus pubescenti-glandulosis. Bractæ parvæ, subulatæ, pubescentes. Flores uti ramuli alterno-secundi. Calycis laciniæ linearí-subulatæ, inæquales. Corollæ tubus cum fauibus  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. longus, fauces apice ( $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll.) dilatatae, limbi laciniæ late ovatæ, retusæ. Capsula lutea, 6 lin. longa, a medio 12-16-sperma.
- $\alpha$ . *latifolium*, foliis oblongis aut ovali-oblongis. — In viâ a Villa Boa ad Barra (Pohl! in h. imp. vindob. n. 1668), in prov. Piauhy et Goyaz (Gardner! n. 3420 in h. Mart. et Hook., 3956 in l. Benth. et Hook., forma foliorum intermedia inter  $\alpha$  et  $\beta$ ). (v. in h. vindob., Mart., Hook. et Benth.)
- \* pedunculis quibusdam simplicibus, floribus oppositis subverticillatis. — Ad S. Bernardo in prov. Goyaz (Gardner! in h. Hook. n. 4344). (v. in h. Hook.)
- $\beta$ . *salicifolium*, foliis lanceolatis utrinque exquisite acuminatis. — In Serrâ das Caldas Velhas (Pohl! in h. imp. vindob. n. 2845). Zahlbrücknera salicifolia Pohl! ic. n. 2845 (pessima, corollæ figura ficta!) in h. palat vindob. (v. in h. vindob.)
20. A. *LONGIFOLIUM*, glabrum, caule acutangulo, foliis oblongis lanceolatis utrinque attenuatis in petiolum late decurrentibus utrinque dense lineolatis opacis mollibus, cymis folio brevioribus bifidis pubescenti-scabris radiis subsecundifloris inæqualibus, calycis laciniis linearí-angustis subsubulatis pubescenti-scabris, corollæ infundibuliformis incurvæ tubo fauces æquante, limbi laciniis retusis.  $\mathcal{U}$  In Guiana Gallica (Richard! in h. DC. var.  $\alpha$ , idem in h. Vahl! et Leblond! in eod. h! var.  $\beta$ ). Ruellia longifolia Richard pl. Leblond in act. soc. hist. nat. paris. 1792 p. 110. Ruellia longiflora Richard in act. soc. paris. 1 p. 120, Pers. synops. 2 p. 176. Simile A. costatum  $\beta$  salicifolio, sed differt foliis mollioribus propter lineolas valde confertas semper opacis et corollis brevioribus ( $1\frac{1}{2}$  poll. ad summum longis, tubo multo breviore). Pedunculi, bractæ et calyces pubescenti-scabra, nonnihil canescunt. An var. A. rubri? (v. in h. DC.)
21. A. *TERMINALE*, suffruticosum, caule basi repente adscendente tetragono apicem versus laxe pubescente, foliis oblongo-ovalibus acuminatis basi acutis repando-crenatis tenuibus glabris costis subtus strigosis, thyro terminali sessili parvo, bracteis calycisque laciniis subulatis scabris, capsula a medio superne 6-8-spermat.  $\delta$  Atacarnes in Peruvia (Barclay!). Quod ad inflorescentiam haud absimile est Stemonacantho Humboldtiano, sed reliqua sunt hujus ge-

- neris. Caulis anguli acutiusculi sunt. Folia inferiora cum petiole semipollucari 6-7 poll. longa, 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. lata, obiter repando-crenata. Thyrsus caulem terminans, adjecto folio 4-pollucari, vix pollucaris est, floribus arte contiguis quasi glomeratis, plerisque sessilibus bracteis parvis interstinctis. Corolla 8 lin. longa, anguste infundibuliformis, coccinea; limbo regulari, lacinii ovalibus retusis. Stamina inclusa. Capsula 5 lin. longa, basi valde angusta, a medio ovalis et juxta originem septi 6-sperma. (v. in h. Barclay.)
22. A. ROSEUM (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 61), canle subterragono, juvenili hirsuto, foliis oblongis in petiolum brevem attenuatis ad costas supra pilosulis, fasciculis paucifloris longe pedunculatis, calycis lacinii basin versus ciliatis, corollæ lacinii emarginatis.  $\checkmark$  In Brasiliæ silvâ primavâ ad Præsidium S. Joannis-Baptistæ prov. Minarum Generalium et alibi, Aprili (Martius!). Ruellia rosea Mart.! obs. n. 1089. Fruticulus humilis, cortice rami adulti albido glabro ad angulos denticulato. Ramuli adscendentes, pilis crassiusculis hirsuti, foliosi. Folia 2½-3 poll. longa, 10-11 lin. lata, obtusa, basi cuneatim in petiolum attenuata, repando-crenata. Pedunculi ancipites, folio longiores, glabri, apice bifidi, ramis brevibus alternatim paucifloris. Bracteæ breves, spathulatæ. Calyx semipollucaris, lacinii linearibus angustis apice dilatatis haud glandulosis sed simpliciter præsentim a basi ad medium ciliatis. Corollæ roseæ tubus fere bipollucaris incurvus, limbus pollucaris, lacinii subrotundis emarginatis. (v. in h. monac.)
23. A. MICROPHYLLUM (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 61), caule herbaceo ?, ramis obtuse quadrangularibus laxe pubescentibus ad genicula barbatis, foliis acutis in petiolum attenuatis glabris subciliatis inferioribus subspathulatis superioribus oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus folio longioribus unifloris calycibusque glabris infra florem bibracteatis, corollæ infundibuliformis limbo regulari patente, lacinii subrotundis.  $\checkmark$ ? In Montevideo ad S. Luciam sub fruticibus ripas fluviorum obumbrantibus (Sellow!). Videlur herba (vel fruticulus) humilis, ramosissima, cæspitosa. Rami erecti, digitales, graciles, raris pilis adspersi et ad genicula cingulo pilorum fortiorum prædicti. Folia superiore pollucaris 4-3 lin. longa, acuta, in petiolum angustum rarer ciliatum attenuata, repanda, inferiora minora, obtusa, ex ovatis suborbiculata et igitur spathulata; rami costales tenues 3-4. Bracteæ in pedunculo 1½-1¾ poll. longo infra apicem due, subulate. Flos brevipedicellatus. Calycis laciniaæ subulataæ, apice scabriæ, obtusiusculæ. Corolla pollucaris, recta, tubo fauciibus obconicis paulo breviore. (v. in h. berol.)
24. A. FORMOSUM, caule foliisque ovatis ovato-ellipticis basi acutis villosis, fasciculis paucifloris longe pedunculatis, calycis lacinii anguste linearibus pubescentibus, corollæ lacinii retusis.  $\checkmark$  In Brasiliâ (Andrews), prope Rio Janeiro (Riedel ! in h. acad. petrop., Graham ! in h. Hook.). Ruellia formosa Ait. hort. kew. 4 p. 58, Vent.! herb. am. t. 324, Link en. 2 p. 133, Spr. syst. 2 p. 822. Ruellia speciosa et formosa h. Mart.! Ruellia coccinea hort. Aven. Requien in h. Benth. Folia apice plus minus obtusa. Pedunculus folio suo sœpe duplo vel triplo longior. Corolla paulo magis quam in reliquis bilabiata. Conferas A. silvaccola var.  $\beta$ , quæ formâ potius huc referri debet. (v. v. et s. in h. petrop. etc.)
25. A. INFLATUM, glabrum, foliis ovalibus basi obtusis apice paulo angustioribus obtusiusculis subrepandis supra lineolatis subtus pallidioribus, fasciculis paucifloris, pedunculo folium æquante paulo longiore, calycis lacinii anguste linearibus pubescenti-scabris, corolla infundibuliformi, tubo longo, fauciibus brevibus inflatis.  $\checkmark$  In Guianâ Gallicâ (Richard ! in h. DC.) Ruellia inflata Rich. pl. Leblond e Cayenne in Act. soc. hist. nat. Paris. a. 1792 p. 110 et in Pers. synops. 2 p. 176. Habitu accedit ad A. formosum, differt autem caule et foliis glabris, his subtus glaucescenti-pallidis, tum pedunculo breviore, plerisque bifloro, altero ramo elongato. Caulis ½-1 ped. altus, acute quadrangularis. Folia vel obtusa vel in acumen breve obtusum exserta, basi ovata in petiolum desinientia. Bracteæ breves spathulato-lanceolatae. (v. in h. DC.)

26. A. **VOLACEUM**, caule erecto herbaceo viloso, foliis oblongis utrinque attenuatis subrepandis tomentosis, pedunculis axillaribus alternis unifloris infra florem bibracteolatis folia æquantibus, bracteolis linearibus, corollæ infundibuliformi tubo obconico, capsula 4-spermâ !  $\mathcal{U}$  In Guianæ Gallicæ savanis ad pedem montis Courou sitis, Octobri (Aublet!). Caulis acute quadran-gulus. Capsulæ pars superior in medio constricta.
- ? 27. A. **CILIATIFLORUM**, herbaceum, foliis petiolatis ovatis inæqualiter serratis pubescenti-hirsutis, paniculâ terminali aphyllâ, calycis inæqualis pubescenti-glandulosi lacinias subulatis, corollæ tubo angulato curvato, limbo oblique undulato, lobis subrotundis dentato-ciliatis.  $\mathcal{U}$  Ad Buenos-Ayres (Tweedie!) cultum in hort. bot. Glasoviensi e semine a Tweedie missa. Ruellia ciliatiflora Hook. bot. mag. t. 3718. Caulis circiter pedalis. Folia sursum decrescentia magisque hirsuta. Paniculæ rami breves vel simplices vel divisi, floribus in apice ramuli subcapitatis. Calycis lacinia altera reliquis conspicue longior. Corolla purpureo-cerulea, pollicis diametro, tubo pollicari; limbi lacinias rotundatae, retusæ, expansæ, eleganter ciliato-dentatae. Bracteolæ calyx breviores. (v. ic. cit.)
28. A. **CURVIFLORUM** (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 62), caule obtusangulo, foliis oblongis lanceolatis in petiolum brevem decurrentibus, fasciculis subunifloris longe pedunculatis, calycis lacinias hirsuto-ciliatis angustis, corollæ incurvæ lacinias amplis retusis, fauce apice inflatæ.  $\delta$  In Brasiliâ. Fruticulus pedalis, erectus, glaber aut in sulcis angulorum subhirsutus. Folia  $1\frac{1}{2}$ -6 poll. longa,  $\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, utrinque attenuata, acumine obtusiusculo rarius arguto, glabra, supra lineolata, ramis costalibus 6-9. Pe-dunculus ad speciem sæpe terminalis, sed revera et evidenter axillaris, apice bifidus, abortiente altero ramo seu flore sæpe uniflorus, folio suo paulo brevior, quadrangularis, glaber. Bracteæ lineari-spathulatae, calyce multo breviores, glabriuscule. Calyx 5-7 lin. longus, lacinias linearibus angustis hirsutus. Corolla bipollucaris, propter fauces obconico-expansas tubo breviores magis infundibuliformis, violacea; limbi diametro  $1\frac{1}{2}$  poll.
- α. caule foliisque glabris. — Ad viam Felisbertiam in prov. Bahiensi, Januário (Max. princ.! Wied. in h. Mart.), in silvis ad Camamu prov. Bahiensis, Januario (Martius!). Ruellia curviflora Nees et M. in nov. act. nat. cur. 11. 1 p. 50, Spr. cur. post. in syst. veg. 236. Ruellia silvaccola var.  $\gamma$  longifolia Mart.! in h. reg. monac. (v. in h. Mart.)
  - β. caule juvenili foliisque supra hirsutis. — In Brasiliâ. Præter hirsutiem etiam foliis angustioribus differt. (v. in h. Moricand).
  - $\gamma$ . *grandifolium*, foliis majoribus acutissimis, paulo longiore petiolo, reliquis ut in formâ communi. — Circa Bahiam. Ruellia longiflora herb. DC. (v. in h. DC.)
29. A. **LONGIFLORUM** (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 62), caule obtusangulo pubescente, foliis oblongis aut ex oblongo lanceolatis utrinque attenuatis basi in petiolum longum decurrentibus, fasciculis bifidis paucifloris, calycis lacinias hispidis angustis, corollæ elongato-obconicæ lacinias brevibus retusis.  $\mathcal{U}$  In Brasiliæ Serra da Viura (Schott! in h. imp. vindob. n. 6130; Schüch! in eod. h. e Brasiliâ, loco natali non accuratius definito). A. curvifloro subsimile, differt pubescentiâ et corollæ A. Hænkeani corollam simulantis figurâ. Caulis gracilis. Folia tenera, 4-5 poll. longa,  $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. lata, acumine angusto obtusiusculo, petiolo  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longo, paginâ superiore sæpe setulis rarís adspersâ, repando-crenulata. Pedunculus folio longior, puberulus, altero pedunculo longiore. Bracteæ ad divisuram brevissime spathulatae. Calycis lacinias longæ, lineares, angustæ, obtusæ, pubescenti-hispidae, nec longe ciliatae. Corollæ coccineæ puberulae tubus cum faucibus continue obconicus, incurvus,  $1\frac{1}{2}$  poll. longus; limbi diameter 8-9 linearum, lacinias ovato-subrotundis retusis. (v. in h. vindob.)

30. *A. coccineum* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 63), herbaeum, glabrum, foliis ovato-oblongis attenuato-obtusis obtuse dentatis basi acutis petiolatis supra lineolatis, floribus subtenuis subsessilibus ramulove plus minus elongato pedunculatis capitatisque, bracteis communibus lanceolatis sessilibus capitulo longioribus, propriis ovalibus obtusis integerimis brevioribus, capsula medio superne octosperma. *2* In insulis S. Crucis (h. Lehmann!), S. Domingo (h. Hooker.), S. Thomas (Wydler!), Portorico (Bertero! ex h. Balbis in h. DC. Plée! in h. Nees ex h. Mus. paris. n. 275, Ledru ibid. n. 554, Wydler! n. 141 in h. Bentham), in humidis Morro Queimado prov. Sebastianopolitanae? (Sericographi scandenti additum vidi unum specimen a cl. Riedel? lectum. Dubia est igitur Brasiliae civis) Americâ merid. (Vahl! in h. Willd. et Moritz! in h. gen. berol.). Ruellia coccinea Vahl! symb. 3 p. 83 et h., Willd.! sp. pl. 3, 1, p. 370 n. 29, herb. n. 11644 Spr. syst. 2 p. 820, Wydler! h. ins. S. Thomas n. 141. Barleria coccinea Linn. sp. pl. p. 888 Plum. gen. p. 31, ic. t. 43 f. 1. Barleria Solani folio, flore coccineo Plum. gen. p. 31 fig. 43. Differt a reliquis Arrhostoxylis speciebus foliis evidenter et grosse obtuse dentatis supra valde nec confertissime lineolatis, et imprimis pedunculo communi (ramulo) minore sœpe brevissimo, bracteis communibus majoribus repando-dentatis. (v. in h. DC., Vahl, Willd., etc.)

## LII. ONYCHACANTHUS N. ab E. — Ruelliae spec. Pavon.

Calyx quinquepartitus, laciinis æqualibus latis obtusis herbaceis. Corolla campanulato-infundibuliformis, tubo brevi, limbi laciiniis subæquibus. Stamina quatuor, didynama, apici tubi inserta, basi barbata, inclusa; anthere basi bicalcaratæ, loculis parallelis secundis contiguis chartaceo-rigidulis. Stigma latiusculum, compressum, in spiram revolutum, apice biunguiculatum. Capsula oblonga, lævis, chartaceo-rigida, bilocularis, prope a basi tetra-octosperma. Semina magna, ovata, compressa, subcarinata, lævia. — Frutices Americani. Rami trichotomi. Folia glabra petiolata. Thyrsi axillares, pedunculati, simplices. Pedicelli oppositi, infra florem vibranteolati. Bracteæ parvæ.

1. *O. CUMINGII*, caule arborescente, ramis quadrangulis apice pubescens, foliis oblongis obtusis basi cuneiformi in petiolum decurrentibus, pedunculis axillaribus terminalibusque folia æquantibus simplicibus trifidis, floribus oppositis brevipedicellatis nutantibus, inferioribus distantibus, bracteis pedicello brevioribus lanceolatis, bracteolis calyce brevioribus ejusque laciinis ovatis obtusis canescens. *5* In Peruvia (Pavon! in h. DC.), in Americâ centrali (Cuming! n. 1307, in h. Benth. et Hook.). — Ruellia arborescens Pavon! in h. Moricand. (v. in h. DC., Benth. et Hook.)
2. *O. BERLANDIERIANUS*, caule erecto profunde quinquangulari glabro lenticuloso, foliis ovalibus oblongis basi acutis apice attenuatis obtusiusculis glabris, juniorum petiolis gemmisque hirsuto-candicantibus, spicis axillaribus oppositis longe pedunculatis feliceo-bracteatis subinvolucratis, bracteis ovalibus, bracteolis lanceolato-spathulatis, petiolo basi dilatato ciliato, calycis laciinis ovatis ciliatis, antheris basi bicalcaratis. — Ad Tampico de Tamaulipas (Berlandier! n. 108, in h. Moricand). Planta speciosa. Folia caulinæ cum petiolo 6 lin. longo 5 poll. longa, 2 poll. lata, coriacea; ramea minora et angustiora. Pedunculi quadrangulares, nudi, stricti, folium æquantes, simplices vel trifidi. Spicæ pollicares, oblongæ. Corolla rigidula, 6-8 lin. longa, pubescens. Stigma longum, filiforme, tremulo-contorquescens. Ovarium prope a basi 4-ovulatum. (v. in h. Moricand).

LIII. TRICHANTHERA Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. 2 p. 242 nota,  
Endl. gen. suppl. 2 p. 62 n. 4059. Meissn. gen. p. 295 (203). — Ruellia spec.  
Humb. et Bonpl.

Calyx 5-partitus, laciniis æqualibus oblongis obtusis. Corolla obconico-infundibuliformis, coriacea, limbo subæquali 5-fido, laciniis triangularibus brevibus planis. Stamina quatuor, per paria connata, exserta; antheræ biloculares, cordato-oblongæ, loculis parallelis muticis margine longe ciliatis demum basi divaricatis. Ovarium ovoidem, subcompressum, pubescens; stylus filiformis exsertus; stigma subulatum. Capsula oblonga, subcompresso-teretiuscula, a basi bilocularis, prope a basi tetrasperma. Semina lenticularia, retinaculis uncinatis apice emarginatis subtensa. — Arbor Americæ tropicae, subquincqueorgyalis, comâ densâ. Ramuli tetragoni, angulii tuberculorum punctiformium serie obsitis, cortice glabro albido. Folia late ovata (6-8 poll. longa, 4-4½ poll. lata), acuminata, petiolata, integrerrima, subcoriacea, basi obtusa, glabra, costis subtus hirtis. Cyma terminalis, dichotomo-divisa, ramis brevibus crassis pubescens. Bracteolæ 2, ovatæ, acutæ, pubescentes, 4½ lin. longæ ad basin calycis. Calycis laciniæ ovales, obtusæ, 4 lin. longæ, rigidae, tomentosopubescentes. Corolla pollicaris, extus sericea, pallida, intus glabra, purpurea ?. Capsula calyce duplo longior, pubescens.

T. GIGANTEA. — Ruellia gigantea Humb.! et Bonpl. pl. equinoc. p. 75 t. 102.  
Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. 1. c. Kunth synops. 2 p. 38. ♂ Frequentissima in ripâ umbrosâ fluvii Magdalenaæ prope Badilla; item juxta Ibagué in radicibus Andium Quindiuensem alt. 700 hexap., Jun.—Octobr. (v. in h. gen. berol. et Hook.)

#### LIV. MACROSTEGIA N. ab E. — Ruellia spec. Ruiz.

Calyx grandis, basi tubulosus, profunde 5-sfidus, laciniis duabus inferioribus longioribus. Corolla tubulosa, limbo brevibilabiata, labio inferiore trifido, laciniis rotundatis, mediâ latiore, labio superiore angustiore compresso integro. Stamina 4, tubi apici inserta, didynama, corollam æquantia, basi hirsutæ cincta, libera; antheræ parvæ, biloculares, ferri equini specie bicornes, connectivo crasso semilunari, loculis connectivi cornibus insertis parallelis, deorsum sinu lato distantibus. Stigma bifidum, laciniis acutis subæqualibus. Ovarium annulo nectarifero cinctum, ovatum, ad basin biovalutum? Fructum non vidiimus: — Herba Peruviana, glabra, caule quadrangulari, foliis latis tenuibus, inflorescentiâ Arrhostoxyli aut Stephanophysi, cymis axillaribus pedunculatis simplicis trifidis in nostrâ specie trifloris, bracteis bracteolisque in pedunculis lateralibus angustis floribus calyce insigni, corollâ calycem haud superante pubescente firmâ, tubo rigidulo.

M. RUIZIANA. ♀ In Peruvâ (Ruiz!). Ruellia macrocalyx Ruiz! in h. gen. berol. (cum Stephanophyso quadrifario). Folia oblongo-ovalia, obtusa cum mucronulo, basi cuneiformi in petiolum brevissimum decurrentia, 9 poll. longa, 3 poll. lata, ramis costalibus 12-13. Pedunculi oppositi, compressi, glabri, bipinnicaires. Bracteæ 9 lin. longæ. Flos intermedius brevius pedicellatus, ebracteolatus. Calyx 1½ poll. longus, subinfundibuliformis, pubescens, laciniis lanceolatis reticulatis, duabus inferis 3 lin. spatio superiores excedentibus. Corolla pollicaris, pubescenti-sericea, tubo glabro, labii inferioris laciniis ovatis obtusis. Filamenta squamulosa, apice incurva. (v. in h. berol.)

LV. SCLERO CALYX *N.* ab *E.* in *bot. sulph.* p. 145. — *Gymnacanthus N.* ab *E.* in *Lindl. introd. ed. 2* p. 444, *Endl. gen. p.* 698 (1).

Calyx grandis, coriaceus, basi brevi spatio tubulosus, profunde quinquefidus, lacinias aequalibus extus canaliculatis, aestivatione quinquangulari, lacinia lateris interioris superficie valvatum conjunctis! Corolla crassiuscula, tubulosa, extus tomentosa, limbo 5-fido regulari, lacinias planis. Stamina 4; antheræ biloculares cordato-oblongæ, loculis parallelis multicis margine nudis. Ovarium ovatum, bilocularis, loculis biovulatis. Stylus filiformis. Stigma oblique rostratum sive unilabiatum basi superne impressum. Fructus latet. — Herba Mexicana, erecta. Pedunculi (vel potius rami) versus apicem caulis axillares, oppositi, solitarii vel gemini, subinde basin versus foliosi, semper autem apice foliis bractealibus caulinis similibus at minoribus praediti, simplices trifidive. Pedunculi partiales firmi, infra apicem bibracteati, uni-triflori, "basi cum petiolo bracteæ connati. Bracteolæ parvæ. — Genus *Trichantheræ* et *Macrostegia* accedens, differt ab hoc calycis æqualis et crassi aestivatione et antheris, ab illo calyce longo nec imbricato antherisque haud ciliatis.

*S. MEXICANUS* (*N.* ab *E.* l. c.) ~~2~~ Ad Acapulco (Hinds), in imperio Mexicano (Haenke!). *Gymnacanthus* petiolaris *N.* ab *E.* in h. Haenke. Caulis erectus, ramosus, pluripedalis, obtuse tetragonus, grosse lenticellatus, dense at subtiliter tomentosus, sicuti et petioli, inflorescentia et calyces. Folia caulis 7-8 poll. longa, 3 poll. lata, ovato-elliptica, basi acutâ in petiolum pollicarem desinentia, apice cuspidato-acuminata cuspide obtusiusculâ, integerrima, supra subtusque (præsertim in costis) puberula. Pedunculi folio breviores, rigidi, erexit. Folia floralia 1-1½ poll. longa, oblonga, petiolata. Pedunculi proprii patentes, longitudine petioli folii floralis, quocum basi caharent. Bracteolæ infra apicem duæ, aliis spatulatæ, aliis lineares, tomentosæ. Calyx pollicaris, lacinias lanceolatis acutiusculis utrinque tomentosis. Corollam expletam non vidi (« albam » describit schedula adjecta). Stamina quod ad anthers, si pilos demis, *Trichantheræ* similia. Ovarium annulo lato cinctum biloculare, quadriovulatum. (v. in h. Henk. et Benth.)

LVI. OPHTHALMACANTHUS *N.* ab *E.* — *Ruellia* spec. *N.* ab *E.* in h. Henk.

Calyx grandis, ad medium usque vel et profundius quinquefidus, lacinias latiusculis herbaceis. Corolla infundibuliformis, tubo angusto, faucibus cum limbo campanulatis, limbi quinquefidi lacinias subæqualibus. Stamina quinque subæqualia, limbum æquantia. Antheræ lineares, longæ, nudæ, loculis parallelis contiguis. Stigma recurvum, bifidum, lacinia superiore brevissimâ, dentiformi. Capsula calyce tecta, rigida, ad medium fere a basi elocularis et asperma, hinc in medio octosperma (abortu tetrasperma). Semina rétinaculis validis suffulta. — Frutices Mexicanæ, gemmis oppositis perulatis plerumque et tomentosis praediti. Rami tetragoni angulis sâpe serie verrucarum vel tuberculorum muriciformium exasperatis. Pedunculi axillares, apice bifidi, triflori, scil. ramulo singulo apice unifloro et tertio flore intermedio sessili, vel uniflori, apice diphylli aut bibracteati. Bracteæ duæ sub bifurcatione, bracteolæ, duæ sub flore utroque lateralí, nullæ sub medio; pedunculi alii, præsertim superiores, tum abortu uniflori. Flores speciosi, lutei, Dipteracanthi figurâ. Pedunculi delapsis fructibus spiniformes persistunt. Quod ad inflorescen-

(1) Genus l. c. ad specimen imperfectiora instructum et ipter Nelsonicas relatum nunc melioribus eductis specimenibus *Ruellieis* consociendum esse intellexi, quo facto et nomen isti loco inconveniens cum alio aptiori commutavi.

tiam accedit Dipteracanthi subdivisioni Paniculariæ, quod ad calycem magis Sclerocalyct et Macrosteigæ.

1. O. SPECIOSUS, calycibus ad medium usque divisus glanduloso-tomentosis, foliis ovatis repandis supra molliter pubescentibus subtus subtomentosis, pedunculis 3-1-floris, bracteis linearibus, caulis angulis muricatis. ♂ In Mexico prope los Baños de Atoto el Grande, Octobri ( Ehrenberg ! n. 771 in h. gen. berol. ), Tehuacan ( Puebla ) alt. 5500 ped. in sepiibus, Augusto Galeotti ! n. 1042 in h. Bentham et Hooker). « Frutex 6-pedalis. Corolla pallide flava, 1½ poll. longa, Sphyngi cuidam grandi viridi dilectissima » ( Ehrenberg in schedis ). Calyx pollicaris. Corolla sesquipollucaris, pubescens, incurva, tubo cylindrico fauces æquante. Capsula longitudine calycis, rigida, 8-4-sperma. ( v. in h. berol. et Bentham ).
2. O. GEMMIPARUS, calyce ad 1-5-partito puberulo, lacinias ciliatis, foliis ovatis brevi-acutis repandis supra sparsim subtus in costis pilosis, pedunculis 1-floris, bracteolis linearibus, caulis angulis tuberculatis. ♂ In Mexico ( Hænke ! ) Ruellia gemmipara N. ab E. in h. Hænk. Caulis fruticosus vel arboreus. Rami ramosissimi, subtetragonoi, cortice cinereo induti, glabri, superne lineis pilosis decurrentibus notati, verrucis albis crebris obtusis exasperati. Ramuli oppositi. Gemmæ magnæ, subglobosæ, oppositæ, magis quam præcedenti candido-tomentosæ, squamulis fuscis. Folia poll. 1½ longa, pollicem lata, ovata, basi apiceque acuta, supra lineolis crebris exasperata setulisque albidis inspersa, subtus ad costam et venas albo-villosa, margine ciliata, venis arcuatis simplicibus. Petioli breves, supra canaliculati et albo-villosi. Pedunculi axillares, oppositi, longitudine dimidiæ folii, demum magis elongati, subtetragonoi, albo-verrucosi, uniflori. Flores cernui, ad basin bracteis duabus oppositis linearibus ciliatis calyce paulo brevioribus instructi. Calyx minor quam in præcedente, ad 1 a basi quinquepartitus, æqualis, lacinias lineari-lanceolatis in fructu amplificatis et lanceolatis acuminatis ciliatis. Corolla ( perfectam non vidi ) quod ad structuram internam præcedenti respondet, extus glabra. Capsula magna, calycem persistentem æquans, obovata, basi brevi spatio contracta, mucronata, glabra, dura, fusca, bivalvis, bilocularis; loculis dispermis. Semina compressa. ( v. in h. Hænke ).
3. O. ROSEUS, hirsutus, calyce quinquepartito glanduloso tomentoso lacinias basi longe ciliatis contextisque, foliis unguicularibus ovatis obtusis in petiolum brevem acute desinuentibus, pedunculis unifloris apice diphylli flore sessili, caulis angulis nudis. ♂ In montibus cactiferis prope Tehuacan alt. 5000 pedum, Cordillera de Oaxaca in imperio Mexicano, Augusto ( Galeotti ! n. 915 in h. Hooker et Bentham ). — « Planta rara et pulchra! » Flores late rosei » ( Galeotti l. c. ). Corolla bipollucaris. ( v. in h. Hooker et Bentham ).
4. O. PARVUS, calyce quinquepartito ciliato, foliis ovatis vel obtusis vel acutiusculis pubescenti-canis petiolatis, pedunculo unifloro apice diphylio folio breve, flore sessili, caulis angulis nudis. ♂ Ad Teocomulco in calidis Mexicanorum ( Karwinski ! in h. Mart. ). Rami digitales, inferne glabri, incani, superne uti folia pubescentia, pube denique evanescente. Folia ( Chenopodioli ) 9 lin. longa ( cum petiolo lin. 1 longo ), 6 lin. lata, e basi obtusa in petiolum breviter acutata, ramis costalibus binis; ramea 3-4 lin. longa, subrotunda. Pedunculi oppositi, 3-4 lin. longi, pubescentes, apice diphylli. Flos sessilis. Calyx 7-8 lin. longus, folia seu bracteolas æquans, lineari-attenuatus, ciliatus. Corolla corulea, sesquipollucaris, lacinias rotundatæ. Capsula anguste clavata, glabra, 12-16-sperma. ( v. in h. Mart. )

#### LVII. WHITEFIELDIA Hooker bot. mag. t. 4155.

Calyx amplus, coloratus, profunde 5-fidus lacinias subæqualibus lanceolatis acutiusculis lineatis. Corolla infundibuliformi-campanulata, limbo

subtilabiato, laciniis ovatis acutis duabus superioribus brevioribus sub-  
adscendentibus, tubo brevissimo intus lanato. Stamina 4 didynama, in-  
clusa, distantia; rudimento quinto obsoleto; anthere oblongo-lineares,  
biloculares, loculis parallelis muticis. Ovarium biloculare loculis biovulatis.  
Stigma obtusum. Annulus hypogynus crassus. Fructus . . . . Frutex Africæ  
tropicæ occidentalis. Rami terminales, subsecundi, deflexi. Pedicelli bra-  
chiatim oppositi. Bractæ angustæ, membranaceæ, coloratae (infimæ  
majores et foliaceæ). Bracteolæ ad basin calycis grandiussculæ (obovatæ  
trinerves adpressæ) sæpiissime coloratae calyce breviores. Flores cum  
calyce bracteisque rubri. — Genus Dipteracantho mediante D. calycino  
conjunctionem sed omni habitu ipsaque corollâ alienum et vix ejusdem  
tribus.

W. LATERITIA (Hooker l. c. Morren ann. de Gand 1846 t. 55). ♂ In in-  
terioribus Sierra Leone (Whitefield! in horto Derbyano et Kewensi).  
Frutex mediocris, ramosus, glaber, ramis flexuosis. Folia oblongo-ovata  
petiolata, subcoriacea, integerrima, undulata. Racemi densi, 8-10-flori,  
speciosi. Calyx basi brevi spatio tubulosus, lateritus uti corolla, fere pollicari-  
ris. Corolla calyce duplo longior, bilabiata, labio inferiore ad medium usque  
trifido, superiore bifido. (v. s.)

LVIII. ANCYLOGYNE N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 63. — Poeci-  
locnemidis spec. Mart.

Calyx usque ad basin fere quinquepartitus, membranaceus, coloratus,  
laciniis oblongis obtusis longitudine nec latitudine æqualibus, superiore  
latiore subovali crassiore, duabus inferis oblongis inæquilateralibus, duabus  
lateralibus magisque interioribus angustioribus lanceolatis. Corolla tubu-  
losa, limbo brevi subregulari quinquefido, laciniis patentibus ovatis  $\frac{2}{3}$ . Sta-  
mina 4, quorum duo sterilia brevissima, duo corollâ longiora. Antherae  
ovales, loculis ovalibus parallelis hirtis basi patenti-calcaratis connectivo  
lanceolato subdiscretis. Stylus filiformis, staminibus longior, apice uncinatus;  
stigma acutum, bifidum, altero ramo brevi dentiformi subinde defi-  
ciente. Capsula tetragona, cuspidata, a basi octosperma, cuspide solidâ,  
lateribus tenuioribus a dissepiamento crasso solubilibus. Semina suborbicularia,  
compressa, lævia, nitida, retinaculis cochleariformibus suffulta.  
— Herbae Americæ tropicæ, perennes, caule quadrangulari, foliis glabris  
dense lineolatis subcrenatis. Spica terminalis, basi interrupta, foliacea-  
bracteata, subinde in capituli speciem contracta, fasciculis in axillis  
bractearum geminis subsessilibus bracteatis. Bractæ duas, a latere oppo-  
sitæ, singulæ vel altera saltem fasciculum floremve singulum soventes, uti  
reliquæ bractæ laciniis calycinis similes, ovali-oblongæ, obtusæ, submu-  
cronatae, paulo firmiores et majores. Inter haec bracteolæ 3-4, etiam, at  
serius floriferæ minoresque; altera autem laciniis calycis similis, florem  
primarium omnino sessilem fulcit. Quæ bractæ omnes imbricatas et con-  
cavæ tanquam capitulum in axillâ bractæ universalis singulæ exhibent.

1. A. MUNITA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 64), spicâ  
elongatâ, bracteis ovato-lanceolatis acuminatis. ♂ In Brasiliæ silvis securis  
flumen Madeira prov. fluminis Nigri, Martio, et in silvis Japurensibus ejus-  
dem prov., Decembri et Januario (Martius!). Caulis subsimplex, glaber,  
ad genicula pilosus. Folia cum petiolo semipollucari 3-4; poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll.  
lata, ovalia, basi apiceque acuta, apicem versus plus minus crenata, glabra,  
subcoriacea. Ramulorum folia infima multo minorâ, subrotunda. Spica ter-  
malis, basi interrupta et subramosa, 4-5 poll. longa. Bractæ oppositæ,  
[ovato-lanceolatae, acuminatae, ; poll. longæ, glomerulo axillari longiora.

- Bractæ partiales exteriores ovales vel ovali-oblongæ, obtusaæ vel mucronulatae, conveæ, flores in speciem capitulo ovati sessilis colligentes. Calycis laciniaæ 5 linæ longæ, nitidæ, laves, oblongæ, obtusaæ, 3 latiores  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  lin. lateæ. Corolla  $1\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, tubuloso-subinfundibuliformis, coccinea, limbi laciniaæ ovatis. Stamina exserta, filamenta fertilibus basi et apice hirsutis, antheris speciosis ovalibus, loculis hirsutis, limbi margine glabro pallido; filamenta breviora sterilia, 1 lin. longa, basi hirsuta. Capsula 4 $\frac{1}{2}$  lin. longa, pallida, glabra, lateribus post dehiscentiam a dorso sœpe solutis undulatisque. Semina fusca, nitida. (v. in h. monac.)
2. A. MACROCNEVIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 64), spicâ elongatâ, bracteis ovato-suborbiculatis obtusis ventricosis, foliis repando-crenatis in petiolum breve acute desinentibus.  $\mathcal{U}$  In Brasiliæ silvis densis insulae Pantinga et alibi in Archipelago Paraënsi prov. Paraënsis, Augusto (Martius!). In universum similis est A. munita, differt autem amplitudine partium, imprimis foliorum, et bracteis ventricosis duplo majoribus. (v. in h. monac.)
3. A. PERUVIANA, spicâ elongatâ, bracteis ovato-suborbiculatis obtusis ventricosis, foliis denticulatis in petiolum longum alatum attenuatis.  $\mathcal{U}$  In Peruviâ: Sesuija, Pangoa, Casapi (Matthews! n. 1221, 2013 et 3108 in h. Hooker; in h. Bentham n. 201?). Differt ab A. munita, cui quod ad inflorescentiam similiis, foliis argute brevicuspidatis evidenter denticulatis et in petiolum attenuatis. (v. in h. Hooker et Bentham).
4. A. CAPITATA, spicâ capituliformi, bracteis oblongis, inferioribus acutis, foliis ovalibus repando-crenatis in petiolum longum nudum acute desinentibus.  $\mathcal{U}$  Pangoa in Peruviâ (Matthews! n. 1230 in h. Hooker). A reliquis differt capitulo terminali magnitudine pomì minoris. Folia magna, cum petiolo biplicari 10-11 poll. longa, acuta, glabra, utrinque lineolata. Corolla pollicaris, sanguinea. Stamina alte exserta. (v. in h. Hooker).

Tribus V. BÄRLERIEÆ N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75,  
Endl. gen. p. 701, Meisn. gen. p. 295.

Corollæ tubus ratione limbi brevis; faux plus minusve inflata; limbus vel parum inæqualis cum fauce infundibuliformis, vel bilabiatus. Stamina 4 didynama, tubo circa basin inserta, altero pari brevissimo subinde abortivo. Antheræ biloculares, angustæ. Calyx inæqualis, aliis 4-partitus, laciñia superiore et inferiore majoribus, mediis interioribusque minoribus, aliis subbilabiatus, 2-5-partitus. Capsula omnium juxta basin tetrasperma, rarius disperma.

#### CONSPECTUS GENERUM.

† *Corolla infundibuliformis limbo obliquo irregulari, nec definite bilabiata.*

LIX. *Barleria*. — Calyx 4-partitus, laciñia superâ et inferâ latioribus. — Asia, Africa et America calidior.

† † *Corolla definite bilabiata.*

LX. *Lophostachys*. — Calyx 4-partitus, laciñia superâ et inferâ latioribus. — America tropica.

LXI. *Asteracantha*. — Calyx 4-partitus, laciñia superâ paulo magiore, inferâ bidentatâ. — India orientalis, Abyssinia, Senegambia.

LXII. *Neurracanthus*. — Calyx 2-partitus , labio superiore 3-fido, inferiore 2-fido. — India orientalis.

LXIII. *Lepidagathis*. — Calyx 5-partitus, laciniæ superiore majore, duabus inferioribus saepè altius subinde fere usque ad apicem conjunctis , raro omnibus subæqualibus. Spica biseriatim secunda, bracteis dorsibus sterilibus. — India orientalis , Ceylon Java , Timor, Manilla , Abyssinia , Senegambia , Brasilia.

LXIV. *Apolepsis*. — Calyx (inæqualis Lepidagathidis ?) ; corolla tubulosa , sursum ampliata , tubo incurvo, limbo 5-lobo , æquali. Capsula tetrasperma. Inflorescentia spicata. — Java.

LXV. *Ætheilema*. — Calyx 5-partitus , laciniæ superiore maximâ bracteiformi. — India orientalis , Asia minor , Africa calidior , orientalis et occidentalis.

LXVI. *Teliostachya*. — Calyx 5-partitus laciniæ superiore tuni duabus inferioribus latioribus. Spica terminalis verticillata , bracteis omnibus fertilibus. — America tropica cum insulis Indiæ occidentalis.

LIX. BARLERIA Linn. , N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 91 , et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 701, Meissn. gen. p. 295 (204, 367).

Calyx quadripartitus , laciniis cruciatim oppositis , superè et inferè multo latioribus plerumque et longioribus magisque exterioribus , integris vel inferiore emarginatâ rarius bipartitâ , medis lateralibusque angustioribus. Corolla infundibuliformis , tubo ratione limbi vel brevi vel longissimo , limbo cum fauce conico-dilatatis ; laciniæ limbi quinque , profunde divisiæ , quarum superior brevior. Stamina quatuor didynama , circa basin tubi inserta , par majus saepè longum , corollam subæquans , minus brevissimum , in paucis speciebus anantherum ; subinde stamina quatuor æqualia , filamentis brevibus. Antheræ lineares , biloculares , loculis parallelis muticis , minorum staminum breviores vel imperfectæ , subinde æquales. Stigma compresso-infundibuliforme , truncatum , limbo integro. Capsula conico-acuminata , circa basin fere bilocularis , ibidemque tetra-vel abortu disperma ; dissepimentum integrum , adnatum. Semina pelliculâ demum floccosâ induta. Retinacula crassa , concava. — Plantæ herbaceæ vel fruticosæ , habitu dissimili , sed typo omnino constante. Inflorescentia in aliis axillaris , in aliis spicata , bracteis in spicatis latioribus vel angustioribus. Bracteolæ dues angustæ , quandoque , ut bracteæ , ciliatæ vel spinosæ. Corolla speciosa , cœrulea , magis minusque venosa , vel alba lutescens.

§ 1. BARLERIÆ PROPRIÆ. — Flores spicati vel axillares subsessiles. Corollæ tubus plerisque , collatus cum fauci longitudine , brevis. Plantæ elatiiores inermes.

A. Floribus spicatis , spicis axillaribus et terminalibus saepè aggregatis subcapitatis que , spicis secundis bracteis floribusque spicatim distractis. Stamina 2-4.

1. B. MICANS (N. ab E. in h. Hænk. et in Benth. bot. of the sulph. p. 146), fruticosæ , inermis , foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis cauleque strigosis , spicâ terminali (axillaribusque) imbricatis subcylindricis , bracteâ calycisque laciniis majoribus ovatis breviuspidatis dentato-ciliatis , inferiore bifida , floribus subdiandris. 3 In regno Mexicano (Hænkel in h. mus. prag.) , prov. Turbaco (Humboldt! in h. Willd. ), Vera Cruz , ad Mirador (Linden !

- n. 188 in h. Hook.), Guatimala (Skinner in h. Benth.), in insula Taboga sinus Panamensis (Sinclair), in istmo Darieu (Barclay), Columbia (Cuming! n. 1138 in h. Hook. et Benth.). Eranthemum cristatum h. Willd. n. 265, Link Jahrb. I. 3 p. 46, R. et Sch. syst. mant. 1 p. 153, Sp. pl. ed. Dietr. I p. 451. Justicia serrata Humb. in h. Willd. Justicia oxyphylla h. DC. (specimen cultum, inflorescentia incompletâ). Fructus ramis teretibus setis flagrantibus strigosis atque micantibus vestitus. Folia 6-12 poll. longa, 2- $\frac{1}{2}$  poll. lata, acuminatissima. Spica terminalis circiter palmaris, sessilis, densa, conico-cylindracea. Calycis laciniæ anterior et posterior magnæ, æquales, bracteæ medianam aequalentes, ellipticæ, acute, basi attenuatae, mucronato-serratae, ciliatae, multi- (11-) nerves, venoso-reticulatae, anterior apice bifida, laciniis subulatis. Corolla circiter pollicaris, flava, siccando violacea, limbo subæquali. Stamina fertilia duo, loco staminum breviorum processus tres, parvi, barbatæ. (v. in h. Hænk., DC., Willd., etc.)
2. B. SENEGALENSIS, fruticosa, inermis, caule adpresso strigilosæ, foliis ovali-oblongis acuminatis in petiolum cuneatim decurrentibus in costis laxe strigosis, spicis terminalibus aggregatis imbricatis subcylindricis, bracteis calycisque laciniis majoribus ovalibus longe cuspidatis dentato-ciliatis, superiore bifidâ, laciniis aristatis, floribus subdiandris. ♂ In Senegambia securis Rio Nunoz fluvium (Heudelet! in h. Mus. paris. n. 8, h. Nees et Hook.!). Simillima B. micant., differt foliis præter costas glabris et calycis cuspidibus longioribus subulatis. Bractea minus quam calyces cuspidata et ciliata. Bracteolæ lineares, rigidæ, acute, calycem æquantes. Stamina sterilia ad basin fertilium, subulata, brevia. Corolla flava, siccata cœrulea. Au mater Barlerie flavae hortorum nostrorum? (v. in h. paris. et Hook.)
3. B. FLAVA (Jacq. ecl. p. 67 t. 46, excl. omnibus synon. præter Willd.), inermis, fruticosa, foliis oblongis utrinque longe attenuatis cauleque strigosis, spicâ terminali imbricatâ subcylindrica, bracteâ calycisque laciniis majoribus oblongo-ovalibus cuspidatis ciliatis, laciniâ inferiore bifidâ paulo breviore, floribus subpentandris. ♂ In America meridionali; frequens in hortis nostris obvia. — Bot. mag. t. 4113, excl. synon. h. gen. berol. ex hort. berol. Eranthemum flavum Willd. en. hort. berol. suppl. p. 2. Barleria mitis Ker bot. reg. t. 191. Lodd. bot. cab. t. 1911. Barleria gentianoides Desf. Barleria cænotheroides Dum. Cours. Proxima B. micant., differt imprimis calycis laciniâ superiore angustiore oblongâ et corollâ minore subquadrifidâ, laciniâ superiore bifidâ subinde tantummodo emarginatâ. Corolla flava. Stamina perfecta 4 cum filamento quinto sterili; subinde et duo breviora stamina antherâ imperfectâ occurunt. Anthera exserta, perfectiores basi hinc saepè subcalcarata, nec vero in omnibus. (v. v. et s. c. in h. Hook. et berol.)
4. B. DISCOLOR (N. ab E. in Benth. bot. of the Sulph. p. 146), suffruticosa, inermis, foliis ovalibus vel ovali-oblongis acutis in petiolum cuneatim desinentibus cauleque strigosis subtus argenteo-albicantibus, spicâ terminali ovata imbricatâ, bracteâ calycisque laciniis majoribus rhombo-ovalibus acuminatis dentato-ciliatis, laciniâ inferiore bifidâ, floribus diandris. ♂ Ad Nicoam (Sinclair). Similis B. micant., differt autem non modo notis adlatis sed etiam calycibus bracteisque cyaneis, dentibus paucioribus circa margines (laciniæ superioris 6-7, inferioris 3-4) medio ad apicem) magisque patentibus prædictis, corollâque (læte violaceâ) paulo majore, limbo magis patulo magisque inæquali. Folia inferiora 8 $\frac{1}{2}$ -9 poll. longa, 3-3 $\frac{1}{2}$  poll. lata, cuspidato-acuta; omnia subtus plus minus argenteo-nitentia, qui color neutiquam ab integumento quadam oritur, nam pili plantæ ut in B. micante flavescentes sunt. (v. in h. Benth.)
5. B. NITIDA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 91. Wight h. propr. n. 1955, ic. 2 t. 454), caule fruticoso strigoso, foliis ovatis ellipticis petiolatis, juniores supra dissite setulosos lineolatisque, floribus spicatis spicis ad apicem caulis coufertis, bracteis ovato-ellipticis acutis denticulatis ciliatis nitentibus, calycis laciniis majoribus inæqualibus rhombo-ovatis acutiusculis ciliatis stri-

gosisque, corollæ lacinia inferiori breviore, tubo mediocri. ♂ In collibus nemorosis prov. Dindigul, Madura, etc. (Wight! Belanger! in h. DC.), Courtallum (h. Wight!), Tīckrigulli, Novembri-Martio (Lady Dalhousie! in h. Arnott). B. cœrulea Wall. cat. n. 2509 h, i. B. cristata capitata h. Hook. B. cristata? h. Wight (Wall. I. c.). B. pungens h. Heyn. (Wall. I. c. i.). Caulis fruticosus, obtuse tetragonus, setis appressis sparsis in parte hornotinâ confertibus strigosus, inferne flavus. Folia 3 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata. Spicæ versus apicem caulis axillares, aggregatae vel singulæ, vix bipollicares, secundæ, brevipedunculatae. Bractæ dorsales  $\frac{1}{2}$  poll. longæ, ovales, acutæ, denticulatae et setulis flavis ciliatae, subtus strigose, venoso-reticulatae, membranaceo-herbaceæ, nitidae, purpurascentes, oppositae lanceolatae, multo minores. Calycis lacinia majora bracteis texturâ dentibus, nitor et ciliis similes, extus densius strigosa; inferior  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, infra medium  $\frac{1}{2}$  poll. lata, acuta; superior vix pollicem longa, magis ovata, obtusiuscula. Corolla speciosa, 2- $2\frac{1}{2}$  poll. longa, limbo quasi bilabiato, scil. lacinia inferior una brevior, obovata, quatuor magis superæ longitudine æquali, obovatæ. Stamina 4. (v. in h. Wall., Wight, DC., etc.)

6. B. TERMINALIS, caule herbaceo sparsim strigoso, foliis oblongo-ovalibus acuminatis in petiolum longum alatum decurrentibus supra dissite setulosis, floribus spicatis, spicis ad apicem caulis confertis ebracteatis, bracteolis lanceolatis calycem subæquantibus calycibusque pubescentibus molliter ciliatis, calycis lacinia majoribus subæqualibus ovalibus acutiusculis integris et integerrimis, corollæ lacinia inferiori breviore, tubo mediocri. ♀ In Indiæ orientali (Jacquemont! in h. Mus. paris. n. 801). Corolla 2 poll. longa. Folia inferiora fere pedalia, 3 poll. lata. (v. in h. paris.)

7. B. HIRSUTA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 91, Wall. cat. suppl. n. 130), fruticosa, hirsuta, foliis oblongo-ouneiformibus in petiolum attenuatis supra asperis, spicis axillaribus subsessilibus brevibus densis, bracteis denticulatis mucronulatis, calycis lacinia inferiori integrâ, corollæ tubo elongato. ♂ In Indiæ orientalis montosis juxta Prome, etiam in montibus Taong Dong dictis, prope Avam (Wall.!). Caulis undique setis rigidis fere pungentibus hirsutus. Folia  $5\frac{1}{2}$ -7 poll. longa, acuminata, utrinque setulis caulinis similibus hirsuta, quæ in paginâ superiori tuberculis innascentur; lineolæ nullæ. Spicæ solitariae, ovatae, folio suo triplo breviores, densissime imbricatae, secundæ. Bractæ ellipticae vel elliptico-ovatae, obtuse cum mucrone exiguo, circiter pollicares, nervoso-venosæ, hirsutissimæ. Calycis lacinia majora bracteis communibus similes, pollicares, ovatae; laciniaæ interioris tertiae vestigia in nostro specimeni adsumt, lamina scil. exigua, obtusa, laciniaæ superiori opposita, cum annulo nectarifero basi confluens. Corolla fere bipollicaris, cœrulea, venoso-reticulata, fauce parum dilatata; limbi laciniaæ obtuse; quatuor cuneiformes; superior brevior, ovata. Stamina quatuor perfecta. (v. in h. Wall.)

8. B. POLYTRICHA (Wall. pl. as. rar. 1 p. 72 t. 82, cat. n. 7143, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 91), fruticosa? hispida, foliis obovato- vel oblongo-cuneiformibus in petiolum attenuatis supra lineolatis, spicis axillaribus brevibus subsessilibus, bracteis obtusis, calycis lacinia superiori bidenticulata, tubo corollæ longo. ♂ ? In Indiæ orientali in ripâ Irawaddi fluminis ad Meaong et in Tavoy (Gomez!). Differt a B. hirsutâ caule sesqui-tripedali, foliis in paginâ superiori hirsutis quidem sed non tuberculatis loco tuberculorum lineolatis saepè latioribus, bracteis magis obtusis vix mucronatis, calycis lacinia inferiori bidenticulata. (v. in h. Wall.)

9. B. RICHARDIANA, caule juvenili foliisque ovalibus acuminatis in petiolum alatum decurrentibus puberulis, spicis axillaribus sessilibus folio plus duplo brevioribus subcylindricis hirsutis, bracteis ovatis subulato-cuspidatis calyce brevioribus 5-nervibus, calycis lacinia majoribus æquialongis, inferiore binervi bidentata, superiore 3-nervi 3-dentata, lacinia subulatis. — In ins. Madagascar, Baie de Rigny (Richard! ex Mus. paris. in h. N. n. 65). Species valde singularis,

absque floribus a me visa, sed certo hujus generis. Spicæ pollicares circiter, alternæ oppositæ, densissimæ, in siccō ferrugineæ et nonnihil scariosæ, bracteis calycibusque presertim margine hirsutis. Calyx 4 lin. longus; lacinia interiores in calyce fructifero brevissimæ et obsoletæ. Corolla deest. Capsula 3 lin. longa, ovato-attenuata, lævis, ad medium usque 2-locularis, circa basin 2-4-sperma. (v. in h. paris.)

10. B. POLYSTACHYTA (h. Hook.), caule glabrescente ad genicula hirsuto, foliis oblongis acuminatis cuneatim in petiolum attenuatis spicisque hirsutis, spicis axillaribus brevibus subsessilibus denisis, bracteis oblongis, calycis lacinia majoribus ovatis integrerrimis apice attenuatis, inferiore acutâ, superiore acute emarginatâ paulo breviore, tubo corollæ elongato. ♂ In Indiâ orientali. A B. coerulea differt hirsutie foliorum, a B. polytrichâ et hirsutâ calycis lacinia exterritoribus magis ad apicem attenuatis superioreque profunde bidentatâ. (v. in h. Hook.)

11. B. CŒRULEA (Roxb. fl. ind. or. 3 p. 39, Wall. cat. n. 2509 a, d, e, f, g), caule appresso-stringoso, foliis elliptico-oblongis in petiolum decurrentibus supra lineolatis glabris, spicis axillaribus subsessilibus brevibus denisis, bracteis ellipticis apice subattenuatis mucronulatis ciliatis, calycis lacinia superiore emarginatâ, corollæ tube elongato. ♂ Ad Samulcottah (Klein! in h. Willd.), Swapur (Hamilt.), in ripâ Irawaddi fluminis, ad Meaong (Wall.), in Assam superiore (Griffith! in h. Hook. et Benth.), Napalîa inferiore (Wall.). A B. hirsutâ differt: caule firmiore, strigis maxime adpressis quasi lineolato iisque detersis glabriusculo lenticuloso-aspero purpureo, foliis ellipticis vel oblongis acutis basi non adeo cuneatim attenuatis sed vel in petiolum diversa longitudinis desinentibus vel cuneatim sessilibus glabris supra lineolatis, calycibus minoribus, lacinia superâ et inferâ plerumque magis attenuatis ad nervos et margines tantum ciliatis brevioribus, inferiore emarginatâ. (v. in h. Wall. et Willd. etc.)

$\alpha.$  spontanea. Calycis lacinia obtusis. B. cœrulea Roxb. B. strigosa Willd. sp. pl. 3 p. 379, h. Willd.! n. 11664. B. unilateralis h. Hamilt.! Wall. cat. n. 2509, f. B. fasciculata h. Russell! Wall. cat. n. 2509, b.

$\beta.$  culta. Calycis lacinia acutis. In hort. bot. calc. (h. DC. Wall. cat. n. 2509, g, et h. Hook.)

$\gamma.$  spicis subcapitatis.

B. Flores ex brevissime spicatis paucifloris secundis axillares, vel glomerati vel solitarii. Stamina vel 4 vel 2.

12. B. CONSPICUA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 92), caule foliisque oblongo-cuneiformibus cuspidatis lineolato-stringosis, spicâ terminali elongatâ, bracteis bracteolis calycisque lacinia majoribus subæqualibus lanceolatis, flore diandro, staminibus brevioribus anantheris uncinatis. ♂ In Penang (h. Wall!). Justicia conspicua Wall. cat. n. 2460. Caulis herbaceus, erectus. Folia inferiora 10-12 poll. longa, 2-2 $\frac{1}{4}$  poll. lata, superiora non multo breviora sed angustiora. Spica semipedalis et longior, pedunculo pollicari tetragono. Rhacheos articuli sequales,  $\frac{1}{4}$  poll. longitudine, strigilosæ. Flores oppositi, sessiles. Bracteæ, bracteolæ et calycis lacinia majores 7-8 lin. longæ. Calycis lacinia majores, apice nec basi attenuatae, bracteâ paulo latiores, rufescentes, superior uninnervis, inferior binervis. Corolla  $\frac{3}{4}$  poll. longa, cœrulea?; tubus limbum subæquans; limbi lacinia quatuor subæquales, ellipticæ, acute, patentes; superior brevior, ovata. Stamina breviora sterilia, parva, filamento filiformi, capitulo loco antheræ parvo uncinato. (v. in h. Wall.)

13. B. COURTALLICA (N. ab E. in h. Wight n. 653 et 655), caule fruticoso foliisque oblongis basi apiceque attenuatis glabris nitidis, spicis axillaribus terminalique brevibus glanduloso-hirtis, bracteis bracteolisqne linearisubulatis,

- calycis lacinia majoribus subæqualibus ovali-oblongis apice attenuatis , staminum breviorum antheris imperfectis basi acutis. ♂ In Courtallum (Wight!). Rami dichotomi , patuli , graciles . Folia 5-7 poll. longa ,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. lata , nitida. Spica 1- $\frac{1}{2}$  poll. longæ . Flores oppositi , subsecundi , subsessiles . Bracteæ 2 lin. longæ , latiuscule subulatæ , obtuse . Bracteolæ linearæ , circiter trilineares . Calycis lacinia majores ,  $\frac{3}{4}$  poll. longæ , 3 lin. latæ (sub anthesi minores) , palmatim suboconcretes , integrerrimæ , non ciliatae , herbaceæ , pallidæ ; inferior apice bidentata . Corolla  $1\frac{1}{4}$  poll. longa , lacinia limbi obtusæ . Stamina breviora exigua , anthera oblonga incumbente utrinque acuta . Capsula longitudinalis calycis , angulis apicem versus pubescens . (v. in h. Wight).
14. B. NUTANS (N. ab E. in h. Wight et Hook.), staminum minorum antheris imperfectis linearibus , caule fruticoso foliisque subovalibus exquisite acuminate basi acutis glabris nitidis , spicis axillaribus terminaliæ brevibus secundis nutantibus glanduloso-hirtis , bracteis bracteolisque linearis-subulatis acutis , calycis lacinia inæqualibus oblongo-lanceolatis , superiore acutæ , inferiore minore bifida . ♂ In ins. Ceylon (h. Wight ! Champion ! in h. Hook.). B. Courtallica proxime affinis , differt : floribus minoribus , scil. corollæ vix  $\frac{1}{2}$  poll. longiore ; calycis lacinia superiore 5 lin. longa oblongo-lanceolata acutæ 5-nervi , inferiore 4 lin. longa magis oblonga ab  $\frac{1}{2}$  ab apice acute bifida sint lacinia que acutis quinque-nervi nervis duobus crassioribus lacinias intrantibus (in fructu calycis lacinia superior 6 $\frac{1}{2}$  lin. longa , inferior 6 lin. longa) , bracteis bracteolisque æqualibus (3 lin. longis) magis acutis . (v. in h. Wight et Hook.)
15. B. DICHOTOMA (Roxb. fl. ind. or. 3 p. 39), herbacea , appresso-strigosa , eaule brachiato , foliis ellipticis oblongis utrinque attenuatis petiolatis , spicis axillaribus terminalibus subcapitatis , bracteis linearis-lanceolatis pectinato-ciliatis , calycis lacinia majoribus ovatis subulato-serratis brevioribus . ♂ In Promontoribus , prope Meloon (Wall !) , in Penang (G. Porter !) , e Natchpur , Gangachora et Patna (in h. Hamilt.) , Simla (Lady Dalhousie ! in h. Arnott) , ex horto (Edgeworth ! n. 224 in h. Hook. , Bouton in h. DC. ) , Bengaliæ (Lechenault ibid.) , Hong Kong (Hinds ! in h. Benth. ) , Macao (Callery ! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 85) . — H. Willd. n. 11663 , Wall. cat. n. 2508 a (ex parte) , b, c, f, h, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 91. Barlieræ cristatae var. h. madr. (Wall. cat. l. c. g.) , h. Vahl ! Differt a B. laciñiatæ , cui similis est : caule herbaceo , setulis raris appressis strigoso , foliis minoribus in petiolum graciliorem decurrentibus simili modo in utræque pagina strigosis , praesertim in costis paginae inferioris , calycis lacinia majoribus bracteas longitudine et latitudine multum superantibus elliptico-ovatis in cuspidem longam integerrimam excurrentibus in ambitu profunde serratis , serraturis rigidis subulatis (neque setaceis ut in illâ) , costis serraturisque strigoso-hirsutis . Inflorescentia spica est , seu racemulus , pauciflorus , densus , brevis , rigidulus , folio brevior , quorum tres terminales capituli formam subeunt . Bractea calyce multo minores et angustiores . Flores sursum spectantes . Corolla pollicaris , cœrulea , venis obscurioribus , lacinia ovatis obtusis , tribus superioribus paulo majoribus . Stamina quatuor perfecta . Capsula calyce brevior . (v. in h. Wall. , DC. etc.)
- β. strigositate densiore , bracteas parce ciliatis integrisque . (Wall. cat. suppl. n. 118). Ad Pingee (Wall. !) , Segae in ripâ Irawaddi (idem) . Lepidagathis laciñiate Wall. cat. suppl. n. 118 bis . Calycis lacinia majores purpurascentes . (v. in h. Wall.)
16. B. LACINIATA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 91) , fruticulosa , hirsuto-flavescens , foliis ovato-oblongis in petiolum brevissimum desinibus , floribus terminalibus subcapitatis , bracteis erectis linearis-lanceolatis rigidis calycisque lacinia majoribus oblongo-lanceolatis pectinato-ciliatis . ♂ In Taong Dong montibus , ad Segae in ripâ Irawaddi fluminis (Wall. !) . Lepidagathis laciñata Wall. cat. suppl. n. 7144 . Caulis erectus , sublignosus , in var.  $\alpha$  simplex . Folia 3 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa ,  $1\frac{1}{2}$  lata , ovato-oblonga , vel ovato-elliptica ,

· acuminata. Flores terminales in capitulum seu potius fasciculum hemisphaericum e pluribus spicis secundis abbreviatis compositum collecti. Bracteæ generales et partiales subconformes, trinervio-venosæ. Flores sursum spectantes. Calycis laciniaæ binæ majores acuminatae, pectinato-ciliatae, nervose. Corolla violacea, reticulata, laciñiis obtusis. Stamina breviora imperfecta videbantur. Capsula longitudine calycis, levis, ad basin 4-sperma. (v. in h. Wall.)

$\alpha$ . foliis majoribus acuminatis, bracteis angustioribus remote pinnatifido-pectinatis, laciñiis setiformibus.

$\beta$ . foliis minoribus oblongis vel obovato-oblongis obtusis vel acutiusculis, bracteis latioribus lanceolatis densius pectinato-ciliatis. Differt caule ramoso, foliis pollice paulo longioribus inferioribus obtusis, fasciculis florum minoribus, bracteis nonnihil latioribus confertius pectinatis magisque hirsutis, calycis denique foliolis majoribus capsulam transgredientibus. (v. in h. Wall.)

17. *B. NAPALENSIS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 91), fruticosa, strigosa-hirsuta, caule corymboso-ramoso, foliis elliptico-oblongis utrinque acutis petiolatis, ramulorum obovatis minoribus, spicis axillaribus terminalibusque capitatis, bracteis linearibus patentibus ciliatis, calycis laciñiis majoribus oblongo-lanceolatis obovatoe - attenuatis longissime acuminatis serrato-ciliatis brevioribus.  $\delta$  In Napalâ (Wall. h. DC.!), prope Tannore Mussoon, Subathoon, in Himalayâ alt. 4000', Septembri, Octobri (Edgeworth! n. 227), in Chinâ (Philippi! in h. gen. berol.). *B. dichotoma* Wall. cat. n. 2508 c et b ex parte. *B. cerulea* h. Lambert in h. DC.! *B. cristata* h. Schreb.! fol. I ex parte. Similis est *B. dichotoma* et *laciñiata*, sed differt: caule graciliore fastigiatum ramoso multifloro, foliis minoribus 3-pollicariibus in ramulis 1-1 $\frac{1}{4}$  poll. longis obovatis, spicis circa apices ramorum in capitula majora densiora congestis et tum sæpe magis divisis, bracteis linearibus integrerrimis simpliciter ciliatis deorsum pectinatim divergentibus, corollis plerumque minoribus. Calycis laciñiis majores modo multo angustiores quam *B. dichotoma*, oblongo-lanceolatae longe acuminatae, ad medium usque serrato-ciliatae, ciliis remotiusculis setaceis, modo iis *B. dichotoma* simillimæ. Pedunculi plerumque bifidi, triflori, flore medio ebracteolato, lateralibus bibracteolatis. Corollæ amoenæ ceruleæ laciñiæ obovato-oblongæ; tres superiores breviores, acutiusculæ. Antheræ ut in *B. dichotoma*. (v. in h. Wall., DC., etc.)

$\beta$ . *microphylla* (ob ramulorum folia sola residua). Cum formâ  $\alpha$ , Morni hills Himalayæ, Decembri (Edgeworth!) — Variat: floribus in axillis foliorum solitariis alternis raris roseis. In ripâ Jumnæ juxta pontem, Junio (Edgeworth! n. 229).

18. *B. CILIATA* (Roxb. fl. ind. 3 p. 38), fruticosa, appresso-strigosa, foliis lanceolatis acutis brevipetiolatis, floribus axillaribus solitariis geminis rarius ternis subsessilibus, bracteis linearibus strictis dentato-ciliatis, calycis laciñiis majoribus æqualibus ovato-oblongis confertim ciliato-dentatis.  $\delta$  In Indiâ orientali, ad Trawancore? (Wight!), Simla (Lady Dalhousie! in h. Arnott), Manilla (Blanco), Java (Hasskarl, Zollinger!). — Wall. cat. n. 2507 a et c, idem in h. DC. ex h. Puer., N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 92, Wight h. prorr. n. 1966, Jacquemont! in h. Mus. paris. n. 129. *B. cristata* var.  $\beta$  foliis linearibus Roth nov. sp. pl. p. 315. Barleria cristata Blanco fl. de Filipp. p. 492, Hasskarl cat. pl. hort. Bogor. alt. p. 149, Zollinger pl. jav. n. 2995. Barleria cristata? h. Wight, Wall. cat. n. 2506 g. Barleria venulosa an pilosa Wall.? h. Wight. Differt a *B. cristata* caule graciliore humiliore ramuloso fruticuloso, foliis minoribus angustioribus 3 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longis 4-5 lin. latis acutis in brevissimum petiolum desinentibus, floribus axillaribus subsessilibus vel omnino sessilibus solitariis rarius geminis ternis, calycis laciñiis majoribus æqualibus ex ovato oblongis attenuato-acutis mucronatis subinde altero bidentato, dentibus setaceis patulis confertim ciliatis, strigoso-hirtis nec

glandulosis nec coloratis, corollæ longioris magisque infundibuliformis tubo graciliore. Tota planta undique confertim lineolata setisque incumbentibus strigosa. Corolla in sicco statu pulchre cœruleo-venosa; viva (in var.  $\beta$  saltem) rosea (Edgeworth). Stamina 5, quorum 3 brevissima sterilia, scil. 2 antheris imperfectis brevibus cordatis præditis, 1 setiformi. (v. in h. Wall., Wight, DC. etc.)

$\beta$ . foliis brevioribus oblongis. — Sirhind in Himalaya 5000' alt., Septembris (Edgeworth!), ibid. (Lady Dalhousie! in h. Hook.). B. cristata h. Hamilt., Wall. cat. n. 2508 bibid. 2506 h (B. cristata h. Heyn.). B. cristata h. madr. Wall. cat. n. 2506 e in h. DC.; h. Willd. n. 11662 fol. 3 a Roxburgh miss.

$\gamma$ . foliis linearis-subfalcatis, bracteis lanceolatis calycem æquantibus. B. chegosa h. madr. Wall. cat. n. 2506 f sub B. cristata. Differt habitu singulari, foliis falcato-linearibus, bracteis lauceolatis calycis longitudine, validius dentato-ciliatis, calycis lacinia minus acutatis magis herbaceis ad apicem usque confertissime ciliatis. An species distincta? Sed specimen adest, foliis latioribus oblongis ad var.  $\beta$  accedens, bracteis etiam paulo minoribus discrepans, quo intrante varietates haec conjungi videntur. (h. Wall., Nees et Hook.)

19. B. CRISTATA (Linn. sp. pl. p. 887), herbacea, appresso-strigosa, foliis ellipticis utrinque attenuatis petiolatis, pedunculis axillaribus brevissimis paucifloris, bracteis linearis-subulatis ciliatis, calycis lacinia majoribus inæqualibus elliptico-oblongis parce ciliato-serratis.  $\mathcal{L}$  In Indie orientalis sepius et nemorosis frequens: Negapatam etc. (Wight!), Natchpur (Hamilt.! Edgeworth), Marlea in Turraya Napalensi (Wallich!), Pondichery (Bouton! in h. DC.), Ceylon (Walker! n. 1314 in h. Hook.). — Burn. fl. ind. p. 136, Willd. sp. pl. 3 p. 378, h. Willd. n. 11662, fol. 1 et 2, h. Vahl! h. Schreb.! Eysenhl. in Linn. I (1826) p. 589, Bot. mag. t. 1615, Bot. repos. 10 t. 625, Roth nov. sp. pl. p. 315, Roxb. fl. ind. 3 p. 37, Don. fl. nep. p. 119, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 92, Wight ic. 2 t. 453, Wall. cat. n. 2506 b, c, Wight h. prop. n. 1957. B. dichotoma h. Hamilt.! Wall. cat. n. 2508, c. B. prionoides hort. monspessul. in h. Benth. Melampyro cognata Madraspatensis Moris. hist. 3 p. 429 sect. 11 t. 23 f. 7. Folia supra et subtus ad costas subhirsuta. Pedunculi axillares vix longitudine petioli, cymuloso-trifidi, 3-5-flori. Flores brevissime pedicellati. Bractea ad apicem pedicelli vix 3 lin. longi  $\frac{1}{3}$  lin. lata, linearis mucronata-subulata, setulis serrulato-ciliata; bracteolaæ duæ oppositæ, similes sed minores; bracteæ et bracteolaæ patentes. Calycis laciniae majores acuminate, mucronatae, nervoso-venosæ, reticulatae, purpurascentes, margine serraturis aliquot setaceis præditæ et glanduloso-ciliatae; superior 8 lin. longa; inferior ovato-elliptica, 6 lin. longa. Corolla pollicem longa, cœrulea. Stamina duo perfecta, tria imperfecta brevissima. (v. v. et s. sp. in h. Wall., DC., paris. etc.)

$\beta$ . lactea (Desfont. in hort. par.), corollâ dimidio minore quam in formâ communâ candidâ. — In Insulâ Mauritii (Desfont. Loddiges!). B. alba Loddig. bot. cab. 4 t. 360. An distincta species? (v. in h. DC.)

20. B. NUDA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 92), herbacea, sparse strigosa, ramis elongatis, foliis oblongo-ellipticis in petiolum decurrentibus acutis supra sparse strigosis, pedunculis axillaribus trifloris brevissimis terminalibusque capitatis, bracteis linearibus ciliatis patentibus, calycis lacinia majoribus valde inæqualibus rhomboeoblongis subintegerrimis brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Sillet (Fr. de Silva!). B. dichotoma Wall. cat. n. 2508, d. B. cristata h. Roxb. Wall. cat. n. 2508 a. Differt a B. dichotomâ, Napalensi et confinibus maximeque a B. cristata calycis lacinia marginè fere nudis nec ciliatis multo neque magis inæqualibus, scil. lacinia superâ 6-7 linea longâ, inferâ 10-11 lin. longâ, utrâque venoso-nervosâ. Corolla sesquipollicaris, cœrulea, tubo an-

- gusto, limbi laciniis parum inæqualibus. Inflorescentia B. cristatae. Capsula oblonga, fusca,  $\frac{1}{2}$  poll. longa, tetrasperma. (v. in h. Wall.)
21. B. OVATA (Meyer), fruticosa, hirsuta, foliis ovato-oblongis brevissime petiolatis obtusiusculis, pedunculis axillaribus brevissimis, bracteolis lanceolato-linearibus falcatis, calycis laciniis majoribus æqualibus ovatis acuminatis spinuloso-serratis, interioribus angustis. ♂ Ad promont. Bonae Spei (Drège! in h. Hook.). B. ovata var. b Meyer ocat. pl. Drège. Caulis dense foliosus. Folia 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, poll. 1 fere lata, petiolo lineâ vix longiore. Calyces inter folia superiora latentes, hirsuti et ciliati. Corolla pollicaris, cœrulea. (v. in h. Hook.)
22. B. REPENS, caule procumbente repente, foliis subovalibus acutis basi acutâ in petiolum desinentibus supra lineolatis subtus laxè puberulis, floribus in axillis superioribus solitariis brevissime pedunculatis, bracteolis subulatis calyce multo brevioribus, calycis laciniis majoribus oblongis acutis integerimis reticulatis glabriusculis. ♀ In insulæ Pembao (Raza insulæ ad oras orientales Africæ australioris) locis humidis (Forbes! in h. Hook.). A reliquis fere omnibus differt ovaule repente. Folia cum petiolo mediocri 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 6 lin. Calyx pollicaris. Flores desunt. (v. in h. Hook.)
23. B. MEYERIANA, herbacea, caule strigoso-aspero, foliis lanceolatis acutis subsessilibus remote dentioulatis in costis et margine pubescenti-scabris ciliatis, floribus axillaribus terminalibus aggregatis sessilibus, bracteolis linearibus calyce brevioribus, calycis laciniis majoribus oblongis acuminatis pubescenti-glandulosis ex tuberculis ciliatis, interioribus angustis. ♀ In promont. Bonæ Spei (Drège! in h. Hook.). B. ciliata E. Meyer (c) in Ind. pl. Drège et in h. Hook. (nec Roxb.). Corolla fere 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa. Caulis gracilis, flavescentis. Flores summi subcapitati. Calyces 6 lin. longi. An var. B. ovata? (v. in h. Hook.)
24. B. VENTRICOSA (Hochstett. in Schimp. it. abyss. 1 n. 42, 2 n. 797, 3 n. 1903), suffruticosa, strigoso-hirsuta, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis sessilibus, floribus axillaribus subsessilibus oppositis solitariis ternis, bracteolis anguste linearibus brevibus, calycis laciniis majoribus æqualibus ovalibus obtusiusculis subrepandis herbaccis integerimis, inferiore bifidâ, faucibus corollæ inflatis staminibus alterius paris brevissimis. ♂ In monte Kubbi et Kira Abyssinia, Novembri (Schimper! Quartin Dillon! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 40 et 48). Affinis B. obtusa, 3-6-pedalis, erecta, ramosa. Caulis folia calycesque pilis erectis vestita; folia adultiora supra glabrescentia. Calyces in axillis foliorum subglomerati, valde hirti; lacinia superior 5-7-nervis. Corolla cœrulea, 9 liu. longa, tubo brevi, faucibus inflatis, limbo subbilabiato, laciniis duabus superioribus lato-ribus suborbiculatis. Antherae staminum minorum, parvæ, attamen polliniferae. (v. in h. paris. et Nees).
25. B. DECAISNIANA, caule flexuoso angulato glabro, foliis ovalibus obtuse cuspidatis obtusive in petiolum brevissimum attenuatis glabris ad costas substrosis, spicis axillaribus brevibus sursum secundis 3-5-floris laxiusculis, bracteis spathulatis obtusis calycibusque hirsutis, calycis laciniis majoribus æqualibus ovalibus obtusis venoso-11-13-nervibus reticulatis glanduloso-punctatis, superiore integrâ. ♀ In ins. Madagascar, Baie de Rigny (Richard! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 66). Proxima B. opaca, differt spicis minus denses et calyculum structurâ et nervatione. Calycis laciniæ interiores lanceolatæ, obtusæ, strigosæ, vix  $\frac{1}{2}$  breviores. Capsula oblonga, lavis, atra, 6 lin. longa, usque ad apicem bilocularis, a basi ad medium 4-sperma. (v. in h. paris. et Nees).
26. B. OPACA, herbacea, caule flexuoso angulato sparsim piloso, foliis ovalibus obtuse cuspidatis in petiolum mediocrem acute decurrentibus supra sparsim pilosulis subtus hirtis demum glabrescentibus, spicis axillaribus brevibus sursum secundis subtrifloris densis, bracteis spathulatis obtusis calycibusque hirsutis ciliatisque, calycis laciniis majoribus parum inæqualibus ovalibus obtusis venoso-5-7-nervibus margine subdenticulatis, superiore apice bifidâ, laciniis

obtusis, staminibus duobus fertilibus exsertis, duobus sterilibus brevissimis.  $\mathcal{U}$  In Guinéa (Thonning). *Justicia opaca* Vahl! en. 1 p. 138 et h., Willd.! sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 382. Affinis *B. ventricosa* Hochst., sed corolla fauces haud inflatae sunt; calyces majores, latiores. Caulis rufus, magis angulatus. Flores in axillis distincte spicati, etc. Calycis laciniae interiores lanceolato-lineares, obtusiusculæ, hirsutæ, majores 5-7-nerves, sparsim punctatæ. (v. in h. Vahl.)

27. *B. HALIMOIDES*, fruticosa, floccoso-tomentosa, candicans, foliis ovatis utrinque obtusis petiolatis crassiusculis, thyrsis axillaris supradecompositis sessilibus spiciformibus subsecundifloris, bracteis parvis lanceolato-spathulatis, bracteolis ovali-oblongis obtusis calycem includentibus, calycis lacinias æquilongis sericeis, exterioribus lanceolatis superiore bidentata, interioribus lanceolato-linearibus, floribus diandris.  $\delta$  In Africâ tropicâ occidentali (h. Hook.). Folia 9 lin. cum petiolo longa, 7-8 lin. lata, sæpe subrotunda, obtusissime, dense albo-tomentosa. Thyrsi folium æquantes vel superantes. Bracteæ trilineares. Capsula bilinearis, compressa, lævis, fusca, tetrasperma. (v. in h. Hook.)
28. *B. OBTUSA* (N. ab E. ac. afr. austr. in Linn. 15 p. 358), fruticosa, hirta, subglandulosa, foliis ovalibus obtusis basi acutis petiolatis, pedunculis axillaribus brevibus, bracteolis linearibus recurvis, calycis lacinias majoribus æqualibus oblongo-linearibus obtusis nervoso-reticulatis, interioribus brevioribus angustis linearibus, staminibus perfectis duobus.  $\delta$  In promont. Bonae Spei. Affinis *B. pilosa* et longiflora. Corolla infundibuliformis, cœrulea, venis saturatioribus. Stamina duo perfecta, tria imperfecta capitata. Variat subinde calyce alteram laciniam latiore bipartitam ad speciem quinquefido. (v. in h. Ecklon, Drège, DC. etc.)

$\alpha$ . pedunculis unifloris petiolum subæquantibus. — In dumetis montis Bothas haud procul a flumine, « der grosse Fischfluss » dicto (Albany) solo humoso e ligno destructo, Februario-Julio (Ecklon! Drège!), Doornkop (Burchell! cat. geogr. pl. afr. austr. n. 2936 in h. DC. et in h. Hook.)

$\beta$ . pedunculis trifloris aut cymoso-trifidis petiolo longioribus, caule foliisque (subinde oblongis) magis hirsutis. — Uitenhage, Martio (Ecklon! Krebs! in h. gen. berol., Drège n. 3602 a in h. Hook. et Burchell! in eod. h.). *Ruellia ovata* h. Zeyher in h. gen. berol. *B. diandra* Schlechtend.! in h. Drège, h. gen. berol.! et in h. DC. *B. Uitenhagensis* Hochst.! in h. (v. in h. Eckl., Drège, DC., berol. etc.).

$\beta^*$ . foliis majoribus plerisque acutiusculis. *B. barbata* E. Meyer in indice pl. Drège. et in h. Hook. (v. in h. Hook.)

29. *B. HOCHSTETTERI* (N. ab E. in Kotschy it. nub. n. 159 et 109 in h. Hook.), fruticosa, ramis strigiloso-tomentosis apice trichotomis, ramulis trifidis trifloris vel unifloris bibracteatis, foliis ovalibus obtusis subnucronatis strigilosis, bracteolis lanceolatis integerrimis, calycis lacinias majoribus ovalibus acutis æqualibus integerrimis glanduloso-pubescentibus, corollæ tubo mediocri.  $\delta$  In rupibus montis Arabiae Feliciae Seddi, Februario in anthesi (Schimper), in montibus Seddi et Kessi Arabiae (Fischer! in h. reg. monac.), locis præruptis rupestribus in monte Cordofano Arasch-Cool (Kotschy). *B. diandra* Hochstett. et Steud. h. Æg.-Arab. un. itin. n. 919. *Fruticulus humilis*, palmaris, pedalis, ramosissimus, rigidus, ramis oppositis patentibus pubescentia rigidulâ densâ canis. Pedunculi aut ramuli imperfecti hinc inde spinescentes. Folia in minoribus ramosissimisque  $\frac{3}{4}$  poll. longa, 5-6 lin. lata, in majoribus  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 9 lin. lata, sæpe basi acutiuscula, utrinque setis longis incumbentibus strigosa, subnervia. Rami aut ramuli florentes vel uniflori, vel trifidi, ramulis unifloris; horum medius ebracteolatus paulo brevior, laterales bracteolis binis linear-lanceolatis acutis patulus supra medium instructi, 4-6 lin. longi. Flos horizontaliter nutans (an semper?). Lacinias calycis majores 3 lin. longæ, herbaceæ, obsolete trinerves. Corolla e tubuloso subinfundibuliformis,

*semipollucaris*, *cæruleo-venulosa*. *Stamina duo*. *Capsula bracteolas æquans*, *subglobosa*, *rostro longo obtuso pubescenti-scabro*. *Specimina Arabica humilia sunt et ramosissima*, *Nubica graciliora*, *majora*, *pedunculis sæpe unifloris*. (v. in h. Hochst., Nees, monac. etc.)

30. *B. MONTANA* (h. madr.), *diandra*, *staminibus brevioribus anantheris squamiformibus*, *tota glaberrima*, *foliis oblongo-ellipticis in petiolum attenuatis margine ciliolato-scabris*, *floribus axillaribus oppositis sessilibus*, *bracteolis linearibus*, *calycis laciniis majoribus æqualibus ellipticis herbaceis*, *superiore obtusa*.  $\mathscr{U}$  *E montibus Travancore* (h. madr.!). *Jacquemont!* in h. in Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 194). — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 92. *Ruellia? montana* Wall. cat. n. 2391. *B. purpurea* Loddig. bot. cab. 4 t. 344. *Rami glabri*, *nodis distantibus*. *Folia 5-pollicaria*,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, in petiolum fere pollicarem attenuata. *Bracteolæ florum inferiorum dimidio calyce longiores*, *lineari-spathulate*; *superiorum quadruplo breviores*, *lineares*, *carinatæ*, *acutæ*. *Calyx pollucaris*, *glauber*. *Corolla fere bipollucaris*; *limbus subæqualis*, *lacinii obtusis*. *Staminum steriliū rudimenta* a *fertilibus remota*, *exigua*, *squamiformia*, *mucroulo setaceo*. *Capsula fusca*, *calycis laciniis longioribus brevior*, in inferiore parte *tetrasperma*. (v. in h. Wall.)
31. *B. INVOLUCRATA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 92. Wight h. pr. n. 1958), *subdiandra*, *herbacea*, *appresso-substrigosa*, *foliis ellipticis utrinque attenuatis*, *pedunculis axillaribus brevissimis trifloris*, *bracteolis lanceolatis integerrimis*, *calycis laciniis majoribus oblongo-lanceolatis obtusis integerrimis sericeis*, *inferiore subbifida*.  $\mathscr{U}$  In Nilgherri (Wight!) Ghaut ad fontes montanos in rupibus (Sebmidt), in montosis Purimdar, Octobri, Novembri (Perrottet!) in h. DC. *B. cærulea* Wall. cat. n. 2509 c, h. Heyn.). *B. diandra* h. Heyn. Wall. l. c. E speciosissimis generis. *Caulis 2-3-pedalis*, *erectus*. *Folia 7-8 poll. longa*,  $2\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, in petiolum  $1\frac{1}{2}$  poll. longum strigosum decurrentia, obiter repanda. *Pedunculi patentes*, *oppositi*, *1-2 lin. longi*, *triflori*. *Pedicelli 2-3 lin. longi*, *strigosi*; *intermedius ebracteatus*, *laterales tribracteati*. *Bracteæ herbaceaæ*; *infera uncialis*, *oblonga*, in petiolum attenuata, *triplinervis*, *proprie binæ*, *4 lin. longæ*, *lanceolatæ*. *Calycis laciniæ majores pollucares*, *violaceaæ*, *utrinque dense strigoso-sericeæ*; *inferior paulo brevior*, *quandoque apice bifida*. *Corolla albido-cærulea*, *2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa*; *limbi laciniæ tres inferæ obovatae*, *duae superæ obovato-oblongæ*, *paulo minores*. *Stamina minora sterilia*, *filamento brevissimo vix antherâ longiore hirto*, *antherâ reniformi vel subcordatâ*. *Capsula pollucaris*, *castanea*, *a basi ad medium tetrasperma*. (v. in h. Wight, Heyn. DC.)
32. *B. ARNOTTIANA* (N. ab E. in h. Arnott), *subdiandra*, *herbacea*, *appresso-strigosa*, *foliis ellipticis utrinque attenuatis*, *pedunculis axillaribus brevissimis tri-abortu unifloris*, *bracteolis oblongis integerrimis*, *calycis laciniis majoribus ovalibus obtusis integerrimis strigosis*, *superiore paulo minore retusâ submarginatâ*.  $\mathscr{U}$  In ins. Ceylon (Walker! in h. Arnott, Hook. et Benth.). Proxima *B. involucratæ*, sed diversa: *strigositate densiore*, *foliis ejusdem fere longitudinis at angustioribus* ( $5\frac{1}{2}$ -4 poll. longis  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. latis), *pedunculus axillaribus plerumque unifloris*, *bracteolis latioribus nec longioribus*, *calycis laciniis majoribus*  $1\frac{1}{2}$  poll. longis 6-8 lin. latis igitur ovalibus nec oblongis strigosis nequitam sericeis, altera paulo breviore. — *Corolla 2 poll. longa*, *cærulea*; *tubus brevis*, *faux longa*, *conica*; *limbi laciniæ quatuor æquales*, *obtuse*; *quinta brevior*, *etiam obtusa*. *Stamina breviora antherâ ovatâ substerili*, *loculis tamen et polline raro præditâ*. *Capsula pollucaris*, *tetrasperma*. (v. in h. Arnott, etc.)
33. *B. PENTANDRA* (Arn.), *pentandra* (?), *herbacea*, *parce appresso-strigosa*, *foliis ovato-acuminatis basi acutis*, *pedunculis axillaribus brevibus trifloris*, *bracteolis linear-lanceolatis*, *calycis laciniis majoribus lanceolato-attenuatis integerrimis strigosissimis*, *inferiore paulo minore bidentatâ*.  $\mathscr{U}$  In ins. Ceylon (h. Arnott! Macrae! in h. Hook.). *B. Macraei* h. Hook. *Martynia spec. Macrae!* n. 114 in h. Benth. *Caulis validus*, *purpureus*, *setulis adpressis*

raris strigosus, trichotomus. Folia (superiora) 4 poll. longa, infra medium  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, valde et argute acuminata, parce adpresso-strigosa, petiolo brevi hirsuti. Pedunculi hirsuti, 2-3 lin. longi, tri-abortu bi-uniflori. Bracteolæ lanceolato-lineares, patentes, hirsuto-strigose. Calycis laciniæ majores altera 14-15 lin. altera pollicem longa,  $2\frac{1}{2}$  lin. late, superior obtusiuscula, inferior minute bidentata. Corolla pollicaris, tubo brevi, faucibus amplis campanulatis. Stamina 4-5, quorum duo vel tres multo breviora, antheris completis at minoribus. (v. in h. Arnott, etc.)

? $\beta$ . caule superne patentii-hirsuto, foliis majoribus (cum petiolo) pedalibus 3-4 poll. latis ex ovali oblongis, calycibus adpresso-strigosissimis. — In ins. Ceylou (Walker! in h. Hook., specimen juvenile nondum florens).

34. B. GRANDIS (Hochst. in Schimp. it. abyssin. 2 n. 702), diandra, suffruticosa, caule pubescenti-glandulosi, foliis oblongo-ellipticis acuminatis in petiolam attenuatis glabris costâ subtus setulosâ, pedunculis axillaribus, inferioribus elongatis trifloris apice foliosis, superioribus calyce brevioribus sub-unifloris, bracteolis lanceolatis patentii-recurvis, calycis laciniis majoribus oblongis integris et integerrimis obtusis glandulos-tomentosis incanis, corollâ grandi resupinata subbilabiata. ♂ In monte Sinai prope Adoam, Decembri (Schimper!), in Abyssinâ prope Meronah (Quartier Dillon! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 47). B. grandiflora R. Br. in Salt it. abyss., opp. ed. N. ab E. I p. 249 (absque diagnosi)? Barleria involucratæ confinis, sed characteribus suis cognitu facilis. Corolla cœrulea, venis obscurioribus picta, a basi ad limbi terminum fere 3 poll. longa. (v. in h. Nees, Hochstett. et paris.)

§2. FRUTICULOSÆ.—*Sape valde ramosæ, humiliores, inermes. Flores 2-4-andri, cœrulei vel albi, axillares, pedunculis saepè trifloris, bracteis angustis. Folia saepè tomentosa vel pubescentia. Bracteæ in nonnullis rigescentes, spinoso-dentatæ, apice uti calyces spinescentes.*

35. B. PANICULATA (h. madr.), fruticosa, hirsuta glandulosaque, foliis elliptico-oblongis longissime acuminatis, pedunculis axillaribus cymoso-bi-trifidis subtrifloris, bracteolis linear-lanceolatis reflexis, calycis laciniis majoribus oblongis reticulatis inæquilibus, superiore acutâ, inferiore breviore bifidâ, interioribus linear-lanceolatis acuminatis subduplo brevioribus. ♂ In Travancore (h. madr.). — Wall. cat. n. 2407, Wight h. prop. n. 1959, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 92). Ruellia paniculata Wall. l. c. A B. tomentosâ Rothii differt: caule setis rigidis nec fasciculatis hirsuto multisque, ut in illâ, intermixtis glandulis viscido, foliis majoribus 4-5 poll. longis  $1\frac{1}{2}$  latis in longum argutissimumque acumen productis basi leniter acutis ideoque magis oblongis utrinque hirsutis, bracteolis latioribus, calyce majore 6-7 lin. longo, laciniis oblongo-cuneiformibus, superiore acutâ, inferiore breviore emarginato-bifida, lacinulis acutis, corollæ tubo breviore, limbo ampliore cœruleo neque evidenter venuloso. (v. in h. madr.)

36. B. TOMENTOSA (Roth nov. sp. pl. p. 314), fruticosa, pilis fasciculatis hirsuto-tomentosa glandulosaque, flavescens, foliis ellipticis utrinque acutis supra strigosis, pedunculis axillaribus cymoso-bitrifidis subtrifloris, bracteolis linearibus reflexis, calycis laciniis majoribus oblongo-ellipticis obtusis reticulatis, interioribus lanceolatis acutis subduplo brevioribus. ♂ Frequens in aridis apricis versus maris littora prov. Tanjore apud Negapatam (Wight! h. madr.). — Spr. syst. 2 p. 827, h. madr. Wall. cat. n. 2503, a ex parte, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 92. B. racemosa Wall. cat. n. 2503 b. B. hirsuta h. madr. Wall. cat. n. 2503 b ex parte. Similis B. longiflora, quacum mixta in h. Madr. occurrebat, differt foliis basi apiceque acutis, magis ellipticis una cum caule pilis stellatis dense hirsuto-tomentosis flavi-

santibus supra potius tomentoso-scabris lineolatis et setis appressis strigosis nec mollissime tomentosis, pedunculis longitudine petioli vel longioribus trifidis trifloris vel, abortiente ramo altero, bifloris, flore altero sessili lateralí, forsau et ramis lateralibus quandoque divisis, calycis laciñis minoribus 5 lin. longis ex oblongo ellipticis basi paulo angustatis tenerioribus pubescenti-hirtulis quinquenervi-reticulatis, corollâ minore (cœruloo-reticulata). Capsula fusca. (v. in h. Wight, madr.)

.37. B. ACUMINATA (Wight h. pr. n. 1960 ic. 2 t. 450), fruticosa, tomentosa, foliis ovatis cordatis acutis basi obtusis subtus incanis, pedunculis axillaribus cymoso-bi-trifidis subtrifloris, bracteolis lanceolato-linearibus reflexis, calycis laciñis majoribus oblongis interioribusque brevioribus lanceolatis aoutis reticulatis. ♂ In Indiâ orientali. — Wall. cat. n. 2503 c, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 93. Differt a B. longiflorâ foliis exquisite cuspidato-acutis supra strigosis vel strigoso-tomentosis, pedunculis axillaribus plerisque bifloris, flore minore; a B. tomentosâ caule dense tomentoso nec apice glanduloso, foliis basi obtusis vel etiam cordatis subtus dense tomentosis, florum limbo duplo minore. Caulis brachiatim ramosus, dense tomentosus, incanus. Folia majora 3 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata (computato petiolo angusto 9-10 lin. longo), supra strigis basi setulis brevissimis stellatis cinctis incumbentibus hirsuta, subtus tomentosa. Pedunculi petiolo breviores, plerique, abortu ramí dichotomie, biflori. Bracteolæ floris primarii lanceolato-lineares, angusta, recurvæ, calycem æquantes; secundarii breviores. Calycis laciñae tenues, membranaceæ; majores trincervato - reticulatae, elliptico-oblongæ; superior  $4\frac{1}{2}$  lin. longa, cuspidulata, inferior 5 lin. longa, acuta. Corolla  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa, cœrulea, venosa; tubus limbo cum faucibus plus duplo longior. Occurunt calyces, laciñis majoribus oblongo - linearibus apice retusis. (v. s.)

α. foliis ovatis. ♂ In collibus ad Maduram (Wight!), in hort. bot. calc. (nomine Barleria buxifoliae). B. tomentosa h. madr.! Wall. cat. n. 2503 b ex parte. B. buxifolia hort. bot. calc. Wall. cat. n. 2504 d ex parte (cum Barleria bispinosa).

β. foliis cordatis vel subcordatis. — In Travancore (h. madr.!). B. racemosa h. madr.! Wall. cat. sub n. 2503 b. Var. β a reliquis non differt nisi foliis paulo latioribus basi cordatis, floribusque in apice ramí, ob folia decrescentia confertioraque racemi speciem exhibentibus. (v. in h. Wight et Wallich.)

38. B. AUCHERIANA, fruticosa, ramosissima, caule candido-tomentoso, foliis parvis distantibus ovali-oblongis obtusis subcarnosis glabrescentibus, pedunculis axillaribus cymoso-bi-trifloris folio longioribus persistentibus subspongiosis, bracteolis spatulato-linearibus patentibus calycis laciñis majoribus ovato-lanceolatis acuminitis æquibus herbaceis pubescensibus. ♂ In collibus montis Chebek, Mascate (Aucher! in h. Moricand). Justicia? Aucher-Eloy, h. d'Orient n. 5222. Caule tomento subtilissimo densoque candido vestito foliisque parvis rarís 3-4 lin. longis crassiuseculis distinctissima. Pedunculi 6 lin. longi, delapsis floribus fructue rigidí persistunt in caule tunc saepè aphylo. Calyx  $2\frac{1}{2}$  lin. longus, subsessilis. Capsula longitudine calycis, ovata, cuspidata, compressa, pubescens. (v. in h. Moricand.)

39. B. PILOSA (h. madr. Wall. cat. n. 2502 a, b, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 93), fruticosa, ramis junioribus foliisque ovatis basi obtusis patentipilosæ, pedunculis axillaribus brevibus unifloris, bracteolis linearibus reflexis, calycis laciñis majoribus subæqualibus ovato-orbiculatis obtusis dentatis ciliatis, interioribus lincari-lanceolatis acutis duplo brevioribus. ♂ In Courtallum (h. madr.! et h. Heyn.). Fruticulus parvus, ramosus. Rami multinodes, adulti glabri, hornotini pilis patentibus vestiti. Folia exquisite ovata, cum petiolo trilinearis  $1\frac{1}{2}$  poll. longa,  $\frac{2}{3}$  poll. lata, acuta, basi obtusa, utrinque pilis confertis subtus confertioribus patulis vestita. Pedunculi alterni, vix  $1\frac{1}{2}$  lin.

longi. Bracteolæ calyce dimidio vel duplo breviores, patenti-recurvæ, aoutæ, pilosæ et ciliatæ. Calyx semipollucaris, pilosus, ciliatus; laciniaæ majores repando-dentatae, membranaceæ, reticulatae; superior paulo brevir. Corolla vix pollucaris, cœrulea; tubus incurvus; limbus tubo plus duplo brevir; laciniaæ obtusæ, obovatæ; superior brevior et paulo angustior. Stamina 4. (v. in h. madr. et Heyn.)

40. B. LONGIFLORA (Linn. suppl. p. 290), fruticosa, mollissime tomentosa, incana, foliis ovatis basi obtusis, pedunculis axillaribus brevissimis unifloris, bracteolis linearibus reflexis, calycis laciniai majoribus æqualibus ovatis obtusis reticulatis, interioribus minimis ovatis setaceo-mucronatis. ♂ In monte S.-Thomæ Malabaræ (Klein! in h. Willd.), frequens in collibus apud Vellope, Chingliput, Circars, etc. (Wight!). — Vahl symb. 1 p. 46 t. 16, Willd. sp. pl. 3 p. 379 n. 13, herb. n. 11665, h. Vahl! Roxb. fl. ind. or. 3 p. 40, Wall. cat. n. 2501, a, b, c, Wight! h. pr. n. 1961, N. ab. E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 93. Folia mollissime tomentosa nec serioea, cum petiolo semipollucari  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. longa et  $\frac{3}{4}$  poll. lata, aoutiuscula vel obtusa, rarius cuspidulato-acuta. Flores non terminales sunt (ut habet Vahl), sed axillares, solitarii, pedunculo circiter linearie. Bracteæ nulla. Bracteolæ duæ herbaceæ, tomentosæ, lineares, semipollucares, reflexæ. Calycis laciniaæ (bracteæ Vahl.) duæ majores  $\frac{1}{2}$  poll. longæ, in fructu majores, membranaceæ, nervoso-veniosæ, pulchre reticulatae, extus pubescens-tomentosæ; interiores non quatuor (ut habet Vahl), sed duæ, octuplo breviores, basi membranaceæ, reticulatae, late ovatae, in mucronem setiformem terminatae. Corolla bipollucaris, tubo longo æquale pubescens-tomentosa. Capsula semipollucaris, tetrasperma. Semina cellulis fibrosis vestita. (v. in h. Vahl, Wall., Wight etc.)

41. B. LICHTENSTEINIANA, fruticosa, procumbens, spicis sessilibus secundis, bracteis dorsalibus ovatis incumbentibus apice spinosis bracteolisque lanceolatis spinoso-dentatis, foliis ovato-oblongis spinoso-mucronatis petiolatis tomentosis, calycis laciniai exterioribus maximis late ovatis spinoso-acutatis dentatisque 9-11-nervibus hirtis. ♂ Ad Grootviers poort in prom. B. Sp. (Lichtenstein! in h. gen. berol. Burchell cat. geogr. pl. afr. austr. extatrop. n. 1652 et 2068, in h. DC.). Affinis B. pungens, differt autem foliis angustioribus ex ovato oblongis oblongis integerrimis tomentosocanis, spicis majoribus, bracteis calycibusque amplioribus. A B. longiflorâ differt foliis apice mucronatis. Capsula castanea, nitida, compresso-tetragona. (v. in h. berol. et DC.)

42. B. BURCHELLIANA, fruticosa, procumbens, caule hirto, spicis sessilibus secundis, bracteis dorsalibus ovatis incumbentibus apice spinosis calycis laciniai exterioribus congruis, foliis oblongo-lanceolatis mucronatis margine cartilagineis remote denticulatis ciliatisque, calycis laciniai exterioribus maximis ovatis spinoso-acuminatis integerrimis 8-9-nervibus hirsutis ciliatis. ♂ In prom. Bonæ Spei, ad Katrivier flumen, Martio (Burchell! n. 457, in h. Hook.). A B. Lichtensteinianâ satis differt integumento longe alio, foliis præter margins glabris obiter denticulatis, bracteis calycibusque haud dentibus longis spiniformibus prædictis sed integerrimis et dense molliterque ciliatis. Folia circiter  $2\frac{1}{2}$  poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  lin. lata, in siccis undulata et rugosula, rigida. Spicæ sursum secundæ, ovatae vel globosæ,  $1\frac{1}{2}$  poll. altæ. Corolla pollicaris, lœte cœrulea, tubo cum faucibus confluente longo subcylindrico, hinc fere hypocraterimorpha. (v. in h. Hook.)

43. B. MACROSTEGIA, fruticosa, procumbens, caule strigoso hirsuto, foliis oblongis mucronatis in petiolum brevem desinentibus subdenticulatis ciliatis utrinque scabris subpilosis, spicis crassis oppositis sessilibus sursum secundis, bracteolis obsoletis, calycis laciniai exterioribus maximis ovato-subrotundis venoso-nervosis hirsutis, superiore cuspidato-mucronata, inferiore emarginato-bidentata. ♂ In promont. Bonæ Spei ad Katrivier fluvium, Februario (Burchell! in h. Hooker.). Folia conferta, rigidula, parva, 6-8 lin.

longa, 2 lin. lata. Spicæ subglobosæ, adscendentes. Calycis lacinia superior 14 lin. longa, 11 lin. lata, 9-nervis; inferior ejusdem latitudinis, sed paulo brevior; laciniae laterales multo breviores, oblongo-lanceolatæ, dense hirsutæ. An var. B. Burchellianæ? ( v. in h. Hooker ).

44. B. IRRITANS ( N. ab E. in Linn. 15 p. 359, Ecklon pl. cap. 79. 2 ), fruticosa, coarctata, bracteis bracteolisque lanceolatis apice spinosis spinoso-dentatis, foliis caulinis ovato-oblongis spinuloso-denticulatis acuminatis apice spinosis, ramulorum ovatis mucronatis mucronato-denticulatis brevissime petiolatis glabris nitidis lineolatis, calycis lacinias exterioribus maximis oblongis spinoso-acuminatis et remote setoso-ciliatis 7-nervibus scabris. ♂ In promont. Bonæ Spei : in collibus graminosæ Adowensibus inter Sonntagsrivier et Boschesmanrivier flumina, etiam solo « Karro dicto ad Coega, transmontes Winterhoeksberge in Karro, Uitenhage, floret a Novembri in Februarium, Julio cum fructu maturo ( Ecklon ). B. pungens Thunb. fl. cap. 2 p. 458 ( ex parte ), h. Vahl! ( spec. Thunberg ). Blepharis pungens h. reg. monac.! ex hort. bot. monac. Fruticulus erectus, gracilis, inferne cortice albo glabro vestitus, superne coarctato-ramosus, ramis bifariam alternatimque strigiloso-vittatis. Folia minora quam in B. pungente, ( caulina inferiora circiter  $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$  poll. longa et ad basin 3 lin. lata, ramea breviora nec angustiora ), tenuiora, petiolo paulo evidentiore prædicta, mucronulato-denticulata nec ciliata, glabra, evidentissime lineolata, majora ramorum principalium in acumen longius spiniforme attenuata marginaque argutius spinuloso-denticulata. Bracteolæ pauciores quam in B. pungente, sæpe duæ tantum sub singulo flore. Flores gemini in pedicello brevissimo. Calycis laciniae majores pollicem longæ et infra medium 3 lin. latæ, leniter in acumen spinescens attenuatæ, nitidulae, subtus scabré, margine setis longis spinulosis patentibus distantibus ciliatae, haud evidenter reticulatæ, rigidiores, qua in B. pungente 9-10 lin. longæ et 4 lin. latæ, ovatæ, cuspidato-acuminatæ, margine setis brevioribus infirmioribus erecto-patulis ciliatae, hirtæ, evidenter reticulatæ ac tenuiores. — Descriptio B. pungentis apud Thunberg. utrique convenit, ut aptius forsan nomen hoc triviale penitus supprimeres. ( v. in h. Vahl, Ecklon, Drège, etc. )

β. calycis lacinii majoribus ex elliptico oblongis, ramis magis divaricatis et flexniosis. — In jugo deserto Karro interrupto ad flumen Rivier-zonderend prope Groenewaldts Platz, Hassaguai Kloof et in jugis inde ad flumen Brederivier procurrentibus prov. Zwellendam, Septembri cum floribus fructuque maturo ( Ecklon! ). B. pungens h. gen. berol. ex parte ( spec. a Krebsio lecta ) et E. Meyer ind. pl. Drég. ( a ). ( v. in h. Ecklon ).

45. B. PUNGENS ( Linn. suppl. p. 290 ), fruticosa, divaricata, bracteis bracteolisque lanceolatis apice spinosis spinuloso-ciliatis, foliis ovatis spinuloso-mucronatis brevissime petiolatis pilosis, calycis lacinii exterioribus maximis ovatis spinoso-acuminatis denseque ciliatis 7-nerviis hirtis. ♂ In promont. Bonæ Sp. districtu cap. : Uitenhage ( Harvey ! in h. Hooker. ), in monte Bothas juxta flumen der grosse Fischfluss dictum ( Albany ), in collibus Karro similibus inter Zwartkopsrivier et Sonntagsrivier flumina, ad prædium Pauli Mare juxta flumen Zwartkopsrivier, in jugo montium inter Coega et Zwartkopsrivier, in campis subarenosis ad flumen Zwartkopsrivier. ( Ecklon, Drège ), Hang Klipp ( Mundt ! et Maire ! in h. gen. berol. ), ad sinum Delagoa Africaustralis ( Forbes ! in h. soc. hort. lond. et in h. DC. ), in silvis primævis Krakakammæ, ad Port Elizabeth, Löwenfonteyn inter Konah et Katrivier flumina ( N. ab E. in Linn. 15 p. 358 Thunb. fl. cap. 2, p. 45 ( ex parte ). Stadtm. in h. Vahl! Ecklon h. cap. n. 560, Krebs in h. berol. ) Floret Februario et Martio, fructus maturat Julio et Augusto ( Ecklon ). Acanthus procumbens h. Willd. n. 11732 ( specimen inferius ). Crabbæ pungens Harvey ! gen. of South-Afric. plants n. 276. Corolla elongato-infundibuliformis, cœrulea, venis obscurioribus reticulata. Conf. speciem

præcedentem. Variat foliis magis minus villosis atque incanis. (v. in h. Ecklon, Vahl, etc.)

$\beta.$  *macrophylla*, foliis ovali-oblongis 2 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longis subintegerrimis. De-lagoa Bay Africæ australis (Forbes! in h. Bentham).

§ 3. PRIONITIS. — Genus *Crabbea Harvey gen. of South-African plants* (1838) p. 276 (nec *Lond. journ.*) — *Bracteæ varii modis spinescentes, in multis abortivæ meras spinas exhibentes; calyces etiam apice sæpe spinosi, lacinia amplitudine minus ac in reliquis diversis. Flores minus conspicui, axillares subsessiles, subverticillati vel solitarii. Pleræque species fruticosæ. Capsulae in multis dispermæ.*

A. *Calycis lacinia inferior haud profunde divisa.*

46. B. *LUPULINA* (Lindley in bot. reg. 18 t. 1483), fruticosa, glabra, axillis foliorum bispinosis, spicæ terminali inermi densa, foliis lanceolatis mucronatis, bracteis imbricatis suborbiculariis mucronulatis calyce majoribus, calycis subpubescens lacinia argute acuminate subequalibus, exterioribus oblongis, interioribus lanceolato-subulatis. ♂ In insulâ Mauritiî, hortensis (Bojer!) B. *macrostachya* Bojer! in h. Hooker. Dicliptera spinosa hort. Caulis striatus. Gemmæ axillares foliorum 'inferiorum' abeunt in par spinarum petiolo sæpe breviorum. Folii 4-5 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 4-6 $\frac{1}{2}$  lin. lata, basi acutâ in petiolum brevem desinentia, integerrima. Spica 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, subcylindrica, nutans? Bracteæ 7-8 lin. longæ et fere æque latæ. Calyx 5 lin. longus. Corolla lutea, pollicaris, tubo longo sursum parum incrassato; limbi lacinia 3 majores, 2 duplo minores. Stamina duo nonnihil exserta. Capsula 6 lin. longa, e basi ovata attenuata, laevis, juxta basin di- (tetra? -) sperma. In schedulâ, specimini l. c. addita, legimus nomen insula: Madag., sed chartæ inscriptum est: Mauritius. (v. in h. Hooker et Paris.)

47. B. *PRIONITIS* (Linn. sp. pl. p. 887), fruticosa, bracteis bracteolisque sterilibus spinosis extraramelis in fasciculo quadrifido, bracteolis fertilibus subulato-spinescentibus, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis glabris subtus lineolatis margine substrigilosis, floribus axillaribus verticillatis sessilibus terminalibus spicatis, calycis lacinia majoribus ovatis spinoso-cuspidatis integerrimis glabris. ♂ In Indiâ orientali; frequens in nemorosâ prov. Madras, Negapatam, in Circars, etc. (Wight! l. c.), in Tavoy (Lechenault! in h. Mus. paris. et Nees), ad Henzada (Guil. Gomez), in Courtallum (h. madr.! Wall. cat. n. 2510 a), ad Dindigul (h. Wight! Wall., d, c), Assam (Griffith! in h. Hook.), e Gungachure (h. Hamilt! Wall. l. c. f), Hurdwar (Wall. cat. l. c. g), Sillet (Wall. l. c. h); hort. bot. calc. (Wall. l. c. i). Vidi porro in h. Heyn! Wight! et in Edgeworth! (pl. culta), in freto Bouton! (h. DC. Labillardière! in h. Moricand), in insul. Ceylon (Royen in h. DC. et Schmied in h. reg. monac., Walker! n. 1409 in h. Hook.), in paludibus Bataviæ, præcipue in hortis frequentissima (Blume), in insulâ Timor h. Mus. paris.! et DC.! h. Nees n. 69), in Manillâ (Chamisso! in h. gen. berol.). — Linn. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 376, h. Willd.! n. 11659, h. Vahl! Spr. syst. 2 p. 827, Decaisne in nouv. ann. du Mus. 3 p. 388. Spanoghe in Linnaea 15 p. 329, h. timor. p. 60, Mill. dict. n. 2, Vahl symb. 1 p. 46, Burm. fl. ind. p. 135, Roxb. fl. ind. or. 3 p. 36, Blume bijdr. p. 805, Hassk. cat. h. bogor. alter, p. 149, Decaisne h. Tim. in nouv. ann. du Mus. 3 p. 388, Wall. cat. n. 2510, a, c, d, e, f, g, h, i, Wight! h. propr. n. 1962, ic. t. 452, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 93). Barreliera Prionites Blanco fl. de Flipp. p. 491. Barleria Hystrix h. vet. in h. gen. berol! et h. Vahl! Justicia appressa Forsk. descr. p. 6. Barleria foliis integerrimis, spinis lateribus Linn. fl. zeyl. p. 231, Roy, Lugdb. p. 291 n. 1. Prionitis Linn. h. cliff.

- n. 486. *Adhatoda* ad alas spinosa et florifera Burm. thes. zeyl. p. 8. *Adhatoda Malabarica* tetracantha Petiv. in act. soc. reg. lond. XX n. 244. *Eryngium Zeylanicum* luteum febrifugum. mus. zeyl. p. 43. *Planta Indica* spinosa amara antifebrilis mus. zeyl. p. 62. *Lycium Indicum*, spinis quaternis ad foliorum singulorum exortum Seb. thes. 1 p. 21 t. 13 f. 1. Par. bat. prodr. p. 349. *Coletta Veedla* Rheed. h. mal. 9 p. 77 t. 41. Caulis teres et folia utrinque lineolata, haec margine strigilosa, ceterum glabra (in juventute autem plus minus pubescens), 4-5 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, late viridia, longe petiolata. Spinæ quadrifidae ad basin ramorum exterius oppositæ, e bracteis binis, quarum altera bibracteolata, radiis æqualibus. Flores axillares subterni, sessiles; quorum duo laterales bracteæ semipollicari lanceolatæ spinoso-acuminatæ et binis bracteolis subulato-spinescentibus calyce brevioribus; intermediius ebracteatus et ebracteolatus. Calyx 6-7 lin. longus; laciniae majores æquales, ovatae, cuspidatae; mediae æque longæ lanceolato-acuminatae. Corolla lutea, 1; poll. longa, videtur bilabiata; labium superius brevius obovatum, inferius (superius conversum) quadrifidum, lacinias obovatis, binis medis paulo angustioribus. Stamina 4. Capsula ad basin di- (tetra?) sperma. (v. v. et s. in h. Wall., DC. etc.)
48. B. *FISSIFLORA* (Bojer pl. madagasc. in h. DC.!), fruticosa, glaberrima, bracteolis sterilibus axillaribus geminis spinosis oppositis divergentibus, fertilibus linearibus oppositis patentibus ciliato-serratis, floribus in racemo brevi denso bracteato oppositis, foliis ovalibus in petiolum attenuatis obtusis brevimucronatis, bracteis oblongo-cuneatis spinescenti-mucronatis, calycis lacinias majoribus oblongis subulato-cuspidatis scabris interioribus lanceolato-acuminatis, corollæ limbo quinquefido, lacinia altera (ut in B. *Prionites*) profundus sita, tubo hinc ad ejus originem usque fiso, staminibus duobus supra laciniam inferiorem e tubo eminentibus. ♂ In silvis locis aridis ad sinum Bombatok insula Madagascari (Bojer! l. c.). Frutex tripedalis, ramis deflexis procumbentibus. Folia subtus glauca. Corolla pollicaris paulo longior; limbi lacinias quatuor æquales, lanceolatae, obtusa, quinta ovalis et ea quidem cum tribus aliis basi in speciem tubi altero latere fissi conjuncta, ad cuius basin e regione rimæ quinta lacinia, figuræ et magnitudine trium superiorum, ab apice tubi brevis abit; fauces igitur rimâ hiant, ex quâ stamina prominent. *Antheræ oblongæ*. (v. in h. DC.)
49. B. *DIACANTHA* (Hochstett.! in Schimp. it. abyss. 2 n. 1008, 3 n. 1922), fruticosa, caule glabro, bracteolis sterilibus spinosis extraramulis in fasciculo bi-quadrifida brevissime stipitato, bracteolis fertilibus subulatis herbaceis, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis glabris lineolatis subtus in costis pilosulis, spicæ terminali sessili, bracteis imbricatis ovatis pungenti-mucronatis glabris calyce longioribus, calycis lacinias majoribus ovalibus obtusissimis muticis pubescens-scabris. ♂ Ad radices montium prope Adegunna Abyssinia, Aprili (Schimper!). Habitat refert B. *Prionitem*, differt imprimis bracteis duplo majoribus viridibus calyceque quam pro genere hoc brevissimo. Lacinia calycis inferior convexa, apice rotundata; superior plana; laciniae laterales oblongæ, obtusiusculæ. Capsula calyce longior. Bracteolea floris calyce breviores; steriles profunde furcatae pungentes. (v. in h. Hochstett., Nees, etc.)
50. B. *TRISPINOSA* (Vahl symb. 1 p. 46), fruticosa, caule glabro basi repente, bracteolis sterilibus extraramulis ternis quaternis spinosis divaricatis in fasciculo brevissime stipitato, bracteolis fertilibus subulatis herbaceo-chartaceis, foliis ovalibus cuspidatis in petiolum attenuatis subtus in costis pilosulis, spicæ terminali sessili, bracteis imbricatis ovalibus mucronatis calyce longioribus, calycis lacinias majoribus ovalibus oblongis subulato-cuspidatis pungentibus strigosis, corollæ lacinia superiore duplo breviore. ♂ In silvis montis Melhan et Hadié Arabie Felicis (Forskål).—Willd. sp. pl. 3 p. 376. descr. Forsk. p. 6. Folia sesquipollicaria. Differt a B. *diacanthæ* calyce longe cuspidato.
- B. *microphylla*, foliis unguiculatis obovatis, infimis muticis, bracteis obovato-spathulatis apice patulo-recurvatis, superioribus longe cuspidatis. —

In monte Maammara Arabiae Felicis (Botta! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 214). (v. in h. paris.)

?*y. hirsuta*, foliis hirsutis, cæterum ut in  $\beta$ . Cum præcedente (Botta! 1. c.). (v. in h. paris.)

51. B. HYSTRIX (Linn. mant. p. 89), fruticosa, bracteolis sterilibus extrarameis geminis rariusve quaternis spinosis divaricatis, foliis ellipticis vel elliptico-oblongis spinuloso-mucronatis ad costas strigosis hirsutissimis, floribus axillariis sessilibus ternis superioribus spicatis, bracteis nervoso-striatis strigilosis, bracteolis propriis subulato-spinescentibus calycisque laciniis majoribus oblongo-lanceolatis acuminato-spinescentibus strigiloso-hirtis. ♂ In India orientali : in collibus Segaeñsibus alibiique secus flumen Irawaddi in Promontoribus (Wall!), Pondichery Bouton! in h. DC. Willd. sp. pl. 3. 1 p. 376, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 93). — *Hystrix frutex* Rumph. amb. 7 p. 22 t. 15. *Melampyro cognata* Madraspatana spinis horrida Pluck. alm. p. 243 t. 119 f. 5. Frutex incomitus, ramis flexuosis rigidis fuscis glabriusculis, senio incanis, novellis præsertim circa genicula strigosis. Folia in var.  $\alpha$  2 poll. longa, 1 poll. lata, in var.  $\beta$   $\frac{3}{4}$  poll. longa, elliptico-oblonga. In inferiore parte ramorum spineæ geminæ, axillares, sessiles vel stipitatae, circiter  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  poll. longæ, divaricatae, subulatae, albæ, mucrone rufo, e quorum angulo cum ramo ramulus oritur. Sequuntur superiora versus spineæ ejusmodi, axillis vel triforis floribus sessilibus, vel bifloris interjecto ramulo. Ubi flores hoc loco abortiunt, spineæ intrant stipitatæ tri-quadrifidae, interioribus ramis minoribus, dein, in var.  $\beta$  præsertim, oritur spica terminalis inermis. Flores laterales, bracteæ communi, majore subulata trinervi binisque bracteolis minoribus similibus spineœcūtibus strigoso-ciliatis suffulti; in spicâ terminali (var.  $\beta$ ) flores singuli bracteæ communi spatulata suffulti sunt. Calyx rigidus,  $1\frac{1}{4}$  lin. longus. Corolla purpurascens  $\frac{3}{4}$  pollicis longa, lacinia superiore breviori, obovatâ, inferiori, quadrifida, lacinias obovatis mediis paulo angustioribus. Stamina 4, minora brevissima, antheris parvis cordatis. Capsula disperma, apice conico-acuminata. (v. in h. Wall., Wight et DC.)

$\alpha$ . *rotundifolia*, foliis magis glabris elliptico-subrotundis, floribus plerisque axillaribus.

$\beta$ . *oblongifolia*, foliis angustioribus magis hirsutis, floribus summis in spicam terminalem dispositis. — (In h. Roxb.); in insulâ Timor, in collibus siccis prope Adoam Arabiae (Schimper! et Gaudichaud! in h. DC.) B. Prioritis h. Russell! Wall. cat. n. 2510 b. B. *bispinosa* Hochstett.! in Schimper t. abyss. n. 208.

52. B. CUSPIDATA (h. madr.), fruticosa, bracteis bracteolisque spinosis fasciculatis, foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis spinoso-mucronatis substrigosis, floribus axillariis subsolitariis, calycis lacinia oblongo-lanceolatis integerimis spinoso-acuminatis. ♂ In aridis India orientalis, prope Tanschaur (Linn.), in collibus prov. Maduræ, Dindigul, etc. (Wight!), in campis ad Malapalam Nilgherry, Martio (Schmidt!). — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 93, Wall. cat. n. 2499, a b c Wight h. propr. n. 1963, ic. 2 t. 451. Barleria noctiflora h. Heyn. (ex parte), Wall. cat. n. 2496 c. Fruticulus spinis sæpe quam maxime horrens, incomitus, ramis teneris dissidente strigosis. Folia  $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa,  $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$  lin. lata, brevissime petiolata, alia fere glabra, alia, præsertim subtus in costâ nervisque et in margine setulis incumbentibus conspersa. Bractea  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longæ; bracteola breves setiformes, hinc pro abortu vario florum aliquot vel cunctorum fasciculi singuli spineæ axillares fasciculatae, 2-4 majores, adjectis vel deficientibus ad singularium basin binis brevioribus nunc omnino nudæ, nunc uno altero flore, quandoque et foliis parvis interjectis. Calyx 5 lin. longus, coriaceo-chartaceus glaber. Corolla sesquipolliecaris, pallide cœrulea, limbo oblique quinquefolia, lacinias obovatis, duabus inferioribus paulo minoribus. Capsula disperma. (v. in h. Wallich, etc.)

53. B. NOCTIFLORA (Linn. suppl. p. 290), fruticosa, bracteolis spinosis prope

basin ramosis axillaribus geminis, foliis obovato-oblongis spinoso-mucronatis strigoso-hirtis glabrescentibus, floribus axillaribus sessilibus solitariis, calycis laciniis majoribus ovatis reticulatis amplis inaequalibus, superiore majore spinoso-ciliata amplectente inferiore integerrimam vel deuticulatam ciliata-tamque. ♂ In Indiâ orientali: Tjanjore, Augusto (Klein! in h. Willd.), Vendavor (Wight in Wall. cat. l. c.), Courtallum et Ceylon (h. madr.!), Nilgherry (Schmidt!). — Vahl symb. I p. 46, Willd. sp. pl. 3 p. 377, h. Willd.! n. 11661 Wall. cat. n. 2496 b (h. madr.!) c (h. Heyn! ex parte), d (ex h. Wight), Wight! h. propr. n. 1964, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 93. B. cristata Lam. enc. meth. 1 p. 380 (excl. syn.). B. Mysurensis Roth nov. pl. sp. p. 313 n. 2. B. ramosa Hamilt. obs. B. ruellioides Rottl.! in h. Vahl. Justicia lanceolata Forsk. descr. p. 6. In axillis inferioribus abortivae flore ramifications intrat pedicellis brevissimi, et tum quidem spinas folio uno altero ecedente quasi proliferæ prodeunt. Folia 9 lin. cum petiolo longa et proxime ab apice tres lin. lata. (v. in h. Wall., Wight, Vahl).

54. B. ACANTHOIDES (Vahl ! symb. 1 p. 47 et h. Willd. sp. pl. 3 p. 378), fruticosa, dense pubescens, bracteolis geminis spinosis margine herbaceo-alatis et basin versus spinoso-pinnatipartitis, foliis obovato-oblongis mucronatis in petiolum attenuatis, floribus axillaribus subspicatis sursum secundis, calycis laciniis majoribus ovatis reticulatis amplis aequalibus spinoso-mucronatis margine spinuloso ciliatis nudis. ♂ In Arabiâ Felici (Forskal, Vahl), in regione superiore montis Seddr. Arabiæ, ineunte Martio (Fischer! in h. reg. monac. et in h. Hook. n. 113; ad pagum Harames, Martio (Schimper!), in regione fluvii Tacaze Abyssiniæ (Schimper!), Ægypto superiore et Kordofan (Kotschy! in h. Hook.). B. noctiflora Hochstett. in Schimp. it. abyss. un. itin. 2 n. 745 et 3 n. 1856. Ab affinibus, praesertim B. noctifloræ et candida differt tum spinis pinnatipartitis in juventute herbaceis estate margine alato lacero deraso angustioribus. Folia unguicularia, pubescenti-mollia. Flores subinde solitarii, frequentius 3-4 in brevi pedunculo racemoso-spicati, bracteolis subulatis spinuloso-ciliatis deorsum spectantibus. Calyx fere B. noctifloræ. (v. in h. Vahl, Hochstett., etc.)

55. B. TRIACANTHA (Hochstett.! in Schimp. it. abyss. 2 n. 1004), fruticosa, pubescenti-cana, bracteolis spinosis prope a basi bidentatis axillaribus geminis, foliis obovatis spinoso-mucronatis ciliatis, floribus axillaribus sessilibus solitariis, calycis laciniis majoribus ovato-oblongis acuminatis subæqualibus reticulatis basin versus spinoso-ciliatis. ♂ In collibus siccis prope Adeganna Abyssiniæ, Aprili (Schimper!). Simillima B. noctifloræ, differt caule foliisque pube subtilissimâ brevissimâ molli vestitis, foliis latioribus molliter ciliatis. (v. in h. uu. itin.)

56. B. CANDIDA, fruticosa, tota candido - tomentosa, ramosissima, ramulis brevibus, bracteolis axillaribus geminis divergentibus in medio utrinque sub-unidentatis unifloris, foliis parvis subtropidis in petiolum brevem contractis mucronulatis, calycis spinam æquantis laciniis majoribus oblongo-ovalibus spinoso-acuminatis margine nudis reticulatis pubescenti-scabris. ♂ In aridi regni Mascate (Aucher Eloy! h. d'Orient n. 5223 in h. Moricand et Hook.). Folia cum petiolo 2-3 lin. longa, crassiuscula, utrinque candido-tomentosa. Calyx 6 lin. longus. (v. in h. Moricand et Hook.)

57. B. SPINICYMA, fruticosa, caule pubescenti-canæ, foliis ovalibus petiolatis utrinque acutis submucronulatis supra dense lineolatis glabriusculis subtus praesertim in costis pubescentibus, cymis axillaribus folio brevioribus dimidiatis secundis, bracteis spinosis rigidis canaliculatis patentibus, floribus sub-sessilibus, bracteolis nullis calycis laciniis subæqualibus pubescentibus integrerimis herbaceis, majoribus oblongis acutiusculis, interioribus oblongo-linearibus obtusis. ♂ In monte Maammaro Arabiæ Felicis (Botta! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 202. Folia cum petiolo 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 8 lin. lata, opaca. Cymæ rigidæ, opposita, albidæ, helicoideæ, scil. flos interme-

dius perfectus est, sub quo bractæ duæ ramorum cymæ spiniformes existunt. Ramus alter deest, alter sæpè perficitur similique modo idem et alterâ vice cum flore intermedio bracteis que binis spinosis procurrat. Ubi primâ origine ramus alter perit, flos singulus in angulo radiorum spiniformium sedet. Corolla biplicaris fere, cœrulea, alterâ laciniâ minore. Stamina fertilia duo; sterilia duo capitata. An hæc vera Barleria bispinosa Vahl? Vix dubitarem, nisi cymæ « folio longiore » ab auctore perhiberentur. (v. in h. paris.)

58. B. STIMULANS (E. Mey. in cat. pl. Drèg. a. 1837), fruticosa, canescens-laxe strigilosa, bracteolis axillaribus geminis spinosis oppositis divergentibus canaliculatis spinoso-subdenticulatis unifloris, foliis elliptico-oblongis basi acutis spinoso-mucronatis, calycis spinâ brevioris laciniis conformibus spinoso-acuminatis scabris. ♂ In promont. Bon. Sp. Differt a B. buxifolia spinis canaliculatis sæpe in margine denticulatis minus patentibus, tum vero et calycis formâ et tubo corollæ longiore in fauces transeunte et cum iisdem 8-9 lin. longo. (v. in h. Dreg.).

α. micracantha, foliis spinisque minoribus, calycibus in medio spinuloso-serratis. — In Africâ australi (Drège). Var. α Meyer l. c.

β. macracantha, foliis spinisque majoribus (his 8 lin. longis folia æquantibus), calycis laciniis exterioribus oblongis subovalibusve subintegerimis. — In Africâ australi (Drège!), ad Gamka fluvium, Maio (Burchell! in h. Hook.) Var. β Meyer l. c.

59. B. BUXIFOLIA (Linn. sp. pl. p. 887), fruticosa, patenti-hirsuta, bracteolis axillaribus geminis spinosis oppositis divaricatis alternis unifloris alternis sterilibus, foliis ellipticis basi acutis suborbiculatis spinoso-mucronatis, calycis spinâ brevioris laciniis subconformibus strigosis ciliatis. ♂ In Indiâ orientali (Linn.), in montibus Courtallum (Wight!). — Willd. sp. pl. 3 p. 377, h. Vahl! Spr. syst. 2 p. 827, Burm. fl. ind. p. 136? Hassk. cat. h. bogor. alter p. 249, Roth nov. pl. sp. p. 313, Roxb. fl. ind. 3 p. 37, Wall. cat. n. 2504 a (ex parte), b, c, d (ex parte), Wight! h. propr. n. 1965, N. ab. E. in Wall. pl. as. var. 3 p. 94. Fruticulus ramosus, pubescens brevi setisque longis patentibus vestitus, cortice fusco; ramuli novelli pubescenti-glandulosi. Folia sæpe apicem versus denticulata, caulinæ pollicem longa, 5 lin. lata, in petiolam 3 lin. longum acute decurrentia; ramea 4-5 lin. longa, brevissime petiolata, supra glanduloso-punctata et strigosa, subitus et in margine pubescens et setis longioribus mixtis hirsuta atque ciliata. Bracteolæ inferiores omnes steriles, spinosæ,  $\frac{1}{2}$  poll. longæ, horizontaliter patentes, albæ, superiores alternatim florem unum ferentes, opposito pari sterili, ubi ramulus exterior gignitur. Calyx in centro spinarum bracteolarum subsessilis, 3 lin. longus. Corolla pollicaris, cœrulea? tubus longus, superne parum incrassatus, limbus subæqualis, laciniis obovatis, superiore paulo profundius discretâ. Stamina majora fertilia, minora sæpè abortiva, exiguo capitulo coronata. (v. in h. Wallich, Wight, DC. etc.)

α. laciniâ calycis inferiore obtusa emarginatâve. B. obovata Hamilt. obs. B. cristata var. β Lam. enc. méth. 1 p. 380. Caraschulli Rheed. h. mal. 2 p. 91 t. 47.

β. laciniâ utrâque mucronulatâ apiceque spinuloso-serratâ. — In agris ad Metapalum et Coimbatur in Nilgherry, Augusto (Schmidt!), copiosa circa Segoor Basis in Neelgherrics montibus, Augusto (Perrottet! in h. DC.), in insulâ Ceylon (Forsyth! in eod. h.). Minor est, 1½-2-pedalis, magis hirsuta; differt imprimis calycis laciniâ majore, inferiore etiam mucronata, nec obtusa aut emarginata, utrâque ambitu spinuloso-dentatula. Flores rosei, pulcherrimi (Perrottet). (v. in h. DC.)

β\* rotundifolia, foliis suborbiculatis plerisque basi obtusissimis. — Neelgherries (Perrottet! in h. Mus. paris. et Nees n. 123). (v. in h. paris. et Nees).

60. B. BISPINOSA (Vahl symb. 1 p. 46), fruticosa, bracteolis spinosis axillari-

bus geminis divaricatis simplicibus nūfloris , foliis obovatis spinoso-mucronulatis strigoso-hirtis , floribus sessilibus , calycis spinas æquantes laciniis majoribus æqualibus ellipticis mucronulatis ciliatis strigoso-hirsutissimis . ♂ In India orientalis montibus Courtallum ( Wight ! ) — Willd. sp. pl. 3 p. 377 , N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 94 , Wight h. prop. n. 1966. *Justicia bispinosa* Forsk. descr. p. 6. B. noctiflora proxime affinis , differt autem : spinis bracteolaribus simplicibus , B. buxifolia similitudine , calycisque laciniis majoribus non membranaceis reticulatis iuæqualibus alterâ alteram amplectente eâque solâ ciliata , sed æqualibus planis 7 lin. longis herbaceis fere , nervosovenosis densâ hirsutie appressâ tectis margine obiter denticulatis et nonnihil ciliatis , superiore mucronulo exiguo prædictâ , inferiore ( in nostris ) emarginatâ . Calycis foliola interiora exigua , trianguli-acuminata , carinata . Capsula a basi ad medium tetrasperma , parte superiori non rostrato-acutatâ et commissurâ clausâ , sed biloculari . ( v. in h. Wallich ).

β. calycibus solito majoribus ( 9-10 lin. longis et prope basin 7-8 lin. latis ).  
In ins. Ceylon ( h. Arnott ! )

61. B. SPINA CEYLANICA , fruticosa , bracteolis spinosis axillaribus geminis divaricatis simplicibus unifloris , foliis obovatis spinoso-mucronatis supra glabriusculis subtus strigoso-hirtis , floribus sessilibus , calycis laciniis majoribus spinas æquantes ovatis mucronatis dentato-ciliatis hirsutis cum fructu increscentibus reticulatis . ♂ In ins. Ceylon ( h. Hooker ! ) B. bispinosa h. Hooker . A B. bispinosa differt imprimis calycis laciniis majoribus in ambitu non integerimis et pilis mollier ciliatis , sed dentibus longis setaceis cinctis , latioribus ætate grandescensibus et magis ovatis nitidisque . Spinae juniores in utrâque pubescente . ( v. in h. Hooker ).

62. B. RIGIDA ( h. Willd. ! n. 11660 ), caule fruticuloso , foliis lanceolatis calloso-marginatis undulato-sinuatibus , floribus axillaribus alternis sessilibus , bracteolis geminis validis subulato-spinosis canaliculatis basi spinuloso-dentatis suprioribus folio longioribus , calycis laciniis exterioribus oblongis spinoso-acuminatis spinuloso-dentatis glabris . ♂ In Africâ australi extratropica ( Hoffmannsegg ! in h. Willd. ), Grootvivers Poort in prom. B. Sp. ( Lichtenstein ! in h. gen. berol. , Burchell ! cat. pl. afric. austr. u. 1991 in h. DC. Fruticulus humilis , caule foliisque pubescenti-scabriusculis . Folia 6 lin. longa , margine eleganter undulata . Bracteoleæ divergentes , rigidæ , 8-12 lin. longæ , glaucescentes . Calyces ( fructiferi ) folio paulo longiores , rigidæ , laciniis majoribus 7-nervibus glaucescentibus . B. irritant affinis . ( v. in h. DC. et Willd. )

B. Calycis lacinia inferior ad basin fere bipartita . Corolla angusta , tubo longo . Stamina 4 perfecta tubi apici inserta , filamentis brevibus . — Species Americana , pedunculis axillaribus brevissimis bi-trifloris , bracteolis spinosis , foliis glabris dentatis .

63. B. SOLANIFOLIA ( Linn. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 376 ), fruticosa , bracteolis sterilibus extraramis geminis spinosis spinis patentibus subrecurvis , foliis ovalibus oblongis angulato-dentatis integrise glabris , floribus axillaribus subsessilibus ternis , bracteolis propriis lanceolatis subulato-subspinescentibus , calycis laciniis majoribus lanceolatis apice subulatis subhirtis , inferiore bipartitâ , staminibus perfectis quatuor brevissimis . ♂ In America australi ( Pluquier ), in insula S. Domingo ( Bertero ! in h. DC. ) Folia basi cuneata , plerique angulis sive dentibus utrinque duobus tribusve , apice vel acuta vel obtusa ; ramea pollicaria ; ramulorum floralium brevissimorum duplo minora subintegerrima . Corolla pallide rosea , tubo angusto filiformi , 4-4½ lin. longo , limbo usque ad tubum fere diviso , laciniis obovatis basi cuneatis subæqualibus . Capsula 3 lin. longa , mucronata , compresso tetragona , tenuior , basi tetrasperma . Semina compressa , sericeo-fimbriata .

α. foliis majoribus oblongis acutis utrinque acute et grosse tridentatis basi longe cuneatis . — Hujus loci synn. Linn. et Mill. prætereaque et B.

*Hystrix* Lam.! in h. Vahl. *Justicia Hystrix* Lam.! in h. Vahl! ( v. in h. Vahl et DC. )

β. caule humiliore, foliis ovalibus vel ovali-subrotundis minoribus obtusis obscurius angulatis vel omnino integerimis. — In Americâ australi ( Miller ), Tabureto Culajabas et in valle confragosâ Trinidad insulæ Cubæ inter saxa juxta ripam fluvii, Aprili ( Otto ! in h. gen. berol. ), ad Havannam ( Ramon de la Sagra ! n. 437 in h. DC. ). Plum. ic. t. 43 f. 2. *Ætheilema rigidum* Bartl.! in hort. bot. götting. ( v. v. c. et s. sp. in h. DC. )

*Species incertæ sedis.*

64. B. *MULTIFLORA* ( Hassk. cat. h. bogor. alter p. 149 ) . foliis oblongo- vel elliptico-lanceolatis acuminatis basi longiter attenuatis, pedunculis axillaribus binis dichotomis abbreviatis foliosis et bracteolatis multifloris, foliis floralibus ovatis aut obovatis, bracteolis pluribus linearibus ciliatis apice spinulosis, calycis lacinia superiore majore una cum inferiore acuminata oblongo-lanceolata serrato-ciliata, corollâ magnâ candidâ. — In Java ? Suffrutex rhizocarpicns.
65. B. *FROCUMBENS* ( Lour. fl. cochinch. ed. Willd. 2 p. 458 ), inermis, foliis lanceolatis crenatis hispidis, capitulis terminalibus.  $\frac{1}{2}$  In incultis prope Cantonem Sinarum ( Loureiro ). « Caulis multiplex, tortuosus, hispidus. Flos luteus, capitulis terminalibus, bracteis acuminatis ciliatis. Calycis laciniae 4, subulate, pilosæ. Stamina 2, valde minora. Capsula oblonga, angulata, 2-locularis, 2-sperma. Semina orbiculata. »
66. B. ( *BARRELIERA* ) *MONOSTACHYNA* ( Bojer in Hooker journ. of bot. I p. 356 ). Flores flavi in spicâ densâ dispositi, tecti ex parte bracteis coloratis. Folia nitide viridia, nervis rubris.  $\frac{1}{2}$  In Madagascar provinciâ Saccalaves et exinde introducta in hortos insulæ Madagascar ( Bojer l. c. ). — An eadem ac B. *Iulpina* n. 46 ?

*Species non nisi nomine nota.*

- B. *ALBA* hort. apud Steud. nomencl. p. 187, excl. syn. B. *lactea* Desf. quæ B. *cristata*.
- B. *BREVISPINA* R. Br. in Salt abyss. p. LXII-LXV.
- B. *ERANTHEMOIDES* R. Br. ibid.
- B. *MOLLIS* R. Br. ibid.
- B. *PARVIFLORA* R. Br. ibid.
- B. *NITIDA* Jacq. apud Steud. nom. p. 187 ( non Jacquini, professoris vindobonensis, sed hortulanus ).
- B. *RUBRA* Hamilt. apud Steud.
- B. *SPICATA* Roxb.  $\frac{1}{2}$  Ind. or. apud Steud. nomencl. p. 188.

*Species exclusa.*

- B. *ANOMALA* Spr. = *Bravaisia floribunda* DC.
- B. *AXILLARIS* Steud. = *Lepidagathis pungens*.
- B. *COCCINEA* Linn. = *Arrhostoxylum coccineum*.
- B. *GLANDULOSA* Hochst. = *Lepidagathis glandulosa*.
- B. *HIRSUTA* Jacq. obs. 2 p. 9 t. 32 quoad iconem dubia semper manebit species, scil. Thrysacantho nitido similis habitu sed stipulis Gonzalce. Descriptio l. c. ad Thrysacanthum bracteolatum respicit. An hujusc var. *hirsuta* ?
- B. *? PUNGENS* Wall. = *Lepidagathis pungens*.
- B. *PYRAMIDALIS* Lam. = *Blechum Brownei*.
- B. *SOLANI FOLIO* etc. Plum. = *Arrhostoxylum coccineum*.
- B. *SPINOSA* Wall. = *Lepidagathis spinosa*.
- B. *TRINERVIS* h. Hamilt. = *Lepidagathis trinervis*.

**LX. LOPHOSTACHYS** Pohl pl. bras. 2 p. 93 t. 161-163 N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 94, in Lindl. introd. ed. 2 p. 285 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 66. Endl. gen. p. 702 Meisn. gen. p. 295 (204).

Calyx profunde quadripartitus, laciniis superâ et inferâ latioribus, hac sâpe plus minus profunde bifidâ, lateralibus angustioribus brevioribus que. Corolla tubulosa, bilabiata, labio supero obtuso retusoque vel bidentato, inferiore trifido. Stamina quatuor didynama, exserta; in una specie duo tantum. Antheræ oblongæ, basi sagittatæ, biloculares, loculis parallelis subæqualibus muticis, connectivo angusto raro latiusculo discretis. Stigma obliquum, ovatum, transversim emarginatum (bifidum?), in una specie acutum. Capsula chartacea, firma, ad basin usque bilocularis, inferiora versus tetrasperma. Semina retinaculis subtensa. — Suffrutes Brasilienses, foliis oppositis petiolatis. Spicae circa apices caulinis aggregatae, secundæ, compressæ, bracteis dorsalibus distiche incumbentibus sterilibus obliquis minoribus, bracteis florigeris majoribus, bracteolis sâpe coloratis conformibus subæqualibus calyce (sâpe colorato) pallidiore brevioribus. — Bracteæ et calycis laciniæ inæquilateræ, altero latere sâpe tri-altero binervi, hinc 6-nerves; calycis lacinia inferior 6-nervis, nervo medio nullo. Corolla puberula, purpureæ vel pallidæ. — A Barleria hoc genus differt corollâ distincte bilabiata et fructu apice haud attenuato imâ tautum basi seminifero.

1. **L. VILLOSA** (Pobl pl. bras. 2 p. 94 t. 161), caule erecto, foliis brevissime petiolatis ovalibus acutis pilosiusculis subtus villosis, spicâ terminali sessili recurvâ, bracteis dorsalibus lanceolatis villosis. ♂ In Montosis locis herbidis: Pras do Serra prope S. José de Tocantins, capitaniæ Goyaz, Junio, Julio (Pohl! in h. imp. vindob.). — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 67. Folia basi obtusa, pollicaria. Bracteæ dorsales virides, subfalcatae. Calyx acuminatus, apice purpurei. Corolla alba, distincte bilabiata. A reliquis facile distinguitur foliis parvis et villositate. (v. in h. vindob.)

2. **L. SESSILIFOLIA** (Pohl pl. bras. 2 p. 96 t. 163), foliis busi cuneatâ sessilibus oblongo-ovalibus obtusis supra confertim lineolatis glabris, spicâ terminali subsimplici, bracteis ovatis acutis basi subcordatis nervosis pubescentibus. ♀ In Brasiliâ, locis herbidis circa Villa Boa, metropolini capitaniæ Goyaz, Aprili (Pobl! in h. imp. vindob. n. 5006, Gardner! n. 3948 in h. Bentham et Hooker), ad Chapada (h. imp. petrop. n. 31), in graminosis siccis umbrosis prope Cuyaba, Martio (Riedel! in b. acad. petrop. n. 27, 31 et 876. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. 7 p. 67). Caulis 1-2 ped. altus. Folia in inferiore caulis parte conferta, in superiori parte rara, angustiora. Spica terminalis simplex basi alterâ minore acuta. Flores rubri vel carnei. Bracteæ purpureæ, quinque-septem-nerves, nervis validis. (v. in h. vindob., monac., petrop. etc.)

3. **L. FLORIBUNDA** (Pohl pl. bras. 2 p. 95 t. 162), subtiliter pubescens, caule erecto, foliis ovali-oblongis acutis basi attenuatis, inferioribus in petiolum longum decurrentibus summis breviter petiolatis, spicis axillaribus oppositis terminalibusque aggregatis, bracteis dorsalibus ovato-falcatis acutis ciliatis, calycis laciniis majoribus ovatis inæqualibus. ♂ In Brasiliâ: locis herbidis prope S. Felis non procul a Correio circa Aldea Carretão de Pedro terceiro et Arragal Pillar capitaniæ Goyaz, Junio et Julio (Pohl! in h. vindob. n. 1952 et 1653), prope Villa Franca, Junio (Lund! in h. DC.), in silvis inter Batataes et Villa Franca, Junio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 2295). N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 67. Bracteæ dorsales herbaceæ, virides, florales et calyces purpurea. Differt a L. falcata caule minus ramoso et bracteis dorsalibus latioribus. (v. in h. vindob., DC. etc.)

4. **L. FALCATA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 67), caule erecto paniculato apicem versus puberulo, foliis inferioribus ovalibus in petiolum lon-

gum decurrentibus, superioribus oblongis in petiolum brevem attenuatis, omnibus acuminatis supra confertim lineolatis opacis subtus hirtis, spicis in ramis cauleque terminalibus solitariis aggregatis, bracteis dorsalibus lanceolatis falcati patentí-recurvis herbaceis glabris puberulisve, calycis lacinii bracteis majoribus ciliatis, superiore ovato-oblongâ acuminatâ, inferiore breviore obovatâ bifidâ lacinii forcipatis.  $\mathcal{L}$ ? In Brasiliâ ( Pohl ! in h. imp. vindob. absque numero locique natalis acutiorc indicio ), in prov. Goyaz ( Gardner ! n. 3950 in h. Moricand et Benth., n. 3416, 3950 et 3953 in h. Hooker et Nees). Caulis ramosus , vel firmus vel laxus, ramis oppositis, altero breviore , altero longiore iterumque ramoso, omnibus ramulisque apice spicigeris. Folia inferiora  $4\frac{1}{2}$  poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. fere lata, superiora  $2\frac{1}{2}$  poll. longa,  $\frac{3}{4}$  poll. vix lata, repanda. Spicæ sessiles,  $2\frac{1}{2}$  poll. longæ, vel dense, vel (in plantis debilioribus diffusissime) laxiusculæ, propter bracteas dorsales reflexas squarroæ; haec bracteæ 6-7 lin. longæ, acuminatæ, sessiles. Bracteæ fertiles duplo breviore, etiam falcateæ, roseæ (vel luteæ?). Calyx præter margines (subinde totus) glaber, membranaceus, venosus, roseus ? ; lacinia superior 8 lin. longa, inferior 6 lin. longa, hujusque lacinia acutissimæ forcipatim sibi invicem incumbentes. Corolla  $\frac{1}{4}$  poll. longa, purpurea. Variat spicis densioribus et laxioribus. ( v. in h. vindob., Moricand, Bentham et Hooker ).

5. L. LAXIFOLIA ( N. ab E. in h. Beyrich et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 68 ), caule erecto, foliis longe petiolatis oblongis utrinque attenuatis cauleque glabris, spicis axillaribus oppositis terminalibusque breviter pedunculatis, bracteis dorsalibus oblongo-lanceolatis a medio longe acuminatis pilosis ciliatisque, calycis lacinii majoribus oblongis æqualibus.  $\mathcal{L}$ ? In Brasiliâ : in silvis umbrosis Serra dos Orgãos , prope Semidório ( Beyrich ) et ad Mandioccama in Serrâ dos Orgãos, Martio-Augusto ( Riedel ! in h. acad. petrop. ), Engenho da Cebola, Augusto ( Sellow ! in h. reg. berol. ). L. floribunda Pohl propinqua, differt foliis confertis longioribus angustioribus in petiolum fere pollicarem cuneatim attenuatis pendulis acuminatis glabris subtus ad costas vix scabriusculis, bracteis calycis lacinii majoribus plus duplo brevioribus ( nec  $\frac{1}{3}$  tantum ) lanceolatis totâ superficie exteriore hirtis ( nec glabris ), calycis lacinis majoribus oblongis cuspidatis æqualibus nec ovatis inæqualibus, corollâ albâ ad fauces rubro-violacea ( Riedel ). Caulis basi repens. ( v. in h. Beyrich, berol., petrop. etc. )

6. L. PATULA Mart. ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 68 ), caule erecto patentí-ramoso, foliis oblongo-ovalibus utrinque attenuatis in petiolum longum decurrentibus glabris, spicis axillaribus oppositis terminalibusque aggregatis brevissime pedunculatis, bracteis dorsalibus ex ovali oblongis cuspidatis pubescentibus ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ : in silvis ad Villam do Príncipe et Tapanhocango provinciae Minarum Generalium , Maio ( Martius ! ), Serra da Viura ( Pohl ! in h. imp. vindob. n. 6030 ), Serra da Badalha ( Sellow ! in h. gen. berol. n. 208 ), in humidis umbrosis ad S. Geraldo, Julio ( Riedel ! in h. acad. petrop. n. 8 et 363 ). Differt L. laxifolia bracteis dorsalibus non a medio leniter acuminatis, sed trans medium denique leniarcu in cuspidem acutam procurrentibus ; a L. floribunda spicis ad apicem caulis 3-7 confertis subinde nullis axillaribus inferius subiectis rarius tamen et alii axillaribus simplicibus compositivis iisque etiam breviter pedunculatis, tum caule subdiffuso. Folia 6 poll. longa, 2 poll. lata, repanda. Spicæ ovales, compactæ, pubescenti-hirtæ. Bracteæ et calycos rubri, ciliato-pilosos. Bracteæ fertiles et bracteolas lanceolate, acuminatæ. Calycis lacinia majores hirsutulae, ovales, acuminatæ, inferior bifida. Corolla pollice longior, rubro-violacea. An varietas L. laxifolia ? ( v. in h. monac., vindob., berol. et petrop. )

7. L. MONTANA Mart. ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 68 ) caule erecto ramoso acute quadriquetro subhirsuto, foliis ovalibus obtusis cum mucronulo basi cuneatâ angustâ sessilibus hirsutis, spicâ terminali solitaria geminâ sessili, bracteis dorsalibus oblongis mucronulatis coloratis pubescentibus ciliatisque.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ : in monte alto Serra da Mendaña, Serro Frio ,

provinciae Minarum Generalium, Maio (Martius!), Fruticulus rigidus, inferne glabrescens. Spica bipollicaris, adjectū et alterā brevi ad basin, hirsuta. Bracteæ dorsales 7 lin. longæ, 2 $\frac{1}{4}$  lin. latæ, rubræ, venis terminis iridibus. Bracteæ florales lanceolatae, oblique acutæ, binerves. Bracteolæ breviores, lineari-acuminatae, uninerves. Calyx purpureus; lacinia superior 12-14 lin. longa, obovato-cuneata, mucronulata vel apice erosulo-subdenticulata, inferior brevior, obovata, acutiuscula, ad apicem subdenticulata. Corolla fere pollicaris, alba. (v. in h. monac.)

8. *L. SEMIOVATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 69), caule ascendente juvenili pubescenti-scabro, foliis oblongo-ovalibus apice parum attenuatis obtusiusculis basi in petiolum mediocrem decurrentibus glabris, spicis axillaribus terminalibusque subsessilibus simplicibus, bracteis dorsalibus dimidiato-ovatis acutis calycisque lacinia majoribus obovatis brevicuspidiatis aequalibus pilosis ciliatisque.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ, ad Mandiocum (Sellow! in h. gen. berol. n. 280), prope Rio de Janeiro (Morton! in h. DC. et Riedel! in h. acad. petrop.).

α. Caulis sesquipedalis, basi brevi spatio repens, dein erectus, flexuosus. Folia cum petiolo quadrilineari 4 poll. longa, superiora 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, inferiora angustiora. Spicae ovales, compresse, pollicares, plerèque oppositæ, subinde et alternæ, pilosæ, probabilitate totæ purpurascentes. Bracteæ dorsales paulo obscuriores, 5 lin. longæ, acutæ, reticulate, perfecte semiovatae, nervis alterius lateris tribus validis, angustioris lateris duobus subtilibus maximeque sibi approximatis. Bracteæ florales 3 lin. longæ, oblongæ, acuminatae, trinerves. Calyx lacinia majores 6 lin. longæ; superior ovalis 7-nervis, inferior obovata, usque ad medium bifida, 8-9 nervis. (v. in h. DC., berol. petrop. et Hooker).

β. minor, caule humili, spicis brevissimis, bracteis glabris soloque in ambitu ciliatis. H. Mart. loco non adnotato. Caulis spithameus et paulo altior. Folia minora. Spicæ 4-6 lin. longæ. Corolla 6 lin. longa, calyx paulo longior. Calyx lacinia superior 9-nervis, inferior 8-nervis. (v. in h. Mart.)

9. *L. ALVAREZIA*, caule procumbente basi repente pubescente, foliis oblongo-ovalibus obtusiuscula acuminatis in petiolum brevem attenuatis supra densissime lineolatis subtus præsertim in costis puberulis, spicis (axillaribus?) terminalibus solitariis geminis sessilibus simplicibus, bracteis dorsalibus dimidiato-ovatis subulato-acuminatis calycisque lacinia majoribus obovatisque glabris ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Peruviâ (Pavon! in h. Moricand). Alvarezia disticha Pavon l. c. A *L. semiovata* vix aliter differt, nisi caule humiliore magis repente, foliis minoribus bracteisque et calyx lacinia majoribus longiore acuminis præditis, his etiam tenuioribus laxius reticulatis paucioribusque nervis sive venis divisis. (v. in h. Moricand).

10. *L. NEMORALIS* (Mart. observ. n. 1062), caule basi totove repente pubescente apice ramis adscendentibus, foliis ovalibus ovafile-oblongis acumine obtuso basi in petiolum decurrentibus glabris, spicis axillaribus brevissime pedunculatis, bracteis dorsalibus ovalibus mucronato-acutis glabris subciliatis, corolla calyce longiore tetrandra.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ: in silvis primævis ad Præsidium S. Joannis Baptista et ad Villam do Principe prov. Minarum Generalium, Aprili et Maio (Martius!), Bahia (Blanchet! n. 1441 in h. Moricand). — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 69. Caule humiliore plus minus repente inter reliquas species distinctu facilior. Folia 3 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, 1 poll. lata. Spica oblongæ, opposita, simplices vel geminae in eodem pedunculo, pollicares. Bracteæ dorsales virides, planæ, 5 lin. longæ, 3 lin. latæ, inaequilateræ, venoso-reticulatae, venis in alterum latus duabus in alterum tribus intrantibus. Bractea floralis lanceolata, albo-viridis. Bracteolæ angustiores et breviores, linear-lanceolatae, albe. Calyx lacinia majores obovatae, argute brevicuspidae, nervoso-venosæ, sexnerves; inferior bifida, 5 lin. longa, su-

perior brevior, 4 lin. longa. Corolla 9 lin. longa, alba, tubo apicem versus magis quam apud reliquas infundibuliformi dilatato. Anthereæ ovatae. Variat caule ad maximam partem erecto vel toto fere repente. ( v. in h. monac. et Moricand ).

11. *L. DIANDRA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 70), caule basi repente hinc erecto subsimplici strigoso, foliis ovalibus obtusiusculis basi in petiolum decurrentibus subtus pallidis in costis strigoso-canescensibus, spicâ terminali basi compositâ sessili, bracteis ovalibus mncronatis hirsuto-ciliatis corollâ calycem sequante diandra. In Brasiliâ : in silvis prope Esperança, Maio (h. acad. petrop. ! n. 785 b). Caulis gracilis, inferne repens, parte erectâ 4-6-pollicari apice foliatâ simplici bifidâ. Folia  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$  poll. ( cum petiolo 2-3 lin. longo ) longa, 9-10 lin. lata, repanda vel repando-crenata, breviacuta vel etiam obtusa, glaucescentia. Spica  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$  poll. longa, subcylindrica, rhachi hirsuta. Bractea dorsales steriles, imbricatae, fertilibus dimidio fere minores, quadrinerves, basi cuneatae; fertiles paulo longiores at apicem versus latiores ( $\frac{4}{3}$  lin. longæ,  $\frac{3}{2}$  lin. latæ) 5-nerves. Bracteolæ linear-lanceolatae subulato-acute, calyce paulo breviores. Calyxis lacinia supera ovali-oblonga, subulato-cuspidata, 5-nervis, inferior obovato-cuneata ad basin fere bipartita, lacinia subulato-cuspidatis venoso-trinervibus. Corolla 3½ lin. longa, albida, venis latae coeruleis, tube brevi cylindrico, labio superiore ovato apice attenuato obtuse bidentato recto, inferiore latiore trifido, lacinia aequalibus oblongis obtusis venis singulis trifurcatis notatis; palatum rugosum. Capsula 3 lin. longa, a basi bilocularis tetrasperma, semine altero juxta basin altero in medio dissepimento sito. Semina margine lanuginosa.— An novi generis typus? ( v. in h. petrop. )

LXI. ASTERACANTHA N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 75 et 90 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 701, Meisn. gen. p. 295 (204). — Barleriae spec. Linn. et auct.

Calyx ad basin quadripartitus, lacinia supera paulo majore, infera bidentata. Corolla profunde bilabiata, labio superiore bifido, inferiore trifido, ad originem laciniarum bicalloso. Stamina quatuor, didynama, per paria basi connata. Anthereæ biloculares, æquales, loculis parallelis glabris nudis. Stigma simplex, acuminatum. Capsula bilocularis, compressa, a basi octosperma; dissepimentum adnatum. Semina retinaculis parvis suffulta, ovata, compressa, basi truncata, lœvia. — Herbae Indiae et Africæ tropicæ, palustres, annuae, ad genicula spinosæ, angustifoliæ, magis minus hirsuta. Verticilli e floribus axillaribus sessilibus bracteatis bracteolatisque, spinis rigidis in ambitu cincti. Flores rubicundi.

1. *A. LONGIFOLIA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 90), plus minus hirsuta, caule quadrangulari subæquali, foliis lanceolatis utrinque attenuatis basi attenuata angustæ sessilibus serrulato-ciliatis. (1) In Indiâ orientali: Tranquebaria (h. Schreb.!), in collibus apud Dindygul, Madura, Courtallum, etc. (Wight!), in Nepaliâ (Wallich!), Munghir (Hamilton!), prope Calcuttam aliquis in partibus Indiæ orientalis, locis aquosis (Edgeworth!), Pondichery (Bouton! in h. DC.), Assam (Griffith! in h. DC.). — Lindl. miscell. not. 1839 n. 117, Wight h. propr. n. 1954, ic. 2 t. 449). Barleria longifolia Linn. am. ac. 4 p. 320, Burm. pl. ind. p. 135, Willd. sp. pl. 3 p. 375, h. Willd. ! n. 11658, h. Vahl! Wall. cat. n. 2505 a-i. Barleria hexacantha Moris in act. taurin. 36 p. 188 t. 7. Barleria spinosa h. Hooker! ex Ind. or. Anchusa angustifolia, verticillis longis aculeis armatis Pluk. alm. p. 30 t. 132 f. 4. Radix annua, rufa, parum ramosa. Caulis superne præsertim infra articulos pilis tuberculis insertis hirsutus. Folia 4-6 poll. longa, 4 lin. lata, lanceolata, acuta, petiolata, petiolo marginaque laminæ serrulato-ciliatis, subtus ad costam et venas hispida, vel tota hirsuta. Spinae ternæ, simplices, subulatae, rectæ, utrinque inter par foliorum. Verticilli multiflori, in ambitu bracteis lanceolatis acuminatis dorso marginaque alho-vel flavo-hirsutis obvallati. Bracteolæ duæ

paulo angustiores singulo calyci. Calycis lacinia superior et inferior oblongo-lanceolatae, laterales linear-lanceolatae, acuminatae. Corolla pollicaris. Nervi labii inferioris duo paralleli, sinibus respondentes, ad basin mediae laciniae conniventes in callos duos parvos flavos intumescunt. Capsula semipollicaris, oblonga. — Variat hirsutie parciore vel densiore albâ vel flavescente, spinis florum verticillorum vel æquantibus, vel superantibus, vel iis brevioribus. Spinae sunt rami inflorescentiae cymoso-tripartitæ, apice steriles et basi tantum floriferi. Flores sunt vel quaterui, vel in quatuor fasciculis dispositi, unus utrinque ad basin exteriorem spinæ cujusque exterioris, due inter medianam spinam exterioreisque siti. ( v. v. et s. in h. Wallich, DC., Hooker etc. )

2. A. **AURICULATA**, hirsuta, caule quadrangulari articulis alternatim evidenter compressis, foliis lanceolatis, floralibus basi plus minus dilatata auriculataque amplectentibus. (1) In Guineæ ( Thonning ! Schumacher ! ), ad Senegal fluviū, Decembri ( Perrotet ! in h. DC. et paris. ), in cultis et sterilibus regni Bondou ( Heudelot ! in h. Mus. paris. , Vogel ! in h. Hooker. ), in palustribus regionis septentrionalis montis Schoboda Abyssiniae ( Schimper ! ), in uliginosis circa Adowa, Abyssiniae ( Quartin Dillon ! in h. Mus. paris. et ex eod. in h. Nees n. 48 ). Barleria auriculata Schumacher pl. guin. p. 285. Asteracantha macracantha Hochstett. in Schimp. it. abyss. 1 n. 114, 2 n. 343. Asteracantha longifolia Hochst. l. c. 3 n. 1511. Barleria macracantha R. Br. in Salt voy. opp. ed. N. ab E. 1 p. 249. Barleria cornigera Very! in h. DC. Barleriae species, B. longifoliae admodum similis Hornem. pl. guin. p. 14. Differre videtur ab A. longifoliâ non solum patriâ, sed spinis fortioribus magis conicis, verticillis crassioribus et imprimis foliis basi minus attenuatis, floralibus in multis basi potius dilatatis et auriculatis, inferiorum quoque petiolo basi subauriculato. Corolla glabra. An var. A. longifolia ? ( v. in h. DC., un. itin., paris. , Hooker ).

*β. glabrata*. — Guinea ( Isert ), India orientalis ( Koenig ). Barleria glabrata Vahl ( Schumacher l. c. ). Truxis spinosa Koenig ( Schumacher l. c. ).

LXII. NEURACANTHUS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 97 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 702, Meissn. gen. p. 295 (204).

Calyx bipartitus, labio superiore trifido, inferiore bifido. Corolla bilabiata, subringens, labio superiore bidentato, inferiore profunde trifido. Stamina perfecta quatuor didynama, in tubo recondita; filamenta brevissima; antheræ parvæ, bilocularis, loculis obliquis, ab apice filamenti pendulis, deorsum divergentibus, superiore cristato-piloso. Antherarum breviorum staminum loculus inferior miior, incompletus. Stigma laterale, oblongum. Capsula compresso-tetragona, a basi tetrasperma. Dissepimentum completum, adnatum. Semina ovato-subrotunda, compressa, levia, retinaculis subtensa. — Frutex Indiæ orientalis scabriusculus. Spicae axillares, oppositæ, inæquales, bracteis nervosis quadrifariis. Flores solitarii, parvi. Calyces ciliato-plumulosi.

N. **TETRAGONOSTACHYUS** ( N. ab E. in Wall. pl. as rar. 3 p. 97 ), caule tereti bifurcian scabro, bracteis quinquenervis. 3 In Promæ montibus regni Avensis, Taong Dong dictis ( Wall. ! ). Ruellia tetragonostachya Wall. cat. n. 7168. Rami teretes, cortice pallido, inferne glabriuscili superius setulis a foliorum paribus ex adverso decurrentibus scabri. Folia æqualia, 5-5½ poll. longa, 1½ poll. lata, elliptico-oblonga, cuspidato-acuminata, in petiolum attenuata, duriscula, indeterminate subcrenulata, supra subtilissime lineolata, subtus ad costas scabra, laxe at distincte venoso-reticulata, lete viridia. Spicae tetragona; altera 1½ poll. longa, altera dimidio, sœpe et duplo brevior. Bracteæ 3-3½ lin. longæ, late ovatae, acutissimæ, concavæ, rigidulæ, extus pubescentes, margine setis confertis tuberculis innatis ciliatae, intus glabrae, eleganter undatum ve-

nulosæ. Bracteolæ duæ, calyce duplo breviores, lineares, acutæ, ciliatæ. Calyx circiter 3 lin. longus, laciniâ superâ ultra medium trifidâ, inferiore bifidâ, lacinulis linear-lanceolatis versus basin longe ciliatis et quasi plurimulosis. Corolla circiter 3 lin. longa, pallida. Antherarum loculi obovato-pyriformes, parte tenuiore apici filamenti innati, deorsum magis vel minus divergentes, quorum superior in dorso lanâ albâ barbatus est. Minorum staminum loculus inferius angustior, obpyriformis, quasi appendicem referens antheræ. Faux corollæ in regione staminum glandulosa. Capsula calycis persistentis longitudinaline, acute tetragona, compressiuscula, acuta, glabra, dorso transversim striata. (v. in h. Wallich).


**LXIII. LEPIDAGATHIS** Willd. sp. pl. 3 p. 40, R. Br. prod. 1 p. 478, ed. N. ab E. 3 p. 334, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 95 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, N. ab E. illustr. gen. Lepidagath. (1841) p. 1 sqq. et in Endl. et Mart. fl. bras. fusc. 7 p. 70, Endl. gen. p. 702 Meissn. gen. p. 295 (204, 365). — Russbergera Endl. gen. p. 1405, nov. stirp. Mus. vindob. dec. p. 38 iconogr. t. 94 (sola inflorescentia) Meissn. gen. p. 293 (202).

Calyx quinquepartitus, laciniâ superiore maximâ, infimis duabus altius conjunctis, in nonnullis fere in unam coalescentibus. Corolla bilabiata, labio superiore vel integro, vel bidentato, vel bifido, laciniis tum labii inferioris trifidi laciniis conformibus. Stamina quatuor, didynama, inclusa, per paria consociata: antheræ biloculares, loculis parallelis, aliis contiguis, aliis basi divergentibus. Capsula bilocularis, bivalvis, juxta basin tetrasperma, parietibus membranaceis, dissepimento rigidulo adnato. Semina compressa. — Plantæ vel herbaceæ vel suffruticosæ, pleræque Indiæ orientali indigenæ, parvæ vel mediocres, multifloræ. Spica per se brevis, simplex vel glomerato-composita, secunda, scorpioidea, scil. bracteis decussatis uno sensu florentibus ideoque floribus in altero rhacheos latere alternatim biseriatis, in altero autem latere rhacheos bracteis sterilibus (in hoc genere majoribus) pariter alternatim biseriatis veluti a tergo incumbentibus. Flores in angulo singulæ bracteæ fertilis singuli, bracteis calycisque laciniis majoribus sœpe nervosis. Flores parvi, purpurascentes vel albidi. Calycis lacinia superior reliquis latior, duæ inferiores minores, laterales duæ minimæ.

### I. GENUINÆ.

Antherarum loculi contigui, folia integerrima aut subrepanda.

#### § 1. *Calyx quadripartitus.*

1. **L. HUMIFUSA** (Decaisne! h. timor. in nouv. ann. du mus. 3 p. 386), caule procumbente ramoso ramis subcaneo-puberulis, foliis parvis ovato-oblongis mucronulatis integerrimis brevissime petiolatis subtus pubescenti-tomentosis, spicis capituliformibus depressis in ramulis terminalibus circa apices ramorum congestis densis, bracteis conformibus calycibusque membranaceis obtusis apice albo-lanatis, calyce quadripartito, corollâ bilabiata.  In insulâ Timor (h. Mus. paris. ! 1836 et ex eodem in h. DC. et Nees n. 71). Habitus Nelsoniæ. Folia 1½ poll. longa, proxime sub spicâ minorâ, sessilia, involucrantia; costæ foliorum subtus prominulæ. Bracteæ omnes oblongæ, obtusaæ, basi virides, extus præsertim apicem versus lanato-subtomentosæ et ciliatæ; fertiles angustiores. Calycis lacinia superior inferiorque æque latæ, linear-oblongæ, lanatae, inferior in nostris constanter integra, laterales laciniæ angustiores, quâ notâ Barlieræ generi adjungitur, sed mediante L. falcata in Lepidagathis genus intrat. Corolla vix 2 lin. longa. Capsula 4-sperma. (v. in h. paris., DC., Hooker et Benthem).
2. **L. FALCATA.** (N. ab. E. ill. Lepidag. p. 28 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 96),

caule fruticoso foliisque ovatis obtusis glabris, spicis axillaribus falato-recurvatis, bracteis sterilibus fertilibusque secundis scariosis nervosis oblongo-acuminatis subæqualibus, calyco quadrifido, lacinia supera et infera oblongis æqualibus, infera apice bifida. 5 In Taong Dong montibus regni Avenensis (Wall.). Ruellia scariosa Wall. cat. n. 7166. Rami teretes. Folia 2; poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, apice modice attenuato obtuso, in petiolum alatum-decurrentia, obiter repanda, glabra. Spicæ axillares, solitariæ, circiter bipolligares, sessiles, a basi sœpe falotatim reflexæ, sursum secundæ. Bracteæ semipolligares. Bracteolæ linear-lanceolatae, trinerves, 4 lin. longæ. Calyx semipolligaris; lacinia inferior oblonga, apice ad  $\frac{1}{2}$  longitudinis bifida, lacinulus aoutissimis apice forcipatim sibi incumbentibus; superior lacinia oblongo-lanceolata, acuminata, trinervato-venosa, nervo medio fortiore. Capsula tres lineas longa. (v. in h. Wallich).

### § 2. *Calyx quinquepartitus.*

A. *Bracteæ magis minusve scariosæ, coloratæ, aristulatæ, nec vero nervoso-striatae vel apice spinosæ.*

\* *Spica terminales, vel axillares terminalesque.*

3. L. MUCRONATA (N. ab E. ill. Lepidag. p. 11 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 95, Wight h. propr. n. 1968), caule herbaceo repente, foliis triangulari-ovatis acutiusculis basi subcuneatis repando-crenulatis glabriusculis, spicis ovatis axillaribus terminalibusque aggregatis, bracteis fertilibus bracteolisque subæqualibus membranaceis mucronatis calycibusque villoso-ciliatis subglandulosisque, calycis lacinia inferiora profunde bifida. (1) In Indiâ orientali (Heyne!), inter Rungia repentis specimen attulit (Wight), Mergui (Griffith! in h. Hooker), insulis Philippinis (Cuming! pl. philipp. n. 1141 in h. Hooker, 1141 et 1148 in h. Bentham et berol.). Ruellia mucronata h. Heyn. Wall. cat. n. 3366 a. Simillima Lepidag. parviflora Blum. bijdr., a qua præprimis differt pubescentiâ glandulosâ bracteas calycasque vestiente vel deficiente omnino vel rariore, et formâ foliorum. Specimina Philippinensis bracteis angustioribus distinguuntur. (v. in h. Wall., Wight, Mus. paris. et Hooker.)

4. L. PARVIFLORA (Blume bijdr. p. 801), caule herbaceo basi repente foliisque triangulari-ovatis apicem productis obtusis basi subtruncatis repandis glabris, spicis axillaribus et terminalibus geminis oblongis, bracteis sterilibus bracteolisque subæqualibus calycibusque villoso-ciliatis glandulosisque mucronatis, calycis lacinia inferiora profunde bifida. (1) In calcareis insule Javæ ad Kuriapan, Tjibogo et etiam circa Bataviam et Tjikao (Blume), in Sarzagonâ (Hænke). — Hassk. cat. h. bogor. alt. p. 150, Cuming h. philipp. n. 497. N. ab E. ill. Lepidag. p. 12 et in Wall. pl. as. rar. 3. p. 95. Est planta tenera, gracilis, similis quidem L. mucronata, sed ea alieno habitu, nitore, foliorum figurâ propriâ, bractearum ad bracteolas inversâ proportione, glandulis spicæ rel. facile dignoscitur. (v. in h. Junghuhn, Hænke et Hooker).

5. L. JAVANICA (Blume bijdr. p. 801), caule herbaceo basi repente hinc adscendente, foliis ovatis acutiusculis basi cuneiformibus subrepandis glabris, spicis conicis terminalibus aggregatis, bracteis fertilibus bracteolisque subæqualibus herbaceis mucronatis calycibusque villoso-ciliatis apice glandulosis, calycis lacinia inferiora profunde bifida. (1) In montanis Gedé insulæ Jave (Blume! Zollinger! pl. jav. n. 527 et 2439, in h. DC. et Bentham), in silvis montis Brambanan insulæ Javæ (Junghuhn!), insula Timor (h. Mus. paris. in h. DC. et Moricand). — N. ab E. ill. Lepidag. p. 14. L. parviflora Moritzi in Zolling. pl. jav. p. 47. L. Timorensis Steud. nomencl. ed. 2. L. parviflora Decaisne in nouv. ann. du Mus. 3 p. 387 (nec Blum.). Differt a L. mucronata caule robustiore minus repente glabro vix ad genicula subpuberulo, foliis majoribus (cum petiolo  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longo tripolligaribus 1 poll. ad 14 liu. latis) basi valde attenuatis obiter subrepandis, spicis paulo longioribus evidentius secundis, bracteis tam fertilibus quam sterilibus ob-

longo-lanceolatis quidem sed paulo angustioribus herbaceis nec nisi margine membranaceis magis glandulosis præsertim apicem versus. Reliqua ut in dictâ specie. — Corollæ labium superius planum. Antheræ non ciliatæ. Capsula calycis longitudinalis. A L. parviflora foliis recedit basi cuneatis nec subtruncatis aut breviacutatis. (v. in h. Jungbuhn).

*β.* *laxior*, foliis lanceolatis, spicis simplicibus longiusculis (terminalibus ternis). — Java (Labillardière ! in h. Moricand). (v. in h. Moricand).

6. *L. PSILANTHA*, glabra, caule erecto et tereti quadrangulo angulis acutis glabro, foliis lanceolatis acutis in petiolum attenuatis undulato-repandis lineolatis in costis scabris, spicis terminalibus capitato-aggregatis brevibus subinvolutatis glabris, bracteis bracteolisque conformibus oblongis cuspidato-subaristatis echartaceis carinâ inferne ciliatis, margine obsolete ciliolatis, calycis quinquepartiti laciniis glabris breviaristatis, superiore oblongâ duabus inferis (inferioris lacinia) lanceolatis mediis linearibus.  $\mathcal{L}$  In insulis Philippinis (Cuming! n. 1013 in h. Hooker. et Bentham). Ex affinitate est *L. secundæ*, luzonæ, sed glabritie inflorescentia etc. facilis distinctu. (v. in h. Hooker).

7. *L. LAXA*, glabra, caule basi repente acute quadrangulari, foliis anguste lanceolatis utrinque attenuatis in petiolum acute decurrentibus, rameis in petiolum attenuatis integerrimis, spicis axillaribus subterminali que laxis angustis glabris, bracteis bracteolisque conformibus subulato-mucronatis subtilissime ciliatis calyce paulo brevioribus, calycis quinquepartiti laciniis subulato-mucronatis, tribus majoribus lanceolatis, subtilissime ciliato-subglandulosis.  $\mathcal{L}$  In Insulis Philippinis (Cuming! n. 1717 in h. Hooker). Videtur species distinctissima, sed specimenia non sufficiunt. Folia (media)  $3\frac{1}{2}$  poll. cum petiolo longa,  $\frac{1}{2}$  poll. lata. (v. in h. Hooker).

8. *L. ARISTATA*, caule fruticoso apice tomentoso, foliis ovatis obtusis integrerimis supra pubescentiâ exiguâ scabris subtus pulverulento-pubescentibus canescentibus, spicis terminalibus capitatis involucratis, bracteis oblongo-lanceolatis nervosis bracteolisque lanceolatis breviaristatis calycis laciniis inferis brevioribus ciliatis, calycis quinquepartiti laciniis distincte aristatis, dorsali oblongâ nervoso-reticulata, inferioribus linearis-subulatis superiori subæquantibus lateralisibus subulatis dimidio brevioribus, corolla laciniâ calycis superiore paulo minore.  $\mathfrak{L}$  In Arabia Felici (Forskal), ad Cahim Arabie Felicis (Botta! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 216). Ruellia aristata Vahl symb. 2 p. 73, Willd. sp. pl. 3 p. 307. Folia unguicularia. Propinqua *L.* terminali Hochst. sed differt corolla, per se quidem pro genere speciosâ  $\frac{1}{2}$  poll. longâ, calycis laciniam subæquiloniam parum superante. Quod ad corollam *L. scariosæ* congruit, isti autem lacinia calycis superior latior est et brevior, folia sunt longe petiolata, quæ dictis speciebus brevipetiolata. (v. in h. paris. etc.)

9. *L. TERMINALIS* (Hochst. in Schimp. it. abyss. n. 815), caule fruticoso foliisque oblongo-lanceolatis repandis subtus pulverulento-tomentosis, spicis terminalibus capitatis involucratis, bracteis omnibus submembranaceis calycis laciniis majoribus ovalibus breviaristatis dorso marginibusque villosis, laciniâ calycis inferiore ad medium usque bifidâ, corolla ringente bracteâ suâ duplo longiore.  $\mathfrak{L}$  Ad rupe locis siccis infra Sessaquilla Abyssiniae, Septembri (Schimper!), in regno Fazobel Abyssiniae (Kotschy, n. 482 in h. Hooker). In universum refert *L. scariosam*, sed differt a reliquis plerisque corollâ speciosa,  $\frac{1}{2}$  poll. longâ, labio superiore arcuato fornicate emarginato. Integumentum ut in *L. scariosâ*, in foliorum pagina inferiori densum, incanum; pagina folii superna stellato-hirta. Nervi subtus prominuli. Loculi antherarum contigui, nec nisi basi divergentes. (v. in h. Hochstett., Hooker et prop्र.)

10. *L. SCARIOSA* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 15 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 95, Wight h. propr. n. 1969), caule fruticoso foliisque ovatis repandis subtus pulverulento-tomentosis, spicis terminalibus capitatis involucratis, bracteis omnibus membranaceis calycisque quadripartiti laciniis breviaristatis villosulis,

harum inferiore profunde bifidâ acuminatâ.  $\mathcal{Y}$  In convallibus nemorosis prov. Madurâ et Dindigul (Wight!), Palamcottah (idem!), in Travancore (h. Madr.!). L. lanata Wall. Wight cat. n. 1969. Ruellia scariosa Wall. cat. n. 2354 a, b, Wight ic. t. 457. Ruellia spec. h. madr. Wall. l. c. sub n. 2354 a et h. DC. Differt a reliquis cognatis tomento e setulis brevibus fasciculatis detersilibus caulem et foliorum nervos venasque inferius, juniora folia tota tegente, primum albicante, in exemplis diutius asseratis ferrugineo. Spicæ 4-5, terminales sessiles, capitulum hemisphæricum magnitudine nucis juglandis construant involucratum jugis geminis approximatis foliorum, quorum inferiora caulinis similis subsessilia, superiors et intime minorâ ovalia penitus sessilia et amplectentia. Bractæ dorsales steriles; inferiores præsertim rhombo-ovatae, acutisculæ, cum vel obsoleta mucrone, reliqua angustiores, longius aristulatae, omnes autem cum fertilibus, quæ lanceolate sunt, membranaceæ, villosæ et villoso-ciliatae, quinquenervi-striatae, 5-6 lin. longæ. Calycis lacinia superior figurâ bractæ dorsalis, quinquenervi-venosa, ut reliqua ciliata, villosa, aristulata. Corolla semipolicaris. (v. in h. Wallich, Wight et DC.)

11. L. CALYCINA (Hochst. in Schimp. it. abyss. n. 1044!), caule fruticoso foliisque oblongis acutis repandis velutino-puberulis, spicis axillaribus (terminalibus) oblongis, bractæ omnibus membranaceis calycisque quadripartiti laciñis majoribus ovalibus breviristatis glabris breviciiliatis, harum inferiore profunde bifidâ acuminatâ.  $\mathfrak{z}$  In valle Mai Oui prov. Modat Abyssinæ, Aprili (Schimper!). L. Hamiltonianæ affinis, differt jam solis foliis multo angustioribus spicisque (plerisque saltem) axillaribus albis. Alta  $\frac{1}{2}$ -1 ped. Caulis erectus canescens. Spicæ in axillis foliorum solitariae, erectæ, oblongæ, pollicares, folium in brevem petiolum attenuatum æquantes. Bractæ trinerves, reticulatae. Bracteolæ subulatae. Corolla bracteam parum superans. (v. in h. Hochstett.)

12. L. HYALINA (N. ab E. ill. Lepidag. p. 16 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 95), caule suffruticoso basi repente, foliis ovato-ellipticis oblongisve utrinque attenuatis repandis ad costas subtus scabris, spicis ovatis axillaribus terminalibusque aggregatis, bracteis ovato-oblongis bracteolisque lanceolatis et calyce aristatis viloso-ciliatis basi hyalinis, calyx 4-partito, laciñâ inferiore profunde bifidâ.  $\mathfrak{z}$  In Indiâ orientali. Folia caulina 6-7 poll. longa, 3 poll. lata. Bractæ inferiores ovatae, superiores oblongæ, omnes (exceptis infimis) basi maximam partem membranaceo-hyalinæ, nitentes, apice reticulatae, virentes (adultiores rufæ), aristato-cuspidatæ apicibus aristarum albis, apicem versus longissime viloso-ciliatae ciliis confertim articulatis. Calyx basi hyalinus, 3 lin. longus; laciñia ciliatae, aristulatae; superior bracteolis similis. Corolla vix tres linea longa, glabra, pallida (v. in h. Wallich, Wight, berol., Hooker, etc.)

$\alpha$ . Caule maximam partem erecto glabriusculo. — In Promæ montibus (Wall.), Pegu (Regnaud! in h. Mus. par. et cx eo in h. Nees), Coro mandel (Macé! ibid.), inter Chappedong et Amherst urbem (Wall.), ad Goalpara et Dimla (Hamilt.), Mergui et Assam (Griffith! in h. Hooker). L. incurva Hamilt. Don prodr. fl. nep. p. 119, Spr. syst. 4 p. 237. Ruellia? disticha  $\alpha$  et  $\beta$  h. Hamilt. Wall. cat. n. 2365 c (sub Ruellia dependente) et 3565 h. Hypoestes cephalotes Link Jahrb. 1, 3 p. 48, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 439. Justicia cephalotes h. Willd. n. 302. Erinus bilabiatus Roxb. in sched. herb. Willd! nec Roxb. fl. ind. 3 p. 92 ex Moluccis, cui capsula polysperma tribuitur. (v. in h. paris., Hooker etc.)

$\alpha^*$ . *lophostachyoides*, spicâ terminali subsolitaria longiusculâ compressâ evidenter secundâ, bracteis oblongo-lanceolatis mucronato-cuspidatis, dorsibus adpressis scariosis expallidis, bracteolis conformibus exterioribus herbaceis, caule adscendente foliisque (oblongis) glabris. — Iu ins. Ceylon (Macrae! in h. Hooker).

*β. dependens*, caule prostrato ad genicula seriatim radiculoso-pubescente, foliis supra magis minusve birsutis. — Prope Sivapura (Hamilton!), in Sillet (F. de S.!), in Nepaliâ (Wall.!), in Penang (Wallich!), Assam et Khas (Griffith! in h. Hooker), Dehra d'hun (Edgeworth n. 233 forma hirsutior), China (Gaudichaud! in h. DC. Staunton! ibid. ex h. Lambert). *Ruellia dependens* Wall. cat. n. 2365 b, d, e, f. Differt caule (casu fortassis) ad terram dejecto maxime geniculato radiculoso pubescente, foliis subtus (sæpe etiam supra) magis hispidis, spicis in glomeru pluribus paulo magis villosis longius aristulatis, calyce paulo longiore in quibusdam apice magis subulato. (v. in h. Wall. , Hooker, DC.)

13. *L. USTULATA* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 18 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 95), caule suffruticoso humili basi repente, foliis ovalibus oblongis scabris infinitis minoribus spathulatis, spicis ovatis terminalibus subagglomeratis, bracteis bracteolisque et calycis subquinquepartiti laciñi majoribus lanceolatis acuminato-aristatis subæqualibus, alternis hyalinis coloratisque. ♂ Circa Gurrukpur et Sukanaghur (Hamilt.!), in Hindustaniâ (Wallich!). Fir hills in Himalayâ alt. 3000-5000 ped., Septembre (Edgeworth ! n. 232). *Ruellia ? ustulata* h. Hamilt. ! Wall. cat. n. 2366 b (sub *Ruellia mucronata*). *Ruellia mucronata* Wall. cat. n. 2366 b, e. A *L. hyalinæ* differt caule humili (digitali vel spithameo) basi repente, ramis multis confertis erectis pubescenti-scabris, foliis ramorum trium vel quatuor parium (quorum infimâ minimâ 2-3 lin. longâ, spatulatâ, tum alterum majorum par spathulatum vel ellipticoruin), spicis terminalibus et in plantis humilioribus, quarum rami brevissimi, fere agglomeratis, bracteis bracteolisque lanceolatis longiore acumine in aristulan transcurrentibus, calycis laciñi latioribus simili ratione longius acuminatis. Variat spicis viridi pallidoque et purpureo pallidoque variis, tum caulis ramis humilioribus confertis magisve elongatis. (v. in h. Wallich).
14. *L. RIPARIA*, caule suffruticoso ? erecto, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis repandis subtus pubescenti-scabris, spicis conicis, axillaribus oppositis terminalibus capitatis, bracteis ciliatis, dorsalibus lanceolatis bracteolisque ellipticis hyalinis longe aristatis, calycis ciliati laciñi infimâ profunde bipartita. ♂ Ad Moalmyne et in ripâ Attron fluminis (Guil. Gomez). *Lepidagathis aristata* N. ab E. ill. Lepidag. p. 19 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 95, Wall. cat. n. 7163. Quod ad caulem et folia *L. hyalinæ* accedit, sed foliis differt subtus totâ paginâ pubescenti-scabris et inflorescentia diversâ. Spicæ axillares, oppositæ ; solitariae vel alterâ minore ad basin auctæ, terminales 8-10 in capitulum grande congestæ ; majores pollicares-sesquipollulares, conicæ, secundæ, alias dimidio minores, purpureæ. Bracteæ uninerves ; dorsales sterilesque 5 lin. longæ, lanceolatae, in acumen aristiforme attenuatae, ciliatae, in latere exteriore angustioreque purpurascentes, in latere interiori albo-hyalinæ ; inferior et fertilis lanceolata, æquilatera, brevius acuminata, tota membranacea, apice purpurea. Bracteolæ 4½-5 lin. longæ, oblongæ, ciliatae, albo-hyalinæ, uninerves, apice reticulatae et cum aristâ ciliatae purpureæ. Calyx quatuor lineas longus, apice purpureus ; lacinia supera lanceolata. Corolla 2 lin. longa, extus puberula, pallida, fusco-purpurascenti-maculata. (v. in h. Wallich).
15. *L. BILLARDIERIANA*, herbacea, glabra, caule erecto, foliis ovatis acuminatis repandis basi acutâ in petiolum brevem decurrentibus, spicis terminalibus capitatis, bracteis bracteolisque conformibus chartaceis opacis oblongo-lanceolatis acuminato-aristatis laxe ciliatis, calycis ciliolati laciñi infimâ bipartita. ♂ In ins. Javâ (La Billardièræ! in h. Moricand). Similis *L. aristata*, differt caule molli herbaceo, spicis angustioribus concoloribus pallide fuscis parum ciliatis. Glandulæ in bracteis etc. nullæ. (v. in h. Moricand).
16. *L. SEMIHERBACEA* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 20 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 96), caule suffruticoso foliisque lanceolatis repandis basi longe attenuatis glabris, spicis axillaribus oppositis, terminalibus ternis ovatis, bracteis bracteolisque subæqualibus oblongo-lanceolatis ciliatis membranacçis, bracteolarum

exteriore herbacea, calycis ciliati lacinia inferiori late lineari bifida.  $\mathscr{Z}$  In Iudiâ orientali. — Wall. cat. n. 7164 a, b. Caulis procumbens, adscendens, herbaeus, gracilis, ramosus, glaber nec lineolatus. Folia 5-6 poll. longa,  $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, acuminata cum acumine plerumque obtusiusculo, margine repanda. Spica pterae in ramulo axillari variae longitudinis (2 lin.-1 $\frac{1}{2}$  poll.) apice diphylla, vel in apicibus caulinum ramorumque terminales ternæ sessiles,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  pollicis longæ, rufo-pallido-viridique vittatae. Bractæ communes 4 lin. longæ, æquales, oblongæ, acuta cum mucronulo, ciliata, uninerves, apice reticulatae; dorsalis sterilisque dimidio exteriore viridi vel rufescente, interiore membranaceo; ventralis fertilisque tota membranacea. Calyx quatuor lin. longus; laciniaæ longitudine æquales, membranaceæ, parce reticulatae, ciliatae; superior lineari-lanceolata, acuta. Corolla 3 $\frac{1}{2}$  lin. longa, pallida. (v. in h. Wallich).

$\alpha$ . caule erecto, calycis lacinia inferiori apice bifida. — Ad Chappedong et in ripâ Attron fluminis (Guil. Gomcz!).

$\beta$ . caule prostrato radicante, foliis longioribus lanceolato-linearibus, calycis lacinia inferiori bipartita. — In Nepaliâ inferiore ad Helaundal (Wallich!) Decembri. Ruellia dependens var. angustifolia, an distincta species! Wall. cat. n. 2365 g, Wall. cat. 7168 in h. Hooker. Plurimis quidem convenit formæ  $\alpha$ , sed differt calycis lacinia inferiori profunde bipartita, foliis prælongis (5-7 poll. longitudine),  $\frac{1}{2}$  poll. latis vel angustioribus, cauleque radicante. Accedit his notis ad L. Hamiltonianam, sed specimen nobis est incompletum, floribus nondum evolutis. (v. in h. Wallich).

? 17. L. SPHEROSTACHYA, glabra, caule simplici eretto tereti, foliis subsessilibus ovalibus basi obtusis integrerrimis inferioribus et apice obtusis superioribus brevicuspidulatis, spicis axillaribus sessilibus globosis, bracteis late ovatis setaceo-cuspidatis utrinque villosis, calyce grandi villoso lacinia oblongis sub-falcatis setaceo-acuminatis subæqualibus!  $\mathscr{Z}$  In Indiâ orientali (Jacquemont! in h. Mus. par. n. 795). Planta singularis, absque flore, sed ex alabastro exiguo judicando staminibus 4 antheris ciliatis ovatis prædita. Ovarium generis, a basi ad medium 4-ovulatum, stigma obtusum. Calyx 10 lin. longus, membranaceus, tenuiter venulosus, longitudine bractæ ejusdem texturæ; cuspides omnes oblique recurvæ. Folia brevissime petiolata, 3 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata. (v. in h. paris.)

18. L. HEUDELOTIANA, caule fruticoso ramis strictis laxe strigilosus, foliis lanceolato-linearibus acutis brevissime petiolatis trinervibus subtus hirsutis, spicis axillaribus oblongis sessilibus adpressis in spicam ramorum densam longam basi interruptam confluentibus, bracteis laciniaæque calycis tribus majoribus membranaceis conformatibus marginibus costisque ciliatis oblongis setaceo-acuminatis acuminis heteromallo, antheris pubescensibus.  $\mathfrak{z}$  In Senegambiæ, uliginosis Rio Nunez et Fouta d'Hiallon (Heudelot! in h. Mus. par. et ex eo in h. Nees n. 10 tum in h. Hooker!). Species eximia inter congeneres, pluripedalis, strictior. Spica 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longæ spicam compositam terminali 8 poll. longam exstruunt. Folia (superiora) 2 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  lin. lata. Calyx 6 lin. longus, lacinia inferiori profunde 2-partita, lacinulis oblongis aristatis, omnibus albo-ciliatis apicibusque extrorsum recurvis. Corolla 6 lin. longa, rosa, labio superiore ovali obtuso violaceo inferiore pallido. Capsula 2-4-sperma. Seminum testa in cellulas fibrosas soluta. (v. in h. paris. et propr.)

19. L. TRINERVIS (N. ab E. ill. Lepidag. p. 21 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 96), caule suffruticoso diffuso foliis lanceolato-linearibus trinervibus glabris, spicis capitato-congestis recurvis axillaribus ciliatis, bracteis conformibus ovatis bracteolisque interioribus lanceolato-cuneiformibus chartaceis calycisque quintuplicatis lacinia aristatis.  $\mathfrak{z}$  Ad Sasera (Hamilt.), prope Lohargaon, Januaria (Royle). Barleria? trinervis Wall. cat. n. 2500 a, b. Ruellia? trinervis h. Hamilt. Wall. (l. c. a.). Planta parva, diffusa, ramis gracilibus ramosis multinodibus glabris acute quadrangulis, lateribus oppositis alterna vice magis excavatis. Folia 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  lin. lata, acuta vel obtusa cum mucronulo, integerrima, sessilia, patent-recurva, glabra, subtus et circa margines scabra,

trinervia nervo medio crasso depresso-plano, lateralibus tenuioribus marginibus approximatis subrepandis. Spicas axillares sessiles, raro simplices, plerumque e binis ternisve tam arcte compositæ, ut simplices ubi videantur,  $\frac{1}{2}$ ; pollicis longæ, ovato-conicae, sursum secundæ, densissime imbricatae, recurvo-patentes. Bractææ, bracteolæ et calyces longitudine æquales, fere quatuor lin. longæ, dorso medio et margine molliter ciliatae. Bractææ chartaceæ, ovatae vel ovato-ellipticæ, uninerves, cuspide subulatâ recurvâ longitudine fere bractææ terminatae. Bracteola exterior oblongo-lanceolata, oblique acuminato-aristata, plana, herbacea, dorso glabra, subtiliter nervoso-striata, acumine bracteolâ duplo breviore; interior bracteola membranacea, cuneiformi-attenuata, acumine aristiformi duplo longior, uninervis. Calycis lacinia superior et duæ inferiores figurâ et magnitudine bracteolæ interioris, apice paulo magis herbacea et villosiores; harum duæ inferiores basi paulo altius conjunctæ. Corolla 3 lin. longa, alba, pubescens. (v. in h. Wallich, Royle et paris.)

$\beta.$  *lepidula*, mīnor, tenerior, foliis late viridibus, spicis ovatis subsolitariis apice roseis. In Indiâ orientali (Jacquemont ! in h. Mus. paris. et ex eodem in h. Nees n. 172 et 173). (v. in h. paris. et prop्र.)

\*\* Spicas axillares et subradicatae.

20. L. HAMILTONIANA (N. ab E. ill. Lepidag. p. 23 et in Wall. pl. as rar. 3 p. 96), caule suffruticoso diffuso, foliis linearibus elongatis glabris margine scabris, spicis circa radicem conglomeratis, bracteis ex ovato oblongis bracteolisque lanceolatis subulato-acuminatis longe ciliatis, calycis quadripartiti ciliati laciniis acuminatis, inferiore latiore bifida.  $\delta$  Ad Nuni, Novembri (Hamilton). — Wall. cat. n. 2422. Ruelia ? radicalis h. Hamilt. Proxime affinis L. cristata, differt caule elongato flagellari, inferne aphylio, superne folioso, foliis 5-6 poll. longis, 2 lin. latis subfalcatis (acutis margine scaberrimis supra transversim lineolatis), spicis juxta basin pluribus in spicam ovatam ovi magnitudine compactis, caulinis nullis, maximeque bractearum florumque magnitudine fere duplâ diversâque structurâ. Bractææ et calyces non villosa, sed apicem versus pilis sparsis glandulis impositis hirsuta et simili ratione longe ciliata, apice purpurascens, 5-6 lin. longa. (v. in h. Wallich).
21. L. ANOBRYA, glaberrima, caule suffruticoso, foliis linearibus trinervibus, spicis in inferiore nudâque parte caulis conglomeratis, glomeribus 1-2 sphæricis approximatis, bracteis, bracteolis calycisque laciniis tribus majoribus ovalibus subulato-cuspidatis villosisque chartaceis acuminibus subheteromallis.  $\delta$  In arenosis Bondou et regni Galam Senegambiae (Heudelet ! in h. Mus. paris.). Accedit ad L. Hamiltonianam et Heudelotianam, differt ab illâ calyce 5-partito, laciniis lateralibus linearie-angustis, ab hac glabritie et spicis radicem versus congestis bracteisque angustioribus. (v. in h. paris. et Hooker).
- $\beta.$  *angustissima*, foliis perangustis, bracteis bracteolisque longissimis recurvatis. — In Senegambiae hnnidis, Fouta d'Hiallon (Heudelet ! ex h. Mus. paris. in h. Nees n. 13.)
22. L. RADICALIS (Hoëchst. ! in Schimp. it. abyss. 2 n. 1072), caule suffruticoso diffuso foliisque lanceolatis pilosis, spicis circa radicem conglomeratis, bracteis ovato-oblongis bracteolisque lanceolatis subulato-acuminatis longe molliterque ciliatis, calycis 5-partiti ciliati laciniis subulato-acuminatis, rigidulis, mediis paulo angustioribus.  $\delta$  In rupibus schistosis prope Adoam, Octobrc (Schimper !), Devarina in Abyssinâ (Quartin Dillon ! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees n. 46), in collibus Gebbel Accara juxta fluvium Tumad (Russegger !). Russeggera collina Endl. nov. st. mus. vindob. dec. 5 p. 38, iconogr. t. 94. Affinis L. Hamiltonianæ, differt foliis triplo brevioribus (1- $\frac{1}{2}$  poll. longis) hirsutis, bractearum et calycum ciliis mollioribus densioribus maximeque calycis laciniis duabus inferioribus usque ad basin discretis. Calyx 7-8 lin. longus, apicem versus herbaceous, trinervis, basi sub fructu durescens. Corolla 6-lin. longa. Labii inferioris laciniæ laterales basi sanguineo-maculatae.

Antherarum loculi connectivo lato discreti, basi apiceque liberi. Russeggeræ lacinias calycis laterales latiores tribuit Endlicher, quas reliquis angustiores vidi in floribus multis a me examinatis. (v. in h. Hochstett., vindob., paris. et propr.)

**B. Bracteæ magis minusve herbaceæ, nervoso-striataæ, in multis apice spinescentes.**

\* Spicæ axillares et radicales.

23. *L. RUPESTRIS*, caule suffruticoso diffuso, foliis oblongis lanceolatis sessilibus, spicis capitato-congestis circa radicem conglomeratis lanatis, bracteis bracteolisque subconformibus ovato-orbiculatis ovalibusve cuspido-lanceolatis mucronatis, calycis quadripartiti densissime lanati laciñi minute mucronatis, inferiore profunde bifida. ♂ In Indiâ orientali.

α. *hirta*, caule foliisque oblongis ( $\frac{3}{4}$  poll. longis) pubescens-scabris, bracteis brevioribus breviore mucronulo. Inter rupestris in collibus prope Ongole rarius (Wight!). Lepidagathis rupestris Wight h. propr. n. 1270, N. ab E., in Wall. pl. as. rar. 3 p. 96, ill. Lepidag. p. 24. (v. in h. Wight).

β. *Rottleriana*, caule glabro elongato, foliis lanceolato-linearibus ( $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longis 2 lin. latis) margine subtusque in costis scabris, bracteis mere ovalibus longiore mucronulo. Acanthus cristatus n. 10 Rottler! in h. Vahl. Ruellia radicifolia h. Vahl. (v. in h. Vahl.)

24. *L. CRISTATA* Willd. (N. ab E. ill. Lepidag. p. 25 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 96), caule suffruticoso diffuso foliisque lincari-lanceolatis oblongis glabriusculis, spicis capitato-congestis circa radicem conglomeratis in ramis axillaribus lanuginosis, bracteis bracteolisque conformibus oblongis attenuatis mucronatis, calycis quadripartiti laciñi acuminatis mucronato-aristulatis inferiore bifida. ♂ In itinere Velurensi, Novembri (Klein! in h. Willd.), in apricis glareosis prope Madras etc. frequens (Wight!), in peninsulâ Indiæ orientalis, Parimandou (Malab. Leschenault! in h. DC.), Gwalior (Edgeworth! in h. Hooker). Spicæ 2-3 in capitulum magnitudine nucis avel-lanæ subglobosum compactæ, revera axillares, sed pleræque circa basin ramorum radicalium in globum ovi gallinacei, immo pugni magnitudine coacervatæ. Bracteæ dense imbricataæ, una cum calycibus chartaceo-menibranaceæ, apice magis herbaceæ, in mucronem aristuliformem acutissimum desinentes, obsolete nervosæ, lanuginosæ et molliter ciliolataæ; tum bracteæ quum bracteolæ oblongæ sunt, 4 lin. longæ, hac paulo angustiores tencrioresque. Calyx  $3\frac{1}{2}$  lin. longus. Corolla 4 lin. longa, pubescens, alba. (v. in h. Willd., Wall., Wight).

α. *angustifolia*, foliis linear-lanceolatis. Lepidagathis cristata Willd. sp. pl. 3, 1-p. 400, h. n. 11735, Poir enc. méth. suppl. 3 p. 333, Wall. cat. n. 2421 a (ex parte) Wight ic. 2 t. 455, Roxb. pl. corom. 3 p. 63 f. 267. Acanthus cristatus Klein! in h. Willd. n. 11735.

β. *latifolia*, foliis oblongis subtus in costis scabris (spicis omnibus circa radices congestis). Circa Bombay—Wight cat. n. 1971, Wall. cat. n. 2421 6. Selago acaulis h. Russel! Wall. cat. n. 2421 c. (v. in h. Wight et Hooker).

\*\* Spicæ axillares.

25. *L. CHLOROSTACHY*, caule fruticoso erecto foliisque ovali-oblongis utrinque acuminatis subrepandis glabris, spicis axillaribus oppositis sessilibus subcylindricis, bracteis omnibus herbaceis calycibusque ciliatis rigidule acuminatis, dorsalibus dimidiatis, fertilibus oblongo-lanceolatis trinervibus, calycis 5-partiti laciñi acuminatis, superiore trinervi latiore. ♂ Ad Mergui (Griffith! in h. Hooker). Species insignis, foliis cum petiolo pollicari 6 $\frac{1}{2}$  poll. longis, 1 $\frac{1}{2}$  poll. latitis nitidis reticulatis. Spicæ cauli adpresso, 1 $\frac{1}{2}$  poll. longæ, virides. Bracteæ dorsales dolabiformes. Bracteolæ longitudine calycis, lineari-lanceolataæ. Corolla calyce paulo longior. (v. in h. Hooker).

26. *L. STRIATA* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 26 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76, Wall. cat. n. 7165), caule herbaceo foliisque oblongis utrinque acuminate subrepandis glabris, spicis in ramulo axillari brevi aggregatis capituliformibus, bracteis dorsalibus ellipticis quinque-septemnervibus bracteolisque cum calycibus quinquepartitis nervosis glanduloso-hirtis.  $\mathcal{L}$  In montibus Promæ regni Avæ (Wall.). Caulis procumbens, adscendens, flexuosus, glaber. Spicæ in ramulis axillaribus solitariis 2, 3 līu. longis duæ vel tres, semipollicares, aggregatae in capitulum tot paribus foliorum, quot sunt spicæ, lanceolatis decrescentibus obvallatum. Bractea superiores 3 līu. longæ, ellipticæ, quinque-septemnerves; inferiores fertilesque lanceolatae, trinerves, ubi dorsales septemnerves non raro 5 vel 7-nerves. Calycis lacinia superior 5 līu. longa, oblonga, quinque-nervis; duæ inferiores 4 līu. longæ, linear-lanceolatae, trinerves; media his paulo minores, linear-subulatae, uninerves Corolla 4 līu. longa, pubescens, pallida, immaculata. (v. in h. Wallich).
27. *L. RIEDELLIANA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 71), caule herbaceo foliisque lanceolato-linearibus acutis integerrimis glabris, spicis axillaribus solitariis sessilibus folio brevioribus quadrangularibus, bracteis subconformibus lanceolato-subulatis pungentibus triuervibus bracteolisque cum calycibus quinquepartitis subulatis nervosis glanduloso-pubescentibus.  $\mathcal{Z}$  In graminosis Serra de Diamantino, Septembri, et prope Cujaba (Riedel! in h. acad. petrop.). Accedit ad. *L. striatam* et *purpuricaulem*, sed tamen longius ab istâ et a reliquo distat bracteis fere aequalibus licet alternis fertilibus. Caulis gracilis,  $\frac{1}{2}$ -1 ped. altus, quadriquetus, glaber, inferne foliis denudatus. Folia 2 fere poll. longa,  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{4}$  līu. lata, sessilia, rigida, reticulata. Spicæ oppositæ, erectæ, rigidæ,  $1\frac{1}{2}$  poll. longæ, ex omni parte glanduloso-pubescentes. Bractea 3 līu. longæ, inferne  $\frac{2}{3}$  līu. vix late, rigidæ, basin versus imprimis pubescentes et ciliatae. Calycis lacinia superior bracteæ similis, paulo tenerior, tri-nervis, ut reliqua laciniae mucronato-pungens. Corolla 3 līu. longa, alba, cœruleo-punctata. (v. in h. petrop.)
28. *L. PURPURICAULIS* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 27 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 96), caule flexuoso herbaceo glabro apice pubescente, foliis lanceolatis longissime acuminate remote crenatis glabris, spicis conicis simplicibus vel subcompositis axillaribus, bracteis nervosis calycibusque hirsutissimis, calycis quinquepartiti laciniis inferis trinervibus.  $\mathcal{L}$  In montium jugo Taong Dong dicto regni Avensis (Wall.), prope Burhi Simar et Sivapura (Hamilt.!), circa Hurdwar (Wallich), in montibus Sivalenis et in Himalaya prope Nalu (Edgeworth!). *Ruellia purpuracaulis* Wall. cat. suppl. *Ruellia?* Nilbutia h. Hamilt. Wall. cat. n. 2366 d (sub *Ruellia mucronata*). *Ruellia tenuis* h. Hamilt. Wall. cat. n. 2366 e (sub *Ruellia mucronata* et in h. Hooker). *Ruellia mucronata* Wall. cat. n. 2366 c, d, f. Folia 4 poll. longa, 8-10 līu. lata, longissime acuminata, in petiolum brevem acute desinente, remote crenata seu potius sinulis exiguis acutis dissitis incisa, quorundem intervalla crenulas latas parum conspicuas exhibent, glabra, nec lineolata, penninervia. Spicæ in ramulo petiolo modo longiore modo breviore bifolio,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longæ, conicas. Rhachis saturate purpurea. Bractea circiter tres lineas longæ, oblongæ, aristato-acuminatae, rigidula, hirsutissimæ, quinque-nervæ, nervis basi purpureis. Calycis lacinia superior figurâ et magnitudine bracteæ communis. Corolla 5 līu. longa, glabra. (v. in h. Wallich, Mus. paris. a Jacquemont, Edgeworth etc.)
29. *L. DULCIS* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 30 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 96) caule herbaceo adscendente, foliis ovato-ellipticis in petiolum cuneiformem attenuatis supra hirtulis subtus ad costas scabris, spicis axillaribus oppositis sessilibus, bracteis dorsalibus herbaceis falcatis, fertilibus propriisque membranaceis, calycis quinquepartiti laciniis duabus inferis dimidiato-ellipticis.  $\mathcal{L}$  In montibus Promæ regni Avensis (Wall.). *Ruellia dulcis* Wall. cat. n. 7167. Caulis basi repens, pedalis. Folia cum petiolo pollicari 5-6 poll. longa,  $1\frac{3}{4}$ -2 poll. lata, acuta vel obtusa. Spicæ inæquales, altera  $1\frac{1}{2}$  altera vix  $\frac{1}{2}$  poll. longæ; superiores subglobosæ, crassæ, speciosæ, conicæ, a dorso

visæ pectinatæ. Bractæ dorsales semipollicares, oblongo-lanceolatæ oblique acuminatae, quinquenerves; bractæ ventrales fertilesque ellipticæ, acutæ, 4 lin. longæ, tri-quadrinerves. Calyx semipollicaris; laciniaæ duæ inferæ semiovatae, margine interno recto, nervo uno huic margini propinquo extrosum venoso-ramificato, superior duarum inferiorum simul sumptuarum ambitus ovalis, mediae linearis-acuminatae, duplo breviores, angustissimæ. Corolla semipollicaris, purpurascens?. (v. in h. Wallich).

30. *L. CUSPIDATA* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 31 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 97), caule fruticoso, foliisque ovato-ellipticis utrinque attenuatis pubescentibus, spicis terminalibus basi compositis densis glanduloso-pubescentibus, bracteis ovalibus trinervibus, bracteolis calycibusque spinoso-mucronatis, bracteis sterilibus angustioribus, calycis quinquepartiti laciniæ dorsali ovata inferioribus que ovalibus trinervibus. ♂ In Hurdwar (Wallich!) Bar in montibus Sivalensisibus (Edgeworth! n. 231). *Ruellia cuspidata* h. Heyn.! Wall. cat. n. 2405 a, b. Ramus epidermide caudida pubescentiæ tenui mollissimæ vestitus, tubo medullari satis amplio, dichotomo-ramosus, nodosus, teres. Folia principalia rami in petiolum semipollicare decurrentia, apice attenuata acumine obtuso, repanda; gemmarum axillarium et ramulorum folia in spicam intrantia,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longitudine, ovalia, in spinam acuminata, integerima, sessilia, utrinque molliter pubescentia. Calyx quinquepartitus; lacinia superior 5 (in fructu 6) lin. longa, oblongo-elliptica, duæ inferæ paullo altius connexæ, oblongæ, 4 lin. longæ; haec atque illa trinerves, spinuloso-mucronatae. Corolla 4 lin. longa, hirsuto-pubesca, ferrugineo-reticulata. (v. in h. Wallich).

β. *stenostegia*, bracteis oblongis basi minus ciliatis subconformibus densissime pubescenti-glandulosis, foliis præter costam glabris. ♂ In montibus Purimdar, Dusan, Octobri (Perrottet! in h. DC., Bombay) (h. Hooker ex h. Lambert). Erecta, ramosa,  $\frac{2}{3}$  ped. alta, flores pallide coerulei. (Perrott.)

31. *L. SPINOSA* (Wight herb.), caule fruticoso ramosissimo, foliis (parvis) sessilibus obovato-cuneiformibus integerrimis spinoso-mucronatis glabris, spicis subsolitariis axillaribus, bracteis bracteolis calycisque quinquepartiti laciniis majoribus conformibus subæqualibus acuminato-spinosis rigidulis subciliatis. ♂ Habitatio incerta. — N. ab E. ill. Lepidag. p. 32 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 97, Wight h. propr. n. 1972. *Barleria?* *spinosa* Wall. cat. n. 2497. Fruticulos spithameus, densissime ramosus, rigidus, ligno duro albido. Ramulorum gemmulae plurimæ, microphyllæ, ob foliorum mucrones prius explicatos quasi spinosæ. Folia approximata, patentia, rigida, 3- $\frac{3}{4}$  lin. longa, duas prope ab apice lineas lata. Spicæ in ramis vetustioribus, jam foliis orbatis, crebræ, revera axillares, ad speciem laterales, sessiles, semipollicares, ovatae, sursum secundæ, plerumque solitariae, vel e binis ternisve conflatae, arcte imbricatae. Bractæ, bracteolas et calycis laciniæ majores plurimis congrue, 5-6 lin. longæ, e basi latiore in acumen ejusdem fere longitudinalis recurvopatulum rigidum aristato-spiniforme attenuatae, uninerves. Bractæ et bracteolæ oblongæ. Calycis lacinia supera ovata, nervoso-striolata. (v. in h. Wight et Wallich).

32. *L. PUNGENS* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 33 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 97), caule fruticoso ramosissimo, foliis (parvis) sessilibus spinoso-dentatis, spicis binis ternisve capitulo-congestis axillaribus villosis, bracteis dorsalibus ovatis fertilibusque bracteolisque oblongo-lanceolatis rigidis apice spinosis, calycis quadripartiti laciniis mucronato-spinulosis, inferiore apice bifido. ♂ Locus natalis non adnotatus est. — Wight h. propr. n. 1973, ic. 2 t. 456. *Barleria?* *pungens* Wall. cat. n. 2498 a, b. *Acanthus pungens* h. madr. Wall. cat. 1. c. b. Frutex spithameus-pedalis, a basi fere dichotomo-ramosissimus, rigidus, pubescenti-tomentosus et scaber, in var. β tonento tenui strigiloso denso canescens, ligno duro albido. Folia 4-9 lin. longa, ovata vel ovato-oblonga, vel oblongo-cuneata, sessilia et cicatricem annularem cujusque paris post casum relinquentia, rigida, acuminata, utrinque in medio dentibus tribus ad quatuor

spinosis apiceque spinulâ longiore armata. Corolla 4 lin. longa. (v. in h. Wight et Wallich).

- β. foliis tomentosis aristisque spicarum brevioribus. — In apricis campes-tribus prope Tinnevelly urbem non longe a promontorio Commorin sitam (Wight!). Lepidagathis pungens Wight cat. n. 1973. Lepidagathis axilaris Wight h. propr. olim.
- γ. integrifolia, foliis margine edentulis cum caule pubescenti-hispidulis, spicis axillaris solitariis. — In Neelgherry montibus (Lechenault! in h. DC. ).

## II. ALIENÆ.

Antherarum loculi superne adfixi deorsum divergentes, folia dentata aut profundiis repanda.

33. L. INCANA; caule herbaceo procumbente puberulo, foliis oblongis obtusis basi acutis subrepandis glabris subtus pallidiis, spicis axillaris terminaliisque simplicibus brevibus basi involucratis, bracteis lanceolatis, bracteolatis linear-lanceolatis calycibusque mucronato-acuminatis herbaceis pilosis eglandulosis, calycis lacinia inferiori bipartita. (1) In vico prope Buitenzorg, Decembri (Blume!). Ruellia incana Bl. hort. buitenz. p. 85. Planta mollis et tenera. Folia in petiolum medioevo acute desinentes, subtus in secco statu albicantha, circiter bipinnicaria. Spicae subglobosæ, laxiusculæ, capituliformes, brevissime pedunculatæ, ad basin foliorum minorum pari suffultæ. Calycis laciniae non glandulosæ sed margine dorsoque etiam pilis longiusculis inspersæ, basi ex-pallidæ; superior lanceolata, trinervis, reliqua lineares, subæquales. Corolla calyce brevior. (v. in h. Nees).
34. L. LUZONA, caule herbaceo procumbente acute quadrangulo juvenili hirsuto, foliis ovatis acutiusculis subrepandis laxe hirsutis et basi rotundata abrupte in petiolum attenuatis, opposito minore, spicis terminalibus brevibus basi involucratis sericanti-hirsutis eglandulosis, bracteis fertilibus oblongo-lanceolatis trinervibus, bracteolis lanceolatis calycisque quinquepartiti lacinia majoribus lanceolato-linearibus herbaceis spinuloso-mucronatis. (2) Ad Manillam (Chamiso! n. 21 in h. gen. berol.). Canis basi repens, ejus latere in merithallis mediis sulcato. Folia unguicularia, septuplinervia; altercum cuiusque paris dimidio minus, breviore petiolo. Spica in nostris una, ex summi folii majoris angulo caulem terminans, folio ad basin uno pluribusve subsessilibus brevimucronatis. Corolla calyce paulo longior. Similis L. incanae. (v. in h. berol. )
35. L. SECUNDA, caule erecto acute quadrangulo glabro, foliis ovatis ovatoe lanceolatis acutis repando-crenatis supra pubescenti-seabris subtus in costis hirtis et basi rotundata abrupte in petiolum attenuatis, opposito minore, spicis terminalibus aggregatis brevibus involucratis sericanti-hirsutis eglandulosis, bracteis fertilibus lanceolatis mucronatis bracteolisque conformibus, calycis 5-partiti lacinia acutis muticis, majoribus lanceolatis chartaceis disco supero herbaceo. (2) In Insulis Philippinis: in horto domus parochialis Pasigensis in Mandolayon et Punta Santiago, Februario (Cuming! pl. philipp. n. 581 in h. Hooker et Bentham). Ruellia secunda Blanco fl. de philipp. p. 495. Proxima L. luzona, differt imprimis foliis angustioribus calycibusque muticis et bracteis haud nervosis minoribus. An var.? (v. in h. Cuming, Hooker et Bentham).
36. L. CEYLANICA (N. ab E. ill. Lepidag. p. 35), caule herbaceo trichotomo-ramosissimo subdiffuso foliisque oblongis utrinque attenuatis repandis dentatis glabris, spicis terminalibus in pedunculis bi-trifidis congestis, bracteis communibus conformibus ovalibus mucronatis trinervibus bracteolosique linear-lanceolatis calycisque lacinia mucronulato-acutis subtilissime ciliolatis pilisque rarioris glandulosus inspersis submembranaceis, antherarum loculis deorsum divergentibus. (2) In ins. Ceylon (Walker! in h. Hooker et Arnott). Folia inæqualia, cum petiolo 1-1½ poll. longo 5-2 poll. longa, 1½-1 poll. lata, oblonga, acu-

minata, iuæqualiter satisque confertim repando-dentata, suprema acutiuscula, subrepanda et minutim denticulata, inferiora in petiolum longum anguste cuneiformem attenuata; ramea minora, brevius petiolata, integrerrima. Rami florantes apice trifidi, ramulis lateralibus bifidis, medio trifido. Spicæ brevipedunculatae, subglobosaæ, fasciculiformes; terminalis major. Fasciculi bipartitæ, partialibus trifloris congestis. Bractææ communes 4-6 lin. longæ, 2½-2½ lin. latæ, ovales, præter magnitudinem præcedentibus non formæ. Bracteolæ ad basin singuli floris (subsessilis) tres, quarum inferior falcata, dimidiata, binervis, longitudine fere bractææ communis, duæ propriæ oppositæ, minimæ, setaceaæ. Calyx usque ad basin 5-partitus, lacinia acutis mucronatis et ciliolatis sicut bracteis; lacinia superior 4 lin. longa, lanceolata, 3-nervis; duæ inferiores breviores, lanceolato-lineares, binerves; medie his etiam minores, lineares, uninerves. Corolla circiter 5 lin. longa, purpurascens ?, glabra. Deser. in ill. Lepid. exhibita ad specimen minus completum confecta folia male designabat. (v. in h. Arnott et Hooker).

37. *L. FASCICULATA* (N. ab E. ill. Lepidag. p. 10 et in Wall. pl. as. rar. 3 p. 95), caule procumbente viloso glandulosoque, foliis oblongo-ovalibus utrinque acuminatis in medio dentatis hirsutulis, spicis capituliformibus racemosis axillaribus, bracteis dorsalis ellipticis acutis trinervibus glanduloso-pubescentibus.  $\mathcal{D}$  In Indiâ orientali. Caulis herbaceus. Folia tenera, 3 poll. longa, 1 poll. lata, a medio ad apicem sinuatim dentata. Pedunculi axillares, folio plerumque longiores, interior trifida. Spicæ subglobosaæ, vel pedunculatae vel sessiles, secundæ, plerumque quatuor. Bracteolæ lineares, inæquales, altera calycis longitudine, altera brevior. Calycis lacinia supera lanceolata, acuminata, trinervis, duæ inferæ lineares, mediae duæ subsetaceaæ, omnes altitudine æquales. Corolla 2½ lin. longa, purpureo-reticulata. (v. in h. Wallich).

$\alpha$ . foliis grosse dentatis.  $\odot$  In nemorosis prope Thermas Tranquemalenses Ceylonæ (Griffith ! h. madr.). Ruellia fasciculata Vahl! symb. 3 p. 82 et h., Willd. sp. pl. 3 p. 369, Pers. synops. 2 p. 177, Retz obs. 4 p. 28, Roxb. fl. ind. or. ed. 2, 3 p. 48, Wall. cat. n. 2394 a, c et 2406.  $\alpha^*$ . minor et laxior. — Ceylon (Walker ! in h. Arnott et Hooker). Lepidagathis hirta N. ab E. ill. Lepidag. p. 37.  
 $\beta$ . foliorum dentibus minoribus.  $\odot$  Ad ripas Attrâu et Saluen fluminum (Guil. Gomez!). Ruellia viscosa Wall. cat. suppl. olim.

38. *L. WALKERIANA*, glabra, caule herbaceo, foliis ovato-oblongis acuminatis obtuse dentatis basi in petiolum longe attenuatis integrerrimis, spicis axillaris trichotomo-compositis confertis pedunculatis folio brevioribus, bracteis herbaceo-chartaceis calyce duplo brevioribus calycisque laciñis exterioribus oblongis obtusiusculis trinervibus, bracteolis bracteis conformibus paulo angustioribus acutiusculis uninervibus.  $\mathcal{D}$  In ins. Ceylon (Walker ! in h. Hooker et Bentham), prope Kandy in Ceylon (Macrae ! in h. Hooker). Lepidagathis Zeylanica  $\beta$  N. ab E. ill. Lepidag. p. 35. Dissert a L. hirtâ glabritie, foliis majoribus, spicis dense thyrsoides e floribus capitatum compactis, bracteis (et calycibus) minoribus rigidioribus, corollâ breviore. (v. in h. Hooker et Beutham).

### *Species exclusa.*

*LEPIDAGATHIS REPENS* Spr. = Herpestis Monnieria prodr. 10 p. 400.

LXIV. *APOLEPSIS* Hassk. cat. hort. bogor. alt. p. 150. — Lepidagathis sp. Bl.

Calyx (inæqualis Lepidagathidis?). Corolla tubulosa, sursum ampliata, tubo incurvo, limbo quinquelobo, subæquali. Capsula tetrasperma. Inflorescentia spicata. — Herbæ perennes, Javanicae.

1. *A. REPANDA*, caule herbaceo adscidente geniculato-nodoso, foliis oblongis

utrinque acuminatis repandis glabris infra canescentibus, spicis axillaribus terminalibusque tetragonis, bracteis cuneatis coloratis.  $\mathcal{L}$  In ins. Java, ad ripas iu montosis Parang prov. Tjanjor, Maio, etc. (Blume).

2. A. DISPAR (Hassk. cat. hort. bogor. alt. p. 150), caule herbaceo basi suffrutescens erecto articulato nodoso, foliis inaequalibus, altero cujusque jugi quadruplo minore, ellipticis utrinque acuminatis margine crispato serratis supra asperis subtus glabris viridibus, inflorescentia spicato-paniculata axillari, spicis subtetragono-ovatis bracteosis.  $\mathcal{L}$  In ins. Java! (Hasskarl l. c.)

LXV. ÆTHEILEMA R. Br. fl. nov. holl. 1 p. 478, opp. ed. N. ab E. 3 p. 334, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 94 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 702, Meisn. gen. p. 295 (204.). — Micranthus Wendl. obs. p. 38. — Phaylospis Willd. sp. pl. 3 p. 342, Pers. synops. p. 168.

Calyx quinquepartitus, laciniâ superiore maximâ bracteiformi. Corolla bilabiata, labio superiore bifido, inferiore trifido, vel subringens, labio superiore integro vel minute bidentato. Stamina quatuor didynama, inclusa, per paria consociata; antheræ biloculares loculis parallelis contiguis. Capsula bilocularis bivalvis, ad basin tetrasperma, lateribus membranaceis, dissepsimento sponte in lamellas duas spermophoras secedente. Seminâ compressa. — Spicæ (vel racemuli) axillares terminalesve, foliosæ. Pedunculi brevissimi in axillis foliorum floralium alterni, ideoque secundi, 2-5-flori. Bractea communis lata. Bracteolæ proprie nullæ.

1. A. RENIFORME (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 94), caule herbaceo foliisque ovatis basi inaequalibus repandis pubescens, altero folio minore, bracteis reniformibus calycisque laciniâ superâ ovatâ membranaceis ciliatis.  $\mathcal{L}$  In montibus Promæ regni Avensis (Wall.), in Sillet (Fr. de S.), in Phuranbari (Hamilt.), Assam (Griffith ! in h. Hooker), Ceylon (Walker! in h. Hooker, Macrae et Bentham), in insulâ Madagascar (h. Willd. et paris.), Bourbon (Richard!), in Abyssinâ (Quartin Dillon ! in h. paris. et Nees), ad Port Natal in Africâustrali (Krauss! in h. Bentham), in Senegambia (Heudelot! in h. paris., Nees et Hooker). — Wight h. propr. n. 1967. Ruellia reniformis Wall. mss. Ruellia imbricata Vahl symb. 2 p. 73 (excl. syn. Forsk.), Willd. sp. pl. 3 p. 366, n. 13, berb. n. 11686!, Wall. cat. n. 2353 a-h. Ruellia dorsiflora Retz obs. 6 p. 31, h. Schreb. Ruellia imbricata et glomerata h. madr. Ruellia glutinosa Roxb. in h. Willd. l. c. fol. I. Ruellia justicioides Wall. mss. (Planta inflorescentia juvenili ante anthesin lecta.). Ætheilema parviflorum Spr. syst. 2 p. 826. Phaylospis parviflora Willd. sp. pl. 3 p. 342 et h. (specim. Wendl.), Pers. synops. 2 p. 168. Micranthus opositifolius Wendl. obs. p. 38 (in h. Willd.). Phaylospis glutinosum Don apud Steud. Ætheilema glutinosum Steud. nomencl. ed. 2 p. 32. Folia a basi maxime inaequali in acumen obtusum attenuata, flaccida, duo cujusque paris valde inaequalia, alterum (cum petiolo) 5-5½ poll. alterum vix 2 poll. longum. Rami axillares folio plerumque breviores, solitarii, alterni, spicigeri, foliis minoribus sed caulinis simillimis prædicti, quorum, superiora, et ea majora quidem alternis minoribus opposita, in axilla proferunt flores, communiter tres, brevissime pedicellatos, nempe duos in communi cum bracteâ pedicello positos et alterum solitarium ebracteatum. Bractea floribus amplior, obtusoque acumine donata, subinde etiam omnino orbiculata obtusaque integerrima, pallida, pulchre venoso-reticulata, 4 lin. longa, 5½ lin. lata. Calyxis lacinia superior ovalis vel ovata, obtusa, texturâ et vestimento bracteæ, 4 lin. longa, vix 3 lin. lata, cum fructu increscens. Corolla vix calyce longior, pallida, glabra, labio superiore paulo breviore. (v. in h. Wallich, DC., paris. etc.)

$\beta$ . hispida, caule foliisque magis hirsutis, floribus in ramis subverticillatis.

Iu ins. Madagascar, in insulæ Pombac montosis silvaticis (Bojer! in h. Hooker). *Ruellia hispidosa* Bojer! in h. Hooker.

2. *A. IMBRICATUM* (R. Br. fl. nov. holl. 1 p. 478, opp. ed N. ab E. 3 p. 334) canle herbaceo basi repente foliisque ovatis ovalive-oblongis inæqualibus repando-crenatis integerrimisque pubescentibus, altero folio minore, bracteis ovato-subrotundis calycisque laciniâ superiore oblongâ ovalive submembranaceis ciliatis.  $\mathcal{U}$  In Arabiâ Felici (Forsk.), Djennat in Arabiâ Felici (Botta! in h. Mus. par. et ex hot in h. Nees n. 207), in dumetis opacis inferioris et mediæ partis montis Scholodæ Abyssinie (Schimper), Sierra Leone (Siins), in promontorio Bon. Sp. (Drège), in insulâ Madagascar (Bojer! in h. reg. monac. et in h. Hooker). — Spr. syst. 2 p. 826. *Aethilema anisophyllum* Meyer cat. pl. Drèg., ann. 1837. *Barleria inæqualis* Hochst. in Schimp. it. abyss. un. itin. I, n. 367. *Ruellia petiolaris* Bojer! in h. reg. monac. *Ruellia imbricata* Forsk. descr. p. 113. *Phaylopsis longifolia* Sims in bot. mag. t. 2433. *Ruellia dorsiflora* Retz. *Ruellia imbricata* Forsk. *Blechum anisophyllum* Juss. Ab *A.* reniformi præcipue differt calycis laciniâ superiore oblongâ nec ovatâ; tum corollâ calyce dimidio saltem longiore. (v. in h. Hochstett., Hooker, paris., monac. etc.)

3. *A. minus*, caule valde flexuoso totoque repente, foliis minoribus, spicis terminalibus.  $\mathcal{U}$  In siccis insulæ Madagascar (Bojer!). *Ruellia* Boj. i. d. Quod ad habitum et spicas terminales *A.* rupestri persimile, differt bracteis majoribus calycibusque omnino ejusdem formæ ac in *A. imbricata*. (v. in h. monac. )

3. *A. RUPESTRE*, caule flexuoso basi repente foliisque ovatis æqualibus obtusis repando-subcrenatis pubescens, altero folio minore, racemo florum terminali paucifloro, floribus axillaribus 1-3 confertis secundis, bracteis orbiculatis obliquis calycis brevioribus, calycis laciniâ superiore oblongâ membranaceâ ciliatâ.  $\mathcal{U}$  In dumetis locis lapidosis circa urbem Tananarivou in insulâ Madagascar (Bojer! in h. DC.). *Ruellia geniculata* var. Bojer! (ex parte) in h. DC. et *Ruellia nniflora* Bojer! (1833) in eod. h. Caules filiformes, valde geniculati. Folii (Origani) cum petiolo 2-3 lin. longo pollicares. Calycis lacinia superior 4-4½ lin. longa, 1½ lin. lata; reliquæ lineares, 3-3½ lin. longæ. Bractæ 2 lin. longæ latæque, in petiolo brevem attenuatæ. Capsula omnino generis, 2 lin. longa. (v. in h. DC.)

#### *Species exclusæ.*

*A. ALOPECUROIDES* Spr. = *Teliostachya alopecuroides*.

*A. RIGIDUM* Bartl. = *Barleria solanifolia*.

*A. ROTII* Stend. omnino non extricanda, sed certo non hujus ordinis.

LXVI. *TELIOSTACHYA* N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 71. — *Aethilematis* spec. R. Br., Spr. — *Ruelliae* spec. auct.

Calyx quinquepartitus, laciniâ superiore tum duabus inferioribus majoribus. Corolla bilabiata, labio superiore obtuse bidentato, inferiore trilobo, lobis conformibus. Stamina quatuor didynama, subinclusa, per paria consociata; antheræ biloculares, loculis parallelis ovalibus altero altiore. Capsula bilocularis, bivalvis, ad basin tetrasperma, dissepimento rigido. Semina compressa. — Plantæ humiles, Americæ meridionalis et Indiæ occidentalis, tum et Africæ tropicæ occidentalis incolæ, perennes, multicaules, caulibus simplicibus ramosisive, foliis subintegerrimis. Spica densa, terminalis, verticillata, regularis, longiuscula, cylindrica, bracteis æqualibus omnibus fertilibus bracteolosique cum calycibus setaceo-acutatis. Flores parvi sub singulâ bracteâ plures, in fasciculos plerumque ternos bi-trifloros subsessiles distributi, singuli bibracteolati. Proximum genus

Lepidagathidi, differt magis inflörescentiā et habitu quam flore fructuque, Neuracantho affinis est habitu, differt calyce quinquepartito.

1. T. CATARACTÆ (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 72), canibus e rhizomate confertis, foliis ovali-oblongis brevi-petiolatis, spicæ verticillis discretis.  $\mathcal{U}$  In rupibus irriguis cataractæ Cupatensis, nec non in silvis ad Jui, Rio Japura tributarium, provinciæ Rio Negro, Januario, atque in campis ad Para provinciæ Paraënsis, Aprili (Martius!). Caulis primarius repens, fibris crassis intricatis. Rami erecti aut adscendentes, acute quadrangulares, purpurascentes, apicem versus pilis brevibus hispiduli, digitales vel paulo longiores. Spica terminalis, subinde et spicas axillares ex axillis superioribus, stricta, 1-2 poll. longa, basi foliosa et interrupta, superiora versus densa, tota setulis glandulosis conspersa, rigidula. Bractæ communis oblongo-lanceolatae mucronatae, trinervia. Calycis lacinia superior magnitudine et figurâ bractæ, at magis in aristam cuspidata, trinervia. Capsula lineâ 1 paulo longior, tetragona, glabra, pallida. Thymum Serpyllum e longinquo refert hæc species. (v. in h. monac.)
2. T. DIFFUSA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 72), caule repente, ramis geniculatis adscendentibus pubescenti-canis, foliis ovatis obtusis longe petiolatis supra hirtis subtus præsentim in costis strigiloso-pubescentibus, spicis axillaribus terminaliæ densi cylindrici, bracteis ovali-oblongis acuminitis calyce brevioribus.  $\mathcal{U}$  In prov. Minarum Generalium (Ackermann! in h. Mart.). Caulis 1½-1 ped. altus, valde geniculatus, ramis geniculatis. Folla cum petiolo 1½-2 poll. longa, in petiolum acute decurrentia, integririma, costis 5-6. Spicas circiter pollicares, brevipedunculatae. Bractæ et calyces birsutæ, illæ 5-nerves. Calycis lacinia dorsalis et duæ inferæ æquales, lanceolatae, nervosæ; laterales lineari-setacea. Corolla 3 lin. longa, pallida. Capsula 3 lin. longa. (v. in h. monac.)
3. T. ALOPECUROIDEA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 72), caule basi repente apice ramoso, foliis ovali-oblongis longe petiolatis glabris, spicis densissimis, calycis lacinia superiore obovali-oblonga.  $\mathcal{U}$  In Panama (Hænke), in insulâ Montserrat (Vahl!), in Guianâ gallicâ (Leprieur! in h. DC., Bentham, paris. etc., Perrottet! in eod. h. Mus. par. n. 165, in h. petrop.), in Guianæ anglicæ montosis arenosis ad R. Quitaro (Schomburgk! n. 553 in h. DC. in h. gen. berol. et Hooker), Surinam (Hostmann! n. 874 in h. Hooker), in insulis Guadeloupe (Lauth! in h. DC.), Portorico (Bertero! in eod. h. et h. gen. berol. Plée in h. Mus. paris. et Nees), ins. Trinitat. (Sieber! in h. DC.), ins. S. Dominico (h. Hooker!), ins. S. Vincent (h. Hooker!), ad flumen Ilheos in Brasiliâ (Blanchet! in h. Moricand). Ruellia alopecuroidea Vahl ecl. 2 p. 49, Sieb. fl. ins. Trinit. n. 137, Willd. sp. 3 p. 373, h.! n. 11653. Ruellia lagopodes Ryan! in h. Vahl. Justicia procumbens h. Thibaud in h. DC.! Atheliele Hænkei N. ab E. iu h. Hænk. Caulis geniculatus basi procumbens, fibris longis solitariis apice fasciculatim ramosus e nodis radicans, apice adscendens, quadrangularis, pubescens, ramosus. Folia 1½ poll. longa, obtusiuscula, integririma, utrinque pubescentia. Spicas in caule et ramis terminaliæ, sessiles, crassæ, 1½-1 poll. longæ, ovatae vel conicæ. Calycis lacinia posterior late ovalis, aristata, trinervia. Corolla pallide corulea, calyce vix longior. (v. in h. Vahl, Bentham, Hooker, paris., DC. etc.)
4. T. MICROCARPA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 73), caule diffuso foliisque oblongis in petiolum mediocrem decurrentibus subtus strigoso-hirtis, spicis densis basiæ interruptis, calycis lacinia superiore oblonga, capsula obovatâ calyce multo breviora.  $\mathcal{U}$  Ad Bareros in Brasiliâ (Pohl! in h. imp. vindob. n. 3062). Zahlbrücknera achyranthoidæ Pohl! ic. n. 3062 in h. vindob. Caulis pedalis et altior, laxus, geniculatus. Folia cum petiolo 2½ poll. longa, 6-7 lin. lata, basi cuneata, apice angustiora at obtusa, repanda. Spica terminalis, sessilis, cylindrica, cernua, 1-2 poll. longa, densa, vel, si

longior, basi interrupta. Calycis laciniæ majores  $2\frac{1}{2}$  lin. longæ. Corolla linea panlo longior. Capsula linea brevir. (v. in h. Moricand).

5. T. LAGUROIDEA, repens, ramosa, caule hirto, foliis longiuscule petiolatis oblongis acutis in petiolum decurrentibus subtus in costis hirtis, spicis brevibus densissimis, calycis lanciniâ superiore oblongâ, capsula oblongâ calyce breviore.  $\mathcal{U}$  In Acræ Africae occidentalis (Vogel in h. Hooker). T. alopecuroidæ minor, spicis brevioribus, cum ramis etiam repens, calycis laciniâ superiore angustiore nec vero breviore. An var.? (v. in h. Hooker).
6. T. LANCEOLATA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 74), caule repente ramis erectis foliisque lanceolatis in petiolum mediocrem longumve decurrentibus subtus (praesertim in costis) pubescenti-hirtulis, spicis densis basive interruptis, calycis laciniâ superiore oblongâ, capsula oblongâ calyce subæquante.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ (Lund! n. 354. in h. DC.), in locis inundatis Rio S. Joâo fluminis prov. Minarum Generalium, Junio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 1327), in prov. Minarum Generalium (Claussen! in h. Mus. par. n. 231 et 237 forma humilis), Maynas (Pœppig! in h. Mus. palat. vindob. n. 2262 B ex h. Endlicher, in h. acad. petrop. n. 2264 et in h. reg. gen. berol.). Differt a T. microcarpâ foliis angustioribus ( $2\frac{1}{2}$  poll. longis vix 6 lin. latis, pubescenti molliore et imprimis capsula oblongo-lanceolata (pubescente)  $1\frac{1}{2}$  lin. longa. Calyx 2 lin. longus, structuræ ejusdem ac in illâ, magis ciliatus. Bractæ lanceolatae, bracteolæ subulatae, calyce breviore, ciliatae. Flores albi ex Riedel. (v. in h. DC., monac., vindob., berol., petrop. etc.)

$\beta$ . *crispa*, caule foliorumque costis subtus hirsuto-canis, foliis recurvis margine undulato-subcrenatis repandisque.— Maynas in Peruvia et ad flumen Amazonum (Pœppig! n. 2240 in h. DC., et in h. gen. berol.)

Tribus VI. *ACANTHEÆ* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et in Lindl. intr. ed. 2 Sp. 285, Endl. gen. p. 702, Meisn. gen. p. 295.

Calyx quadripartitus, laciniis lateralibus angustioribus, raro 5-partitus, laciniis lateralibus paulo angustioribus. Corolla unilabiata, tubo basi cartilagineo. Stamina 4 didynama. Antheræ uniloculares (in Blephari par alterum biloculare), ciliatae barbatæve. Capsula prope a basi 4-spermia.

#### CONSPECTUS GENERUM.

LXVII. *Blepharis*. — Calyx 4-partitus. Spicæ laterales, unifloræ, bracteis pluribus sterilibus imbricatis sæpe setoso-ciliatis cinctæ. Staminum breviorum antheræ oblique biloculares, septo inter labia recondito. — India orientalis, Arabia, Africa tropica et australis.

LXVIII. *Dilivaria*. — Calyx 4-partitus. Spicæ plurifloræ. Corollæ tubus brevis, labium trilobum. Stamina conformia, recta. — India orientalis continens et insulæ, Africa australis.

LXIX. *Acanthus*. — Calyx 4-partitus. Spicæ plurifloræ. Corollæ tubus brevis, labium trilobum. Stamina breviora apice ad antherarum insertionem uncinatum inflexa. — Europa australis, Africa septentrionalis et media, Arabia, India orientalis elatior.

LXX. *Cheilopsis*. — Calyx 4-partitus. Spicæ plurifloræ. Corollæ tubus brevis, labium 5-lobum, ad basin utrinque labii superioris bi-

partiti laciniis adnatis auctum. Stamina conformia , recta. — Asia minor, Africa tropica.

LXXI. *Acanthodium*. — Calyx 4-partitus. Spicæ plurifloræ. Corolla tubus brevis , labium 5-lobum , basi planum. Staminum breviorum antheræ in filamento recto elongato laterales, stipitatae , filamenti apicis styliformis longitudine. — Arabia, Ægyptus, Nubia, Abyssinia, Africæ oræ occidentales, promontorium Bonæ Spei.

LXXII. *Acanthopsis*. — Calyx 4-partitus. Spicæ plurifloræ. Corolla tubus longus , labium 5-lobum. Antheræ in apice filamenti a tergo insertæ . fixæ. — Africa australis.

LXXIII. *Isacanthus*. — Calyx 5-partitus , elongatus , inæqualis. Spicæ paucifloræ. Antheræ conformes , erectæ. — Africa occidentalis tropica.

LXXIV. *Sclerochiton*. — Calyx 5-partitus , subinæqualis , laciniis obtusis. Flores axillares, solitarii. Antheræ conformes, erectæ. — Africa australis.

LXVII. BLEPHARIS Juss. gen. p. 103 , N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 97 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 703, Meisn. gen. p. 295, Harvey gen. of south afric. plants p. 275 (ex parte). — Acanthi spec. Linn. et auct.

Calyx quadripartitus, inæqualis, laciniâ inferâ et superâ latioribus, inferâ bidentatâ , basi bracteatus. Corolla unilabiata, labio trifido, fauce cartilagineâ , margine supero tridenticulato. Stamina quatuor subdividynama. Antheræ superæ uniloculares, loculo margine ciliato-barbato; inferæ oblique biloculares, septo communî inter labia, dum clausa, latente; staminum superiorum antheræ filamento adnatæ, inferiorum in filamento obtuso laterales, substipitatae vel sessiles. Capsula bilocularis, ad basin di-tetrasperma. Disseminationum adnatum. Semina retinaculis subtensa. — Herbæ Asiaticæ et Africanæ, suffruticose, repentes, hispidæ, foliis verticillatis inæqualibus. Spica bracteata , imbricata , bracteis inferioribus vacuis sæpe aristato-ciliatis. Flos terminalis bibracteolatus , bracteolis bracteis conformibus vel disformibus.

1. B. SETOSA , bracteis ovalibus glanduloso-seabris trinervibus spice 7-9-setis setis glochidatis, spicis sessilibus solitariis , caule suffruticoso foliisque linearifiliformibus supra canaliculatis scabris setisque patentibus hirsutis. ♂ ? Ad Aapjes Rivier in promont. Bou. Spei, Octobri (Burchell! in h. Hooker cum Calophane setoso). Persimilis, quod ad habitum, dicto Calophani, sed differt etiam steriliis, foliis semiteretibus supra profunde canaliculatis. (v. s.)
2. B. SATUREÆFOLIA ( Pers. syn. 2 p. 180 ), scaberrima , foliis quaternis oblongo-linearibus, bracteolis ovali-oblongi convexis apicem versus glochidiato-ciliatis. 2' In promont. Bon. Spei, in collibus graminosis Adowensisibus ad Grahamstown (Burchell! in h. Hooker), ad flumen Kat Rivier Febr. et ad Grahamstown (idem in h. Hooker n. 21 et in h. Bentham), in montibus fluminum Van Stadens rivier, Kaurizrivier, Krakakammæque jungo (Ecklon!), Uitenhage , tum in deserto Karro, in ripâ dextrâ fluminis Zwarde Kay Rivier, Tambukiland in campis mimoseis (Ecklon ! Drège!). Port Natal (Krauss). — Floret a Decembri in Maium. — Spr. syst. 2 p. 820, N. ab E. ac. afric. austr. in linn. 15 p. 360. Acanthus integrifolius Thunb. fl. cap. 2 p. 456 , Burchell! cat. geogr. pl. afr. austral. n. 1950 in h. DC., Willd. sp. pl. 3 p. 399 , h. Vahl! (spec. Thunb.). Blepharis integrifolia c ! Meyer cat. pl. Drèg. ann. 1837 ! in h. DC. Flores lutei. Caulis filiformis, hispidus.

Folia oblongo-lanceolata, subquaterna, hirta. Setæ bractearum purpurascentes. Bracteolæ intimæ exiguae, subnudæ. (v. in h. Ecklon, Drège, Vahl, Willd., DC. etc.)

*ß. latifolia*, foliis inferioribus ovalibus superioribus ovali-oblongis. — Keur-booms rivier in promontorio B. S. Julio (Mund! et Maire in h. gen. berol. sub Acantho integrifolio). Blepharis integrifolia a ! E. Meyer in cat. pl. Drèg. ann. 1839. (v. in h. berol. et Drège, tum cult. in h. b. monac.)

3. B. MOLLUGINIFOLIA (Juss. Pers. synops. 2 p. 180), setoso-hispida, caule repente, foliis quaternis oblongo-sublinearibus margine densissime serrulato-scabris, duobus oppositis dimidio minoribus, floribus axillaribus alternis sessilibus, bracteolis cymbiformibus setaceo-acuminatis setoso-ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali (Vabl!), in aridis nemorosis apud Madras et in Circars (Wight!), in Monghir (h. Hamilt.), Tjangore (h. monac.). — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 97, Spr. syst. 3 p. 820, h. Willd. n. 11733, Wall. cat. n. 2514 a, b, c, d, Wight h. prop. n. 1914! Dietr. synops. 3 p. 594. Blepharis repens Roth nov. pl. sp. p. 321. Acanthus repens Vahl symb. 2 p. 76 et h.! Willd. sp. pl. 3 p. 399. Folia majora semipollucaria, margine per se quidem integerrima, sed confertim scabrido-serrulata. Spicae axillares, sessiles, grani tritici magnitudine, lanceolatae. Bractæ quatuor parium imbricatae; primi paris semilinearæ, orbiculate, cuspidatæ, uninerves; secundi 1 linearæ longæ, orbiculatae, trinerves, apice quinquesetæ setis glochidiato-scabris, adjecto acuminæ; tertii paris 1 $\frac{1}{2}$  linearæ longæ, ellipticæ, trinerves, 5-6-setæ, acuminæ trisetæ; quarti paris 2 $\frac{1}{2}$  linearæ longæ, obovato-ellipticæ, trinerves similiterque 6-setæ, acuminæ trisetæ. Sequitur flos bibracteolatus. Bracteolea duas 4 lin. longæ, navicularæ, aristato-acuminatae, margine membranaceæ, venis transversis pietæ. Calycis lacinia transversaliter venulosæ, membranaceæ, scabrae; lacinia superior 4 linearæ longa, oblongo-lanceolata, mucronato-acuta, trinervis; reliqua paulo breviores et inter se æquales; inferior oblonga, apice bidentata, binervis. Corolla 4 $\frac{1}{2}$  lin. longa, alba; labium cuneiforme, trilobum; lobi labii obtusi; medius angustior. (v. in h. Wallich! Wight, Vahl, monac. etc.)

4. B. BOERHAAVIÆPOLIA Juss. (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 97), pubescens vel pubescenti-scabra, caule repente, foliis quaternis ovato-rhombeis oblongis repando-subdentatis, dentibus muticis vel subtilissime micronulatis, duobus oppositis minoribus, floribus axillaribus sessilibus pedunculatis, bracteolis cuneiformibus planis, apice setaceo-ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali. Folia ex ovato-rhombea, basi cuneata, apicem versus irregulari modo repanda, dentibusque magis minusve conspicuis paucis distantibus obtusis muticis vel brevi mucronulo præditis instructa, obtusa cum vel sine mucronulo, utrinque, ut caulis, pubescentiâ brevi canescenscens scabra, 1 $\frac{1}{2}$  pollicem longa, brevipetiolata. Spica  $\frac{1}{2}$  poll. longa, Blepharidis molluginifoliæ spicæ plus dupla major. Aliæ spicæ sessiles, solitariae vel geminae; aliæ longe pedunculatae, plerumque in apice pedunculi ternæ, pedunculis lateralium brevibus, ex axillis bractearum primi vel secundi paris spicæ mediae prodeuntibus. Bractæ quinque parium; infimi integerrimæ, uninerves, secundi denticulatae et ut reliquarum trinerves, hæ fere orbiculatae; que sequuntur ex obovato cuneiformes 8-10-12-setæ cum mucrone brevi recto trisetæ. Bracteola calyce breviores, cuneiformes, octo-setæ, mucronulo terminali brevissimo. Calycis lacinia superior ovato-oblonga, acutiuscula, nervoso-venosa; inferior oblongo-lanceolata, obtusa, binervio-venosa, 5 lin. longa. Corolla  $\frac{1}{2}$  poll. longa, alba, purpureo-lanata maculâque labii inferioris oblongâ sulphureâ. Labium obovatum, trilobum.

$\alpha.$  *ciliaris*, foliis subdentatis dentibus submuticis. (v. in h. Vabl, Wallich, Edgeworth, DC. etc.)

$\alpha^*$ . foliis minoribus subovatis mucronatis.  $\mathcal{L}$  In aridis insulæ Ceylon (Burm.), in Indiâ orientali (Jussieu, Persoon), in sepibns et nemoribus provinciarum Tangore, Madras et Chingliput (Wallich! Shuter! in h. DC.),

in Madras (Griffith!), in Avā Octobri (Gomez! in h. Wallich), in ruinis prope Tuglihabad, Rohicand, Januario (Edgeworth!), ad Metapalum (Schmidt! h. DC. ex h. Puer.), in Arabiā Felici (Forskol! in h. Vahl). *Acanthus ciliaris* Garcin. Burm. fl. ind. p. 139 t. 42 f. 2 (excl. syn. Pluck.). *Acanthus maderaspatanus* h. Vahl! *Blepharis boerhaaviaefolia* Juss. Pers. syn. 2 p. 180 (excl. syn. *Acanth. maderaspatani* Linn. et Pluck.). *Blepharis maderaspatensis* var.  $\beta$  Roth nov. sp. pl. p. 320. *Acanthus maderaspatensis* Willd. h. n. 11734! *Blepharis procurrens* Heyne apud Roth l. c. *Blepharis boerhaaviaefolia* Wall. cat. n. 2513 b (ex h. Hamilt. et Heyn!) n. 2513 c ex h. Wight! et d. in h. DC. partim, Wight! h. propr. n. 1975, ic. 2 t. 458, Edgeworth! h. n. 234 ex parte (v. in h. Wallich, Wight, Edgeworth, Hooker, DC. etc.).

$\alpha$  \*\* foliis ovato-oblongis apice plus minus attenuatis obtusis cum mucronulo, superioribus subinde acuminatis. — In Promæ montibus ad ripas Irrawaddi fluminis (Gomez! in h. Wallich), in Himalayā alt. 2000-3000' (Edgeworth), in insula Ceylon (Forsyth! in h. DC.), in petrosis sciccis mediae et inferioris regionis australis montis Scholoda Abyssiniae (Schimper, Quartin Dillon! in h. paris. et Nees), in Senegambia (h. Hooker!), in arenosis insulae Sor (Heudelet! in h. Mus. paris. et Nees), in Guineā (Thonning! in h. Vahl). *Blepharis boerhaaviaefolia* Wallich cat. n. 2513 a. Edgeworth! h. n. 234 ex parte. *Blepharis abyssinica* Hochst. in Schimper it. abyss. I n. 247, 1492 et 1895. Specimina abyssinica ciliis bractearum prælongis differunt, ceteris congruunt. (v. in h. Wall. etc. ut supra).

$\beta$ . *maderaspatensis*, foliis oblongis, dentibus paulo crebrioribus evidentiis mucronatis, subtus plus minus canticantibus, in aliis integerrimis, bracteis minoribus arctius imbricatis, apice densitus rigidiusque ciliatis. — In Dumroong et in horto calcutensi (Wallich), ex India orientali (Leschenault! et Jacquemont! in h. Mus. paris. et Nees; ex h. Puer. in h. DC.!) *Acanthus maderaspatensis* Linn. syst. p. 485, Willd. sp. pl. 3 p. 400, h. Puer. in h. DC. *Blepharis maderaspatensis* var.  $\alpha$  Roth nov. sp. pl. p. 320. *Blepharis boerhaaviaefolia* h. Hamilt.! ex hort. bot. calo. *Blepharis rubrifolia* Schuhm. in dansk. videnskab. selsk. afh. 4 p. 66 et in h. Vahl! *Melampyro affinis tetraphylla gangetica*, floribus inter folia sparsis Pluk. alm. t. 99 f. 3. *Adhatoda maderaspatensis*, calyce barbato, foliis subtus villosis Pet. mus. p. 23. An spec. propria? (v. in h. Wallich, DC., Mus. paris. et Nees).

5. B. ABLEPHARA, caule repente pube subtili reflexa scabro, foliis quaternis obovato-oblongis obtusis muticis basi attenuatis integerimis seahirsutulis subtus pallidioribus, duobus oppositis dimidio minoribus, floribus axillaribus sessilibus, bracteis oblongo-lanceolatis subcymbiformibus mucronulatis mollieri ciliatis.  $\mathcal{U}$  In ins. Java (Labillardière! in h. Moricand). Quod ad habitum accedit B. boerhaaviaefolia cuiusdam minori, differt bracteis (6 sursum magnitudine crescentibus) minime spinoso-ciliatis sed ciliis subtilissimis e pubescentia constantibus cinctis. Bracteæ inferiores minores, 3-nerves. (v. in h. Moricand).

6. B. ASPERRIMA, bracteolis propriis quaternis basi albidis viridi-reticulatis alternis cuneiformibus trifidis lanceolatisque, foliis oppositis.  $\mathcal{U}$  In montosis Purimdar circa Gagwor (Poonah), Octobri (Perrottet! in h. DC., Jacquemont! in h. Mus. paris. et Nees), Decan prope Guspora (Edgeworth! in h. Bentbam). *Justicia aspera* Perrottet in litt. *Caulis herbaceus*, suberectus, 1-pedalis. Folia oblonga ovatæ, brevissime petiolata, subintegerimis aut remote denticulata spinulis parvis setaceis ciliata et in utrâque paginâ setulis brevibus rigidis scaberrima. Flores axillares, oppositi, solitarii vel gemini, brevissime pedunculati. Bracteæ omnes apice virides, basi coloratae et venosæ: duas exteriores et paulo inferiores lanceolatae, tum quatuor fere in circulo dispositæ, scil. duas exteriores latiores, obconicæ, apice trifidæ, lacinia longis subulatis rectis, duas angustiores linearis-lanceolatae, acutæ. Calycis lacinia

majores involucro longiores, oblongæ, inferior conniventibidentata, inferiores lanceolato-subulatæ. Corolla cœrulea, labio trilobo, lobis brevibus rotundatis, medio paulo minore retuso. ( v. in h. DC., paris. et Bentham ).

*Species dubia, a genere aliena.*

B. CALAMINTHÆFOLIA ( Pers. synops. 2 p. 180 et Spr. syst. 2 p. 820 ), foliis ovatis integerim spuosis, floribus axillaribus, caule fruticoso. ( h. Juss. )

*Species exclusæ.*

B. ARBOREA Spr. = Cheilopsis arborea.

B. CAPENSIS Pers. et Spr. = Acanthodium Capense.

B. EDULIS Pers. et Spr. = Acanthodium spicatum.

B. FURCATA Pers. et Spr. = Acanthodium furcatum.

B. GLOMERATA Poir. = Acanthodium procumbens.

B. LINEARLÆFOLIA Pers. et Spr. = Acanthodium hirtum var. β.

B. PROCUMBENS Pers. et Spr. = Acanthodium procumbens.

LXVIII. DILIVARIA Juss. gen. p. 103 N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 98 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 703 Meissn. gen. p. 295 ( 204 ). — Acanthi spec. Linn. et auct.

Calyx quadripartitus, laciniis superiore et inferiore paulo majoribus integris basi callosis. Corolla unilabiata, labio trilobo, palato convexo incrassato, margine supero integrerrimo. Stamina quatuor didynamica. Anthere omnes uniloculares, margine barbato-ciliatae, adnatae; filamenta conformia, recta. Capsula bilocularis, compressa, a basi ad medium tetrasperma, lateribus chartaceis, dissepimentum ligneum unisulcum, a valvis secedens, apice dilatatum oblique truncatum. Semina cordato-ovata, compressa, tuberculata. Retinacula crassa, obtusa, rectiuscula. — Frutes Indici et Africani, riparii, erecti, foliis plerumque spinosis dentatisque. Spicæ aphyllæ. Flores bracteis plerique etiam bracteolis mediocribus integrerrimis conformibus instructi. Flores speciosi.

1. D. ILICIFOLIA ( Juss. gen. p. 103 ), spinosa aut subinermis, glabra, foliis ellipticis sinuato-dentatis spinosis undatis in petiolum brevem acute desinentibus, spicæ multifloræ, floribus bracteatis bracteolatisque. ♂ In Indiæ locis maritimis, in salsis uliginosæ provinciæ Tanjore frequens ( Wight ! ), in Penang ( Wallieh ! ), in paludosis salsis prope Mahé in Karikal, a Decembri in Martium ( Perrotet ! in h. DC. ), ad Gangetem ( Gaudichaud ! ibid. n. 254 ), in Ceylon ( Macrae ! in h. Benth. ), hort. bot. calc. ( Wall. l. c. n. 2511 b, h. DC. ), Calcutta ( Lady Dalhousie ! in h. Hooker ), Mergui et Assam ( Griffith ! in h. Hooker ), China ( Maeræ ! Gaudichaud ! in h. DC. Vachell ! in h. Bentham, Callery in h. Mus. paris. et Nees ); in terris adluvialibus paludosis insulæ Javæ, floret omni tempore ( Blume, La Haye ! et Labillardière in h. DC. ) in insulâ Manillâ ( Chamisso ! in. h. gen. berol. ) — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 98. Wight h. prop. n. 1976 et ic. 2 t. 459, Pers. syn. 2 p. 179 n. 1, Heyne h. Wall. cat. n. 2511 d. Nomen javanic. Galli galli ( Blume ). Acanthus Dolvaria Blanco fl. de philipp. p. 487. Acanthus ilicifolius Blume bijdr. p. 806, Linn. sp. pl. p. 892, Willd. sp. pl. 3 p. 398, h. Willd. ! n. 11730, h. Vahl ! Spr. syst. 2 p. 819, Mill. dict. n. 5, Osb. it. p. 92, Burn. fl. ind. p. 138, R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 480, cd. N. ab E. p. 336, Wall. cat. n. 2511 b, d, e. Acanthus malabaricus, Agrifolii folio Petiv. sicc. n. 10, gazoph. t. 94 f. 15. Aquifolii facie arbor malabarica, Acanthi florc albo cucullato Plukn. phytogr. p. 38, alm. t. 264 f. 4. Frutex indicus spinosus, foliis agrifoliis, siliquâ geminata brevi Raj. hist. p. 1766. Carduus aquaticus, seu Indorum Dilivaria Kamel. Iuz. p. 6 n. 16. Raina

schulli Rheed. h. mal. 2 p. 93 t. 48. Frutex glaber, 2-4-pedalis, ramis suban-

cipitus. Folia omnino fere ilicis Aquifolii. Spinæ duæ, rectæ, acutæ, una utrinque juxta basin petioli; rarius caulis inermis. Flores in spicis axillaribus et terminalibus per intervalla magis approximati, sessiles. Bractæ calyce bre-

viores, scariosæ; communis ovato-triangularis, mucronata; propriæ conformes, sed angustioræ. Calycis laciniaæ majores 7 lineas longæ, ovatæ, acutiusculæ, crasse chartaceæ, subtiliter striatæ, margine lacero-ciliolatæ, superior amplectens inferiorem; interiores ellipticæ paulo breviores; omnes basi callosæ, lâves. Corolla Acanthi mollis, rosea; tubus et filamenta cartilaginea, lâvia; labium amplum, undulato-trilobum, palato luteo-barbato. Anthere rigidæ, unilocularæ, obtusæ, incurviusculæ. Stylus glaber, basi incrassatus, quadrangularis. Capsula 1½-2 poll. longa, nitide castanea. Semina magna, oblique cordiformia, tuberculato-rugosa. Dissepimentum rubrum liguosum. Retinacula basi dente setaceo. (v. in h. Wallich, Wight, Vahl, DC. etc.)

$\beta$ . *heterophylla*, foliis superioribus lanceolatis aut lineari-lanceolatis elongatis basi cuneatâ truncatis dentatis superius, summis ex toto integerrimis. Quilon. (Wight cat. 1836. n. 804.)

$\gamma$ . *subintegra*, foliis integris basin versus denticulo uno altero, spinuloso. — In insulâ Java (Junghun !) — Ne cum sequente specie confundas, cave. Differt ab istâ bracteolis obvios; differt a formâ communi foliis subintegerrimis spinulis aliquot basin versus loco dentinum præditis.

$\delta$ . *micrantha*. — In districtu Uitenhage promontorii Bonaë Spei (Wendemann). A D. ilicifolia Indiæ orientalis haud differt, nisi flore duplo minore.

2. D. *EBRACTEATA* (Juss. Pers. syn. 2 p. 179), fruticosa, inermis, glabra, foliis oblongis basi cuneiformibus repando-dentatis spinosis (integrivæ), spicâ multiflorâ, floribus ebracteolatis. ♂ In Indiâ orientali et Cochinchinâ: ad Chappedong flumen (Guil. Gomez!), circa Malaccam (h. DC. ex h. Delessert). — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 98. *Acanthus ebracteatus* Vahl symb. 2 p. 75 t. 40 et h.! Willd. sp. pl. 3 p. 399, Spr. syst. 2 p. 819, Wall. cat. n. 7159. *Acanthus ilicifolius* Lour. fl. cochinch. ed. Willd. 2 p. 455? *Aquifolium Indicum* Rumph. h. amb. 6 p. 163 t. 71 f. 1. Differt a D. ilicifolia foliis multo longioribus angustioribus basi cuneatim angustatis minus undatis levius sinuatâ, caule inermi, bracteolis deficiensibus; reliquis maxime congruit. Flores paulo minores videbantur. (v. in h. Wallich et DC.)

3. D. *SCANDENS*, fruticosa, inermis, glabra, volubilis, foliis obovato-oblongis integerrimis, floribus ebracteolatis. ♂ In æstuariis Gangetis et fluminum Martabanâ, floret sub pluviosis (Wallich!), Mergui (Griffith! in h. Hooker), in littoribus æstuariorum Javae et insularum Moluccarum (Rumphius). *Acanthus volubilis* Wall. pl. as. rar. 2 p. 56 t. 172. *Acanthus ebracteatus* Blume bijdr. p. 806. *Aquifolium Indicum femina* Rumph. h. amb. 6 p. 163 t. 72 f. 2. Differt a præcedente evidentissime: caule volubili et foliis integerrimis. Corolla 10-11 lin. longa, rosea. Bractæ calyce longiores. (v. in h. Hooker).

### Species exclusa.

D. *HORRIDA* N. ab E. in Linn. = *Acauthopsis horrida*.

D. *POLYSTACHYA*. Dietr. = *Cheilopsis polystachya*.

LXIX. ACANTHUS Linn., Juss. gen. p. 603. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 98 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 703, Meisn. gen. p. 295 (204).

Calyx quadripartitus, laciñis superâ et inferâ multo majoribus, hac spicâ bifidâ. Corolla unilabiata, labio trifido vel trilobo basi quandoque auriculato, margine supero integerrimo in paucis 5-lobo. Stamina quatuor

subdidynama; filamenta infera apice inflexa; antheræ omnes uniloculares, ciliatæ, superiores erectæ, inferiores in filamento unco transversæ. Capsula bilocularis, compressa, a basi ad medium tetrasperma, lateribus chartaceis. — Herbæ vel frutices in regione Mediterraneâ Europeæ et in Asiâ et Africâ tropicâ crescentes, foliis Cardui, plerisque pinnatifidis spinosis. Spica terminalis, speciosa bracteata, aphylla; flores cœrulentes vel albi, magni, tribracteati, bracteâ communâ setaceo-ciliatâ.

1. A. LEUCOSTACHYUS (Wall. cat. n. 2512, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 98), foliis oblongis subrepandis spinoso-dentatis, costis subtus valde propinulis cauleque ramentaceo-tomentosis, labii lacinia emarginatis.  $\mathcal{L}$  In montibus prov. Sillet (Wallich!), Assam (W. Griffith!). Caulis pedalis, ex inferis articulis repens, simplex, tetragonus, pilis viscidis mollibus dense intertextis vestitus. Folia dentibus plurimis spinuloso-setaceis quasi ciliata, supra glabra, costâ venisque immersis, subtus iisdem maxime protuberantibus et viscidō-tomentosis rugosa, inferiora obtusa, superiora acutiuscula. Spica  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, omnibus partibus dense pubescenti-scabris. Bractea communis ovato-elliptica, aristato-acuminata, margine apicem versus uno altero ventre setaceo prædicta,  $4\frac{1}{2}$  lin. longa. Lacinia calycis superior et inferior oblongo-lineares; illa 8 lin. longa, obtusa cum mucrone, trinervis, hæc paulo brevior, binervis, apice brevi spatio bidentata. Corolla  $\frac{3}{4}$  poll. longa, alba. (v. in h. Wallich et Hooker).
2. A. DIOSCORIDIS (Linn. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 398), foliis lanceolatis integris cauleque pubescentibus, inferioribus subintegerrimis margine spinoso subdentatis, superioribus spinuloso-dentatis, spicâ densâ oblongâ, bracteis ovatis acuminatis apice spinuloso, marginibus subulato-spinosis.  $\mathcal{L}$  In Libano (Linn.), in Cappadociâ ad Euphratem (Aucher-Eloy! n. 2698 in h. DC. et Hooker n. 268), Kurdistan (h. gen. berol. ex h. Lindl., Strangways! in h. Bentham), in Persia (Aucher! n. 2181 in h. DC.). Corollæ labium tenerius et paulo latius quam in præcedentibus. Variat pubescentiâ plus minus densâ. (v. in h. DC., Hooker, berol. etc.)
3. A. MOLLIS (Linn. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 397), foliis latis cordatis pinnatifido-sinuatis lyratisque subpubescentibus inermibus laciinis angulato-dentatis, spicâ elongatâ laxisculâ pubescente, bracteis ovalibus subspinoso-inciso-dentatis apice spinuloso-mucronatis.  $\mathcal{L}$  In Dalmatiae, Istriæ, Italiae, Sicilie, Sardiniae Galliae merid. humentibus duris rupestribusque, in fossis arcis Perpignan (Endress! in h. Mart.). — Sibth. fl. gr. t. 610, Sabb. hort. rom. 3 t. 13, Lam. ill. t. 550 f. 2, h. Willd. n. 11726 fol. 2, Vahl!, DC.! fl. fr. 3 p. 493, Reichenb. fl. germ. excurs. 1 p. 364, Host fl. austr. 2 p. 216. Foliis inermibus circumscriptione ovatis, laciinis superioribus contiguis angulatis distinctus a reliquis. Hujus loci probabiliter Acanthus a Dioscoride laudatus. Sub Acantho Virgilii certo Ilex Aquifolii intelligenda est.
  - $\beta$ . *niger* (Willd. l. c. et h. n. 11726 fol. 1), foliorum deutibus spinuloso-mucronatis, foliis subinde pinnatipartitis laciinis angustis pinnatifidis. — Cum præcedente: in Algeriâ, locis umbrosis (Bové! in h. DC.). Bonifacio in Corsicâ (h. Mart.). Acanthus spinulosus Host fl. austr. 2 p. 217. Acanthus sativus vel mollis Virgilii h. Schreb.! fol. 1. (v. in h. Willd., Vahl, DC., berol. etc.)
4. A. LONGIFOLIUS (Host fl. austr. 2 p. 217!), foliis radicalibus elongatis pinnatipartitis glabriusculis, rhachi alatâ, laciinis æquidistantibus rhombœ-ovatis inciso-dentatis basi abrupte coangustatâ cum alâ rhacheos confluentibus, spicâ oblongâ densâ glabrâ, bracteis ovatis spinoso-inciso-dentatis acuminatæ latisculo brevimucronata.  $\mathcal{L}$  In Dalmatiae memoribus (Host!), prope Fiume Graf! et Noé! in h. gen. berol.), prope Ragusam (Feuzl! in h. Mart.). Acanthus mollis Graf! et Noé! l. c. Fenzl! in h. Mart. Species est foliorum formâ distinctissima. Affinis Acantho molli. Folia suprema lyrato-pinnatifida,

basi pectinata lacinii angustis apice mucronatis subulatis integerrimis, superioribus lanceolatis angulato-subdentatis. (v. in h. berol. et Mart.)

**A. SPINOSUS** (Linn. sp. pl. ed. Willd. 3 p. 398), foliis pinnatifidis cauleque pubescentibus, laciuiis triangulari-acuminatis patentissimis profunde dentatis apice dentibusque spinosis spinis brevibus albidis, spicâ densâ villosulâ, bracteis ovatis acuminatis rectis margine spinoso-dentatis.  $\mathcal{U}$  In Asiâ minore et Europâ Mediterraneâ. — Reichenb. fl. excurs. 1 p. 364, Sabbat. hort. rom. 3 t. 14, Lam. ill. t. 550 f. 1, Host fl. austr. 2 p. 217, h. Willd. n. 11729 fol. 2 et 3 h. Vahl! Folia lanceolata, laciuiis harumque dentibus apice neque in pagina spinosis. Flores minores quam in A. spinosissimo.

$\alpha$ . spicâ elongatâ subinde glabrescente. — In Syriâ (Aucher-Eloy! in h. DC.), in monte Tauro (Kotschy pl. cauc. n. 404, h. DC., h. Hooker!).

Acanthus spinosus (h. Willd. n. 11729 fol. 2 et 3).

$\beta$ . minor, ( $\frac{1}{2}$ -1 ped. altus), caule folijs vix altiore sæpe, hirsuto, spicâ ovali densissimâ magis hirsutâ. — In Oriente (Rousseau! in h. DC.); in insula Rhodo (Aucher-Eloy! n. 1321 et 2699 in h. DC. et Hooker n. 2662 et 2669), in Cariâ (Boissier! in h. DC. et Pinard!), in Bannatu (Sadler, Reichenb.). Acanthus hirsutus Boiss.! diagn. 4 p. 85. Pinard! in h. Hooker. (v. in h. Vahl, spec. Forsk., in h. Willd., DC., Hooker, etc.)

**A. SPINOSISSIMUS** (Desf. hort. parisi.), foliis pinnatipartitis glabriusculis undique valide spinosis, laciuiis distantibus linearibus pinnatifidis, spicâ elongatâ laxiusculâ pilosâ glabrescente, bracteis ovato-lanceolatis acuminatis recurvis rigidis acuminè canaliculato spinoso, lateribus valide quadrispinosis.  $\mathcal{U}$  Ad viarum margines et latera collum circa Acropoli insulæ Zante (Margot! in h. DC.); ad mœnia Castel Nuovo Dalmatiae (Ehrenberg! in h. gen. berol.), ad vias inter agros prope Salona Dalmatiae (Fenzl! in h. Mart.), Canea (h. gen. berol.!), Naupliam (h. reg. monac.!), Spalatro in Dalmatiâ (Petter! Biasoletto! in h. DC., Alexander! in h. Hooker). — Pers. synops. 2 p. 179, Reichenb. fl. excurs. 1 p. 364, Host fl. austr. 2 p. 218, h. DC., h. Willd. 11729, fol. 1. Acanthus spinosus Spr. syst. 2 p. 819 et Dietr. syst. 3 p. 819? Acanthus spinosus Birol! in h. gen. berol. ex hort. reg. berol. Foliorum laciuiis angustis distantibus pinnatifidis, nervis laciiniarum induratis longe productis spuisque igitur foliorum et bractearum, præsertim harum acumine, validissimis longisque ab Ac. spinoso differt. Spica sæpe pedalis. Rachis hirsuta; caulis autem glabrescens. (v. in h. DC., berol., monac., Hooker, etc.)

$\beta$ . mollior, foliis pinnatifido-sinuatis spinoso-dentatis, spinis brevioribus, nervis laciiniarum parum vel non induratis, bracteis ut in  $\alpha$ , dentibus acumineque paulo brevioribus. — Locis humidis umbrosis circa Hyères, Julio (Riedel! in h. gen. berol.). Acanthus mollis Riedel! l. c. (v. in h. gen. berol.)

#### Species dubia.

**A.?** RUBENS Raf. fl. lud. p. 36.

**A. TETRAGONUS** R. Br. in Salt abyss. R. Br. opp. ed. N. ab E. 1 p. 249.

#### Species exclusæ.

**A. ARBOREUS** Forsk. = Cheilopsis arborea.

**A. CAPENSIS** Linn. = Acanthodium Capense.

**A. CARDUIFOLIUS** Thunb. = Acanthodium carduifolium.

**A. CILIARIS** Burm. = Blepharis boerhaaviæfolia  $\beta$ .

**A. DELILII** Spr. = Acanthodium spicatum.

**A. EBRACTEATUS** Vahl = Dilivaria ebracteata.

**A. EDULIS** Forsk. = Acanthodium spicatum.

- A. **FURCATUS** Linn. = Acanthodium fureatum.  
 A. **GLOMERATUS** Lam. = Acanthodium procumbens.  
 A. **HUMILIS** h. Vahl = Acanthodium sinuatum N. ab E.  
 A. **ILICIFOLIUS** Linn. = Dilivaria ilicifolia.  
 A. **INTEGRIFOLIUS** Linn. = Blepharis satureiæfolia.  
 A. **MADERASPATENSIS** Linn. = Blepharis boerhaaviaefolia var.  $\beta$  maderaspensis.  
 A. **POLYSTACHYUS** Caill. = Cheilopsis polystachya.  
 A. **PROCUMBENS** h. madr. = Blepharis boerhaaviaefolia  $\beta$ .  
 A. **PROCUMBENS** Linn. = Acanthodium procumbens.  
 A. **REPENS** Vahl = Blepharis molluginifolia.

*Species non nisi nomine nota.*

A. **VERUS** Wender. apud Steud. nomencl. ed. 2 p. 11.

LXX. **CHEILOPSIS** Moquin-Tandon in ann. des sc. nat. 27 p. 230. — Acanthi spec. auct.

Calyx 4-partitus, lacinis superâ et inferâ multo majoribus, hac apice 2-4-fidâ dentatâ. Corolla subunilabiata, labio quinquelobo, labii superioris bipartiti lacinis brevibus labio inferiori incumbentibus eidemque adnatis, tubi margine supero fisso angusto. Stamina 4 subdidyma. Filamenta recta, breviora infra antheram hinc strumosa. Antheræ omnes uniloculares, ciliatæ, erectæ, filamento adnatae. Capsula a basi ad medium tetrasperma lateribus chartaceis. — Frutices Asiæ minoris et Africæ tropicæ, foliis pinnatifidis spinosis, petiolis basi auriculatis. Spica terminalis, molliuscula, bracteis latis, dentato-ciliatis, bracteolis longis angustis pectinatis.

1. C. **MONTANA**, fruticosa, glabra, caule quadrangulari, foliis caudato-acuminatis pinnatifidis lacinis ovatis acutis sinuato-dentatis apice dentibusque spinosis, spicâ terminali densâ brevi glaberrimâ, bracteis obovatis acutis inciso-dentatis dentibus linear-setaceis subspinosis, bracteolis lanceolato-linearibus in medio parce spinuloso-dentatis. ♂ In ins. Fernando Po, in montibus vulgaris, Novembri (Vogel!). Acanthus tetragonon R. Br. in Salt abyss. R. Br. opp. ed. N. ab E. 3 p. 249?. Pluripedalis. Foliorum solæ costæ subtus hirtulae, laciniaæ basin versus de crescentes. Spica 2-3 poll. longa, ovata. Bracteæ reticulatæ, trimeres, dentibus utrinque 5 apiceque molliter spinosis. Bracteolæ calyce paulo breviorcs. Calycis laciniaæ majores oblongo-lanceolatae, apice herbaceæ; superior acuta, apice spinuloso-serrata, inferior apice bifida, lacinis dente uno altero spinulosis. Corolla (pallide lutea?), fere  $1\frac{1}{2}$  poll. longa. Filamenta breviora apice introrsum canaliculata, extrorsum strumosa, neque incurva. Staminum majorum loculus antheralis in utrâque valvula ciliatus, minorum uon nisi in alterâ. (v. in h. Hooker).

2. C. **ARBOREA**, caule fruticoso pubescente, foliis glabris lanceolatis acuminatis acumine integerrimo pinnatifidis basi truncatâ in petiolum brevem auriculatum desinentibus, lacinis triangularibus inciso-subdentatis dentibus apiceque laciniaæ rigide spinosis, spicâ terminali elongatâ pubescente, bracteis lanceolatis oblongis subovatisse acuminatis nervosis spinoso-ciliatis, bracteolis linearibus pinnatifidis laciniaæ setaceis, calycis laciniaæ majoribus ovatis longe acuminatis, superiori acutâ apicem versus spinoso-ciliatâ, inferioris acumine subpalmatim quadrifido, labio oblongo. ♂ Hadie et Kurma in Arabia Felici (Forskal! in h. Vahl); Birk el Essheeba in Arabiâ Felici (Botta! in h. Mus. paris. et ex hoc in h. Nees). Acanthus arboreus Forsk. descr. p. 215. Vahl symb. 1 p. 47. Willd. sp. pl. 3. p. 398. Folia fere Cardui nutantibz, sed gla-

bra, costis subtus puberulis. Auricula ad basin petioli suborbicularis, spinulo-dentata. Calycis lacinia superior pollicaris; laciniae laterales fere duplo breviores, ovales, longe setaceo-acuminatae, molliter ciliatae, inermes. Corolla labium obconicum, apice rotundatum, quinquelobum, purpureum. (v. in h. Vahl. paris. et ex eo in h. Nees).

3. C. POLYSTACHY (Moquin-Tandon in ann. des sc. nat. 27 p. 230), caule fruticoso, foliis glabris oblongis acuminatis acuminatissimis integerrimo pinnatifidis basi truncata in petiolum brevem auriculatum desinentibus laciñiis triangularibus parce spinoso-dentatis apiceque spinosis, spicis in caule ramisque oppositis terminalibus elongatis minutissime puberulis, bracteis ovalibus longe rigideque acuminatis nervosis dentato-spinosis dentibus basi extrorsum compositis, bracteolis lanceolatis pinnatifido-spinosis, calycis laciñiis majoribus ovato-oblongis apice angustioribus parce spinuloso-serratis, superiore acutiusculâ, inferiore apice mucronato-bidentata. ♂ In Ægypto (Cajlaud), in regno Fazohel (Kotschy! n. 489 in h. Hooker), Adowa et Gondhar (Quartin-Dillon! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees). Acanthus polystachyus Cailaud voy. au Meroë 2 t. 62 f. 2. Varietatem censeo C. arborea; differt amplitudine foliorum et florum maximeque bractearum et calycis structurâ alicnâ. Corolla sesquipollucaris, purpurascens, labio lato. (v. in h. Hooker, paris. et ex eo in h. Nees).

- LXXI. ACANTHODIUM Delile fl. ag. p. 97, N. ab E. in Lindl. intr. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 703, Meisn. gen. p. 295 (204). — Blepharacanthus N. ab E. in h. Ecklon et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285 et 444, Endl. gen. p. 703, Meisn. gen. p. 295 (204). — Acanthi spec. Linn. et auct.

Staminum minorum loculus in connectivo recto elongato styliformi lateralis, stipitatus, connectivi longitudine. Calycis laciñiae superior et inferior oblongo-lineares, truncatae, laterales duplo breviores. Corolla labium quinquelobum. — Spicæ terminales, aut, propter ramulos brevissimos, ad speciem axillares, bracteis imbricatis spinosis tectæ, a basi floreutes. Bracteolæ oppositæ, lineares. Frutices Asiatici et Africani humiles, foliis bracteisque sœpe spinosis rigidisque.

#### § 4. Bracteæ lateraliter pinnatim spinosæ.

\* Folia primordialis reliquis conformia.

1. A. PROCUMBENS (N. ab E. in Linnaeâ 15 p. 362), fruticosum, procumbens, foliis lanceolatis bracteisque ovalibus apice molliter spinosis inæqualiter setaceo-ciliatis, ramulis spicigeris brevissimis. ♂ In promont. Bon. Spei, ad prædium Pauli Maré hand procul a flumine Zwartkopsrivier, solo argillaceo-arenoso, Uitenhage, (Ecklon! Burchell! in h. Hooker). Acanthus procumbens Linn. Thunb. fl. cap. 2 p. 456, Vahl h.! (specim. Thunb. et Lamarck.) Willd. sp. pl. 3 p. 399 b. n. 11732 (specimen superius), h. DC. (spec. Drèg.), Meyer in h. Drèg. Blepharis procumbens Pers. synops. 2 p. 180, Spr. syst. 3 p. 820. Acanthus (Blepharis glomerata J.) Poir. euc. méth. suppl. 1 p. 89. Acanthus glomeratus Lam. enc. 1 p. 23. Flores cœrulei. (v. in h. Ecklon, Drèg., Vahl, DC. etc.)
2. A. ANGUSTUM, fruticosum, procumbens, foliis linearibus mucronatis integrerrimis margine revolutis supra punctulis exiguis exasperatis scabrisque, spicis in ramulis brevissimis axillaribus terminalibusque ovatis, bracteis ovali-oblongis carinatis subulato-acuminatis acumine spinoso, margine apicem versus utrinque 4-5-spinosis spinis setaceis superioribus majoribus, costis scabris. ♂ In promontorio Bonæ Spei prope Schoon Strom, Junio (Burchell! in h. Hooker). Habitu proximum A. procumbenti, differt foliis multo angustioribus et bracteis longioribus rigidioribus acuminis longo rigido lateribus paucispinosis spinis rigidioribus. Flores cœrulei. Ab A. hirta et grossa differt bractearum formâ. (v. in h. Hooker)

3. *A. GROSSUM*, humile , ramis procumbentibus adscendentibus foliisque linearibus margiuc revolutis supra scaberrimis, bracteis rhoīnis spinosodentatis in nervis hirsutis, spicis in centro ramificationum confertis ovatis ovatoe-oblongis sessilibus. ♂ In Africā occidentali infra tropicum austrum versus (h. Hooker!). Ab *A. hirtum* differt foliis supra setulis exiguis adpressis confertim tectis et bractcis in medio paulo inferioris rhombeo-dilatatis utrinque spinis 3-4 fortioribus præditis hinc longe acuminate acumine in medio utrinque unidentato. *Acervus* spicarum pugni magnitudine aut major. (v. in h. Hooker).

4. *A. HIRTUM* (Hochst. in Kotschy it. nub. n. 256), fruticulosum, hispidulo-sabrum , foliis lancolato-linacribus integerrimis rarerter ciliato-denticulatis, bracteis ovatis ciliato-dentatis margine carināque hirsutis, spicis solitariis cylindricis brevissime pedunculatis. ♂ In savannis, circa montem Cordofanum Kohn colles incolens, Novembri (Kotschy!), in Senegambiā (h. Hooker!). Simile *A. procumbenti*, a quo imprimis differt spicis 2-3 poll. longis dichotomiae impositis, ramis strictis erectis, foliis duplo longioribus (2 poll. longis) fere linearibus sæpe integerrimis raro dente uno altero setigero præditis, bracteis sinuato-dentatis dentibus setaceo-attenuatis. (v. in b. Hochst., Hooker, Mus. paris. et Nees).

α. ramis erectis. — In Abyssiniā. *Acanthodium hirtum* Hochst. l. c.

β. ramis procumbentibus adscendentibus magis pubescenti-canis. — In Sene-gambiā, in montosis circa Bakelct in arenosis Quallo (Heudelot! in h. Mus. paris. et ex eo iu h. Nees). *Blepharis linariaefolia* Pers. synops. 2 p. 180.

5. *A. SPICATUM* (Delile fl. ægypt. p. 97 t. 33 f. 3), fruticulosum, erectum , subacaule, pubescenti-velutinum , albido-glaucum , foliis ad basin caulis paucis parvis ovalibus oblongis spinoso-dentatis (subinde nullis), spicā columnari quadrifariā, bracteis lanceolatis spinoso-acuminatis et utrinque 2-3 spinis rigidissimis præditis valide 5-nervibus squarroso-patentibus flore longioribus. ♂ In Arabiā , Lohaje (Forsk.!), in Ægypto (Delile! Acerbi! in h. DC.), in deserto Suez (Delile! in h. gen. berol. , Aucher! n. 2690 in h. DC.), in deserto Cairico circa Suez et Valbeo Baruk propè Djedda , Aprili et Maio (Bové! n. 53 in h. DC.), ad cisternas Geddeā in arenosis, Octobri-Febr. (Fischer! n. 148 in h. Hooker), Cordofan in Ægypto superiore (Kotschy! n. 33 in h. Hooker), in rupibus prope Nakkeb Arabiæ Petrosæ (Schimper!), in Arabiā Felici, Djieuat, Mons, Maammara (Botta! in h. Mus. paris. et Nees, Lenz! in h. Bentham), in Nubia inter Korosko et Babu (Kotschy! n. 341 in h. Hooker). — Dietr. synops. 3 p. 594. *Acanthus Delilii* Spr. syst. 3 p. 819 , Aucher l. c. Schimp.! it. arab. in h. un. itin. n. 367. *Acanthus pectinatus* h. Willd. n. 11727 (ex Ægypto). *Acanthus edulis* Vahl symb. 1 p. 48 et h.! Forsk. descr. p. 114; Willd. sp. pl. 3 p. 400. *Blepharis edulis* Pers. synops. 2 p. 180. *Ruellia ciliaris* Linn. mant. p. 89. *Ruellia persica* Burm. fl. ind. p. 135 t. 42 f. 1. Glaucedine et spicā solā sæpe totam plantam constitente, tum bracteis longis rigidissimis patulis in spinam simplicem canaliculatum protractis facilis cogniti. Bracteæ inferiores in spicis maxime elongatis sæpe sunt steriles. Corolla cœrulea. Folia edulia cruda, sapida. Semina recentia in manu mixta salivâ cum fragore dissilire aiunt. (Forsk. l. c. b.) (v. in h. berol., Vahl, DC. Hochst. etc.)

β. *Echinus* (DC.) vix sesquipollicare, ovatum , undique foliis spinosis tectum. *Acanthodium Delil.* in h. Juss. fide Scbed. DC. (v. in h. DC.)

6. *A. SINUATUM* (N. ab E. in Linn. 15 p. 362), suffruticosum procumbens, foliis oppositis oblongis sinuato-pinnatifidis bracteisque ovatis nervosis valide spinosis glabris incanis, ramo spicigero subradicali erecto. ♂ In Promont. Bon. Spei, in rupestribus inter Grahamstown et montem Bothas (Albany), Julio cum floribus (Ecklon !). *Acanthus humilis* h. Vahl! (specimen Thunbergianum). Distincta species, bracteis fere *Acanthi capensis*, sed floribus cœruleis

Acanthi procumbentis. Rami steriles breves, procumbentes. Radix recta, perpendicularis.

? *β. nanum*, acaule, vix pollicare (cum spicâ), ramulo gracili, spicâ omnino sessili, foliis asperis spinis dentium conicis albis, bracteis obovatis mucronato-acutis utrinque 2-3-spinosis in tergo hirsutis (fere ut in *A. hirtiervio*) præditis. — Ad mare Rubrum (h. Hooker!). An *Ac. spicati* forma nana? (v. in h. Hooker).

7. *A. DIVERSISPINUM*, fruticosum, procumbens, pubescenti-velutinum, foliis oblongis utrinque 2-3-dentatis dentibus apice brevi-spinosis, ramulis spicigeris brevissimis, bracteis inferioribus spiniformibus simplicibus, vel spinoso-dentatis, superioribus ovalibus in acumen spiniforme rigidum productis utrinque apicem versus trispinosis. ♂ In Africâ australi extratropicâ (Burchell! cat. geogr. plant. afric. austr. extratrop. n. 2377 in h. DC., Bergius! in h. gen. berol.). Corolla corulea. Differt ab *A.* procumbente acumine bractearum longiore rigide spinoso recto nec recurvo; ab *Ac.* sinuato foliis haud sinuatibus et spicis lateralibus.
  - α. spinâ bractearum terminali spinis lateralibus ei proximis multo longiore; ad quam citata præcedentia spectant. (v. in h. DC. et berol.).
  - β. spinâ bractearum terminali spinas laterales ei proximas æquante, at semper tamen iis rigidiores. — In promontorio B. Sp. (Hoffmannsegg! in h. Willd.), Modderfontein prope Grootrivier (Lichtenstein! in h. gen. berol.). *Acanthus furcatus* h. Willd. n. 11731! et Lichtenst.! in h. gen. berol. (v. in h. Willd. et gen. berol.)
8. *A. SERRULATUM*, fruticosum, procumbens, subtilissime velutino-pubescentis, foliis oblongi adpresso spinuloso-serratis mucronatis subtus pallidioribus, ramulis spicigeris brevissimis, bracteis obovatis velutinis apicem versus utrinque 4-6-acanthis spinis lateralibus terminali parum brevioribus. ♂ Ad Aapjes Rivier et Macalisberg in promont. Bon. Spei, Novembri (Burchell! in h. Hooker). Caulis flexilis, mollis. Folia 9 lin. longa. Flores corulei. Serraturis spinulosis adpresso foliorum satis distinctum a reliquis; *Ac. diversispino* ante omnia simile. (v. in h. Hooker).
9. *A. MARGINATUM*, fruticosum, humile, adscendens, foliis primariis..., axillaribus bracteisque lanceolatis calloso-marginatis a basi apiceque dentato-spinosis glabris glaucis, dentibus setaceis patentissimis. ♂ In Africâ australi (Burchell! cat. pl. afric. austr. extratr. n. 1902 in h. DC.). Fruticulus 1-2 poll. altus, a basi divisus, glaber. Rami fusi, inferne nudi. Folia et bracteæ subconformia, utrinque spinis setaceis 6-8 rufescensibus prædicta apiceque simpliciter spinosa. Calyx et corolla fere ut in *A. capensi*, hæc autem paulo major, foliorum et bractearum spinæ plures, tenuiores. Affine *A. macro*, sed differt foliis, quod ad partem foliaceam latioribus neque fere ad costas redactis linear-pectinatis. An *A. squarroso* forma nana? (v. in h. DC.)
10. *A. SQUARROSUM*, fruticosum, ramosum, caule pulverulento-tomentoso adscendente, foliis primariis secundariisque conformibus dissitc spinoso-dentatis glabris dentibus setaceis patentissimis, spicis terminalibus bracteis ovato-lanceolatis acuminatis recurvatis calloso-marginatis apice medioque spinosis. ♂ In promontorio Bonæ Spei, ad Kat Rivier fluvium, Martio, etc. (Burchell! in h. Hooker). Flores corulei, siccæ flavescunt. Folia primaria cum petiolo 4-5 poll. longa, 6-7 lin. lata. Bracteæ squarroso-patentes,  $\frac{1}{2}$  poll. longæ, in medio utrinque spinis 3-4 patentibus, apice longe acuminatae integerrimæ, margine et sæpe etiam costis albidis, ceterum virides. Differt ab *A. marginato* magnitudine et bracteis recurvis, tum et ab illo et ab *A. capensi* γ. leucographo floribus coruleis nec luteis. Ab *Ac.* sinuato differt bracteis multo longioribus apiceque attenuatis. (v. in h. Hooker).

\*\* *Folia primaria spinescentia.*

11. A. **FURCATUM**, fruticosum, erectum, foliis primariis spinescentibus, axillaribus cuneiformi-lanceolatis mucronatis dentato-spinosis (inermibusve) puberulis, bracteis ovatis concavis nervosis utrinque uni-bispinosis, apice lineariprodncio palmato-trispinoso. ♂ in Carro infra Bockland, Octobri, Novembri (Thunberg). Acanthus furcatus Thunb. fl. cap. ed. Schult. 2 p. 455, Willd. sp. pl. 3 p. 399. Rami albantes, glabri. Bracteæ quinquenerves, apice plus minus prominente trinervi lineari. Corolla cœrulea.
- β. *integerrifolium*, foliis integerrimis mucronatis, bracteis utrinque unidentatis. — In promontorio Bon. Spei (Drège!). Acanthus *integerrifolius* E. Mey.! in cat. pl. Drég. ann. 1837. Acauthus furcatus h. DC. (v. in h. DC. et Drég.)
- γ. *ramosissimum*, caule humili, foliis dentatis, bracteis apice minus productis. — Ad Gamka fluvium, Aprili (Burchell! in h. Hooker). (v. in h. Hooker.)
12. A. **MACRUM**, fruticosum, erectum, foliis primariis spinescentibus, axillaribus lineari-lanceolatis mucronatis integerrimis puberulis, bracteis lanceolatis attenuatis trinervibus utrinque 2-3-spinosis apiceque palmato-trispinosis spinis patentissimis. ♂ In promontorio Bon. Spei (Drège!). Acanthus macer E. Meyer! cat. pl. Drég. ann. 1837. Persimile A. trispino et ejus probabilitet varietas macrior, differt solummodo bracteis multo angustioribus in longitudinem protractis spinisque lateralibus duabus fortioribus instructis accende subinde tertio dente minore magisque inferiore. Color albidus, rami ut in præcedente. (v. in h. Drég.)
13. A. **CAPENSE** (N. ab E. in Linnaeâ 15 p. 361), fruticosum, erectum, foliis primariis spinescentibus, bracteis utrinque tri-quadrispinis (1), ramulis floribus longisculis. ♂ In promontorio Bou. Spei: ad prædiū Pauli Maré in viciniâ fluminis Zwartkopsrivier et in collibus Karro similibus ad flumina Sonndagrivier, von Stadens rivier, Curirivier et in jugo Krakamæ (Uitenhage), iu Karro, prope Gauritzrivier fluvium (Distr. George), ad castellum Beaufort in finibus terra Caffrorum (Ceded Territory). Floret per omnem fere annum. Acanthus Capensis Linn. Thunb. fl. cap. 2 p. 455, Willd. sp. pl. 3 p. 399. Blepharis Capensis Pers. syn. 2 p. 180. Blepharis furcata Eckl. pl. cap. n. 563. Acanthus furcatus h. Vahl. Frutex humilis, rigidus. Folia primaria caulis et ramorum subulata, spinescentia, inferius utrinque dentibus 1-2 spinosis armata, superiora majora. Ramuli axillares aut abortivi aut breves, foliorum aliquot paribus in fasciculum confertis oblongis lanceolatisve petiolatis deutibus nonnullis (2-3 utrinque) parvis spinulosis præditis. Flores lutei.
- α. foliis axillaribus lanceolatis molliter spinosis, bracteis utrinque tridentatis. — (Drège! pl. cap. n. 7930, Ecklon in h. gen. berol. n. 1, 2). (v. in h. berol.)
- β. foliis axillaribus oblongis molliter spinosis, bracteis utrinque quadridentatis. Acanthus furcatus b. E. Meyer! in h. Drég., Mund! in h. gen. berol. (v. in h. Drég. et berol.)
- γ. *leucographum*, foliis axillaribus lanceolatis valide spinosis spinis costâque albis, bracteis albo-nervosis (7-9-spinis). — Solo Karro in viciniâ fluminius Gauritzrivier, Decembri, (Ecklon! in h. gen. berol. n. 94, 12, Drège! pl. cap. n. 7933, h. gen. berol. ex h. Zeyher). Acanthus capensis h. Vahl! fol. 2 (specim. Thunb.). (v. in h. berol. et Vahl).
- δ. *villosum*, bracteis villosa-canescensibus latioribus. — In fructicetis solo calcareo et Karro inter Sonndagrivier et Coegarivier flumina (Uitenhage), Maio cum floribus et fructu (Thunberg, Ecklon!), Uitenhage (h. Hooker). Acanthus furcatus h. Hooker! (v. in h. Hooker).

(1) In Linnaeâ l. c. loco quadrifariis legendum: quadrispinis.

♂\* *vilosum subacaule*, ramis e radice brevissimis confertis ad spicas usque nudis foliis primariis spiniformibus orbatis, infra spicas foliosis foliis oblongis repando-dentatis dentibus apiceque spinosis, bracteis villosis utrinque 3-4-dentatis dentibus villosi-ciliatis. — Fish River, Maio (Burchell! in h. Hooker). Spithamæa. Bracteæ et flores ut in var. ♂. (v. in h. Hooker).

ε. *integrimolum*, foliis axillaribus lanceolato-linearibus integerrimis inermibus margine revolutis, bracteis ut in var. ♂. — In fruticetis montis Konabshoode inter Konab et flumen Vischrievier, Julio (Ecklon! Drège, Krebs! in h. gen. berol.). Blepharis furcata h. Zeyher! in h. gen. berol. Acanthus capensis E. Meyer! a et c in h. Drège. (v. in h. berol., Eckl. Drège.)

ξ. *inerme*, foliis lanceolatis spinoso-dentatis mucronatis, spicis paucifloris bracteis apice mucronatis margine integerrimis submembranaceis. (v. in h. Hooker).

14. A. *HIRTINERVUM*, fruticosum, erectum, ramosum, foliis primariis spinoscentibus, axillaribus subspathulatis vel inermibus vel uno altero dente spinoso prædictis mucronatis glabris, bracteis obovatis quinqñenervibus ad nervos hirsutis mucronatis latereque spinoso-serratis. ♂ In promont. Bon. Spei (Drège! pl. cap. n. 7932). Simile A. capensi var. ♂ villoso, sed differt spinis bractearum multo brevioribus, bracteis autem majoribus nervis valde elevatis hirsutis. Frutex rigidus, semipedalis-spithamæus, foliis primariis spiniformibus simplicibus trifidisve axillaribus 6-10 lin. longis. Corolla flava. (v. in h. Drège).

### § 2. *Bracteæ apice palmatim spinosæ.*

15. A. *GLAUCUM*, subacaule, glabriuscum, foliis linear-lanceolatis remote dentatis dentibus apice spinosis, spicâ terminali cylindricâ elongatâ, bracteis obovato-cuneatis apice trifidis laciniis apice spinosis. ♀ In promontorio Bonæ Spei (Drège!). Acanthus glaucus E. Meyer! cat. pl. Drège. ann. 1837. A reliquis differt bracteis ex ovato oblongis subdistantibus apice trifidis tridentatis, dentibus brevibus ovatis, medio latiore in spinam 4-5 lin. longam excurrente, lateralibus cum spinâ vix 1-1½ lin. longis; nervi tres, quorun laterales apice cum medio coeunt. Spica fere radicalis, sessilis, 4 poll. longa, folia triplo et amplius excedens. Calycis laciniæ majores ovali-oblongæ, sericeo-pubescentes; superior obtusa, trinervis, inferior mucronato-acuta, 5-nervis. (v. in h. Drège).

16. A. *SPATHULARE*, fruticosum, erectum, caule sericanti-cano, foliis lanceolatis sinuato-dentatis spinosis velutinis, spicâ terminali lateralibusque subsessilibus globosis, bracteis late cuneiformibus apice truncatis quinque- (vel sex-) spinosis, spinis intermediis validis, mediâ bractearum superiorum foliacea spathulato-lanceolata mucronata. ♂ In promontorio Bonæ Spei (Drège!). Acanthus spathularis E. Meyer! cat. pl. Drège. ann. 1837. Distinctum forma spicarum et bractearum (altitudine suâ fere latiorum 5-nerviarum) spinâ mediâ in processum foliaceum spathulatum subinde serrato-dentatum mutata, spinis isti proximis subulatis validis longisque, tum lateralibus, quæ illas sequuntur, his multo minoribus. Calycis laciniæ majores suborbiculatae. An forma monstrosa A. carduifolii? (v. in h. Drège).

17. A. *HOFFMANSEGGIANUM*, acaule, velutino-pubescentes, foliis lanceolatis sinuato-dentatis spinosis, spicâ subsessili oblongâ densissimâ, bracteis obovato-cuneatis palmatim quinquefidiis laciniis pinnatifido-spinosis pungentibus. ♀ In promont. Bon. Spei, Modderfontyn (Lichtenstein! n. 407 in h. gen. berol. ex parte, Hoffmannsegg! in h. Willd.). Acanthus carduifolius h. Willd. n. 11728. Ab A. carduifolio, cui babitu omni congruum, sane differt bracteis ad medium usque (tri-) quinquefidiis laciniis apice longe spinosis, mediâ lateralibusque etiam latere basin versus utrinque bi-trispinosis spinis subn. latis, intermediis subsimplicibus subulatis basi sœpe bidentatis. Corolla angusta,

*coerulea*, tubo longiusculo. A Thunbergio cum nostro *A. carduifolio* confusum est. (v. in h. Willd. et gen. berol.)

18. *A. GLABRUM*, subacaule, glabrum, foliis lanceolatis sinuato-dentatis spinosis, spicâ terminali cylindricâ, bracteis obovato-cuneatis truncatis apice palmato-quinquespinozis margineque juxta apicem serrato-bispinulosis.  $\mathcal{Z}$  In promontorio Bon. Spei (Drège!). *Acanthus glaber* E. Meyer! cat. pl. Drèg.! ann. 1837. *Acanthus carduifolius* Linn. suppl. Willd sp. pl. 3 p. 397, forma «foliis nudis, » ex descriptione. Differt ab *A. carduifolio* foliis glabris, spicâ angustiore, bracteis angustioribus, spinis longioribus. Bracteæ 5-nerves. Calycis laciniæ majores oblongæ, pubescentes. (v. in h. Drège).
19. *A. CARDUIPOLIUM*, subacaule, villoso-subtomentosum, foliis lanceolatis sinuato-dentatis spinosis, spicâ terminali cylindricâ, bracteis subrotundis apice palmato-quinquespinozis margineque juxta apicem serrato-unispinulosis.  $\mathcal{Z}$  In rupibus Hantum promontorii Bonae Spei (Tunberg, Drège!). *Acanthus carduifolius* Linn. suppl. p. 294. Willd sp. pl. 3 p. 397, h. Vahl! E. M.! cat. pl. Drèg. ann. 1837. Canescit. Folia spicâ longiora. Spica crassior quam in *A. glabro*. Calycis laciniæ majores ovales, villosæ. (v. in h. Vahl et Drège).

LXXXII. ACANTHOPSIS *Harvey in Hook. Lond. journ. bot. 7 p. 28, Meisn. gen. suppl. p. 367.* — *Dilivariæ spec. N. ab E. in Linnaæ 15 p. 363.*

Calyx 4-partitus, laciniis anticâ et posticâ multo majoribus, hac bidentatâ. Corolla unilabiata, tubo tenui, labio (antico) breviter quinquelobo, lobo medio majore, lateralibus auriculiformibus, margine postico (faucium) emarginato, dente (in alterâ specie) in sinu posito. Stamina 4, summo corollæ tubo inserta, exserta; antheræ omnes uniloculares, barbatæ, apici subulato filamento punto medio affixæ (nec oscillantes). Ovarium . . . Stylus filiformis. . . . Stigma acutum, incurvum, margine dorsali spongioso. Capsula brevis, ovata, compressa, a basi bilocularis disperma. Semina compressa, retinaculis suffulta. — Herbæ capenses, foliis spinoso-dentatis, spicis terminalibus densis, bracteis multifidis rigidis spinosis. — Genus quod ad characteres simile *Dilivariæ*, differt tubo corollæ longiore angusto molli, labio profundius quinquefido nec trifido.

1. *A. HORRIDA*, fruticosa, foliis lanceolatis pinnatifidis squarroso-spinosis, bracteis cuneiformibus palmato-spinosis, superioribus pennato-pilosis.  $\mathfrak{Z}$  In promont. B. Sp. in monte Kamiesberg solo argilloso, Namaqualand, Novembri (Ecklon! n. 73, 11, Drège!). *Dilivaria horrida* N. ab E. Ac. cap. in Linnaæ 15 p. 363. *Acanthodium plumulosum* E. M.! cat. pl. Drèg. ann. 1837. Denticulus parvus in sinu labii. Calycis laciniæ majores ovales. Bracteæ 5-9-nerves, apice simpliciter palmato-spinosæ. (v. in h. Ecklon et Drège).
2. *A. DISPERMA* (*Harvey l. c.*), herbacea, subacaulis, foliis omnibus radicalibus lanceolatis basi attenuatis repando-dentatis spinoso-ciliatis, spicâ ovatâ sessili, bracteis altitudine latioribus palmato-multifidis laciniis spinosis.  $\mathcal{Z}$ ? In promontorio Bon. Spei (Drège!). *Acanthodium dispermum* Meyer cat. pl. Drèg. Planta humilis, radice simplici. Folia hirta, longitudine spicæ. Bracteæ trifidæ, laciniis lateralibus brevioribus trifidis, lacinulis spinosis basi compositis. Calycis laciniæ majores latæ, ovatæ, cuspidatæ, aristato-acuminatæ, 7-9-nerves. (v. in h. Drège).

LXXXIII. ISACANTHUS.

$\mathfrak{Z}$  Calyx 5-partitus, chartaceo-cartilagineus, laciniis conformibus angustis elongatis apice integris, superiore inferioribusque paulo latioribus. Corolla unilabiata, tubo tenui, labio breviter quinquelobo lobis subæqualibus, margine postico faucium emarginato integro. Stamina 4, tubi apici

inserta, exserta; antheræ omnes uniloculares, dimidiato-ovales, adnatae, conformes, basi barbate, ad suturam parce ciliatae. Stigma obtusum. Capsula oblonga, a basi bilocularis 2-4-sperma, retinaculis brevibus. Semina apice barbata. — *Frutex Africanus ramosus*, inermis, foliis integerrimis, floribus maximam partem albis. Spica terminalis, brevis, pauciflora, bracteis bracteolisque calyce brevioribus, his bracteis latioribus.

I. VOGELII. ♂ Ad promontorium Palmas Africæ occidentalis, Julio (Vogel! in h. Hooker, Ansell! in h. Hooker et Benthem). *Frutex* 2-3-pedalis, erectus, ramosus. Rami teretiusculi, glabri, sicut folia punctulis exiguis exasperati. Folia 2-3 poll. longa,  $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$  poll. lata, subcaudato-acuminata, acumine obtusiusculo, basi acutâ in brevem petiolum decurrentia, reticulata, supra nitida, opposito minore. Spicæ in apice ramorum capituliformes, sessiles. Bractæ 3 lin. longæ, lanceolatae; bracteolæ oblongæ, acutæ, 6 lin. longæ, haæ et illæ asperulæ, virides. Calyx fere pollicaris, laevis, laciniis chartaceis rigide erecto-patulis pallidioribus, superiore paulo longiore et latiore acutâ, tum inferioribus paulo minoribus, his lateralibusque setaceo-acuminatis convoluto-canaliculatis. Corolla pollicaris, albida, basin versus rubella, labio cuneiformi, laciniis ovalibus viridulis. Capsula pallide rufa, 5 lin. longa. (v. in h. Hooker et Benthem).

LXXIV. SCLEROCHITON Harvey in Hook, Lond. journ. bot. 1 p. 27, Meisn. gen. suppl. p. 367.

Calyx bibracteatus, scariosus, rigidus, persistens, 5-partitus, laciniis subinæqualibus obtusis. Corolla unilabiata, tubo incurvo, fauce latiore superne fissâ, limbo plano quinguelobo. Stamina 4, tubo inserta, exserta, basi per paria confluentia, subæqualia, antheris unilocularibus loculo semiovato marginé ciliato. Stylus persistens, stigmata bidentata. Capsula indehiscens?, coriacea, bilocularis, a medio disperma, inferius compressa et mollior. Semina retinaculis suffulta? — *Suffrutex Capensis*, erectus, foliis parvis rigidis subovalibus subdentatis glabris nitidis basi apiceque attenuatis acumine apicis obtuso, floribus axillaribus solitaris subsessilibus, bracteolis calyce brevioribus ovatis obtusis ejusdemque laciniis siccis subscariosis multistriatis. Corolla subcoriacea, rubra, 8-9 lin. longa.

S. HARVEYANUS (N. ab E.). ♂ in promontorio Bon. Spei (Drège! h. n. 4037); Orangeriver (Burchell! in h. Hooker, Krebs! in h. Moricand). (v. in h. Drège, Hooker et Moricand).

Tribus VII. APHELANDREÆ N. ab E. — *Justicieæ* div. 1. Aphe landreæ N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 98 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Erdt. gen. p. 703, Meisn. gen. p. 296 (204) ex parte.

Calyx quinquefidus, laciniis æque longis, duabus lateralibus paulo angustioribus, membranaceo-chartaceis striatis. Corolla vel hypocrateriformis aut infundibuliformis limbo subregulari, vel bilabiata aut ringens. Stamina 4 subdividynama, antheris unilocularibus, saepe hirsutis. Capsula prope a basi 4-sperma. Inflorescentia spicata.

#### CONSPECTUS GENERUM.

LXXV. *Crossandra*. — Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis, limbo subregulari 5-fido superne ad tubum usque fisso. Stamina inclusa. — *India orientalis*.

LXXVI. *Stenandrium*. — Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis vel hypocraterinorpha, limbo subæquali 4-5-fido. Stamina inclusa. Plantæ parvæ. — Americæ calidioris loca editiora.

LXXVII. *Polythrix*. — Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis, limbo trifido subæquali. Stamina inclusa. — Madagascar.

LXXVIII. *Geissomeria*. — Calyx 5-partitus. Corolla tubulosa, limbo brevi subbilabiato. Antheræ exsertæ. — America tropica.

LXXIX. *Salpixantha*. — Calyx 5-dentatus. Corolla tubulosa, sursum sensim ampliata, limbo regulari patentí-recurvo. Stamina corollam æquantia. — America tropica.

LXXX. *Lagochilum*. — Calyx 5-partitus. Corolla ex infundibuliformi bilabiata, limbo 4-5-fido, his labio superiore profunde bifido, inferiore trifido. Stamina limbum æquantia. — America tropica.

LXXXI. *Strobilarachis*. — Corolla bilabiata, tubo gracili incurvo, faucibus late campanulatis, labii latis, superiore bilobo, inferiore trilobo. Stamina inclusa. Stigma compresso-infundibuliforme, bilobum. — Brasilia.

LXXXII. *Aphelandra*. — Corolla bilabiata vel ringens, tubo elongato in fauces trausente, labio superiore fornicato apice bidentato, inferiore trifido. Antheræ exsertæ. — America tropica.

LXXV CROSSANDRA *Salisb. parad. lond. t. 12, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 98 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 703, Meisn. gen. p. 296 (204).* — Harrachia *Jacq. ecl. t. 21.* — Justicia spec. *Linn.* — Ruellia spec. *Andr.*

Calyx quinquepartitus, lacinias latis, interioribus brevioribus. Corolla tubo longo, limbo plano quinquefido superne ad tubum usque diviso. Stamina quatuor didynama in tubo latentia. Antheræ uniloculares, hirtæ, margine ciliatæ. Capsula compressa, bivalvis, a basi tetrasperma. Dissemination adnatum. — Frutices Indiæ orientalis, foliis subintegerrimis, floribus speciosis rubris. Spica terminalis tetragona, bracteis oppositis latis herbaceis, propriis angustis membranaceis.

1. C. INFUNDIBULIFORMIS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 98, Wight h. pr. n. 1977, ic. 2 t. 461), caule pubescenti-hirto, foliis verticillato-ternis quaternis ovato-oblongis utrinque punctulato-asperis scabrisque, bracteis ciliatis, spicis longe pedunculatis. ♂ In Indiæ orientali. Bracteæ nervis pluribus non multum prominulis striatæ, pilis erecto-patulis ciliatæ. Flores pulchre minutiati. (v. v. et sicc. spec. in h. DC. etc.)

α. pedunculo folia æquante, lævi. — In h. Wight! et Madras! Crossandra infundibuliformis h. Willd.! n. 363 fol. 1. Crossandra undulæfolia Ait. h. kew. 4 p. 54. Link en. h. ber. 2 p. 134 n. 1515. Crossandra nutans Wight h. pr. n. 36 olim. Justicia infundibuliformis Linn. sp. pl. p. 21, Burm. fl. ind. p. 7, Vahl symb. 2 p. 17. Ruellia infundibuliformis Andr. rep. n. 542, Wall. cat. n. 2364 b, f, g. Harrachia speciosa Jacq. ecl. t. 21, Blume bijdr. p. 793, Spr. syst. 2 p. 826. Manja-Kurini Rheed. h. mal. 9 p. 121 t. 62.

β. pedunculo folia superante, scabro. — In Noacote Nepaliæ (Wallich!), in Singapore (Prince!), in convallibus nemorosis provinciæ Madura (Wight!), in Ceylon (Walker! in h. Hooker!), in Javâ (h. DC.! Schmidel, Blume), in hortis ad Macao (Meyen). Vidi etiam exempla in herb. Russellian.! Heyn.! Hamilt.! Crossandra infundibuliformis h. Willd. n. 263 fol. 2, 3. Crossandra undulæfolia h. Hamilt. Wall. cat. n. 2364

- e. *Ruellia infundibuliformis* Wall. cat. n. 2364 c, d, e, g (ex parte), hort. bot. calc. Wall.
2. C. **AXILLARIS** (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 98), caule novello scabriuscule, foliis quaternis oblongis glabris lœviusculis, spicis axillariibus alternis folio brevioribus, bracteis pubescenti-scabris margine nudis.  $\delta$  In Indiæ orientalis convallibus nemorosis provincia Madura (Wight!), (Lamarre-Ricquot! in h. gen. berol.). — Wight h. propr. n. 1978, ic. 2 t. 460. Harrachia spinosa h. Hooker! Differt a C. infundibuliformi et oppositifoliâ bracteis non ciliatis sed dense pubescenti-scabris cauleque novello tuberculis setulivis exiguis quasi pruinosis et scabriuscule foliisque paulo brevioribus et punctulis minimis subasperis. Variat pedunculis brevissimis et spicâ longioribus. Foliorum verticilli etiam disjuncti occurunt e jugis foliorum 2 approximatis constantes. (v. in Wight, Hooker et berol.)
  3. C. **OPPOSITIFOLIA** (Wight herb.), glabra, foliis approximato-quaternis oblongo-lanceolatis lœvibus, bracteis ciliatis, spicis subsessilibus terminali-aggregatis.  $\delta$  In montibus Courtallum (Wight!). — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 98, Wight h. propr. n. 1979. A C. infundibuliformi distincta glabritie, foliis angustioribus, spicis brevissime pedunculatis in summo foliorum verticille spurio congestis foliis suis brevioribus, bracteis angustioribus longioribus longius ciliatis ciliis magis patentibus nervis tribus crassis instructis, floribus paulo minoribus, antheris hirsutissimis. (v. in h. Wight et Hooker).
  4. C. **GUINEENSIS**, caule juvenili pubescenti-hirto, foliis oppositis ovalibus repandis utrinque obtusis glabris, petiolo brevi hirsuto, spicâ terminali sessili, bracteis oblongo-lanceolatis mucronato-acutis striatis apicem versus remote ciliato-serrulatis.  $\mathcal{U}$  In Guinéa (h. Hooker!). Caulis basi repens, dein erectus, mollis. Folia basi angustiole at obtusa in petiolum desinunt. Bracteolæ lanceolatae, calyx longiores. Tubus corollæ limbi longitudine. Stamina tubo medio inserta. Antheræ apice acutæ. (v. in h. Hooker).
  5. C. **HÆNKEANA**, herbacea, villosa, foliis quaternis ovato-acuminatis subtus incanis, spicis axillariibus terminalibusque, bracteis ellipticis acuminatis ciliatis.  $\mathcal{U}$  In regno mexicano (Hænke!). Aphelandra verticillata N. ab E. in h. Hænk.! Caulis bi-tripedalis. Rami subsimplicios, elongati, basi tetragoni, superne teretiusculi, albido-villosi. Folia inferiora poll.  $3\frac{1}{2}$  longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, ovata, superiora angustiora magisque ovato-oblonga, omnia in petiolum longum latumque attenuata, integrerrima, supra pilosa, subtus pubescenti-cana. Spicæ solitariæ,  $1\frac{1}{2}$ -3 poll. longæ. Bracteæ elliptico-oblongæ, cuspidatæ, nervosostriatae, extus glabré, longe ciliatae, longitudine calycis. Corolla sesquipollucaris, coccinea? glabra, subbilabiata, labio superiore profunde bifida in inferiore trifido, laciniis oblongis obtusis, superioribus angustioribus; tubus a basi in limbum sensim sensimque amplior. (v. in h. Hænk.)

LXXVI. STENANDRIUM N. ab E. in Lindl. intr. ed. 2 p. 285 et 444, Endl. gen. p. 701, Meisn. gen. p. 295 (203). — Caldenbachia Pohl ic. in h. imp. vindob. n. 2163.

Calyx quinquepartitus, laciniis æquilibus scariosis striatis. Corolla infundibuliformis; tubus cylindricus; limbus subæqualis, quadri-quinquifidus, laciniis obtusis; in nonnullis laciniis duæ superiores altius connatæ et corolla hinc subbilabiata. Stamina 4, apici tubi inserta, inclusa, ad summum fauces æquantia. Antheræ lineares, uniloculares, dorso angusto et apice hirtis pilisque suis cohærentes; filamenta brevia, antherarum sœpe longitudine. Stigma simplex, obconicum, truncatum disco prominulo, ambitu ciliato. Capsula oblonga, ad basin bilocularis septo completo adnato, paulo infra medium tetrasperma. Semina echinata, retinaculis suffulta. — Herbæ Americæ calidioris, pleræque monticolæ aut in planitie editæ crescentes, perennes vel acaules, foliis radicalibus tum pluribus,

subinde longe petiolatis, scâpis radicalibus; vel caulescentes suffruticesve, pedunculis axillaribus nudis. Flores spicati. Bracteæ imbricatae, subinde serratae. Bracteolæ calyce breviores, setaceæ. Genus proximum Crossandracæ, differt corollâ subregulari, antheris angustioribus habituque humili.

\* *Acaulia* vel *subacaulia*, corollâ sœpe subregulari, tubo faucibus (sœpe brevissimis) longiore.

1. S. DIPHYLLUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. brâs. fasc. 7 p. 75), subacuale, hirsutum, scapo supra basin diphylo, foliis ovatis obtusis petiolatis, bracteis ovali-oblongis lanceolatis acutis integerrimis.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ. Radix obliqua vel horizontalis, tuberosa, tuberibus in fibris radicis pendulis apice fibroso-barbatis. Scapus in var.  $\alpha$  1-1 $\frac{1}{2}$  poll. altus, dense hirsutulus pilis handita longis. Folia saturate viridia, prope a basi duo 3-4 lin. longa, ovata, obtusa, e basi rotundata in petiolum laminâ breviorum attenuata, hinc subspatulata; infra hoc par foliorum alterum accedit foliorum minimorum spatulatiorum; in formâ  $\beta$  scapus deest et par foliorum caulinorum cum foliis radicalibus confluit. Spica circiter 6 lin. longa, oblonga, subsquarrosa. Bracteæ ciliatae, 3 lin. longæ, inferiores ovales, superiores oblongæ, subinde omnes vel oblongæ vel lanceolatae. Bracteolæ setaceaæ, calyce breviores. Calyx bracteæ brevior, laciniis lanceolato-attenuatis striatis subtilissime ciliolatis. Corollæ violaceaæ vel pallide cœruleaæ, tubus 2 lin. longus, limbi laciniæ 5 lin. longæ, ad tubum fere discretæ, oblongo-euneiformes, obtuse, inferior latior disco ad basin hirsuto. Antheræ inclusæ, apice præsertim hirtæ.

$\alpha$ . *longiscapum*, scapo foliis longiore. — Ad S. Paulo in prov. ejusdem nominis ( Riedel ! in b. acad. petrop. n. 50 ), in campis siccis prope Itarare, Februario ( Riedel ! in h. imp. petrop. n. 281 ). ( v. in h. petrop. )

$\beta$ . *exscapum*, spicâ sessili subsessilive. — In Campis ad Porto Alegro, Rio Grande, Octobri ( Sellow ! in h. reg. berol. n. 80 ), Banda oriental, Buenos-Ayres ( Tweedie ! in h. Bentham et Hooker ). Corolla saturate rosea ( Sellow ! in shed. ). ( v. cum formâ interm. in h. berol., Hooker et Bentham ).

2. S. DULCE, acaule, scapo foliis breviore foliisque elliptico-oblongis obtusis repandis subtus nd costas petiolisque hirsutulis, bracteis lanceolatis acuminatis integerrimis enervibus ciliatis.  $\mathcal{U}$  Prope Talcahuana urbem Chilensem ( Cavañilles ), ad Valparaiso locis sabulosis siccis ( Mac Rae ! in h. Lindl. atque ex eo in h. Mart., Bridges ! in h. Hooker et Bentham n. 302 ), Chili ( Chamisso ! in h. gen. berol.), prope Zacatecas in regno Mexicano ( Hartweg ! in h. gen. berol. et Hooker ), Concepcion in Chili ( d'Urville ! in h. DC., John Style in eod. h. Barclay in b. Hooker ), ad Tarma Peruviae ( Ruiz ! in eod. h. ). Ruellia dulcis Cav. ic. 6 p. 62 t. 585 f. 2. Stenandrium Macraganum N. ab E. in h. Lindl. et in schedis. Crossandra ? fascicularis Benth. pl. Hartw. n. 182. Ruellia acaulis Ruiz ! in h. gen. berol., Pavon ! in h. Moricand. Folia fere Globulariae vulgaris, petiolo laminâ sœpe longiore. Tubus corollæ fere semipollicaris, limbi diameter 3-3 $\frac{1}{2}$  linearum. Antheræ fauces æquantes. ( v. in h. Lindl., Benth., Hooker, DC., berol. etc. )

3. S. TRINERVE, acaule, scapo laxe piloso foliis longiore brevioreve, foliis oblongis vel oblongo-ovalibus obtusis cuneatim in petiolum desinentibus ciliatis paginis glabris hirsutis, bracteis lanceolatis acuminatis ciliatis trinervibus dorso sparsim pilosis.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ. Simile est S. dulci, differt autem foliorum costis subtus baud hirsutis et bracteis longioribus evidenter acuminatis atque trinervibus. Flores intense rosei. Semina strigoso-birsuta.

$\alpha$ . scapo foliis multo longiore, foliis supra pilis raris inspersis subovalibus. — Ad S. Luzia prov. Montevideo in campis ( Sellow ! in h. reg. berol. n. 84. d. 301 ). ( v. in h. berol. et Hook. )

- β.* scapo foliis oblongis glabris ciliatis breviore eave æquante. — In campis ad Porto Alegro, Rio Grande (Sellow ! h. ber. n. 85, 3275 et 3482). (v. in h. berol. et Hook.)
- γ.* *escapum;* parce pilosum. — (Idem ! in eod. h. n. 89), Surrucucho prope Cuenca in Columbiâ (Jameson ! in h. Hooker). (v. in h. berol. et Hook.)
- γ\**. *subexscapum,* foliis hirsutissimis. — (Idem ! ibid. n. 86). Scapi vel nulli vel uni-biflori ; folia pilis confertissimis hirsuta atque incana. An varietas S. dulcis ? (v. in h. berol.)
4. *S. Pohlii* (N. ab E. in Ehdl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 75), acaule, hirsutum, scapo foliis oblongis obtusis petiolatis sessilibusve plerumque longiore, bracteis ovalibus integerrimis ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ : Corgo-Piam (Pohl ! in h. imp. vindob., Vauthier ! ex h. Endl. in eod. h.), locis argilliosis tempore pluvio inundatis prope Cujaba (Riedel ! in h. acad. petrop.), in campis siccos ad Rio Pardo flumen Septembri (idem ! ibid. n. 478), Piauhy et Goyaz (Gardner ! n. 2291 in h. Morieand et Hooker, n. 3415 in h. Mart., Bentham et Hooker, n. 4341 in h. Bentham et Hooker). Caldenbachia elegans Pohl ! in h. imp. vindob. n. 2163 ic. mala ! Folia Pilosellæ fere, at multo densiore hirsutæ; infima parva subrotunda; reliqua (2-3)  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa et  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. lata, obtusa, in petiolum plerumque brevissimum, subinde paulo magis conspicuum attenuata, integerrima. Scapus (1-2) 2- $2\frac{1}{2}$  poll. longus, hirsutus. Spica circiter pollicaris, subcylindrica. Bractæ 5 lin. longæ,  $1\frac{1}{2}$  lin. latæ, sessiles, hirsutissimæ et ciliatæ, apice obtuse acutata, in aliis obtusiusculæ vel mucronulatæ, in var.  $\beta$  saepè rotundatæ. Corolla alba et pallide cœrulea (rosea vel carnea Riedel); tubus corollæ 3-3½ lin. longus, diameter limbi 6-7 lin.; laciniæ ovales, obtusæ, erecto-patulæ. (v. in h. petrop., Mart., Benth., Hooker etc.)
- β.* *pusillum,* 1-2 poll. altum, hirsutus rufescens, omnibus partibus mino-ribus, bracteis apice rotundatis vel mucronulatis. — Parana (Riedel ! in h. acad. petrop. n. 49), Mato Grosso (h. Mus. paris. ! n. 245). (v. in h. petrop. et paris.)
- γ.. breviscapum,* scapo cum spicâ elongatâ folium æquante, foliis solito am- plioribus. — In prov. Piauhy (Gardner ! in h. Bentham n. 2291). (v. in h. Benth.)
5. *S. elegans*, subacaule, hirsutum, foliis ovalibus (aut ovali-oblongis) obtusis repando-crenatis in petiolum decurrentibus, scapo foliis longiore, spicâ laxâ, bracteis patulis oblongis mucronato-acutis utrinque unidentatis ciliatis.  $\mathcal{L}$  In prov. Caracas, Januario-Aprili (Moritz ! n. 337 in h. gen. berol., Linden ! n. 21 in h. Hooker). Caulis pollicaris. Spicæ axillares, aliæ minores folio bre-viores sunt, sed pleræque tamen folio duplo longiores. Bractæ inferiores a reliquis magis distantes, earum par inferioris sterile et integrum. Reliquæ tri-nervæ, ciliatæ, patulæ, utrinque infra apicem serraturæ subulatæ præditæ et infra hanc plerumque denticulo exiguo. Calyces bracteam æquantes. Bracteolæ calyce dimidio breviores. Corolla subhypocrateriforma, laciniis obovatis. Inter reliqua S. Humboldtiano imprimis accedit. (v. in h. berol.)
6. *S. radicosum*, pubescens, caule basi radicante apicem versus folioso, foliis elliptico-oblongis acutiusculis in petiolum longum acute decurrentibus, scapis infraterminalibus foliis longioribus vel ea æquantibus simplicibus bifidisve, spicâ laxâ, bracteis patulis lanceolatis acuminatis apicem versus utrinque alterove latere unidentatis ciliatis.  $\mathcal{L}$  Prope S. Martha et Maracaybo in Co-lumbiâ in silvis montanis humidis (h. Hooker !, Moritz ! n. 1273 in h. gen. berol.) A S. elegante differt bracteis angustioribus acuminatis calyce subdupo longioribus. Caulis inferne ramis radicalibus pluribus longis ramosis subfasci- culatus instructus est. (v. in h. Hooker et berol.)
7. *S. rupestre*, acaule, plus minus hirsutum, foliis oblongis ovalibusve longe petiolatis (repando-crenatis), scapo folia æquante, bracteis lanceolatis.  $\mathcal{L}$  In fissuris rupium juxta fluvios in desertis insulæ Hispaniolæ (Swartz !). Ruellia

- rupestris Swartz prodr. fl. iud. occ. p. 93, fl. ind. occ. 1071, Willd. sp. pl. 3 p. 375, h. Willd. n. 11657 et Schreb. spec. Swartz! Gerardia foliis subovatis tomentosis Plum. ic. p. 64 t. 75 f. 2. Folia e basi obtusâ subcordatâe in petiolum decurrentia. Scapus in spec. Willd. hirsutus. Corolla pallide carnea maculâ purpureâ ad basin laciniarum superiorum, quæ tribus inferioribus minores. Flores primordiales clandestini. (v. in h. Willd. etc.)
8. S. DROSEROIDES, acaule, hirsutum, foliis oblongo-spathulatis longe petiolatis integerrimis, scapo foliis longiore gracili, bracteis lanceolatis.  $\mathcal{L}$  In Insula Cuba (Ramon de la Sagra! in h. DC.) Simile S. rupestri, differt foliis basi cuneatâ in petiolum desinenteribus, scapo longiore (subflexuoso). Folia obtusa. Spica pauciflora, nutans. Corolla parva. (v. in h. DC.)
9. S. HUMBOLDTIANUM, acaule, hirsutum, foliis oblongis acuminatis integerrimis in petiolum brevem attenuatis, scapo foliis longiore, spicâ laxâ, squamis lanceolatis patulis.  $\mathcal{L}$  Atures, Maypures Americae meridionalis (Humboldt! in h. gen. berol.). Elytraria Kth. in h. reg. berol. Scapus spithameus. Spica laxe patuloque 4-faria. Bracteæ calyce paulo longiores; bracteolæ calyce breviores. Corolla hypocraterimorpha, tubo fere 4 lin. longo. Stamina 4 inclusa, antheris unilocularibus dorso hirsutis. (v. in h. berol.)
10. S. RIEDELIANUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 76), pulv brevissimâ velutinum, foliis ovato-oblongo-spathulatis obtusis repandis petiolo longo, scapo folia vel æquante vel superante, spicæ angustæ floribus inferioribus omnibus distantibus, bracteis lanceolato-subulatis oblongisve calycem vix æquantibus.  $\mathcal{L}$  In umbrosis Brasiliæ ad margines silvarum montium Serra da Chapada, Septembri (Riedel! in h. acad. petrop.), Facenda da Piedade et Tamburel (Sellow! in h. reg. berol.). Bracteis brevibus calycem raro æquantibus a reliquis excepto S. scabroso recedit, tum etiam corollâ angustiore (6 lin. longâ, tubo limbo breviore). Folia omnia radicalia, subsucculentæ videntur, namque in statu sicco punctulata et asperulo-papulosa apparent, evidenter repanda, in petiolum laminam æquante cædemve longiore attenuata. Scapus 1½ poll. longus, pubescens-scaber. Spica 1-2 $\frac{1}{2}$  pollicaris. Bracteæ lin. 1 longæ, acutæ, obtusæ, scabre, patulæ. Bracteolæ calyce duplo longiores; calycis laciniae lanceolatae, acuminatae, striatae, glabriuscule. Corolla vel alba, vel carnea, vel coerulea. Antheræ valde hirsuta. Capsula calyce duplo longior, valvis utrinque plicato-costatis. Semina hirta. (v. in h. petrop. et berol.)
11. S. SCABROSUM, acaule, foliis ovatis brevipetiolatis subrepandis glabris subtus scabris, scapo foliis longiore, bracteis minutis subulatis.  $\mathcal{L}$  In petrosis umbrosis Hispaniolæ (Swartz!). Ruellia scabrosa Swartz! fl. ind. occ. p. 1074, Willd. sp. pl. 3 p. 375.
- Caulescentes, corolla subtiliata, infundibuliformis, tubo faucibus breviore.
12. S. MANDIOCCANUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 76), canescens, suffruticosum, geniculato-vagans, pubescens, foliis ovali-oblongis, spicis axillaribus terminalique folio brevioribus.  $\mathcal{L}$  In silvis umbrosis provinciæ Rio de Janeiro Brasiliæ prope Mandioccam (Beyrich! Sellow! in h. gen. berol. n. 161 et 224), ad Cabo Frio (Max. Princ. Wied.), in collibus siecis prope Rio Janeiro, Septembri (Riedel! in h. acad. petrop. n. 788), in monte Corcovado, ad Capo Cabana prope Sebastianopolin, Februario-Augusto (Luschknath! in h. Mart. et in h. acad. petrop.). Ruellia geniculata Velloz, fl. fl. 5 t. 93? Blechum brasiliense h. Mart. Frutex humilis. Folia acuta vel obtusa, integerrima. Spicas breves, bracteis spathulato-cuneiformibus tri-quinquenervibus obtusis. Bracteolæ calyce breviores, setaceæ. Corolla trilinearis, pallide purpurascens, pubescens, subtiliata, scil. lacinias duabus superioribus altius concretis, inferâ latiore ovatâ, lateralibus oblongis. Capsula trilinearis, fusca. Variat capsulâ dispermâ. (v. in h. Beyrich, berol., Mart., petrop. etc.)

13. *S. SERPENS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 77), caule suffruticoso serpentino basi repente adscendente vel decumbente setulis incurvis hispido attate glabrescente, foliis oblongis obtusis glabris basi inaequilateribus in petiolum brevissimum desinentibus, spicis axillaribus terminalique sessilibus strictis folium aequantibus, bracteis lanceolato-subulatis trinervibus calyce longioribus.  $\mathcal{U}$  In silvis Porto Seguro Brasiliæ (Max. Princ. Wied ! in h. Nees et Mart. ). Eranthemum macrostachyū Mart. in sched. Caulis ( $\frac{1}{2}$ -1 ped. longus) subinde eleganter arcuato-serpentinus decumbens, subinde adscendens at basi saltu repens. Folia inferiores cum petiolo linearī  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 poll. lata, superiora paulo minora et angustiora, omnia subcoriaceae integerrima, pallide viridia, costâ subtus valde prominente, latere altero versus basin angustiore. Spica a basi florens,  $2\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa, terminalis, vel et altera axillaris. Bracteæ stricte subulatae,  $2\frac{1}{2}$  lin. longæ, glabrae. Bracteolæ setaceæ, ciliolatae, calyce bilineari dimidio breviores. Corolla 4 lin. longa, violacea, limbi laciniis acutiusculis, duabus superioribus minoribus lanceolatis, tribus inferioribus subovalibus. Capsula bilinearis, apice totave expallens. (v. in h. Mart. et propr.)
14. *S. TENELLUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 77), caule petiolis foliorumque costis pubescenti-hirtis, foliis ovatis obtusis e basi rotundatâ in petiolum acute desuentibus, spicâ terminali brevi sessili, bracteis obovato-cuneatis integerrimis subulato-cuspidatis ciliatis, corollæ laciniis subæqualibus rotundatis, duabus superioribus breviribus altius connatis, mediâ inferiore reliquis latiore. (1)? In Brasiliâ : frequens in silvis altis prov. Rio Grande, ad Porto Alegro, in Serra do S. Antônio, Octobri (Sclow ! in h. gen. berol.). Caulis basi repens, tener. Folia poll. 1 longa, 8 lin. lata, petiolo 6 lin. exacte ovata, subtus pallidiora. Bracteæ 5 lin. longæ, tenues, albideæ, quinque nervosæ, nervis lateralibus extrorsum venosæ. Corolla lutea, 7-8 lin. longa, tubo brevissimo, faucibus obconicis. Stamina profunde inclusa. (v. in h. berol.)
15. *S. HIRSUTUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 77), caulescens, herbaceum, hirsutum, foliis oblongis, pedunculis axillaribus folio longioribus.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ ad S. José (Pohl ! in h. imp. vindob. n. 2183), in campis prope Curau ad fluvium, ad Rio Pardo, et in campis siccis prope Soto Curau, Septembri (Riedel ! in h. acad. petrop.). Semipedale, pedale et altius. Caulis subsimplex, erectus, pilis longis patentibus in sioco plus minus fulvis obsitus. Folia sessilia, apice nonnihil attenuata at obtusa, integerrima, nitentia, longe ciliata,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  poll. longa, 6-5 lin. lata. Spicæ oblongæ,  $2\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longæ, in pedunculis bi-sesquipollicularibus hirsutis aphyllis. Bracteæ 5-4 lin. longæ, elliptico-oblongæ, obtusæ cum mucronulo, integerrimæ, hirsutæ, vel saltem longe ciliatae, quinque nervosæ. Bracteolæ subulate, glabrae, calyce  $\frac{1}{2}$  breviores. Corolla venosæ tubus  $1\frac{1}{2}$  lin. longus, limbi diameter semipollicularis. (v. in h. vindob. et petrop.)
16. *S. VILLOSUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 77), caulescens, herbaceum, villosum, foliis lanceolatis sessilibus obtusis, pedunculo terminali.  $\mathcal{U}$  In siccis Cuyabæ, Septembri (Riedel ! in h. acad. petrop.). Pedunculo terminali, pubescens confertiore mollioreque, bracteis minoribus ovato-oblongis foliisque angustioribus satis differt a *S. hirsuto*, cui affinitate est conjunctius. Corolla rubro-violacea. (v. in h. petrop.)

## LXXVII. POLYTHRIX. — Barleræ spec. Bojer.

Calyx 5-partitus, laciniis lœvibus convolutis, exterioribus latioribus. Corolla infundibuliformis, tubus brevis, cylindricus, limbus trifidus, laciniis subæqualibus, duabus superioribus oblique emarginatis. Stamina apici tubi inserta, inclusa; filamenta brevissima; antheræ lineares, uniloculares, per paria subcohærentes, dorso angusto acuto glabro, valvis margine ciliatis. Stigma.... Capsula oblonga, usque ad basin bilocularis septo completo adnato, paulo infra medium tetrasperma, apice subcapitata.

tata ovata, rigidior, nitidissima, sterilis. Semina lœvia, ovata, retinaculis suffulta. — Frutex Madagascariensis, caule erecto stricto subsimplici pubescenti-strigoso cano, foliis patentibus oblongis obtusis integrerrimis in petiolum attenuatis pubescenti-scabris ( $4\frac{1}{2}$  poll. longis 6 lin. lati). Spica terminalis sessilis, 4-2 poll. longa, satis crassa, dense imbricata, tetra-sticha. Bracteæ magnæ; in nostrâ setaceo-ciliatæ. Bracteolæ duæ, linearipetaceæ, calycem æquantes. A Stenandrio quibus differat, ex comparatis characteribus patet.

P. STENANDRIUM. — *2* In silvis locis aridis ad sinum Bombatok insulæ Madagascar et in montibus provinciæ Emyr, atque in silvis Be-fourem (Bojer in h. Hooker). Barleria polytricha Bojer! in h. DC. Frutex 2-5 pedes altus. Bracteæ 9 lineas longæ, ovales, basi cuneatæ, longissime subulato-cuspidatæ, cuspidé complicatæ patulæ glabra, utrinque apicem versus dentibus 4-5 setaceis longis prædictæ. Calyx chartaceus, rigidulus, glaber, lœvis, laciñis tribus exterioribus 5-4 lin. longis ovali-oblongis setaceo-cuspidatis convolutis, duabus interioribus duplo fere brevioribus linearí-lanceolatis acuminatis. Corolla fere pollicaris, tubo pulvérulo-tomentoso, limbi laciñis obovatis basi angustioribus. Capsula fusca, glabra, 2 lin. longa. (v. in h. DC. et Hooker).

LXXXVIII. GEISSOMERIA Lindl. bot. reg. t. 1045, Endl. gen. p. 702, Meisn. gen. p. 295 (204), N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 79. — Pæcilocnemis Mart. in sched.

Calyx 5-partitus, laciñis plerumque herbaceis latis imbricatis, positiçā latiore. Corolla tubulosa, sursum sensim dilatata, limbi plerisque subbilabiati laciñis brevibus erectis, duabus superioribus mediâque inferiore latioribus, lateralibus paulo angustioribus, intermediâ inferiore in disco sœpe barbatâ. Stamina 4 corollæ tubo prope a basi inserta, subdynamæ, corollam æquantia raro superantia; filamenta basi pilosa; antheræ uniloculares, basi apiceque acutæ, dorso herbaceo carinato affixæ, apice barbatæ villisque connexæ. Ovarium unguiculatum, biloculare, loculis biovulatis. Fructus ovalis, basi haud contractus, a medio tetraspermus. Stigma excavatum. — Fruticuli Brasilienses, caule tetragono, foliis ovalibus oblongis. Corollæ longæ, puniceæ, sœpe velutinæ, tubo nonnihil incurvo. — Ab Aphelandra differt corollæ limbo subregulari nec distincte bilabiato et antheris arctius cohærentibus, tum calycis laciñis (in sectione I) crassioribus, a Strobilarhachi et Lagochilio distinguitur corollæ structurâ. Spicæ axillares et terminales, arcte imbricatæ. Flores solitarii, oppositi, tetraстichi. Bracteæ in sect. 1 vix calycem æquantes, at eo latiores, rigidulæ, adpressæ, nervosæ, in sect. 2 calyce longiores et latiores. Bracteolæ duæ similes, calycis laciñis angustiores, at paulo breviores.

### Sectio 1. BRACHYSTEGIÆ.

Bracteæ calycem ad summum æquantes ejusque laciñis herbaceis nervoso-striatis.

1. G. NITIDA (N. et M. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 80), fruticosa, glaberrima, foliis oblongis utrinque acutis nitidis, spicâ terminali pedunculatâ simplici basive racemosâ, bracteis bracteolisque triangularibus integrerrimis calyce plus duplo brevioribus, corollæ glabrae limbo brevi, labii inferioris laciñis subæqualibus. *2* In silvis primævis Brasiliæ, presertim provinciæ Bahiensis v. c. ad viam Felisbertiam, Januario-Martio, porro ad Villam vicissim in silvis maxime umbrosa (Max. Princ. Wied! in h. Mart.) (Blanchet! in h. gen. berol. n. 3233, n. 737, 1430, 2107 et 3233 in h. Moricand, Sellow! ibid. n. 52 et 269), Bahia in silvis opacis (h. DC. et Benthamp!

1. c.), locis umbrosis humidis prope Ilheos, Septembri (Riedel! in h. acad. petrop. n. 407), prope Esperança, Maio idem! ibid. n. 801 a). *Aphelandra nitida* N. et M. in nov. act. ac. nat. cur. xi p. 1 p. 57. *Justicia eriandra* Salzmann! in h. DC. Benthani et Hooker. Transitum ad Aphelandram parat. Corolla paulo distinctius bilabiata est, labio superiore latiore bifido lacinis ovatis. Flóres inferiores pedicellati, pedicello bracteam æquante aut supèrante. Corolla sesquipollucaris, glabra, incurva, læte rubro-incarnata (Blanchet). *Antheræa hirsutæ*. Frutex alt. 4-8 pedum, basi repens. Folia sæpe pedalia, nitidissima subcoriacæa. Variare videtur calycis lacinis latioribus ovatis et flore breviore incarnato (Blanchet n. 737 et 1430), et calycis lacinis magis oblongis corollâ longiore coccineâ. Forsan hic duæ latent species. (v. in h. Mart., DC., berol., petrop., Hooker etc.)
2. *G. MACROPHYLLA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 80), glaberrima, foliis elliptico-oblongis argute cuspidatis basi cuneiformibus petiolatis venoso-reticulatis nitidis, spicis axillaribus terminalique brevibus, bracteis ovatis acutis margine nudis calycem æquantes. ♂ In silvis ad Soteropolin et Villa de Cacheira provinciæ Bahiensis, Januario (Martius!), in provinciâ Bahiensi (Salzmann! l. c.). *Geissomeria longiflora* Salzm. in h. acaâ, petrop. *G. cestrifolia* similis; differt caule crasso, probabiliter molli succulento, quippe in statu sicco collapso, annulo articulari angusto axillas contingente, foliis majoribus 10 poll. longis (adjecto petiolo pollucari) 3 poll. latis cuspidatis cuspidé angustâ acutâ, basi magis in petiolum decurrentibus, bracteis majoribus, calycis segmentis omnibus subæqualibus ovalibus. Corolla ad summum 9 lin. longa, glabra, in sicco sordide rubra. An *Geissomeria* nitidæ status incompletus? (v. in h. monac. et petrop.)
3. *G. CESTRIFOLIA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 80), glaberrima, foliis oblongo-ellipticis obtuse cuspidatis, basi cuneiformibus petiolatis venoso-reticulatis nitidis, spicis supraaxillaribus terminalibusque brevibus, bracteis ovatis subulato-acuminatis margine nudis calyce brevioribus. ♂ In silvis Serra Grande Brasilæ, prope Camamu, Januario (Martius!). Arbuscula subsimplex, rami subtetragoni, glabri, cortice pallido, articulis annulo supra-axillari marginato subtruncato ochreiformi notatis. Folia rigidula, nitida, cum petiolo pollucari trigono 6-7½ poll. longa, 2½-2¾ poll. lata, integerrima. Spicæ circiter pollicares, axillares, pedunculatae, cum terminali confertæ, haud admodum dense. Bractæ 1½-1¾ lin. longæ, glabrae, nec ciliatae, exquisite acuminatæ. Calycis laciniae 2½-2¾ lin. longæ. Corolla ¾ poll. longa, glabra, coccinea, lacinis ovatis subæqualibus, superioribus paulo brevioribus a reliquis paulo profundiore sinu discretis. (v. in h. monac.)
4. *G. CINCINNATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 81), foliis oblongis acuminatis in petiolum late latum attenuatis glabris, spicis corymbosis strigilosis, bracteis ovatis acutis scabris calyce brevioribus ciliatis. ♂ In silvis ad ostia Torantins in terra continente provinciæ Paraënsis, et in insulâ Marajo, Julio (Martius!), ante prædium Tapebussa in silvis ad fluvium Iriri, Septembri (Max. Princ. Wied! in h. Mart.), prope Rio de Janeiro (Karwinski! in h. Mart.), in silvis montium Serra d'Estrella, Aprili (Riedel! in h. acad. petrop.) et prope Summidouro, Martio et Aprili (Schlow! in h. gen. berol.). *Pœcilocnemis cincinnata* Mart.! in h. reg. monac. *Pœcilocnemis multiflora* Mart. obs. n. 1059 (nec h. monac.). Frutex 4-5-pedalis, ramis teretibus. Folia 9 poll. longa, 2½-3½ poll. lata, tenuia. Spicæ ex axillis foliorum supremorum et terminales; illæ pedunculo 6-4 pollices longo valido stricto basi arcuato tereti suffulta, quaternæ-ternæ-binæ corymboso-aggregatæ basique foliosæ. Calyx bractæ paulo longior. Corolla pollucaris velutino-pubescentia, coccinea, basi subgloboso-inflata, post haec angustior sursumque ambitu leniter crescens, compressiuscula, nonnihil curvata, limbo quinquefido subbiliabili brevi, lacinis in medio flavis, duabus superioribus paulo brevioribus rotundatis, tribus inferioribus longioribus, lateralibus oblongis obtusis, inter-

media latiore ovata acutâ iu disco laxe barbatâ (v. iu h. monac., petrop., berol., Mart.)

5. G. LONGIFLORA (Lindl. iu bot. reg. t. 1045), caule glabro superne sœpe puberulo, foliis elliptico-oblongis apice attenuatis basi in petiolum longum decurrentibus glabris, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis ovato-oblongis calyce brevioribus ciliatis. ♂ In Brasiliâ. — N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 81. Differt a G. ciucinnatâ foliis miioribus (cum petiolo basi angusto pollicari) 4-5 poll. longis 1-1½ poll. latis, (obtuse aut argute acuminati), bracteis bracteolisque etiam calycis lacinias inferioribus apicem versus magis attenuatis, spicis brevioribus; corollæ barbâ densiore. — Corolla haud longior est quam præcedentis, quin sœpe brevior (10-12 lin. longa). Spicæ inferne foliosæ, scil. bracteis iuferioribus foliaccis oblongo lanceolatis. Variat in universum spicis modo brevibus, modo longis, et florum jugis tum magis distauitibus.

α. obtusa acuminé folii obtuso. — In silvis Serra do Mar provinciae Rio de Janeiro, Decembri (Martius!), in monte Corcovado prope Rio de Janeiro urbem (Tweedie! n. 1196 in h. Hooker et in silvis Macahé, Augusto, Luschnath! in h. Mart. et petrop., Schott! in h. imp. vindob. n. 6125 et 6128, Sellow! in h. reg. berol. n. 95, Riedel! in h. acad. petrop.), in omnibus arboribus silvarum grandium prope Rio de Janeiro, Junio (Baile! in h. DC. Gardner n. 586! in h. pal. vindob., Hooker et Bentham!). Steuandrium speciosum N. ab E. in Mart.! h. n. 456. (v. iu h. monac., DC., petrop., berol., vindob., Hooker et cult. ex h. soc. hort. lond.)

β. acuta, acumine folii acuto. — In Morro Queimado ad Novum Friburgum provinciae Sebastianopolitanæ (Sommer! in h. Mart.). Stephanophysum attenuatum Mart. h. bras. n. 179. Caule magis pubescente foliisque angustioribus ad G. pubescens accedit. (v. cult. in h. DC., berol., vindob. etc.)

γ. paniculata, ramis trichotomis tristachyis. Differt inflorescentiâ magis compositâ, bracteis superioribus villosis (7-nervibus) calyce plus duplo brevioribus. Folia supra pilis raris inspersa sunt. (v. in h. Mart.)

δ. spica solitaria densa subinvolucrata. — Prope Rio Janeiro (Twedie! in h. Bentham).

6. G. PUBESCENS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 82), caule superne pubescente, foliis oblongis utrinque attenuatis apice obtusiusculis basi in petiolum longum angustum attenuatis, spicis axillari terminalique subcorymbosis brevibus, bracteis ovato-oblongis obtusiusculis calycem subæquantibus. ♂ In silvis ad præsidium S. Joannis Baptiste provinciae Minarum, Aprili (Martius! Ackermann! in h. Mart.), (Schott! in h. imp. vindob. Clausen! in h. Mus. paris. n. 227), ad Facenda do Pinhal, Maio (Sellow! in h. gen. berol. ex parte), ad Cabo Frio cum Beloperone involucrata (Max. Princ. Wied), in provinciâ Goyaz (Gardner! in h. Bentham et Hooker n. 4343). Differt a G. longiflorâ, imprimis pubescentiâ haud ita quidem densâ, at in omnibus plerunque partibus obviâ, præsertim in inflorescentiâ canescen- tiâ aliquam induente. Folia omnino fere ut in G. longiflorâ nisi paulo angustiora, petiolo ad basin distincte alato, 6-6½ poll. louga, 1-1½ poll. lata. Spicæ sesquipolares; terminalis sessilis, laterales pedunculo breviores. Bracteæ 2½ lin. longæ, 1 lin. latæ, obtusiusculæ, dorso plus minus villosæ, marginc ciliatæ. Corolla 10 lin. longa, velutina; laciniaæ limbi omnia obtusaæ; sinus labia distinguens paulo magis conspicus est. Variat foliis bracteis que magis vel minus pubescentibus, subinde foliis solummodo ad costas strigilosis, foliisque vel oblongis magis lanceolatis. (v. in h. monac., viudob., Mart., paris., berol., etc.)

β. spicis lateralibus brevius pedunculatis et propter bracteas iufieriores majores

foliaceas lanceolatas ad speciem involueratis. — Ante Antes in Serra Macano, Orixas Brasiliæ (Pohl! in h. Mus. palat. vindob. n. 1727 fol. 4 Beloperone nodicaulis), ad Facenda do Pinhal, Maio (Sellow! in h. reg. berol.), in silvis ad S. Carlos, Januario (Riedel! in h. acad. petrop.). (v. in h. vindob., berol., petrop.)

*γ. velutina*, spicis 1-3 terminalibus inferne foliaceo-bracteatis, foliis subtus velutinis. — In provinçia Goyaz (Gardner! in h. Bentb. et Hooker n. 3952). Geissomera pubescens γ monostachya N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 82). (v. in h. Gardn. etc.)

7. *G. SCHOTTIANA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 82), foliis oblongis utrinque attenuatis acumine angusto basi in petiolum brevem attenuatis glabris, spicis axillaribus terminalibusque brevibus densis ovatis paniculatis, bracteis ovatis villosis calyce brevioribus. ♂ In Brasiliâ (Schott! in h. pal. vindob. n. 6124), Facenda do Pinhal (Sellow! in h. gen. berol. 106, 127 et 200 ex parte), in silvis primævis Macahé provincie Minarum Generalium, Maio, Junio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 784). Differt a *G. longiflora* et pubescente foliorum acumine longiore angustiore subacuto saepè falcato, petiolo breviore et pedunculus ex axillis foliorum superiorum trifidis magisve compositis patentibus foliis floralibus parvis prædictis folio plerumque brevioribus (incanis), spicis brevibus ovato-subglobosis, bracteis dense strigiloso-villosis ovatis acutis vix lineæ longioribus calyce minus strigoso duplo brevioribus. Folia supra dense lineolata. Corolla pollicaris, incurva, coccinea. (v. in h. vindob., petrop., berol.)

8. *G. DISTANS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 83), glabra, foliis oblongis utrinque attenuatis acumine angusto basi in petiolum longum coangustatis, spicis axillaribus terminalibusque paniculatis, floribus oppositis discretis, bracteis bracteolisque ovatis ciliatis calyce brevioribus. ♂ In Brasiliâ (Schüch! in h. palat. vindob.). Ruellia spicata Velloz. fl. fl. 5 t. 92. A reliquo differt floribus in spicis non imbricatis sed Merithallorum longitudinem æquantibus proptereaque discretis. Inflorescentia fere ut in *G. Schottianæ*, sed spicas longiores sunt (2-2½ poll. longæ) et lineares neque ovatae fereque capituliformes. Pedunculi communes circiter pollicares, glabri, patuli ut in *G. Schottianæ*, eorum rami seu pedunculi proprii pubescentes. Calyx 2-2½ lin. longus, lacinias ohlongo-lanceolatis obtusis ciliatis. Corolla pollicaris, coccinea, pubescens. (v. in h. vindob.)

## Sectio II. PLATYSTEGIÆ.

Bracteæ calyce longiores et latiores. Calycis laciniae membranaceæ.

9. *G. BRACTEOSA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 82), fruticosa, glabra, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi attenuatâ in petiolum longe decurrentibus subtus glaucoscentibus, spicis terminalibus brevipedunculatis tetragonis, bracteis ovatis argute acutatis margine nudis calyce longioribus latioribusque. ♂ In silvis primævis densissimis summas Serræ dos Orgaos provinciæ Sebastianopolitanæ, Septembri (Khotzky! n. 154 in b. DC.). Frutex erectus, ramosus; rami adulti teretes, cortice cinereo inæquali, novelli quadrilateri. Folia inferiora 7-8 poll. longa, 1½-1¾ poll. lata, superiore 3 poll. longa, 12-10 lin. lata. Spicæ in ramis terminales, 2-3 poll. longæ, regulariter quadrifariae, bracteis erecto-patulis. Bractea Strobilorhacheos bracteas similes, sed non tam arcte imbricatae, 7 lin. longæ, 4 lin. latæ, argutissime cuspidato-acuta, dorso scabriuscule. Corolla 1½ poll. longa, anguste obconica, incurva, coccinea, glabra; limbi laciniae triangulares, mucronatae, subæquales; inferior paulo profundius divisa. Capsula oblonga, nitide testacea, subtetragona, ad basin bilocularis, in medio tetrasperma. (v. in h. DC.)

LXXIX. SALPIXANTHA Hook. bot. mag. t. 4158.

Calyx quinquedentatus, dentibus ovatis. Corolla infundibuliformi-hypo-

crateriformis (i. e. tubulosa, sursum sensim dilatata, limbo patentí-recurvo), laciñis limbi æqualibus rotundatis retusis. Stamina 4 corollæ tubo prope a basi inserta, subdidynama, corollam æquantia; filamenta glabra; antheræ uniloculares, glabræ, dorso herbaceo carinato affixæ. Ovarium biloculare, loculis biovulatis. Stigma obtusum. Fructus... — Frutex Indiæ occidentalis. Spicæ axillares et terminales. Flores arcte sessiles, oppositi, bracteis et bracteolis æqualibus calyce brevioribus. Corollæ coccineæ. — Genus proximum Geissomeriaæ et vix differens nisi calyce haud ad basin partito et corollâ perfecte regulari.

S. COCCINEA (Hook. l. c.) ♂ In ins. Jamaica (Purdie, hort. reg. kew. Wilson! in h. Hooker). Frutex ramosus, glaber; rami teretes. Folia ovalia, nitida, acumine obtusiusculo, basi obtusa in petiolum brevem desinentia. Pedunculi axillares, oppositi, folia subæquantes vel terminales, terni. Spicæ nutantib. Flores distantes. Calyx ovatus, brevis. Bractea et bracteola calyci adpresso. Corolla pollicaris, amœna rubra, faucibus albis. Quod ad habitum persimilis est Geissomeriaæ distanti. (v. in h. Hooker et Nees).

LXXX. LAGOCHILIUM N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 85. — Stenandrii spec. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. l. c.

Calyx quinquepartitus, laciñis lanceolatis æqualibus, mediis angustioribus. Corolla tubo obconico, limbo subbilabiato 4-5-partito, labio superiore vel bipartito vel integrō, inferiore tripartito, laciñiā mediā latiore. Stamina quatuor, æqualia, limbum æquantia aut paulo breviora; antheræ lineares, uniloculares, latere hirtæ. Capsula a basi ad medium tetrasperma. Dissepimentum adnatum. — Herbæ vel frutices Americani, foliis sat ampliis, Aphelandræ et Crossandræ habitu. Spica vel una vel 2-3 terminales, tetragonæ, bracteis oppositis latis obtusis coloratis, propriis calycis laciñiis similibus usque paulo majoribus coloratis. — Differt ab Aphelandris limbo corollæ ad tubum usque quinquepartito, laciñis solummodo connivendo bilabiatam corollam referentibus et capsulâ a basi, nec a medio, seminiferâ. A Crossandris distinguitur limbo corollæ haud dorso profundius discreto subfisso et secundo, tubo latiore, filamentis longioribus.

### § 1. *Bracteis serratis.*

#### a. *Foliis pictis.*

1. L. MACULATUM, caulescens, herbaceum, subtilissime pubescens, foliis oblängis in disco pictis, pedunculis axillaribus folio longioribus, spicis laxis, bracteis oppositis unifloris patentibus ovali-oblongis acuminatis in medio spinulososerratis. ♂ Ad Chicoplaya Peruvia (Ruiz!), Caniguo in provinciâ Guayaquil (Hall! in h. Hook.). Ruellia maculata Tafalla cum icoñe 357, Ruiz in h. gen. berol. Caulis basi repens, ascendens. Folia majora poll. 4 longa, 1½ poll. lata, plagâ mediâ dentatâ pallidâ notata. Spicæ teneræ, cylindricæ, imbricatae; florentium bracteæ divergentes, parium circiter 7-8 distantes, 5 lin. longæ, calyce membranaceo plus duplo longiores. Stigma infundibuliforme, subbilabiatum. (v. in h. gen. berol. et specim. incompl. in h. Hooker).
2. L. PICTUM, foliis cordato-ovatis acutiusculis costis venisque coloratis, caule herbaceo repente petiolisque lanatis, spicâ terminali, bracteis remotiusculis ovalibus acutis, laciñis calycis apice setaceis. ♂ Maynas (h. Endlich!) in h. imper. vindob. n. 2283. Caulis 3-4 poll. longus, geniculatus, ad genicula fibras radicales emittens. Folia absque petiolo, 2-3 poll. longa, 1½-2 poll. lata, breviacuta, basi cordata, subrepanda, glabra, supra lineolata, ramis costalibus 6-7nis supra flavis, venis flavis reticulatim conjunctis, subtus minus coloratis scabris. Pedunculus terminalis, pollicaris, tomentosus. Spica

- 1-1<sup>½</sup> poll. longa, rhachi tomentosâ. Bracteæ articulos rhacheos æquantes, 3 lin. longæ, incumbentes, sessiles, longe ciliatæ, uniflora? Calyx parvus (in nostro specimine maxime destructus et fragilis), lacinis setaceo-acuminatis ciliatis. Corolla ( secundum Poeppig ) bilabiata, labio inferiore trilobo. Stamina duo, loculis parallelis vix inæqualibus. Ovarium oblongum; stylus longus, intortus; stigma bidentatum. (v. in h. vindob.)
3. L. HYDROMESTUS, caule erecto glabro, foliis cruciatim oppositis nitidis rugosis undulatis luteo-maculatis coriacieis obtusiusculis basi acutis petiolatis, spicâ (4-5 poll. longâ) terminali quadrifariam imbricata. ♂ In Mexico (Scheidweiler!). Hydromestus maculatus Scheidw. in Gartenz. 1842 p. 285. Bot. reg. 1843 app. p. 40 n. 46. Suffrutex parvus, 2 ped. altus, floribus luteis. Folia 8 poll. longa, 3 poll. lata, nitida, rigidula; petioli pollicares (ex horto botanico Bruxellensi).
4. L. ORNATUM, caule petiolis foliorumque costis subtus strigoso-hirsutis, foliis ovalibus obtusis acute in petiolum desinentibus costâ media flavo-limbata, spicâ terminali sessili; bracteis ovalibus complicato-acutis glabris ciliatis spinuloso-serratis, corollæ lacinis subæqualibus ovatis, duabus superioribus paulo brevioribus. ♂ In Brasiliâ (Sellow ! in h. gen. berol. n. 175, loco natali haud adnotato). Stenandrium venatum (errore typographicò loco ornatum). N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 79. Differt a L. decorato foliis paulo brevioribus maximeque autem bracteis plus dimidio majoribus, basin versus haud angustatis, venoso-9-nervibus et inde a basi fere ad apicem usque utrinque serraturis spinulosis 8-9 instructis. Accedit ad L. obtusifolium, sed et isti bracteæ cuneatae sunt. (v. in h. berol.)
5. L. DECORATUM, herbaceum, caule humili petiolis foliorumque costis præsertim subtus strigoso-hirsutis, foliis oblongo-ovalibus obtusis acute in petiolum desinentibus, costâ primaria ejusque ramis albo- (flavo-?) limbatis, spicâ terminali sessili, bracteis obovato-cuneatis mucronato-acutis laxe hirsutis apicem versus spinuloso-serratis, corollæ lacinis subæqualibus ovatis, duabus superioribus paulo brevioribus, tubo faucibus breviore. ♂ In Brasiliâ (Sellow ! in h. gen. berol. n. 114 et 234, loco natali haud adnotato). Stenandrium decoratum N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 79. Præpinquum L. igneo et picto, sed differt formâ foliorum. Caulis simplex, 2-4 poll. altus, basi repens. Folia 3<sup>½</sup>-4 poll. longa (cum petiolo 3-6 lin.), reticulata, integerima, limbo costatum et ejus ramos cingente effuso subinde in siccis evanescente. Bracteæ 4 lin. longæ, tri-quinquenerves, ciliatae, apicem versus utrinque serraturis 3. Corolla coccinea ?, 6 lin. longa, glabriuscula. Stamina inclusa. (v. in h. berol.)
- b. *Foliis immaculatis.*
6. L. BAHIENSE, herbaceum, caule humili petiolis foliorumque costis strigosis, foliis oblongo-ovalibus in acumen obtusum attenuatis in petiolum decurrentibus immaculatis subtus pallidis, spicâ terminali sessili, bracteis oblongis obtusis mucronulatis ciliatis apicem versus spinuloso-serratis, corollæ lacinis subæqualibus ovatis duabus superioribus paulo brevioribus, tubo faucibus longiore. ♂ Circa Bahiam (Blanchet ! n. 2106 in h. Moricaud), in locis petrosis prope Castel Novo, Martio-Riedel ! in h. acad. petrop. n. 650). Differt a L. decorato foliis non pictis haud apice rotundatis sed in acumen obtusum attenuatis et corollâ graciliore 7-8 lin. longâ. Bracteæ laxiusculæ tetrastichæ, 6 lin. longæ, 5-nerves, sparsim puberulae, apicem versus utrinque serraturis 4. Corolla lutea. Stamina limbum æquantia, antheris glabris mucronatis. (v. in h. Moricaud et Hooker).
- β. *angustifolium*, foliis oblongo-lanceolatis.
7. L. OBTUSIFOLIUM, suffruticosum? foliis elliptico-oblongis repandis obtusis basi acutis subtus ad costas cauleque strigoso-subtomentosis, spicâ terminali, bracteis obovatis mucronulatis glabriusculis, apicem versus spinuloso-serratis ciliatisque, corollâ pubescente, labii lacinis subæqualibus. ♂ ? In Serra

- de Macaçú (Schott! in h. vindob. n. 6033). Solani Melougenæ plantam iner-  
meni fingit. Radix simplex, fibris subverticillatis brevibus. Caulis  $\frac{1}{2}$ -1 ped.  
altus, dense rufo-strigosus, ad apicem subtomentosus. Folia 2 $\frac{1}{2}$ -4 poll. (demto  
petiolo) longa, 14 lin.-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata. Pctioli strigosi, inferiores 2 superiores  
1 poll. longi. Spica terminalis sessilis, pari foliorum minorum suffulta, 2-3 poll.  
longa, oblonga. Bractæ dense imbricatae, venoso-nervosæ, reticulatæ, colo-  
ratae, 10 lin. longæ et infra apicem 5 lin. latæ, apicem versus utrinque den-  
tibus mucronulogue apicis spinulosis. Bracteolæ calyce breviores, setaceaæ, his-  
pido-scabrae. Calyx bractæ brevior, laciniæ lanceolatæ, glabrae, acumine  
longissimo setaceo scabro. Corolla 10 lin. longa, infundibuliformis, coccinea,  
labio superiore ovato brevi spatio bifido laciniis obtusis, inferiore profunde tri-  
fido, laciniis ovatis obtusis, singula labio superiori subæquali, lateralibus paulo  
angustioribus. Stamina longitudine corollæ, filamenta introrsum hirsuta, an-  
theræ lineæ laterali apiceque hirsutæ. Stigma bidentatum. Fructus latet. (v. in  
h. vindob.)
8. L. OBTUSUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 86), 'caule cos-  
tisque foliorum subtus strigilos-canis, foliis ovali-oblongis obtusis, bracteis  
ovalibus mucronatis spinulo-serratis. 2 Ad Porto d'Acunha, cum Belope-  
rone Poblana. Caulis herbaceus, vix pedalis, erectus, simplex, setulis  
adpressis dense vestitus. Folia ovali-oblonga (4 $\frac{1}{2}$  poll. circiter longa, 1 $\frac{1}{2}$   
poll. lata), basi cuneatæ in petiolunc brevem (3-4 lin. longum) strigosum  
decurrentia, obtusa, præter costas glabra, supra nitida, subtus pallida,  
ramis costalibus tenui 9-10. Spica terminalis sessilis, 3 poll. longa, te-  
trasticha, colorata. Bractæ imbricatae, chartaceaæ, 7-8 lin. longæ, 4-4 $\frac{1}{2}$  lin.  
latæ, obovato-ellipticae, mucronato-acutæ, medio margine patulo-spinu-  
loso-serratae, 11-nerves, glabrae. Capsula 5 lin. longa, subtetragona, gla-  
bra, infra medium tetrasperma, apice brevi spatio solida. (v. in h. vindob.)
9. L. AURANTIACUM, fruticosum, hirsutum, foliis ovalibus ovatis utrinque  
acutiusculis, bracteis obovatis obtusissimis mucronatis apicem versus spinulo-  
serratis, corollâ pubescente, labii inferioris laciniis subæqualibus ovatis  
obtusis. 3 In Brasiliâ: in Serra d'Estrella, Febrero et Martio (Riedel! in h.  
Mart.), in silvis Macahé, Junio (id! in h. acad. petrop. n. 793), ad Mandioc-  
cam, Decembri et Januario (idem! ibid.). Stenandrium aurantiacum N. ab E.  
in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 78. Differt a reliquis confinibus staturâ  
humiliore atque hirsutie, ab L. igneum foliis angustioribus basi hand cordatis  
brevoire petiolo præditis. Pili rainorum fulvi. Folia repanda. Corolla lutea. (v.  
in h. Mart. et petrop.)
10. L. IGNEUM, herbaceum, humile, foliis cordato-ovalibus, spicâ terminali  
pedunculata, bracteis obovato-cuneatis cuspidatis apicem versus spinuloso-  
serratis serraturis erectis, corollâ pubescente, laciniis subæqualibus ovali-  
bus. 2 In silvis Brasiliâ, Januario (Max. Princ. Wied!). Synandra  
Schrad. in Maxim. Princ. Wied. it. 2 p. 343. Hemitone ignea N. ab E. mspt.  
Stenandrium igneum N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 78. Herba  
caule brevissimo apice bifido, ramis diphyllis monostachyis. Folia ad bifur-  
cationem minorâ, longissime petiolata, acuta, reliqua magis ovalia, obtusa,  
basi subcordata, 4 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. longo uti  
lamina hirsuto. Spica 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, pedunculo subæquilongo hirsutissimo.  
Bractæ 7-6 lin. longæ, supra medium 4-3 lin. latæ, obovato-cuncatae, nervosæ,  
hirsutæ, serraturis utrinque 5-6 spinulosis. Calyx bractæ brevior, cum bracteolis  
glaber, ciliatus. Bracteole et laciniæ laterales calycis lineares, lacinia dorsalis  
oblongo-lanceolata, duæ inferiores lanceolatae, omnes setaceo-acuminatae.  
Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, glabra, lœtc aurantiaca; labium superius longitudine in-  
ferioris, ovatum, retusum; inferius trifidum, laciniis ovalibus mediâ latiore.  
Filamenta glabra; antheræ latere et apice hirsutæ. Stigma truncatum, bilabia-  
tum. Ovarium 4-ovulatum. (v. in h. Maximiliani Principis et Mart.)
11. L. MOLLE, herbaceum, pubescens, humile, foliis ovatis obtusis e basi ro-  
tundata in petiolum anguste decurrentibus, spicâ terminali pedunculata, brac-

teis oblongo-cuneatis acumine brevi obtuso, apicem versus spinuloso-serratis serraturis patulis, corolla lacinis subæqualibus, duabus superioribus paulo minoribus, bracteolis calyce duplo brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Novâ Granâda, Maio (Goudot! in h. Hooker). Simile L. igneo, differt floribus duplo fere minoribus, pubescentiâ breviore subtiliore, foliis minime cordatis etc. (v. in h. Hooker).

12. L. MAXIMILIANUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 85), caule substrigilosus, foliis oblongis acuminatis basi cuneatis subtus subtilissime tomentosis glabris, bracteis obovatis cuspidatis apicem versus setaceo-serratis.  $\mathcal{L}$ ? In Brasiliâ: in silvis Arassatibas prope Barrâ de Jacu, Martio (Maximilianus Princeps in h. Mart.), (Sellow! in h. gen. berol. n. 179, 180, 233, loco speciatim haud adnotato). Affinis L. obtuso. Caulis strictus, trichotomus, inferne teres, glaber, apicem versus quadrangularis, strigilosus. Folia 7-10 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, subrepanda, subtus tomentulo nudo oculo non perceptibili vestita et mollia, subinde glaberrima, supra nitida, ramis costalibus 10-15. Spicæ terminales 1, 3 vel 5,  $2\frac{1}{2}$ -4 poll. longæ, tetragonaæ, dense. Bracteæ  $\frac{1}{2}$  poll. longæ,  $4\frac{1}{2}$  lin. apicem versus latæ, eaque parte utrinque serraturis spinulosis 6-8 prædicta, dorso pubescentes; cuspis mediocris, spinulosa. Corolla pollicaris, tubulosa, coccinea, incurva, limbo quinquefido parum obliqua, lacinis brevibus ovatis obtusis, duabus superioribus paulo latioribus profundiusque discretis. Stamina corollæ longitudine, filamentis antherisque hirsutis. (v. in h. Mart., berol. et Hooker).

### § 2. Bracteis integrerrimis.

13. L. SPICATUM, caule ramoso, ramis superne subtetragonis pubescenti-canis, foliis ovatis longe petiolatis supra pilosis subtus pubescentibus, floribus axillaribus glomeratis terminalibusque spicatis, bracteis lanceolatis integrerrimis longitudinali calycis.  $\mathcal{L}$  In regno Mexicano (Hænke!). Caulis erectus, herbaceus, dichotomus. Rami elongati, simplices. Folia poll.  $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{1}{2}$  longa, 2 poll. lata, acutiuscula, basi cuneata in petiolum ejusdem longitudinis cauaticulatum ciliatum attenuata, subintegerrima vel obiter repanda; inferiora breviora, ex ovato subrotunda et repente acuta. Flores in alis inferioribus 3-4 sessiles, in apice caulis spicati, solitarii vel gemini, oppositi, approximati neque imbricati, bracteati. Rhachis communis alternatim compressa, cano-pubesca. Bracteæ apice subulate, pubescenti-canæ. Bracteole breviores, subulatae, incanae. Corolla pollicem longa, tubuloso-infundibuliformis, glabra, coccinea, limbi lacinias quatuor æqualibus oblongis, quinta latiore ovata, omnibus obtusis. Capsula lanceolata, basi attenuata, glabra, pallida, loculis dispermis. (v. in h. Hænke).

14. L. MUCRONATUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 86), glabrum, bracteis obovato-cuneatis cuspidulato-mucronatis.  $\mathcal{L}$  In silvis humidissimis prope Castel Novo, Martio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 719), Minas Geraes (Claussen! in h. Mus. paris. n. 230). Differt a L. repando bracteis erectis, apicem versus minus dilatatis cuspiduloque brevi pungente præditis. Calyx laciniae lineari-attenuatae, longæ. (v. in h. petropol. et paris.)

15. L. REPANDUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 86), glabrum, bracteis obovato-cuneatis obtusis.  $\mathcal{L}$  In silvis ad fluvium Xingu provincie Paraensis, Septembri, atque in silvis ad Porto dos Miranhas ditionis Japuren-sis, Decembri (Martius!). Harrachia repanda Mart. in h. reg. mon. et in obs. n. 3108. Differt a L. montano glabritie, nitore, foliis bracteisque majoribus laxioribus, floribus bracteis paulo longioribus. Variat foliis latioribus et angustioribus. (v. in h. monac.)

16. L. MONTANUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 87), fruticosum, caule superne strigilosus subinde glabro, foliis ovalibus elliptico-oblongis basi cuncatis acuminatis supra addresso-hirtis, bracteis obovato-ellipticis sub-mucronatis integrerrimis glabris calyce longioribus, corollâ ringente pubescente, labio superiore bifido inferiore tripartito lacinii subæqualibus obtusis, latera-

libus lanceolatis mediâ ovatâ. ♂ In silvis ad Antonio Pereira provinciæ Minarum generalium Brasiliæ, Martio (Martius! Ackermann! in h. Mart.), in Serrâ de S. Giraldo ad prædiūm Guidowald in ditione Indorum Coroados, tum ad Santos in provinciâ S. Pauli (Sellow! in h. gen. berol.). Harrachia montana Mart.! in h. reg. mon. Ruellia colorata Velloz. fl. fl. 5 t. 99. Folia utrinque acuta, 7-8 poll. (cum petiolo) longa, inferiora 2 $\frac{1}{2}$  poll. superiora 2-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, repanda, in petiolum longe decurrentia, pilis brevibus incumbentibus præsertim supra vestita. Spica sessilis, simplex, vel ad basin unâ duabusve aucta, foliis duobus lanceolatis parvis suffulta, 3-3 $\frac{1}{2}$  poll. longa, oblonga, dense quadrifariam imbricata. Bractæ poll. longæ, 7 lin. latæ, obtusæ sæpe cum mucronulo, subcoriacetæ, 9-nerves, nervis venoso-conjunctis, purpureæ, glabrae, unifloræ. Corolla pubescenti-tomentosa, fere sesquipollucaris, coccinea; tubus pollucaris, limbus  $\frac{1}{2}$ , subæqualis, ad tubum usque divisus, incisurâ labiorum paulo profundiore; laciniæ oblongo-lanceolatæ, obtusæ, duæ superiores magis contiguae. Stamina limbum subæquantia. (v. in h. monac., Mart. et berol.)

LXXXI. STROBILORHACHIS Link, Klotzsch et Otto ic. pl. 2 p. 117 t. 48, Dietr. Gart. Zeit. 7 p. 307, N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 84. — Ruellie spec. Velloz.

Calyx brevis, quinquepartitus, laciniis chartaceo-membranaceis, subæque latis. Corolla bilabiata, tubo angusto longo incurvo, limbo late campanulato, laciniis amplis, labio superiore bilobo, inferiore trifido, laciniis ovato-subrotundis æqualibus teneris. Stamina 4, corollæ tubo prope a basi inserta, inclusa; antheræ uniloculares, basi apiceque acutæ, dorso herbarceo carinato, villis connexæ. Stigma compresso-infundibuliforme, bilobum. Capsula a basi tetrasperma. — Frutices vel herbae Americæ tropicæ, speciosæ. Spica tetragona, bracteis quadrifariam imbricatis subcoriacetis integrermis rigidulis, bracteolis parvis. Corollæ limbo lato et tenero, tubo gracili maximam partem a bracteis inclusu conspicuæ.

1. S. PRISMATICA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 84), fruticosa, glabra, bracteis ovalibus pungenti-cuspidatis, foliis oblongis in petiolum acute desinentibus. ♂ In provinciâ Sebastianopolitanâ Brasiliæ, Aprili-Decembri , v. e. in Serra d'Estrella prope S. Ana (Beyrich! in h. gen. berol., Luschnath, Riedel!), in tractu montis graniticæ Serra do Mar retro S. Cruz locis silvis æternis obtectis (Martius!), in montis Corcovado humidis umbrosis (Pohl! in h. pal. vindob. n. 5010), ad Tejuco (Riedel! in h. acad. petropol.), porro in eadem provinciâ prope Rio Janeiro (Gaudichaud! in h. DC., Raven! n. 216 in h. Mart., Claussen! n. 1962 in h. Mus. paris. et Nees). Strobilorrhachis glabra Link, Klotzsch et Otto ic. pl. 2 p. 117 t. 48 et h. gen. berol., bot. reg. 1845 misc. p. 21. Harrachia macrothyrsus Mart. in h. reg. mon. Ruellia prismatica Velloz. fl. fl. 5 t. 98. Justicia imbricata Pohl in h. vindob. n. 5010 (analyse floris falsa). Frutex 2-3-pedalis. Folia oblonga, 2-1 ped. longa, 2 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$  poll. lata, basi acuta, apice paulo magis attenuata nec vero acuta, ramis costalibus novenis densive; petioli 1 $\frac{1}{2}$  poll. longi, glabri. Bractæ 1 poll. longæ 6 lin. latæ, nervoso-striatæ, rigidæ, luteæ, glabrae, nec ciliatae. Bracteolæ longitudine calycis, lineares. Calyx 2 lin. longus, laciniis triangulare-lanceolatis acutis striatis, lateralibus interioribusque angustioribus. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, flava, glabra, infundibuliformis, limbo ad speciem quadrifido, scil. laciniis tribus magis exterioribus (labio inferiori respondentibus) æqualibus late ovatis obtusis paulo firmioribus, quartâ i. e. labio superiore latiore teneriore brevi spatio bifidâ laciniis obtusis basin versus complicata. Stamina fauces attingentia. (v. in h. monac.: Mart., vindob., berol., petrop., DC. etc.; colitur in hort. bot. berol.)
2. S. BLANCHETIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 85), herbarcea, glabra, bracteis oblongis brevimucrouulatis, foliis oblongis in petio

lum alatum decurrentibus.  $\mathcal{Y}$  Ad Bahia, Ilheos (Blanchet! n. 739 et 2086 in h. Moricand); in Brasiliâ loco ign. (Riedel! in h. acad. petrop.). Differt a S. prismaticâ caule crasso herbaceo, bracteis longioribus brevi mucronulo terminatis, flore minore et follis majoribus haud petiolatis et in petiolum acute desinentibus sed fere ad basin usque angustâ alâ decurrentibus. (v. in h. Moricand, petrop., Hooker).

LXXXII. APHELANDRA Rob. Br. prodr. fl. nov. holl. I p. 475, ed. N. ab E. 3 p. 331, nota, Endl. gen. n. 4074. — Synandra Schrad. in itin. Maxim. Princ. 2 p. 343. — Hemitome N. ab E. mspt. — Hemisandra Scheidweiler in bull. acad. brux. 1842 1 p. 23. Flora raiab. 1843 p. 514. — Poecilocnemidis spec. Mart. in sched. — Justiciae spec. Jacq., Hook. et auct.

Calyx quinquepartitus, laciniis chartaceo-membranaceis subtiliter striatis, posticâ sæpe latiore. Corolla bilabiata vel ringens, labio superiore bidentato rariusve subintegro plerisque fornicate, inferioris tripartiti laciniis lateralibus sæpe minoribus. Stamina 4, corollæ tubo prope a basi inserta, subæqualia, corollâ sæpe longiora; filamenta basi pilosa; antheræ uniloculares, basi apiceque acutæ, dorso herbaceo carinato, apice plerisque barbatæ villisque connexæ. Stigma bidentatum. Capsula basi compressa, a medio tetrasperma (laevis et nitida). Semina retinaculis fulcrata. — Frutices Americae tropicæ..... Folia alia integerrima, alia dentata pinatifidæ, spinosa. Corolla speciosa rubra. Spicæ axillares et terminales, sæpe arcte imbricatæ. Flores solitarii, tetrastichi. Bracteæ vix calycem æquantes at eo sæpe latiores. Bracteolæ duæ, minores.

**§ 1. STENOCHILA. — *Laciniae laterales labii inferioris medio multo breviores minoresque, saltem magis quam triplo minores.***

a. *Bracteæ integerrimæ.*

1. A. TETRAGONA, fruticosa, foliis ovalibus utrinque acuminatis saltu me acutis in petiolum longum cuneatim decurrentibus glabris, bracteis ovato-acutis calyce paulo brevioribus, bracteolis rhachique dense albo-pubescentibus, corollâ ringente glabriusculâ, labio superiore bifido, inferioris laciniâ mediâ lanceolatâ acutâ, lateralibus brevissimis.  $\beta$  In Guianâ (v. Robr! Vahl!), Caracas (h. Willd!), Guayaquil (Hænke!), Llanos de Barcelona et Caracas (Moritz! in h. Willd.), Galipan in Columbiâ Septembri (Moritz! n. 1271 in h. berol.). Novâ Grenadâ (Goudot! in h. Hooker), insulâ Trinidad (Lockhart! in h. Hooker). Justicia tetragona Vahl symb. 3 p. 5, en. 1 p. 118. Justicia cristata Jacq. hort. schœnbr. 3 p. 38 t. 320, h. Willd. ex hort. schœnbr.! n. 11621 et h. gen. berol. ex bort. bot. berol. Aphelandra pulcherrima h. Willd! n. 11624 fol. 1 et 2. Distincta a reliquo, exceptâ A. pulcherrimâ rhachi tomentosâ, in hac autem tomentum hoc sæpe minus spissum et tumidum est, quam in A. pulcherrimâ. Flores subheteromalli, magni. Rami costales foliorum plures, angulo fere recto decurrentes. Variat spicâ terminali solitaria pluribusque conferti. (v. v. c. et sicc. in h. Vahl, schœnbr., Hænk., berol. et Hooker).

$\beta$ . *grandis*, foliis amplis caudato-acuminatis, spicis in apice caulis congestis, rhachi dense lanatâ. — Merida ad flumen, in silvis Cinchonæ, Septembri (Moritz! n. 1272 in h. gen. berol.). Folia cum petiolo sesquipollucari fere pedalia, 4 poll. lata. (v. in b. berol.)

2. A. PULCHERRIMA (Kunth in Humb. et B. nov. gen. et sp. pl. 2 p. 236, synops. 2 p. 33 excl. syn. Justiciae tetragonæ Vahl), caule fruticoso superne villoso, foliis ellipticis ovatis in petiolum ad basin fere decurrentibus, partenudâ brevissimâ subintegerrimis subtus villoso-mollibus in petiolum attenuatis, spicis terminalibus, bracteis calyce duplo brevioribus ovatis acutis pubescenti-subtomentosis ciliatis, rhachi dense lanatâ, corollis villosis, labii inferioris laciniis lateralibus brevibus.  $\beta$  Locis turfosis salsis prope Turbaco Novo-Granatensem (Humboldt),

ad Acapulco (Hænke!), in faucibus montanis Catoche securus fluvium, in provinciâ Caracas, Februario (Moritz! in h. gen. berol.), in monte La Stopa prope Carthaginem de Columbia (Billberg! in h. gen. berol.), ad S. Martham Am. merid. (h. Hooker!), ad Barim fluvium in Guianâ anglicâ (Schomburgk! n. 109 [38] in h. gen. berol.), in insula Martinicâ (Plée! in h. Mus. paris. et ex eo in h. Nees). — H. Willd. n. 11624 f. 3. *Justicia pulcherrima* Jacq. am. 6 t. 2 f. 4. Ludit spicâ terminali solitaria pluribusque confertis. An eum *A. tetragonâ* conjungenda? Distinguit imprimis folis in petiolum anguste euneatum recurrentibus, seu potius in formam ejusmodi petioli attenuatis. Rami costales pauci, acuto angulo recurrentes. (v. v. et sicc. in h. Willd., berol., Schomb., Hooker, etc.)

*β. deltoidea*, foliis deltoideo-ovatis e basi obtusâ in petiolum alatum attenuatis. *Aphelandra pulcherrima* hort. bot. berol. et vindob. (v. s. c. in hort. vindob. et berol.)

3. *A. GLABRATA* (h. Willd.! n. 11623), caule fruticoso glabro, foliis oblongis utrinque attenuatis subrepandis basi cuneatâ sessilibus nitidis subtus ad costas villosulis, bracteis ovatis acutis subtiliter ciliatis integerrimis, corollâ.... ♂ In America meridionali (Humboldt! in h. Willd. l. c.). Differt a reliquis canle adulto lœvi albidente, foliis angustioribus nitore pingui. (v. in h. Willd.).

4. *A. HARTWEGIANA* (N. ab E. in Benth. pl. Hartweg. p. 236 n. 1270), fruticosa, foliis oblongis utrinque acuminatis longe petiolatis glabris, spicâ terminali simplici, bracteis ovalibus obtusis cum mucronulo calyce  $\frac{1}{2}$  brevioribus glabris striatis, bractcolis calycibusque et rhachi glabris, calycis laciniis lanceolatis obtusiusculis, exterioribus apice rigidioribus multistriatis coloratis, corollâ ringente, labio superiore bidentato, inferioris laciniâ mediâ lancolatâ acutâ, lateraliibus brevissimis obtusis. ♂ In silvis umbrosis Hacienda de Palmer prope Guadas in provinciâ Bogota (Hartweg!). Frutex gracilis, alt. 12 ped. Differt ab A. tetragonâ rhachi bracteolisque glabris bracteis obtusis; ab A. Schiedeanâ Schl. foliis bracteisque glabris, calycibus majoribus rigidis, præsertim a medio apicem versus. Corolla fere 3 poll. longa, glabra. Calyx  $\frac{1}{2}$  poll. longus. Bracteolæ 5 lin., bractæ 6 lin. longæ. Folia speciosa, inferiore fere pedalia, multicostata. (v. in h. Bentham).

5. *A. MACROSTACHYA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 88), fruticosa, foliis ovali-oblongis apice magisque basi attenuatis in petiolum longum recurrentibus in costis primariis strigosis cæterum glaberrimis, spicis terminalibus elongatis, bracteis ovatis acuminatis ciliatis, corollâ ringente, labiis lanceolatis, superiorc licuspidate, inferioris laciniâ mediâ lancolatâ, lateraliibus plus triplo brevioribus. ♂ In Brasiliâ: in radice montis Arara Coara provinciâ Rio Negro ditionis Japurensis, Decembri et Januario (Martius!). Peculiaris macrostachya Mart. in sched. n. 3179 et in h. monac. Frutex humanæ altitudinis, speciosus. Rami inferne teretes, apicem versus tetragoni, stigilosco-scabri. Folia cum petiolo pollicari 9 poll. longa, 2- $\frac{1}{4}$  poll. lata, acmine obtusiusculo cum mucrone, integerrima, rigidula, nitida, nervis costalibus duodenis costâque, supra præsertim, strigosis. Spica terminalis, 4-5 poll. longa, subsessilis, laterales ex proximis axillis breviores, brevipedunculatæ. Bractæ pulchre tetrastichæ, ciliatæ, multinerves, scabré, 3 lin. longæ. Bracteolæ calyce breviores, lanceolatæ, carinatæ, carinâ villosæ. Corolla bipollicaris, coccinea, glabra. Capsula 9 lin. longa, castanea, rigida. (v. in h. monac.).

6. *A. SINCLAIRIANA* (N. ab E. in Benth. bot. of the sulphur p. 146 t. 47), fruticosa, foliis oblongo-lanceolatis apice et basi acuminatis et in petiolum longum attenuatis utrinque, præsertim in costis, cauleque hirsutis, spicis terminalibus fastigiatis, bracteis ovalibus integerrimis sericeo-pubescentibus calyce longioribus, infimis patulis acuminatis, reliquis imbricatis ventricosis obtusissimis, laciniis calycinis chartaceis lanceolatis acutis subtilissime velu-

tinis, corollæ labio superiore bideutato, inferioris lacinia mediâ ovato-lanceolatâ acuminatâ, lateralibus brevissimis obtusis labio superiore accretis. ♂ Prope Panamam ( Sinclair ! in h. Benth. ), in Isthmo Darien ( Barclay ! ibid. ) Differt ab A. Schiedeanâ Schl. hirsutie insigni et labii corolle inferioris longe aliâ figurâ; ab A. Hartwegianâ recedit bracteis majoribus ( licet minoribus quam in A. Schiedeanâ ) calycis obtegmentibus nec iis brevioribus magisque pubescentibus. Folia pedalia, 2-2½ poll. lata, pilosa, costis hirsutis. Spicæ in summo caule 3-5, semipedales, cylindricæ. Bracteæ infimæ herbaceæ, acuminatae, steriles, tunc aliquot coloratae atque acute; reliquæ cunctæ coloratae et obtusæ. Corolla coccinea, bipollucaris. ( v. in h. Bentham ).

7. A. SCHIEDEANA ( Schlechtend. pl. Schied. in Linnæâ 5 p. 95 ), arborescens, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis in petiolum longum decurrentibus in costis primariai subtus hirtulis cæteroquin glabris, bracteis membranaceis ovalibus obtusiusculis integrerrimis pubescentibus calyce longioribus, corollâ ringente, labio superiore integro, labii inferioris lacinia mediâ obovatâ lateraliibus plus triplo brevioribus. ♂ In Mexico: ad Hacienda de la Laguna et Barranca de Tioselo, Octohri ( Schiede ! in h. reg. berol. et monac. ). Lagochilium Schiedeanum N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 87 ( adnot. sub Lagochilium ). Corolla 2½ poll. longa, coccinea. Folia 6-8 poll. longa, 2 poll. lata, petiolo pollicari, supra lineolata. ( v. in h. berol. et monac. )

8. A. MELGARIENSIS, fruticosa, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis in petiolum desincentibus in costis primariai subtus hirtulis cæteroquin glabris, spicis terminalibus brevipedunculatis laxiusculis, bracteis herbaceis oblongis obtusis integrerrimis venoso-nervosis pubescenti-scabris, corollâ pubescente. ♂ In Novâ Granadâ ( Humboldt ! ). Justicia Melgariensis h. Willd. ! n. 320 ( spec. Humboldt ). Propinqua A. Schiedeanâ, et probabiliter status ejusdem speciei juvenilis. Distinxii propter bracteas duplo minores herbaceas nec membranaceas nervis fortioribus, aliis simplicibus, aliis bi-trifurcati divisis. Bracteolæ linearis, pubescenti-ciliatae, longitudine calycis. Stamina omnino generis, antheris apice pubescentibus. Corolla in specim. non explicata. ( v. in h. berol. )

9. A. FLAVA, fruticosa, caule superne laxe pilosulo. foliis oblongis acuminatis basi in petiolum longum acute decurrentibus supra pubescentiâ exigua subtus densiore pube vestitis et mollibus, spicâ terminali brevissime pedunculata, bracteis ovato-oblongis acuminatis integrerrimis pubescentibus viscidulisque molibus calyce longioribus apice patulisi, bracteolis angustis undique calycis que lacinias subnlate-acuminatis apice plumoso-ciliatis, corollæ labio superiore acuminato inferioris lacinia mediâ oblongâ obtusa lateralibus multo brevioribus lanceolatis liberis. ♂ In Novâ Granadâ, Alto de Limba, Julio ( Goudot ! in h. Hooker ). Folia cum petiolo bi-tripollucari fere pedalia, 2½-3 poll. lata, argute acuminata. Spica tripollucaris, oblonga. Bracteæ 1½ poll. longæ, tonues, in sicco statu pallide, nervoso-venosæ. Corolla 1½ poll. longa, ringens, flava. subtilissime pubescens. ( v. in h. Hooker ).

- b. Bracteæ serratae vel spinuloso-serratae, sœpe utrinque maculâ glandulari denudatae notatae.

10. A. PECTINATA ( h. Willd. n. 11623 ), fruticosa, caule juvenili strigiloso-canæ, foliis ovato-ellipticis oblongis acutis cuneatim in petiolum attenuatis subrepandis subtus ad costas totis pubescentibus subtomentosis, spicis terminalibus, bracteis ovato-cuspidatis villosis apicem versus utrinque spinuloso-uni-bi-triserratis et maculâ utrinque lateris mediâ subinde geminâ glandulosâ denudatae notatis, corollis villosis, labii inferioris lacinia lateralibus brevissimis labio superiori accretis. ♂ Ad ostia fluminis Sinu imp. Mexicanæ ( Humboldt ), in orâ septentrionali Columbiæ et Panamæ ( Cuming ! in h. Arnott n. 2009 ), Columbia ( Cuming ! n. 1099 in h. Hooker ), in insulâ Taboga sinus Panamensis et ad sinum Iconseca ( Sinclair ! et Hinds ! in h. Benth. ), in silvis circum Guaduas provinciæ Bogotensis ( Hartweg ! n. 1267 ), Nicoza in imp. Mexicano ( Sinclair ! ), in isthmo Darien ( Barclay ! ), Surinam

(Hostmann! 539 in h. Hooker), in Guianâ anglicâ, secus ripas fluvii Sururu (Schomburgk! n. 180 in h. Benth. et in h. DC., in h. gen. berol. n. 1461), in insulâ S. Vincentii (h. Hooker!). Benth. pl. Hartweg. p. 236 n. 1267. Aphelandra cristata Kunth in H. et B. nov. gen. et spec. 2 p. 236, synops. 2 p. 33 (ex parte). Justicia seabra h. Vahl! Foliis basi cuneatim sessilibus et bracteis villosis longius cuspidato-acuminatis apicem versus plus minus pectinato-serratis serraturis 1-2-3 apiceque subspinosis, subinde et unâ tantum alterius lateris obviâ, distincta esse videtur ab A. Hænkeana. Ludit imprimis foliis majoribus minoribus, modo glaberrimus nec nisi in costis subtus setulis adpressis vestitis, modo utrinque plus minus pubescenti-mollibus, tum et corollâ modo glabriuscula soloque labio superiore hirsuto, modo undique pilis patentibus flavidantibus obsitâ. (v. in h. Willd., Vahl, Arnott, Bentham, etc.)

*β. macra*, minor, caule simplici strigoso, foliis reflexis ovalibus acuminatis basi cuneatâ brevi sessilibus, spicis 2 brevibus. — Ecuador (Sinclair! in h. Benth.) Folia si species, a specie valde recedere tibi persuaderes, sed bracteæ et flores omnino reliquis congruent. (v. in h. Bentham).

11. A. HÆNKEANA (N. ab E. in pl. Hænk.), caule fruticoso apicem versus hirsuto, foliis ellipticis oblongis subintegerrimis cuneatim in petiolum attenuatis subtus pubescenti-mollibus subtomentosis, bracteis ovatis acutis acuminatis ciliatis apicem versus utrinque uni-tridentatis dorso hirsutis utrinque in medio maculâ glandulari denudatâ, corollis ringentibus pubescentibus, labio inferiore hirsuto. ♂ Ad Acapulco (Hænke!), in accessu montis Oaxaca inter Tehuantepec et sinum Mexicanum (Andrieux! pl. mexic. exsicce. n. 131 in h. DC., Hegewisch! in h. Hooker), in Cordillerâ de Vera Cruz, Jun.-Oct. (Galeotti! n. 909 in h. Bentham), ad Mirador, Decembri (Linden! n. 189 in h. Bentham), in Americâ centrali (Barklay! in h. Hooker). Justicia resupinata Hegewisch in h. Hooker. Accedit ad A. pectinatum, differt autem foliis subtus hirsuto-subtomentosis, bracteis subinde utrinque dente unico parvoque præditis, subinde tamen et bi-vel tridentatis dentibusque tum magis setaceis, tum corollâ breviore latiore, solo labio superiore hirsuto. Frutex octopetalis. (v. in h. Hænke Hooker, Bentham, DC.)

12. A. DEPPEANA (Schlechtend. in Linn. 5 p. 96), caule fruticoso juvenili pubescente, foliis oblongis acutis in petiolum attenuatis subtus velutino-tomentosis supra pubescenti-scabris, spicis terminalibus aggregatis, bracteis ovato-acuminatis acumine recurvo dorso hirsutis apicem versus utrinque setaceo-unibidentatis maculâ glandulari denudatâ notatis, corollâ ringente, labii inferioris lacinia mediâ linear-lanceolatâ, lateralibus brevissimis labio superiori acerretis. ♂ In Mexico ad Hacienda de la Laguna, Septembri (Schiiede! in h. gen. berol.) Ab A. Hænkeana facile distinguitur bractearum acumine longiore recurvo. Corolla pollicaris, labio superiore apice hirsuto bidentato. (v. in h. berol.)

§ 2. PLATYCHILA. — *Labii inferioris laciniae subæquales, saltem laterales vix plusquam triplo breviores.*

† *Genuinæ. Folia integra, nec margine spinosa.*

a. *Bracteæ plus minus spinuloso-serratae.*

13. A. AURANTIACA (Lindl. bot. reg. 31, ser. nov. 18, t. 12 et bot. reg. 1845. misc. p. 29), foliis oblongis glabris basi undulatis in petiolum brevem decurrentibus, spicâ terminali simplici tetragonâ (sessili), bracteis ovatis acuminatis serratis, corollæ lacinia ovatis acutissimis, lateralibus (sub-) duplo minoribus. ♂ In Mexico, culta iu hort. belg. et angl. — Bot. mag. t. 4224, Schl. et M. bot. Zeit. 4, 1846, p. 392. Hemisandra aurantiaca Sebclidw. in bull. acad. brux. 1842 p. 23 et fl. ratisb. 1843 2 p. 514. Justicia à fleurs oranges, épaisse forêts de Téapa (Tabasco) Novembri et Decembri. Linden! h. du

sud. n. 177 in h. Bentham. Frutex pulcherrimus, A. acutifoliae affinis. Color corolle luteo aurantiacus. (v. sp. spont. in h. Bentham).

14. A. ACUTIFOLIA, suffruticosa, glabra, foliis oblongis acuminatis basi acutâ in petiolum mediocrem parum decurrentibus, spicâ terminali sessili, bracteis ovali-oblongis acuminatis apicem versus serratis serraturis superioribus sœpe majoribus margine subtilissime ciliolatis, corollâ glabratâ, labii inferioris laciniis ovatis obtusis lateralibus paulo brevioribus. ♂ Ad Vitoc in Peruvia (Ruiz! in h. gen. berol., Mathews! n. 2011 in h. Hooker), Vitoc, Peru (Laan! in h. Hooker), Sierra S. Pedro Nolasco, Palea, etc. in imperio Mexicano (Jürgensen! n. 648 in h. Hooker), Surinam (Hostmann! n. 167, in h. Hooker et Bentham). Justicia acutifolia Tafalla cum icone n. 10, Ruiz in h. gen. berol. Corolla fere bipollucaris. Antheræ dorso glabratæ, filamenta hirsuta. (v. in h. berol. et Hooker).
15. A. NEMORALIS (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 90), fruticosa, glabra, foliis oblongis utrinque attenuatis, spicâ subterminali pedunculata, bracteis ellipticis acutis utrinque bidentulatis membranaceis coloratis, corollâ glabratâ, labii inferioris laciniis lateralibus linearibus medium oblongam subæquantibus. ♂ In Brasiliâ : in silvis montis Corcovado provinciæ Rio de Janeiro, Augusto (Martius!). Rami teretes, glabri, cortice albido tuberculato. Folia 8-9 poll. longa, 2 poll. lata, in petiolum 1-1½ poll. longum decurrentia, laxa. Spica bipollucaris, oblonga in pedunculo bipollucari, tetragona. Flores et bracteæ flavae. Bractæ 9 lin. longæ, 4½ lin. lata, 5-nerves, glaberrimæ, membranaceæ, supra medium utrinque denticulis duobus parvis approximatis instructæ. Corolla bipollucaris, glabra, labio superiore recto oblongo concavo obtuse bidentato margine inferiore æquilongo trifido, laciniis supra pubescentibus. (v. in h. monac.)
16. A. CHAMISSONIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 90), suffruticosa, glabra, foliis lanceolatis acumine obtuso basi in petiolum longum cuneiforme-decurrentibus, spicâ terminali sessili, bracteis ovalibus longe cuspidatis apicem versus serratis serraturis superioribus majoribus, corollâ glabratâ, labii inferioris laciniis oblongo-lanceolatis acutis subæqualibus. ♂ In insula S. Catharinæ Brasiliæ (Chamiso! in h. acad. petrop.). Caulis tener. Folia inferiora 5-6 poll. longa, 10-11 lin. lata, basi magis quam apice attenuata, tenera, glabra. Spica bipollucaris. Bractæ 11-10 lin. longæ, glabratæ, membranaceæ, exquisite cuspidatae, serraturis utrinque ab origine cuspidis 4-6, quarum inferiores minores sunt. Corolla 1½ poll. longa, coccinea; fauces obconice, inflatæ; labium superius latiusculum, apice bilobum. Acumine longo bractearum et foliis angustis evidenter differt ab A. nemoralis et scrophilæ Mart. (v. in h. petrop.)
17. A. SCIOPHILA (Mart. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 91), suffruticosa, foliis oblongis utrinque attenuatis costis subtus scabris, spicâ terminali sessili, bracteis oblongo-lanceolatis attenuatis utrinque in medio setaceo-bi-tridentatis herbaceis, corollâ pubescente, labii inferioris laciniis subæqualibus ovalibus. ♂ In Brasiliâ : in silvis ad radices montis Araracoara et in rupestribus ad fauces fluminis dos Engenhos provinçia Fluminis Nigri, Decembri (Martius!). Ruellia quadrangularis Velloz. fl. fl. 5 t. 97. Caulis pubescens, simplex. Folia 3½-4 poll. longa (cum petiolo) 1 poll. lata, repanda, acumine obtuso. Spica terminalis, sessilis, bipollucaris, tetragona, dense nec arcte bracteata. Bractæ pollicares, acuminatæ, planæ, 5-nerves, virides, tenues, margine 2-3-dentatæ, denticulis subsetaceis brevibus. Corolla sesquipollucaris, pulchre miniato-coccinea, subtiliter pubescens; labium superius lineare, rectum, obtuse bidentatum; inferius latius et paulo longius, laciniis ovalibus utrinque attenuatis planis patentibus. (v. in h. monac.)

b. *Bractæ integrerrimæ, calyce longiores.*

18. A. STEPHANOPHYSA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 90), suffruticosa, glabra, foliis oblongis acuminatis in petiolum cuneiformi-decurrentibus, spicis terminalibus solitariis ternisve pedunculatis, bracteis oblongis acutiusculis integerrimis patulis rectis, corollæ glabrae faucibus inflatis, labii æqualibus obtusis, superiore bilobo, inferiore tripartito laciniis subæqualibus. ♂ In Brasiliâ : in silvis Macahé, Junio (h. acad. petrop.!). Frutex 3-pedalis. Folia  $8\frac{1}{2}$  poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, repanda. Bractæ subdistantes, 6 lin. longæ, 2 lin. latæ. Rhachis glabra. Corolla ultra bipollicularis, coccinea. (v. in h. petrop.)
19. A. SQUARROSA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 89), herbaria, glabra, succulenta, foliis ellipticis acuminatis basi cuneiformibus, spicis terminalibus solitariis ternisve pedunculatis, bracteis obovato-cuneiformibus integerrimis complicato-acutis acumine recurvo, corollæ glabrae, labii æqualibus acutiusculis, superiore bifido, inferiore tripartito. ♀ In Brasiliâ : in Serrâ de Macacu (Pohl! in h. vindob. n. 6034 et 6122 ?, specimen Schottianum), in umbrosis humidis ad Rio de Janeiro urbem (Karwinski! in h. Mart., Riedel! in h. acad. petrop.), Pernambuco in eâdem provinciâ (h. Mart.). Ruellia comosa Velloz. fl. fl. 5 t. 91. Planta speciosa, caule crasso, in statu sicco col-lapso. Folia conferta, 10-12 poll. longa,  $3\frac{1}{2}$ -4 poll. supra medium lata, basi magis quam apice atenuata, nonnihil repanda, costâ et petiolis latis. Spicæ terminales tres plures, media  $3\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$  poll. longa, pedunculo crasso bipolliculari glabro; laterales breviores. Bractæ dense imbricatae, læves, nitentes et glabrae, aurantiaceæ, chartaceæ,  $1\frac{1}{2}$ -1 poll. longæ,  $\frac{1}{2}$ -1 poll. apicem versus latæ nec multum basin versus angustatae, apice breviacutatae et ita complicate atque reflexæ, ut longiore acumine prædictæ videantur et spica fere ut in Melampyro cristato squarrosa evadat. Corolla sesquipollicularis, lutea, labio superiore laciniâque mediâ inferioris ovatis, lateralibus labii inferioris ovali-oblongis. Capsula 4 lin. longa, glabra, pallida. Variat spicâ ampliore bracteis maxime recurvis. (v. in h. vindob., Mart. et petrop.)
- β. *laxior*, spicâ elongatâ, bracteis a medio recurvis propterea que magis discretis. — In Serrâ dos Orgâos prope Rio de Janeiro, Maiô (Guillemin! cat. n. 1007 in h. Mus. paris. n. 149), ad Engenho de Cebola, Augusto (Sellow! in h. gen. berol. n. 181). (v. in h. paris. et berol.)
- γ. *angustifolia*, foliis oblongo-lanceolatis, spicâ brevipedunculata. — In Serrâ do Cubatão (Sellow! in h. reg. berol. n. 196 (c. 478)). In hac varietate bractæ sunt rectæ, apice erecto-patulæ et minus acutæ; antheræ glabrae videbantur; an distincta species? (v. in h. berol.)
20. A. LUTEA, fruticosa, caule costisque foliorum strigosis, foliis præter costas glbris ovali-oblongis basi cuneatis obtuse acuminatis, bracteis oblongo-ovalibus obtusis integerrimis glbris calyce multo longioribus, corollâ ringente, labio superiore bifido, inferiore tripartito, laciniis subæqualibus obtusis, lateralibus lanceolato-linearis, mediâ oblongâ. ♂ In Brasilia silvis prope Mandiocam, Januario, Februario (h. Mart.), in umbrosis humidis Serrâ d'Estrella prope José Dios (Beyrich! in h. gen. berol., Sellow! n. 1173 in h. Hooker, Riedel! in h. acad. petrop.), in Serrâ dos Orgâos, provinciæ Sebastianopolitanae (Luschinath! et Riedel! in h. acad. petrop.). Strobilorrhachis hirta Klotzsch! in h. gen. berol. Differt ab A. Schiedeanâ bracteis glaberrimis et corollæ luteæ labio superiore bifido (laciniis acutiusculis). Caulis dense strigosus. Folia 5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. fere lata, apice haud ita longo acumine eoque obtuso, repanda. Spica terminalis subsessilis, bipollicularis, oblonga. Bractæ coloratae, 13-14 lin. longæ, 6 lin. latæ, reticulatae, apice rotundatae. Corolla fere sesquipollicularis, labiis longis, superiore ad  $\frac{1}{2}$  fere bifido. (v. in h. berol., petrop., Mart. et Hooker).
- c. *Bractæ integrerrimæ, calyce breviores.*
21. A. MARGINATA (Nees et M. in nov. act. ac. n. c. 11, 1 p. 52 et in Endl. et

Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 91), suffruticosa, glabra, foliis oblongis retusis marginatis subtilissime ciliatis, spicâ terminali, bracteis integrerrimis bracteolisque ovato-lanceolatis acuminatis calyce brevioribus corollâ ringente pubescens, labio superiore integro, inferiore tripartito, lacinias linearis-lanceolatis subæqualibus, mediâ latiore. ♂ In silvis ad Barra das Varedas Brasiliae (Maximil. Princ. Wied!). A reliquis omnibus differt foliis minoribus retusis brevipediolatis subcoriaceis cartilagineo-marginatis. Frutex 1-2 ped. altus. Corolla speciosa, coccinea, sesquipollucaris (errore typographico  $\frac{1}{2}$  poll. dicta loco citato). « Aurtheræ 2 transversales » l. c. errore typographico intruso numero 2, ad insertionem antherarum, seu potius filamentorum dorsalem infra medium intendit, qua generi Aphelandræ communis est. ( v. in h. Mart.).

22. A. NUDA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 89), fruticosa, glaberrima, foliis oblongis utrinque acutis nitidis, spicâ terminali pedunculata secundâ, floribus distantibus bracteis bracteolisque ovatis integrerrimis calyce triplo brevioribus, corollæ labii inferioris lacinias lanceolatis obtusis, mediâ majore. ♂ In Brasiliae : frequens inter frutices prope Catuca et Fernambuco, in Serra dos Orgãos provinciæ Rio de Janeiro (Gardner! n. 1111 in h. imp. vindob., Moricand, Bentham, etc.). Planta speciosa. Caulis subscandens. Folia Citri, 6 poll. longa, 2 fere poll. lata, anguste marginata, ramis costatis tenuibus venosis. Pedunculus terminalis, longitudine spicæ (tripollucaris). Flores inæqualiter distantes, sessiles. Calyx 3 lin. longus, lacinias ovato-lanceolatis acutis glabris. Bractea et duæ bracteolæ 1 lin. longæ, ovatae, calyci adpressæ ; bracteolæ paulo angustiores. Corolla coccinea ; tubus cum faucibus obconicus 2 poll. longus ; labium superius oblongo-lanceolatum rectum emarginatum 8 lin. longum ; inferioris tripartitum, lacinias lateralibus 6 mediâ 9-10 lineas longis. Capsula fere pollicaris, laevis, fusca, nitidissima. ( v. in h. vindob., Moricand, Bentham, etc. )

†† *Acanthoideæ. Folia dentata vel pinnatifida, sæpè et margine spinosa.*

23. A. MUCRONATA, fruticosa, foliis oblongis in petiolum longiusculum decurrentibus glabris remote spinoso-dentatis, spinis incurvis, spicâ terminali elongatâ, floribus distantibus, bracteis calyce brevioribus ovatis acuminatis, calycis lacinias ovalibus mucronatis. ♂ In Andium Peruviaæ nemoribus (Ruiz!) Justicia mucronata R. et Pav. fl. per. 1 p. 8 t. 10 f. b, Vahl en. 1 p. 169, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 390.

24. A. ACANTHIFOLIA (Hook. ic. t. 113), fruticosa, velutino-substrigosa, foliis ovalibus acuminatis grosse serratis apice serraturisque spinescentibus, petiolis brevissimis ad basin spinosis, spicis terminalibus aggregatis densifloris, bracteis ovatis sepaliisque lanceolatis apice spinescentibus, corollâ sericeâ, labio superiore profunde bifido, inferiore trifido, lacinias lateralibus subdupo brevioribus, staminibus styloque exsertis. ♂ In prov. Chachapoyas Peruviaæ (Matthews! n. 3165), in montosis Loxensis (Hartweg! in Benth. pl. Hartweg. p. 237). ( v. in h. Hooker ).

25. A. FORMOSA, fruticosa, foliis oblongis duplicato-dentato-spinosis supra glabris subtus in costâ hirtis, petiolis brevissimis tomentosis ad basin fasciculato-palmatove spinosis, floribus ad apicem caulis axillaribus (seu potius in spicam brevem confertis) foliorum longitudine, bracteis foliaceis dentato-spinosis, inferioribus flore paulo brevioribus, superioribus decrecentibus calycem æquantibus, bracteolis c basi ovata lanceolatis subulato-spinosis et sæpe utrinque uni-bidentatis, sepalis lanceolatis apice subspinosis, corollæ incurvæ labio inferiore breviore trifido, lacinias ovatis, superiore apice bifido. ♂ In frigidis montis Peruviaæ Paramo de Guanani (Bonnpl.!), in frigidis Andium Cumanensem inter fluvios Chulucanas et Quiros 1520 hex., Augusto (Humboldt!), in silvis sunmi montis Pisagua, alt. 8000' et in descensu montis An-

gus ( Hall ! in h. Hooker ) in Columbiâ ( Lobb ! in h. Hooker ). Ruellia formosa Humb. et Bonpl. pl. equinox. 1 p. 169 t. 48 , Humb. et Bonpl. nov. gen. 2 p. 242 , Kunth synops. 2 p. 38 . Aphelandra carduifolia Hook. ic. t. 718 . Hygrophila formosa Spr. syst. 2 p. 828 . Frutex 8-10-pedalis. Folia bipinnicaria. Corolla bipinnicaris , aurantiaca. ( Antheræ , in descriptione Bonplandianâ biloculares dictæ , revera sunt unilocularcs. ( v. in h. Hooker ).

*β. polystachya* , spicis axillaribus pluribus , bracteis plerisque conformibus minoribus calyceque vix longioribus , foliis subsimpliciter serrato-spinosis subtus velutino-pubescentibus , corollâ paulo minore et pallidiore. — Abunde circum San Miguel in Peruv. alt. 7800' ( Hall ! in h. Hooker ).

26. A. ACANTHUS , strigoso-hirta , foliis oblongis pinnatifidis laciñiis margine apiceque spinosis , petiolis brevissimis ad basin spinosis , spicâ terminali simplici densiflorâ , bracteis sepalisque ovatis apice ciliatis et spinoso-mucronatis , corollæ subtomentosæ labio inferiore trifido obtuso.  $\mathcal{U}$  Quindiu ( Humboldt ! in h. Willd. ), Justicia acanthifolia h. Willd. ! n. 344. Persimilis A. acanthifoliae Hook. et formosa et forsan varietas foliis profundius sectis calyceque auctis. Specimen h. Willd. valde incompletum est. ( v. in h. Willd. )

27. A. RUNCINATA ( Klotzsch ), fruticosa , glabra , foliis oblongis acutis in petiolum brevem attenuato-desinéntibus grosse dentatis dentibus margine apiceque spinosis ad basin decurrentibus , petiolis ad basin spinosis , spicis axillaribus simplicibus folio brevioribus terminalique compositâ ampliore , floribus approximatis , bracteis bracteolisque ovatis , illis acuminatis apiceque spiosis calycem æquantibus , his calyce brevioribus , calycis laciñiis ovatis mucronatis , corollæ tubulosæ faucibus elongatis transversim undulato-rugosis , labio inferiore breviore trifido , laciñiis ovatis obtusis , superiore apice bifido.  $\mathfrak{Z}$  Ad Merida in Cinebonetis umbrosis ad fluminum ripas , Decembri ( Moritz ! in h. reg. berol. ), in Nova Granada , Quindiu , Chusquæ redondo ( Goudot ! in h. Hooker ). Planta speciosissima , alta , foliis pedalibus et sesquipedalibus mollibus , corollâ sesquipollicari cum calyce flavo-coccineâ , tubo brevi , faucibus cylindricis incurvis glabriusculis valde undulato-rugosis. Antheræ glabræ. Maxime affinis est Aph. Acantha et formosæ. ( v. in h. berol. et Hooker ).

28. A. QUERCIFOLIA , herbacea , foliis oblongis acuminatis in petiolum longum cuneatim decurrentibus remote sinuato-grosse dentatis dentibus mucronatis glabris ad originem petioli inermibus , spicâ terminali inermi , bracteis lanceolatis reflexis calyce ovato longioribus , corollæ lèvis faucibus subinflatæ , labio superiore inferiore longiore.  $\mathcal{U}$  In Nova Granadâ , Quindin la Palmita , Novembri ( Goudot ! in h. Hooker ). Proxima A. runcinatae , differt corollis brevioribus sursum latioribus nec rugosis cauleque inermi. ( v. in h. Hooker ).

29. A. LYRATA , herbacca , caule angulato laxe pilosulo , foliis supra undique subtus in costis laxe hirsutis lyrato-pinnatifidis sinubus obtusis laciñiis ovatis angulato-dentatis dentibus mucronatis inermibus , spicâ terminali pedunculata , bracteis ovalibus oblongis apicem versus plus minus dentatis ciliatis , bracteolis linearis-lanceolatis integrerrimis , corollæ labio inferiore trifido laciñiis æqualibus oblongis obtusis , lateralibus paulo angustioribus.  $\mathcal{U}$  In Americâ meridionali. Caulis erectus , sàpè purpurascens. Folia approximata , 6-12 poll. longa , mollia , in petiolum variæ longitudinis attenuata , laciñiis inferioribus valde decrescentibus magisque distantibus. Insertio foli nuda. Pedunculus terminalis , modo longitudine spicæ , modo brevis. Spica 3-5 poll. longa , laxiuscula , Pedicularem refert. Bracteæ inferiores calyce plerunque longiores et reliquis latiores magisque ( patulo- ) dentatae. Bracteolæ longitudine calycis at angustiores. Laciñiæ calycis teneræ , lanato-ciliatae , 5 lin. longæ , 3 latiores ovato-lanceolatae , valde atteuuatæ. Corolla sesquipollicularis , glanduloso-pubescent , coccinea ; labium superioris longitudine inferioris apice bifidum ( subinde trifidum ! ) laciñiis obtusis. Stamina glabra ; antherarum sutura alba. ( v. in h. Hooker ). — Variat :

*z. latibractea* , foliis latis subsessilibus , pedunculo longo , bracteis omnibus

ovalibus mucronatis dentibus crebris. — Canta in Peruviâ (Mc. Lean ! in h. Hooker).

$\beta.$  *laxior*, foliis apud plerasque longius petiolatis, pedunculo longo bracteis oblongis vel spathulato-oblongis, infimis saltem crebro-dentatis. — Cuesta de Puruchuru et Lima in Peruviâ (Matthews ! n. 782 in h. Hooker).

$\gamma.$  *arguta*, foliis longe petiolatis lacinia dentibusque acutioribus, pedunculo brevi, bracteis oblongis vel linearis-oblongis subspathulatis obtusiusculis apicem versus parce obiterque dentatis (infimis in uno specimine sterilibus integrerrimis). — In Columbia (Lobb ! in h. Hooker). Caulis et folia hac in specie magis hirsuta sunt. (v. in h. Hooker).

Subtribus VI. GENDARUSSEÆ N. ab E. in Wall. pl. as. var. 3 p. 76, et in Lindl. bot. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 704. Meisn. gen. 284.

Calyx 4- vel 5-fidus. Corolla bilabiata vel ringens. Stamina paucis 4 didynama, plerasque duo tantum cum vel absque sterilium rudimentis. Antheræ in sectione priore uniloculares, in posteriore biloculares, vel, ubi 4 stamina adsunt, breviorum staminum uniloculares. Antherarum bilocularum loculi situ vario, aliis paralleli, aliis basi divergentes, aliis in connectivo obliquo obliqui, mutici calcareative. Capsula tetrasperma, raro plurisperma, basi plerumque depressa et asperma, hinc fere a medio vel depressa vel compressa, bilocularis, seminifera. Inflorescentia vel axillaris subverticillata, vel terminalis thyrsoida, vel spicata, floribus vel oppositis vel disticho-secundis. Bracteæ variæ, aliis cum bracteolis calyce longiores vel etiam latiores, aliis breviores calyce.

#### CONSPECTUS GENERUM.

##### 1. *Pseudo-Aphelandrea*, antheris unilocularibus.

LXXXIII. *Spirostigma*. — Stamina 4, fauces æquantia. Corolla infundibuliformis limbo subregulari. Capsula a medio 6-sperma. Spica foliaceo-bracteata. — Brasilia.

LXXXIV. *Machenzia*. — Stamina 4, inclusa. Corolla tubulosa, intus hirsuta, limbo brevi 5-fido subæquali. Capsula prope a basi 4-sperma. Spicæ terminales foliaceo-bracteatae. — America australis.

LXXXV. *Haplanthera*. — Stamina 4, breviora ananthera. Corolla bilabiata. Ovarium 4-oyulatum. Flores spicato-capitati, terminales. — Abyssinia.

LXXXVI. *Ruttya*. — Stamina 4, quorum duo dentiformia; antheræ basi mucronatae. Corolla 2-labiata faucibus ventricosis. Capsula 4-sperma. Calycis laciniae prælongæ mollissimæ attenuatae. — Africa australis.

LXXXVII. *Ramusia*. — Stamina duo, faucibus inserta, limbum æquantia. Corolla bilabiata, labio inferiore apice trifido. Stigma integrum. Spica terminalis herbaceo-bracteata. — Africa australis.

LXXXVIII. *Monothecium*. — Stamina 2 exserta. Corolla bilabiata faucibus inflatis. Capsula longe unguiculata, 4-spernia. Spica tetragona floribus opposito glomeratis bracteatis. — Abyssinia.

LXXXIX. *Stenostephanus*. — Stamina 2, absque alterius paris rudimento ad basin. Corolla tubo brevi, limbo 4-fido brevissimo, laciui angustis subæqualibus altera paulo magis adscendente. Capsula sursum compressa 4-sperma. Thyrsi terminales vel simplices vel compositi. — Brasilia, Mexico.

**XC.** *Galeottia*. — Stamina duo exserta. Corolla e tubo elongato faucibus inflatis bilabiata, labiis brevibus, inferiori latioire breviter trifido. Capsula..... Panicula terminalis. — Vera Cruz.

**XCI.** *Anthocometes*. — Stamina duo, antheris basi brevi-mucronatis. Corolla bilabiata, labio superiore angusto, inferiore lato trilobo. Capsula depressiuscula, in medio 4-sperma. Calycis laciniæ longæ, setaceæ. Spicæ terminales et axillares; densæ. — India orientalis.

**XCII.** *Habracanthus*. — Calyx 5-partitus. Stamina duo exserta, antheris basi muticis rectis (scil. emisso polline laud contortis). Corolla ringens labio superiore integro. Capsula a medio 4-sperma. Panicula terminalis vel cymulæ axillares. — Mexico.

**XCIII.** *Sebastiano-Schaueria* — Calyx 5-partitus. Stamina duo longitudine limbi, antheris supra basin adfixis emisso polline contortis. Corolla anguste infundibuliformis limbo subæquali 5-fido laciniis angustis duabus superioribus magis contiguis. Capsula a medio 4-sperma, angusta. Spica floribus oppositis inferioribus subinde fasciculatis. — Brasilia.

**XCIV.** *Chætothylax*. — Calyx 4-partitus. Stamina 2, loculo antherarum infero abortivo calcariformi. Corolla ringens. Capsula a medio tetrasperma compressiuscula. Spicæ axillares disticho-secundæ. — Mexico, Brasilia.

## 2. *Genuinæ, antheris bilocularibus.*

### a. *Antheræ muticæ.*

**XCV.** *Heinzelia* — Stamina 2. Antherarum loculi paralleli, maxime contigui. Calyx 4-partitus. — Brasilia.

**XCVI.** *Schaueria*. — Stamina 2. Antherarum loculi paralleli, subæquales, subdiscreti. Calyx 5-partitus. Capsula a medio suborbicularis tetrasperma. Thyrsus sepe stachyoideus. Flores albi vel lutei. — Brasilia.

**XCVII.** *Pachystachys*. — Stamina 2, basi subinde rudimento alterius staminis dentiformi aucta. Antheræ sagittatæ loculis æqualibus. Calyx 5-partitus subæqualis. Capsula a medio 4-sperma. Spica densa floribus verticillatis late bracteatae bracteis herbaceis. — America tropica.

**XCVIII.** *Phloganthus*. — Stamina 2, antherarum loculis parallelis demum basi divergentibus. Calyx 5-partitus æqualis. Corolla firma, labio superiore longiore latioreque bifido. Capsula a medio 4-sperma. Racemus terminalis spiciformis floribus subverticillatis bracteis bracteolique conformibus elongatis angustis. — India orientalis.

**CXIX.** *Lovianthus*. — Stamina 2 fertilia, 2 imperfecta subulata ad basin fertilium. Antherarum loculi paralleli. Calyx 5-partitus. Corolla tubulosa, coriacea, incurva, limbo oblique 5-lobo subæquali. Capsula a basi polysperma. Thyrsus terminalis pedunculis bifidis minute bracteolatis. — India orientalis.

**C.** *Duvernoya*. — Stamina 2 fertilia, trium steriliū rudimenta forma linearum hirsutarum a basi fertilium galeam versus adscendentia; antherarum loculi paralleli altero paulo demissiore. Calyx 4-sidus

lacinia superiore latiore bidentata. Corolla coriacea , ringens. Ovarium 4-ovulatum ? Spicæ axillares , foliaceo-bracteatae . — Promontorium Bonæ Spei.

CI. *Thrysacanthus*. — Stamina fertilia 2 cum vel absque rudimentis steriliis ad basin ; antheræ ovales , loculis in connectivo oblongo subobliquo parallelis discretis. Corolla tenera , tubulosa , limbo vel subregulari 5-lobo vel bilabiata. Capsula a medio 2-4-sperma. Thyrsus terminalis , in aliis racemus simplex , pedicellis longiusculis , bracteis bracteolisque parvis . — America tropica.

CII. *Graptophyllum*. — Stamina 2, antheris incurvis angustis sa-gittatis, loculis parallelis. Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla ringens, labio superiore recto, margine reflexo. Capsula prope a basi 4-sperma. Racemus terminalis e racemulis axillaribus constructus . — India orientalis.

CIII. *Cyrtanthera*. — Stamina 2, apice recurva, antheris brevibus cernuis, loculis antrorum contiguis, connectivo latiusculo. Calyx 5-fidus partitusve , æqualis. Corolla ringens, labio superiore falcato inferiorisque laciñiis angustis. Capsula 4-sperma ? Thyrsus terminalis vel cymæ axillares , bracteis bracteolisque calyce longioribus illis et latioribus teneris . — America tropica.

CIV. *Hoverdenia*. — Stamina 2, antheris oblongis in medio connectivo adfixis, loculis parallelis contiguis. Calyx 5-partitus, laciñiis longis latisque coloratis. Corolla ringens, palato tunido rugoso. Ovarium 4-ovulatum. Cymæ terminales , oppositæ latibracteatae . — Mexico.

CV. *Cardiacanthus*. — Stamina 2, cordato-ovata, loculis contiguis parallelis. Calyx 5-partitus , laciñiis angustis. Corolla subinfundibuliformis, bilabiata, labio superiore angustiore. Capsula a medio dilatata, 4-sperma. Flores axillares, sessiles . — Mexico.

CVI. *Jacobinia*. — Stamina 2, basi sagittata vel obtusa et tum vero inæqualia, loculis parallelis basi mucronulatis. Calyx 5-partitus, latiusculus. Corolla ringens , labio superiore recto bidentato, inferiore apice trifido. Capsula a medio compressa , 4-sperma. Flores in apice ramosum axillares, oppositi, subinde spicati ; bracteolæ angustæ , vel parvæ vel elongatæ . — America meridionalis.

CVII. *Harpochilus*. — Stamina 2, loculis in connectivo lanceolato parallelis subcontiguis basi parum inæqualibus submucronatis. Calyx amplius vel tripartitus, laciñi superiore bifidæ , vel 5-partitus. Corolla ringens , labio superiore falcato angusto. Capsula a medio 2-3-sperma. Cymulæ axillares, parvibracteatae . — Brasilia.

CVIII. *Drejera*. — Stamina 2, incurva ; antheræ longæ , loculis parallelis æqualibus connectivo medio linearí discretis basi apiceque liberis. Calyx subchartaceus, ad medium usque 5-fidus. Corolla ringens, labio superiore angusto , inferiore trifido. Capsula a medio 4-sperma. Spica vel spicæ terminales axillaresve , secundifloræ , bracteis bracteolisque parvis . — America tropica et subtropica.

CIX. *Plagiocanthus*. — Stamina 2 ; antherarum loculi oblique

alter super altero positi, inferior minor. Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla bilabiata, labiis æquilatis, superiore integro, inferiore bilobo. Capsula a medio 2-sperma, depressa. Thrysus terminalis. — Peruvia.

CX. *Rhytiglossa*. — Stamina 2; antherarum loculi subtransversim alter super altero positi, plus minus discreti. Calyx 4-5-partitus, laci-niis æqualibus inæqualibusve. Corolla bilabiata, labio superiore angustiore, inferiore trilobo, palato rugoso venosove. Capsula a medio 4-sperma, compressa. Flores vel axillares, sessiles, vel spicati, bracteis bracteolisque vel brevibus angustisque, vel rarius his latioribus. — Africa australis, America septentrionalis et meridionalis.

CXI. *Amphiscopia*. — Stamina 2; antherarum loculi vel in connectivi elongati finibus alter sursum alter retro spectantes, vel linea recta alter super altero positi. Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla ringens, palato æquale vel venuloso. Capsula a medio disperma, depressiuscula. Spicæ axillares, oppositæ et terminales, bracteis latis basi saepe contractis. — America meridionalis.

CXII. *Sericographis*. — Stamina 2, ad insertionem maculis sericeis interstincta, antherarum loculis subparallelis, altero altius posito, demum saepe divergentibus plerisque muticis, in paucis basi cornutis. Calyx 5-partitus. Capsula a medio compressa, 4-sperma. Spicæ axillares, secundæ, simplices ramosæve, bracteis bracteolisque parvis. — America calidior et tropica.

CXIII. *Herpetacanthus*. — Stamina 4, basi per paria conjuncta; antheræ breviorum uniloculares. Calyx 5-partitus. Corolla bilabiata. Capsula a medio 4-8-sperma. Spicæ quadrifariam subsecundæ, bracteis latis. — America tropica.

b. Antheræ basi cornutæ vel calcaratæ.

CXIV. *Hemichoriste*. — Stamina 4; antheræ breviorum uniloculares. Corolla ringens. Thrysus. — India orientalis.

CXV. *Anisostachya*. — Stamina 2, connectivo triangulari. Calyx bilabiatus, labio utroque bifido. Capsula teres, superius 4-sperma. Spicæ axillares, geminæ, inæquales, secundifloræ, bracteis latis basi contractis duriusculis. — Madagascar.

CXVI. *Rostellaria*. — Stamina 2. Calyx 4-5-partitus, inæqualis. Capsula oblonga, a basi seminifera. Spica floribus oppositis, bracteis bracteolisque calycis lacinis subconformibus. — India orientalis, Madagascar, Nova Hollandia.

CXVII. *Leptostachya*. — Stamina 2, loculis superpositis contiguis, superiore majore. Calyx 5-partitus, æqualis. Capsula a medio depresso, 4-sperma. Spicæ axillares terminalesve, simplices vel compositæ subumbellatæ, graciles, floribus ex oppositis subsecundis subverticillatisve parvis, bracteis bracteolisque exiguis. — India orientalis, Africa australis, America tropica.

CXVIII. *Sarotheca*. — Stamina 2 connectivo securiformi, loculo supero transversali ciliato, infero verticali. Calyx 4-partitus.

Capsula apice parum dilatata, a medio 4-sperma. Spicæ axillares, simplices divisæ, secundifloræ, bracteis bracteolisque parvis. — Mexico, Brasilia.

CXIX. *Schwabea*. — Stamina 2, loculis superpositis, superiore globoso. Calyx quinquepartitus, æqualis. Capsula ovata, inflata, prope a basi abortu 2-sperma. Semina ad hilum barbata. Flores axillares, oppositi. — Africa tropica.

CXX. *Adhatoda*. — Stamina 2, antherarum loculis plus minus obliquis. Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla ringens, palato vel læviusculo vel in medio tumente rugisve venisve pectinatim notato. Capsula depressa, basi breviore spatio sterilis. Flores ex axillaribus verticillati vel spicati, bracteis variis, sæpe latis, bracteolis vel latis vel angustis. — Africa et America calidior, Arabia, India orientalis.

CXXI. *Gendarussa*. — Stamina 2, antherarum loculis in connectivo dilatato obliquis. Calyx 5-partitus, parvus. Corollæ ringentis palatum in medio tumens, sæpe bicarinatum. Capsula angusta a basi ad apicem depressa, 4-sperma, basi rigidior. Spica terminalis, bracteolis parvis, bracteis bracteolis vel conformibus vel latis et tum vero deciduis. — India orientalis.

CXXII. *Monechma*. — Stamina 2, antherarum loculis in connectivo rhomboeo-lanceolato oblique altero super altero positis. Calyx 5-partitus, æqualis. Corolla bilabiata, labio superiore breviore. Capsula basi brevi spatio contracta, hinc suborbiculari-compressa, 2-sperma. Spicæ axillares herbaceo-bracteatae, in terminalem confluentes (in specie dubiâ flores axillares, solitarii). — Arabia, Abyssinia, prom. Bonæ Spei, Texas.

CXXIII. *Simonisia*. — Stamina 2, antherarum loculis in connectivo semisagittato oblique distantibus, altero altiore. Calyx 5-partitus, rigidus, laciniis longis in alabastro conico contiguis. Corolla brevis, ringens, labio inferiore lato, palato tumido. Stigma capitatum. Capsula a medio 4-sperma. Spicæ breves, densæ, secundifloræ, in apice caulis subcapi-tatae, bracteis parvis. — Brasilia.

CXXIV. *Beloperone*. — Stamina 2, loculis antherarum in connectivo subsemisagittato obliquis, altero altiore.\* Calyx 5-partitus, æqualis, laciniis latiusculis sæpe coloratis. Corolla ringens, tubo longo, labii inferioris disco lævi. Capsula a medio compressiuscula, 4-sperma. Spicæ axillares in terminalem confluentes, tetrasticho-secundifloræ, bracteis bracteolisque conformibus subæqualibus longis nec admodum latis. — America tropica.

CXXV. *Anisotes*. — Stamina 2, antherarum loculis in connectivo lanceolato obliquis, uno altius posito, utroque basi corniculato. Calyx 5-partitus. Corolla tubo brevissimo, bilabiata, labio superiore latiore fornicato labium inferius basi involvente. Capsula Capitula axillaria, pauciflora, pedunculata. — Arabia.

1° *Pseudo-Aphelandreae. Antheræ uniloculares.*

LXXXIII. SPIROSTIGMA N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 83.

Calyx profunde quinquefidus, laciniis æqualibus acutis. Corolla infundibuliformis; tubus subcylindricus, limbus subæqualis, laciniis obtusis. Stamina quatuor, fauces æquantia; filamenta brevia; antheræ lineares, uniloculares, glabrae. Stigma bilabiatum, labio inferiore linearí membranaceo revoluto, superiore exiguo denticuliformi. Capsula a basi ad medium compressa, sterilis, in medio hexaspermia, seminibus valde approximatis margine ciliatis retinaculis suffultis. — Herba Brasiliensis, caule spicisque hirsutissimis. Spica foliacea-bracteata, bracteis 2-3-floris. Bracteolæ lineares, calyce longiores. Corolla parva glabriuscula.

S. HIRSUTISSIMUM (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 85).  $\mathcal{U}$  In silvis ad Araracóara prov. Fluminis Nigri, Decembri (Martius!). Caulis tetragonus, pilis densis longis patentibus in secco statu rufescens hirsutissimus, trichotomus. Folia oblonga, 5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{3}{4}$  poll. lata, utrinque modice attenuata. Spica terminalis. Bracteæ lanceolatae, obtuse, flores æquantes vel superantes, pilis strictis rufis tuberculo insertis hirsutæ. Flores 2-3 aggregati. Bracteolæ ad basin glomeruli 2, lineares, hirsutæ, longitudine bractearum. Calyx vix lineæ longior, ad  $\frac{2}{3}$  quinquefidus. Corolla 3 lin. longa, glabra. Filamenta antheras vix æquantia. Stigma in spiram revolutum, denticulo supero ad basin notatum. Capsula 4 lin. longa, fusca. (v. in h. monac.)

## LXXXIV. MACKENZIEA.

Calyx 5-partitus laciniis linearibus herbaceis. Corolla tubulosa, intus hirsuta, limbo 5-fido subæquali, laciniis brevibus. Stamina 4, subdidynama, tubi apici inserta, inclusa; filamenta brevia; antheræ uniloculares, glabrae, carinatae, linear-oblungaæ. Stylus pubescens, apice curvatus; stigma simplex. Capsula brevis, ovali-oblonga, compressa, prope a basi 4-sperma; semina ovata, mucronata. — Frutex, ramis oppositis, quadrangularibus, foliis sessilibus integerrimis margine revolutis, floribus mediocribus. Spicæ in ramis terminales, breves, foliacea-bracteatae. Flores oppositi, subsessiles, bibracteolati.

M. SESSILIS.  $\mathfrak{J}$  America australis? (Mackenzie! in h. Bentham ex h. soc. horticult. lond.). Rami adulti tetragoni, pallidi, lenticellato-tuberculati, glabri, novelli acute quadrangulares, laxe hirsuti. Folia  $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 5-6 lin. lata, ovata vel ovalia, obtusa, subtus glabra, supra laxe hirsuta, marginè reflexa; floralia decrescentia, at similia. Calyx 5 lin. longus, laciniis latiuscule linearibus obtusis hirtulus. Bracteolæ laciniis calycis similes at paulo breviores. Corolla calyce dimidio longior. Capsula 3 lin. longa, fusca. (v. in h. Bentham).

## LXXXV. HAPLANTHERA Hochst. nov. gen. pl. afric. in Florâ 1843 p. 71.

Calyx 5-partitus, subæqualis, laciniis angustis. Corolla bilabiata, labio superiore bifido, inferiore trifido, lobis æqualibus, omnibus obtusis. Stamina 4, a basi usque ad faucem tubo adnata, duo breviora ananthera, longiorum exsertorum antheræ uniloculares glabrae, apice et basi acuminate, ad dorsum connectivo continuo adnatae. Ovarium bilocularare, loculis biovulatis; stylus filiformis, simplex, longe exsertus, stigmate capitato bilobo. Capsula... Frutex foliis ovatis oppositis, floribus spicato-capitatis terminalibus speciosis, pedicellis basi bibracteatis.

H. SPECIOSA (Hochst. l. c.).  $\mathfrak{J}$  In declivibus ad utrumque latus vallis fluvii

Tacazea (Schimp. pl. exsicc. abyss. un. itin. n. 769); in Abyssinia (Quartin-Dillon! voy. en Abyss. n. 9, in h. mus. paris. n. 36). Frutex cortice cinerascente vel pallido erectus vel subscandens, ramulis oppositis tetragonis (sæpe rubentibus) laevis glabrisque, foliis oppositis petiolatis ovatis acuminatis subtus reticulato-venosis integerrimis subciliatis in petiolum decurrentibus. Calyx glabriusculus, 5-6 lin. longus, lacinias lanceolatis ciliolatis. Corolla scsquipollicaris, extus puberula, rubicunda, labio superiore ad basin utrinque intensius punctata, palato maculis copiosis punctiformibus confluentibus atro-sanguineis picta. (v. in h. un. itin. et paris.)

LXXXVI. RUTTYA Harvey gen. of south-african plants in Hooker Lond. journ. of bot. I p. 27, Meissn. gen. p. 367.

Calyx 5-partitus, laciiniis linearis-attenuatis flexuosis longissimis. Corolla bilabiata, labio superiore erecto semibifido plano, inferiore valde deflexo tripartito lobis subæqualibus, tubo lato, laciiniis calycis breviore, fauci inserta, exserta, antheris unilocularibus loculo obliquo basi mucronato; breviora sterilia, dentiformia. Ovarium sessile, biloculare, loculis biovulatis; stylus filiformis, pubescens, apice incurvus; stigma bifidum. Capsula... . — Herba natalensis, caule tereti pubescente, pulvinis foliferis elevatis patetæformibus vel semipateræformibus excavatis marginibus acutis, linea transversali elevata paria pulvinorum conjungente, foliis inæqualibus ovato-lanceolatis petiolatis glabriusculis vel parce pubescentibus integerimis repandis; spicis terminalibus densis bracteatis; bracteis calycis laciiniis similibus sed latioribus; calycis laciiniis mollissimis. — Differt ab Haplanthera Hochst. calycis laciiniis prælongis et rudimentis staminum breviorum exiguis.

R. OVATA (Harvey l. c.). *U* Prope Port Natal Africæ australis (Williamson! apud Harvey l. c.). (v. in h. Drèg.)

♂. caule glabro subtetragono, lateribus alternis convexis latioribus, angulis acutis, foliis ovali-oblongis in petiolum attenuatis supra pubescentibus. ♂? In Africâ australi (Drège!). Hypoestes fimbriata E. Meyer! cat. pl. Drèg. a. 1837. An species distincta? (v. in h. Drèg.)

LXXXVII. RAMUSIA.

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla bilabiata, tubo longo, limbi laciiniis æqualibus, superiore integrâ, inferiore apice trifidâ. Stamina 2, fauci inserta, limbum æquantia; anthereæ uniloculares, glabræ, muticæ, in dorso carinatæ, supra basin affixa. Stigma integrum. Ovarium.... Capsula. Spica terminalis, bracteis bracteolisque conformibus calyce longioribus, illis majoribus. — Fruticulus Africæ australis, ramis geniculatis glabriusculis teneris quadrangularibus pubescentibus, foliis ovalibus (2 poll. cum petiolo 6 lin. longo longis, 10-14 lin. latis) in acumen obtusum attenuatis basi cuneiformi in petiolum hirsutum decurrentibus repandis supra præsertim pubescentibus, ramulorum foliis angustioribus, spicâ terminali axillaribusque adjectis brevibus sessilibus densis; bracteis bracteolisque linearibus longis recurvo-patentibus ciliatis illis 7-8, his 4-5 lin. longis, calycis laciiniis linearis-lanceolatis ciliatis, corollâ fere pollicari, tubo limbo longiore intus sericeo. — Ramusia E. Mey. est Asystasia Bl.

R. TRIDENTATA. ♂ In Africâ australi (Drège!). Justicia tridentata E. Meyer cat. pl. Drèg. a. 1837. (v. in h. Drèg. et Hooker).

LXXXVIII. MONOTHECIUM Hochst. in Flord 1841 p. 374, 1843 p. 74.

Calyx quinquepartitus, subæqualis, segmentis angustis. Corolla bilabiata, fauce inflatâ, labio superiore erecto truncato-bidentato, inferiore plano tridentato breviter trilobo. Stamina duo, prominula, a basi usque ad terminum tubi adnata, antheris unilocularibus linearibus connectivo apice unilateraliter dilatato ad dorsum medium affixis. Ovarium biloculare, loculis biovalutatis; stylus simplex, filiformis, exsertus, stigmate brevissimo bifido. Capsula longe unguiculata, bivalvis, valvis medio septiferis, retinaculis lamellatis longiusculis obtusis, seminibus discoideis rugosotuberculatis. — Suffrutex Abyssinicus. Spica tetragona, bracteata, capitulis bibracteolatis sessilibus oppositis bracteâ unâ suffultis, floribus in capitulo ternis, lateralibus plerumque tabescientibus vel abortivis. Calycis segmenta subulata bracteâ, bracteolisque longiora.

M. OLANDULOSUM (Hochst. l. c.). — In dumetis regionis inferioris et mediæ australis montis Scholoda in Abyssinæ prov. Tigre, nec non in præruptis umbrosis prope Mai Doyale (Schimper!). Hypoëstes glandulosa Hochst. in fl. abyss. exsicc. un. itin. n. 346 et postea sub n. 617. Rostellaria glandulosa N. ab E. in litt. Planta caule adscendente ramosa pubescencitano pedali-bipedali basi lignescente, foliis ovatis petiolatis utrinque acuminatis pubescensibus, spicâ terminali elongatâ attenuatâ, bracteis lanceolatis bracteolisque similibus et calycibus longioribus subulatis glanduloso-pubescentibus, corollâ calycoem superante (albâ vel pallide roseâ?), labio superiore angusto extus pubescente, inferiore latiore punctis rubris picto, capsula puberulâ (pubescentiæ glandulosâ) figuram capsulae Peristrophes bicalyculata omnino emulante. (v. in h. un. itin.)

LXXXIX. STENOSTEPHANUS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 91.

Calyx quinquepartitus, lacinias linearibus æqualibus patulis. Corolla tubulosa, tubo brevi sursum gibbo, limbo brevissimo quadrifido, lacinias subæqualibus angustis, alterâ paulo magis sursum vergente. Stamina duo cum vel sine alterius paris rudimento ad basin, apici tubi inserta, corollâ longiora; anthera unilocularis, basi libera, acuta. Stigma obtusum. Capsula a basi usque ad medium depressa, elocularis et sterilis, hinc compressa, bilocularis, tetrasperma, seminibus alternis orbiculatis tuberculatis retinaculis obtusis suffultis. — Suffrutices Brasilienses et Mexicanæ, habitu Schaueriæ, foliis tenuibus, floribus rubris. Thyrsus terminalis vel thyrsi infra-terminales, oppositi, simplices ramosive, angusti. Bracteæ et bracteolæ ad basin pedicellorum vel parvæ vel illæ latiores. Flores fasciculato-terni, oppositi, quorun uno in singulo fasciculo perfecto longius pedicellato, pedicello ebracteato, duobus ad ejus basin imperfectis multo minoribus brevissime pedicellatis, pedicellis sæpius bibracteolatis sessiliibus.

1. S. LOBELLÆFORMIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 92), thyrsi terminali pubescente, corollæ faucibus angustis, bracteis subulato-acuminatis, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis in petiolum longiusculum cuneatim desinentibus glabris, staminibus alterius paris dentiformibus. 3 In nemoribus humidis Serræ dos Órgaos prov. Sebastianopolitanæ, Septembri (Khotzky! n. 105 in h. DC.), in silvis primævis Macahé, Junio (h. acad. petrop.! n. 796). Suffrutex erectus, tri-quadripedalis, glaber, ramosus, ramis patentissimis apice foliosis tetragonis. Folia cum petiolo 10-5 poll. longa, 2 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$  poll. lata. Thrynsa tripartitus, erectus, subtilissime puberulus. Bracteæ inferiores circiter 2 lin. longæ, subulato-acuminatæ, adpressæ. Bracteolæ

breviores, subulatæ. Pedicellus medius floræ fertilem ferens 3-4 lin. longus, duo huic adjecti et steriles quadruplo breviores. Flos fertilis subnutans. (v. in h. petrop. et DC.)

*B. subsessilis*, pedicello floræ fertilis calyce duplo triplove breviore, calycis laciniis paulo brevioribus rectiusculis, corollæ violaceâ. ♂ In silvis prope presidio Brasiliæ, Julio ( h. acad. petrop. n. 362). Differt corollis brevioribus violaceis et pedicellis brevissimis, pubescentiâ etiam rariore et vix glandulosâ, sed habitus et folia minime discedunt. An species propria? Suffrutex 1-2-pedalis. (v. in h. petrop. )

2. S. LASIOTACHYUS, thyrsis ad apicem caulis oppositis inæqualibus hirsutissimis, corollæ faucibus inflatis deorsum gibbosis, bracteis ovali-oblongis cuspidatis, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis in petiolum longum longe cuneatimque decurrentibus glabris, staminum brevirorum rudimentis nullis. ♂ In faucibus montium scaturiginosis prope Caracas, Februario (Moritz! n. 258 in h. gen. berol.). Corolla coccinea, flavo-striata (Moritz l. c.). Habitus prioris, at folia multo magis in petiolo decurrentia (acuminata, apicem versus subcrenata). Thyrsus densus, folio suo brevior, oppositus minor et laxior. Corolla valde ventricosa, limbi laciniis subulatis dentiformibus. Calyces præsertim pilis longis mollibus articulatis dense vestiti. (v. in h. berol.)

#### XC. GALEOTTIA.

Calyx quinquepartitus, æqualis, brevis, laciniis angustis. Corolla e tubo angustiore in fauces oblongas inflatas transiens, limbo brevi bilabiato erecto, labio superiore recto angustiore integro, inferiore latiore concavo brevi spatio trifido. Stamina duo apici tubi inserta, corollæ longiora; antheræ uniloculares, basi liberæ, obtusæ. Stylus filiformis, corollæ longior. Stigma haud discretum. Fructus.... — Frutex Mexicanus glaber, paniculâ patulâ ramis gracilibus, floribus rubris pendulis insignis. Panicula terminalis, laxa, trifida. Bracteæ ad basin ramificationum oppositæ, subulatæ, parvæ. Bracteolæ nullæ. — Genus proximum Stenostephano, distinctum corollæ structurâ et inflorescentiâ.

G. GRACILIS. — ♂ In Cordillerâ prov. Vera Cruz imperii Mexicanæ, alt. 2000 ped. ad rupes, rara, Februario (Galeotti! n. 7050 in h. Hook. et Benth.) in eadem prov. ad Mirador, Augusto (Linden! n. 197 in eod. h.). Caulis flexuösus, ramosus, quadrangularis uti tota planta glaber, laxus, habitu Scordoxylî. Folia circa apices ramorum collecta, 4-5 poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, oblonga, apice attenuata, basi in petiolum mediocrem angustum attenuata, repando-subcrenata, in costâ mediâ margineque scabra, obscure viridia, ramis costæ quinis arcuatis subvenosus. Panicula terminalis, brevipedunculata, glabra, laxa, rhachi tenui, ramis plerisque oppositis patentissimis gracillimis apice trifidis trifloris, rare altero ramo bifloro. Pedunculi graciles, medius bilinearis, laterales sœpe duplo longiores, et tum vero supra medium bibracteolati. Bracteæ exiguae, subulatæ. Bracteolæ nullæ. Flores nutantes vel penduli, kermesini, 12-14 lin. longi. Calyx vix lin. longus, glaber, laciniis subulatis. Corolla glabra, viscidula. Filamenta ultra lineam inter labia prominula, recta, glabra; anthere oblongæ, post pollen emissum basi retusæ. Stylus gracilis, glaber, longitudine staminum. Ovarium oblongum, glabrum, annulo nectariifero lato cinctum; ovulorum numerum definire non contigit. (v. in h. Hook. et Bentham).

XCI. ANTHOCOMETES. — Justiciæ spec. dub. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 115.

Calyx quinquepartitus, laciniis æqualibus setaceis. Corolla bilabiata. Labium superius angustum, rectum, complicatum; inferius latum, trilo-

bum, concavum. Stamina duo. Antheræ uniloculares, lineares, compressæ, basi obtuse mucronatae. Capsula basi depressa, sterilis, hinc depressiuscula, in medio tetrasperma. Retinacula brevia, squamiformia. Semina discoidea, rugosa. — Suffrutex Indicus, diffusus, radicans, floribus parvis. Spicæ terminales et axillares, densæ, subsecundæ, bracteis bracteolisque calycis laciniis setaceis conformibus.

A. ARISTATUS, foliis elliptico-oblongis integerrimis, spicis ad apicem caulinum aggregate subinde nutantibus. ♂ In ins. Ceylon (Wight!), in Nilgherry jugo (Schmidt! in h. Zenkeriano). Justicia aristata Wall. cat. n. 2481, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 115. (v. in h. Wall., Walker et Hooker).

XCII. HABRACANTHUS. — Justiciæ spec. Willd. et Schlechtend.

Calyx profunde quinquepartitus, æqualis. Corolla ringens, labio superiore falcato integro, inferiore vel tripartito, laciniis subæqualibus angustis, vel apice breviter trilobo. Stamina duo, exserta, divergentia; antheræ uniloculares, rectæ (neque peractâ anthesi contortæ), infra medium dorsum adfixæ. Stigma acutiusculum. Ovarium a medio quadriovulatum, basi annulo lato cinctum. Capsula a basi ad medium asperma, hinc subcompressa, bilocularis, tetrasperma. Semina ovato-subrotunda, discoidea, tuberculata, basi truncata, angulo raphæos prominulo. — Herbæ vel frutices Mexicanæ, floribus albis vel rubris. Panicula terminalis, ramis cymoso-bifidis inæquilateribus, vel cymulæ axillares, paucifloræ; pedicelli definites (medii) ebracteolati. Bracteæ bracteolæque parvæ, a calyce remotæ.

1. H. SILVATICUS, glaber, paniculâ terminali angustâ, labio inferiore corolla tripartito. ♂? In silvis inter S. Bartolo et Pueblo Nuevo (Chiapas), Febrero (Linden! h. austr. n. 181 in h. Hooker), Sierra S. Pedro Nolasco, Palearto (Jürgensen! n. 902 in h. Hooker). Frutex ramosissimus, trichotomus, glaber, ramis laxis inferne teretibus superne tetragonis. Folia oblonga, vel ovali-oblonga, suberenata, utrinque attenuata, acuminæ obtusiusculo submucronata, basi acuta in petiolum mediocrem desinentia, obscure viridia,  $4\frac{1}{2}$  poll. longa, poll. 1 lata. Thyrsus brevipedunculatus, 3-pollicaris. Rami thyrsi  $\frac{1}{2}$  poll. longi, apice cymosi. Calyx circiter bilinearis. Corolla ante evolutionem falcata, 6 lin. longa, alba. (v. in h. Hooker).

2. H. HÆMATODES, herbaceus, glaber, paniculâ terminali laxâ, ramis patentibus, labio corollæ inferiore acute tridentato. ♀ In regione calidiore infra la Cuesta grande de Ciconquiaco, Septiembre (Schiede! n. 76 in h. gen. berol.). Justicia bæmatodes Schlecht. in Linn. 1832 p. 394. Folia ovalia (5-9 poll. cum petiolo longa, 22 lin.- $3\frac{1}{2}$  poll. cum petiolo lata, petiolo  $1\frac{1}{2}$  poll. longo), acuminate, basi cuneatâ longâ in petiolum desinentia, supra setulis raris adpersa, utrinque in costis scabra. Panicula sessilis, 4-10 poll. longa, oblonga. Corolla poll. 1 longa, fauclibus iufatis, labiis brevibus, superiore bidentato. Stamina ut in reliquis, exserta. Capsula 7-8 lin. longa. (v. in h. berol.)

3. H. SANGUINEUS, herbaceus, caule superne viscido-pubescente, pedunculis axillaribus in paniculam terminalem confluentibus paucifloris, labio corollæ apice trilobo, foliis oblongis strigoso-pubescentibus. ♂? Ad Orinoco fluvium (Humboldt! in h. Willd.), Bogota (Goudot! in h. Hooker). Justicia sanguinea Willd.! in b. n. 305. Caulis quadrangularis, lateribus oppositis alternis profundis. Folia (superiora) bipollicaria, acuminata, summa deliquescentia. Cymulæ axillares 2-3-floræ, flore breviores. Corolla pollicaris sanguinea. Antheræ ut in præcedente. (v. in h. Willd. et Hooker).

XCIII. SEBASTIANO-SCHAUERIA N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7  
p. 152.

Calyx regularis, quinquepartitus. Corolla anguste infundibuliformis, tubo cylindrico, limbo erecto patente profunde quinquefido, lacinii angustis æqualibus, duabus superioribus paulo magis contiguis. Stamina duo, tubi apici inserta, longitudine limbi; antheræ uniloculares, supra basin insertæ, connectivæ carinato, emiso polline contortæ. Stigma obtusum. Capsula a basi usque ad medium depressa elocularis asperma valvulis continguis, hinc compressa circumscriptione lanceolata, bilocularis, tetrasperma. Semina discoidea, ovali-orbiculata, tuberculata, ad umbilici alterum latus uniloba. Retinacula acuta. — Herba Brasiliensis. Spica terminalis (vel spicæ), floribus oppositis, inferioribus subinde geminis ternisve. Bractæ et bracteolæ parvæ, æquales, calyce breviore.

S. OBLONGATA (N. ab E. l. c.) 2 Canto Gallo Brasiliæ (Schott! in h. imp. vindob. n. 22 et 4724), in umbrosis prope Præsidio, Julio, (Riedel! in h. imp. petrop. n. 9). Caulis herbaceus 1-1½ ped. altus, glaber, ad genicula carnosus, ramosus. Folia 5½-7 poll. longa, 1-1½ poll. lata, oblonga, tenuia, glabra, supra setulis paucis scabra, modo alia repanda, alia apicem versus plus minus crenata, acuminate, basi in petiolum ½-¾ poll. longum acutata. Spica in caule ramisque terminalis, sessilis vel pedunculata, 2-8 poll. longa, subinde ad originem ramo aucta. Flores oppositi. Bractæ et bracteolæ e basi latiore subulatae, scabré, calyce duplo breviores. Calyx sessilis, sub flore 2 lin. longus, sub fructu 4 lin. longus, æqualis, profunde 5-partitus, lacinii subulatis scabris. Corolla 4 lin. longa, subbilabiata, lacinii linear-lanceolatis obtusis pubescentibus pallidis lineis purpureis pictis (violaceis, Riedel), duabus superioribus magis continguis. Capsula 7 lin. longa, testacea, scabriuscula. (v. in h. vindob. et petrop.)

XCIV CHÆTOTHYLLAX N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 153.—  
Justiciae spec. Pohl in h. vindob.

Calyx quadripartitus, æqualis, herbaceus. Corolla ringens, labio superiore compresso, inferiore trifido, lacinii oblongis obtusis, palato æquali. Stamina duo, longitudine labii superioris; antheræ uniloculares, loculo inferiore abortivo in calcar filiforme a loculo superiore distans mutato. Stigma anguste lanceolatum, papillosum. Capsula a basi ad medium depressa, hinc modice compressa medioque constricta, bilocularis, tetrasperma. Retinacula truncata. Semina lenticularia, hilo truncato, asperula, colorata. — Frutices Americani. Spicæ axillares, breves, in terminaliæ abentes, subinde geminæ, interiore longiore brevipedunculata, exteriore sessili, densæ, disticho-secundæ. Bractæ vel foliis similes, vel, uti bracteolæ angustæ, calycem subæquantes. Corolla coerulea.

1. C. TOCANTINUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 153), spicis axillaribus geminis, bracteis bracteolisque linearibus calycem æquantibus, foliis ovalibus subcrenulatis. 3 Ad Rio Tocantins, ad Pasta tres Brasilæ (Pohl! in h. mus. palat. vindob.), in prov. Minarum Generalium (Claussen! in h. mus. paris. n. 228), in prov. Goyaz Serra da S. Brida (Gardner! n. 3949 in h. Hooker). Justicia crenulata Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 2009 et 2071. Habitus Justiciae (Rhytidiosæ) Caracasana Jacq. (v. in h. vindob., paris. et Hooker).
2. C. PHYLLOSTACHYUS, spicis axillaribus solitariis, bracteis foliaceis ovalibus acutiusculis calyce longioribus, bracteolis linearibus calycem æquantibus, foliis oblongo-ovalibus integerrimis. 3 Ad flumen Teapa in prov. Tabasco, Maio (Linden! n. 188 in h. Hooker). Flores rosei (Linden.) (v. in h. Hooker).
3. C. UMBROSUS, spicis axillaribus solitariis geminis, bracteis bracteolisque

subulatis calyce subulato duplo brevioribus scabris. ♂ In Novâ Granadâ (Goudot! in h. Hooker), in silvis obscuris St. Xaver copiosus ( Tweedie! n. 1262 in h. Hooker). Flores pallidi. Labium inferius superiore latius et longius. Antheræ loculus inferior valde remotus, calcariformis, at vero distincte bivalvis, subcompletus. (v. in h. Hooker).

2º *Genuinæ. — Antheræ biloculares.*

XCV. HEINZELIA N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 151 et 153. — Justiciæ spec. Pohl.

Calyx quadripartitus, æqualis. Corolla bilabiata, labio superiore angusto, inferiore plano apice trifido, laciniis subæqualibus obtusis. Stamina duo, infra fauces inserta, longitudine labii superioris. Anthera mutica, bilocularis, loculis in connectivi angusti continuo lateribus arcte contiguis antheram unilocularem mentientibus antrorum dehiscentibus. Stigma obtusum neque incrassatum. Capsula a basi brevi spatio depressa, asperma, hinc tetrasperma. Retinacula acuta. Semina orbiculata, compressa, subtilissime muriculato-scabra. — Herbae vel suffrutices Brasilienses habitu Rhytidoglossæ aut Leptostachyæ, floribus fructibusque parvis. Spicæ ex axillariis terminales, compositæ, trifidæ, secundifloræ, densiusculæ. Bractæ angustæ, bracteolis setaceis paulo longiores, calyce breviores.

1. H. LYTHROIDES (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 153-154), foliis lanceolatis glabris. ♀ In umbrosis ad fluvium Pirrahi Brasiliæ, Martio (Pohl!). Justicia lythroides Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 5013. Caulis probabiliter adscendens, teres, lineâ hirsutâ inter ramos oppositos oriente notatus, trichotomo-ramosissimus, superne obtuse tetragonus. Folia 2½-3 poll. longa, ½ poll. lata, acuminata, basi attenuata. Corolla 3 lin. longa, alba, puberula. Capsula 3 lin. longa, pallida, ad ¼ a basi depressa. (v. in h. vindob.)

2. H. OVALIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 74), herbacea, foliis ovalibus oblongisusc subciliatis supra in costâ vel undique petiolis caulisque lineis hirsutis, corollæ tubo limbo paulo longiore. ♀ Locus umbrosis sylvaticis Ypanemensibus in Brasiliâ, Martio (h. acad. petrop.: n. 1983), in locis siccis petrosis prope Barbacena, Maio (idem! ibidem. n. 88 var. hirsuta), Tucuman in silvis (Tweedie! in h. Bentham). Caulis herbaceus, decumbens, basi repens, apice adscendens. Folia inferiora breviora, ovalia, obtusa, ½-2 poll. longa, ¼ poll. lata; superiora vix longiora et angustiora apiceque magis attenuata, acumine obtuso. Corolla 4 lin. longa, rosea vel ex rubro violacea, labio inferiore purpureo-punctato. (v. in h. petrop. et Bentham).

3. H. LONGIFLORA, fruticosa, foliis ovalibus ovatisse obtusis supra in costis petiolo caulisque lineis pubescensibus, corollæ tubo limbo triplo longiore. ♂ Prope las Ajuntas in imperio Mexicano, Januario (Ehrenberg! n. 1076 in h. gen. berol.). Caulis teretiusculus. Spicæ pedunculatae, bifido-ramosæ, paucifloræ, foliis paulo longiores, alternæ, axillares vel et ex angulo ramí provenientes. Corolla pollicaris, pallida ?, tubo æquali gracili 9 lin. longo pubescente; labium inferius planum. (v. in h. berol.)

XCVI. SCHAUERIA N. ab E. ind. sem. hort. wratisl. 1838, Linn. literaturb. 1839 p. 119, Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 102, Endl. gen. suppl. 1 p. 1406, Meissn. gen. p. 296 (204). — Justiciæ spec. Link, Lindl., Hook.

Calyx profunde 5-fidus, laciniis angustis, subinde setaceo-attenuatis, (in S. hirsutâ, anomalâ, 4-partitus). Corolla bilabiata, labio superiore angusto concavo, inferiore ad basin usque tripartito, laciniis subæqualibus,

unde corolla in multis ad speciem regulariter quadrifida appetet. Stamina duo exserta; antheræ muticæ, bilocularis, loculis parallelis subcontiguis vel connectivo oblongo discretis muticis, altero subinde paulo altiore. Stigma crassiusculum, obtusum. Capsula a basi ad medium usque asperma, angusta depressa, hinc compressa, tetrasperma, parte seminiferâ suborbiculari. Semina ad basin loculorum approximata, discoidea, muricata, retinaculis suffulta. — Frutices Brasilienses, ramosi, articulati, ad genicula compressi articulisque a projecturis ex geniculis decurrentibus quadricostatis; genicula saepe a basibus foliorum prominulis bidentata, dentibus truncatis. Flores albi vel lutei. Spica vel thyrsus terminalis, bracteis 5-3-2-unifloris, vel herbaceis calyce longioribus, vel parvis angustis, bracteolisque bracteâ etiam minoribus.

### § 1. Bracteales. — Bractea latæ.

1. S. **MARGINATA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 102), bracteis oblongis, foliis lanceolatis glabriusculis.  $\mathcal{U}$ ? In silvis ad Soteropolin prov. Bahiensis, Decembri (Martius). Caulis procumbens, adscendens, ramosus, multiarticulatus, articulis brevibus, inferne glaber, juvenilis subtilissime pubescens. Folia  $1\frac{3}{4}$ -2 poll. longa, 3 lin. lata, utrinque attenuata, acumine obtusiusculo, in petiolum per se brevem basi cuneatim desinentia, in costis subpubescencia, margine angusto cartilagineo pellucido cincta. Spica vix pollucaris, sessilis, laxiuscula, puberula, viscidula. Bractæ 2 lin. longæ, oblongæ, acutiusculæ, virides. Bracteolæ lanceolato-lineares, bracteâ breviores. Calyx lin. vix longus, lacinii apice setaceis. Corolla angusta, pallide purpurascens? 6 lin. longa. Stamina limbo breviora. Capsula 3 lin. longa, acuminata, pallida, pubescens. Semina magna, albida? (v. in h. monac.)
2. S. **HUMULIFLORA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 102), bracteis ovato-orbiculatis mucronatis membranaceis calycibusque villosis, foliis ovalibus utrinque acutis ciliatis.  $\mathfrak{Z}$  In silvis ad Rio Belmonte et in viâ Felisbertiæ Brasiliæ (Max. princ. Wied.!). Justicia humuliflora N. et M. in nov. act. ac. nat. cur. 11 p. 53, Willd. sp. pl. ed. Distr. 1 p. 369. Folia  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, subcoriacea, margine cartilaginea. Petioli semiunciales, marginati, sulcati, ciliati. Bractæ venoso-reticulatae, pallidæ, 6 lin. longæ. Flores subterni. Bracteolæ setacea, longitudine calycis. Reliqua ut iu præcedente. (v. in h. Mart.)
3. S. **MALIFOLIA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 103), caule repente strigiloso-sericeo, spicâ terminali adscendente basi ramosâ pubescenti-glandulosâ, floribus oppositis distantibus, bracteis lanceolatis calycem subsequantibus, bracteolis subulatis calyce brevioribus, foliis ovatis obtusis sub-euspolidatis supra densissime lineolatis subtus velutino-pubescentibus costis marginibusque strigiloso-canis.  $\mathfrak{Z}$  Rio de Janeiro, Septembri (h. acad. petrop.!). Fruticulus procumbens, basi repens, ramis pedalibus canescens. Folia firma, 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. prope a basi lata, basi obtusissima subinde subcordata, apice vel obtusa vel minuto cuspidulo praedita, subtus dense pubescentia subincana. Spica terminalis 3-pollicaris, arcu brevi adscendens, basi ramulis aliquot praedita, stricta, pubescens adpressâ cauescens. Flores longe distantes. Corolla parva, 3 lin. vix longa, limbo profunde bilabiato, labii lacinias profunde divisis. (v. in h. petrop.)
4. S. **HIRSUTA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 103), hirsuta, spicis terminalibus subgeminis, bracteis ovalibus brevi-acutis basi cuneatis nervosis, foliis ovalibus obtuse breviuspidatis basi acutis.  $\mathfrak{Z}$  Ad Bahiam (Blanchet in h. Moricand n. 3131!). Suffrutex basi repens, hinc adscendens, undique pilis albidis vestitus, simplex, pedalis et sesquipedalis. Folia 2-3 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 poll. lata, utrinque hirsuta, petiolo 2 lin. longo. Spica terminalis, cum pe-

dunculo semipollucari 2 poll. longa, cylindrica, adiectâ vel alterâ ad angulum duplo minore, etiam pedunculata. Pedunculus hirsutus. Calyx quadripartitus, lin. 1 paulo longior, laciuiis æqualibus subulatis birsutis. Corolla 2 lin. longa, alba; labium superius ovale, obtusum; inferius paulo latius, trifidum, laciuiis æqualibus linearis-oblongis obtusis. Anteræ nutantes, ovales, cordatae, loculis connectivo lato discretis. Capsula 2 $\frac{1}{2}$  lin. longa, a basi ad  $\frac{1}{3}$  lata, depresso, hinc compressa, lanceolata, disperma. (v. in h. Moricand).

### § 2. *Angustibracteatae*. — *Bracteæ lineares subulate*, *setaceæ*.

\* *Calycis laciniis longissimis setaceis*, *corolla limbo tubo cum faucibus simul sumptis brevioribus*. *Flores flavi*, *subsessiles*.

5. S. CAPITATA, spicâ terminali trifidâ subcapitata ramis brevissimis, bracteis oblongo-lanceolatis calyce brevioribus, calycis laciniis linearis-setaceis glandulos-pubescentibus, tubo corollæ cum faucibus cylindrico recto, foliis ovatis glabris. ♂ In montosis prov. Rio Grande (Tweedie! in h. Hooker). Specimen digitale, nescio an integra planta an pars ejus. Folia omnino fere Sch. calycotrichæ. Inflorescentia terminalis e spicis tribus subglobosis brevipedunculatis constat. Bractæ infima major reliquis, subinvolucratis. Calycis laciniæ e basi latiore setaceo, attenuatae, breviore quam Scb. calycotrichæ. Corolla 6 lin. longa, pallida. (v. in h. Hooker).

6. S. CALYCOTRICA (N. ab E. ind. sem. hort. wratislaw. 1838), thyrsi terminali subspicato, calycis laciniis linearis-setaceis longissimis, faucibus corollæ elongato-obconicis calyce duplo longioribus incurvis, foliis ovato-oblongis glabris. ♂ In Brasiliâ, ad Cabo Frio (Max. princ. Wied.), in silvis jugi Serra dos Órgãos (Martius, Douglas! in h. Hooker), Sellow in h. reg. berol. n. 219!), locis humidiusculis prope Semidorio, Martio et Aprili (h. acad. petrop.!) — Linnae literaturb. 1839, p. 119, Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 103. *Justicia calycotrichæ* Link et O. pl. sel. p. 113 t. 53, Bot. mag. t. 2816, Spr. cur. post. in syst. p. 18, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 373. *Justicia calycotrichæ* Hook. exot. fl. t. 212. *Justicia flavicoma* Lindl. bot. reg. t. 1027, h. DC. ! Rami glabriuscui, ad foliorum ortum pilosuli. Folia ovata, alia subcordata, acuta, undulato-subcrenata, ad oras ciliolata. Corollæ pollicares, amonea lutea, subtilissime pubescentes, tubo longo sursum nonnihil inflato. Calycis laciniæ bracteæque corollâ  $\frac{1}{3}$  vel  $\frac{1}{2}$  breviore, glandulos-ciliatae, pallide virescentes aut luteolæ. Thyrsus terminalis, densus. Capsula 6 lin. longa, straminea, glabra, in medio tetrasperma, bina basin versus depresso. (v. in b. nost., berol., petrop., Hooker et viv. c.)

\*\* *Calycis laciniis mediocribus vel parvis*, *limbo corollæ ringentis tubo cum faucibus simul sumptis brevioribus*. *Flores longiuscule pedicellati*, *flavi*.

7. S. SULPHUREA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 104), thyrsi terminali elongato subracemoso pubescente, calycis laciniis subulatis, faucibus corollæ elongato-obconicis calyce multa longioribus, foliis lanceolatis apice attenuatis basi acutiusculis acutius glabris. ♂ Serra Grande in Brasiliâ (Schott! in h. palat. vindob. n. 4741!), in silvis ad Piraby fluv. Brasiliæ, Martio (Pohl! in h. palat. vindob. n. 5011!). *Justicia sulphurea* Pohl! ic. in h. palat. vindob. n. 4741. *Justicia lutea* Pohl! ic. in b. palat. vindob. n. 5011. *Flos* fere Schaueria calycotrichæ, sed calyx parvus vix 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus. Thyrsus terminalis, sessilis, 4 poll. longus, lanceolatus, e cymulis racemuliformibus brevibus plerumque trifidis constat, quarum ramuli uniflori, 1-3 lin. longi pedicellos medio bibracteolatos fingunt. Bractæ et bracteolæ parvæ, subulate, uti rhachis et ramuli plus minus pubescentes. Corolla subfalcata, 9-12 lin. longa, labio superiori falcato, inferiore tripartito, laciuii late linearibus obtusis æqualibus. Caulis fruticosus, geniculis nodosis, nodis sæpe constrictis. Folia inferiora cum petiolo pollicari 9 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, basin versus plus minus attenuata, superiora cum petiolo semipollucari 3-3 $\frac{1}{2}$  poll. longa, propius a basi 6 lin. lata, hinc apicem versus in acumen obtusum cum mucronulo attenuata, basi vel simpliciter

acuta, vel rotundata et in petiolum acute desinentia, utrinque confertim lineolata, integerrima, glabra. (v. in h. vindob.)

\*\*\* *Calycis laciniis mediocribus vel parvis, limbo corollæ tubum subæquante vel superante saepe speciem corolla infundibularis referente. Flores albi.*

8. S. **LOPHURA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 104), glabra, thyro terminali subspicato, bracteis bracteolis calyce brevioribus calycibusque linearis-setaceis glanduloso-subciliatis illis calyce brevioribus, floribus 3-5 brevipedicellatis sessilibusve fasciculatim oppositis, corolla labii inferioris laciniis labioque superiore integro subæqualibus æquidivisis erectis, foliis ovatis ovato-oblongis basi obtusis inæqualibus, apex attenuatis subrepandis. ♂ In silvis ad Porto Seguro et Cabo Frio, Augusto et Septembri in anthesi (Max. princ. Wied.), in prov. Minarum Generalium (Gardner! n. 5136 in h. Bentham et Hooker!) Frutex speciosus, thyrsis albis excellens. Rami glabri, albidi, adulti teretes, teneriores projecturis a foliis descendentibus notati, subquadrigulares, ad ramifications compresso - dilatati. Folia mollia; lamina 3 poll. longa, 1½ poll. lata, basi obtusa et inæqualia subinde subcordata, apex angustus sed obtusus. Thyrsi oblongo-pyramidales, circiter 3-pollicares, densi in apice ramorum, erecti. Rhachis glabra, hinc inde pilosa. Bracteæ et bracteolæ pedicellosæ sequentes, patulæ, ciliato-serrulatae, subinde margine nudæ. Calyx 3 lin. longus. Corolla 8 lin. longa, subinfundibuliformis, labii laciniis linearibus labioque superiore subæqualibus erecto-patulis. (v. in h. Mart., Hooker et Bentham).
9. S. **VIRGINÉA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 105), glabra, thyro terminali subspicato, bracteis bracteolisque calyce brevioribus calycibusque linearis-setaceis glanduloso-ciliatis, floribus brevipedicellatis sessilibusve fasciculatim oppositis, corolla labii inferioris laciniis labioque superiore integro subæqualibus æquidivisis patulis, foliis oblongis basi acutis apice attenuatis subrepandis. ♂ In silvis ad Cabo Frio Brasiliæ, Septembri (Max. princ. Wied.), ad Aracatiba Brasiliæ (Martius); (Sellow! in h. reg. berol. n. 155, 156 et 226!) — Gardner pl. bras. n. 839. Schaueria lophura differt foliis longioribus basi acutis longioreque petiolo præditis, corollis majoribus magisque patulis. Petioli inferiores 2-2½ poll. longi; lamina 5-5½ poll. longa, 1½ poll. lata. Calyx 4 lin. longus, corolla 9-10 lin. longa. Capsula pallida, 5 lin. longa, parte fertili ungue breviore, lenticulari-cuspidata, 4-sperma. Semina tenuia, suborbiculata, dissite tuberculata, ad hilum emarginata. Frutex 2-6 pedes altus. (v. in h. Mart., monac., berol., Hooker, etc.)
10. S. **LACHNOSTACHYIA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 105), caule lineis pilosis alternis notato, thyro terminali subspicato, bracteis bracteolisque calyce brevioribus calycisque laciniis linearis-setaceis villis longis ciliatis, rhachi hirsutâ, floribus brevipedicellatis sessilibusve simpliciter fasciculatimve oppositis, corolla labii inferioris laciniis labioque superiore integro subæqualibus æquidivisis erectis, foliis ovato-oblongis acuminatis basi acutiusculis obtusisve subrepandis glabris. ♂ In monte Corcovado ad Rio de Janeiro (Maximil. princ. Wied. in h. Mart., Schott! in h. mus. palat. vindob. n. 4743! Sellow! in h. reg. berol. n. 15 et 225! h. acad. petrop.). Justicia confertiflora Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 4743. Differt a Schaueria lophurâ et virgininâ, præter folia basi evidenter acuta, in primis villis longis articulatis, qui loco pilorum capitatorum bracteas bracteolas calycesque longorum ciliorum specie cingunt. Folia ad costas subtus hinc inde setulâ brevi adspersa sunt, margines haud raro evidenter repando-crenati. (v. in h. Mart., vindob., berol., petrop.)
11. S. **MACROPHYLLA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 105), glabra, thyro terminali subspicato solitario ternisve folio brevioribus subsessilibus densussimis, bracteis bracteolisque calycem subæquantibus calycisque laciniis setaceis rhachiisque pubescenti-scabris, floribus 3-5 brevissime pedicellatis sessilibusve fasciculatim oppositis, corolla bilabiatae labio inferiore tripartito la-

bioque superiore subæqualibus lanceolatis obtusis erectis, foliis oblongis acuminatis basi acutis repando-crenatis. ♂ Serra de Macao in prov. Goyaz Brasiliæ (Pohl ! in h. palat. vindob. n. 4736). *Justicia macrophylla* Pohl ! ic. in h. palat. vindob. n. 4736. Differt a Schaueriæ virginæ foliis amplis (cum petiolo 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longo) 1-1 $\frac{1}{2}$  ped. longis 2 $\frac{1}{4}$ -3 $\frac{1}{2}$  poll. latis exquisite acuminatis et evidenter late crenatis, tum caule crassiore, thyrsos densissimo oblongo cum pedunculo semipollicari 3-4 poll. longo. Corolla 7-8 lin. longa, labio superiore latiusculo incurvo ?. (v. in h. vindob.)

12. S. *MARXIMILIANI* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 106), spicis axillaribus terminalique interruptis, bracteis bracteolisque subulatis æqualibus calyce brevioribus, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis subrepandis glabris. ♂ Ad viam Felisbertiam Brasiliæ, Januario (Max. princ. Wied.). *Justicia nitida* Nees et M. in nov. act. ac. nat. cur. 11 p. 56 (excl. synon.). Differt a Schaueriæ gonyostachyæ floribus distantibus, inferioribus fasciculato-ternis, superioribus oppositis foliisque tonuoribus laxioribus longius petiolatis, tum vero ab hac et a reliquis cunctis calyce majore (3 lin. longo). Folia supra subtilissime elevato-punctata. Rhachis spica ad genicula alternatim compressa. Calycis laciniaæ linearifiliformes, ciliatae. Corolla 5 lin. longa, alba, labio superiore vix emarginato. Antherarum loculi connectivo lanceolato subdiscreti basi apicque conniventes. Capsula 6 lin. longa, laevis, fuscescens, parte fertili ovali acutæ. (v. in h. Mart. et Princ. Wied.)

13. S. *PANICULATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 106), paniculâ terminali pedunculata trichotomâ, floribus solitariis geminis brevissime pedicellatis secundis, bracteis bracteolisque æqualibus calyce brevioribus calycisque laciniaæ subulatis scabris, foliis ovalibus utrinque acutis cauleque glabris. ♂ In Brasiliâ, loco incerto (Sellow ! in h. reg. berol. n. 121 [568] et 241 [568]!). Differt a reliquis inflorescentiæ (circiter tripolicari), pedunculo 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longo rhachibusque pubescenti-scabris, ramis (geminis solitariis) 2-3 parium decrescentibus oppositis patentibus ipsis transmedium trifidis ramis brevibus, apice longiore racemoso secundiforo. Caulis 1-2-pedalis, subsimplex, fere omnino glaber, inferne teres, erectus, cortice fusco. Folia cum petiolo 5-6 lin. longo 3 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, rigidiuscula, nitida, in secco non nihil repanda. Flores haud raro alternatim gemini solitarii. Corolla 7-8 lin. longa, recta, rnbra?, labii inferioris laciniaæ lanceolatis obtusis æqualibus tubo brevioribus. (v. in h. berol.)

14. S. *DECIPiens*, herbacea, spicâ terminali compositâ trifidâ longe pedunculata glanduloso-pubescente, floribus oppositis sessilibus, bracteis bracteolisque e basi latiore subulatis his calyce duplo brevioribus, calycis laciniaæ subulatis, foliis subsessilibus ovatis ovato-oblongis apice attenuatis basi obtusis, supra pilis raris adspersis, margine praesertim basin versus petioloque brevissimo ciliatis. ♀ Supra Rio Grande in regno Mexicano (Ehrenberg ! in h. gen. berol. specimen 1). Rhytidlossam pectoralem refert, sed floris et fructus structura generis Schaueriæ characteres exhibet. Corolla  $\frac{5}{4}$  lin. longa, pallida. (v. in h. berol.)

15. S. *GONYOSTACHYA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 106), spicis axillaribus terminalique, bracteis subulatis calyce brevioribus, bracteolis exiguis setaceis, foliis ovali-oblongo-lancolatis utrinque attenuatis suborenatis glabris. ♂ Ad Ilheos et viam Felisbertiam Brasiliæ, Januario (Max. princ. Wied. in h. Mart.!), in Brasiliæ loco non designato (Sellow ! in h. reg. berol. n. 152 et 279!), in silvis prope Castel-Novo, Novembri (h. acad. petrop. n. 560!). Frutex quinquepedalis, apicem versus plus minus pilosus, subinde rubiginoso-hirtus. Folia 4-5 poll. longa, utrinque lineolis parvis elevatis dense inspersa, basi plus minus cuneata in petiolam brevissimum desinentia. Flores quadrifarii, conferti, dentibus angulorum rhacheos inserti, plane sessiles. Bracteæ ovalo-subulatae, serrulato-ciliatae, calyce glabro linea paulo longiore profunde 5-fido duplo breviores. Corolla 4 lin. longa, viridi-alba, glabra. (v. in h. Mart., berol., petrop.)

*spicis axillaribus terminalique densis.* — *Justicia gonystachya* N. et M. in nov. act. nat. cur. 11 p. 52, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 269. (v. in h. princ. Wied. et Mart.)

16. S. SCHOTTII (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 107), spicæ in caule ramisque terminali densâ glanduloso-villosâ, bracteis bracteolisque subæqualibus oblongo-lanceolatis aoutis calyce duplo brevioribus, foliis oblongis acuminatis basi cuneiformi in petiolum longe recurrentibus subrepandis glabris ad costam subtus strigilosis, corollæ ringentis tubo brevissimo.  $\delta$  In silvis inter Paraiba et Canto Gallo, circa Aldeam do Padre et in Serrâ d'Estrellâ Brasiliæ (Schott! in h. mus. palat. vindob. n. 4723!). *Justicia Schottii* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 4223! *Caulis fruticosus* trichotomus, bifidus, nodosus, inferne teres, lævis, glaber et pallidus, superne subtetragonus plus minus hirtus, ad genicula compresso-acutangulus. Folia cum petiolo oirciter pollicari 5-7 poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, mollia, margine scabra, subtus ad costas ferrugineo strigoso-sericea, lète viridia. Spicæ 3-4-pollicares, maximam partem densa, pilis mollibus glandulosis omnium partium viscidæ. Corolla alba?, extus pubescens, 4 lin. longa; tubus vix lin. 1 longus, cylindricus; limbus bilabiatus, labio superiore coucavo parum decurvo, cæterum inferioris labii lacinii subconformi pauloque latiore oblongo-lanceolato obtuso, labii inferioris tripartiti lacinias lanceolatis obtusis recurvis subæqualibus. (v. in h. vindob. et Hooker).

CVII. PACHYSTACHYS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 99.  
— *Justiciae spec. Linn.*

Calyx profunde quinquefidus, brevis, lacinia superiore sæpe angustiore. Corolla ringens, tubo brevi in fauces obconicas inflatasve subincervas transeunte, labio superiore angusto concavo apice bilobo, inferiore lato trifido laciniiæ æqualibus (oblongis ovatis). Stamina fertilia duo, corollam æquantia; filamenta ab origine ex apice tubi brevissimi libera, ad basin vel dente patente, secundi paris rudimento, prædicta, vel nuda; anthera bilocularis, profunde sagittata, loculis æqualibus muticis. Stylus filiformis; stigma obtusum? Fructus.... — Herbæ vel suffrutices Americanæ tropicæ polyphylli, foliis grandiusculis petiolatis mollibus sæpe lète viridibus. Spica terminalis, densa. Bracteæ latæ, herbaceæ. Bracteolæ nullæ, quarum loco callus utrinque ad basin calycis brevissimus. Flores verticillato-terni-quaterni, omnino sessiles rhachique crassæ angulatæ basi subimmersi. Corolla speciosa, purpurea vel lutea.

1. P. RIEDELIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 99), glabra, foliis ovali-oblongis a medio ad basin cuneato-angustatis ipsâ basi obtusa, bracteis oblongis exquisite acuminatis basi longe attenuatis.  $\mathcal{U}$  Villa de Borba in Brasiliâ (Riedel! in h. acad. petrop.), in némoribus prope Pozuzzo (Ruiz!), in Guianâ Gallicâ (Melinon! in h. mus. paris. n. 263). *Justicia spicata* R. et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 8 t. 9 f. a. (ex specim. h. reg. berol. nam icon potius ad P. coccineam pertinere videtur). Folia cum petiolo pollicari 6 $\frac{1}{2}$ -7 poll. longa, 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. lata, acuta, vix repanda, utrinque viridia. Spica terminalis subsessilis, triplicaris, ovalis, densa, multiflora. Rhachis glabra. Bracteæ oblongo-rhombicæ, 9 lin. longæ, margine scabré, virides. Calyx vix lineâ longior. Corolla fere pollicaris. (v. in h. petrop., Ruiz, vindob., paris. et ex eo in h. Nees.)
2. P. COCCINEA, glabra, foliis lævibus ovali-oblongis acuminatis basi acutis, bracteis oblongis exquisite acuminatis basi brevi spatio attenuatis.  $\mathcal{U}$  In insula Cayennæ et prope montem Curu Guianæ Gallicæ ad rivos (Aublet! Perrottet! n. 204 in h. D. C.), Mojabamba (Mathews! n. 1537 in h. Hooker). *Justicia coccinea* Aubl! guian. 1 p. 10 t. 3, Smith ic. pict. 2 p. 8 t. 8, Vahl symb. 3 p. 6, en. 1 p. 121 et h.!, Willd. sp. pl. 1 p. 86, ed. Dietr. 1 p. 368,

- h.! n. 361 (planta hortensis foliis latis et brevibus). Differt a P. Riedelianæ foliis et bracteis basin versus minus attenuatis calycisque lacinii angustioribus et longioribus. (v. in h. DC. et Hooker).
3. P. LATIOR, glabra, foliis subtilissime elevato-punctulatis ovalibus brevi-acuminatis basi obtusis, bracteis ovalibus setaceo-cuspidatis in petiolum latiusculum attenuatis. In Guianâ (Parker! in h. Hooker). Folia cum petiolo sesquiplicari 7-8 poll. longa,  $3\frac{1}{2}$ - $3\frac{3}{4}$  poll. lata. Bractæ  $\frac{1}{4}$  poll. longæ, ultra medium 4 lin. latæ. Corolla ut in P. coccinea. An hujus var.? (v. in h. Hooker).
  4. P. ASPERULA, glabra, foliis utrinque lineolato-asperulis ovato-oblongis basi obtusis acumine apicis brevi et obtusiusculo, bracteis oblongo-ovalibus argute acuminatis.  $\delta$  Trinidad (Lockhart! in h. Hooker et Bentham). Justicia coccinea h. Willd.! n. 361 (spec. ex hort. bot. berol.). Justicia pulcherrima var. spicata? B. dc Sch.! in h. Hooker. Justicia carnea? h. Hooker! Differt a P. coccinea non modo ebaracteribus supra adnotatis, sed etiam corollâ fauces versus magis inflatæ et itaque ad speciem breviorae. (v. in h. Hooker et Bentham).
  5. P. LUTEA, glabra, spicâ terminali subcompositâ densâ brevipedunculatâ, bracteis membranaceis ovatis, infimis subcordatis acutis quadrifariis puberulis, bracteolis lanceolato-spathulatis acutis calycem tenuem æquantibus apice subdenticulatis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subsessilibus costis subtus pubescentibus, floribus luteis.  $\delta$  Ad Chicolaya Peruviæ (Ruiz! in h. gen. berol.), Lamas (Mathews! n. 1538 in h. Hooker). Justicia lutea fl. peruv. cum ic. edenda n. 345, Ruiz! l. c. et h. Willd.! n. 360. Folia basi mediocriter cuneiformi-attenuata; inferioria denique basi in petiolum brevissimum obtuse desinentia, summa plane sessilia. Fructus latet. Stigma crassiusculum, bilobum. (v. in h. Ruiz, berol. et Hooker).
  6. P. NUTANS, pubescens, spicâ in ramis terminali sessili brevi densâ nutante, bracteis membranaceis ovatis cuspidulato-mucronatis ciliatis, bracteolis linearisubulatis calyce brevioribus, foliis ovatis apice attenuatis obtusis basi brevi acutâ in petiolum mediocrem desinentibus in costis subhirsutis floribus brevibus.  $\delta$  Barranca del Rio de Tolima prope las Ajuntas ad Caracol in Mexico (Ehrenberg! n. 1060 in h. gen. berol.). Caulis gracilis, ramosissimus. Folia 12-14 lin. longa, petiolo 3-4-lineari. Bractæ pallidæ. Flores videntur purpurei. Soli P. luteæ est similis. (v. in h. berol.)

XCVIII. PHLOGACANTHUS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 99, Lindl.  
intr. ed. 2 p. 285. — Justiciæ spec. Rozb. et Wallich.

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla oblique bilabiata; labio superiore latiore et longiore bifido, inferiore trifido; tubo trigono. Stamina duo. Anthæ biloculares, loculis parallelis contiguis, demum hastato-divergentibus muticis. Stigma simplex, acutum. Capsula compressa, bilocularis, loculis superius tetraspermis. — Folia supra minute papulosa. Racemus terminalis vel lateralîs, simplex vel triplex spiciformis, floribus verticillato-quaternis, bractæ communis partialibusque binis conformibus angustis elongatis. Corolla speciosa, lutea aut fulva.

1. P. CURVIFLORUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 99), caule erecto quadrangulari strigoso-tomentoso, foliis amplis ellipticis utrinque acutis repando-dentatis glabris, corollâ elongatâ.  $\delta$  In montibus Sillet (Wallich! et Guil. Gomez!), Kharrya (Griffith! in h. Hooker). — Bot. mag. t. 3780. Justicia curviflora Wall. pl. as. rar. 2 p. 9 t. 112, cat. n. 2429 a, b. Speciosi generis planta speciosissima. Caulis crassus, obtuse quadrangularis lateribus concavis, articulatus, strigoso-tomentosus. Folia sesquipedalia-pedalia, 6 pollices lata, in petiolum longum compresso-tetragonum basi angulosum decurrentia, supra tuberculis exiguis sparsis nec confertis asperula. Costa media subtus valde prominens. Thyrsi in caule et ramis terminalis e dichotomâ, 4-8 poll. longi, in vegetioribus pedales, stricti. Rhachis acutangula, tomentoso-scabra, uti et

pedunculi et calyces. Pedunculi breves, rigidi, bifidi, triflori, vel in majoribus fasciculato-pluriflori. Bractæ linearis-acuminatæ, scabré, pedunculo communis adnatae; pedicelli laterales bracteolis duabus ejusmodi brevioribus; intermedium 3-4 lin. longus, ebracteatus. Calyx campanulatus, ad quinquefidus. Corolla bipollucaris, pubescenti-tomentosa, lutescenti-rubicunda, crassiuscula; tubus cylindraceo-conicus, modice incurvus; limbus tubo sextuplo brevior. Capsula clavata, quadrangularis, sessilis, acuta, ultra pollicem longa, glabra. (v. in h. Wallich et Hooker et cult.)

2. *P. TUBIFLORUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 99), caule erecto tetragono superne pubescenti-scabro, foliis ampliis ellipticis utrinque acutis subrepandis subtus pubescens, racemo thyrsideo, corollæ brevi. ♂ In Indiæ montibus Camrupæ ad Gualparam (Hamilt.!), Assam, Khassyâ (Griffith! in h. Hooker). Justicia tubiflora h. Hamilt. Wall. cat. n. 2428. Quod ad partes inferiores similis *P. curviflora*, differt autem caule non strigilosus, sed inferne glabriuscule punctulato-aspero, superiora versus bifarium pubescenti-hirtulo, foliis ratione longitudinis latioribus, ubi pedalia (cum petiolo plus quam tripllicari) 4½-5 poll. latis, utrinque brevi-acutatis nec basi cuneatim attenuatis, perfecte ovalibus obsolete repandis subtus pubescenti-hirtis, ante omnia autem floribus paucis 4-5 lin. longis in thyrsum terminalem densum (4-10 poll. carem) confertis, ramulis tbyrsi omnibus plurifloris. Omnes inflorescentiae partes pubescenti-subtomentosæ, glandulosæ. Bractæ et bracteolæ subulatæ, parvæ. Pedicelli lineam, calycis segmenta sesquialteram longi, lacinias subulatis. Corolla dense tomentosula et viscida. Capsula pollicaris, cylindraceo subclavata, incurva. (v. in h. Wall. et Hooker).

3. *P. angustifolius*, foliis oblongis basi magis cuneatim attenuatis, pedicellis calyce duplo longioribus. — Assam (Griffith! in h. Hooker). — Planta fructifera. Præter folia basi magis attenuata vix differt. Pedicelli probabilitate maturante fructu inveniuntur. (v. in h. Hooker).

3. *P. THYRSIFLORUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 99), caule erecto novello quadriquetro, foliis oblongo-cuneiformibus integerrimis glabris, raccemo elongato. ♂ In Bengaliæ interiore, Januario et Februario floret fructumque maturat Martio et Aprili, in silvis Mithilæ et Maghadæ, Maluny (Hamilt.!), in montibus prov. Sillet (F. D. et Guil. Gomez!), in montibus Napalæ (Wall.), in Oude (idem !), in montibus Sivalensisibus prope Hurdwar in ripis rivulorum, Martio (Edgeworth!), Assam (Griffith! in h. Hooker). Justicia tbyriflora Roxb. fl. ind. or. ed. Car. et Wall. 1 p. 116 n. 2, R. et Scb. mant. 1 p. 131, Willd. sp. pl. ed. 2. 1 p. 370 n. 13, Spr. syst. p. 73, Wall. cat. n. 2430, a-f. Carey! in h. Hook. et Arnott. Jacquemont! in h. mus. paris. n. 189; Justicia thyrsoides Roxb.! in b. Willd. n. 348. Capsula columnaris, quadrangularis. (v. in h. Wallich, Hooker, etc.)

4. *P. GUTTATUS* (N. ab E. in Wall. pl. as rar. 3 p. 99), caule basi procumbente, dein erecto quadrangulari, foliis oblongis repando-crenatis glabris, racemo abbreviato. ♂ In montibus Punduanis prov. Sillet Dec. et Jan. (F. D.!). Justicia guttata Wall. pl. as. rar. 1 p. 24 t. 28, bot. reg. t. 1334? Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1. p. 371. n. 17. Fruticulus humilis, pedalis et bipedalis, a basi procumbens, apice adscendens, lignosus, ramis articulatis nodulosis, cicatricibus foliorum semilunaribus juncturisque repandis inæqualis, projecturis foliorum angulatus, cortice albo glabro vestitus, lenticellis distantibus prominentibus ovalibus verruculosis. Folia 3-4 parium opposita, 5½-6 poll. longa, 1½ poll. lata, supra punctulato-asperula obscuræ viridia, subtus pallide viridia. Racemulus terminalis, 1½-2 poll. longus, pubescenti-scaber, brevipedunculatus. Flores oppositi, inferiores terni, superiores solitarii. Bractæ et bracteolæ subulatæ, calyce breviorcs. Calyx 2½ lin. longus. Corolla ad labii superioris apicem 4-6 linea longa, subcoriacea, dense glandulosæ-pubescentis, alba, guttis purpureis transversalibus picta. (v. in h. Wallich.)

5. *P. ASPERULUS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 99), caule novello quadri.

quattro angulis denticulato-exasperatis, foliis elliptico-oblongis longe acuminatis glabris. ♂ Hort. bot. calc. e Silhet (Wallich!), Assam, Mergui (Griffith! in h. Hooker). *Justicia asperula* Wall. hort. b. calc. cat. n. 7171, bot. cab. t. 1681. *Justicia hedyotidifolia* Wall.! in h. Heyn. cat. n. 2450 ex parte (1). *Justicia quadrangularis* Hooker bot. mag. t. 2845. A P. thyrsiflora et curviflora differt: caule ad angulos asperrimo, foliis minoribus  $3\frac{1}{2}$  poll. longis pollicem latis in longum acumen productis basi acutis sed minime cuneiformibus ellipticis vel oblongis, spicâ terminali pollicari vel sesquipollicari solitariâ ad basin foliosâ et interrupâ, interdum divisâ, bracteis brevibus, corollis circiter 3-4 lin. longis. Reliqua congenerum. Folia supra punctulato-aspera, osterum glabra. Flores lutei vel aurantiaci. (v. v. c. et s. in h. Wallich, Griffith et Hooker, item spec. orig. ex hort. bot. glasgov.)

**XCIX. LOXANTHUS N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 99, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 704, Meisn. gen. p. 296 (204).**

Calyx quinquepartitus, æqualis, brevis. Corolla tubulosa, incurva, coriacea, limbo oblique quinquelobo, laciniâ inferiore paulo profundius divisâ. Stamina fertilia duo; antheræ biloculares, loculis parallelis; stamina sterilia parva ad basin fertilium, subulata. Capsula a basi polysperma. — Frutex Indicus. Thyrsus terminalis, pedunculis bifidis minute bracteolatis ut in Phlogacantho.

L. GOMEZII (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 99, Wall. cat. n. 7170).  
 ♂ In montibus prov. Sillet (Guil. Gomez!), Mergui (Griffith! in h. Hooker). Frutes speciosus. Rami tetragoni, glabri. Folia oblonga, cuneiformia, integerrima, glabra 10 poll. et ultra longa, 3 poll. lata, acuta, nec lineolata nec tuberculata, nitida. Petioli pollicares. Thyrsus 3-4 pollices longus, densus, tomentosus. Rhachis crassa, tomentosa. Pedunculi oppositi, breves, tomentosi, inferiores triflori, superiores uniflori. Bractea communis pedunculo paulo longior, linearis-subulata, tomentosa, adpressa. Bracteola ad basin pedicellorum duæ, alternae, exiguae, denticuliformes. Pedicelli lineam longi, tomentosi. Calyx longitudine pedicelli, campanulatus, ad medium quinquefidus, tomentosus, laciniis æqualibus lanceolatis acutis. Corolla  $\frac{2}{3}$  poll. longa, coriacea, incurva, tubulosa, dense tomentosa, lutea? Limbus obliquus, quinquefidus, laciniis brevibus ovatis obtusis æqualibus, quarum quatuor superiores in galeam connivent, inferior paulo profundius dehiscit. (v. in h. Wallich et Hooker).

**C. DUVERNOIA E. Meyer cat. pl. Drèg. a. 1837.**

Calyx brevis, campanulatus, 4-fidus, laciniâ superiore latiore bidentata. Corolla ringens, coriacea, labio superiore compresso incurvo margine, præsertim apice, membranaceo emarginatoque, inferiore trisido, laciniâ mediâ latiore. Stamina duo; staminum sterilem rudimentum figurâ lineâ callosâ hirsuta a basi filamentorum fertilium versus galeam adscendentia, corollæ adnata, quinti rudimentum brevius; antheræ biloculares, loculis parallelis contiguis in connectivo lanceolato secundis multicis altero paulo altiore. Stigma obtusum, subumbilicatum. Ovarium ovatum, hirsutum, 4-ovulatum?, annulo lato nectarifero cinctum. Fructus latet. — Frutex? promontori Bonæ Spei, habitu Phlogacanthi, a quo genere Duvernoia differt calyce haud æqualiter quinquepartito et spicis axillaribus. Caulis crassus, obtuse quadrangularis, cum foliis glaber. Folia 7-9 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  poll. lata, oblonga, acuminata, basi cuneiformi in

(1) Altera hujus nominis et numeri planta est *Rostellularia hedyotidifolia*.

petiolum decurrentia, subcoriacea, margine repanda, lineolata. Spicæ axillares, oppositæ, pedunculatae, foliaceo-bracteatae pollicares, squarrosæ, pedunculo 2-2½ poll. longo. Bracteæ lanceolatae. Bracteolæ linearis-patulatae, calyce longiores. Flores oppositi solitarii vel glomerati terni, tribracteolati. Calyx 3 lin. longus, late campanulatus, velutinus. Corolla pollicaris, purpurea velutina. Stamina exserta, filamentis glabris.

D. ADHATODOIDES (E. Meyer 1. c.). ♂ In promont. B. Sp. (v. in h. Drèg. et gen. berol.)

CL. THYRSACANTHUS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 97. — Odontonema N. ab E. in Linn. 16 p. 300. — Poeciloenemis multiflora Mart. in h. reg. monac. (nec obs. p. 1059, quæ Geissomeria circinnata). — Justiciae spec. auctt.

Calyx ultra medium quinquefidus, æqualis, brevis. Corolla tota tubulosa vel apicem versus dilatata, incurva, mollis, limbo vel quinquelobata subregulari, vel distinctius bilabiato, labio superiore bifido, inferiore trifido. Stamina fertilia duo; antheræ biloculares, ovales, loculis parallelis, connectivo oblongo subobliquo discretis. Stamina sterilia subulata, uncinata, capitatave ad basin fertilium, vel nulla. Stigma bidentatum. Capsula a basi ad medium depressa sterilisque, hinc bilocularis di-tetrasperma. Semina retinaculis suffulta, discoidea. — Herbae vel frutices Americanæ tropicæ, cortice lœvi laxo colorato, foliis amplis cuneato-sessilibus aut in petiolum attenuatis. Thyrsus terminalis, modo densus, ramis brevibus cymosis (fasciculis) oppositis verticillos referentibus, modo laxior in racemum simplicem abiens. Bracteæ et bracteolæ parvæ. Flores longiuscule pedicellati, coccinei.

### § 1. *Corolla subregularis, tubulosa, fere Geissomeria, coccinea. — Folia tenuia.*

1. T. BARLERIOIDES (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 97), herbaeus, pubescens, thyrsi subsessilis verticillis approximatis, corollâ tubulosâ subæquali. ♂ In silvis ad Præsidium S. Joannis Baptiste prov. Minarum Generalium, Aprili et Augusto (Martius!); (Schott! in h. imp. vindob.); Mato dos Puris et Engenho das Puntas in Brasiliâ (Sellow! in h. gen. berol. n. 41, 199 et 201); ad rivulos in montibus Serra Montiquira, Maio (Riedel! in h. acad. petrop.). Justicia barlerioides Schott! in h. imp. vindob. n. 4722 cum iconi (malâ, si demis figuram rami florentis integrâ). Poeciloenemidis spec. Mart. Caulis erectus, strictus, succulentus. Folia 6-9 poll. longa, 1½-3 poll. lata, sessilia, apice brevius attenuata, acuminæ arguto. Thyrsus terminalis, 2-7 poll. longus, multiflorus, densus, basi interruptus. Bracteæ semipollricates, lanceolatae, subulato-acuminatae, pubescentes, inæquilateræ. Fasciculi in singulæ bracteæ axillâ gemini, interiore præcociore, seu potius cyma subsessilis bipartite ramis inæqualibus cum flore intermedio præcociore, in universum 10-12-flora. Bracteolæ singulæ ad basin pedicellorum, lanceolatae et lineari-lanceolatae, hirtulæ, pedicellis multo breviores. Corolla 1-1½ poll. longa, coccinea, glabra, limbi lobis ovatis obtusis ½. Capsula pollicaris. (v. in h. monac., berol., vindob. petrop.)

2. T. CUSPIDATUS, herbaceus, foliis ovalibus cuspidatis in petiolum brevem cuneatim desinentibus subtus in costis puberulis, thyrsi longe pedunculati verticillis adproximatis pedunculoque pubescentibus, corollâ tubulosâ subæquali. ♂ In umbrosis ad flumen Teapa prov. Tabasco, Decembri (Linden! h. austr. n. 180 in h. Hooker); Serra S. Pedro Nolasco, Talea, etc. (Jürgensen n. 894 et 985 in h. Hooker). Differt a T. barlerioides follis haud in petiolum attenuatis cuspidatis nec acuminatis, fere glabris, etc. Filamenta sterilia recta acuta. Flores rubri. (v. in h. Hooker).

- β.* *micrantha*, corollis minoribus ( $5\frac{1}{2}$  lin. longis<sup>3</sup>), foliis magnis ovalibus basi cuneatâ in petiolum brevissimum desinentibus vel omnino sessilibus. thyro trifido.—Pangoa (Matbews! n. 1196 in h. Hooker). Folia supra confertim punctulato-aspera. (v. in h. Hooker).
3. *T. HOOKERIANUS*, herbaceus, foliis ovalibus longe acuminatis in petiolum brevem attenuatis inæqualiter undulato-crenatis thyrsi longe pedunculati ramosi verticillis inferioribus distantibus pedunculo costisque foliorum subtus pubescenti-scabris, corollâ tubulosâ subæquali.  $\mathcal{U}$  Guayaquil ad Potococha (Hill! in h. Hooker). Foliis apice longe attenuatis nec cuspidatis evidenter crenatis et floribus paulo minoribus (subinfundibiformibus) *T. cuspidato* differt. (v. in h. Hooker).
4. *T. AMPLEXICAULIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 98), herbaceus, pubescens, foliis amplexicaulis thyrsi longe pedunculati verticillis inferioribus distantibus, corollâ apicem versus hinc ventricosâ.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ (Sellow! in h. gen. berol. n. 272 (947), loco natali non accuratus adnotato). Caulis subteres, medullâ amplâ faretus, lœvis, ætate rufo-ferrugineus. Folia oblonga, acuminata acuminè angusto obtusiusculo, basi modice angustato-sessilia et amplexentia, laxe hirsuta, 8 poll. longa et fere 2 poll. lata. Pedunculus terminalis, 6-7 poll. longus, pubescens. Thyrsus angustus. Fasciculi multiflori, bracteolis exiguis subulatis ciliatis interstincti, cum rhachi pubescenti-tomentosi. Corolla  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{3}{4}$  poll. longa, purpurea, tubo brevi, faucibus tumidiusculis in limbum breve abeuntibus; limbi obliqui laciniaæ subæquales, ovatæ, obtusæ. (v. in h. berol.)
5. *T. SESSILIS*, glaber, foliis oblongis acuminatis repando-subcrenatis basi cuneiformi undulatâ sessilibus thyro pedunculato verticillis approximatis, corollâ tubulosâ subinfundibiformi limbo regulari, staminibus sterilibus brevissimis obtusis incurvis.  $\mathcal{U}$  In Columbia (Lobb! in h. Hooker). Verticilli omnes fasciculati, pedicellis calycibusque glabris. Caulis angulatus, glaber. Folia 7 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{3}{4}$  poll. lata. Corolla fere pollicaris, purpurea, glabra, laciinis ovatis obtusis. (v. in h. Hooker).
6. *T. STRICTUS*, glaber, foliis oblongis acuminatis basi acutâ in petiolum brevem attenuatis thyro terminali elongato simplici, verticillis adproximatis adpressis, floribus omnibus fasciculatis, corollâ tubulosâ subinfundibiformi limbo obliquo subregulari, staminibus sterilibus brevissimis subulatis.  $\mathfrak{z}$ ? Honduras (Armstrong! in h. Hooker). Caulis in nostro simplex, elongatus. Thyrsus strictus, pedalis, angustus. Bracteæ subulatæ, ciliolatæ, pedicellos subæquantes. Corolla fere pollicaris, laciinis oblongis acutis,  $\frac{2}{3}$  (v. in h. Hooker).
7. *T. TUBÆFORMIS*, foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ciliatis thyrsis (racemis) simplicibus interruptis, floribus fasciculatis, bracteis lanceolatis ciliatis, corollæ fauce longâ ampliâ limbo patente.  $\mathfrak{z}$  In Esquintla Guatimalæ (Velasquez). Justicia tnbæformis Bertol. florul. guatimal. in nov. comment. acad. scient. inst. bonon. 2 p. 405. Caulis obscure tetragonus, glaber. Folia pilosula præsertim in uevo et venis, breviter petiolata, majora quadri-quinquepollicaria. Racemus terminalis, et laterales oppositi, omnes solitarii, pedunculati, simplices, sessiles, circiter bipollicares. Flores breviter pedicellati, inferiores fasciculati duo-tres, fasciculus oppositus in axillâ bracteæ lanceolato-linearis, valde acuminatae, ciliatae. Calyx quadri-quinqefidus, corollâ multo brevior. Corolla circiter pollicaris, tubo tenui, fauce longâ, successive ampliore, nec tamen valde ampliata, limbo brevi, patulo, labiis subæqualibus, superiore bifido, inferiore trifido, laciiniis obtusis ciliolatis. Stamina duo, antheris oblongis, stylusque corollam subæquant (Bertol.). An forma seu var. *Tl. stricti?*
8. *T. DISSITIFLORUS* (N. ab E. in Endl. et Mart fl. bras. fasc. 7 p. 98), glaber, foliis subsessilibus oblongis acuminatis thyrsi pedunculati verticillis distantibus, staminibus sterilibus nullis, corollæ labiis brevissimis, inferiore parum diverso.  $\mathfrak{z}$  In Brasiliâ (Schott! h. imp. vindob. n. 6120). Differt non modo statim sterilium defectu, sed etiam corollæ laciiniis brevissimis subtriangulari-

bus mucronulatis. Inflorescentiae typus idem omnino qui in Th. barlerioide, sed distractis et productis partibus spiciformis, cum pedunculo 7-8 poll. longo saepe sesquipedalis. Rhachis pubescens. Fasciculi oppositi, distantes. Bractæ et bracteolæ subulatae. Folia in apicibus ramulorum conferta, parium 3-4, 5-7 poll. longa, 1½-2 poll. lata, longe acuminata, nitida. Pedicelli et calyces pubescenti-glandulosi. Pedicelli longiores 3-3½ lin. longi. Corolla pollicaris, sesquipollicularis, incurva, pubescens, coccinea. (v. in h. vindob.)

9. T. SCHOMBURGKIANUS (N. ab E. in Benth. pl. Schomb. Lond. journ. of bot. 1845 p. 636 n. 71 et 157 [110]), ramis subtetragonis angulis levibus, foliis ovali-oblongis cuspidato-acuminatis, racemo terminali elongato longe pedunculato glanduloso-pubescente, floribus distantibus oppositis, inferioribus saepe geminis ternisve secundis, pedicellis recurvatis, corolla tubulosa limbo brevi. ♂ In Guiana Anglicâ (Schomburgk! Parker! in h. Hooker). Differt a praecedente corolla pollicari, limbo fere regulari, lacinia ovatis (?) parum patentibus; reliqua congruunt. Folia in utrâque stirpe argute cuspidata, variant a longitudine spithamæ ad 3 poll. (v. in h. Bentham et Hooker).
10. T. FUCHSIOIDES, ramis tetragonis ad genicula hispidulis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis acumine obtuso margine scabris in petiolum brevissimum undulatum decurrentibus, racemo terminali elongato simplici bifido dove longe pedunculato pubescenti hirto, floribus distantibus oppositis, inferioribus subfasciulatis secundis nutantibus, corollaæ faucibus oblongis limbo subregulari brevi obtuso. ♂ Rio de Hacha (h. Hooker! sem. n. 237). Differt a T. Schomburgkiano floribus minoribus pollice brevioribus (pallidis?), foliis angustioribus. (v. in h. Hooker).

## § 2. *Corolla distincte bilabiata, labio superiore bi- inferiore trifido.*

11. T. BRACTEOLATUS, ramis acute tetragonis angulis asperis, foliis oblongo-lanceolatis thyrsi terminali angusto, corollaæ limbo profunde diviso. ♂ In America meridionali (Jacquin), Novâ Grenadâ (Linden! n. 703 in h. Hooker). Justicia bracteolata Jacq. coll. 3 p. 253 ic. rar. 2 t. 205, Vahl en. 1 p. 128. Odon-tonema lucidum N. ab E. in Linn. 16 p. 300 excl. synon. Justicia lucida Andr. Frutex ramis nodosus tetragonis ad angulos argutos denticulatis inferne glabris, cortice laxo levissimo fulvescente vestitis, apice pubescentibus. Folia longe acuminata, in brevem petiolum desinentia, glabra, lucida, subbulata, 4-6 poll. longa, 1-2 poll. lata. Thyrsus pubescens. Pedunculi inferiores tri- (forsan et pluri-) flori, superiores uniflori, brevissimi. Bractæ lanceolato-subulatae, herbae. Bracteolæ subulatae. Corolla semipollicularis, pubescenti-viscidula, coccinea, bilabiata, labio superiore bifido. Stamina sterilia a basi spatio quodam cum fertilibus connata. (v. c. et s. sp. in h. Hooker).
12. T. INDICUS, ramis acnte tetragonis angulis levibus, foliis oblongo-lanceolatis glabris acuminatis basi attenuatâ in petiolum brevem longe decurrentibus, racemis axillaribus brevibus in terminale plus minus thyrsoidem subsecundiflorum abeuntibus, corollaæ subbilabiatae lacinia brevibus, filamentis sterilibus rectis. ♂ Assam (Mack! et Griffith! in h. Hooker), Khas (Griffith! in h. Hooker). T. bracteolato affinis, differt angulis caulis levibus et corollaæ limbo multo breviore. (v. in h. Hooker).
13. T. VARIEGATUS, caule pubescenti-scabro, foliis ovali-oblongis acuminatis repando-suberenatis in petiolum attenuatis glabris, racemo terminali trifido pubescenti-scabro, floribus fasciculatis oppositis approximatis brevipedicellatis subverticillatis, corollaæ infundibuliformi subbilabiata, labio superiore bipartito, inferiore tripartito lacinia subæqualibus obtusis (nec ut in iconæ Aubletianæ acutis), staminibus sterilibus nullis. ♂ In Guiana silvis (Aublet! Leprieur! in h. DC.) Justicia variegata Aubl. guian. 1 p. 12 t. 4, Vahl en. 1 p. 126, Willd. sp. pl. 1 p. 89, ed. Dietr. 1 p. 373, R. et Sch. syst. 1 p. 147. Habitum accedit ad T. nitidum, sed longe differt jam solâ corollâ minus evidenter bilabiata albâ, lacinia lateralibus labii inferioris cœruleis mediâ croceâ punctis

violaceis. Tubus brevis. Capsula longe unguiculata, apice dilatata tetrasperma. (v. in h. DC.)

14. *T. CALLISTACHYUS*, herbaceus, caule strigilloso-pubescente glabrescente, foliis ovali-oblongis cuspidato-acuminatis, thyro terminali simplici basive trifido brachiato, verticillis distantibus, corollâ ringente, filamentis sterilibus uncinatis.  $\mathcal{L}$  Misantlae in imperio Mexicano (Schiede! in h. gen. berol.). *Justicia callistachya* Schlechtend. in Linn. 6. p. 370. Folia 8 poll. longa, 3 poll. lata, cuspidato-acuminata, in petiolum hrevem decurrentia, repanda, glabrescentia, tenuia. Thyrsus angustus,  $\frac{1}{2}$  ped. altius. Fasciculi ferrugineo-hirti vel saltem puberuli 3-7-11-flori. Corolla fere pollicaris, purpurea, glabra, tubo longiusculo recto; labium superius angustum, integrum. (v. in h. berol.)

$\beta$ . magis glabrescens, thyro breviore simplici, foliis amplioribus. — Papantla (Schiede! l. c.) Schlechtend. in Linn. l. c.; Mirador in prov. Vera Cruz, Martio (Linden! n. 192 in h. Hooker). (v. in h. berol. et Hooker).

$\gamma$ . *amplus*, caule glabro, foliis rigidioribus inferioribus sessilibus late ovatis, bracteis calycibusque paulo minus hirtis thyro magno trifido. — In Cordillerâ Vera Cruz alt. 3000 ped. locis præruptis, Decembri (Galeotti! n. 926 in h. Hooker); Mexico (Claussen! n. 277 et 407 in h. Hooker). Flores rubri; in var.  $\beta$  rosei ex Linden. (v. in h. Hooker).

15. *T. LINDENIANUS*, herbaceus, foliis ovalibus cuspidatis glabris subtus in costis scabris, inferioribus in petiolum cuneatim decurrentibus, summis sessilibus latioribus, bractealibus inferioribus subtrotundo-cuspidatis verticillo longioribus, superioribus obsoletis thyrsi pedunculati simplici angusti verticillis discretis pedunculoque puberulis, floribus brevissime pedicellatis, corollâ bilabiata.  $\mathcal{L}$  Ad Caracas, Aprili (Linden! n. 356 in h. Hooker). Proximus *T. cuspidato*, sed flores subsessiles, et corolla videtur bilabiata. Distinctus foliis superioribus sessilibus et verticillis florum inferioribus foliaceo-bracteatis. Quod ad habitum *T. callistachyo* magis accedit. (v. in h. Hooker).

16. *T. RUBER*, glaber, caule subtetragono ramoso ramisque oppositis patentissimis lutescenti-canis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, racemo terminali subsessili glabro, pedicellis oppositius distantibus erecto-patentibus, inferioribus subtrifloris superioribus (abortu) unifloris, corollâ bilabiata limbo brevi.  $\mathfrak{z}$  Ad S. Martha in Americâ meridionali (de Rohr! in h. Vahl). *Justicia rubra* Vahl ecl. 2 p. 1, en. 1 p. 149 et h.l., Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 373. Similis *T. Schomburgkiana*; differt foliis angustioribus, caule patentii-ramoso brachiato, racemo glabro sessili rel. Corolla pollicaris. Anthereæ ciliolatae. (v. in h. Vahl.)

17. *T. LONGISTAMINEUS*, herbaceus, caule glabro, foliis ovalibus acuminatis basi cuneatâ sessilibus glabris costis subtus hispidulis, thyrsi terminalis pedunculati decompositi puberuli rams cymosis inferioribus magis distantibus, corollâ bilabiata faucibus inflatis deorsum glbis, labii inferioris laciniis brevibus ovatis obtusis conniventibus, staminibus styloque longe exsertis.  $\mathcal{L}$  In Peruviaë Andium *Pillaensium* nemoribus ad Pampamarca, Octobri, Novembri (Ruiz! in h. gen. berol.). *Justicia longistaminea* R. et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 8 t. 10 f. a., Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 377. *Justicia staminea* Vahl en. 1 p. 127. Planta tripedalis. Folia ampla. Corolla digitalis, labio superiore angustiore integro, iuferioris laciniâ mediâ angustiore. (v. in h. Ruiz. et berol.)

18. *T. INTERRUPTUS*, fruticosus? caule pubescenti-scabro, foliis oblongis utrinque modice attenuatis apice obtusis basi acutis petiolatis glabris in costis pubescenti-scabris, racemo terminali simplici pubescente, floribus distantibus, inferioribus ternis oppositis superioribus oppositis brevipedunculatis, corollâ bilabiata, labio superiore profunde bifido, staminibus imperfectis deficientibus.  $\mathfrak{z}$  In Novâ Granadâ prope S. Ana, Septembri (Humboldt). *Justicia interrupta* Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 232, Kunth syn. 2 p. 30, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 368, h. Willd.! n. 364. Accedit ad *T. nitidum*, sed differt foliis apice multo minus attenuatis, thyro minore paucifloro, calycibus majoribus, corollis minoribus.

Folia bipollucaria. Verticilli inferiores 6-flori, abortu 4-2-flori, reliqui omnes biflori. Bractæ lincares, hirtæ, pedicello longiores. Calyx 2 lin. longus, laciniis subulatis hirtis. Corolla 6 lin. longa. (v. in h. Willd.)

19. T. **NITIDUS**, fruticosus, glaber, foliis oblongis nitidis subcoriaceis, thyrsi terminalis ramosi compositi verticillis confertis, corollâ bilabiata. ♂ In Indiæ occidentalis insulis.

α. foliis acuminatis. — In ripâ torrentum insularum Martinicæ (Jacquin), Jamaicæ (Sloane, Swartz, etc.), St. Crucis, Guadeloupe (Isert ! in h. Schmid, Perrottet, Balbis, Krauss etc. in h. DC.), Cube (de la Ossa ! in h. DC.); St. Lucia (Anderson), Antiguæ (Nicholson ! in h. Hooker), St. Vincent (Guilding ! in h. Hooker), Montserrat (Ryan). Justicia nitida Jacq. americ. p. 5. Swartz prodr. p. 13, fl. ind. occ. 1 p. 26, Vahl symb. 2 p. 5, en. 1 p. 127 et h. ! (specimen Kyan.), Willd. sp. pl. 1 p. 88, ed. Dietr. 1 p. 374 et h. ! n. 365, Sieb. fl. martin. n. 251, fl. mixt. n. 400 et 401 (in h. acad. petrop.!). Justicia bracteolata Willd. en. hort. berol. p. 26, h. gen. berol. (neo Ruiz). Sloane hist. jam. 1. t. 10 f. 2. (v. in h. DC., Hooker etc.)

β. foliis salticm superioribus, obtusis. — In Guadeloupe (l'Herminier ! in h. Mus. paris. n. 287 !). Thyrsus constat e fasciculis geminis ternis oppositis brevipedunculatis multifloris bracteis brevi subulatâ suffultis, apice tri-quadrifidis ramulis 3-4-floris brevissimis bractcolis brevibus ovato-acuminatis ciliatis imbricatis vestitis. Pedicelli nudi, 3-4 lin. longi. Calyx vix lineâ longior. Corolla semipollucaris. Stamina duo. Staminum sterilium loci hirsutiem inveni (v. in h. paris.).

γ. racemo abbreviato thyrsoideo. — In Guadeloupe (Perrottet ! in h. DC.).

20. T. **RAMOSISSIMUS** (Moric. pl. nouv. Amer. p. 165 t. 96, N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 98), fruticosus, trichotomo-ramosissimus, glaber, caule ramisque teretiisculis striatis, foliis ovato-lanceolatis obtusis subsessilibus thyrsulis in ramis terminalibus parvis scabris compositis, corollâ bilabiata limbo brevi, staminibus sterilibus nullis. ♂ In silvis cœduis jugi Serra de Acurua prov. Bahiensis (Blanchet ! in h. mus. palat. vindob. Moricand ! Bentham ! Hooker ! n. 2893, eodenique in h. reg. berol. n. 2843). Caulis ad nodos foliorum basibus residuis bidentatus neque inflatus; ramuli novelli pubescenti-scabri subincani sicuti et omnis inflorescentia. Folia primaria caulis cito perent, ramea 8-9 lin. longa, infra medium 4 lin. lata, basi et apice obtusa utrinque punctata et subtus ad costam substrigosa, ceterum glabra, nitida; rami costales debiles, venosi. Thyrsus vix pollucaris, basi trifidus ramis secundifloris, apicem versus subsimplex. Bractæ subulatæ, alterâ sterili. Pedicelli calycis fere longitudine, in medio bracteolis duabus oppositis subulatis parvis stipati. Calyx ad medium usque quinquefidus laciniis subulatis. Corolla coccinea, 9 lin. longa; tubus brevis; fauces obconicae, ad basin dorsalem in gibbam parvam tumentes, limbus brevis, bilabiatus, labiis æqualibus, superiore subovato apice bifido, inferiore trifido laciniis conniventibus oblongis obtusis subæqualibus. Stamina sterilia nulla. (v. in h. Moricand, berol., Hooker).

CII. GRAPTOPHYLLUM N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 102, Lindl intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 704, Meisn. gen. p. 296 (204). — Justicia spec. Linn. et autt.

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla ringens, labio superiore recto fornicate margine reflexo, inferiore trifido. Stamina duo. Antheræ bilocularis, incurvæ, sagittatæ, muticæ, loculis parallelis æqualibus. Capsula rostrata, ad basin bilocularis, tetrasperma. Semina retinaculis suffulta. Racemus terminalis racemis axillaribus constructus. Bractæ et bracteolæ parvæ ad basin pedunculorum.

G. HORTENSE (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 285, Wight h. propr. n. 1990), fruticosum, racemo terminali breviovato, bracteolis parvis, foliis oblongis ovatis cuspidatis glabris pectis, tubo corollæ sursum ampliato compresso, laciuiis margine revolutis intus glandulosis. ♂ In Indiâ orientali cultum in hortis, in Patna (Hamilt.), (h. Madras! et h. Wight!), (h. DC. ex h. Lambert., Mergui (Griffith! in h. Hooker), Assam (Mack! ), in insula Java culta in cœmteriis Javanensium (Blume! Junghuhn! Spanoghe! Zollinger! pl. Jav. n. 466 in h. Bentham), insulae Philippinæ (Cuming! n. 500 in h. Bentham, Hooker et reg. berol.). Timor (Gaudichaud! in h. DC. ex h. mus. paris. ), Sarzagon, in insula Manilâ (Haenke! Newmann! in h. Hooker), Nassau in insula Providence, Bahama, an culta? (Mitchill! in h. DC.), St Vincent (Guilding! in h. Hooker), Demerara (cult. Parker! in h. Hooker), Mauritio (h. DC.! ex mus paris. ). Justicia pieta Linn. sp. pl. 21, R. et Sch. syst. 1 p. 149, mant. 1 p. 133, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 380 n. 43 et h. n. 312! (specim. Vahl. et Roxburgh), Vahl symb. 2 p. 14, en. 1 p. 128 et h.! (specim. Lamarck ), Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 118 n. 5, Blume bijdr. p. 784, Blanco fl. philipp. p. 12, Wall. cat. n. 2438 a, f. Justicia nitida N. ab E. in h. Haenk. Justicia Klotschiana Hoffmannsegg! in h. gen. berol. (spec. Klein ex insula Javâ ). Justicia Carayana Newmann! cat. hort. maurit. in h. Hooker, Bot. mag. n. 1870<sup>o</sup> Bot. reg. 1227. Tjude Marum Rheed. h. mal. 6 t. 60. Folium bracteatum Rumph. h. amb. 4 p. 73 t. 30. Puring Javan. Cajo Maas Hoffmannsegg! in h. DC. Variat foliis ferrugineis immaculatis, ex specim. horti calcuttani in h. Hooker. (v. in h. Wallich, Blum., Junghuhn, DC., Vahl, Willd. , Hooker, etc.)

### CIII. CYRTANTHERA N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 99.

Calyx quinquepartitus quinquefidusve, æqualis, laciiniis coloratis tenuibus lanceolatis. Corolla ringens, tubo longo, labiis profunde divisus æquilibus, superiore complicato linear-i-falcato, inferiore elongato-obconico apice trifido, laciiniis brevibus conniventibus, mediâ plerisque angustiore apice complicato-recurvâ. Stamina duo, basi tubi inserta eidemque ultra medium adnata, longitudine labii superioris, apice recurva. Anthera cernua, brevis, bilocularis, loculis antrosum dehiscentibus margine membranaceis in connectivo plerisque semilunari apice recurvo carinato subsecundis, lateribus plerunque arcte contiguis muticis, altero paulo demissiore, subinde connectivo protracto omnino distantibus. Stigma obtuse unilabiatum. Fructus. — Frutices caule valido, foliis amplis latis petiolatis, floribus Aphelandrae magnis at angustis coccineis. Plerisque thyrsus terminalis decompositus, densissimus, multiflorus, speciosus, ramis secundifloris, bracteolisque calyce longioribus plerumque coloratis teneris, illis latoribus.

#### § 1. *Genuinae. — Flores dense thyrsoides, terminales.*

1. C. MAGNIFICA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 100), foliis vel ovatis subdetoideis vel ovali-oblongis basi longe cuneatis longe petiolatis, bracteis bracteolisque lanceolatis acuminatis longe ciliatis calyce duplo longioribus, illis latoribus. ♂ Ad Tejuco? (Schott! in h. mus. palat. vindob. n. 196 et 4744 ex parte). Caulis pluripedalis, quadrangularis, quadrangularis, punctulis elevatis confertis sicut folia utrinque asperulus atque opacus, lineis interstitialibus rubiginoso-sultomentosis sæpe notatus. Folia Heliantho subsimilia, 8-9 poll. (cum petiolo bipanicari) longa, prope a basi 3 poll. lata, apice attenuata et argute acuminata, basi obtusa subinde subtruncata et brevi acumine in petiolum desinentia, margine repanda et irregulariter crenulata. Thyrsus terminalis 4-pollicaris, oblongo-ovalis, floribus multis simul floreibus ornatus; pedunculus 6-8 lin. longus. Thysuli partiales breves, a basi fere

decompositi, apice simplices dichotomo-secundi ( scil. altero ramulo breviore altero continuante). Partes inflorescentiæ omnes viscidulae, purpureæ. Bracteæ inferiores 9 lin. longæ, oblongæ, basi et apice attenuatae; superiores lanceolatae magis acuminate 7-9 lin. longæ pilis patentibus ciliatae. Bracteolæ linearæ, 6-7 lin. longæ. Corolla biplicaris, coccinea, pubescenti-viscidula, recta, ante anthesin subclavata apiceque deorsum nonnihil obliqua. ( v. in h. vindob.)

$\alpha.$ . foliis subdeltaeis. — *Justicia magnifica* Pohl ! ic. in h. mus. pal. vindob. n. 4744.

$\beta.$  *minor*, foliis subovalibus aut oblongo-ovalibus, basi parum rotundata in petiolum longum cuneatim decurrentibus, thyro minore, bracteis oblongo-vel lanceolato-spathulatis, caule evidenter lineato costisque foliorum subtus ab basin rubiginoso-scabris. — In umbrosis prope Semidorio prov. Sebastianopolitanæ Brasiliæ, Martio et Aprili ( Riedel ! in h. acad. petrop.), in monte Corcovado ejusd. prov. a Januario usque in Martium ( Luschnath ! in eod. h. ), Organ Mountains ( Gardner ! n. 583 in h. Hooker ). *Justicia carnea* Hook. bot. mag. t. 3383, Lindl. bot. reg. t. 1397. ( v. sp. et c. in h. Hooker ).

2. C. *AUREA*, foliis ovalibus acuminatis in petiolum longiusculum cuneatim decurrentibus supra pilis brevibus raris adpersis, thyro terminali ramis brevibus decompositis ramulis secundifloris, bracteis bracteolisque subæqualibus lanceolato-linearibus calyce quadruplo longioribus puberulis, antheris rectis.  $\mathcal{U}$  Mexico, in sepiibus pagi Tioselo, Augusto ( Schiede ! n. 75. in h. gen. berol. ! ), Sierra S. Pedro Nolasco Talea, etc. ( Jürgensen ! n. 795 in h. Hooker ). *Justicia aurea* Schlechtend. in Linn. 7 p. 393 et in h. gen. berol. ! Flores aurei. Thyrsus angustior, quam in C. magnifica, ad speciem verticillatus. ( v. in h. berol. et Hooker ).

$\beta.$  *glaberrima*, foliis omnino glabris, bracteis bracteolisque linearibus. — Oaxaca ( h. Moricand ! ).

3. C. *UMBROSA*, foliis ex ovali oblongis basi plus minus cuneatâ in petiolum longum desinentibus utrinque pubescenti-hirtis costisque rubiginoso-subtomentosis, bracteis bracteolisque lanceolatis lanceolatoque linearibus acutis glanduloso-pubescentibus, illis latioribus.  $\mathcal{U}$  In silvis umbrosis prope Chimpacho, Guatemala ( Hartweg ! n. 552 in h. Bentham ). *Justicia umbrosa* Bentham pl. Hartweg. p. 79 n. 552. An var. C. magnifica? Differt imprimis foliis magis pubescentibus, costis validioribus. Caulis quadrangularis lateribus profundis.

$\alpha.$  foliis oblongo-ovalibus.

$\beta.$  foliis lanceolato-oblongis. ( v.  $\alpha$  et  $\beta$  in h. Bentham et Hooker ).

4. C. *SELLOVIANA* ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 101 ), foliis oblongo-lanceolatis brevipetiolatis, bracteis bracteolisque lanceolatis acuminatis longe ciliatis.  $\mathcal{U}$  In Serra do Cubatao Brasiliæ ( Sellow ! in h. reg. berol. n. 42 [1433] n. 96 [1436] et 213 [1434] ). Differt a C. magnifica caule debiliore, foliis 6-7 poll. longis,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{3}{4}$  poll. latis acuminatis basique lanceolato-attenuatis supra sparsim hispidulis, bracteas subæquantibus; reliqua congruant. An varietas C. magnifica? ( v. in h. berol. )

5. C. *CHAMISSONIANA* ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 101 ), foliis lanceolatis longe acuminatis, bracteis bracteolisque lanceolato-linearibus pubescenti-scabris recurvis, antherarum loculis distantibus.  $\mathcal{U}$  In insulâ S. Catharinæ ( Chamiso ! in h. acad. petrop. ). Tota glabra, sola inflorescentia subtilissime pubescenti-scabra. Folia cum petiolo 6-9 lin. longo 6-pollicaria, poll. 1 lata, longe et argute acuminata, repanda, basi acuta. Thyrsuli bipartiti, subsecundi, infimi axillares, reliqui in thyrum terminalem cylindricum densum coentes, erecti. Bracteæ 6-7 lin. longæ, utrinque attenuatae, rectæ aut subrecurvæ; bracteolæ 4 lin. longæ, recurvæ. Calycis laciniae purpureæ. Corolla fere sesquipollucaris, purpurea, viscidio-pubescentia. Filamenta apice valde incurva. ( v. in h. petrop. )

6. C. POHLIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. faso. 7 p. 101), foliis ovato-oblongis ovatis basi curvatum attenuatis in petiolum longe decurrentibus, bracteis obovato-oblongis basi attenuatis acutiusculis obtusis bracteolisque lanceolatis linearibus acutis margine breviter puberulo-setulosovae ciliatis. ♂ Ad Mideiros et centre dos Morros Brasiliæ inter frutices (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 196 et 4744 ex parte), Porto Alegro, Rio Grande, Serra do S. Autonio, Paxiacho do Negro (Sellow! in h. reg. berol. n. 97 [4021] et 252), Tres-Irmãos (idem! ibid. n. 214 [1432]), Praesidio de S. João Baptista Brasiliæ (idem! ibid. n. 254 [B. 1433 o. 490]), in locis humidiusculis Brasiliæ, Octobri (h. acad. petrop.). Similis C. magnifica, differt caule robustiore, foliis amplioribus, longiore petiolo 3-pollicari, e basi leniter rotundata cuneiformi-attenuatis et ad medium petiolum ulteriusque decurrentibus, in utrâque paginâ haud asperulis sed vix lineolatis nitidulis (in var. γ utrinque pubescens velutinis), ramis costalibus 11-12 magis approximatis (margine ut illi crenulatis) inferioribus cum petiolo pedalibus, 3 poll. lati, denique bracteis bracteolisque baud ciliatis sed marginibus tantummodo scabris, neque acuminatis sed breviaentis, bracteisque inferioribus fere obtusis cum mucronulo. Caulis 3-4-pedalis. Calyx paulo firmior quam in C. magnifica. Corolla eadem, sed glabra et vix viscida. (v. in h. vindob., berol., petrop.)

β. obtusior, bracteis obtusissimis evidenter ciliolatis, foliis magis oblongis.

— In h. brasil. monac. absque loco natali (Raven! n. 211 in h. Mart.), in insulâ S. Catharinæ (Chamisso! in h. acad. petrop.). An distincta species? Folia cum petiolo  $1\frac{1}{2}$  poll. longo fere pedalia  $2\frac{1}{2}$  poll. lata, apicem versus valde attenuata.

γ. velutina, bracteis ut in β, foliis ut in α, sed utrinque velutino-pubescentibus. Flores rosei. Prope Rio Grande, Buenos Ayres (Tweedie! in h. Bentham). Jam eximum bortorum est ornamentum; floret toto anno (Tweedie), quod probabiliter ad C. magnifica intendit. (v. in h. Bentham et Hooker).

## § 2. Flores in cymis axillaribus trifidis dispositi, paniculares. Corolla labium superius intus membranis duabus, styli apicem in-cludentibus, longitudinaliter auctum.

7. C. MACRANTHA, foliis oblongis utrinque attenuatis acuminatis cauleque glabris pedunculis axillaribus semel bisve trifidis paucifloris, bracteis bracteolisque parvis linearibus. ♂ In regione temperata ad Ranebo del Palo Hueco in imperio Mexicano (Hartweg). Justicia (gen. nov.) macrantba Benth. pl. Hartweg p. 78. n. 551. Planta speciosa 3-5-pedalis. Folia 6-6 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, in costâ subitus quandoque puberula. Cymæ folio paulo breviore, supremæ sèpè unifloræ. Calyx vix 2 lin. longus. Corolla 2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, purpurea. Corollæ labium superius oblongum, integrum. Fructus latet. (v. in h. Hooker et Bentham).

## CIV. HOVERDENIA.

Calyx profunde quinquefidus, lacinis æquilibus latis longisque coloratis. Corolla ringens, tubo longiusculo cylindrico plicato-sulcate, faucibus brevibus inflatis, labio superiore lato cucullato recto apice integro, inferiore profunde trifido, lacinia mediâ paulo latiore lateralibus obliquis basi paulo angustioribus, palato tumido rugoso. Stamina duo, tubi apici inserta faucibusque brevi tractu adnata, longitudine labii superioris, antheræ biloculares, oblongæ sub medio dorso adfixæ, loculis in connectivo lanceolato parallelis contiguis æquilibus basi muticis. Stylus apice involutus. Stigma capitatum, compressiusculum, leniter bilobum, lobis obtusis. Ovarium annulo cupulari crasso cinctum, oblongum, compressum, glabrum, quadriovulatum, ovoidibus compressis lœvibus. Fructus deest.

— Frutex Mexicanus, speciosus, tomentosus, bracteis purpureis, corollis flavis. Cymæ terminales, opposite, fastigiatæ, ramulisque plerisque abortu unifloris et tum in medio bibracteolatis pedicellos fingentibus. Bracteæ communes late coloratae colore calycis.

Comiti de Hoverden Plencken, Silesio, horticulturæ ejusque cultoribus dilecto, hoc genus dedicatum est.

H. SPECIOSA. ♂ Ad Caracol de Atotonicapa, Januario (Moritz! in h. berol.). Frutex altit. 8-10 ped., totus dense tomentosus et in foliis subglandulosus. Folia ovalia, superiora mucronato-acuta; inferiora obtusa magisque rotundata, basi obtusa. Bracteæ ovales sessiles, bracteolæque oblongæ acutæ et calyces purpurea, pubescensque glandulisque flavis sessilibus micantia. Calyx 6 lin. longi laciniæ lanceolatae acuminatæ. Corolla 14 lin. longa; labii inferioris laciniæ mediæ oblongo-ovali reflexæ. (v. in h. berol.)

CV. CARDIACANTHUS N. ab E. et Schauer en. et descr, pl. mexic. in Linnæa ined.

Calyx quinquepartitus, laciniis æqualibus angustis. Corolla subinfundibuliformis, bilabiata, faucibus oblongis tubo brevioribus, labio superiore angustiore et paulo breviore recto apice integro, inferiore latiore tripartito, laciniis oblongis, mediæ apice emarginatæ. Stamina duo, valde approximata; antheræ cordato-ovatae, loculis in connectivo angusto parallelis contiguis muticis. Stigma obtusum, obsolete bidenticulatum. Capsula a basi ad medium depressa, elocularis, asperma, hinc compressa, ovata, acuminata, bilocularis, juxta originem dissepimenti tetrasperma. Semina cordata, punctulato-aspera, margine denticulata. Retinacula mediocria, vix distantia. Flores axillares sessiles, singuli geminive, oppositi. Bracteolæ linearis-subulatae, calyce breviores. — Suffrutex Mexicanus, ramosissimus, diffusus, totus glanduloso-pubescent, ætate glaber, ramis candidis. Folia unguicularia paulo majora, superiora decrescentia, in adultioribus minora 3-4 lin. longa, cuncta longiusculæ petiolata, ovata ovato-oblonga, obtusiuscula, irregulariter sinuato-dentata, dentibus obtusis (sæpe utrinque ternis), minora integerrima. Corolla purpurea, glabriuscula, 9 lin. longa, labii inferioris laciniis 6 lin. longis 2 lin. latis, mediæ paulo angustiore. Stamina haud exserta. Capsula fere 5 lin. longa, glabra, olivacea, juxta suturam profunde impressa. Semina magna. — Genus soli generi Thrysacantho comparandum, a quo differt figurâ collarâ et antherarum structurâ, tum et inflorescentiâ.

C. NEESIANUS (Schauer in pl. Aschenbornianis l. c. n. 237). ♂ In montosis altioribus imperii Mexicanici (Aschenborn), in Banôs de Atoto el Grande, Decebri (Ehrenberg! n. 681 in h. gen. berol.) (v. in h. berol.)

CVI. JACOBINIA N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 113. — Justiciae spec. Ruiz et Pavon.

Calyx grandiusculus, herbaceus, profunde quinquefidus, laciniis æqualibus acuminatis. Corolla ringens, labio superiore recto oblongo-lineari, inferiore cuneiformi apice dilatato trifido, laciniis subæqualibus oblongis obtusis; palato æquali. Stamina duo, longitudine labii superioris. Antheræ biloculares, oblongæ, basi profunde sagittatae, loculis in connectivo angusto parallelis utroque basi mucronato incurvo, altero paulo demissiore. Stigma capitatum, transversim bilobum, lobis ovatis obtusis arcte conniventibus, inferiore paulo longiore. Capsula a basi usque ad medium fere depressa, plana, (subinde transversim undulato-rugosa), plus minus hinc compressa, bilocularis, ad originem dissepimenti tetra-

sperma. Semina discoidea, calloso-marginata, aliis glabra et lœvia, retinaculis validis truncatis sinuata, aliis tuberculata. — Frutices Americæ meridionalis ramis rectis, foliis subcoriaceis, floribus (*Beloperones*) magnis coccineis luteisve. Pedunculi in angulis foliorum superiorum uni-biflori, aliis spiciferi, vel axillares vel terminales, bracteolis duabus sub flore instructi.

**§ 1. *Bracteolis minimis, antherarum loculis apicem versus omnia in contiguis, utroque basi mucronato.***

1. *J. LEPIDA* (Moricand pl. nouv. Amer. p. 157 t. 92, N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 113), glabra, foliis ovali-oblongis obtusis utrinque punctatis, pedunculis oppositis subunifloris, bracteolis subulatis. In Bahia in silvis Saledade (n. 3279), et in montium jugo Egreja Velha (n. 344) Blanchet! in h. Moricand et in h. reg. berol.). Rami rectinervi. Folia basi acutâ in petiolam brevem desinentia, 3-4 poll. longa, 14-15 lin. lata, supra intense viridia, subtus pallidiora. Petiolus 3-4 lin. longus. Pedunculi plerumque ad apicem rami duo, oppositi, 2-3 lin. longi, plerique uniflori. Bracteola a calyce paulum distantes eodemque multo breviores. Calyx pollicaris, glaber, lacinias lanceolatis acuminatis. Corolla biplicaris. Capsula novem lin. longa, cuspidata, pallida, glabra. (v. in h. Moricand et berol.)

**§ 2. *Antherarum loculis ad apicem usque connectivo angusto discretae, basi obsolete mucronatis minus divergentibus, bracteolis calycem æquantibus eodemque longioribus (1).***

2. *J. SERICEA*, sericeo-albicans, pedicellis axillaribus brevissimis oppositis unifloris, bracteolis linearibus, foliis costatis inferioribus oblongis utrinque acutis, floralibus ovatis, bracteolis linearibus. In aridis et agroribus marginibus Tarmæ et Acobamba et in Cheuchin (Quito), ubi Chucumpa nnocupant (Ruiz et Pavon), in Peruvia (Dombey! in h. paris. n. 242, h. DC.), inter Caxamarquilla et Huanaco Peruvia (Mathews! n. 796 in h. Hooker). Justicia sericea R. et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 9 t. 9 f. 6, Vahl en. 1 p. 120, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 368. Justicia salicina Vahl en. 1 p. 132, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 375. Quod ad habitum similis *Tyloglossæ furcata*, sed primo obtuitu distinguenda integumento sericeo et foliorum ramis costalibus pluribus (5-7) subtus prominulis, costâ validâ. Folia margine saxe plus minus revoluta. Flos J. lepidæ. Calyx minor. Corolla valde pubescens. Staminum alterius paris vestigia hirsuta apparent. Capsula brevis, ovata, parte sterili brevissima. Flores ex superioribus alis oriundi, spicam terminalem subinde producere videntur. (v. in h. Ruiz, DC., paris. et Nees).
3. *J. PUBESCENTS*, sericeo-tomentosa, spicis axillaribus (infra apicem) brevibus brevipedunculatis bracteatis, bracteis foliisque lanceolatis, bracteolis lanceolato-linearibus calyce longioribus. In Peruvia (Dombey! in h. mus. paris. n. 243 h. DC.), Columbiæ (Lobb! n. 80 in h. Hooker). Justicia pubescens Ruiz in h. Willd.! n. 349. Justicia cinerascens Willd. in h! 1. c. Similis *J. sericea*, sed differt evidenter integumento spissiore, foliorum costis minus prominulis, inflorescentia spicata, bracteis foliis similibus at duplo minoribus, corollâ majore 1½ poll. longâ. Variat foliis lanceolatis latioribus et linear-lanceolatis margine valde revolutis. (v. in h. DC., paris. et Hooker).
4. *J. BARLERIOIDES*, caule brachiatum, adulto testaceo cortice tenui laxo, ramis patentissimis, juvenilibus foliis omnique inflorescentia pubescenti-viscidulis, foliis. spicis axillaribus simplicibus terminalique compositâ sessilibus foliaceo-bracteatis, bracteis lanceolatis longe petiolatis bracteolis longioribus patulis, bracteolis valvatim contiguis oblongis obtusis calyce duplo longioribus,

(1) *Tyloglossæ* accedunt hæ species diversæ antheris muticis.

♂ Ad Canade de Supulote in districtu Quitensi (Humboldt). *Justicia straminea* h. Willd. n. 315. Barlieria affinis, floribus flavis. Capsula 4 lin. longa, a tergo modice depressa. Semina tuberculata. Corolla  $\frac{3}{4}$  poll. longa, flava ex Humboldt. (v. in h. Willd.)

6. *J. SULCATA*, caule a basi ramosissimo trichotomo sulcato, foliis infimis ovalibus, rameis lanceolatis sessilibus, omnibus ramisque pubescentibus, spicis in ramis terminalibus brevibus, bracteis lanceolatis sessilibus calyce longioribus, bracteolis calycem æquantibus, corollæ tubo longo angusto, cylindrico. ♂ Rio Parana (Tweedie! in h. Hooker). *Fruticulus humilis*. Corolla 6-7 lin. longa, pallide purpurea ?. (v. in h. Hooker).
6. *J. CILIATA*, caule quadrangulari sulcato juvenili puberulo, foliis lanceolatis acuminate brevipetiolatis glabris, floribus in apice ramorum axillaribus subsessilibus oppositis, bracteis bracteolatis linearis-setaceis longe ciliatis calyce longioribus, corollæ tubo labia æquante. ♂ In silvis montanis prope S. Iago frequens (Tweedie! n. 1261 in h. Hooker). Calyx laciniæ lanceolatae, setaceo-acuminatae, glabrae. Corolla 10 lin. longa. (v. in h. Hooker).

CVII. HARPOCHILUS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 146.

Calyx profunde quinquepartitus vel tripartitus, laciñi latis, superiore ubi tripartitus latiore bifidâ apiceve tridentatâ. Corolla ringens, tubo mediocris, limbo longo, labio superiore linearis-angusto complicato arcuato, inferiore tripartito, laciñi æqualibus angustis, faucibus brevibus inflatis. Stamina duo, basi tubi inserta, labii superioris longitudine et cum eodem decurva. Antheræ bilocularis, oblongæ, loculis in connectivo lanceolato parallelis subcontiguis basi parum inæqualibus submucronatis. Stigma obtuse bilabiatum, labio superiore latiore obtuso inferius bidentulum amplectente. Ovarium annulo glanduloso crasso cinctum. Capsula rigida, a basi ad medium depressa, angusta, asperma, hinc tetra- (abortu di-) sperma. Semina discoidea, orbiculata, laevia, retinaculis longis suffulta. — *Frutices Brasilienses*. Flores vel in cymulis racemiformibus brevibus simplicibus oppositis axillaribus dispositi, in apice caulis thyrsum foliis interstictum singentes, brevipedicellati, subsecundi, vel arcte sessiles, scil. cymulis contractis 3-4-floris, spicam terminalem foliacea-bracteatam construentes. Rhachis compressa, distiche nodoso-dentata, nodis alternis ejusdemve lateris florigeris. Bracteæ inæquales, fertilis parva, pedicellum æquans, quæ ei opposita exigua dentiformis. Bracteolæ ad basin calycis exiguae, subulatae.

1. *H. NEESIANUS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 146), pubescenti-subtomentosus, incanus, calyce 3-4-partito. ♂ In arenosis calidis ad flumen S. Francisci prope Joazeiro prov. Bahiensis, Martio (Martius!) in paludosis ad Ihahira (Blanchet! n. 2884 in h. Moricand). *Justicia Neesiana* Mart. obs. n. 2275. Rami recti, polyphylli. Folia inferiora cum petiolo  $\frac{2}{3}$  poll. longo  $3\frac{1}{2}$  poll. longa, vix 1 poll. lata, oblonga, obtusa, basi acutâ in petiolum desinentia, ramis costalibus senis prædicta, minus quam caulis pubescenti-tomentosa; superiora et ramea minora; floralia unguicularia, fere ovalia. Racemuli a medio apicem versus crebri, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longi, incani, nodis circiter 4 aut 5 totidemque floribus prædicti. Bractea nodo crassiori impedita, 3-2 lin. longa, spatulato-linearis, decidua. Pedicellus vix 1 lin. longus, bracteolis sub flore duabus exiguis dentiformibus. Calyx 6-7 lin. longus, canus. Corolla pallide flava, glanduloso-punctata, pubescens, a basi ad os fauicium 9-10 lin. longa. Capsula fere pollicaris, acuta, venoso-rugulosa, glabra, subfuscata. (v. in b. monac. et Moricand).

- 2? *H. PHÆOCARPOS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 147), caule incano, foliis oblongis glabris, calyce quinquepartito. ♂ Ad flumen S. Francisci, prope Joazeiro in prov. Bahiensis locis herbidis (Martius!).

Caulis tetragonus, pulverulento-incanus, medullâ amplâ. Folla cum petiolo  $\frac{1}{4}$  poll. longo  $5\frac{1}{2}$  poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata. Racemi longitudine folii, incuni, structuræ præcedentis at firmioris; inferiores subsecundi, supremi oppositi vel gemini, subcorymbosi. Flores infimi et supremi oppositi, medii secundi, omnes subsessiles. Bracteæ longitudine calycis, lanceolatæ, obtusæ, patentes, marcescentes. Bracteolæ linearæ, calyce (4 liu. longo) duplo breviores. Calycis lacinia lanoeolatæ. Capsula fere pollicaris, lignosa, tuberculatæ-rugosa, fusca. (v. in h. monac.)

CVIII. DREJERA N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 112.

Calyx subcampanulatus, chartaceo-herbaceus, ad medium usque quinquefidus laciniâ superiore angustiore. Corolla ringens, labio superiore angusto, inferiore latiore ad medium usque trifido laciniis subæqualibus obtusis, palato æquali. Stamina duo longitudine labii superioris incurva. Antheræ biloculares, loculis connectivo medio linearî pellucido diæcretis basi apiceque liberis parallelis æqualibus muticis. Stylus longus. Stigma crassiusculum, fissum. Ovarium basi annulo lato cinctum, a medio 4-ovulatum. Fructus basi aspermus, medio tetraspermus, retinaculis valde approximatis. — Frutices Americani, floribus speciosis. Inflorescentia: spica (vel spicæ) secundifloræ, terminales vel ex axillaribus terminales. Bracteæ et bracteolæ parvæ, calycis laciniis angustiores.

1. D. RAMOSA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 112. t. 17), hirsuta, foliis oblongis acuminatis basi obtusis, calycibus lævibus spicâ terminali subsimplioi. ♂ Allegres in Brasiliâ (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 2944). Justicia ramosa Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 2944. Frutex-patenti-ramosus ramis teretibus hirsutis ætate glabrescentibus rugulosis incanis. Folia cum petiolo bilineari  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 9 lin. lata, remote repandorenata. Spica sessilis, apice recurva, 6-8-flora, adjecta subinde ad basin alterâ breviore. Rhachis hirsuta. Flores secundi. Bracteæ et bracteolæ subulatæ, hirsute, 2 $\frac{1}{2}$  lin. longæ. Bractea altera sterilisque paulo altius sita. Calyx 3 lin. longus. Corolla speciosa, rosea?, pubescens. (v. in h. vindob. et Hooker).
2. D. BOLIVIENSIS, foliis oblongis acuminatis basi acutâ in petiolum brevem desinentibus glabris lucidis spicis axillaribus compositis in terminalem trifido-compositam ramis secundifloris abeuntibus, calycibus glanduloso-asperis. ♂ In Boliviâ prope Chiquitos (Orbigny! n. 786 in h. Mart.), in dumetis apricis prov. Venezuelæ, Martio (Otto! in h. gen. berol. n. 1009), ad Surinam (Hostmann! n. 1123 in h. Hooker). — Justicia . . . d'Orbigny voy. dans l'Amer. mérid. bot. p. . . Caulisteres, glaber, striatus. Spicas tam laterales quam terminalis trifido-compositæ, rhachibus pubescentibus; rami florentes secundiflori. Bracteæ et bracteolæ subulatæ, calyx triple breviores, submentosæ. Calyx minor quam in præcedente, paulo profundius divisus, pubescens et glandulæ sessilibus obsitus. Corolla omnino præcedentis. Capula 8 lin. longa, pubescens pilis recurvis, coriacea, viridis, a medio sursum compressa et juxta basin dissepimenti tetrasperma, retinaculis cujusque lateris valde approximatis suboppositis apice dentatis. (v. in h. Mart., Hooker, berol.)
3. D. WILLDENOWIANA, caule lanuginoso-canescente, foliis oblongo-ovalibus pubescentibus basi acutâ in petiolum brevem desinentibus, spicis axillaribus secundis recurvatis simplicibus bifidisve, rhachi lanuginosâ, calycibus glabris, ♂ Ad Vera Cruz (Humboldt! in h. Willd.). Dicliptera scorpioides h. Willd.) nec Juss. n. 300 (Fragmenta). Labium inferius corolle " integrum " describit b. Willdenow, quod ex specimine non amplius illucet. Cæteram calycis forme et habitus ramuli ad Drejeram genus referre suadent. Calyx minor est quam in dnabus præcedentibus, lineâ 1 paulo longior. Corolla pollicaris, tubo intus ad basin fere ut in S. hirsuto. Antheræ paulo minores, quam in reliquis. Species non omni dubio expedita. (v. in h. Willd.)

## CIX. PLAGIACANTHUS N. ab E. — Justiciæ spec. Ruiz et Pavon. fl. peruv.

Calyx quinquepartitus laciniis æqualibus. Corolla bilabiata labiis æquilateralis, superiore integro, inferiore apice bilobo, palato lævi? Stamina duo, apice tubi inserta. Antherarum loculi oblique unus super altero positi, subcontigui, ovales, mutici, inferiore minore. Stigma bilobum. Capsula depressa, a medio bilocularis disperma. Semina retinaculis suffulta, orbiculata, lævia. — Herba Peruviana, caule quadrangulari, ex opposito alternatim tomentoso-lineato; foliis ovato-oblongis acuminatis apicem versus repando-crenatis e basi rotundata acutiuscule in petiolum brevem desinentibus. Thyrsus terminalis, ramis oppositis brevibus cymoso-bi-tripartitis. Flores brevipedicellati. Bracteæ et bracteolæ calyce breviores et angustiores. Flores purpurei uti et calyces et bracteæ puberuli.

P. RACEMOSUS. 2f In Peruvia nemoribus ad Huancuco (Ruiz! in h. gen. berol.). Justicia racemosa R. et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 9. t. 11. f. b. Vahl en. 1 p. 159. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 396. Bi-tripedalis. Folia 3-3½ poll. looga exquisite acuminata, prope a basi 1-1½ poll. lata. Thyrsus bipaniculatus, pedunculatus. Bracteæ et bracteolæ lineari-subulatae, patentes. Calycis laciniæ coloratae, molles, lineari-lanceolatae, acute, trinerves. Corolla punicea, 9 lin. longa, labiis erectis oblongis. Capsula parva. Semina hinc concava inde convexa. (v. in h. berol.)

CX. RHYTIGLOSSA N. ab E. in Lindl. bot. ed. 2 p. 285 et 444, in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 118. Endl. gen. p. 705. Meisn. gen. p. 296 (205). — Justiciæ spec. Linn. et autt. — Orthotacti spec. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 141.

Calyx quinquepartitus, laciniis angustis subæqualibus superiorive evidenterius minore saltemve angustiore subinde penitus suppressâ calyceque propterea quadripartito. Corolla (tenera) bilabiata, labio superiore angustiore sæpe et breviore bidentulo subornicato, labio inferiore convexo breviter trifido, disco rugoso vel saltem venoso-reticulato, limbo depresso. Stamina duo apici tubi inserta. Antherarum loculi oblique unus super altero positi, subtransversi, discreti, vel contigui, ovales, mutici. Stigma simplex, acutum. Capsula basi depressa, a medio compressiuscula, bilocularis, tetrasperma, raro disperma. Semina retinaculis suffulta, tuberculata. — Plantæ Capenses et Americanæ, tropicae vel saltem plagam temperatam calidiorem amantes, herbaceæ vel suffruticosæ, foliis laxis. Inflorescentia spicata, perraro flores axillares oppositi. Spicæ angustæ, subverticillatae, haud dense imbricatae vel axillares vel terminales solitariae. Flores oppositi, solitarii vel glomerulati, raro alternant secundi, omnino sessiles. Bracteolæ laciniis calycis sæpe similes iisque breviores, plerisque glandulosæ vel pilosæ, raro calyce longiores et latiores. Bracteæ his parvæ bracteolisque similes, aliis majores, late et imbricatae. Corollæ rubicundæ mediocres aut parvæ. Differt a Tyloglossâ antheris muticis, loculis in connectivo parvo tantum contiguis, ipsis parvis, labii inferioris effiguratione alia; a Rostellulariâ labii rugis venisive et capsulâ longo spatio a basi depressâ et aspermâ. Species Americanæ forsitan a Capensis generice differunt.

§ 1. *Calyce quinquepartito regulari.*

1. R. CILIATA (N. ab E. in Linn. 15 p. 364), pubescens, foliis ovatis, spicis axillaribus foliis brevioribus subsessilibus densis, bracteis spathulatis deorsum membranaceo-marginatis calyce longioribus ciliatis, bracteolis lineari-sub-

- falcatis calycem subæquantibus. 3 Inter frutices in campis ad flumen Zwartkopsrivier solo argilloso cum ligno putrefacto, et in silvis primævis jugi Olifantshoek ad flumen Bosjesmanrivier ( Uitenbage ), floret a Martio in Octobrem ( Ecklon ! Drège ! ). Justicia Capensis Eckl.! h. cap. n. 556 ( ex parte ). Justicia intercepta E. Meyer ! in cat. pl. Drèg. 1837. Justicia divaricata ( nec Liecht. ) h. Zeyher ! fl. cap. n. 175 et h. gen. berol. ! fol. 1. Frutex ramosissimus, erectus, flexuosus. Folia ramea unguicularia, primaria caulis majora, ovata aut ovato-oblonga, utrinque pilosula, petiolata, petiolo ciliato, floralia minora, magis ciliata approximata. Spicæ parvæ, folia raro subæquantes, ovales aut cylindricæ. Calyx profunde quinquepartitus, lacinias æqualibus linear-lanceolatis acutis margine membranaceis ciliatis, superiore angustiore. Variat pilis bracteolarum calycisque simplicibus capitatisve. ( v. in h. Eckl., Drège, Hooker, etc. )
2. R. ORGANOIDES ( N. ab E. in Linn. 15 p. '365 ) foliis ovatis acutiusculis cauleque ramosissimo stricto hirsutis, spicis axillaribus terminalibusque paniculatis glanduloso - villosis confertis. 3 In silvis primævis montium Olifantshoek circum flumen Bosjesmanrivier, Octobri cum fl. et fr. mat. ( Ecklon, Drège ! Krebs ! n. 383, in h. DC. ; ad Hangklip ( Mund et Maire in h. gen. berol. ! ) Justicia glandulifera Meyer ! cat. pl. Drèg. a. 1837. Schlecht. ! in h. DC. Krebs ! in h. gen. berol., Mund et Maire ! ibid. ; Zeyher ! n. 928, in h. Hooker. Forma fere Organii vulgaris. Pedalis et altior. Difert a R. Eckloniana caule rigidiore stricto, ramis minus divergentibus, crebris tamen, hirsutie densiore, foliis majoribus conformibus, spicis brevioribus densioribus floribus contiguis, aliis axillaribus aliis terminalibus paniculam multifloram exhibentibus, bracteis oblongo-ovalibus, calycis lacinias brevioribus, capsula calyce dupla longiore, quæ parum in illâ est calyce longior. ( v. in h. Ecklon, Drège. Hooker, DC., berol. etc. )
3. R. OVATA, foliis ovatis acutis brevissime petiolatis utrinque præsertim in costis cauleque stricto apice coarctato hirsutis, spicis terminalibus subsecundis contractis pubescentibus, bracteis oblongo-lanceolatis, bracteolis calycisque bracteolâ longiori lacinias lanceolatis pubescentibus. 2 In Africâ australi ( Drège ! ) Justicia ovata E. Meyer ! cat. pl. Drèg. Distincta caule stricto, ramis erectis brevibus spicigeris supremis fastigiatis coarctatis, foliis quo exquisite ovatis stricte erectis basi obtusis petiolo 1-1 $\frac{1}{2}$  lin. longo hirsuto innatis 1 $\frac{1}{2}$  poll. longis 1 poll. latis. Spicæ 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longæ, subcylindricæ, crassitie pennæ scriptorijæ fortioris. Flores in axillis bractearum solitarii, alterni, subsessiles. Calyx 4 lin. longus. Corolla 5 lin. longa. Antherarum loculi fere transversales. Discus labii callis dubius arecam medium rugosam obvaliantibus auctus. ( v. in h. Drèg. et Hooker. )
4. R. ECKLONIANA ( N. ab E. in Linn. 15 p. 365 ), foliis inferioribus ovalibus superioribus evato-subrotundis decrescentibus, spicis terminalibus subsecundis glanduloso-villosissimis laxis, bracteolis linear-lanceolatis. 3 In Promontoriu B. Sp. silvis primævis regionis Olifantshoek ad flumen Bosjesmanrivier Uiteuhage ( Ecklon ! ) Fruticulus circiter pedalis, a basi patentí - ramosissimus, inferne teres et glaber. Rami pilis recurvis hirsuti lineisque longitudinalibus insculpti, gracilescentes. Folia inferiora circiter 4 poll. longa, petiolo æquilonga In ramulis florentibus evadunt subrotunda, et subsessilia ad extremum apparent. Flores in apicibus ramulorum approximati, subsecundi. Bracteæ cuneiformes, acutiusculæ, sessiles, calyces subæquantes, uti bracteolæ et calyces pilis longis patentissimi capitulo glanduloso terminatis flavicantibus villosissimæ; altera sterilis. Bracteolæ lanceolato-lineares, acutæ. Corolla 5 lin. longa. Antherarum loculi valde distantes. Capsula oblonga acuta. ( v. in h. Ecklon et Hooker. )
5. R. PROLIXA, spicis axillaribus compositis ramis floribusque secundis canuleque villosissimis laxis, foliis ovatis acuminatis, caulinis glabriusculis petiolatis, floralibus subsessilibus pilosis coloratis, bracteolis calycisque lacinias

subæqualibus linearibus acuminatis villosis.  $\mathcal{U}$  In Africâ australi (Drège!), Port Natal (Krauss! n. 502 in h. Benthami). *Justicia prolixa* E. Mey.! cat. pl. Drèg. a. 1837. *Justicia prolifex* E. M.! in h. gen. berol.! Similis Rh. Ecklonianæ, sed differt primo adspectu foliis multo majoribus exquisite acuminatis cum petiolo 6-7 lin. longo  $2\frac{1}{2}$  poll. longis  $1\frac{1}{2}$  poll. latis basi acutâ in petiolum desinentibus, margine costisque hispidulis. Caulis ascendens, geniculatus, cum ramis suis florentibus paniculatus. Spicæ folia æquantes, incurvæ, ramis extrorsum 3, introrsum nullo unove apicem versus præditæ decrescentibus. Flores distantes. Bractæ patentí-recurvæ, bracteolis paulo latiores. Calyx  $3\frac{1}{2}$  lin. longus; corolla 4 lin. longa; labium superius apice bifidum; inferius disco medio rugoso inflato. Antherarum loculi in connectivo fisso subtransversales. Variat spicis laxioribus magisque confertis. (v. in h. Drèg. et Hooker).

6. ? R. PTYCHOSTOMA, foliis ovali-oblongis obtuse cuspidatis glabris, spicis in caule ramisque terminalibus angustis basi diphyllis, bracteis orbiculatis petiolatis venoso-reticulatis ciliatis mucronulatis deciduis, corollâ....  $\mathfrak{Z}$  In Penang (G. Porter). *Justicia ptychostoma* Wall. cat. n. 2478, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 108. Rami graciles, longi, inferne obtuse superne acutius tetragoni, glabri, superiora versus ad genicula compresso-dilatati. Articuli longi. Folia inæquaalia; alterum 6-8 poll. longum,  $2\frac{1}{2}$  poll. latum, alterum 3-4 $\frac{1}{2}$  poll. longum, obiter repanda, supra dense lineolata, glabra, subtus ad costas scabra. Rami axillares oppositi vel alterni, terminales quinque, spicigeri, aliquot pollicum, basi longe aphylli, apice diphylli, foliis inæqualibus, 3 et  $1\frac{1}{2}$  pollicum, oblongis petiolatis. Spicæ 1-2 pollices longæ, dum bracteis tectæ, tetragonæ, mox autem, bis ab inferiore parte delapsis graciles, floribus ex opposito solitariis perfecte sessilibus dissitiusculis, apice paucis bracteis residuis comosæ. Rhacbis articulata, alternatim compressa hirsutieque brevi lineaata. Bractæ 2-2 $\frac{1}{2}$  liu. longæ, subrotundæ, in petiolum conspicuum semilineare contractæ, cuspidulatae vel obtusæ, ciliatae, teneræ, penninervi-venosæ, cito defluentes. Bracteole ad basin calycis oppositæ, calyce dimidio breviores, trianguli-lanceolatae, acutæ. Calyx vix  $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$  lin. longus, glanduloso-pubescentia, tenuis. (v. in h. Wallich).

7. R. ANAGALLIS (N. ab E. in Endl et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 119), radice repente spicis axillaribus alternis secundis incurvis pedunculatis folio longioribus, foliis linearibus oblongis obtusis cauleque ereto basi sexangulari aphylo glabris.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ. Species rhizomate longe repente ad genicula fasciculato-ramoso et caule simplici inferne spongioso aphylo distinctissima. Spicæ in pedunculo quadrangulare compreso folia æquante aut superante in formâ  $\alpha$  vix pollicares, in  $\beta$  1-3-pollicares. Flores unilaterales. Bractea opposita sterilis. Bractæ et bracteolæ conformes, subulatae, calyce 5 lin. longo 5-partito glabro laciniis lineari-lanceolatis acutis multo breviores. Corolla pureo-corœula, striis transversis albis (Mart.); in var.  $\alpha^*$  lilacina (Galeotti), cœrulea (Linden.) Plaga palatina oblonga, pectinatum rugosa.

$\alpha$ . foliis linear-angustis 2 poll. longis 2 lin. vix latis, inferioribus utilis aut brevissimis. — In aquosis prope Villa de Caiteté et Caxoeira prov. Bahiensis, Novembri (Martius!), in itinere e Monte Video versus Porto Alegro locis sabulosis inter frutices ripas obumbrantes prope S. José do Uruguay (Sellow! in h. reg. berol. n. 53, d. 1038; h. Moricand! ex h. Dorvill.) *Justicia Anagallis* Mart. obs. n. 1876. (v. in h. monac., berol. et Moricand).

$\alpha^*$ . foliis lin.  $1\frac{1}{4}$  latis, corollâ angustiore minore, quippe 5 lin. longâ, calyce 3-3 $\frac{1}{2}$  lin. longo, caule diffuso. —  $\odot$  In campis alt. 3000' Cordilleræ prov. Vera Cruz, Junio-Octobr. (Galeotti! n. 908 in h. Hook.), Xalapa (Galeotti ibid.), in pratis inundatis ad Mirador ejusd. prov. (Linden! n. 187 in eodem h.) (v. in h. Hooker).

$\beta$ .? foliis oblongis  $1\frac{1}{4}$  poll. longis 4 lin. latis. — Prope Caxoeira, Februario (Mártius!) (v. in h. monac.)

$\gamma$ . foliis inferioribus ternis. (l. c.)

8. *R. REPENS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 119), caule repente pube brevissimâ reflexâ plus minus vestito, foliis subsessilibus oblongis obtusis marginie scabris, iufinis subtrotundis, spicis axillaribus alternis adscendentibus longe pedunculatis paucifloris, floribus distantibus approximatim secundis, bracteis bracteolisque subulatis calyce duplo brevioribus calyceque subæquali quinquepartito apice scabris.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ, loco non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 62). Herba parva, Veronica serpyllifoliae feræ specie, a basi ramosa et repens. Folia basi angustiore sessilia, 3 lin. longa, media 7-8 lin. longa,  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  lin. lata, suprime magis lanceolata. Spicae  $\frac{5}{6}$ -1 poll. longæ, et floribus 4-8 subsecundis plerisque distantibus. Corolla recta, labii inferioris palato parum rugoso violaceo, saltem intensius tincto, laciniis ovalibus obtusis. Antherarum loculi distantes, dorsiū sursumque spectantes. Capsula 4 lin. longa. (v. in h. berol.)
9. *R. SARMENTOSA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 119), caule sarmentoso flagellarique repente pube reflexâ hirta, foliis brevissime petiolatis basi obtusis apice attenuatis supra subtusque præsertim in costis hirsutis, inferioribus ovato-lanceolatis, superioribus lanceolatis, spicis axillaribus alternis longe pedunculatis paucifloris, floribus approximatim secundis, bracteis bracteolisque subulatis calyce duplo brevioribus calyceque æquali quinque-partito scabris.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ: Sellow! in h. reg. berol. n. 56). Similis Rh. repenti; differt caule longioribus internodis praetereat, halitu sarmento-o, densius pubescente, foliis laxè hirsutis hirtissimis magis lanceolatis, at inferioribus tamen evidenter brevirribus latioribusque (6-8 lin. longis 3-4 lin. prope basin latis), superioribus summisque autem 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longis 4-3 lin. latis apicem versus longe attenuatis, conites plus minus repandis, basi rotundata latiore in petiolum brevissimum contractis, pedunculus rhachique ad instar caulis pubescens, calycis laciniis pubescenti-scabris lineari-subulatis angustioribus, antherarum loculis contiguis, infero verticali, supero obliquo. Palati plaga lanceolata, acute marginata, parce et oblique pectinata venosa. (v. in h. berol.)
10. *R. LÆVILINGUIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 120), caule adscendente quadrisulcato rhachique glabris, foliis lanceolatis obtusisculis subsessilibus brevissime petiolatis marginie serrulato-scabris spicis axillaribus per lunulatis, inferioribus alternis, superioribus subinde oppositis in spicam terminali compositam abeuntibus, floribus alternis secundis, bracteis bracteolisque subulatis calyce plus duplo brevioribus, antheris basi mucronulatis, calycis quinquepartiti laciniis lineari-lanceolatis æqualibus scabriusculis, corollæ palato lanceolato acute marginato evenio.  $\mathcal{U}$  In Brasiliæ Est. dos Fideles ad St. Gab, locis umbrosis, Decembri (Sellow! in h. reg. berol. n. 7 [3331], in umbrosis Capim Fideles, Decembri (Sellow! 3346) et in campis ad Porto Alegro, Maio (Sellow! 3509, h. reg. berol. n. 54, Rio Segundo in prov. Cordova (Tweedie! in h. Bentham), Banda oriental (id. ibid.), insulâ S. Catharinæ (Tweedie! in eod. h.). A Rh. angustifoliâ distinguitur caule non tetragono sed sulcis quatuor in angulos totidem obtusos scabriuscules neque strigilosos diviso, spicis longioribus  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. longis, inferioribus alternis pedunculo 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longo (apice, ubi flores incipiunt, sœpe parumper inflexo), superioribus brevioribus densioribus oppositis, unde caulis habitus panicularis prodit, rhachibus glabris, foliis inferioribus brevioribus 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longis at latioribus (4lin. latis), omnibus (repandis) margine scabris muriculis exiguis, denique plagâ labii inferioris elevata acete marginata evenia. Corolla paulo longior. Antberarum loculus inferior longior superiore basique acutus. Capsula 8 lin. longa, fusca, 4-sperma. (v. in h. berol. et Bentham).
- B. longifolia*, foliis lanceolato-attenuatis acutioribus, spicis omnibus axillariis secundis. — Buenos Ayres (Bacle! in h. Moricand et DC.). Folia (superiora) 3-5 poll. longa, 3-5 lin. lata. Pedunculi cum spicis folia æquantes aut superantes. (v. in h. Moricand et DC.)
11. *R. OBTUSIFOLIA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 120), caule

herbaceo quadrangulari folijs lanceolatis obtusis subsessilibus glabris, spicis axillaribus terminali subbifidjs simplicibusve, bracteis subulatis calyce quinquepartito multo brevioribus, antheris basi mucronulatis, basi repente, corollæ palato lanceolato punctulato aspero basi venoso, capsula superne ovali valde compressâ.  $\mathcal{U}$  Ad Buenos Ayres (h. Arnott!), in ripis fluminum ad Porto Alegro (Sellow! in h. reg. berol. n. 55 [2551 et d 2465]), la Plata Tweedie! n. 768 in h. Hooker), abunde in humidis prope Porto Alegro in prov. Rio Grande (Tweedie! n. 769 et 772 in h. Hooker), Surinam (Hostmann! n. 727 in h. Hooker), Texas (Drummond n. 182 in h. Bentham!), New Orleans (id! n. 255). Beloperone obtusifolia N. ab E. in h. Arnott! Caulis pedalis et altior. Folia  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 8-9 lin. lata, ovato-oblonga lanceolatava superiora minora. Spicæ pedunculatae, 1-2 poll. (demto pedunculo  $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ -poll.) longæ, ad basin hinc ramulo brevi subinde anctæ, aliæ simplices, omnes secundæ, rhachi articulata nec vero fragili. Lacinia calycis linear-lanceolatae, minute ciliolatae, 3-4 lin. longæ. Corolla a basi ad apicem labii inferioris 6 lin. longa, in superioribus floribus calycem vix excedens. purpurascens, puberula, tubo et funiculis angustis, labio superiore paulo brevior integro, inferiore trifido lobis æqualibus obtusis, paitati areæ lanceolata asperula in disco venosa. Antherarum loculi oblique contigui, inferioris mucrone baseos obsoleto. Capsula 6 lin. longa. (v. in h. Arnott Hooker, berol. etc.)

$\beta.$  *hirsuticaulis*, caule hirsuto, foliis oblongo-lanceolatis obtusissimis. — Rio Negro (Riedel! in h. acad. petrop.)

12. R. ANGUSTIFOLIA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 121), caule erecto tetragono rhachique strigilosæ-canescitibus glabrescentibus, foliis lanceolatis obtusis subsessilibus asperulis in costis strigilosis, spicâ terminali compositâ ramis brevibus, floribus rami inferioribus alternis approximatæ, bracteis bracteolisque setaccis calyce plus duplo brevioribus, calycis quinquepartiti laciniis linearibus lanceolatis æqualibus pubescenti-scabris, corollæ palato venoso.  $\mathcal{U}$  Ad Corgo Pian Brasiliæ (Pohl! in h. mus. vindob. n. 2187). Justicia angustifolia Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 2187. Similis quod ad habitum Rh. lavandulæfoliæ. Spica in apice caulis densiuscula, basi trifida, ramis oppositis brevibus inæqualibus spicifloris. Bractæ et bracteolæ pergraciles et breves, setacea. Calyx  $3\frac{1}{2}$  lin. longus, æqualiter 5-partitus. Corolla purpurea, 6 lin. longa, palato haud carinato-marginato. Antherarum loculi subtransversim obliqui. Capsula 4 lin. longa, fusca, basi pallidior. Caulis pedalis. Folia  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 3 lin. lata, rigidula, punctulis minimis præsertim in pagina superiori asperula, venis costalibus 6-7-nis ante marginem arcuatim coeuntibus, obtusissima, intima subcuneata repandaque. (v. in h. vindob.)

$\beta.$  *compactior*, caule fere glabro nec nisi lineis strigilosis in articulis superioribus præditæ, spicâ terminali breviore densiore ramis inferioribus trifidis densifloris, calycis laciniis brevioribus lanceolatis.  $\mathcal{U}$  In prov. Goyaz Brasiliæ tropicæ vulgaris in campis humidis prope Natividade, Novembri (Gardner! n. 3413 in h. Bentham, Hooker et Mart.)

13. R. PEDUNCULOSA, glaberrima, caule erecto angulato, foliis lanceolato-ensiformibus elongatis, spicis axillaribus subcapitatis longissime pedunculatis alternis, bracteis bracteolisque calyce duplo brevioribus subulatis.  $\mathcal{U}$  In America borealis aquæ lente fluentibz et in sinibus ripæ fluminum S. Laurence, Osorgo, Ohio, Kenhaway (Pursh), Niagara, Arkansas (Engelmann), Texas (Lindheimer! fl. tex. exs. fasc. 2 n. 291 in h. Hooker). Justicia pedunculosa Michx. fl. bor. am. 1 p. 7, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 408. Justicia Americana Vahl en. 1 p. 140 et h.! (specimen ex h. Banks.). Justicia linearifolia Lam. ill. 1 p. 41. Justicia ensiformis Ell. 1 p. 11. Dianthera Americana Linn. syst. p. 64, h. DC.! Dianthera ensiformis Walth. carol. p. 63. Pluk. alm. p. 114 t. 423 f. 5. Pedunculi longitudine folii (4 poll. longi). Spica  $\frac{1}{2}$  poll. longa. Plaga labii inferioris rugosa, anguste triangularis. (v. in h. prop., Hooker, DC., berol., vindob. etc.)

14. *R. HUMILIS*, glabra, caule adscende de quadrangulari, foliis oblongis lanceolatis (subinde oblongo-ovalibus) in petiolum attenuatis obtusiusculis apicem versus repando-subcrenatis margine scabris, spicis axillaribus simplicibus pedunculatis alternis inferioribus oppositis, floribus alteruis secundis inferioribus oppositis, bracteis bracteolisque subulatis calyce multo brevioribus, autheris basi mucronatis, calycis quinquepartiti laciniis linearibus æqualibus, capsula parte dilatata oblonga acuminata. (In Carolinâ australi, in Floridâ (Rugel!) in h. DC. ex h. Shuttleworth n. 861 (ex parte). A Rh. obtusifoliâ et laevilingui differt foliis basi in petioli speciem attenuatis. (v. s.)
- z.* foliis plerisque oblongis vel ovali-oblongis, floribus inferioribus oppositis. — In Carolinâ, Georgiâ (Torrey! Elliott! in h. Hooker). *Justicia humilis* Michx. fl. bor. am. 1 p. 8, Pursh fl. am. sept. 1 p. 13, Elliott carol. 1 p. 11, Vahl eu. 1 p. 143 et h.! R. et Sch. syst. 1 p. 155, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 407. *Justicia humilis* var. 2. Torrey! in h. Hooker. *Dianthera ovata* Walth. carol. p. 63, Bosc et Fraser! in h. DC. *Dianthera Caroliniana* Fraser! in h. DC. *Dianthera Americana* Fras.! in h. DC. (ex parte). (v. in h. Hooker.)
- β.* foliis lanceolatis. — In Louisianâ (Teinturier! in h. DC. Shuttleworth! Rugel, Riddell! in h. Hooker), in Georgiâ ad flumen Savannah (Beyrich! in h. gen. berol.) (v. in h. DC., Hooker etc.)
15. *R. TENUIFLORA*, caule inferne glabro, ramis quadrangularis pubescentibus, foliis oblongis acuminatis in petiolum cuneatim attenuatis integrerrimis glabriis, spicâ terminali trichotomo-compositâ sessili glanduloso-pubescente, ramis simplicibus bifidis secundifloris, floribus solitariis, bracteis bracteolisque æquilibus calyce multo brevioribus, calycis quinquepartiti laciniis subulatis, corolla longisculâ pubescentis tubo angusto palato oblique pectinatum rugoso. (In Peruvia nemoribus ad Cuchero vicum, Junio-Augusto (Ruiz et Pavon, Dombey! in l. DC. ex h. mus. paris.). *Justicia tenuiflora* R. et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 9, t. 12 f. a, Vahl en. 1 p. 125, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 376. *Justicia tenuifolia* Spr. syst. 1 p. 78. *Bipedalis*. *Folia nitida*. *Corolla pollicaris*, punicea (R. et P.) (v. in h. DC.)
16. *R. SECUNDA*, caule etiam subinde lineâ hirtâ notato, foliis ovato-oblongis apice (in aliis etiam basi) attenuatis obtusiusculis acutis repando-crenatis integrerrimis cauleque sexsulcato glabris, petiolo margine æquali, spicis secundifloris bipartitis oppositis, superioribus in spicâ terminali subnudâ paniculiformi pedunculata dispositis, floribus solitariis brevissime pedicellatis, bracteis bracteolisque setaceis calyce brevioribus calycis quinquepartiti laciniis linearibus acuminatis acutis aut obtusiusculis scabris, corollâ elongata labio inferiore linearie trilobato palato lanceolato pectinato-venoso. (In insulâ Trinitatis (de Rohr! in h. Vahl., Anderson! in h. Bentham ex h. Forsyth, Lockhart! in h. Hooker), in silvis humidis St. Marthæ, Martio (Purdie! in h. Hooker), St. Vincent (Guilding! in h. Hooker), in Novæ Andalusiae umbrosis prope Caripe (Humboldt! Goudot! in h. Hooker), prope Caracas (Vargas! in h. DC. Haenke! Moritz! in h. gen. berol.), prope la Hunapa? (Moritz! in h. gen. berol.), Sessuya Chachapoya (Mathews! n. 3169 in h. Hooker), in Guianâ Anglicâ, in ripâ flum. Essequibo (Schomburgk!, Hostmann! n. 1112 in h. Hooker). *Justicia secunda* Vahl symb. bot. 2 p. 7 en. 1 p. 133, h.!, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 391, Bot. mag. t. 2060, Sieb. fl. martinic. n. 382 et fl. ins. Trinit. n. 139, h. DC. *Justicia Caripensis* Kunth in Humb. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 233, Kunth syn. 2 p. 31, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 391, h. Willd. n. 318. *Sericographis Caripensis* N. ab E. in Bentham pl. Schomb. n. 134 (190.) *Justicia Caracasanæ* h. Willd. n. 343 (specimen Swartz. e Caribæis). *Corolla pollicaris*, purpurea, venis intensionibus ad anastomoses maculâ obscurâ notatis. Antherarum loculi valde distantes. (v. in h. Sieber, Vahl, DC., Willd., Bentham etc.)

*β. intermedia*, calycibus setaceo-acuminatis, foliis acuminatis, inferioribus

- oblongo-lanceolatis basi longe attenuatis, caule pubescente. — Surinam (Hostmann! n. 1112 in h. gen. berol.). Calyces et inflorescentia ut in Rh. Moricandianâ, folia etiam acutissima, sed basi angusta, subinde pedalia,  $3\frac{1}{4}$  poll. lata. (v. in h. berol. et Hooker).
17. R. GENICULATA, foliis ovato-lanceolatis glabris, subtus pallidis distantibus, paniculis terminalibus laxis cernuis, bracteis subulatis. ♂ In insula S. Vincentii umbrosis. *Justicia geniculata* Sims bot. mag. t. 2487, Willd. sp. ed. Dietr. 1 p. 388. Differt a R. secundâ labio corollæ superiore integro, inferiore dentibus 3 obtusis rotundatis, a R. lucidâ floribus paucioribus et minoribus nec coufertis, foliis multo angustioribus magis acuminatis neque in petiolum decurrentibus, ab utrâque paniculâ laxiore cernuâ, pedunculo multo longiore nudo ex Sims. Corolla coccinea.
18. R. MORICANDIANA, foliis ovalibus basi obtusis argutissime cuspidatis repando-crenatis glabris, petiolo undulato-marginato, corollæ elongatae viscidæ palato angusto pectinatum venoso spicis secundifloris bipartitis in spicâ terminali subnudâ verticillatâ pedunculatâ apice nutante dispositis basi densifloris, floribus solitariis vix pedicellatis, bracteis bracteolisque setaceis calyce multo brevioribus, calycis quinquepartiti laciniis linearibus setaceo-acuminatis pubescentis scabris. ♀ In Guiana Gallica (h. Moricand !) Differt a R. secundâ caule crassiore medullâ ampliore sexangulari lineisque hirtis conspicuus notato, foliis amplioribus (cum petiolo pollicari margine undulato) 5 poll. longis  $2\frac{1}{7}$  poll. latis in acumen angustum subtile atque acutum cuspidatum excurrentibus, spicis partialibus plurifloris ad basin ramulosis. Calyces valde acuminati. Flores paulo longiores, glutinosi, intensius nigro-purpureo maculati. Antherarum loculi obliqui, distantes, semiovales ut in R. secundâ. (v. in h. Moricand).
19. R. LUCIDA, foliis ovalibus vel oblongo-ovalibus cuspidulato-acuminatis in petiolum brevem decurrentibus subrepandis bullatis lucidis canaque fruticuloso glabris spicâ terminali densâ thyrsoidâ brevi ex spicis partialibus oppositis brevibus paucifloris, floribus solitariis approximatis secundis brevissime pedicellatis, bracteis bracteolisque setaceis calyce multo brevioribus, calycis quinquepartiti laciniis linearibus acuminatis scabris. ♂ In Barbadoes (Andrews), in insula Sti Vincentii (Anderson ! in h. Bentham ex h. Forsyth). *Justicia lucida* Andr. rep. n. 313, Bot. mag. n. 1014, Vahl en. 2 p. 400, Ait. bort. kew. ed. 2. 1 p. 37. R. et Sch. 1 p. 152, mant. 1 p. 135, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 387, h. Willd. ! n. 342. *Justicia coccinea* b. Forsyth ! Differt notis allatis, tum corollæ (bipollucaris) labio superiore integro, inferiore apice breviter trifido, antherarum loculis paulo minus distantibus. (v. in h. Bent. et Willd.)
20. R. LINEOLATA, foliis ovalibus acuminatis basi obtusa in petiolum angustum obtuse desinentibus canaque glabris lineolatis spicis terminalibus solitariis geminis trichotomo-compositis pedunculatis puberulis, floribus oppositis, bracteis bracteolisque subulatis subæqualibus calyce triplo-dimidio brevioribus patulis, calycis quinquepartiti laciniis subulatis glabriusculis, corollæ palato punctato. ♀ In Peruvia nemoribus ad Cuchero vicum, Julio et Augusto (Ruiz et Pavon), Pangoa in Peruv. (Mathews! n. 1194 in h. Hooker). *Justicia lineolata* R. et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 9. t. 13 f. a., Vahl en. 1 p. 125, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 372. *Justicia lineata* Pers. syn. 1 p. 18. Caulis 2-3-pedalis, superne quadrangularis. Folia ut in congenribus lineolata. Corolla purpureo-cœrulea ex R. et P. (v. in h. Hooker).
- ♂. bracteis bracteolisque calyce parum brevioribus. — In Peruvia (Dombey ! in h. Hooker n. 339 ex h. paris. n. 246). Calycis lacinia superior paulo minor reliquis. (v. in h. D.C.)
21. R. MEYENIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 121), foliis ovato-oblongis basi obtusissimis glabris spicâ terminali densâ, bracteis lanceolatis, bracteolis calycisque quinquepartiti laciniis linearibus longe ciliatis. ♀ Ad Sebastianapolin. Beloperone Meyeniana N. ab E. in nov. act. sc. nat.

eur. 19 suppl. 2 p. 381. A R. genuflexa differt præcipue foliis basi obtusissimis glabris, quæ isti basi in petiolam decurrent et pilis vestita sunt; tum etiam bracteolis calycisque lacinias linearibus obtusiusculis nec setaceo-acuminatis. Labium inferius venosum. (v. in h. Meyen).

22. R. GENUFLEXA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 121), hirsuta, caule repente, foliis ovalibus basi acutis spicis axillaribus terminalique pedunculatis cylindraceis densis, bracteis lanceolatis, bracteolis calycisque quinquepartiti lacinias setaceis hirsutis.  $\mathcal{L}$  Ad flumen Ilhéos juxta viam Felisbertiam, Decembri, et in silvis circum Villa do Prado ad flumen Alcobaça (Max. Princ. Wied.). Justicia genuflexa Nees et Mart. in nov. act. sc. nat. eur. 11 p. 57, R. et Sch. syst. mant. 1 p. 248, ib. Spr. eur. post. p. 18 Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 394. Caule maxime geniculato repente cum foliis hirsutis facilis est distinctu. Corolla violacea, recta, 4 lin. longa; labii inferioris lacinia media venosa, parum undulata. Laciniae calycis setaceæ, hirsutæ, superiora minore. Bracteolæ setaceæ, calyce breviores eique subæqualis. Bracteæ lanceolatæ, acute. Pedunculus longitudine spicæ. Flores in angulo singulæ bracteæ 2-3. (v. in h. Maxim. Princ., Mart. et prop.)

23. R. CORDIFOLIA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 121) foliis cordato-ovatis cordatoe oblongis basi inæqualibus brevissime petiolatis subtus hirsutis altero mlnore vel abortivo spicâ terminali laximembranâ caule superne repente hirsutis, bracteis lanceolatis, bracteolis calycisque quinquepartiti lacinias setaceis hirsutis.  $\mathcal{L}$  In silvis circum Villa do Prado Alcobaça Iuvium (Max. Princ. Wied. in h. Mart.). Simillima R. genuflexa ejusdemque omnino modo crescendi, differt autem foliis glaucescentibus basi valde inæqualibus ovatis cordatis in acumen breve obtusum productis supra glabris subtus hirsutis (repandis), superioribus brevissime petiolatis, ob alterius defectum vel minutum haud raro ad speciem alterius; spicis laxioribus, subinde subsecundis pedunculo duplo longioribus. Flos et fructus ut in illâ. Rh. Meyenniana distinguuntur tunc glabritate, tunc vero et calycis lacinias bracteolisque angustioribus. Folia 2-2½ poll. longa, 12-14 lin. lata. Flores rubicundi. (v. in h. Maxim. Princ. et Mart.)

24. R. ILHENSISS (Moricand mss.), caule herbaceo basi repente geniculato, foliis ovalibus acuminate basi acutis petiolatis utrinque hirsutis, spicis axillaribus terminalique solitariis densis, bracteis ovalis subulato-cuspidatis ciliatis bracteolatisque linearibus calycisque lacinias setaceis et caule superne hirsutis.  $\mathcal{L}$  In Ilhéos (Blanchet in h. Moricand). A R. Cayennensi differt bracteis foliisque latioribus, antherarum loculis fere contiguis et iis tamen fere transversi. Folia cum petiolo semipollicari 3 poll. longa, 12-13 lin. lata, acumine arguto, basi breviter acuta. Bracteæ 3 lin. longæ, 2 lin. latæ, venoso-7-nerves reticulatae, pallide. Corolla pubescens, pallide purpurascens, 4 lin. longa. (v. in h. Moricand).

25. R. HIRSUTA, caule erecto hirsuto, foliis ovato-oblongis acutis basi obtusis longe petiolatis utrinque, præsertim in costis, pilosis spicis axillaribus terminalique solitariis densis tetragonis, bracteis subrotundis mucronato-acutis pennatim venosis longissime ciliatis bracteolatisque lineari-lanceolatis acutis ciliatis calyce longioribus, calycis quinquepartiti tenerrimi lachnus setaceis sparsim pilosis.  $\mathcal{L}$  aut  $\mathcal{O}$  Ad Maynas (Pœppig! in h. acad. petrop. n. 583). Canlis 1-2 ped. altus, obtuse quadrangularis, pilis longis recurvo-patentibus dense vestitus. Folia distantia, 3-4 poll. longa, 1½-2 poll. lata. Petioli fere pollicares, hirsuti. Spicæ 2-4 pollices longæ, erectæ, brevipedunculatae. Bracteæ (3 lin. longæ, basi parum attenuata) et bracteolæ virides, herbaceæ. Calyx pallidus, vix lineam 1 longus, corollæ arte incumbens. Corolla tenera, purpurea, 4-5 lin. longa; labium inferius latum, convexum, fuscibus venoso-reticulatum. Antherae parvæ, loculis subtransversalibus contingis introrsum dehiscentibus. Capsula 2½ lin. longa, pallida, pubescens. Semina muriculata. (v. in h. petrop.)

26. R. MICROSTACHYTA, foliis ovali-oblongis apice attenuatis acumine obtusiusculo

- basi acutâ in petiolum brevem desinentibus denses lineolatis glabris costis scabris spicâ in caule ramisque terminali parvâ densâ pubescenti-glandulosâ, bracteis ovatis subulato-cuspidatis ciliatis bracteolisque linear-lanceolatis calycem æquantibus. — Ad Maynas (h. imp. vindob. add. 171 ex. h. Enillicher). Rami asperuli, linea hirsuta notati. Folia lata viridia, cum petiolo 2 lin. longo  $3\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, 13-11 lin. lata, vix repanda. Spica nutans, 6 lin. longa, brevipedunculata, pallida, folio minore ad basin pedunculi oppositoque isti folioli subulato. Rhachis pubescenti-cana. Flores oppositi, sessiles. Bracteæ et calyces 2 lin. longi. Corolla purpurascens? 4 lin. longa, labio superiore angusto retuso, inferiore lato trilobato, lobis subæqualibus rotundatis, disco venoso-ruguloso intensioris coloris. Stamina labio superiore breviora; antherarum loculis semiovalibus muticus uno recta super altero posito. Stigma acutum. Ovarium glabrum. (v. in h. vindob.)
27. *R. OBLONGA*, herbacea, caule geniculato basi radicante apicem versis incano et ad genicula compresso, foliis oblongis in acumen obtusiusculum longe attenuatis basi acutâ in petiolum brevem desinentibus glabriusculis, spicis axillaris e foliorum superiorum angulis folio brevioribus, bracteis rhombo-ovatis acuminate vénosis ciliatis, corollæ labio superiore bifido, inferioris laciniis ovalibus obtusis puberulis.  $\mathcal{L}$  In Columbiâ (Sinclair). Orthotactus oblongus N. ab E. in Bentham bot. sulph. p. 147. Folia tenuia, flaccida; inferiora 7-8 poll. longa, 2 poll. lata; superiora 4-5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. fere lata. (v. in h. Bentham).
28. *R. ARNOTTIANA*, herbacea, foliis ellipticis utrinque acutis glabris, spicis axillaris in terminalem confluentibus foliis brevioribus, bracteis ovatis trinervibus ciliatis, corollæ labio superiore bifido, inferioris laciniis oblongis obtusis puberulis.  $\mathcal{L}$  In Bahiâ (Delessert! in h. Arnott. n. 2575). Orthotactus Arnottianus N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 132. Bracteæ mucronato-acutæ. Corolla pollicaris. (v. in h. Arnott.)
29. *R. LEUCOPHLŒA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 129), foliis ovatis cauleque hirsutis glabrescentibus, spicis axillaris terminalibusque bifidis dichotomise recurvatis, floribus secundis, bracteis bracteolisque setaceis brevibus glandulos-pubescentibus, corollæ elongata.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ, ad Rio Xipoto fluv. (Martius), ad viam Felisbertiam prope Ilhéos flumen, Decembri (Max. Princ. Wied.! in h. Mart.), ante Padre Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 3215), in imperio Mexicano? (Hænke). Justicia leucophlœa N. ab E. in plant. Hænke. ined.? Dicliptera Brasiliensis Nees et Mart. in nov. act. sc. nat. cur. 11, 1 p. 60. Dicliptera xipotensis R. et Sch. syst. 1 p. 248 c, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 426. Dicliptera recurvata Spr. syst. cur. post. p. 19. Justicia setibractea Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 3215. Variant folia basi obtusissime fere cordata, et (præsertim superiora) acutiuscula. Capsula ovata, compressa, basi attenuata, acuta, utrinque sulculis duobus obliquis baseos insculpta, fusca, glabra, loculis monospermis, dissepiamento suorum evanescente, ita ut capsula fere unilocularis evadat. Corollæ labium inferioris apice brevi spatio trifidum laciniis subæqualibus obtusis. Antherarum loculi valde distantes. (v. in h. Maxim. Princ., Mart., vindob. Hooker, Hænke).
30. *R. PANICULATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 129), foliis ovatis cauleque hirsutis, spicis axillaris terminalibusque bifidis dichotomise recurvato-patentissimis, floribus secundis, bracteis bracteolisque brevibus glandulos-pubescentibus, corollæ brevis fauibus inflatis.  $\mathcal{L}$  In Ilhéos (Blanchet! in h. Moricand n. 2979). Differt a R. leucophlœa corollâ duplo breviore (4 lin. longâ) pallida, fauibus campanulato-inflatis tubum æquantibus. Reliqua ut in hac. Labii inferioris palatum latius tumens, pectinatum venosum. Antherarum loculi ut in R. leucophlœa connectivo longo discreti. (v. in h. Moricand).
31. *R. REPTANS*, caule repente, foliis ovatis obtuse subattenuatis cauleque gla-

*bris*, spicā subterminali pauciflorā secundā, bracteā bracteolisque brevibus, calycisque quinquepartiti laciniis subulatis.  $\mathcal{L}$  In Jamaicā, St. Domingo (Swartz). Justicia reptans Swartz prodr. fl. ind. occ. p. 13, fl. ind. occ. 1 p. 33, Willd. sp. pl. 1 p. 101. ed. Dietr. 1 p. 395, h. Willd. n. 330, h. DC! (spec. Swartz), Vabl en. 1 p. 143 et h. Planta parva, alsiniformis, foliis vix unguicularibus. Capsula haud polysperma, ut babet Swartzius l. o., sed tetrasperma, ut in reliquis. (v. in h. Vabl, Willd., DC.)

32. *R. RADICOSA*, caule repente pubescenti-scabro, radicibus longis ramosis, foliis ovalibus obtusis glabris margine scabris, spicā terminali biflorā longe pendunculatā, calycis quinquepartiti laciniis lanceolato-linearibus acuminatis.  $\mathcal{L}$  In Ceylon, April (Capit. Champion! in h. Hooker). Caulis aliquot pollicum longitudine, fibris radicalibus axillaribus longis solitariis apice valde ramosis repens. Folia unguicularia, obtusa, basi acutiuscula, brevipetiolata. Pedunculus 4-7 lin. longus, glaber, apice floribus 2 approximatis alternis sessilibus. Bractea late subulata longitudine calycis sub flore inferiore. Bracteæ calyce breviores. Corolla deest. Capsula 3 lin. longa, sulco juxta suturam rufa. Semina ferruginea, tuberculata. (v. in h. Hooker).

33. *R. HAVANENSIS*, glabra, caule repente, foliis ovato-lanceolatis acuminatis basi rotundato-obtusis brevissime petiolatis altero subsessili spicis axillaribus simplibus secundifloris in terminalem compositam abcutibus, bracteis bracteolisque brevibus calycisque 5-partiti laciniis lanceolato-subulatis.  $\mathcal{L}$  In Jamaicā, Havanā (Green! in h. Hooker). Justicia humilis? Green l. c. n. 26. Affinis *R. reptanti*, sed diversa foliis longioribus et inflorescentiā fere *R. pectoralis*. Fibra radicalis e singulo fere nodo caulis singula, simplex. (v. in h. Hooker).

## § 2. *Calyx vel quadripartitus, æqualis, vel quinquepartitus, laciniā superā minore saltēm angustiore.*

\* *Floribus axillaribus sessilibus.*

34. *R. AXILLARIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 122), foliis brevissime petiolatis glabris, inferioribus ovalibus obtusis axillulis sterilibus, superioribus (floralibus) lanceolatis acutis floribus axillaribus oppositis sessilibus, bracteolis lanceolatis acuminatis calycem æquantibus, calycis quadripartiti laciniis linear-setaceis scabris.  $\mathcal{L}$  In Brasiliæ campis circa littora fluvii S. Barbano prope Rio Grande, prov. ejusdem nominis (Sellow! in h. reg. berol. n. 61 [3252]). Caulis digitalis paulo altior, tener, ramosus, erectus adscendens, superne lineis pubescutibus alternatim oppositis notatus, articulis compressis. Folia media 8-9 lin. longa, 4-3 lin. lata, superiora angustiora, acutiora et paulo breviora, margine scabra, magis approximata, inferiora decrescendo ex ovalibus subrotunda, obtusiora magis distantia. Flores a medio caule oppositi. Bracteæ 4 lin. longæ, stricte acuminatæ, margine scabre, calycis laciniis vix longiores at duplo latiores. Corolla 5 lin. longa, pubescens, tubo brevi; labium superius rectum, inferius trifidum palato laxe pectinatum venoso. Differt a *R. sessili* foliis floralibus angustis acuminatis, bracteolis majoribus calycisque laciniis longioribus gracilioribusque. (v. in h. berol.)

35. *R. CAMPESTRIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 118), foliis inferioribus subovalibus, floralibus lanceolatis sessilibus tota hirta, floribus axillaribus oppositis sessilibus, bracteolis lanceolatis calycem quadripartitum æquantibus.  $\mathcal{L}$  In campis ad Porto Alegro et Catalar, Maio (Sellow! in h. reg. berol. n. 63 [3608 et 3390]), in rupibus siccissimisque clivibus glareosis prov. Rio Grande Brasiliæ (Tweedie! in h. Hooker). Herba humilis, digitalis. Radicis fibre longæ, validæ, flexuose, fuscae. Caule basi ramosi, intricati, geniculati, quadrangulares. Folia intima ovalia, 6 lin. longa, 3 lin. lata, obtusissima, media circiter  $\frac{2}{3}$  poll. longa et 4 lin. lata, utrinque magis attenuata, tamen obtusa, integerrima, utrinque sicuti et caulis pilis brevibus patentibus hirta. Calycis lacinia 3 lin. longæ, lineari-setacea, hirsuta, bracteolis paulo breviores ac angustiores. Corolla 5 lin. longa, pallida, pubescens,

tubo brevi, faucibus amplis, labio superiore ovato-lanceolato emarginato, inferiore ovato lato trifido lacinii obtusis, palati plagâ elevatâ oblongâ valde rugosâ intensius colorata. Antherarum loculi breves, obliqui, contigui, superior mitriformis, inferior breviovatus. Capsula acuminata. (v. in h. berol. et Hooker).

36. R. *SESSILIS*, foliis ovatis brevissime petiolatis obtusis pubescenti-scabris, floralibus conformibus apiceve paulo magis attenuatis semper tamen obtusis aut obtusiuseulis floribus axillaribus sessilibus oppositis subsolitaris, bracteolis calyce breviribibus calycisque quadripartiti lacinii subulatis scabris.  $\mathcal{U}$  In Caribæis (Vahl, Jacquin), St. Domingo, Portorico, ad silvarum oras et in fruticetis cœduis (Bertero! in h. DC.), St. Thomâ (Forsyth! in h. DC.) Justicia pauciflora Vahl ecl. am. 1 p. 2, Pers. syn. 1 p. 23. Justicia sessilis Jacq. fl. am. 3 t. 2 f. 2, Willd. sp. pl. 1 p. 95, ed. Dietr. 1 p. 407 et h. n. 341 (spec. Desfont.), Vahl en. 1 p. 152 et h.! Planta illepida, polygona articulis brevibus lineis hirsutis notata vel tota hirsuta. Folia  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, pleraque basi obtusa, nonnulla et basi acutiuscula, utrinque, præsentim in costis, pubescenti brevi scabra, floralia paulo minora, subinde obtusissima, subinde et apicem versus modice attenuata apice tamen obtuso. Corolla 6-7 lin. longa, pallide purpurea, labio superiore recto, inferiore lato trifido lacinii obtusis, media pectinatim venosa. Capsula 6 lin. longa, tetrasperma. Semina tuberculata. (v. in h. DC., Willd. etc.)
37. R. *HYSSOPTUS*, fruticosa, ramosissima, caule sulcato pubescenti-cano, foliis pubescensibus brevissime petiolatis, caulinis lanceolato-linearibus, floralibus ovatis acutis venoso-trinervibus floribus versus apicem caulis et ramorum axillaribus oppositis sessilibus spicata sessilem exhibentibus, bracteolis linearibus acutis calyce quadripartiti longioribus.  $\mathfrak{z}$  In ripâ fluvii Mosteguma prope las Ajuntas in imperio Mexicano, Januario (Ehrenberg! n. 1061 in h. gen. berol.). Fruticulus humilis. Folia caulina Hyssopi, tripli- vel quintupliciter; floralia duplo latiora, tenuiora, calyce multo longiora. Corolla deest, quapropter genus dubium. Capsula brevi spatio a basi tetrasperma. Retinacula apice bidentata. Semina ovalia, marginata, laeviuscula, basi inæqualiter cordata. (v. in h. berol.)

\*\* *Floribus spicatis.*

38. R. *RUIZIANA*, caule erecto pubescente, foliis oblongis acutiusculis basi obtusa sepe inæquali in petiolum longum desinenteribus glabris subtus in costis puberulis, spicâ terminali elongatâ tetrastichâ densâ, bracteis late ovalibus acutiusculis pennatim venosis brevicipiliatis bracteolisque oblongis acutiusculis ci- liatis calyce longioribus, calycis subquinqüepartiti pilosuli lacinia superiore multo minore setacea.  $\mathcal{U}$  In Peruvâ (Raiz! in h. Lambert et in h. gen. berol.). Dianthera lineolata Tafalla! (nec Ruiz et Pavon), in h. citt. Proxima R. hirsute, differt bracteis haud adeo cuspidulatis, sed vix acutis et calyce inæquali. Folia obiter repando-crenata, viridia. Caulis, petioli, rhachis pubescens-canescens. Corolla 4 lin. longa, purpurascens; labium superius integrum, inferius latum, vix ad medium usque trifidum, lacinii obtusis, mediâ duplo latiore. Antherarum loculi subtransversi, contigui. Capsula  $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longa, pubescens. (v. in h. berol.)

39. R. *MENTHOIDES* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 122), caule repente lineatim hirsuto, foliis ovatis subcordatis acutiusculis supra hirsutis, petiolo mediocre spicâ caulis ramorumque terminali densâ verticillatâ, bracteis oblongo-lanceolatis utrinque acutis, bracteolis linearis-subulatis calycisque quadripartiti lacinii setacea hirsutis.  $\mathcal{U}$  Prope Castel-Novo Brasiliæ, Novembri (h. acad. petrop.! n. 571). Folia media 3 poll. longa (cum petiolo 5-linearis) prope a basi  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, inferiora minora longiore petiolo, superiore et ramea brevior petiolo, cuncta supra valde hirsuta, subtus præter costas pilosulas glabra. Spica terminalis (ad speciem subinde et 2 oppositæ), pedun-

culata, 1-2 poll. longa, cylindrica. Flores in axillis bractearum 2-3, sessiles basi ejus petiolari adnati, non omnes perfecti, verticilos subcontiguos singentes. Bracteæ bracteolæ et calyces æquales, 2 lin. longæ, pilis longis patentibus ciliatæ. Corolla 3 lin. longa rubra, tubo albo. Antherrarum loculi ovales, transversim contigui. Capsula 2 $\frac{1}{2}$  lin. longa, pubescens, pallida. (v. in h. petrop.)

40. R. CAYENNENSIS, foliis oblongo-ellipticis in petiolum cuneatim decurrentibus glabris hispidulo-scabris subtusve hirsutis spicis terminalibus axillaribusque subsolitariis densiusculis, bracteis oblongis subulato-acuminatis ciliatis, bracteolis calycisque laciniis setaceis cauleque superne hirtis, calycis laciniâ superiore capillari reliquis multo minora. ♂ In Guianâ Gallicâ (h. Mart. ! n. 163 ex mus. paris.; h. Bentham! ex eod. mus. n. 163; h. acad. petrop.! ex eod. mus. n. 163; Leprieur! in h. Nees ex eod. h. n. 265 et in h. Bentham!; h. DC.! e Cayenne; Leprieur! in cod. h. n. 23), Surinam (Hostmann! n. 1122 in h. gen. berol. et Hooker). Quod ad inflorescentiam et corolla figuram. accedit ad R. genuflexam, sed differt maxime caule fruticoso erecto dichotomo, tum foliis longioribus haud hirsutis sed vel glabris vel setulis brevissimis sparsis, praesertim in costis, hispidis, et bracteis latioribus. Pedunculi infra apicem caulis orti, subinde terminales videntur, spicæ sunt breviores, pubescenti-hirti. Corolla 3-4 lin. longa, alba aut purpurascens, labio superiore integro, inferiore trifido laciniis subæqualibus obtusis subtus et apice hirsutis. Antherrarum loculi semiovales, mutici, emissò polline subtransversales. Capsula a medio tetrasperma, pubescens, 3 lin. longa. (v. in h. paris., Nees, DC., Bentham, Hooker, etc.)

♂. caule declinato foliisque subtus hirsutis. — In Guianâ Gallicâ (Perrottet ! n. 206 in h. DC.).

γ. foliis basi minus attenuatis, spicâ densiore. — Ad La Maña in Guianâ Gallicâ (Leschenault! in h. mus. paris. n. 255).

41. R. MAYNENSIS, glabra, caule fruticoso trichotomo lneolato-aspernulo, foliis ovalibus obtuse cuspidatis in petiolum longum cuneatim decurrentibus, spicis axillaribus oppositis densis in terminali composite aheuntibus, bracteis oblongis mucronatis acutis basi cuneiformibus pubescenti-scabris, bracteolisque calycisque quadripartiti laciniis linear-setaceis æqualibus ciliatis. ♂ Ad Maynas (Poeppig! in h. acad petrop. n. 159). Folia latiora sunt quam in R. Cayennensi et majora (inferiora 7 poll. longa, 2 $\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo 1 $\frac{1}{2}$  poll. longo), subcoriacea, subcrenata. Bracteæ majores, minus cuspidatæ, hasi magis cuneiformes (septuplinervia). Spicæ plures, praesertim in apice caulis, longiorès, densiores. (v. in b. petrop.)

42. R. NANA, hirsuta, caule repente ?, foliis omnibus brevissime petiolatis, melius ovato-attenuatis, supremis ovali-subrotundis cuspidulatis plerisque supra laxius hirsutis, spicæ caulis ramorumque terminali densâ sessili, floribus oppositis, bracteis bracteolisque linearibus acuminatis calycis quadripartiti laciniis linearisubulatas æquantibus bracteolisve his paulo brevioribus, cunctis hirsutissimis, corollæ palati valde rugoso. ♂ Ad San Sebastian in regno Mexicano, Aprili (Ehrenberg! n. 1005 in h. gen. berol.). Accedit R. menthoïdi, sed differt staturâ vix digitali, petiolis brevissimis, corollâ fere duplo majore. Tumor palati ovato-attenuatus, oblique pectinatum rugosus, rugis subimplexis; gula laxe et regulariter pectinatum venosa. Folia parva. Caulis hirsutus nec lineatus. (v. in h. berol.)

43. R. VIRIDIFLORA, caule herbaceo trichotomo pube recurvâ subtilissimâ sebro, foliis oblongo-ovalibus utriusque attenuatis obtusis in petiolum longiusculum cuneatim decurrentibus scabris, spicis axillaribus terminali pedunculatis densis, bracteis ovalibus obtusis cum mucronulo basi parum attenuatis trinerviis bracteolis calycisque inæqualiter quinqnepartiti laciniis linear-setaceis ciliatis, laciniâ calycis superiore multo minore. ♂ In Florida ad fluvium Apalachicola, prope Mount Vernon, Sept. (Rugel! Shuttleworth! in h. DC.). Justicia viridiflora Buckley exs. Rugel l. c. Justicia brachiata Young!

in h. Hooker ( nec Pursh ). Semina cordato-orbiculata, muricata, pallida. Corollam non vidimus. (v. in h. DC. et Hooker).

44. R. PÆPPIGIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 123), caule juvenili dense pubescenti-lineato geniculato basi repente ? foliis subovatis attenuatis basi acutis glabris, spicis axillariibus terminali pedunculatis subcylindricis densis, pedunculo hirsuto, bracteis ovalibus oblongis cuspidatis, bracteolis calycisque quadripartiti laciniis linearis setaceis aequalibus pubescenti-glandulosis.  $\mathcal{L}$  Ad flumen Amazonum (Pœppig! n. 215 in h. DC. et in h. reg. berol. et in h. acad. petrop. n. 2065). Habitus R. genuflexæ. Folia cum petiolo bilineari hirsuto,  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 10-12 lin. lata. Bracteæ cum bracteolis et calyce  $2\frac{1}{2}$  lin. longæ, illæ  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$  lin. latæ, cuspide reliquam partem fere aequante. Bracteolæ lineares; calycis laciniæ linearis subulatæ, distincte glandulosæ. Corolla purpurascens, 3 lin. longa, labii inferioris lobis obtusis, palati plagâ oblongâ, evidenter pectinatum venosâ. Authorarum loculi ovales, oblique distantes et inter se ferè paralleli, altero deorsum, altero sursum delibescentes. (v. in h. berol. et petrop.)

45. R. CHAMÆDRYOIDES (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 123), caule diffuso, juvenili piloso-lineato, foliis ovato-subrotundis acutinseulis glabris, spicis terminalibus raro et axillariibus pedunculatis laxiusculis, floribus oppositis discretis, bracteis bracteolisque subulatis subæqualibus calyce duplo brevioribus, calycis subquadripartiti laciniis linearis - subulatis pubescenti-scabris serrulato-ciliatis, quintæ exigua setacea.  $\mathcal{L}$  In silvis ad Cabo Frio, Martio (Max. princ. Wied.). Præcedenti similis, differt caule folii-que minime hirsutis, sed hisce glabris caule autem lineis et pilis brevibus confluentibus alternatim oppositis lineato, foliis latioribus brevioribusque basi obtusis (cum petiolo bilineari  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  lin. longis  $\frac{1}{2}$ -1 poll. latis subrepandis). Caulis basi ramosus, ramis basi geniculatis et subinde repentibus, ad alt. pedis dimidii assurgentibus. Spicæ laxiores, quam R. genuflexæ, bracteis brevioribus. Calyx vel quadripartitus alisque vestigio laciniæ superioris, vel laciniæ quintæ exiguaque instructus. Corolla 2½ lin. longa, albida, labii disco ruguloso purpureo picto; laciniæ laterales mediæ angustiores. Capsula 3 lin. longa, lanceolata, glabra. Semina obliquè subovata, tuberculata, fusca. (v. in h. Maximil. princip. et Mart.)

46. R. PAUCIFLORA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 123), caule diffuso, juvenili sparsim piloso, foliis ovalibus utrinque acutis sparsim pilosis glabrescentibus, spicæ terminali pedunculata laxa basi interrupta, rhachi hirsutæ, floribus oppositis, bracteis bracteolisque subulatis subæqualibus calyce brevioribus hispidis, calycis laciniis 4 lanceolatis pubescenti-hispidis, quintæ exigua setacea.  $\mathcal{L}$  In locis humidis prope Camapuan in Brasiliam (Riedel ! in h. ac. petrop. n. 42 et 672). A R. Chamaedryoidæ præcipue differt foliorum figurâ, quippe quorum inferiora cum petiolo trilineari 1½ poll. longa, 10 lin. lata, reliqua a 2 poll. longis 9 lin. latis ad  $1\frac{1}{2}$  poll. longa 6 lin. lata, fere lanceolata transeunt. Rhachis spicæ hirsutior est. Flores magis inter se distant, præsertim inferiores. Au var. R. chamaedryoidis? Suffrutex est pedalis. Flores albi ex Riedel. (v. in h. petrop.)

47. R. PIAUHIENSIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 124), caule diffuso patentè-hirsuto, foliis ovatis apice angustiore obtusis e basi rotundata in petiolum brevem attenuatis laxe pubescentibus spicæ terminali pedunculata elongata, rhachi calycibusque cum bracteis hirsutis, floribus oppositis discretis, bracteis bracteolisque subulatis inæqualibus calyce plus duplo brevioribus, calycis laciniis 4 subulatis quintæ exigua.  $\mathcal{L}$  In prov. Piauhiensi Brasiliæ locis colliculosis umbrosis inter Lagoa Comprida et Corimata, Februario (Gardner! n. 2290 in h. Bentham et Hooker!). Differt a R. pauciflorâ hirsutie caulis rhacheos et calycum multo densiore et longiore patentissimâ canescentiam provocante et spicæ longiore pauciflorâ. Calyces breviores sunt, 2 lin. longi. Bracteæ lin. 1 vix longæ, bracteolæ duplo fere breviores bracteis. Corolla

pallide purpurea, 3 lin. longa; palati plaga lanceolata, elevata, canaliculata, subtiliter oblique striata, marginibus elevatis acutis. (v. in h. Hooker et Ben tham).

48. R. HOOKERIANA, caule quadrifolico, superne laxe piloso-lineato inferius glabrescente, foliis ovatis cuspidulato-mucronatis in costis puberulis, spicæ terminali simplici laxiusculâ, floribus oppositis, bracteis bracteolisque e basi ovatâ subulatis ciliatis calycis quadripartiti laciniis subulatis ciliatisque duplo brevioribus, corolla labii tubo subdupo brevioribus.  $\mathcal{L}$  Ad Sesuya, Chachapoyas in Peruviâ (Mathews! n. 3512 in h. Hooker, ex parte cum R. cuspidulata). Caulis laxior quam in R. cuspidulata, inferne glaber. Folia pollicem longa, 10 lin. lata, in specimine principali basi obtusissima, apice parum attenuata cum cuspidulo, subinde obtusissima præter costas glabra; petioli longiusculi. Spica 2-6 poll. longa, rhachi quadrangulari-compressa laxe puberula. Calycis laciniæ a basi attenuatae. Corolla purpurea, pollicaris, labiis 3½-4 lin. longis angustioribus quam in R. cuspidulata, tubo angusto deorsum angustiore. (v. in h. Hooker).

$\beta$ .? foliis ovalibus basi acutis, spicâ breviore. — Cum formâ  $\alpha$ , specimen incompletum.

49. R. CUSPIDULATA, caule geniculato adscendente lineatim piloso, foliis oval-oblongis (ovalibus) obtusis cuspidulato-mucronatis basi acutis supra laxe subtus subtomentoso-pubescentibus spicâ terminali simplici sessili densiusculâ pubescente floribus oppositis, bracteis bracteolisque subulatis æqualibus calyce duplo brevioribus, calycis 4-partiti laciniis lanceolato-linearibus acutis pubescenti-ciliatis, corollæ labiis tubo longioribus.  $\mathcal{L}$  Ad Sesuya, Chachapoyas in Peruviâ (Mathews! n. 3152 in h. Hooker, ex parte cum R. Hookeriana). Folia 1½-2 poll. longa, 7-12 lin. lata, summa subinde minora et suborbiculata. Spica 2-3 lin. longa, rhachi dense pubescente. Corolla rubicunda, labio inferiore lato 6 lin. longo palato oblongo elevato valde rugoso. (v. in h. Hooker).

50. R. ONLONGA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 124), caule basi repente geniculato-adscendente erecto pilis recurvis hirto, foliis oblongis acutiusculis in petiolum brevissimum attenuatis laxe hispidulis, spicâ terminali trifidâ trichotomâve basi foliosâ, partialibus pedunculatis densiusculâ, floribus oppositis approximatis, bracteis bracteolisque linearisubulatis æqualibus calyce brevioribus calycisque quadripartiti laciniis lanceolato-subulatis pubescenti-scabris.  $\mathcal{L}$  Ad Porto Alegro, Rio Grande, Sta Lucia et prope S. Laurenço Brasiliæ, locis usid ad ripas fluviorum, Maio, Junio (Sellow! in h. reg. berol. n. 2 et 116). Differt a R. chamædryoide et pauciflorâ jam solis foliis angustioribus regulariter oblongis et subsessilibus; a priore etiam bracteis bracteolis calycibusque minime hirsutis, tum caule præsentim superiora versus dense hirto vel etiam hirsuto haud diffuso, spicisque densioribus spicam compositam terminalem efficientibus. Folia superiora 2½-2½ poll. longa, 9-11 lin. lata, infra apicem sœpe acutum repando-crenata utrinque lineolata pilisque brevibus hirta; inferiora breviora, obtusiuscula, basi magis attenuata, suprema ad basin spicæ terminalis et primariae divisionis unguiculares. Spicæ 2-3 poll. longæ. Calyx 3 lin. longus. Corolla ut in R. chamædryoide. Capsula 3 lin. longa, scabra, pallida, dorso sulcata et supra medium utrinque stricta. (v. in h. berol.)

51. R. LAVANDULÆFOLIA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 124), glabra, caule erecto obtuse quadrangulare, foliis linearis oblongis sessilibus aveniis, calycis quadripartiti laciniis subulatis æqualibus, corollâ palato acute marginato spicis in caule ramisque terminalibus subfastigiatis, floribus distantibus oppositis bracteis bracteolisque lanceolato-subulatis, illis calycem æquantibus paulo longioribus, hic calyce brevioribus.  $\mathfrak{Z}$  Ad Corgo Pian Brasiliæ (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 2188), in uliginosis prov. Goyaz, prope Natividade, Decembri (Gardner! n. 3412 in h. Bentham et Hooker). Justicia lavandulæfolia Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 2188. Distinctissima foliis linearibus 1<sup>½</sup> poll.

longis neque  $\frac{1}{2}$  lin. latis omnino sessilibus obtusissimis et propter ramos costales, fere parallelos, ad speciem nervoso-striatis. Caulis circiter pedalis, strictus. Spicæ 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longæ, brevipedunculatæ, glabræ. Bractæ lanceolato-subulatae, inferiores præsertim calyce longiores. Calyx 2 lin. longus, omnino sessilis. Corolla 3 $\frac{1}{2}$  lin. longa, pallide purpurascens, labii inferioris lacinia brevibus obtusis, palati gibbo valde elevato, canaliculato, marginibus acutis elevatis. Antheræ loculi distantes, basi brevissime mucronati. Fructus deest. (v. in h. vindob., Hooker, Bentham).

52. R. LINEARIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 125), caule birsutissimo, foliis linearibus obtusis pilosis, calycis quadripartiti lacinia equalibus lineari-acuminatis, spicæ terminali solitaria, floribus subdistantibus oppositis, bracteis a basi ovata subulatis bracteolisque lineari-subulatis calyce brevioribus calyceque hirsutis. (I) In paludibus Cujabæ prov. Minarum Generalium, Februario (Riedel ! in h. acad. petrop.), ex eadem prov. (h. mus. paris.! n. 240). A R. lavandulæfoliâ differt hirsutie in caule maxime confertâ patente, alia ut taceam. Rhizoma crassiusculum, fibris validis. Caulis erectus, simplex, quadrangularis. Folia sessilia, apicem versus parum attenuata, 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, lin. 1 lata, utriusque pilis plus minus sparsis vestita, inferiora distantia, minora; infima vix 1 $\frac{1}{2}$  lin. longa, ovalia. Spica pollicaris, in pedunculo semipollucari longiorive pilosa vel hirsuta. Florum oppositorum juga 4-5. Calyx 3 lin. longus. Corolla cœrulea, 5 lin. longa, labio inferiore lato convexo trifido, palato rugoso-reticulato. Capsula longitudine calycis. (v. in h. petrop., paris. et Hooker).

53. R. LINDENIANA, glabra, caule suffruticoso basi repente ramoso, foliis lanceolato-linearibus obtusis in petiolum brevissimum acute desinentibus punctulatis, spicis axillaribus subterminalibus pedunculatis folio longioribus laxiusculis, floribus oppositis, bracteis bracteolisque subulatis subequalibus calyce brevioribus, calycis lacinia quatuor lanceolatis acutis cum bracteis glabris, quintâ duplo minore filiformi. ♀ In saxis ad Rio Teapa fluvium prop. Tabasco, Aprili (Linden! n. 182 in h. Hooker). Habitus Hyssopi. Suffrutex pedalis, diffusus, ramis compresso-tetragonis flexuosis. Folia pollicaria, liu. 1 lata basin et apicem versus parum attenuata, laxe venulosa, lète viridia. Calyx 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus. Corolla 3 lin. longa, cœrulea e Linden. (v. in h. Hooker).

54. R. DISTORTA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 125), caule fruticoso diffuso geniculato ramosissimo villoso, foliis e basi obtusâ lanceolato-attenuatis supra laxe hirsutis subtus bolosericeo-mollibus, rhachibus subvelutinis, bracteis bracteolisque subulatis calyce brevioribus unifloris, calyce quadripartito lacinia lanceolatis subulato-acuminatis glabris spicis axillaribus spicam terminalem caulis ramorumque secundam basi foliosam exhibentibus secundifloris. ♂ In ditione fluvii Parayba Brasilæ (Sellow ! in h. reg. berol. n. 3. [B. 1418, c. 468] et 115! [1418]). Similis R. dasyclade, differt caule lignoso densius viloso pubescentia molliore (estate glabrescente) ad genicula infracto et magis incrassato, ramis, præsertim superioribus, secundis basi nudis apicem versus jugis duobus singulove foliorum, e quorum angulo exteriori singulæ spicas oriuntur cum spicæ terminali spicam compositam secundam basi foliosam exhibentes, porro foliis angustioribus statimque a basi fere attenuatis (repando-crenatis) subtus densissime at subtilissime holosericeis, neque glabris, nec margine ciliatis (3 $\frac{1}{2}$  poll. longis, prope a basi 6-8 lin. latis, brevissime petiolatis), calyce glabro longiore (4 $\frac{1}{2}$  lin. longo), corollâ majore (9-10 longâ, tubo respectu limbi longiore basi incurvo), antherarum loculis contiguis. Rhacées apicem versus glabrescant. Corollæ plaga palatina acute marginata, pectinatim laxe venosa, sulco medio insculpta. (v. in b. berol.)

55. R. INEQUALIS, glabra, caule fruticoso? diffuso geniculato ramosissimo, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis in petiolum longum cuveatim decurrentibus argute acuminatis, bracteis bracteolisque subulatis calyce brevioribus unifloris, spicis axillaribus pedunculatis simplicibus pedunculo subdiphylo cum terminali bi-trifida spicam terminalem caulis ramorumque basi foliosam exhi-

hentibus, paucifloris secundifloris, calyce quadripartito laciniis lanceolatis subulato-auminatis glabris.  $\delta$ ?  $\mathcal{L}$ ? In regione temperata in Rancho do Palo Hueco, Guatimalæ, Decembri (Hartweg!). Justicia inaequalis Benthum l pl. Hartweg. p. 80 n. 553. Similis R. distortæ, a quâ differt glabritate, foliis longe petiolatis (supra, nec subtus, ut l. e. scriptum exstut) pilis brevissimis sparsis præsertim apicem versus præditis, corollâ dimidio majore  $1\frac{1}{2}$  poll. longâ. (v. in h. Benth. et Hook.).

56. R. SYMPHYANTHA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 125), glabra, foliis oblongis apice longe attenuatis basi aenatis (rarius obtusis), spicis axillaribus terminalibusque compositis pedunculatis cylindricis densiusculis, floribus binis quaternis quinvis in rhachi brevissimâ bracteæ linearilanceolatae brevi connatae seriatim contiguous sessilibus erctotis, bracteolis cylindricis que laciniis setaceis glanduloso-pubescentibus, laciniâ superâ plus duplo minore.  $\mathcal{L}$  In silvis ad Engenho da Ponte prov. Bahiensis, Decembri (Martius), (Sellow! in h. reg. berol. n. 242), locis humidis silvarum prov. Bahiensis (Blanchet! in h. Moricand n. 660 et 3129). Caulis succulentus, siccando collabescens, pluripedalis, basi repeuis. Folia 5-6 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, basi rotundato acuta, apice in acumen longum angustum obtusiusculum obliquum attenuata, glabra, mollia; petiolus brevis, in aliis paulo longior. Spicæ terminales ternæ; media reliquis paulo longior, 3-4 poll. longa; axillares folium subæquantes, subinde geminæ, interiore minore. Bracteæ lanceolatae, acutæ, glomerulum suum æquantes, 3 lin. longæ, glanduloso-pubescentes. Singularis in hac specie est glomeruli structura, utpote cuius rhachilla simplex, circiter  $1\frac{1}{2}$  lin. longa, tota bracteæ adnata 2 ad 6 calyces in una serie sursum spectantes contingens sessiles proferat. Bracteolæ calyce 4 lin. longo paulo breviores. Calycis laciniæ apice setaceæ, longe ciliatae; superior duplo brevior, setacea, angustissima. Corolla  $3\frac{1}{2}$  lin. longa, rosea. Capsula 3 lin. longa, straminea, pubescens. (v. in h. Mouac., berol. et Moricand).

$\beta$ ? *obtusifolia*, foliis apice parum attenuatis obtusis, spicâ terminali solitaria geminâ. — Quod ad habitum accedit R. genuflexæ, sed differt glabritate et floribus salem hinc inde conseriatis, sœpe autem et solitariis. Caulis scandens. Corolle labium superius violaceum; inferius violaceum striis saturioribus. An propria species?

$\gamma$ ? *subpaniculata*, foliis basi magis obtusis, spicis axillaribus terminalique compositis (Blanchet! n. 3132), in fruticetis prope Ilhéos, Februario (h. acad. petrop.! n. 744).

57. R. LETA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 126), glaberrima, caule adscendente? foliis lanceolatis longe acuminatis basi in petiolum acute desinenteribus irregulariter repando-crenatis, spicis axillaribus terminalique vel simplicibus vel basi trifidis laxis oppositifloris, bracteis ovatis apice subulatis bracteolisque calycisque laciniis linearis-subulatis appressis, calyx bracteis duplo longiore solitario subquinquepartito, calyx laciniâ superâ multo minore setacea.  $\mathcal{L}$  In silvis cœdibus montis Corcovado prov. Rio de Janeiro, Octobri (Martius! Riedel! in h. acad. petrop. n. 1105, Gardner! n. 177 in h. Hooker et Mertens! ex R'o Janeiro in codem h.), in Serrâ Grande Brasiliæ (Schott! in h. mus. palat. vindob. n. 4731), in Brasiliae loco non accuratus indicato (Sellow! in h. reg. berol. n. 126 et 147). Justicia leta Mart. adnot. n. 244. Justicia salicaria Pohl! ic. in h. mus. vindob. n. 4731. Similis R. dasyclado, sed distincta glabritate, foliorum acumine angustiore, sœpe et argutissimo, basique acuta, spicis propter calyces bracteasque subdepressas angustioribus, etiam glabris, etc. Calyx 2 lin. longus, laciniâ dorsali multo minore setacea. Corolla 5-6 lin. longa flavo-centri-albido-virens (alba, Riedel); labium inferius latum, trilobum, convexum medio roseum striis parallelis transversalibus albis (Martius). Capsula 6 lin. longa, lanceolata, basi valde attenuata, a medio in dorso uisulcata, 4-sperma. Semina rufa. Variat spicâ terminali solitariâ axillaribus nullis, vel harum unâ alterâve accedente cunctis

simplicibus geminisve ternisve. (v. in h. monac., petrop., berol., vindob., Mart., Hooker, etc.)

58. R. DASYCLADOS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 126), caule procumbente adscendente, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi obtusisusculis glabris, spicâ terminali solitariâ geminâve laxiusculâ subsecuendâ, bracteis bracteolisque subulatis scabris calyce brevioribus unifloris, oppositâ sœpe sterili, calyce subquinquepartito laciniis 4 lineari-acuminatis, quintâ exiguae setacea vel deficiente.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ. Caulis 2-3-pedalis, teretiusculus, inferne glaber, superiora versus lineis duabus pilorum patentium e foliis decurrentibus vel undique etiam hirsutus, ramosus. Folia 2-3 poll. longa,  $\frac{2}{3}$  poll. lata, apicem versu attenuata, basi obtusa in petiolum brevem acute desinentia, raro fere cordata. Spica terminalis 1-3-4 poll. longa, additâ sœpe alterâ minore, pedunculata. Flores sœpe alterni, unilaterales, raro oppositi, sessiles. Calyx 5 lin. longus, internodia rhacheos æquans, laciniis 4 lineari-acuminatis strictis hispidulo-scabris æqualibus, quinta vel nulla omnino vel exigua setacea <sup>supera</sup>. Corolla 8 lin. longa; labium superius brevius, ovatum, concavum, violaceum, inferius trilobum, lobis ovatis obtusis dilatius violaceis, disco medio sulcato et lineis biserialibus transversalibus violaceo-sanguineis picto. Antherarum loculi omnino discreti, superior transversalis, sursum delhiscens.

$\alpha$ . caule lineis oppositis subinde confluentibus hirsuto, corollæ tubo crassiore. — Inier Lagoa Dourada et Camabuão prædia prov. Minarum Generaliu, Februario, Martio (Martius!), in Brasiliâ loco speciatimi non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 101). Justicia dasyclados Mart. observ. n. 737. (v. in h. monac. et berol.)

$\alpha^*$ . spicâ laxiore, floribus fere omnibus secundis.

$\alpha^{**}$ . spicâ densiore, fere insque ad apicem oppositiflorâ (caule valde hirsuto, foliis subtus in costis pilosis). — Prope Rio de Janeiro (Riedel! in h. acad. petrop. et Nees; Gardner! in h. Bentham. n. 5577), in minis generalibus Brasiliæ (Langsdorff in h. Hooker). (v. in h. petrop., Bentham, Hooker.)

$\beta$ . glaberrima, corollæ tubo graciliore. — Flores violacei vel cœrulei. Caulis 2-4-pedalis, pallide lineolatus. — In silvis prope Ypanema, Martio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 1985).

59. R. AMAZONICA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 127), caule basi repente geniculato apice adscendente lineis subinde confluentibus putescente, foliis lanceolatis utrinque attenuatis obtusis glabris dense lineolatis, spicâ terminali solitariâ densiusculâ, bracteis bracteolisque subulatis scabris calyce brevioribus unifloris, floribus oppositis, calycis quadripartiti laciniis lanceolato-linearibus subulato-acuminatis scabris.  $\mathcal{U}$  Ad rivulum Amazonum (Pœppig! n. 2156 in h. reg. berol. et in h. DC!). Differt a R. dasyclado et lœtâ foliis minoribus basi magis (in petiolum sat longum) attenuatis, apice minus attenuatis acumine magis obtuso, tum flore minore; a R. lœtâ insuper calyce quadripartito et caule plus minus pubescente atque subhirsuto. Folia vix 2 poll. longa,  $3\frac{1}{2}$  4 lin. lata, irregulariter repanda, margine scabra, supra præseritim dense lineolata, inferiora breviora. Spica brevis, subsessilis. Calyx  $2\frac{1}{2}$  lin. longus. Corolla purpurascens 9 lin. longa; labium inferius obovatum, trilobum, palati plagiæ pubescente subovata, subtiliter et obsolete pectinatum venosâ. Antherarum loculi oblongi, æquales, inferior verticalis, <sup>superior</sup> obliquus. (v. in h. berol. et DC.)

60. R. SPECIOSA, caule procumbente adscendente pubescenti-hirto ramosissimo, foliis ovali-oblongis acuminatis basique acutâ in brevem petiolum desinentibus, spicâ terminali solitariâ simplici folia æquante densiusculâ oppositiflora, bracteis bracteolisque unifloris et basi subovalâ subulatis calyce subduplici brevioribus glabris, calycibus subquinquepartitis glabris laciniâ superiore brevissimâ dentiformi, corollâ angustâ elongatâ palato lœvi.  $\mathcal{U}$  Ad rivulos prope la Guayna in Columbiâ, Maio (Moritz! n. 425 in h. gen. berol.), Cumana

Füncke! in h. Hooker!). Corolla quam in R. dasyclado duplo longior, nec latior, purpurea. Palatum lœve. Laciniæ labii inferioris oblongæ. (v. in h. berol. et Hooker).

61. R. BREVIFLORA, caule adscendente ? apicem versus pubescenti-lineato, foliis oblongis acuminatis basi attenuatâ in petiolum brevem decurrentibus glabris utrinque lineolatis ramis costalibus (8-9) subtus prominulis, spicâ terminali solitariâ densiusculâ subsessili, floribus oppositis, bracteis bracteolisque et calycis quadripartiti laciniis subulatis glabris his bracteis duplo longioribus collarib. tubum æquantibus.  $\mathcal{L}$  Ad Chiapas, Martio ( Linden ! h. austr. n. 184 in h. Hooker). Folia 6-7 poll. longa, 2 poll. lata, lœte viridia. Calyx 3 lin. longus. Corolla 5 lin. longa, cœrulea; labium inferius latum, trilobum, longitude tubi, disco venoso (v. in h. Hooker).
62. R. CARACASANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 127), caule basi repente adscendente glabro, spicâ terminali solitariâ geminâve simplici bifidâ laxiusculâ oppositiflorâ, bracteis bracteolisque subulatis scabris calyce quadripartito brevioribus unifloris, foliis lanceolatis apice attenuatis basi obtusiusculis glabris.  $\mathcal{L}$  In Miuis Generalibus Brasiliæ (Ackermann! in h. Mart.), ad Caracas reg. mexic. (Jacq.), in Mexico (Mairet de la Chaux-de-Fond ! in h. DC.). Justicia Caracasana Jacq. coll. 4 p. 116, ic. 2 t. 206, Vahl en. 1 p. 153, n. 100, Willd. sp. pl. 1 p. 93, ed. Dietr. 1 n. 388, R. et Sch. syst. I p. 159. Justicia Ackermannii Mart. in sched. Caulis firmus, pluripedalis, primo articulo repens, omnino glaber, quâ notâ magisque floribus oppositis a R. dasyclado differt. Folia majora sunt, scil. 5-6 poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, e basi obtusâ in petiolum brevissimum acute desinentia. Calyx 3 $\frac{1}{2}$  lin. longus, quadrifidus; corolla 5 lin. longa; flos igitur minor, quam in R. dasyclado. Discus labii inferioris utrinque callo distincto longitudinali instructus est, ex quo latera labii deflectuntur. Justicia Caracasana h. Willd. n. 343 e Caribæis est R. secunda. (v. in h. Mart. et DC.)
63. R. ANDROSÆMIFOLIA, caule geniculato adscendente lineis pubescentibus notato, foliis inferioribus ovato-lanceolatis, superioribus ovatis apice attenuatis vel subovalibus oblongis acumine obtuso, basi e rotunditate in petiolum acute desinentibus glabris, supra in costâ scabris, spicâ terminali solitariâ, floribus oppositis distantibus, bracteis bracteolisque subulatis scabris calyce brevioribus, calycis quadripartiti laciniis lanceolato-linearibus subulato-acuminatis scabris.  $\mathcal{L}$  In insulâ Martinicâ (Sieber!), in insulâ Dominicâ (h. Hooker!). Justicia androsæmifolia Sieb. fl. mixt. n. 380 et 402. Calyx grandiusculus. Corolla pollicaris, labio inferiore lato suborbiculari. Sub hoc nomine in collectionibus Sieberianis (fl. mixt. n. 380) occurunt specimina longe diversa speciei, foliis quidem quod ad figuram accedentibus sed utrinque pubescenti - tomentosis floribusque solitariis ?, cuius quidem examinandæ occasio defuit. (v. in h. Sieb. et Hooker.)
64. R. PECTORALIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 128), caule basi repente adscendente lineâ pilosâ a gemmâ fortiore decurrente sâpè notato alternatim bisulculato, foliis lanceolatis longe attenuatis basi acutis brevipetiolatis, spicâ terminali dichotomâ glandulosâ-pubescente filiformi, floribus distantibus secundis, bracteis bracteolisque setaceis calycem æquantibus, calycis quinquepartiti laciniis subulatis superiore minore capillari.  $\mathcal{L}$  In Americâ calidiore. Corolla 4-6 lin. longa, pallide incarnata. Labium inferius purpureum, in disco laciniæ mediæ pectinatim venoso-rugosum. Antherarum loculi ovales, obliqui.
- $\alpha$ . foliis angustioribus a basi apicem versus continuo attenuatis, spicis gracilioribus, caule piloso-lineato. — In Antillis (Brownie), in insulâ Trinitatis et in Martinicâ (Sieber!), S. Domingo (h. DC. !, h. paris. Ehrenberg! n. 72 in h. gen. berol.), in insulâ Martinicâ (Plée! in h. mus. paris. n. 274. vulgo herbe au Charpentier), St-Vincent et Sta Lucia (Anderson!), in Brasilâ (Martius!), in Mexico (Hænke), in

- Guianâ Anglicâ ( Schomb. n. 176, I41 et I372 ), Guianâ Gallicâ ( Le-prieur ! in h. DC. et h. Mus. paris. n. 254 ), Surinam ( Hostmann ! n. 639 in h. Bentham ). Justicia pectoralis Jacq. am. p. 3, t. 3, Vahl en. I p. 144 et h. Willd. sp. pl. ed. Dietr. I p. 395 et h. n. 335 fol. 1, 2, 4, Humb. B. et Kth. nov. gen. et sp. 2 p. 232, Bot. reg. t. 796 (specimen solitus grossius, pingue magisque pubescens ), Sieb. fl. martii. n. 252 et fl. ins. Trinit. n. 136. Justicia procumbens et pectoralis Anderson ! in h. Bentham ex. h. Forsyth. ( v. in h. berol., Willd., vindob., paris., DC., Hook., etc. )
- β. caule glaberrima, foliis paulo latioribus lanceolato-oblongis ante medium latioribus hinc demum apicem versus attenuatis, spicis firmioribus, floribus plerisque oppositis.  $\mathcal{U}$  In silvis umbrosis S. Montigueira prov. Minas-  
rum Generalium, Julio ( Riedel ! in h. acad. petrop. n. 36 et 318 ), ad Caracas ( Moritz ! n. 100 in h. gen. berol. ), S. Domingo ( Swartz ! in h. DC. ), S. Vincent ( Guilding ! in h. Hook. ). Flores ex Riedel albi, labio inferiore violaceo. An distincta species ? ( v. in h. petrop., berol., DC. , Hook. )
- γ. monostachya, spicâ terminali simplici. — Ad Orinocum ( Humboldt ! in h. Willd. ! ). Justicia pectoralis h. Willd. ! n. 331 fol. 3.
65. R. DIVERGENS ( N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. I28 ), caule basi repente adscendente ramisque furcatis divergentibus pubescentibus, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis obtusis basi in petiolum acute decurrentibus glabris, spicis axillaribus oppositis terminalique sessilibus folio brevioribus subsecundifloris pubescentibus, calycis lacinia superâ minimâ setacea.  $\mathfrak{Z}$  In silvis ad Para prov. Paraënsis, Aprili ( Martius ! ). Fruticulus pedalis circiter, caule geniculato 4-sulco. Folia 2-2½ poll. longa, vix 1 poll. lata, supra lineolata, late viridia. Spicas  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longae, sessiles vel subsessiles. Bractæ et bracteolæ subulatae, calyce 2 lin. longo laciinis etiam subulatis pubescentibus plus triplo breviore. Corolla semipollucaris, rubicunda, labio superiore breviori, inferiore lato trilobo disco convexo venoso. Antherarum loculi omnino distantes, semi-ovales. Capsula ( immatura ) parva, pubescens. ( v. in h. monac. )
66. R. LATIFOLIA, fruticosa, caule tereti nodoso apicem versus paniculisque pubescentibus, foliis ovalibus cuspidatis et basi rotundata in petiolum breve acute desinentibus repando-crenatis glabris utrinque lineolato-asperulis, spicis axillaribus oppositis paucifloris pedunculatis folio brevioribus subsecundifloris, bracteis bracteolisque subulatis calyce quadripartito laciinis lanceolatis acuminatis pubescentibus multo brevioribus, corollâ elongata.  $\mathfrak{Z}$  In silvis Teapæ, prov. Tabasco, Octobri et Decembri ( Linden ! h. austr. n. I79 in h. Hooker ! ). Caulis inferne lineolato-scaber. Corolla rubra, fere bipollucaris. Antheræ loculi deorsum valde divergentes. Spicæ 3-2-1-floræ. Folia cum petiolo 3-linari 5 pollices longa, 2-2½ poll. lata. ( v. in h. Hook. )
67. R. POLYGONOIDES, caule basi repente apice adscendente ramoso lineis pubescentibus notato, foliis lanceolatis in acumen longum obtusiusculum attenuatis basi in petiolum brevissimum acute decurrentibus confertim lineolatis et subtus in costis scabris bracteis bracteolisque subulatis margine subciliatis, his calyce brevioribus unifloris, spicis axillaribus terminalique solitaria laxis, floribus oppositis, calycis quadripartiti laciinis linearis-subulatis margine ciliato-scabris.  $\mathcal{U}$  In convalli huminum Caucæ inter Popayan et Carthago alt. 500 hexapod., Octobri ( Humboldt ). Justicia polygonoides Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 232, Willd. sp. pl. ed. Dietr. I p. 401. Justicia suaveolens h. Willd. ! n. 336. A R. Amazonicâ differt foliis brevissimo petiolo praeditis, a R. Caracasanâ glabrescente floribus minoribus et foliis non argute acuminatis. An prioris var.? Herba suaveolens. Corolla ex Humb. alba, violaceo-striata. ( v. in h. Willd. )
- β. ? calyce hand ciliato, parumper scabro, subquinquepartito, laciñia superiore exigua setacea. — In Mexico ( Ehrenberg ! in h. gen. berol. ). Pala-

tum corollæ evidenter rugosum. Folia supra in costis marginuequac laxe puberula ). Accedit ad R. dasycladum, sed differt foliis apice minus attenuatis. ( v. in h. berol. )

68. R. SCABRA, caule basi ramoso pubescenti-lineato, foliis anguste lanceolatis utriusque attenuatis acuminae obtuso scabris in petiolum brevem decurrentibus, spicis terminalibus geminis ternis folia æquantibus simplicibus brevipedunculatis ex omni parte subtilissimè glanduloso-scabris densiusculis, floribus (plerisque) oppositis, bracteis bracteolisque subulatis calyce brevioribus, calycis quinquepartiti lacinias subulatis superiore minore.  $\mathcal{U}$  Patria . . . Justicia pectoralis h. Willd! n. 335. fol. 5. Differt a R. pectorali foliis angustioribus basi magis attenuatis utrinque setulis exiguis microscopicis scabris, bracteis brevioribus, etc. Calycis lacinia superior rigidior est, quam in R. pectorali. ( v. in h. Willd. )

69. R. ACUMINATA, caule herbaceo erecto angulato inferne glabro, apicem versus piloso, foliis lanceolatis acuminatis basi obtusa in petiolum brevissimum desinentibus glabris, spicâ terminali compositâ decompositâ filiformi, ramis verticillatis subæqualibus inferne patenti-pilosus superius pubescenti-viscidulis simplicibus apice bifidis, floribus approximatis secundis solitariis, bracteis bracteolisque calyce duplo brevioribus calycisque quinquepartiti ( subinde et quadripartiti æqualis ) lacinias subulatis viscidulo-scabris.  $\odot$  In paludosis ad flumen Teapa prov. Tabasco, Febrero ( Linden! n. 1633 in h. Hook. ), ad Caracas ( Moritz! n. 109 in h. gen. berol. ). Distinctissima foliis valde acuminatis 5 poll. longis 10-11 lin. latis subsessilibus et spicis terminalibus paniculatis gracilissimis, floribus minimis, calyce vix linea 1 longiore, corollâ  $1\frac{1}{2}$  lin. longâ. Flores coerulei. Caulis medullâ amplâ sarcutus, levis. Rami paniculæ dum aquâ humectantur flaccidi, a basi bi-tripartiti ideoque ad speciem verticillati. Similis R. verticillari. ( v. in h. Hooker et berol. )

70. P. LONGIFLORA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 128), caule adscendentis subquadangulari elongato, foliis ovato-oblongis apice attenuatis subtus confertim lincolatis, inferioribus subinde basi abrupte cuneatis, spicis axillaribus terminalique di-trichotomis pubescentibus pube brevissimâ floribus distantibus secundis, bracteis bracteolisque setaceis, illis calycem æquantibus, calycis quinquepartiti lacinia superiore duplo minore setacea.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ. R. pectorali subsimilis, differt statura majore ( 1-3-pedali ), pubescentia exiguâ quidem at, ubi adest, densiore, foliis latioribus majoribus 4-3 poll. longis  $1\frac{1}{2}$ -1 poll. latis apice valde attenuatis, basi (inferioribus præsertim) ex rotunditate cuneatim in petiolum longe decurrentibus, floribus denique longe majoribus ( 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longis ). Folia superiora in aliis longiora et oblongo-lanceolata. Calyx 2 lin. longus, lacinias linearis subulatis canescenti-scabris. Flores inæqualiter sanguinei ex Riedel. Antherarum louuli ovales, sursum deorsumque inclinati.

$\alpha$ . caule rhachique dense pubescentibus canescientibus, flore majore. — In silvis umbrosis prope Præsidio, prov. Minarum Generalium, Julio in anthesi ( Riedel! in h. acad. petrop. n. 7 et 334 ). ( v. in h. petrop. et Hooker ).

$\beta$ . misera, caule glabro rarissime lineis pubescentibus obsoletis notato, corollâ minore ( 10 lin.-1 poll. longâ ). — Ad Agoa gentem in silvis ad fluviorum ripas ( Schott ! in h. mus. palat. vindob. n. 4725 ). Justicia misera Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 4725 demum corollâ et staminibus, que non sunt hujus plantæ. ( v. in h. vindob. et Hooker ).

71. R. VERTICILLARIS, caule herbaceo cresto compresso-angulato lineis hirtulis lati notato, foliis lanceolatis pubescenti-scabris obtuse acuminatis basi longe cuneatâ in petiolum longiusculum desinentibus, spicâ terminali compositâ decompositâ scabri filiformi ramis verticillatis inæqualibus, floribus distantibus secundis solitariis subglomeratisque, bracteis bracteolisque triangularibus calyce duplo brevioribus, calycis lacinias lanceolato-linearibus acutiusculis,

quintâ duplo breviore neque angustiore. ♂? In Portorico (Plée! in h. Mus. paris. n. 268). Planta laxa, habitu R. pectoralis, spicis tenuioribus oppositis, superioribus autem verticillatis gracilioribus distincta. Corolla vix 2 lin. longa. Capsula parva. Folia cum petiolo semipollicari 6 poll. longa, 1-1½ poll. lata. Bractæ duas opposite, setaceæ, parvæ sub ramificatione. (v. in h. Mus. paris. et ex hoc in h. Nees).

*Species dubiæ.*

72. *R. BARBATA*, foliis lanceolatis serrulatis, racemis simplicibus interruptis, floribus solitariis oppositis, corollæ labio superiore fornicato emarginato, inferiore breviter trifido, antheris barbatis. ♂ In Antiguâ Guatimalæ (Velasquez). Justicia barbata Bertol. florul. guatim. in. nov. comment. acad. scient. inst. bonon. 4 p. 405. Caulis obscure tetragonus, erectus, ramis oppositis patulis. Folia parva, opposita, lanceolata, acuta, vel acutiuscula, serrulata, brevisime petiolata. Racemi simplices, interrupti, solitarii, terminales cauli ramisque. Flores solitarii, oppositi, longiusculi pedicellati; inferiores remotiores. Bractæ sub quovis flore, similis folio caulinò, pedicello sublongior. Calyx quadrifidus, lacinias lanceolatis acuminatis patulis, 5-6 lineas longus, pedicello proprio subæqualis. Corolla crasse tubulosa, pollicaris et ultra, extus puberula, bilabiata, labio superiore fornicato emarginato, ore barbato, labio inferiore paulo brevior breviter trifido, lacinias obtusis utrinque pubescens. Stamina duo, corollæ subæqualia, antheris crassis ovato-sagittatis obtusis barbatis. Stylus exsertus, stigmate clavato, obtuso. Capsula ovoidea, acuta, glabra, calyce brevior. Tota planta, corollis et antheris exceptis, glabra.
73. *R. CORYNULOSA*, foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis integrerrimis, racemo terminali composito elongato, partialibus corymbulosis, calycibus quadrifidis. ♂ In Esquintâ Guatimalæ (Velasquez). Justicia corymbulosa Bert. florul. guatimal. in nov. comment. acad. scient. inst. bonon. 4 p. 404. Caulis obscure tetragonus. Folia opposita, breviter petiolata, oblongo-lanceolata, acuminata, integrerrima, tres-quinque poll. longa. Petioli supra canaliculati, triquadrilateræ. Racemus terminalis, compositus, elongatus, interruptus, racemulis partialibus oppositis, in axilla bractæ lanceolato-linearis acuminatae breviter pedunculatis uniformibus corymbulosis, bracteolis lanceolatis acuminatis ad eorum divisiones. Calyx simplex, quadrifidus, lacinias lanceolato-lineariibus acuminatis corollâ multo brevior. Corolla tubulosa, gracilis, octo-decem lineas longa, limbo brevi paulo latiore bilabiata, labii subæqualibus, superiore bifido, inferiore trifido, lacinias acutis. Stamina duo, ad faucem corollæ producta. Antheræ cordato-oblongæ. Stylus corollæ subæqualis. Tota planta glabra.
74. *R. PUNCTATA*, foliis lanceolato-ovatis, spicis terminalibus, floribus remotis verticillatis, bractæ lanceolatis acuminatis calyce brevioribus. ♀ In Arabiâ Felici (Vahl). Justicia punctata Vahl symb. 2 p. 15, en. 1 p. 142, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 394. Dianthera punctata Vahl symb. 1 p. 4. Dianthera Americana ♂ alba Forsk. deser. p. 9. Corolla alba, violaceo-punctata. Antheræ muticæ.

CXI. *AMPHISCOPIA N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77 et 112, in Lindl. intr. ed. 2 p. 285 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 129, Endl. gen. p. 706, Meisn. gen. p. 297 (205). — Orthotacti spec. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 131. — Justicia spec. Linn., Vahl et alior.*

Calyx profunde quinquepartitus, æqualis, parvus. Corolla ringens, labio inferiore trifido. Stamina duo; antheræ biloculares, muticæ, loculis uno super altero positis, vel distantibus et in connectivi elongati finibus altero sursum altero retrorsum spectante (Euamphiscopæ), vel contiguis (Orthotacti). Stigma simplex. Capsula ad medium usque asperma valvulis plano contiguis, in superiori parte bilocularis et inferius tetrasperma deppressa. Dissepimentum persistens. Semina compressa, retinaculis suffulta.

— Herbæ vel frutices Americæ tropicæ (1). Spicæ axillares, oppositæ vel terminalis composita, secundæ, bracteatæ, ramulis secundifloris. Bracteæ florales latæ, basi in petiolum latiusculum contractæ pedicelloque brevissimo connatæ. Bracteolæ parvæ.

### Sectio I. EUAMPHISCOPIA.

Loculi antherarum distantes.

1. A. **POLYSTACHYÀ**, foliis oblongo-lanceolatis lanceolatis hrevipetiolatis ad costas cauleaque quadrangulari pubescentibus spicis axillaribus oppositis simplificibus, bracteis fertilibus ovalibus sterilibus dimidiato-ovatis bracteolisque subfalcatis ciliatis. 3 In Guianâ Gallicâ (Richard! Vahl! ex h. Rohr, h. Bentham et h. acad. petrop. n. 165 ex h. Mus. paris.; Leprieur! in h. DC. in h. Nees ex h. Mus. paris. n. 256 et 267 et in h. Bentham), ad Cayenne (h. DC!), in silvis umbrosis ad Rio Madeira Brasiliae (Riedel! in h. acad. petrop. n. 33 et 1331). *Justicia polystachya* Lam. ill. p. 40, Vahl! symb. 2 p. 7, t. 26, en. 1 p. 138, et h., Willd! sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 409 n. 126 et h. n. 324. *Justicia membranacea* Rich. act. soc. hist. nat. paris. 1 p. 105. Caulis bipedalis, basi repens; anguli alterni strigoso-hirti. Spica in pedicello brevissimo sæpe geminata, altera multo breviore. Bracteæ obtusiusculæ, dorsales 3 lin. longæ, dimidiato-ovatae, floriferæ 4 lin. longæ, ovatae, subæquilateræ. Bracteolæ dimidiatae, modo e basi latiore acuminatae modo dimidiato-lanceolatae, teneriores, dimidiati pectinato-venosæ. Corolla 6 lin. longa, albida ex Riedel. Variat foliis oblongis et lanceolatis. (v. in h. paris., petrop., DC., Nees, Bentham, etc.)
2. A. **BEYRICHI** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 130), foliis oblongis acuminatis in petiolum longum undulatum attenuatis glabris, spicis axillaribus terminalique compositis, bracteis subrotundis retusis ciliatis. 3 In rupibus umbrosis silvarum in Serra d'Estrella, Augusto (Beyrich), prope Mandioccam, Novembri, Decembri (Riedel!), ad S. Lucia et Muella in Campos (Sellow! in h. gen. berol. n. 158, 159 [301 et 5993] et 217 [183]), in silvarum montosarum umbrosis, prope Sebastianopolin prov. Rio de Janeiro, Novembri (Martius!), ibidem, Martio (Riedel! in h. acad. petrop.), Nacanos in ead. prov. (Schott! in h. mus. palat. vindob. n. 4748), Pernambuco (Gardner! in h. Moricand et Bentham n. 96), in Brasiliâ (Lund! n. 535 in h. DC.) *Justicia crispata* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 4748. *Justicia numularia* Mart. obs. n. 236. Fruticulus bi-quadripedalis, basi repens deinde ascendens, inferne geniculatus, teres, glabriusculus in parte hornotina subtetragonus tomentosus. Folia 5-6 pollices longa, 1-1½ poll. lata. Corolla 4 lin. longa, apice subpubescens coerulescens (Riedel); labia pulchre venosa, superius convavum, minutim emarginatum, inferius, nec profunde, trifidum, lacinias obtusæ, mediæ latiore rotundata roseæ cum striis confluentibus albis in medio. (v. in h. Beyr., berol., Hooker, etc.)  
 β. *prunellæfolia*, foliis minoribus obtusis. — In Brasiliâ (Pohl l. c.). *Justicia prunellæfolia* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 4745.  
 γ. *humilis*, caule simplici brevi undulato, foliis ovatis obtusis (subtus subtilissime velutinis), spicæ terminali solitaria parvæ. — Pernambuco (Gardner! in h. Moricand n. 841). Folia in apice caulis adproximata, 2½-3½ poll. longa, 1½-2 poll. lata. Inflorescentiæ partes omnino ut in reliquis. (v. in h. Moricand).
3. A. **MIDDLETONI**, foliis oblongis apice longe attenuatis acumine angusto obtusiusculo basi acutâ in petiolum longum angustum desinentibus supra in costis pubescenti-scabris, spicis axillaribus terminalique compositis pedunculatis densis, bracteis obovato-cuneatis obtusis venoso-nervosis reticulatis pu-

(1) Nec non Africæ, si locus nat. A. Middletoni Guineensis, ut videtur ex dictionnariis geographicis nostris verbo non Gaboon sed Gabon. (Alph. DC.)

bescenti-ciliatis. ♂ Gaboon coast in silvis (Johanna R. Capt. Middleton! in h. Benthem ex h. Forsyth). Habitu similis A. Beyrichii, differt foliis longe petiolatis nec in petiolum attenuatis et bracteis haud retusis nec basi adeo contractis. Flores in nostro specimine desunt. Capsula plane ut in A. Beyrichii. Flores pallide rubri ex Middlet. in sched. (v. in h. Benth.)

4. A. RETUSA, herbacea, glabra, foliis ovalibus utrinque attenuatis repando-subcrenatis spicis axillaribus terminalique sessilibus, hracteis obovato-spathulatis bracteolisque conformibus angustioribus hasi longe attenuatis obtusis cum mucronulo laxe imbricatis. 2 In insula St. Crucis (Vahl! West! in h. DC.). Justicia retusa Vahl symb. 2 p. 8, en. 1 p. 136 et h.l., Willd. sp. pl. 1 p. 169. Diichtera retusa Juss. in ann. du mus. 9 p. 263, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 426 et h. Willd. n. 287! Corolla purpurea, speciosa. Capsula magna, depressa. Bracteæ subtilissime ciliatae. (v. in h. DC. et Willd.)
5. A. LANCIFOLIA, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi longe cuneatæ in petiolum longiusculum angustum decurrentibus repandis in costis et margine scabris, spicis infraterminalibus terminalibusque oppositis solitariis geminisve subsessilibus petiolo vix longioribus laxis, bracteis ovali-suborbiculatis brevicutis in petiolum attenuatis ciliatis herbaceis. 2 In Peruvia (Ruiz! in h. gen. berol.). Dianthera lancifolia Tafalla! Ruiz l. c. Caulis sulcis quatuor haud profundis insculptus, pilis brevibus retro adpressis incanus. Folia tenuia, cum petiolo 4-6 poll. longa, 1 poll. lata; petioli 1-1½ poll. longus. Flores hreves, purpurei. Bracteolæ lineares, ciliatae, longitudine calycis. Laciniae calycis tenues, lineari-acuminates, apicem versus laxe ciliatae. Fructus ut in A. Middletoni et inficiente. (v. in h. berol.)
- β. ? minor, foliis oblongis minus attenuatis petiole quo paulo breviore instructis, bracteis alternis orbiculatis rotundatis, hrevissime mucronatis et oblongo-ovalibus acutis. 2 Ad Caracas (Moritz! in h. gen. berol. n. 264). Propria videtur species, licet proxime affius A. lancifoliae. Folia cum petiolo quadrilineari 3 poll. longa, 1 poll. lata, hracteæ majores magis obtusæ. Specimen haud sufficit. (v. in h. berol.)
6. A. INFICIENS, hirsutissima, foliis ovatis acuminatis acumine obtusiusculo e basi rotundata in petiolum acute desinenteribus spicis axillaribus oppositis brevissimi pedunculatis simplicibus petiolo paulo longioribus, bracteis fertilibus ovalibus acutis hirsutis ciliatisque subsessilibus, alterâ breviore, bracteolis linearibus ciliatis. 2 In Andium Peruvia nemoribus ad Pozuzo, Cinchao et Cuehero vicos, Septembri et Octobri (Ruiz! in h. gen. berol.). Justicia inficiens Vahl en. 1 p. 161, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 414. Dianthera hirsuta R. et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 11 t. 13 f. b. Tincturam coeruleam dat exsiccata. Corolla parva. (v. in h. berol.)
7. A. SERPENS, fruticosa, caule ramosissimo divaricato repente, foliis oblongis utrinque attenuatis petiolatis glabris, spicis infra apicem caulis ramorumque axillaribus oppositis simplicibus subglobosis pedunculatis petiolo paulo longioribus, bracteis lanceolatis utrinque attenuatis bracteolisque linearibus acuminatis calyce longioribus ciliatis puberulisque, antheris muticis. ♂ Eseque in Columbiâ, Aprili (Moritz! n. 1276 in h. gen. berol.). Caulis rufus, distortus, juvenilis, petioli et pedunculi pubescentes. Corolla pollicaris, coccinea, pubescens-viscidula. Labium superius et laciniae inferioris lanceolata acuta. (v. in h. berol.)

## Sectio II. ORTHOTACTUS.

Loculi antherarum contigui.

8. A. MORICANDIANA, foliis ovalibus in petiolum cuneiformi-attenuatis obtuse cuspidatis repandis bracteisque orbiculatis subspathulatis rotundatis ciliatis spicâ terminali pedunculata simplici folio breviore. 2 In Brasiliâ (h. Moricand! ex h. Dorvill.). Amphiscopia ciliata Moricand ic. ined. et N. ab E.

in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 130. Ab A. Martiana distinguitur bracteis foliisque ciliatis, ab A. Beyrichii spicâ simplici, foliis in petiolum haud undulatum attenuatis, ciliatis, bracteis majoribus, antherarum loculis minus inter se distantibus. (v. in h. Moricaud).

9. A. STROBILACEA, suffruticosa, pubescens, foliis ovalibus obtusiusculis in petiolum cuneatim attenuatis, spicis axillaribus oppositis folium sequantibus eove paulo longioribus brevipedunculatis, bracteis ovalibus mucronulatis, bracteolis linearibus calyce paulo longioribus, corollæ concoloris? labio inferiore ad palatum gibbo laxe pectinatum venoso longiore. 25? In silvis ad S. Antonio et Alcgre prædia prov. Pernambucensis ad flumen S. Francisci (Martius!), Capocheira in Serrâ Jacobina prov. Bahiensis (Blanchet! pl. bras. n. 2575 in h. mus. palat. vindob. in h. Moricand, Hooker et Benthem). Orthotactus strobilaceus N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 133. Beloperone strobilacea Mart. obs. n. 2431. Radix perennis. Caules plerunque plures, inferue lignosi ramis erectis. Folia præsertim subtus pubescentia. Spica subtetragone. Corolla 1½ poll. longa, pulchre coccinea; antheræ fuscæ, polline flavo. Capsula 6-7 lin. longa, acuta, fusca. Semina rubra, tuberculata (Martius!). Bracteæ semipollicares, venoso-trinerves. Calycis lacinia lanceolatae, acutæ, purpureæ, 2 lin. longæ. (v. in h. Mart., Moric., Hook. et Benth.)
10. A. VENOSA, suffruticosa, pubescens, foliis ovatis in petiolum longum attenuatis repando-subcrenatis spicis axillaribus terminaliæ solitariæ brevipedunculatis folio brevioribus, bracteis ovalibus apiculatis bracteolisque linearis-lanceolatis calyce longioribus reticulatis longe ciliatis, corollæ venosæ labio inferiore ad palatum gibbo pectinatum rugoso-venoso. 3 Ad Rio Maranhão Brasiliæ (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 1849, Schott! ibid. n. 6032). Orthotactus venosus N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 133. Justicia venosa Pohl! in h. Mart. Justicia cristata Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 1849. Similis A. strobilacea, differt imprimis foliis apicem versus magis attenuatis ipso tamen apice obtuso, bracteolis longioribus latioribus venoso-reticulatis bracteisque longioribus ciliis ornatis, et corollæ labiis longioribus, inferiore tripartito lacinia linearis-lanceolatis obtusis, faucium plagâ angustiore lanceolatâ elevatâ pectinatum venosâ rugosâ notatis. Labium superius submarginatum. Corolla purpurascens, venis saturatioribus piota. An varietas A. strobilacea? (v. in h. vindob.)
11. A. AEQUILABRIS, suffruticosa, pubescens, foliis ovalibus utrinque acutis in petiolum decurrentibus in costis pilosulis, spicis axillaribus alternis folium sequantibus brevipedunculatis bracteis oblongis acutis bracteolisque linearibus calyce longioribus ciliatis, corolla concoloris labii inferioris brevis palato parum tumente laxe pectinatum venoso. 3 In Brasiliâ, loco non accuratus indicato (Sellow! in b. reg. berol. n. 174). Orthotactus æquilabris N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 134. Ab A. strobilacea præter characteres supra allatos differt etiam pubescentiâ caulis laxiore et magis sparsâ. Corolla labium inferius longitudine superioris, duplo brevius quam A. strobilacea et venosæ, trifidum lacinia oblongis obtusis. Bracteæ 5 lin. longæ, 2½ lin. latæ, venosæ, longe ciliatae. Corolla pollicaris, coccinea. (v. in h. berol.)
12. A. ROSEA, suffruticosa, caule subtiliter sublineatimque puberulo, foliis oblongo-ovalibus basi cuneatâ in petiolum attenuatis subrepandis glabris subtus in costis puberulis, spicis axillaribus in terminalem compositam coenitibus brevipedunculatis folio brevioribus, bracteis ovatis apiculatis bracteolisque subulatis calycem æquantibus longe ciliatis, corollâ concolore. 3? 2? In silvis Macahensis, Junio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 795). Orthotactus roseus N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 133. Ab A. venosa distinguitur foliis magis acutis tenuioribus 6-8 poll. longis 2-2½ poll. latis magis acutis in petiolum brevem attenuatis fere glabris, bracteolis minoribus

et angustioribus, bracteis latioribus ex rubro fuscis, corollâ minore rubrâ et roseâ concolore (10 lin. longâ) labio inferiore breviore. (v. in h. petrop.)

13. A. MONTANA, fruticosa, foliis ellipticis obtusis cum cuspidulo brevisimo subtus scabris, spicis axillaribus ad apicem confertis folia subequalibus, bracteis patulis spathulato-oblongis. ♂ In summo Brasilie monte Itambé (Martius!). Orthotactus montanus N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. faso. 7 p. 134. Rami rigiduli, apicem versus strigiloso-canis. Folia ad basin et apicem rami conferta, in medio ramo distantia, 1½-2 poll. longa, 11 lin.-1 poll. lata, rigida, integerrima, brevipetiolata, supra nitida, petiolo costisque utrinque strigilosis. Spicae in axillis foliorum superorum opposita, pollicares, laxæ. Rhachis pubescens, articulis cuneiformibus alternantibus compressis. Bractea cruciata, 6 lin. longæ, infima brevior, obovato-spathulata, obtusa, reliqua oblongæ, mucronulatae, basi ouneatae, omnes, praesertim subtus, strigilosoæ, patulis. Bracteolaæ setaceaæ, scabrae. Calyx 3½-4 lin. longus, lacinia lanceolato-subulatis scabris. Corolla 1½ poll. longa, pubescens, purpurea. (v. in h. monac.)

14. A. POHLIANA, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris supra dense lineolatis, spicâ terminali densâ quadrangulari coloratâ sessili, bracteis late ovatis apice complicatis mucronatis recurvis subpubescentibus ciliatis, bracteolis lanceolatis calyce longioribus. ♂ Ad Porto d'Acunha (Pohl! in h. vindob. n. 6031 cum Lagoschilio obtuso), Tres hermaos in Brasiliæ (Sellow! in h. gen. berol. n. 207), in silvis primævis ad Cabo d'Agosto et Villa do Príncipe, prov. Minarum Generalium, Maio (Martius!). Orthotactus Pohlianus N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 174. Porphyrocoma lanceolata Hook. bot. magaz. t. 4176, Morren ann. de Gaud 1846 t. 56. Fruticulus humilis, ramosus, densifolius glaber. apice subherbaceus. Folia cum petiolo mediovi 6 poll. longa, ad summum 1½ poll. lata, basi cuneatim in petiolum longe decurrentia vel penitus in petiolum attenuata, apice plus minus (subinde maxime) attenuata acumine obtuso acutove, repanda superiora et ramea in nonnullis breviora et latiora, magis cuspidata. Spica 2-4 poll. longa (Melampyri cristati). Bractæ 7 lin. longæ, 5½ lin. latæ, basi in formam petioli lati brevissimæ contractæ, complicatae, apice recurvæ, purpureæ, molles, venosæ. Bracteolaæ 4 lin. longæ, ciliatae. Calyx subsessilis, vix 3 lin. longus, lacinia lanceolatis. Corolla violacea, 6-7 lin. longa, glabra. Capsula 5 lin. longa. (v. in h. vindob., berol., Mart., Hooker et v. c.)

*β. angustifolia*, foliis omnibus lanceolatis (9 poll. longis ¾-1¼ poll. latiis), acuminatis. ♂ Ad Engenho do Parayba Brasiliæ, Augusto (Sellow! in h. reg. berol. n. 178 et 250 [1424 c. 479]), in silvis prope Aldea dos Pedros prope Rio Parahybo, Julio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 790), in prov. Minarum Generalium (Gardner! n. 5133, in b. Benthham). Suffrutex ½-1 ped. altus, floribus et bracteis purpureis vel ex purpureo violaceis (Riedel l. c.). (v. in h. berol., petrop., Hooker, Benthham, etc.)

15. A. CILIATA, foliis ellipticis utrinque attenuatis longe petiolatis glabris costatis costis, nervoque medio pubescenti-scabris, spicâ terminali compositâ thyrsoidæ imbricata, bracteis spathulato-lanceolatis bracteolisque linearibus longe ciliatis. ♂ In monte Corcovado prope Rio de Janeiro, Februario (Luschnah in h. Mart.). Orthotactus ciliatus N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 135. Beloperone? ciliata N. ab E. in Mart. h. fl. bras. p. 265 n. 457. Caulis erectus, crassitie pennæ cygneæ, geniculis carnosus. Folia cum petiolo 1-2½ poll. longo 9-11 poll. longa, 3 poll. lata, in petiolum decurrentia, in acumen longum angustum obtusiusculum attenuata. Spica terminalis bipinnipolaris, densissima, subnudans, e fasciculis brevibus compacta, subsecunda. Bractæ 6 lin. longæ, 1-1½ lin. latæ, acutæ, in petiolum attenuatae, dorso et margine pilis longis articulatis hirsutæ. Bracteolaæ calycis longitudine, lineares, hirsuto-ciliatae. Calycis laciniae, 5 lin. longæ, scabrae, margine submembranaceæ. Corolla sesquipinnipolaris, recta, purpurea, glanduloso-pubescentia. (v. in h. Mart.)

*Species dubia.*

16. A. *COMOSA*, foliis ellipticis, tbyrsis terminalibus subimbricatis subcomosis. *Z* In Americâ meridionali. *Justicia comosa* Vahl en. 1 p. 155, Willd. spec. pl. ed. Dietr. 1 p. 397. Caulis tetragonus, glaber. Folia glabra, evenia, 3-4 poll. longa. Thrysus semipedalis e pedunculis geminis, pedicellis partialibus oppositis, floribus sessilibus imbricatis. Bractæ lanceolatæ, villosæ, calyce longiores. Corolla villosa, labio superiore indiviso fornicate. Antberæ altera super alterâ (Vahl l. c.). In b. Vahl deficit.

CXII. SERICOGRAPHIS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 107.

Calyx quinquepartitus, æqualis, bracteis bracteolisque plerumque subulatis suffultus. Corolla ringens, tubo brevi intus prope basin maculis tribus sericeis nitentibus (staminum deficientem vestigis) instructo, labio superiore fornicate bidentulo, inferiore convexo trifido. Stamina duo, tubi brevissimi apici (prope a basi corollæ) inserta, limbo longo sensim dilatato ad medium usque adnata. Antheræ biloculares; loculi plus minus oblique alterque altero altius positi, primum sœpe contigui et paralleli, mox divergentes, subinde et semper paralleli, emissò polline undulati, subinde calcarati. Stigma bifidum. Capsula basi deppressa asperma, valvularum commissurâ plana, apice compressa, tetrasperma. Dissepimentum adnatum. Semina muricata, retinaculis apice bifidis suffulta. — Herbae aut suffrutices Americanæ tropicae, caule articulato, geniculata haud raro incrassatis, foliis latitudine in diversis speciebus admodum diversâ. Racemi spiciformes, axillares, secundi. Bractæ bracteolæque conformes, parvæ. Capsula ratione floris sœpe magna.

1. S. *RIGIDA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 108 t. 16), foliis inferioribus ovalibus superioribus oblongis lanceolatisve basi obtusis rariusve basi acutis subsessilibus versus apicem caulis decurrentibus, racemis terminalibus aggregatis (solitarioe) scorpioideo-secundis confertis glanduloso-hirtis, bracteis lanceolatis oblongis bracteolisque lanceolato-linearibus acutis rigide costulatis calyce brevioribus, calycis lacinia superiore duplo minore, antherarum loculis parum distantibus utroque basi subcalcarato. *Z* In campis ad Caxoeira, Februario ante anthesin, et in silvis Catingas ad Caité prov. Bahiensis florentem, Octobri (Martius!), in Serrâ de San Felis ante Corrcio, Aguia gente, Trabiras, Caretao (Pohl! in b. mus. palat. vindob. n. 1954 et 1878), in campis graminosis prope Uberosa prov. Goyaz, Julio (Riedel! in b. acad. petrop. n. 2413), in eadem prov. (Gardner! n. 3953, cum var.  $\beta$ , in h. Bentham et Hooker). *Justicia stricta* Pobl! ic. in b. mus. palat. vindob. n. 1954 et 1878. Caulis 1-2 ped. altus, lignosus, laevis, testaceus, strictus, simplex basive ramosus. Folia in var.  $\alpha$   $\frac{1}{4}$ -3 poll. longa, inferiora (4 lin.-1 poll. lata, superiora apicem versus magis attenuata nec magis acuta, 4-1 lin. lata, ad longitud.  $\frac{1}{2}$  poll. decrecentia. Racemi in apice caulis 1-3, approximati, secundi, falcati, densi, undique pubescentiâ brevissimâ capitata vestiti. Bractæ 2 lin. longæ, costulis subparallele excurrentibus prominulis, sicuti et bracteolæ (2 lin. longæ) linear-lanceolatæ, et calyces (3 lin. longi) lacinias linear-lanceolatis acuminatis ad speciem nervosa. Calycis lacinia superior reliquis duplo brevior et angustior. Corolla 1 $\frac{1}{4}$  poll. longa, saturate purpurea, viscosa. Maculae solitæ in tubi basi confluentes, albæ, villosæ, laxiusculæ. (v. in h. Mart., vindob., petrop., Benth. et Hook.)

*B. desertorum*, tota hirsuta, foliis omnibus ovalibus. — In campis inter Villa de Fanado et Contendas prov. Minarum Generalium, Julio (Martius!). in campis graminosis prope Uberosa prov. Goyaz, Julio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 2413), in prov. Minarum Generalium (Claussen! in b. mus. paris. n. 234), Rio Abaite Brasiliae (Pohl! in h. mus. palat. vindob.). (v. var.  $\alpha$ . et  $\beta$ . in h. monac., vindob., petrop., paris., Hooker, etc.)

2. *S. CORDATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 108), foliis subcordatis ovatis apice breviter obtuseque attenuatis brevissime petiolatis cauleque erecto nodoso subtetragono glabris, racemis axillaribus terminalibusque trichotomo-subcorymbosis decompositis et supra decompositis secundifloris.  $\mathcal{L}$  In campestribus ad Barra do Rio Negro prov. fluminis Nigri, Novembri (Martius!). Beloperone cordata Mart.! in h. reg. monac. Pluripedalis. Folia inferioria 4-4½ poll. longa, 2½ poll. lata, supra confertissime lineolata, fere sessilia. Raini pedunculares longi, terni, vel secundi. Corolla pollicaris, saturate purpurea. Maculae sericeæ in basi tubi inconspicuae. Calyx 2½ lin. longus. (v. in h. monac.)
3. *S. INCANA* (N. ab E. in Aschenb. pl. mex. exs. n. 346), caule erecto pubescenti-cano, foliis oblongo-ovalibus acutiusculis obtusissimisve basi cuneatâ in petiolum brevem decurrentibus supra pubescentibus subtus pubescenti-tomentosis, racemis oppositis brevibus paucifloris, corollâ elongatâ, calycibus brevibus.  $\delta$  In Mexico ad Tolimam, Julio (Karwinsky! in h. reg. monac., Aschenborn!), Vera Cruz, Martio (Linden! n. 1079 in h. Hooker), Mexico prope el Punto de Dios, Decembri (n. 983) et inter Regla et S. Sebastian, Aprili (Ehrenberg! n. 968 in h. gen. berol.). Corolla fere 1½ poll. longa, glabra, coccinea. Racemus dense pubescens, 3-4-florus floribus approximatis, cum pedunculo petiolum subæquans. Bractæ bracteolæ et calyces parvi. Maculae tubi ad staminum insertionem confluentes, flavæ. Antherarum loculi distantes, parum obliqui, mutici. Folia subinde apice retusa; alia, præsertim inferiora obtusa, superiora subinde et acutiuscula. (v. in h. Aschenborn, monac., berol., Hook.)
4. *S. ACUMINATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7. p. 109), foliis ovato-oblongis acuminatis repando-subcrenatis brevipetiolatis eauleque erecto adscendenteve nodoso subtetragono glabris, costis pubescentibus racemis axillaribus alternis oppositis secundifloris subfastigiatis.  $\delta$  In Brasiliâ. Folia cum petiolo 1½ lin. longo 3½-4 poll. longa, 1-1½ poll. lata, basi rotunda, apice longe arêteque acuminata. Racem in apice caulis plurumque terci, secundiflori. Bractæ et bracteolæ capillari-setaceæ, illa his duplo longior, calyce attamen triplo brevior. Calyx 5 lin. longus laciniis lineari-lanceolatis. Corolla pollicaris, purpurea. Maculae sericeæ in basi tubi obsolete.
- $\alpha$ . racemis simplicibns.—In silvis Japurensibus Brasiliæ, prov. flum. Nigri, Novembri (Martius!).
- $\beta$ . ? racemis paniculato-compositis decompositis. — Cum var.  $\alpha$ . Differt ab  $\alpha$  spicâ (terminali) trichotomo-compositâ et decompositâ thyrsoidâ densâ, ramulis gracilioribus (paucifloris) secundifloris. (v. in h. monac.)
5. *S. MOHINTLI*, caule erecto pubescenti-cano, foliis oblongo-ovalibus lanceolatis obtusiusculis basi cuneatâ in petioli brevem decurrentibus utrinque vel undique vel in costis et in margine pubescentibus, racemis oppositis bistrifidis folio brevioribus ramis secundifloris, corollæ elongatæ glabrae labio superiore integro.  $\delta$  In Mexico, ad Zonaguia (Hartweg), Istapongajoya, Chiapas (Linden! n. 185 in h. Hooker), passim quasi sponte Jalapæ, Maio, et culta ad Hacienda de la Laguna (Schiede!), prope Toluca (Allaman), Totola (Aschenborn!), Guatemala (h. Hooker!), Honotla et S. Sebastian de Regla (Ehrenberg!). Justicia (Mohintli) Moc. et Sessé fl. mex. ic. (Lag.! in h. Mart.), Aschenborn pl. mex. exs. n. 101. Justicia tinctoria hort. Mexic. Allaman! in h. DC. et Moricand, Ehrenberg! in h. berol. Justicia atramentaria Benth. pl. Hartweg. p. 69. Justicia spicigera Schlecht.! in Linn. 7 p. 395 et in h. gen. berol. Corolla pollicaris, pallide purpurascens. Racemorum rhaches dense pubescentes, dimidiis folii longitudine. Bractæ et bracteolæ pedicellum brevem æquantes. Labium corollæ inferius lineari-oblongum, apice trilobum lobis æqualibus, siccando revolutum. Basis tubi corollæ ad insertionem staminum hirsuta maculis vix discretis. Antherarum loculi in con-

nectivo trianguli deorsum divergentes, basi brevi-mucronulati, apice conniventis subæquales. Proxime affinis est *S. incanæ* N. ab E., cui flores majores sunt in pedunculis multo brevioribus et folia subtus tomentosa. (v. in h. Aschenborn, Benth., Hook., Moric., Mart., DC., berol.)

6. *S. ASCHENBORNIANA* (N. ab E. in Aschenborn pl. mex. exsicc. n. 598), caule recto ramosissimo pubescenti-tomentoso, foliis late ovatis obtuse oospidulatis in petiolum longum desinentibus repando - crenatis supra hirsutis subtus hirsuto-tomentosis, racemis oppositis bi-trifidis folium æquantibus ramis secundifloris, bracteis bracteolisque brevissimis, corollæ elongatae pubescens labio superiore emarginato intus carinulis duabus albis notato, antherarum loculis contiguis basi cornutis altero altiore. ♂ In Mexico (Aschenborn!). Calyx dense glandulosus, lacinias lanceolatis acutis latiusculis rubiginosus. Bracteæ setaceæ. Corolla pollicaris, venis intensius purpureis picta. Labium inferius trilobum, pallide marginatum et versus fauces lineis duabus pallidis pictum. Capsula fusca, 6 lin. longa. (v. in h. Aschenborn).
7. *S. HAPLOSTACHYÀ*, caule erecto ramosissimo foliisque pubescentibus, foliis ovato-oblongis apice attenuatis acumine obtuso repando-subcrenatis utrinque pubescentibus, racemis oppositis simplicibus secundis folium æquantibus eodemve longioribus, bracteis bracteolisque brevissimis, calycibus glandulosis, corollæ elongatae pubescens labio superiore integro ?, antherarum loculis subcontiguis basi cornutis, altero altiore. ♂ Prope Minoschtl in imperio Mexicano, Januario (Ehrenberg! n. 1252 in h. gen. berol.). Differt a *S. Aschenborniana* foliis minoribus angustioribus, racemis haud compositis. Arborescens. Corolla videtur pallide purpurea, intensius lineata. An var. *S. Aschenbornianæ* ? (v. in h. berol.)
8. *S. POLITA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 109), caule tetragono lævi geniculato foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, racemis subracemosis axillaribus terminalibusque umbellatis dissitifloris, floribus secundis. ♂ Ad rivulos in Serrâ d'Estrella Brasiliæ (Beyrich!); in Serrâ dos Orgãos (Gardner! in h. imp. vindob. Benth. et Moricand n. 588). Folia inferiora palmaria, nitidula, firma, superiora duplo triplove minora. Bracteæ calyce multo breviores, inferiores præsertim in var.  $\beta$  spathulato-oblongæ, obtusæ, sessiles, superiores vel cuneatae etiam (in var.  $\alpha$ ) plus minus subulate. Bracteolæ ejusdem longitudinis atque bracteæ, in var.  $\beta$  spathulato-lineares. Corolla coccinea, 8-15 lin. longa, intus ad basin maculæ tribus oblongis albo-sericeis notata.
  - $\alpha$ . *pulchra*, foliis longioribus magis attenuatis, racemis longioribus firmioribus plurifloris in caulis apice oppositis subcorymbosive, corollis paulo longioribus (1½ poll. longis) magis tubulosus, calycis lacinias lanceolato-acuminatis. — Ad rivulos jugi Serra d'Estrella prov. Sebastianopolitanæ (Beyrich! Schott! in h. mus. palat. vindob. Gardner! in eodem h. n. 588, Luschnath! in h. acad. petrop.), in Brasiliâ loco incerto (Sellow! in h. reg. berol. n. 135). *Justicia pulchra* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 4732 et 4746. (v. in h. Beyrich, vindob., petrop., berol., Hooker.)
  - $\beta$ . *umbrosa*, foliis minoribus minus attenuatis, racemis brevioribus tenerioribus paucifloris, corollis minoribus (8-12 lin. longis) in medio subventricosis pallidiorebus, calycis lacinias linearis-acuminatis. — Locus natalis ut iu var.  $\alpha$ . (v. in h. monac.)
9. *S. SCANDENS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 109), caule subsessilis divaricato-ramoso aspero in juventute hirsuto, foliis ovato-oblongis attenuatis acutiusculis nitidis ad costas hirsutis basi obtusis, petiolis mediocribus hirsutis, racemis axillaribus simplicibus alternis secundifloris densis villosis folio brevioribus, bracteis bracteolisque lanceolato-linearibus calycis colorato paulo longioribus. ♂ In silvis jugi Serra d'Estrella, Martio et Aprili (Riedel! in h. acad. petrop.), in humidis Mora Queimado prov. Sebastianopolitanæ, Octobri (Riedel! in h. acad. petrop.). Accedit ad *S. politam*, sed differt ab hac et a multis aliis bracteis bracteolisque majoribus, quare habitum induit Beloperonæ.

Caulis serpentinus, teretiusculus, purpureus, nodis compressis, subscandens, seu potius inter frutices adscendens, punctis minutis asper. Folia cum petiolo 6 lin. longo 3-3½ poll. longa, et prope a basi poll. 1 lata, reflexa, integerrima, basi obtusa et subobliqua, supra obscurae nitentia, subtus pallidiora et nitida. Racemi simplices, cum pedunculo 3-4 lin. longo sesquipollulares, densi. Bracteæ et bracteolæ villosæ subglandulosæ, illæ fere 4 lin. longe, hæc paulo breviores. Calyx purpureus, 3 lin. longus, lacinias linearibus acutis magis glabris. Corolla police longior, coccinea. (v. in h. petrop.)

10. S. PALUSTRIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 110), foliis lanceolatis attenuatis in petiolum brevem acute decurrentibus cauleque adscendente basi ramoso glabris, racemis axillaribus subunilateralibus secundifloris recurvis pedunculatis folium subæquantibus glabriusculis, calycis lacinias linearibus æqualibus, bracteis bracteolisque brevissimis subulatis. ♂ In paludosis ad Barra do Jucu Brasilie, Februario (Max. princ. Wied. in h. Mart. et Nees). Racemi scorpioidi. Rhachis glabra. Bracteæ et bracteolæ exiguae, æquales. Calyx 2-2½ lin. longus. Corolla 3 lin. longa, alba. Capsula 6 lin. longa, pallide fusca, nitida. (v. in h. Maximil. princ., Mart. et Nees.)
11. S. PAUCIFLORA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 110), caule fruticoso erecto trichotomo-ramosissimo geniculato, foliis oblongis utrinque parum attenuatis ovalibus obtusis, pedunculis axillaribus unitrifloris foliis brevioribus, bracteis bracteolisque brevissimis calycisque lacinias lanceolatis acuminatis scabris, corollæ tubo basi submonsticto. ♂ In Brasiliâ. Frutex aliquot pedum altitudine, rufus, pilis (in var.  $\alpha$ ) parvis patentibus hirtus. Folia inæqualia, diversiformia; alia, præsertim inferiora, cum petiolo linearie ½-¾ poll. longa, 3-4 lin. lata, obtusissima, basi acutiuscula, ovalis vel obovata, myrtilloidæ, superiore 1½-3 poll. longa (cum petiolo 2-6 linearie) 6-13 lin. lata, apice angustiora obtusa, basi acuta, altero sœpe minore, margine repanda repandoque-crenata et scabra. Pedunculi plerique uniflori, 3-4 lin. longi, infra apicem bracteolis duabus oppositis obtusis sterilibus instructi, flore terminali pedunculatae basi bibracteolatae, rarius tri-flori pollicares, pedicello brevi ex alterius bracteæ inferiore angulo proveniente. Flores nutantes. Calyx 1½-2 lin. longus. Corolla coccinea, fere pollicaris. Macula in basi tubi altera magna fere ovalis, reliqua duæ minimæ vel obsoletæ.
  - $\alpha$ . *umbrosa*, minor, ramulis foliisque supra hirtulis, foliis subtus sœpe pubescentibus.—Ad Porto Alegro, Rio Grande, Encuritahada, Mato Castellano locis uidis in silvis umbrosis, Octobri (Sellow! in h. reg. berol. n. 128, 129 et 154.)
  - $\beta$ . *speciosior*, ramis foliisque glahrescentibus, his etiam paulo majoribus. (Ibid. n. 231 [4269]; Tweedie! in h. Bentham). (v. in h. Benth. et Hook.)
12. S. CLAUSSENIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 111), glabra, caule suffruticoso erecto, foliis pubescenti-scabris lanceolatis attenuato-acuminatis basi obtusa in petiolum brevissimum desinentibus, racemis axillaribus 1-3 floris, bracteis bracteolisque setaceis brevissimis, calycis lacinias linear-lanceolatis acuminatis scabriusculis, corollæ tubo basi pentasticto. ♂ Ad Novum Friburgum Brasilie (Claussen! in h. Mus. paris. n. 222). Accedit ad S. paucifloram, a quâ differt foliis angustis, et ad S. palustrem, cui flores sunt multo minores. Caulis gracilis, teres. Folia 3-3½ poll. longa, prope a basi 4 lin. lata, hinc apicem versus valde attenuata, apice acutiuscula, subrepanda, utrinque glabra, intense viridia. Racemi ½ poll. longi, erecti, 3-2-1-flori. Calyx 4 lin. longus, bracteis et bracteolis octuplo longior, pube brevissimâ rarâque, sicuti et pedunculi, scaber. Corolla 1½ poll. longa, incurva, coccinea, maculis in basi tubi quinque linearibus confluentibus pallide flavis. Antherarum loculi contigui, basi acutiusculi, alter dimidio anteriori positus situ. (v. in h. paris. et ex eo in h. Nees).
13. S. PARABOLICA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 111), glabra,

- fruticosa, foliis subparabolicis, racemis axillaribus parvis simplicibus secundis apice recurvis, bracteis bracteolisque lanceolatis. ♂ Vallo fundo in Brasiliâ (Sellow! in b. reg. berol. n. 209). Caulis gracilis. Folia brevipetiolata, circiter pollicaria, basi ovata, a medio subsinuato-coangustata acumine obtuso, integrifolia, septuplinervia, reticulata, chartacea. Racemi folio duplo breviores. Bracteolæ et bractæ lanceolatæ, acute, scabriæ, calyce trilineari paulo breviores. Calycis laciniæ lanceolato-attenuatæ. Corolla pollicaris, pubescens, purpurea, maculis bistratis ad tubi basin distinctissimis. Fructus deest. (v. in b. berol. et Hooker).
14. S. *SQUARROSA*, fruticosa, foliis ovatis acumine brevi obtusiusculo caule quo trichotomo glabris, racemis axillaribus simplicibus secundis folio breviribus recurvis scabris, bracteis lanceolatis basi attenuatis bracteolisque linearibus calyce longioribus recurvo-patulis. ♂ Ad Rio Grande (Tweedie! in h. Hook.). Folia  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 6 lin. lata, basi acute in petiolum desineutia. Corolla pollicaris, purpurea. Capsula fusca. Semina rufa. (v. in b. Hooker).
- 15? S. *VESTITA*, fruticosa, hirsuta, foliis oblongis acuminatis in petiolum longum attenuatis racemis axillaribus suboppositis sessilibus bi-tripartitis, ramis 2-3-fidis secundifloris laxiusculis, bracteis bracteolisque subulatis calyce brevioribus. ♂ Pangoa in Peruvia (Matbews! n. 1219 in b. Hooker). Corolla fere pollicaris, pubescens, purpurea. (v. in h. Hook.)
16. S. *COLORATA* (N. ab E. in Bentham pl. Hartweg. p. 148 n. 827), caule fruticoso, foliis oblongis utrinque attenuatis foliorum costis pedunculisque hirsutis, racemis subracemosis axillaribus secundis folia æquantibus, bracteis bracteolisque linear-lanceolatis pubescentibus his calycem subæquantibus, calycis laciniæ lanceolatis setaceo-acuminatis. ♂ In montosis Loxæ (Hartweg!) Frutex 4-6 ped. altus. Corolla  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, pubescens, coccinea. Calyx longus, purpureus. Folia 3 poll. longa, 10-11 lin. lata, nitida. Maculæ ad basin tubi corollæ argenteo-sericeæ. (v. in b. Benth. et Hook.)
17. S. *MONTICOLA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 111), caule fruticoso diffuso tomentoso-hirsuto, foliis ovatis bistratis glabrescentibus, racemis axillaribus parvis simplicibus secundis, bracteis bracteolisque setaceis. ♂ In monte Serrâ do Caraca prov. Minarum, Maio (Martius!), (Schüch! in b. palat. vindob.), in prov. Minarum Generalium (Claussen! in h. Mus. paris. n. 221). Apbelandrum monticola Mart. obs. n. 1124. Affinis S. parabolicæ. Caulis densissimâ hirsutus tomentosus. Folia brevipetiolata, ovata, acuta vel acutiuscula,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  poll. longa  $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, nitida, chartacea, repandorenata, vel undique bistrata, vel glabrescentia nec nisi in costis marginibusque strigoso-birta, basi rotundato-obtusa. Racemi folio duplo breviores, pubescenti-hirsuti. Bracteæ et bracteolæ calyce 4-lineari triplo fere breviores. Calycis laciniæ lanceolato-attenuatæ. Corolla pollicaris, purpurea, labio inferiore basi cuneiformi attenuato ad  $\frac{1}{3}$  æqualiter trifido laciniis angustis. Maculæ ad basin tubi distinctissimæ. (v. in b. monac., vindob., paris. et propr.)
18. S. *SELLOVIANA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 111), caule fruticoso erecto anguste fureato hirsuto, foliis oblongis utrinque attenuatis apice obtusis supra strigoso-birtis subtus dense lineolatis ad costas bispidis, racemis axillaribus secundis folia æquantibus superantibus pubescentibus glandulosisque, bracteis bracteolisque linear-subulatis, his calycem æquantibus eovo brevioribus, calycis laciniæ lanceolatis acuminatis. ♂ In Brasiliâ (Sellow! in b. reg. berol. n. 5). Caulis strictus, flavus, angusto angulo bifurcus, lineis pilosis, in ramis juvenilibus confluentibus hirsutus notatus, æstate glabrescens. Folia cum petiolo semipollucari 3- $3\frac{1}{2}$  poll. longa, 10-11 lin. lata, supra pilis brevibus e tuberculis orientibus hispida, subtus pallidiora, margine ciliata, in petiolum acute decurrentia. Racemi 4-5 poll. longi, simplices basive ramulo aucti, pedunculati. Bracteæ et bracteolæ calyce paulo angustiores; illæ calycem vel æquantes, vel (superiores) eodem plus duplo breviores bracteolisque æquales. Calyx 5 lin. longus, laciniis lanceolatis acuminatis glandulosis. Corolla cocci-

- nea, viscidula, 1½ poll. longa, palatum plagâ mediâ lanceolatâ elevatâ acutâ marginatâ oblique pectinatim rugosâ pallidiore instructum. (v. in b. berol.)
19. S. HETEROPHYLLA, caule fruticoso foliorum costis pedunculisque hirsutis, rameisque petiolatis ovatis basi acutis apice obtuse acuminatis, racemis axillariibus trichotome ramosis basi foliosis terminalibusque fastigiatis foliis longioribus glandulosis, ramis secundifloris, floralibus subrotundis subcordatis subsessilibus acute cuspidatibus bracteis bracteolisque subulatis calyce multo brevioribus, calycis laciniis lanceolatis acutis, foliis caulinis. In monte Serro Colorado imperii Mexicanici, Augusto (Schiode! n. 117 in h. gen. berol.). Justicia heterophylla Schlecht. in Linn. 5 p. 95. Distincta a reliquis spicis subcorymbosis ad basin ramificationis infimæ foliis parvis subrotundis stipatis. Corolla dense pubescens, pollicaris, maculis sericeis albis distinctis. Capsula longe unguiculata. Affinis S. coloratae (v. in h. berol.)
20. S. HIRSUTA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 112), caule fruticoso ? foliisque racemis que birsutis, foliis ovato-oblongis racemis axillariibus simplicibus folio brevioribus bracteis bracteolisque setaceis. In silvis ad Cocoës prov. Minarum Generalium, Maio (Martius!), in eadem prov. (Ackermann! in b. Mart.), in Serrâ dos Orgaos prov. Sebastianopolitanae, Aprili (Gardner! n. 587 et Schubert! n. 4749 in h. mus. palat. vindob. et Bentham). Justicia birsutis Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 4749. Differt a S. monticolâ foliis birsutis angustioribus (cum petiolo 6-8 lin. longo) 2-4 poll. longis 8-12 lin. latis basi rotundato-angustioribus, apicem versus magis angustatis. Flores in racemulis subinde disticho-alterni, in aliis secundi, inferiores pedicellati. (v. in b. vindob., Hooker et Benth.)
- CXIII. HERPETACANTHUS N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93.  
— Scbultzia N. ab E. in nov. act. acad. n. c. 11 p. 61.
- Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla bilabiata, labio superiore recto bidentato, inferiore trifido. Stamina quatuor, didynama, basi per paria conjuncta, apice tubi inserta. Antheræ muticæ, staminum longiorum biloculares, loculo altero oblique altero altius posito, breviorum staminum uniloculares. Stigma bilabiatum, breve. Capsula a basi usque ad medium clausa, angusta et asperma, hinc tetra-octosperma. Semina retinaculis suffulta. — Fruticuli aut herbæ Brasilienses basi repentes, floribus mediocribus, in sylvarum humidarum umbris degentes. Spicæ simplices vel varie compositæ, bracteatæ, subsecundæ, bracteis quadrifariis, unifloris, sœpe latis, bracteolis angustis. — Differt ab Hemichoriste antheris muticis et inflorescentiâ.
1. H. RUBIGINOSUS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 94), caule herbaceo longe repente villoso, foliis ovalibus obtusiusculis supra subhirsutis, spicâ terminali simplici, bracteis ovalibus sessilis. In altis ad Cubatão Brasiliæ, Aprili (Sellow! in b. gen. berol. n. 87 [1427] et 203), in silvis prope Rio Janeiro urbem prov. ejusdem nominis, Novembri (Riedel! in h. acad. petrop.; Schott! in h. pal. vindob. n. 4740 bis). Canlis semipedalis, repens, sicuti petioli et bracteæ pilis articulatis molibus ferrugineis vestitus, ramosus. Folia basi acuta, cum petiolo 2-3 lin. longo 1½-1¾ poll. longa, 8-9 lin. lata, supra pilis raris adpersa, plus minus glabrescentia, subtus ad costas hirsuta et glaucescentia. Spica hirsuta, pollicem 1 longa. Bracteæ 4 lin. longe, acutæ trinervæ, venosæ. Bracteolas lineares, bracteas subæquantes. Calyx lin. 1 longus laciniis subulatis glabriusculis. Corolla 5 lin. longa, alba, lineis punctisque cœruleis picta. Capsula 4 lin. longa, glabra. (v. in h. petrop. et vindob.)
2. H. MACAHENSIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 95), caule herbaceo basi repente villoso, foliis oblongis obtusiusculis basi acutis supra subhirsutis subtusque ad costas pilosis, bracteis ovalibus in petiolum attenuati. In silvis Macahé, Junio (h. acad. petrop!). Quod ad integumentum, colo-

rem et habitum in universum accedit H. rubiginoso, differt autem foliis oblongis longioribus (cum petiolo 3-4-lineari)  $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$  poll. longis 1 poll. latis, tum spicâ laxiore et bracteis ( $5\frac{1}{2}$  lin. longis  $2\frac{1}{2}$  lin. latis acutis) a medio fere in formam petioli angusti attenuatis. (v. in h. petrop.)

3. **H. MACROPHYLLUS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 95), caule fruticoso basi repente granulato-aspero, foliis oblongo-ovalibus acuminatis glabris, spicis axillaribus compositis densis in terminali decompositam crassam confluentibus, bracteis ovalibus argute cuspidatis, corollâ longitudine bracteæ glabré. ♂ In Brasiliâ (Sellow! in h. gen. berol. n. 46 et 273). Caulis genu procumbens, articulis hinc gibbis, repensque, apice ascendens. Folia 8-9 poll. longa, 3 poll. lata, petiolo vix lineâ longiore, acumine angusto acuto. Spicæ oppositæ, infimæ minores, superiores bipollicares oblongæ, pedunculo brevi rubiginoso-hirsuto suffulta; spicæ partiales imbricatæ. Spica terminalis ovata, decomposita, densa, probabiliter purpurea. Bracteæ imbricatæ, 6-7 lin. longæ, trinerves, venosæ, pilosæ, eleganter ciliatae; opposita augustior est et fertiles, uniflora. Bracteolæ lineari-setacea, ciliatae, calyce triplo longiores. Calycis laciniaæ lineâ vix longiores, lanceolato-acuminatae, glabriuscule. Corolla 6-7 lin. longa, glabra, purpurea. (v. in h. berol.)
4. **H. LONGIFLORUS** (Moricand pl. nouv. d'Amér. p. 159 t. 93. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 95), caule suffruticoso inferne granulato-aspero apicem versus strigiloso-pubescente, foliis oblongo-ovalibus utrinque attenuatis glabris, spica terminali composta trifidâ densâ, bracteis ovatis cuspidatis acutis, corollâ bracteâ duplo longiore pubescente. ♂ Ad Bahia (Blanchet! n. 3130 in h. Moricand), in silvis umbrosis humidis ejusdem (prov. Junio Luschnath! in h. acad. petrop.). Differt a reliquis corollâ 12-14 lin. longâ angustâ. Ab H. macrophylio imprimis foliis minoribus (6-6 $\frac{1}{2}$  poll. longis 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{4}$  poll. latis in petiolum  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$  poll. longum cuneatim desinentibus, et bracteis latioribus (7 lin. longis 5 lin. latis) basi haud attenuatis breviore minusque argutâ cuspidate prædictis marginæ breviter ciliatis (intense purpureis). Bracteolæ lineari-lanceolatae, 4 lin. longæ, calyce duplo longiores, strigiloso-hirtæ. Corolla violacea. (v. in h. Moricand et petrop.)
- β. *brachystachys*, spicis brevibus, in paniculâ terminali tri-quinquefida foliosâ dispositis, bracteis plerisque haud cuspidatis sed brevi-acutis. — In umbrosis prope Sebastianopolin, Junio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 794).
5. **H. SCHULTZIA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 96), caule fruticoso hirsuto, foliis oblongis utrinque attenuatis in costis strigosis, spicâ in caule ramisque terminali simplici pedunculata, bracteis dorsalibus obovatis cuspidati-ciliatis, capsulâ tetraspermâ. ♂ In Brasiliâ; prope Villam insulanorum, ad viam Felisbertiam prov. Bahiensis, Decembri (Max. Princ. Wied!) Dicliptera tetrauda Nees et M. in nov. act. ac. nat. cur. 11 p. 61. Schultzia Brasilensis N. ab E. in act. ac. acad. n. c. l. c. Hygrophila Brasilensis Spr. cur. post. in syst. p. 237, Dietr. synops. 3 p. 584 n. 4. Caulis sesquipedalis. Ramuli novelli fulvo-hirsuti. Folia cum petiolo pollicari  $5\frac{1}{2}$ -6 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{4}$  poll. lata. Bracteæ trinerves, calyce longiores, ventralesque fertiles paulo angustiores et miuores. Bracteolæ lineari-lanceolatae, calyce paulo longiores, ciliatae. Calycis laciniaæ lineari-subulatae, hirsuta. Corolla 5 lin. longa, alba. Capsula 4 lin. longa, pubescens. (v. in h. Maximil. Princip., Mart. et petrop.)
6. **H. MELANCHOLICUS** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 96), caule fruticoso juvenili hirsutulo dein glabrescente quadri-bifurcato, foliis lanceolatis ovatis oblongis apice attenuatis obtusis basi acutis pubescenti-scabris, spicâ in caule ramisque terminali simplici subsessili brevi ovata, bracteis orbiculari-ovatis mucronatis ciliatis, capsulâ tetraspermâ. ♂ In Brasiliâ. Similis H. Schultziae, differt autem caule graciliore, iteratim furcatim quadridido vel bifido, rarius trifido (scil. ramis in eodem plano subinde binis ex uno

folii angulo orientibus abortientia caule medio caulis quadrifurcatus oritur ramis ad originem semper genuflexis), pube brevi canæ hispidulo, foliis minoribus et angustioribus brevioreque petiolo præditis, 2-2½ poll. cum petiolo trilineari longis, 6 lin. lati, undique pilis brevibus conspersis in primis tamen inferne in costis, spicis denique in apicibus ramorum subsessilibus bracteisque magis rotundatis neque basi in petioli formam attenuatis, brevi tantum acumine mucronuliformi præditas.

a. *angustifolius*, foliis lanceolatis. — In silvis primævis ad viam Felisbertiam, Jantuario (Max. Princ. Wied.!). Dicliptera melancholica. Mart. Dicliptera furcifera N. ab E. in h. (v. in h. Maxim. Prince. et Mart.)

b. *latifolius*, foliis oblongis oblongo-ovalibus glabris. — Tocai in Brasilia, prov. Sebastianopolitana (Schott! in h. pal. vindob. n. 4757). Justicia bracteata Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 4751. Folia variant 3 poll. (cum brevi) longa, 1½ poll. lata et 4 poll. longa 1 poll. lata. Semper dense lineolata sunt sed fere tota glabra. Caulis adultus glabrescit, juvenilis patulo-hirtus est subhirsutus. Bracteæ hirsutæ. Flores minores. Forsan propria species. (v. in h. vindob. )

7. H. DECIPiens, caule fruticoso juvenili dense strigoso, foliis oblongis obtusiusculis supra glabris subtus presertim in costis petiolisque strigilosis, spicæ terminali laxè pubescente, bracteis ovato-lanceolatis calyce brevioribus. 3 In monte Corcovado Brasilæ (Gardner! n. 5577 in h. Hooker). Rhytidlossam dasycladam refert. Corollæ tubus gracilis. (v. in h. Hook. )

### b. *Antheræ basi cornuta vel calcaratae.*

CXIV. HEMICHORISTE N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 102, Lindl. syst. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 704, Meisn. gen. p. 296 (205).

Calyx quinquepartitus, æqualis. Corolla ringens, labio superiore integro, inferiore trifido. Stamina quatuor didynama, versus basin tubi inserta; antheræ longiorum biloculares, loculis connectivo dilatato discretae oblique divergentibus basi calcaratis; breviorum seu interiorum uniloculares basi calcaratae, vel rudimentariae. Stigma obtusum bifidum, lamellis arcte contiguis. Ovarium superiora versus quadriovulatum. Fructus..... — Herba perennis Indiae orientalis. Thyrsus elongatus subverticillatus, e cymis oppositis. Bracteis et bracteolis latiusculis, sed non tegentibus, floribus speciosis coccineis.

H. MONTANA (N. ab E. in pl. as. rar. 3 p. 102), glabra, foliis oblongis integrermis 2/3. In Indiæ orientali. Justicia montana h. madr.! Wall. cat. n. 2471 a. Justicia longifolia h. Heyn.! Wall. cat. n. 2437. Caulis herbaceus, erectus, strictus, aliquot pedum altitudine, pennæ cyaneæ crassitie, fistulosus, tetragonus lateribus oppositis alternatim canaliculatus, ad genicula tumidus, probabiliter simplex. Folia opposita, inferiora 7-8 poll. longa, 2 ad summum lata, oblonga, acuta, basi cuneatim in petiolum attenuata, integerrima, glaberrima, lœvia. Thyrsus terminalis, 1-1 pedem longus, simplex aut ramosus ramis oppositis. Rbachiæ, bracteæ, petioli, calyces dense sed subtilissime pubescentes, griseo-micantes. Flores in pedunculis brevibus vix 3-1 lineam longis oppositis cymosi. Bractea 3 lin. longa, ovalis, acutiuscula. Cymæ bis (rarius ter) bifidae cum flore intermedio furcarum ebracteolato, hinc in septemfloris flores tres ebracteolati, quatuor bracteolati; ad singulam divisionem bractea partialis ovalis communis minor. Bracteolæ oblongæ, nec multo minores reliquis. Calyx patulus, dense pubescens viscidulusque, lacinia lanceolata. Corolla pollicé longior, speciosa, pubescens, coccinea. Stamina ventriculo tubi inserta, corollam æquantia, filamenta basi hirta; inferiorum staminum antheræ ubi adsunt, uniloculares loculo in connectivo angustiori apice mucronato lateralí. (v. in h. Wallich).

CXV. ANISOSTACHYA. — *Strobilanthes spec. Bojer.*

Calyx a medio bilabiatus, labio utroque bifido, superiore bicarinato. Corolla bilabiata, labio superiore plano obtuso apiceve bidentulo, inferiore paulo latiore convexo brevi spatio trifido, laciinis obtusis, mediâ latiore basi pennato-venosâ. Stamina duo. Antheræ biloculares, loculis connectivo triangulare discretis obliquis, altero altiore, infero basi calcarato. Stigma simplex, obtusum. Capsula teretiuscula, lævis, suturâ dorsali canaliculata, a basi fere ad medium elocularis asperma, hinc tetrasperma, retinaculis, brevibus obtusis squamiformibus. Spicæ axillares, geminæ, inaequales. Bractæ imbricatæ, latæ, basi contractæ amplectentes durescentes dorsoque nervoso-costulatæ, hinc apicem versus latiores membranaceo-herbaceæ; altera cujusque paris sterilis. Flores solitarii, alterni, sessiles, bibracteolati. Bracteolæ calyce breviores, altera latior. — Herba Madagascariensis, glabra, Rostellulariaæ similitudine; caule basi repente, adscendente; foliis ovali-oblongis, utrinque attenuatis, apice obtusis, petiolatis, cum petiolo  $\frac{2}{3}$  poll. longis, 10 lin. latis, inferioribus minoribus. Spicæ  $\frac{2}{3}$  poll. longæ, subtetragonæ, axillares, geminæ oppositæ et terminales, pedunculo longitudine spicæ. Bractæ imbricatæ, obovato-cuneatæ, non nihil obliquæ, mucronatæ, basin versus ciliatæ et quinque nervis costatae, semicylindrico-concavæ, rigidiores, calycem amplectentes. Bracteolarum altera oblonga aut subovalis, altera linearis-subulata, utraque calyce brevior. Calyx bilinearis. Corolla trilinearis. Stamina labio superiore paulo breviora. Capsula longitudine calycis. — Differt a Rostellularia imprimis calyce ad medium usque bilabiato et bractearum singulari indole.

A. BOJERI. *2* In montibus locis saxosis prov. Emirnæ insulæ Madagascar. *Ruellia anisostachya* Bojer! in h. gen. monac. *Strobilanthes anisostachys* Bojer! in h. DC. Spica exterior cujusque axillæ interiore brevior est. (v. in h. monac. et DC.)

CXVI. ROSTELLULARIA Reichenb. handb. p. 190. — *Rostellaria N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 100, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 704. Meisn. gen. p. 296 (204).*

Calyx 4-5-partitus, laciinis duabus superioribus sæpe minoribus, quintâ ubi adest, superâ minimâ. Corolla bilabiata; labium superius planum, truncato-bidentatum, inferius trilobum, convexus, latum, disco venoso. Stamina duo. Connectivum apice incrassatum; loculi oblique positi; inferior basi sterilis in rostrum productus, superior minor. Capsula tetrasperma, a basi seminifera. Retinacula brevia, lamelliformia. — Herbæ Indiæ orientalis et Africæ, sæpe annuæ, pleræque parvæ, humiles, e spicis habitu proprio prædictis facilis distincta. Spica terminalis et axillaris, bracteata. Flores decussati in solitarii, bibracteolati, bracteolis laciinis calycis similibus iisdemque alternis, bracteis in aliis laxis, in aliis calycis laciinis subsimilibus.

1. R. REPTANS, caule repente ramosissimo geniculato, foliis obovato-subrotundis basi cuneatâ in petiolum decurrentibus supra scabris, spicis tetragonis axillaribus solitariis, bracteis suborbiculariis membranaceis latis, bracteolis calycisque laciinis subulatis ciliatis supremâ duplo minore. *2* In humidis inundatis ad sinum S. Augustini et in Bombaton insulæ Madagascar (Bojer! in h. DC.). *Strobilanthes reptans* Bojer! I. c. Folia inferiora  $\frac{2}{3}$ -1 poll. longa, longius petiolata, ramea unguicularia petiolo breviora. Spicæ axillares et terminales, circiter pollicares, crassæ, pedunculo longitudine spicas septe inflexo.

Bracteæ arcte confertæ, subsquarrosoe, basi obtusissimæ, superiores basi magis cuneatæ, brevipetiolatæ, apice mucronulatae, venoso-5-7-nerves, rosæ margine albo-byalino, basin versus ciliatæ. Corolla bracteam æquans, pallide rosea? labio inferiore apice trifido, lacinia rotundatis, mediâ latiore puberula. Capsula lin. longa, 4-sperma, pallida, dorso bituberosa. (v. ex h. Bojer in h. DC. et Hooker).

2. R. HAPLOSTACHY, caule erecto compresso-quadrangulari utrinque linea subtomosâ notato, foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis petiolatis glabris, spicis oblongis circa apicem caulis et ramorum axillaribus solitariis fasciculatisve, bracteis subrotundis in petiolum linearem nervosum contractis obtusissimis latis pubescentibus, bracteolis setaceis calycem subæquantibus calycisque laciñiis lanceolatis setaceo-acuminatis pubescentibus, laciñiâ superiore duplo minore.  $\mathcal{U}$  Frequens inter frutices circa lacum Nosi-Be prov. Betani-Mena insulæ Madagascar (Bojer! in h.). Strobilanthes spec. Bojer! l. c. Herba octopetalis, dichotoma. Folia cum petiolo 9 lin. longo  $2\frac{1}{2}$  poll. longa et 1 poll. fere lata, in acumen argutum obtusum producta, subrepanda, costis quinis. Spicæ ad apicem ramorum axillares geminæ solitariæ, 6-9 lin. longæ, folio breviores, pedunculum pubescentem æquantes, statu sicco flavescentes. Bracteæ molliter imbricatae, obtusissimæ et subretusaæ, basi in modum petioli canaliculati 5-nervis contractas, inferiores autem hinc brevipetiolatae, teneræ, venoso-5-nerves, puberulae. Corolla 2 lin. longa, pubescens, labio superiore integro, inferiore apice trifido, laciñiâ mediâ latiore. Capsula 3 lin. longa. (v. in b. DC. et Hooker).
3. R. TENELLA, caule basi repente adscendente linea puberula notato, foliis ovalibus obtusis repando-crenatis basi cuncatis glabris longe petiolatis, spicis ovalibus axillaribus solitariis fasciculatisque, bracteis ovato-cuneatis obtusissimis truncatis membranaceis, bracteolis linearibus, calycis laciñiis subulatis glabris supremâ duplo minore.  $\mathcal{U}$  In pratis humidis inter saxa prov. Emirnæ insulæ Madagascar (Bojer! in h. DC. et Hooker), in Senegambiâ secus fluvium Rio Nunez (Heudcloc! in b. mus. paris. n. 4). Tenella, habitu fere Trifolii filiformis aut Meliloti cuiusdam. Genicula caulis pubescentia. Folia semipollicaria. Spicæ laxiusculæ, 3-4 lin. longæ, pedunculo breviores, folium subæquantes, plerumque solitariæ, oppositæ, subinde et geminæ, exteriore breviore. Bracteæ venoso-quinquenerves. Capsula lin. 1 longa. (v. in h. DC. et Hooker).
  - $\beta.$  *squamosa*, squamis apice truncatis angulis obtusis subrepandis. — In insulâ Bourbon (Petit-Thouars! in h. Willd.). Justicia squamosa h. Willd.! n. 327.
4. R. CRENULATA, caule procumbente glabro apice pubescenti-scabro, foliis ovato-orbiculatis obtusis apicem versus obsolete crenulatis basi cuneatis brevipetiolatis glabris, spicis subglobosis axillaribus solitariis, bracteis obovato-cuneatis obtusissimis latis glabris, bracteolis linear-lanceolatis calycem æquantes calycisque laciñiis linear-subulatis glabris, supremâ duplo breviore.  $\mathcal{U}$  In humidis inundatis prov. Emirnæ insulæ Madagascar (Bojer! in h. DC. Lyall! n. 382 in h. Hooker). Strobilanthes? crenulata Bojer! l. c. — Planta pusilla, aliquot pollicum longitudine. Folia cum petiolo 3 lin. longa, 2 lin. lata. Spicæ nisi magnitudine cum pedunculo puberulo folium æquantes. Bracteæ  $1\frac{1}{2}$  lin. longæ, 1 lin. prope ab apice latæ, pallide virides, trinervio-venosæ. Corolla parva. Calyx cum capsulâ parum ultra lineam longus. (v. in h. DC. et Hooker).
5. R. BRACHYSTACHY, caule quadriquetro laxe pubescenti-scabro, foliis oblongis utrinque attenuatis in petiolum brevem desinentibus in costis petioloque pubescenti-strigilosis canescensibus, spicis versus apicem caulis axillaribus oblongis recurvis secundifloris pedunculatis, pedunculis geminis oppositis, altero monostachyo altero bi-tristachyo, bracteis obovato-cuneatis obtusissimis quinqueribus subciliatis, bracteolis lato-subulatis calyce plus duplo brevioribus,

- calycis quadripartiti laciniis æqualibus triangulare-snbulatis anguste membranaceo-marginalis.  $\mathcal{L}$  In Mauritio ( Petit-Thouars! in h. Willd.). Justicia brachystachya h. Willd! n. 308. Habitu accedit ad R. crenulatam. Capsula 4 lin. longa, clavata, a basi ad medium asperma. (v. in h. Willd.)
6. R. PSYCHOTRIOIDES, caule quadrignetro strigiloso-scabro, foliis ovalibus obtuse cuspidatis in petiolum medicorem acute desinentibus subtus undique supra in costis petioloque strigiloso-scabris, spicis infraterminali-oppositis (terminalibus quaternis) ovalibus secundifloris pedunculatis petiolo paulo brevioribus, bracteis cuneiformibus acutiusculis subquinquenervibus margine ciliolato-scabris rigidulis, bracteolis calyce duplo brevioribus calycisque quadripartiti laciniis subulatis carinatis immarginatis scabris.  $\mathfrak{Z}$ ? In insulâ Mauriti (Petit-Thouars! in h. Willd.). Justicia psychotrioides h. Willd! n. 309. Folia cum petiolo 4-lineari bipinnularia, rigidula, uti et bracteæ. Planta siccata nigrescit. Corollæ (parvæ) tantum rudimentum vidi, sed affinitas cum R. brachystachyf tanta est, ut de genere viz dubites. (v. in h. Willd.)
- 7.? R. SARMENTOSA (Zollinger pl. jav. n. 596), caule sarmentoso diffuso puberulo radicibus crassis radicante, foliis ovatis vel oblongo-ovalibus obtusiusculis glabris in costis asperulis, spicis axillaribus terminali-laxiusculis, bracteis lanceolatis subulatis-acuminatis laxe ciliatis calyce longioribus bracteolis subulatis calyci 5-partito æqualibus huicunque laciniis setaceis conformibus glanduloso-asperulis.  $\mathcal{L}$  In insulâ Javâ (Zollinger!).  $\mathcal{M}$ theilema? Moritzi pl. zoll. p. 47 n. 596. Planta tenera, foliis spicisque pollicaribus. Corollæ (pallidæ?) labium superius brevius, emarginatum. Stamina omnino bujus generis. Capsula a basi fere tetrasperma, lateribus brevi spatio a dorso solutis (in uno exemplo nescio an eo constante). Bracteæ spiratim alternæ. (v. in h. Zolling.)
8. R. ROTUNDIFOLIA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 100), caule repente foliisque orbiculatis hirsutissimo, calycis laciniis bracteis calyce paulo brevioribus ex ovato cuspidatis margine late membranaceis hirti-ciliatis. (I) In Indiâ orientali, Nepaliâ cum R. mollissimâ (Wall!), in Travancore (h. Madr.), Madras, Augusto (Edgeworth! n. 137), Doab in planities umbrosâ, Octobri (idem! n. 239). Justicia rotundifolia Wall. cat. n. 2489 (ex parte). Justicia mollissima Wall. cat. n. 2445 (ex parte). Justicia procumbens h. Madr. Wall. cat. n. 2441 a (ex parte). Similis quidem R. procumbentis var.  $\beta$  exemplis latifoliis, sed diversa: canilibus e radice crassa ramosâ plurimis vix digitalibus repertibus patenti-birsatis, foliis (4-6 lin. longis) fere regulariter orbiculatis apice rotundatis longiore petiolo instructis, spicis minoribus, bracteis bracteolis calycisque quadripartiti laciniis latioribus brevioribus e latiore basi lanceolatis margine membranaceis pilis multis quidem, sed brevioribus, iis neque adeo rigidis vestitis. Capsula candida, longitudine calycis, apice barbulato-pubescentis. (v. in h. Wallich, Wight, Hooker).
- $\beta$ . foliis superioribus ovatis vel ellipticis angustioribus, labio subtns scabro. — In Pagamew (Guil. Gomez!), Madras (Edgeworth!). Vidi etiam in h. Mart. ex h. Hügel, in ripâ Chumbal prope Dholpoor (Edgeworth! in h. Bentham). Justicia Vahlii  $\beta$  imberbis Roth nov. pl. sp. p. 15. Fide exempli h. Heyn. Justicia procumbens Wall. cat. n. 2441 i. Justicia procumbens Vahl en. 1 p. 140 et 141 excl. synon. (v. in h. Mart., Heyn. etc.)
- $\gamma$ . erecta, foliis (superioribus) lanceolatis brevissime petiolatis, spicis crebris elongatis, caule erecto patenti-hirsuto. — (O) In Indiâ orientali (Jacqemont! in h. mus. paris. n. 163).
9. R. HEDYOTIDIFOLIA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 100), caule erecto a basi divaricato-ramoso foliisque ovatis subcrenatis acutis sebriusculis, spicis terminalibus et sub apice axillaribus brevibus basi interruptis, caly-

cis quadripartiti lacinii lanceolatis marginæ membranaceis glabris, bracteis calycem aequalibus, bracteolis calycem brevioribus, utrisque setaceis. (O) In Indiâ orientali. (Ex herbario Heyneano, loco natali speciatim non adnotato). *Justicia hedyotidifolia* Wall. cat. n. 2450 (ex parte). Planta spithamea. Folia caulinâ media police paulo longiora, summa et ramea breviora, in petiolum bilineare obovatae-scapulatae desinentia, apicem versus obitor et irregulariter crenatae, margine et nervis scabriusculis. Bractea setacea, calycem aquans; bracteola calycem duplo breviores, setacea, scabriusculæ. Calyx sesquilinearis; laciniae anguste lanceolatae, acuminatae, margine membranaceæ, glabrae, acuminæ serrulato-scabro; superiores duas paulo breviores. Corolla bilinearis pallide purpurea. (v. in h. Wallich).

10. R. DIFFUSA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 100, Wight h. propr. n. 1985 et 1985 b), caule procumbente diffuso foliisque lanceolatis ellipticis vel subrotundis lineolatis glabris vel parce pilosulis, spicis compressis gracilibus, calycis lacinii lanceolatis margine membranaceis subtilissime ciliatis, bracteis consumilibus calyce brevioribus. (I) In pascuis humidis Indiâ orientalis (Wight!), in Mongbir, Madras (Wall.), Hamilt.). Vidi etiam in herb. Heyn. et Wight. *Justicia diffusa* Willd. sp. pl. 1 p. 87, ed. Dietr. 1 p. 393 et h. n. 326 (specimen Klein.), R. et Sch. syst. 1 p. 154, mant. 1 p. 137, Roth nov. pl. sp. p. 14, Wall. cat. n. 2444 a, b, c (teste spec. Heyneano in h. Moll. et Mart.), h. Madr.! Wall. cat. n. 2441 a ex parte! c ex parte. *Justicia procumbens* ð thymifolia Vahl, en. 1 p. 140 et h. fol. 2 et 4 (spec. h. Linn.), R. et Sch. syst. 1 p. 154, h. DC.! ex h. Hook. *Justicia procumbens* var.  $\alpha$  h. Hamilt.! Wall. cat. n. 2441 c ex parte. Planta statuâ et directione caulis maxime variabilis, foliis  $\frac{1}{2}$ -2 poll. longis, petioliis 1 lin. vel 6 linearum longitudine, ambitu ovatis, ovalibus vel subrotundis Thymi vel Parietariae judaicæ. Sed constant haec nota: Felia glabra sunt, lineolis interruptis seu rugulis inspersa, tanquam setulæ adpressis sub epidermide relictis. Bractea inferior oblongo-lanceolata, calyce nonnihil latior, laterales angustiores ex ovata basi magis subulatae, calyce duplo triplo brevior. Calyx ad basin fere quinquepartitus, lacinia 4 lanceolatis acutis, quarum duæ inferiores longiores; quinta minima subulata; laciniae et bracteæ margine lato membranaceo subtilissime pubescenti-ciliato præditæ sunt, nervo que carinali lato viridi pubescenti scabro; lacinia superior illa calycis tota membranacea est. Corolla omnino ut in R. procumbente, sed minor, carnea; labium inferius pubescens. Capsula oblonga, glabra, calycem in plantis minoribus humifusis æquans, in majoribus superans, et tum basi attenuata. (v. in h. Wallich, Wight, Hooker, etc.)

11. R. PROCUMBENS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 101), caule procumbente vel adscendente foliisque ex ovato lanceolatis ciliatis hirtis, spicis subteragonis, calyeibus 4-5-partitis bracteisque lanceolato-linearibus æqualibus hirsuto-hispidovalve ciliatis, capsula oblonga calicem æquante. (I) In Indiâ orientali, Julio-Septembr. Decesne Timor. in nov. ann. du mus. 3 p. 383, h. Wight n. 1986. Differentia essentialis hujus speciei constat in pubescenti rigidula setiformi articulata in caule sœpe retrospectante, quâ omnes partes maxime calyces et bracteæ vestiuntur, tum vero calycis laciniae linearilanceolatae acuminatae rigidæ, basi magis vel minus membranaceæ, fere longitudine sunt bractearum, que inter se æquales linearilanceolatae hirtæ et rigentes spicam densam crassiusculam  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  pollicis longam oblongam cylindraceo-tetragonam struunt. Corolla rosea, labio inferiore pubescente. Capsula calyce paulo latior, oblonga. (v. cum varri. in h. Wallich, Wight, DC., Hooker, berol., etc. etc.)

$\alpha$ . caule procumbente, spicis sœpe brevioribus, foliis oblongo-lanceolatis oblongis. — Moritzi pl. Zollinger. p. 47 n. 846 in h. DC. Frequentissima in pascuis costæ Coromandelianæ (Roxb., Wight!), in Himalayâ alt. 6000' (Edgeworth!), in insula Timor (h. DC.!), Tavoy (W. Gomez!)

h. DC.), Mergui (Griffith! in h. Hooker), Prome montibus (Wallasch!), Cap Lintin (Meyen! Staunton! in h. DC.), Hong-Kong (Hinds! in h. Bentham), Java (Zollinger!). *Justicia procumbens* Linn. fl. zeyl. p. 19, Willd. sp. pl. ed. 2, 1 p. 303, Röem. et Sch. syst. 1 p. 154, excl. var.  $\delta$ , mant. 1, p. 136, Vahl en. 1 p. 140 (incl. var.  $\gamma$ , et hb.! fol. 1 et 3), Roxb. fl. ind. or. ed. Car. et Wall. 1 p. 133 n. 28, Roth nov. gen. pl. sp. p. 16, observ. Wall. cat. n. 2441 d, h. *Justicia hirtella* Wall. cat. n. 2448, (h. Wight!) suppl. n. 159.

$\alpha^*$ . caule erecto; reliquis ut in var.  $\alpha$ . — Simla in Himalayā (Edgeworth!), in ripâ Irawaddi fluminis frequens (Guil. Gomez!). *Justicia quinquangularis* Wall. cat. n. 2444 d.

$\alpha^{**}$ . foliis hrevissime petiolatis suhsessilibus, ad var.  $\delta$  transiens (h. Mart. ex h. Lambert!).

$\alpha^{***}$ . caule foliisque hirsutis glabrescentibusve, foliis brevissime petiolatis, floribus duplo majoribus. Variat 1<sup>o</sup>: hirsutior, foliis ovali-oblongis acutiusculis. In Ceylon (Walker? n. 39 et 183 in h. Hooker Moricand). 2<sup>o</sup> glabrescens, foliis oblongis obtusis. In Ceylon (h. Hooker n. 1751).

$\beta$ . caule ut in var.  $\alpha$ , foliis ovatis vel subrotundis. — In oryzetis Indiæ (Roxb.), in humidis circa lacus et oryzeta (idem), in valle silvestri humida ad Ootacamund, Nilgherry (Schmidt), Khas (Griffith! n. 171 in h. Hooker), Cachemyr (Jacquemont! in h. mus. paris. n. 165), Chinā (Staunton in h. DC!), Fortune! in h. Hooker), Culu-Naga (h. gen. berol! spec. glabrescens), ad pedem jugi montani Nilgherry (Schmidt); prope Kaitis (Perrottet in h. DC.), in Himalayā Simlā alt. 6000' (Edgeworth! n. 236. Lady Dalhousie! in h. Hooker). *Justicia Japonica* Thunb. fl. jav. p. 20 (in h. Hooker).

$\gamma$ . cum formâ foliorum ut in  $\beta$  spicis (sæpe) elongatis angustioribus laxioribusque interruptis bracteisque calyce dimidio brevioribus; quæ exempla fere media sunt inter R. procumbentem et diffusam. Prome (Wall. cat. n. 2444. e!).

$\delta$ . foliis linear-lanceolatis vel linear-oblongis subsessilibus, reliquis ut in var.  $\gamma$ . — In Promæ montibus (F. Gomez!), in Novæ Hollandiæ littoribus inter tropicos (Rob. Brown), in ripâ Hunters river dicto, Aprili (Cunningham! n. 50. in h. Bentham. et h. Hooker.) *Justicia procumbens* Wall. cat. n. 2441. e. ex parte, (*Justicia procumbens* h. Roxb.) *Justicia quinquangularis* Koen. Roxb. fl. ind. or. ed. Wall. et Car. 1 p. 134. Röem. et Sch. mant. 1 p. 136. Willd. sp. pl. ed. 2 p. 393. *Justicia hirtella* Wall. cat. n. 2448. ex h. Wight! *Justicia adscendens* R. Br. prodr. fl. nov. holland. 1 p. 476. opp. ed. N. ab E. 3. 1 p. 322. Sæpe glabrescens. Variat bracteis calycibusque parum ciliatis.

$\epsilon$ . caule simplici ramosove erecto. — In pede montium Nilghericorum (Schmidt), in Nepal (Don). *Justicia simplex* Don fl. nep. p. 118, Willd. sp. pl. ed. 2 p. 376.

Varietates  $\alpha$  et  $\beta$  vix limites ostendunt, tametsi fines extremi maxime dissimiles videantur.

12. R. ABYSSINICA (Brongn. in hort. bot. paris.), caule erecto foliisque ohlong-lanceolatis oblongis hirtis, spicis oblongis cylindricis subtetragonis, calycibus quadripartitis bracteisque linear-lanceolatis æquantibus margine membranaceis hirsuto-ciliatis, capsulâ ovali obtusissimâ calycem subæquante. (O) In Abyssiniâ: ad margines fruticetorum umbrorum partis inferioris septentrionalis montis Scholoda et in montibus umbrosis prope Axum, Novembri (Schimper!), ad Adonali in Abyssiniâ (Quartin-Dillon! in h. mus. paris. n. 43). Rostellularia pumila Hochst. in Schimp. it. abyssin. 3 n. 1524. Barleria pumila Hoerbst. in Schimp. it. abyssin. un. itin. 2 n. 21. Similis R. procumbenti, a quâ caule erecto, capsulâ breviore teneriore magisque pubescente primo obtutu

distinguitur. Variat caule ramoso proceriore et simplici pumilo, quæ est Barleria pumila Hochst. l. c. (v. in h. Schimper. etc.)

13. R. GLANDULOSA, caule adscendente ramoso pubescenti-cano, foliis ovato-oblongis acuminatis pubescentibus, spicis terminalibus elongatis tetragonis basi subcompositis, calycibus quadripartitis subulatis glandulosis, bracteis lanceolatis bracteolisque calyce brevioribus, capsulâ basi contractâ glabrâ calyce longiore.  $\Sigma$  In dumetis regionis inferioris et mediæ australis montis Scholoda (Schimper!). Hypoestes glandulosa Hochst. in Scbimp. it. abyss. un. itin. n. 346. A R. procumbente in primis differt foliis acuminatis et capsulâ majore, basi angustatâ. (v. in h. un. itin.)

14. R. CRINITA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 101, Wight h. prorr. n. 1987), caule procumbente adscendente trichotomo pubescenti-cano, foliis ellipticis ovatis birtis, spicis terminalibus sessilibus brevibus, calycibus quadripartitis apice bracteisque setaceis æqualibus patenti-hirsutissimis.  $\odot$  In Indiâ orientali. (Vidi exemplum h. Heyn! inter alia complura R. mollissimæ). Justicia micrantha Wall. cat. n. 2449 (ex parte). Justicia micrantha et hispida var. ? h. Heyn. Wall. cat. l. c. (ex parte). A R. procumbente, differt: foliis multo minus lineolatis amplioribus, bracteis e basi parum dilatatâ setaceis longioribus setis articulatis patentissimis flexuosis hirsutissimis, corollâ paulo longiore, antheræ loculo infero in cornu subcontorto. Caulis semipedalis-pedalis, sexangularis, a basi trichotomus, ramis fastigiatis, undique setulis recurvis scaber et subcanescens. Folia in varietate  $\alpha$  cum petiolo  $\frac{1}{4}$  poll.  $2\frac{1}{2}$ -3 pollices longa,  $\frac{1}{4}$  pollices et ultra lata, basi apiceque acuta; in var.  $\beta$  fixum petiole majora, petiolo bilineari prædicta, utrinque hirsuta. Spicæ in ramulis oppositis brevibus infra apicem ipsoque in apice sessiles, foliorum pari minorum stipitæ, in var.  $\alpha$   $\frac{1}{4}$  poll. longæ, oblongæ, in var.  $\beta$  breviores ovatæ, densæ. Corolla 2-2 $\frac{1}{2}$  lin. longa, pallide purpurea. Capsula fere duas lineas longa, ovalis, glabra, pallida. (v. in h. Wallich et Hooker).

$\alpha.$  foliis ellipticis utrinque acutis longe petiolatis.

$\beta.$  foliis ovatis basi obtusis brevipetiolatis.

15. R. ROYENIANA, caule procumbente diffuso, foliis oblongo-lanceolatis lineolatis glabris, spicis pedunculo brevioribus, calycis laciniis bracteis bracteolisque linearibus acutis sparsim patenti-pilosis glandulosis immarginatis.  $\odot$  In ins. Zeylon. Justicia Ganggetica Linn. ? h. Royen! in h. DC. Justicia repens h. Delessert! in h. DC. Hoeloe naga e Ceylon. h. gen. berol.! Differt a R. procumbente foliis cauleque glabris, illis laxius lineolatis subtus glaucescentibus subrepandis, spicis paulo laxioribus minus hirsutis. Quod ad habitum omnino accedit ad R. adenostachyanum, sed differt calycibus longioribus glandulis destitutis. An. R. procumbentis var. glaber? (v. in h. DC. et Hooker).

16. R. ADENOSTACHYA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 101), caule procumbente diffuso, foliis oblongo-lanceolatis lineolatis glabris, spicis pedunculo brevioribus, calycis laciniis bracteis bracteolisque linearibus obtusis glandulosos pilosis margine angusto membranaceo.  $\odot$  In Indiâ orientali: in Travancore (h. Madr.!) Justicia procumbens Wall. cat. n. 2441. a. (ex parte.) Justicia diffusa h. Madr.! (nescio an omnia exempla) Wall. l. c. Differt a R. procumbente foliis longius petiolatis glabris nec nisi margine petiolisque scabris, spicis  $\frac{1}{4}$  poll. longioribus pedunculo brevioribus, pilis capitatis glandulosis vestitis, calycibus bracteisque minus acutis. Corollæ albae labium inferius purpureum. Antheræ loculus inferior totas in cornu contractus. (v. in h. Wallich).

17. R. MOLLISSIMA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 101, Wight h. n. 1988), caule procumbente repente, foliis ex ovo lanceolatis hirsutis, spicis tetragonis, calycibus et bracteolis lanceolatis bracteisque rhombo-ovalibus acuminatis acutives æqualibus membranaceo-marginatis ciliatis flavicantibus.  $\odot$  In India orientali. Differt a R. procumbente caule magis elongato, dense flavicanti-

*hirsutulo*, pubescens minus rigidæ, foliis ex oblongo-vel ovato-lanceolatis lanceolatis obtusis, breviore etiam petiolo præditis, valde arcuatim lineolatis utrinque hirsutis hirsuto subpressa, spicis semper densis, bracteis bilinearibus rhombo-ovatis acuminatis ciliatis, margine lato flavicanti-hyalino cinctis virore medio anguste lanceolato, his atque bracteolis lanceolatis acuminatis angustiorique margine cinctis calycem adæquantibus vel etiam superantibus, calycis laciniis lanceolatis hirsuto-ciliatis late membranaceis nervo dorsali viridi angusto, corollæ majore ampliore alba, labiis late ovatis, superiore bidentata, inferiore haud profunde trifida, laciniis lateribus angustioribus. Colla 8 lin. longa. Capsula ovalis, apice pubescens, disperma.

$\alpha$ . in Nepalij (Wallich !), (b. Wight !, absque loci natalis indicio), in collibus Billfcallæ, nec vero circa Utacamund Nepaliæ (Sebmüdt), in Nilgherries (Leschenault! in h. DC.)

$\alpha^*$ . canæ hirsutæ, bracteis rhombo-ovalibus acuminatis acutis, statura majore. — In ins. Jaya (Zollinger! pl. jav. n. 2026, Moritzl pl. Zollinger. p. 47).

$\alpha^{**}$ . caule glabro spleem versus setulis retroversis scabro, bracteis oblongo-lanceolatis margine membranaceo angustiore ferrugineo. — In Philippinis (Cuming! n. 1298 in h. Hooker, Bentham, et in h. gen. herol. Dianthera Americana Blanco fl. philipp. p. 16. Media quasi est inter R. procumbentem et mollissimam var.  $\alpha$  et forsitan propria species.

$\beta$ . extenuata, caule elongato flaccido subsimplici. — In Nepalij (Wallich !) Justicia mollissima Wall. cat. n. 2445 (ad majorem partem). Justicia micrantha et hispidæ var. h. Heyu.! Wall. cat. n. 2447 (ex parte). Est forma macra et debellis umbra et soli sterilitate extannata. Folia in hac minora sunt; spica plerisque una tantum, terminalis, brevis. (v. in h. Wallich et Hooker).

18. R. OBTUSA, caule procumbente repente foliisqæ ex ovato oblongis sgabris, spicis tetragonis densis, bracteis bracteolisque calycem æquantibus ovalibus obtusis cum mucronulo vel breviacutis calycoisque laciniis late membranaceo-marginatis ciliatis. (C) In insulâ Java. Accedit ad R. rotundifoliam habituque magis etiam ad R. mollissimam. Differt ab utrâque bracteis bracteolisque obtusis, Calycis laciniæ 4-5, lanceolatæ; superior, si adest, duplo brevior reliquis. Collæ pallidæ tubus longitudine calycis. Capsula calyce paulo longior, ovalis, laevis, alba. Folia unguicularia, ovata, ovalia, aut ovato-oblonga, obtusa, nonnulla subrenata, supra dense lineolata, subtus et in margine setulis brevibus scabra, brevissime petiolata. Spicas in forma  $\approx$  1 poll., in forma  $\approx$  2-3 poll. longæ. An var. R. media? (v. in h. Blume, Jungbuhn, Zollinger, berol.)

$\alpha$ . spicis brevibus, bracteis obtusis. — In silvaticis montis Ungarang insulæ Javæ (Jungbuhn!, Blume!). Justicia procumbens Bl. bijdr. p. 788.

$\beta$ . spicis elongatis bracteis obtusis. — In umbrosis prope Brambanan, ab Aprili in Augustum, in silvaticis montis Ungarang insulæ Javæ (Zollinger! pl. jav. n. 2218 et 2237 nec in Moritzl pl. Zollinger. In h. DC.) Justicia procumbens var.  $\beta$  Blum. bijdr. l. c.

$\gamma$ . bracteis breviacutis Justicia Blumeana Klotzsch! in h. gen. berol.

19. R. MEDIA, caule erecto foliisqæ oblongo-lanceolatis obtusis pilosulis, spicis tetragonis densis, bracteis bracteolisque calycem æquantibus ovalibus obtusis cum mucronulo calycoisque laciniis late membranaceo-marginatis ciliatis. (C) In Novæ Hollandiæ oris orientalibus infra tropicum (R. Br.), locis siccis in ripâ Brisbane fluvii (Allan Cunningham! n. 44 in h. Hooker. Justicia media R. Br. prodr. fl. nov. holl. I p. 476, opp. ed. N. ab E. 3 p. 332. Simillima R. obtusa et forte hæc cum R. media conjugenda, adjecta tum vero et R. adscendente R. Br. Differt solummodo a R. obtusa follis paulo angustioribus et caule erecto. Spicas in nostro specimine breves, in aplice caulis et ramorum ut plurimum ternæ aggregatae, subsessiles. (v. in h. Hooker).

20. *R. PEPLOIDES* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 101), caule erecto ramis divaricatis diffusis repente foliisque subovatis obtusis punctulatis glabris, spicis apice densis basi interruptis et foliosis, calycis laciniis bracteis bracteolisque conformibus æqualibus ex oblongo linearibus obtusis membranaceo-marginatis apice exasperatis et serrulato-ciliolatis. (C) In Indiâ orientali. — Differt a reliquo glaucedine, glabritaque partium, spicis basi foliosis, floris partibus obtusis patulis apice tuberculis setuligeris exasperatis marginaque serrulato-ciliolatis. Herba palmaris-pedalis. Folia 1½-1 poll. longa, inferiora in petiolum breve planum acute desinentia, ovata vel ovato-elliptica, superiore magis oblonga et basi in petiolum attenuata, glauca, carnosula. Rhabdophyllum acute sexangularis, glabra. Bracteæ glabrae. Bracteæ inferiores binæ vel quaternæ sepe majores, oblongæ, petiolatae; reliquæ calyce paulo longiores, lanceolatae, ohtusæ, margine membranaceæ apicem versus argute serrulato-ciliatae dorsoque setulis exasperatae. His similes bracteolæ calycisque subquadripartiti laciniæ, nisi quod angustiores lato-lineares et laciniæ calycis insuper apice plerumque setulæ mucronulatae. Corolla bilinearis, glabra, pallida. Capsula ovalis, glabra, 3 lin. longa, vix ad ¼ a basi asperma.

$\alpha$ . foliis caulinis ovatis. summis rameisque ex oblongo cuneiformibus. —

In ripâ Gangetis ad Rhagpur et Rajemabl (Wallich!), in humidis prope Doab ad Tuttenguhl, Augusto et Septembri (Edgeworth! n. 238), Afghanistan (Griffith! n. 598 in h. Hooker). *Justicia procumbens* Wall. cat. n. 2441 c, b et var.  $\gamma$ . (v. in h. Wallich, Hooker et Edgeworth).

$\beta$ . foliis omnibus ex oblongo vel lanceolato cuneiformibus, caule humiliore infirmiore, ramis magis diffusis. — Sibguni (Wallich!), in humidis prope Doab ad Tuttenguhl Augusto et Septembri (Edgeworth! n. 238). *Justicia procumbens* n. 2441, c  $\beta$ . Wall. l. c. *Justicia procumbens* var.  $\beta$  h. Hamilt. Wall. l. c. (v. in h. Wallich et Edgeworth).

1. *R. QUINQUANGULARIS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 101), caule erecto vel procumbente foliisque linear-lanceolatis acutis lineolatisque elongatis ad tactum scabris, calyce bracteolis bracteisque sub anthesi æqualibus lanceolatis obtusis margine anguste membranaceis levibus margineve scabris, antheris glabris, labio subtus in medio scabro. (C) In Indiâ orientali. Radix fibrosa, ramosa, barbam densam conficiens. Caules aliquot pedum, in var.  $\beta$  semipedales, a basi ramosi ramis dichotomis, superiora versus hexagoni, lateribus 4 planis angulo obtuso conjunctis, duobus concavis, ideoque, ubi duo latera confluent, ad speciem pentagoni, ad angulos tuberculis scabriusculli, quandisque levæ. Folia internodiis breviora, 2½-3 pollices longa, 2 lin. lata, lanceolata, in var.  $\alpha$  utrinque acuta, in var.  $\beta$  obtusa, supra conformatim lineolata, in ambitu scabra. Bracteæ bracteolæ et calycis laciniæ sub anthesi fere ejusdem omnino longitudinis et formæ, bilineares, lineari lanceolatae, obtusæ, viridulae, margine tenui membranaceo cinctæ, apicem versus setulis erectis ciliolato-scabre, dorso levæ. Post anthesin calyx incrementus depositusque, sicuti et bracteæ, omni marginum scabritie, levæ evadit, 3 lin. longus, bracteæ et bracteolæ perstant, ut in flore. Corolla parva, 2½-2½ lin. longa, glabra, alba, labio inferiore roseo. Capsula 2½ lin. longa, oblonga glabra.

$\alpha$ . major, canile foliisque elongatis, his acutis, bracteis calycibusque patulis, sub anthesi margine scabris. — In ripâ Gangetis fluvii ad Rajamahl (Wallich!), in Nepaliâ inferiore (idem!), in Sillet (Wallich!), Moradabad, Maio (A. Thomson! in h. Hooker). *Justicia quinquangularis* Koen. Roxb. fl. ind. or ed. Car. et Wall. 1 p. 134. R. et Sch. syst. mant. 1 p. 136, Willd. sp. pl. ed. 2 p. 393, Spr. syst. 1 p. 81, Wall. cat. n. 2443 c, e, f. *Justicia geniculata* Wall. in h. olim. (v. in h. Wallich).

$\cdot$  minor, foliis obtusis, bracteis calycibusque adpressis margine levibus. — Ad margines oryzatorum agri Samulcottensis (Roxb.), in Nimtabad (Hamilt.). *Justicia diffusa* h. Hamilt.! Wall. cat. 2443 d. *Justicia quin-*

*quangularis* Wall. cat. l. c. Propter folia obtusa, spicam compressam, floribus æquidistantibus adpressis instructam bracteas bracteolasque magis oblongas margine omni statu læves, corollas paulo majores, nescio an rectius proprio nomine, ut species, sit proponenda. (v. in h. Wallich).

22. R. VAHLII (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 102), caule procumbente foliisque lanceolatis linear-lanceolatis elongatis ad tactum scabris, calyce bracteolisque æqualibus oblongo-lanceolatis bracteisque paulo longioribus ovato-oblongis cuspidatis margine late membranaceis apice scabriusculis et ciliolatis, antheris apice labio subtus barbatis. ♂ In Indiâ orientali (Wallich ! Wight ! in h. Hooker). Ad R. quinquangulararem relata se habet ut R. mollissima ad procumbentem; quod ad flores et bracteas R. diffusa est propinquā. Caulis articulis elongatis, inæqualiter sexangularibus, alternatim ex opposito sulco profundiore divisus ad angulos acutiores setulis seu potius tuberculis exiguis sparsis scaber. Folia angusta, 3-4 pollices longa,  $2\frac{1}{2}$ -3 lin. lata, utrinque attenuata, glabra, margine scabra, punctulata nec lineolata. Bracteæ 2 lin. longæ, inferiora versus unam lineam fere late, subulato-acuminatæ. Bracteola ejusdem longitudinis, lanceolatæ, acutæ, margine membranaceo angustiore. Calycis bracteæ sub-æqualis laciniæ a basi oblongo-lanceolatæ cuspidatæ, fere totæ membranaceæ, nervo medio apicem versus vidente. Corolla 3 lin. longa, labio purpureo, laciniæ mediæ subtus hirtulæ. Capsula 3 lin. longa, oblonga, pallida, apicem versus tenuissime pubescens.

α. foliis lanceolatis vel linear-lanceolatis. — *Justicia Vahlii* Roth nov. sp. pl. p. 14 (excl. var. β). *Justicia Vahliana* Roem. et Sch. mant. 1 p. 138. Willd. sp. pl. ed. 2 p. 393. *Justicia diffusa* Vahl en. 1 p. 141 (excl. syn. Willd.) et h.! *Justicia linearifolia* h. Vahl ! Var. foliis lanceolatis; specimen Rottlerianum. *Justicia procumbens* h. Heyn.! Wall. cat. n. 2443 g. *Justicia quinquangularis* Wall. cat. l. c. et h. Russell.! Wall. cat. n. 2443 a. fol. I ex parte. (v. in h. Vahl, Wallich, etc.).

β. *graminea*, foliis linearibus, caule magis diffuso. *Justicia graminea* et *junccea* h. Russell.! fol. 2 et 3. Wall. cat. n. 2443 a (ex parte). Roxb. fl. ind. or. Car. et Wall. 1 p. 134 (adnot. ad J. quinquangularem).

γ. *nana*, caule humili 1-2-pollicari cæspitose ramoso, reliquis ut in formâ majore. — In Indiâ orientali (Jacquemont ! in h. Mus. paris. et Ncs n. 164).

23. R. JUNCEA, caule erecto, foliis linearibus obtusiusculis arcuatim lineolatis margine scabris, calyce bracteisque æqualibus lanceolatis scabris margine membranaceis laxe ciliolatis, bracteolis subulatis subimmarginatis paulo brevioribus. ♂ In littoribus Novæ Hollandiæ orientalibus (R. Brown). *Justicia juncea* R. Br. prodr. Nov. Holl. 1 p. 476, opp. ed. N. ab E. 3 p. 332. *Justicia media* R. Br. in h. Hooker. Folia crassiuscula, subsucenta. Spica brevis, oblonga, pedunculo spicæ longitudine. Capsula longitudine calycis. Accedit ad R. Vahlii. Variat foliis cauleque glabris et foliis utrinque cauleque pilosiusculis. (v. in h. Hooker).

CXVII. LEPTOSTACHYHA N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 105, Lindl. intr. ed. 2 p. 285, Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 149, Endl. gen. p. 705, Meisn. gen. p. 296 (204). — *Justicia* spec. Jacq., Linn. et autt. — *Campylostemon* E. Mey. pl. Dreg.

Calyx quinquepartitus, æqualis, parvus, bracteis bracteolisque parvis plerisque subulatis suffultus. Corolla ringens, tubo longiusculo, in unâ specie (*L. campylostemon*) intus ad basin maculis tribus sericeis, ut in Sericographi, notato, labio superiore recto bidentulo, inferiore convexo trifido laciniis brevibus. Stamina duo, tubo inserta, basi sæpe tubo ad

staminum insertionem strigoso-hirtis nec vero maculis sericantibus staminibus interjectis. Antheræ biloculares, loculis subcontiguis, uno alteri superposito, superiore obliquo, inferiore minore calcarato (in *L. parvifloræ*, crinita, Martiana, virgata et Wallichii mutico). Stigma bidentatum. Capsula basi compressa, asperma valvularum commissurâ planâ, apice depressa, tetrasperma. Dissepimentum adnatum. Semina muricata, retinaculis bidentatis suffulta. — Herbæ, raro frutices, pleræque Americanæ, aliquot Indiæ orientali, una species etiam Africæ australi indigenæ. Spicæ secundæ rarius floribus oppositis glomeratisque verticillatæ, terminales, vel axillares, vel ex axillaribus in terminalem abeentes, aliis simpliæ, aliis dichotomo-vel trichotomo-divisæ, subumbellatæ multifidæ vel etiam pluries compositæ. Flores mediocres vel parvi, pallide rosei, disco labii inferioris sæpe pennatim venoso. — Genus hoc magis inflorescentiæ et habitu quam characteribus scriptis definitum.

§ 1. *Spicæ vel axillares, simplices, bi- trifidae, vel terminales, ramosæ. Flores et fructus majusculi. — Capenses, Americanæ et Indicae.*

1. *L. LUCIDA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 149), glaberrima, caule tortuoso-ramoso ascendentæ, foliis inæqualibus conformibus ovali-oblongis basi in petiolam acute decurrentibus lucidis supra intense viridibus lineolatis, spicis axillaribus oppositis solitariis geminis sessilibus flexuosis folio multo brevioribus secundifloris, calycis laciniis bracteolisque margine scabris. ♂ In Brasiliæ. Caulis ramosissimus, insigniter et illepidè tortuosus. Folia nitidissima. Folium alterum jugi singuli duplo sæpe minus est altero et racemulum minorem in angulo suo nutrit; in multis etiam deficit, nescio an casu præmaturo, an lege suâ. In foliis infimis sæpe minimum est hoc folium. Calyx æqualis, vix lin. 1 longus. Corolla alba tubus brevis, sursum amplior; labii inferioris discus pennatim venosus, maculis ferrugineis conspersus (Lund! in h. DC.). Antherarum loculi oblique contigui, inferior calcaratus calcare incurvo.

α. *acutifolia*, foliis apice attenuatis obtusiusculis. ♂ In silvis Macahé Brasiliæ, Augusto (Luschnath! in h. Mart.), in silvis umbrosis prope Rio de Janeiro (Lund! n. 227 in h. DC.), iisdem in locis Augusto et Septembri (Riedel! in h. acad. petrop. n. 785 a), in silvis Parayba (idem! ibid.) (v. in h. Mart., DC. et petrop.).

β. *obtusifolia*, foliis obtusis. — In Brasiliæ loco incerto (Sellow! in h. reg. berol. n. 131 [302] et 223 [84]).

2. *L. HETEROPHYLLA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 150), caule tortuoso ramoso-subdichotomo pubescente, foliis inæqualibus difformibus majore ovali oblongo-minore suborbiculari, supra lineolatis glabris subtus præsertim in costis scabris, spicis axillaribus oppositis solitariis geminis sessilibus flexuosis folio multo brevioribus secundifloris, calycis laciniis bracteolisque scabris. ♂ In Brasiliæ. Differt a *L. lucida*, caule graciliore pubescente, foliis minus lucidis subtus pallidis (in α utrinque modice attenuatis cum petiolo bilineari  $2\frac{1}{2}$  poll. longis 9-10 lin. latis, in β  $1\frac{1}{2}$  poll. longis 9 lin. fere latis, minoribus in utrâque formâ  $\frac{1}{2}$  poll. circiter longis latisque brevissime petiolatis, in formâ α breviacutatis in β obtusissimis), spicis minoribus (3-4 lin. longis) paucifloris magis scabris, corolle 3-6 lin. longæ purpurascens tibi basin versus magis attenuato. Capsula  $4\frac{1}{2}$  lin. longa, inter semina contracta, ut in *L. lucida*.

α. *acutior*, foliis majoribus utrinque subacutis magis angustatis, minoribus mucronato-acutis. ♂ Parayba in Brasiliæ (Sellow! in h. reg. berol. n. 130 [1425], in silvis umbrosis Macahé Brasiliæ, Maio et Junio (Riedel!

in h. acad. petrop. n. 798), Cassapi (Matbews! n. 1598 in b. Hooker).  
(v. in h. berol., petrop. et Hooker).

$\beta$  obtusa, utroque folio obtuso. — Parayba in Brasiliâ (Sellow! in h. reg. berol. n. 202 [1425, 482]).

3. L. PŒPPIGIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 150), glabra, caule adscendente erecto, foliis æqualibus conformibus ovalibus apice parum attenuatis obtusis basi in petiolum longum acute decurrentibus opacis supra lineolatis, spicis axillaris oppositis solitariis geminisve pedunculis trifidis rectis folio duplo multo brevioribus disticho-secundifloris calycis laciniis bracteis bracteolisque longioribus rhachique viscidulis glabris, antheris calcariatis.  $\mathcal{U}$  Maynas ad Egam circum flumen Amazonum, Junio (Pœppig! n. 2485 B in h. mus. palat. vindob. ex h. Endlich. et in h. reg. berol. et petrop.), Taropoto (Matbews! n. 1596 in h. Hooker). Justicia secundiflora Pœppig! coll. n. 2485 B in b. reg. berol. Similis L. lucideæ, differt formâ magis regulari foliisque conformibus æqualibus amplioribus apice minus attenuatis, longe petiolatis opacis. Spicæ subinde communi pedunculo longiusculo suffultæ, subinde petiolo duplo breviores et tum quoque pedunculatæ bi-trifidæ. Folia cum petiolo 1½ poll. longo 6½-7 poll. longa, 2 poll. lata. Corolla 3 lin. longa, calyces et bracteæ ut in illâ. Bracteæ et basi latiore subulata, bracteolæ que setaceæ calyce duplo fere breviores. Rhachis et calyces glandulæ exiguis viscidæ. Capsula immatura 4½ lin. longa. (v. in h. petrop. et Hooker).
4. L. SECUNDIFLORA, glabra, caule erecto, foliis æqualibus conformibus ovali-oblongis acuminatis basi cuneiformi-attenuatis et in petiolum longum decurrentibus opacis supra sparsim lineolatis, spicis axillaris oppositis solitariis pedunculis trifidis rectis folio brevioribus disticho-secundifloris, calycis laciniis bracteis bracteolisque longioribus rhachique viscidulis glabris, antherarum utroque loculo calcarato.  $\mathcal{U}$  In Peruvia Andium nemoribus ad Pozuzo, Augusto et Septembri, vernaoule Pusca (Ruiz! in h. gen. berol.). Dianthera secundiflora R. et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 11 t. 15 f. a. Justicia secundiflora Vahl en. 1 p. 158. Willd. spec. pl. ed. Dietr. 1 p. 412 et h.! n. 352 (spec. Ruiz.). Conferas L. Pœppigianam, quæ huic proxima, nisi varietas. (v. in h. berol.)
5. L. CAMPYLOSTEMON, caule fruticoso teretijsculo sulcis quatuor alternis spongioso-hispidis instruto, foliis ohlongo-ovalibus basi cuneatis in acumen obtusum attenuatis glabris utrinque lineolatis, spicis axillaris trifidis apice bifidis hispursive paucifloris folio brevioribus, partialibus divergentibus longe pedunculatis.  $\mathfrak{z}$  In promontorio Bon. Sp. (Drègè!). Campylostemon paniculatus E. Meyer! l. c. Folia cum petiolo fere pollicari 4-5½ poll. longa, 1½-1½ poll. lata, subcoriacea, costis quinis venosis divisa. Pedunculi axillares, spatio ¼-1 poll. a basi trifidi apice bifidi, vel columnmodo bifidi, glabri; rami patentes, in medio pari florum vel saltem bractearibus, denique juxta apicem floribus 3-5 prædicti. Bracteæ et bracteolæ subulatae, breves, glabré. Calyx brevis, glaber. Corolla circiter 6 lin. longa, ruhra? viscidula. Stamina incurva; antheræ basi calcareae. Maculae in basi tubi corollæ argenteæ ut in Sericographi. Capsula fusca, 6 lin. longa. Semina muricata. (v. in h. Drèg.).
6. L. VIRENS, caule tetragono foliisque oblongo-ovalibus acuminatis basi cuneiformi-attenuatis utrinque lineolatis glabris spicis axillaris bi-trifidis folio brevioribus, ramis apice capitato-bi-trifidis, calycibus bracteis bracteolisque pubescenti-glandulosis.  $\mathfrak{z}$  In Africâ, Gaboon Coast (Middleton! in h. Bentham). Affinis L. Campylostemoni, differt autem foliis acuminatis calycibus glandulosis aliisque notis. Corolla labium superius ex ovata basi acutum, brevius inferiore. (v. in h. Bentham).
7. L. CORDATA, glabra, foliis cordatis oblongis acutiusculis sessilibus, cymis axillaris subtrifloris pedunculatis folium æquantibus, bracteis scariosis ovatis mucronatis pedicellos æquantibus, calycis laciniis lanceolatis acuminatis margine membranaceis.  $\mathcal{U}$  Ad latus montium securus flumen Tacazé infra

- Selassaqilla Abyssiniae, Septembri (Schimper!). Gendarussa cordata Hochst. in Schimp. it. abyss. un. itin. sect. 2 n. 1250. Pedunculi nudi, 1½-1 poll. longi. Corolla 6 lin. longa, pubescens, labio superiore ovato fornicate, inferiore trifida lacinia media latiore; palatum ovatum, tumidum, pectinatum venosum. (v. in h. Hooker ex h. un. itin.)*
8. *L. VIRGATA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 105), folijs deltoides supra lineolatis, spicis tomentoso-scabris, antheris muticis. In Indiâ orientali in Taong Dong (Guil. Gomez!). *Justicia virgata* Wall. cat. n. 7177. Caulis teres, lignescens, nodoso-articulatus, inferne glaber, superne et in inflorescentia setulis exiguis dense confertis erectis subtomentosus. Folia inferiora ampla, lamina 6-7 poll. longa, 3½ lata, acuta, repanda, firma, glabra, basi brevi acuminata in petiolum ejusdem longitudinis tetragonum descendenter. Folia paris summi duplo minora, ovata, brevipetiolata. Spica terminalis, semipedalis, gracilis, trichotoma ramis alternis longis patulis. Bractæ sub divisionibus floribusque oppositæ, parvæ, subulatæ. Flores solitarii sœpiusve terni glomerati, bracteolis oppositis minimis suffulti. Calyx vix lineam longus. Corolla 3-4 lin. longa, pubescens, pallide purpurea? (v. in h. Wallich).
9. *L. WALLICHII* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 105, Wight h. propr. n. 2001), folijs oblongis vel ex oblongo ovalibus supra punctato-asperis, spicis glandulosis, antheris muticis. *Courtallum* (Wight!), in insulis Philippiinis (Cuming! n. 548 in h. Bentham et Hooker). *Ruellia leptostachya* Wall. cat. n. 2411. Similis est *L. virgata*, sed differt abunde foliorum formâ et floribus minoribus. Caulis obsolete tetragonus, glaber, superiora versus alternatim pulverulento-scabridus. Folia tenera, amœne viridia, cum petiolo pollicari 6-8 poll. longa, 2-2½ lata, acuminata, basi acutâ in petiolum scabriuscum decurrentia, glabra, supra punctulus papillaribus dissitis inspersa, subtus ad costas scabriuscula. Spica trichotome divisa, patula ½-1 ped. longa caulem terminat. Rhachis communis alternatim canaliculata, ut reliquæ partes pubescutæ brevissimâ densâ viscosulâ, prætereaque versus genicula pilis longioribus sparsis vestita. Rami trichotomi, bifidi, summi simplices; infîmi axillares, reliqui bracteâ lineam longâ subulatâ suffulti. Flores oppositi, solitarii, inferiores quandoque gemini, bracteolisque vix similiæ longis lanceolato-subulatis obtusiusculis viscidulis suffulti, brevissime pedicellati. Calyx vix lineam longus, viscidulus. Capsula 8 lin. longa et longior, clavata, mucronata, dense pubescens. Variat paniculâ breviore densiore rigidioreque, et laxiore elongatâ. (v. in h. Wallich et Hooker).
10. *L. DICHOTOMA*, foliis ovatis acuminatis ad costam et venas puberulis paniculâ terminali glandulosâ ramis dichotomis. In umbrosis silvaticis insulæ Javæ (Blume! Junguhnu! Zollinger! pl. jav. n. 528 in h. DC.). *Justicia dichotoma* Bl. bijdr. pl. 783. *Justicia tinctoria* Hoffmannsegg! in h. Mart., DC. et Hooker n. 99. Caulis subtetragonus, lineâ villosâ inter foliorum paria decurrente hirtus, secundum Blume basi procumbens repensque. Folia ovato-acuminata, in nostris haud longe petiolata, acuminata, integerrima, basi obtusa rariusve acutiuscula, supra dense lineolata, utrinque ad costam medium subtus etiam ad venas laterales pubescenti-hirta, costis lateralibus novenis, satis prominulis, 3½ poll. longa 1½ poll. lata, superiora minora. Panicula terminalis multiflora, glandulosa, elongata, angusta. Bractæ lineares patulæ. Bracteolæ subulate. Corolla semipollicaris fere, purpurascens, labio inferiore medio flavo-maculato. Antheræ loculi divergentes, inferius attenuatus calcare obtuso. Rubro colore mattis stramineis tingendis inservit. (v. in h. DC., Mart. et Hooker).
11. *L. ZEYLANICA*, caule fruticoso virgato coarctato foliisque angusta lanceolatis utrinque attenuatis glabris spicis axillaribus simplicibus bifidove-ramosis, ramis secundifloris, floribus distantibus, Paradenia in insula Ceylon (Macrae! n. 423 ex h. soc. hort. lond. in h. Bentham, Gen. Walker in h. Hooker). Quod ad habitum spicarum accedit *L. dichotomæ*, sed spicæ axillares

sunt ex omnium foliorum angulis, glabriæ. Bractæ lineares, patulæ, inferiores longitudine calycis, superiores bracteolæque calycis breviores et calycis laciniæ scabriæ. Corolla circiter 6 lin. longa. Calcar loculi inferioris acutum. Capsula a tergo modice depressa. Semina tuberculata. Caulis obtusangulus, lineis albis oppositis articulorum notatus. (v. in h. Bentham et Hooker).

§ 2. *Spica umbellato-paniculatae. Flores et fructus parvi. Americana.*

12. L. ANTIRRHINA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 150), foliis oblongo-ellipticis utrinque acuminatis glabris, spicis bi-trifidis umbellatis, pedunculo communis petiolum æquante, floribus secundis, corollâ basi gibbâ, antheris calcaratis.  $\mathcal{L}$  In silvis primævis ad viam Felisbertiam sub finem Decembri (Max. princ. Wied! in h. Mart.). Justicia antirrhina Nees et Mart. in nov. act. ac. nat. cur. 11, 1 p. 59 n. 9, Rœm. et Sch. syst. mant. 1, add. p. 248 b, Spr. cur. post. p. 19, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 412 n. 134. Caulis 3-4-pedalis, erectus, glaber, superne lin. 2 hirsutis notatus, geniculis carnosis fragilibus. Folia in petiolum semiplicatè acute desinentia, 4-5 poll. longa, glabra. Cymæ axillares, folio breviores, radiis 3-4nis scabris, aliis simplicibus, aliis bifidis. Pedunculus communis petiolum vix æquans, spicis brevior. Flores secundi, distantes. Calyx scaber, vix lineâ longior. Corolla 3-4 lin. longa, albida; tubus crassus, cylindricus, basi deorsum gibbus; labium superius oblongum emarginatum, inferius latum trifidum, lacinii ovatis acutiusculis. Antherarum loculi parum divergentes; inferior calcaratus. Ovarium quadriovulatum. (v. in h. Maxim. Princ. et Mart.)
13. L. LAXA (N. ab E. in Endl. fl. bras. fasc. 7 p. 151), foliis oblongis acuminatis basi acutiusculis glabris longe petiolatis, pedunculis axillaris tri-penta-heptastachyis petiolo duplo brevioribus spicisque glanduloso-pubescentibus, floribus secundis, corollâ gibbâ, antheris calcaratis.  $\mathcal{L}$  In silvis ad Rio Belmonte Brasiliæ (Max. Princ. Wied! in h. Mart.), Ilheos (Blanchet! n. 3055 in h. Moricand). Quod ad corollæ structuram persimilis L. antirrhina, differt autem caule laxiore basi lignescente, ramis adscendentibus quadrangularibus, foliorum petiolo longiore et graciliore scil. 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longo, in foliis inferioribus, quæ 4-4 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, acuminata, tum spicis in pedunculo communis axillari semiplicari glanduloso-pubescente ternis septenis divaricatis simplicibus, subinde bi-trifidis, glanduloso-pubescentibus. Corolla bilinearis, lutescens. (v. in h. Maxim. Princ., Mart., Moricand).
14. L. PARVIFLORA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 151), caule basi repente, foliis lanceolatis utrinque longe attenuatis, spicis subsimplicibus umbellatis folio subbrevioribus in apice caulis paniculatum coeuntibus glabris, antheris muticis.  $\mathcal{L}$ ? In rupibus alvei Ilheos fluvii, Decembri (Max. Princ. Wied! in h. Mart.), Rio Grande (Tweedie! in h. Hooker cum L. Martiana), in Brasiliâ, loco accuratius non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 125 [174]), in silvis prope Castel-Novo, Novembri (Riedel! in h. acad. petrop. n. 569), Bahia, Moritiba (Blanchet! n. 345, 900, 1290 et 1398 in h. Moric., 3541 in h. DC.). Justicia comata Nees et Mart. in nov. act. ac. nat. cur. 11, 1 p. 56 (excl. synon.). Differt a L. comata foliis basi longiter attenuatis umbellisque minoribus. Caulis sulcato-sexangularis, lanceolato-asperulus, pedalis, glaber. Folia exquisite lanceolata, utrinque lineolata, glabra, margine scabra. Umbellæ spicarum superiores folia subæquantes, partiales pedunculo plerumque breviores, sæpe septenæ. Calyx vix lincam longus, scaber, lacinii subulatis bracteolis longioribus. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  lin. longa, glabra, rosea. Capsula 2 lin. longa, pubescens, testacea, basi pallida. (v. in h. Maxim. Princ., Mart., N. ab E., petrop., Moricand).

$\beta$ . *latifolia*, foliis oblongis utrinque minus attenuatis, infimis stolonumque foliis minoribus subtundis. — Porto Alegro inter frutices (Sellow! in h. reg. berol. n. 124 [d. 2439]). (v. in h. berol. et Hooker).

15. *L. CRINITA* (N. ab E. in Benth. bot. sulph. p. 147), caule basi repente glabro articulis panicularibus patentí-pilosis, foliis ovali-oblongis acumine obtuso basi in petiolum longum cuneatim attenuatis, spicis subsimplicibus umbellatis folio duplo brevioribus in paniculam terminalem parvam transeuntibus antheris muticis. (I) ? In Columbiâ (Sinclair in h. Bentham). Differt a *L. parviflora* foliis latioribus 4-4½ poll. longis et 1½ poll. fere latis, basi elongato-cuneiformibus, apice minus attenuatis, articulis infra et intra paniculam pilis patentissimis vestitis, et antheris muticis. (v. in h. Bentham).
16. *L. MARTIANA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 152 et in Benth. bot. sulph. p. 147), foliis subsessilibus ovato-lanceolatis subcordatis apice attenuatis, spicis simplicibus ramosisve umbellatis folium æquantibus in paniculam terminalem magis compositam transeuntibus, rhachi paniculae terminalis hirsutâ glandulosâ, antheris muticis. (O) *Justicia comata* Salzmann! in h. acad. petrop. *L. parviflora* similis, differt foliis petiolo brevisimo præditis fere sessilibus amplectentibus basi sæpe cordatis et pedunculis cum umbellâ folium æquantis. Spicae per se breves, 4-5, media plerumque ramulo uno altero prædicta, subinde et ipsa umbellatum composita. Flores et fructus parvi. Corolla alba, subpurpurascens; labium inferius paulo longius superiore, reflexum, trilobum lobis obtusis; palatum punctis purpureis adspersum. (Salzmann in h. DC.)
- α. caule foliisque glabris, paniculae rhachi hinc inde hirsutâ.— In silvaticis prov. Babiensis (Martius!), in prov. Bahiensis fossis aquâ dulci repletis (Salzmann! n. 444 in h. DC.), in h. Hooker et in h. acad. petrop., Luschnath! in h. gen. berol. n. 231), in Brasiliæ loco non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 277), in graminosis prope urbem Para ad flumen Amazonum, item in insulâ Cubâ (Pœppig! in h. gen. berol.), Rio Grande (Tweedie! in h. Hooker cum *L. parviflora*), in Guianâ Anglicâ (Schomburgk!), ad Guayaquil (Sinclair!). (v. in h. monac., berol. et Benth.)
- α\*. *macrophylla*, foliis inferioribus majoribus evidenter cordatis.— In Guianâ Anglicâ (Schomburgk! n. 305 in h. Hooker, etc. h. DC.). (v. in h. DC. et Hook. )
- β. *hispida*, caule foliisque hispido-scabris, his brevioribus, panicula valde glandulosâ nec pilis longioribus hirsutâ.— In Guianâ Anglicâ (Schomburgk! sub n. 305).
- Variant hæ formæ foliis modo latioribus modo angustioribus.
17. *L. COMATA*, caule ascendentे foliis superioribus sessilibus e basi rotundata lanceolatis vel lanceolato-oblongis basi cuneatâ in petiolum attenuatis, cunctis acuminatis glabris, spicis simplicibus ramosisve umbellatis folio longioribus in paniculam terminalem transeuntibus, rhachibus calycibus bracteisque pubescenti-hirtulis. (O) In Jamaicâ (Jequin! Swartz! in h. DC.), in paludibus calidis interioribus ad S. Anna, Decembri (H. P.! in h. Hooker, Mac. Fadyen! in eod. h.), Portorico (h. DC.! Plée! in h. mus. paris. n. 279 et Bertero! ex h. Balbis ibid. n. 609), Havane in insulâ Cubâ (Ramon de la Sagra! n. 601 in h. DC.), Trinidad (Lockhart! in h. Hooker), in silvis Guianæ et prope Turbaco Novo-Granatenium (Humboldt!), in silvis Guayaquilenibus (Hænke! Hartweg! n. 687), Peruvia, ad Sesuya (Mathews! n. 3145 in h. Hooker). *Justicia comata* Swartz obs. p. 14, Vahl symb. 2 p. 15, en. 1 p. 142 et h. (specimen Linneanum et Hoffmann), Willd. sp. pl. ed. Dietr. I p. 408 et h. n. 329! (spec. Humboldt). — Sloane hist. jam. I p. 160 t. 103 f. 2. Similis *L. Martiana*, differt caule flaccidiore, foliis paniculisque majoribus amplioribus. Folia inferiora ovalia vel lanceolata, in petiolum attenuata, superiora subamplexicaulia. Flores parvi, *L. parviflora* et *Martiana*, labio superiore integro, inferioris lacinia pectinatim venosâ. Variat pedunculis axillaribus crebris et paucis, solâ tum panicula terminali verticillatâ ramis simplicibus obviâ. (v. in h. Vahl, DC., Hook. , paris., berol., Hænk., Benth.)

*B. humifusa*, minor, canle decumbente apice adscendente, umbellâ terminali alterâve axillari tri-quinquefidâ, foliis minoribus omnibus conformibus ovato-vet subcordato-lanceolatis ungicularibus.—In Jamaicâ (Swartz!). Dianthera decumbens Swartz! in h. DC. *Justicia humifusa* Swartz prodr. p. 14, fl. ind. occ. 1 p. 35, Willd. sp. pl. 1 p. 102, ed. Dietr. 1 p. 397 et h. n. 351, Vahl en. 1 p. 158 et h! (v. in h. DC., Vahl, Willd.)

## CXVIII. SAHOTHECA N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 113.

Calyx profunde quadripartitus, laciiniis æqualibus. Corolla subperso-nata, tubo vel mediocri vel brevi, faucibus plus nînus inflatis, labio superiore fornicate, inferiore apice trifido laciiniis subæqualibus, palato plus minus tumido acute marginato oblique pectinatim venoso-rugoso. Stamina duo, ad rictum usque faucibus adnata, longitudine labii superio-ris. Antheræ biloculares, loculi in connectivo securiformi discreti, dimidiato-ovales; superior obliquus vel fere transversalis, margine supero ci-liatu, sursum dehiscens; inferior verticalis, basi calcaratus, introrsum dehiscens. Stigma bilabiatum, labio superiore angusto filiformi, inferiore tumidulo spongioso obtuso a tergo oblique resciso. Ovarium annulo brevi cinctum, quadriovulatum. Capsula angusta, a basi ad medium ferme de-pressa, elocularis, hinc parum depressa, dorso canaliculata, bilocularis, tetrasperma. — Frutices vel suffrutices Americæ temperataæ et caldioris. Spicæ axillares, simplices, trichotomæ, secundifloræ. Bractæ bracteolæ-que parvæ. Flores violacei et purpurei. — Genus propinquum *Tyloglossæ*, differt calyce 4-partito, antherarum formâ et cristâ, tum inflorescentiâ *Rhytidoglossæ*, a quâ ex alterâ parte distinguitur antheris apice pectinato-ciliatis et basi calcaratis.

1. S. ELEGANS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 2 p. 114), pubescenti-tomentosa, foliis oblongis spicis trifidis multifloris, corollæ tubo brevissimo faucibus ventricosis. ♂ In Serrâ de S. Felis ad fluvium « Rio Traeira » Bra-siliæ (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 1989). *Justicia elegans* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 1989. Suffrutex pubescenti-tomentosus, canescens. Caulis valde geniculatus, inferne repens, apice adscendens, tetragonus. Folia oblonga, 4-5 poll. longa, 1½ poll. lata, apice in acumen obtusum, basi in petiolum longinsculum attenuata, subrepanda, utrinque canescens. Spicæ axillares oppositæ, foliis æquantes, pedunculate, rhachibus floribusque tomentosulis et dense pubescenti-glandulosis. Flores distantes, secundi, oppositæ bracteæ sterili. Bractæ et bracteolæ conformes, æquales, lincari-subulatae, calyce duplo breviores. Calyces 3 lin. longi, laciiniis lanceolato-lineariibus acutiusculis densissime pubescenti - glandulosis herbaceis mollibus dissite trinervibus. Corolla antirrhinoidea, purpurascens ?, 7 lin. longa, pubescenti-viscidula. Palati tumor oblongus, usque ad basin laciiniis mediis labii inferioris protensus, venis purpùreis oblique divergentibus eleganter pectinatim pictus; labium superius ovatum. (v. in h. vindob.)

2. S. SALVIÆFLORA, pubescens, subvillosa, foliis oblongo-lanceolatis, spicis subsimplicibus paucifloris folia superantibus, corollæ tubo brevissimo faucibus ventricosis. ♂ In horto botanico Mexicano cultam invenit cl. Humboldt. *Justicia salviæflora* Kunth in H. et B. nov. gen. 2 p. 233, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 399, h. Willd! n. 350. *Justicia salviæfolia* (errore typogr.) Kunth syn. 2 p. 31. Persimilis S. eleganti, differt foliis angustioribus, spicis propter flores distantes laxioribus saepè simplicibus, calycis laciiniis panlo longioribus (4 lin.), labio corollæ superiore ex ovata basi falcato-acuminato. Calycem in specimen her-barii Willdenoviani 4-partitum in omnibus inveni floribus. Bracteolæ calyce duplo breviores. Folia repando-crenata. (v. in h. Willd.)

3. *S. SCABRA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 114), caule viloso, foliis scabris, calycibus corollâque elongatis. ♂ Ad Chapada in Brasiliâ (Riedel! in h. acad. petrop. num. 1008). Differt a *S. elegante* caule validiore stricto erecto a basi ramoso pilis mollibus patentibus vestito et florum proceritate. Folia cum petiolo  $\frac{1}{2}$ ; poll. longo circiter 5 poll. longa et 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. lata, inferiora ovata, superiora ovato-oblonga, cuncta apice attenuata, basi in petiolum decurrentia, repando-subcrenata, rigida, supra undique subtus in costis venisque setulis rigidis exiguis scabra, viridia. Pedunculi axillares cum spicis foliæ aequantes, rigidi. Calyx 8-9 lin. longus, uti bractæ glanduloso-pilosus. Bractæ lanceolata, acuta, calyx duplo brevior. Bracteola lineares, acutæ, bractæ paulo breviores. Calycis laciniae, lanceolato-lineares, acutæ. Corolla pollicaris. Capsula 5-6 lin. longa, pubescens, subovalis, brevi spatio a basi sterilis, hinc tetrasperma, valvulis a tergo depressis sulcoque notatis. (v. in h. petrop.)

*Species dubia.*

4. *S. ROSTRATA*, foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis in petiolum decurrentibus, spicis simplicibus, calycibus bracteisque lanceolatis setacco-acuminatis, corolla labio superiore longiore integro recurvo, inferiore recto bifido. ♂ In Esquintla Guatimala (Velasquez). Justicia rostrata Bertol. florul. guatimal. in nov. comment. acad. scient. inst. bonon. 4 p. 406. Caulis senior cortice albicante tectus, junior hirsutus, opposite ramosus. Folia ovato-oblonga, acuminata, integerrima, inferne longe angustata et fere usque ab basin petioli decurrentia, majora cum petiolo semipedalia, seniora subtus pilosa superne glabrata, juniori utrinque adpresso villosa. Spicæ terminales et axillares, approximatæ, sessiles, continuæ, biplicatae, tetragonæ a floribus cruciatim opositis. Bractæ primariae sub quovis flore, solitariae, ovatae, acuminatae, tenuiter pubescentes, fuscæ, calycem subæquantes; partiales duas sub quovis flore, lanceolata, acuminatae, acumine setaceo, stramineæ. Calyx quadripartitus, lacinias formâ et colore bracteolarum partitum. Corolla tubulosa, octodecim linea longa, extus pubescens, limbo constricta. Labium superius integrum, acuminatum, rostrato-recurvum, dorso villosum. Labium inferius paulo brevius, trididum, rectum, pilosum, lacinias lanceolatis valde acuminatis. Genitalia inclusa, corollam æquantia. Antheræ acutæ, conniventes, basi appendiculatae. Capsula oblonga, utrinque acuta, fuscæ, glabra, nitida, calyci æqualis aut paulo longior.

CXIX. SCHWABEA Endl. gen. p. 1405 (1), nov. stirp. dec. (1839) n. 10 p. 81, Meiss. gen. p. 293 (202). — Pogonospermum Hochstett. in Flora 1844 bei. p. 5. — Justicia spec. Linn. et autt.

Calyx quinquepartitus, segmentis angustis subæqualibus. Corolla bilabiata, tubo brevi antice deorsum gibbosus, labio superiore concavo erecto bidentato, inferiore majore plano patentissimo breviter trilobo, ad originem gibbulis duobus coloratis ornato. Stamina 2, subexserta, antheris bilocularibus, loculis superpositis, superiore globoso, inferiore basi longe calcareo apice bidentato. Stylus filiformis, apice subulatus, stigmate bifido. Ovarium quadriovulatum. Capsula ovata, acuta, turgida, brevissime unguiculata, abortu disperma. Retinacula duo perfecta majora, apice membranaceo truncatoque fertilia; duo sterilia minora, acuta, fertilibus approximata. Semina orbiculato-reniformia, compressiuscula, laevia et nitida, ad hilum barbata, in margine opposito hirto-clivata. — Plantæ annuae, Nubiae, Abyssiniae et Senegambiae indigenæ. Flores axillares, oppositi. Flores bibracteati, bracteis lacinias calycis similibus.

*Adnot.* Fatetur, nos lubentius nomen genericum ab Hochstettero propositum

(1) Ubi loco «stamina 4» legendum stamina 2.

retinuisse propterea quod Endlicherus rara quādam hoc in ordine florū monstruositate (ut opinor) seductus, quatuor stamna huic generi tribuit. Quo errore Hocbatterus in dijudicando et adhibendo Schwabeæ generis charactere impeditus et novos rectioresque characteres et novum nomen a se inventum generi isti tribuit. Tamen et in his legibus obtemperare constitui, quibus nomen antiquius priori præferre jubeamur.

1. *S. CILIARIS*, foliis lanceolatis obtusis basi calycibusque hispido-ciliatis, floribus axillaribns solitariis oppositis sessilibus. (○) In Nubiâ (Kotschy), Abyssiniâ (Scbimper!), Senegambiâ, in arenosis regni Cayor (Heudelot! in h. mus. paris. n. 1 et 3). Pogonospermum ciliare Hochst. in Fl. 1844 beil. p. 6. Justicia ciliaris Linn. suppl. p. 84, Vahl symb. 2 p. 15, en. 1 p. 134 et h.!, Willd. sp. pl. 1 p. 90, ed. Dietr. 1 p. 407. Dicliptera ciliaris h. Willd.! n. 285 (spec. cultum, a Krause datum). Justicia ciliata Jacq. hort. vindob. 2 p. 47 t. 104. Monechma hispidum Hochstett.! in Kotsch. it. nub. un. itin. n. 239 in Florâ 1841 p. 375, 1843 p. 76. Schwabea modesta Endl. in nov. stirp. dec. p. 81. Schwabea modesta Bunge del. sem. hort. dorp. 1841. Pogonospermum hispidum Hochst. in diar. ratisb. l. c., h. DC. (ex hort. Monsp.) Corolla alba, palato purpureo bipunctata punctis didymis; labium superius sordide stramineum lineolis 6 purpurascensibus notatum. Capsula ovata, basi brevissimo spatio contracta, lævis, glabra, rigida, disperma. Semina nitida, brevia, fusco-castanea, barba hili e ciliis marginis pallidis. Semen *S. ciliaris* neutiquam differt a Schw. hispidae semine. (v. v. c. et sicc. in h. un. itin., paris., prop. et Hooker).

2. *S. SPICIGERA*, foliis bractealibus lanceolatis obtusis basi calycibusque hirsuto-ciliatis, floribus spicatis, spicis axillaribus oppositis propter pedunculum bipartitum geminis, ramo altero inferiorum elongato, altero superiorumque utroque brevissimo. (†) In Senegambiâ, in arenosis et cultis Bondou (Heudelot! in h. mus. paris. n. 16). Folia inferiora non vidimus. Internodia caulis elongata sunt. Corolla violacea ex scbedula, reliqua ciliari omnino congruent, cuius probabiliter est varietas luxurians. (v. in h. paris., prop., et Hooker).

β. *luxurians*, ramis axillaribus foliosis elongatis apice spicigeris, opposito-deficiente, bracteis minus ciliatis, caule glabro. Ad flumen Nunez in Sene-gambiâ (Heudelot! n. 667, in h. mus. paris.)

CXX. ADHATODA *N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 102*, Lindl. intr. ed. 2 p. 285. — Gendarussa a. Adbatoda Endl. gen. p. 705, Meisn. gen. p. 296 (205). — Adbatoda Hermann. — Tyloglossa Hochst. nov. gen. pl. afr. p. 4, *N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 115*. — Gendarusse spec. *N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 103, 599*. — Athlianthes Endl. gen. mant. 2 p. 367. — Justiciae spec. Linn. et aut.

Calyx profunde quinquefidus, laciniaæ æqualibus. Corolla ringens, tubo brevi aut mediocris, labio superiore concavo inferiore trilobo. Stamina duo, tubo infra medium inserta. Antheræ biloculares, loculis in connectivo obliquis altero altius inserto, inferiore calcarato. Stigma obtusum. Capsula depressa! in medio tetrasperma. Semina vel lenticularia vel magis compressa. — Herbae vel frutices regionum temperatarum imprimis tamen calidaru[m] totius orbis, floribus variis, foliis integerrimis. Vel spicae axillares oppositæ, vel flores axillares, vel spica terminalis. Bracteæ et bracteolæ, hæ sæpe grandiusculæ, calyce longiores. Flores vel abortu secundi, vel oppositi.

§ 1. *Flores spicati*. Bracteæ subinde et bracteolæ venoso-vel nervoso-reticulatae. Corolla mediocris vel parva tubus rectiusculus subcylindricus. Palatum lave. Connectivum lanceolatum et igitur loculi antheræ subcontigui. — Herbæ Asiaticæ. Flores

*subinde sub singulâ bracteâ terni bracteolis magnis tecti, eorumque laterales ad basin etiam bibracteolati.*

1. A. ARGYROSTACHYA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 102), foliis late ovato-ellipticis utrinque acuminatis supra pilis inspersis non lineolatis, spicis axillaris oppositis tetragonis villosis, bracteis ovatis obtusiusculis basi albidi apice reticulatis, bracteolis oblongo-lanceolatis acuminatis membranaceis calyce vix longioribus. ♂ In montibus Prome (Guil. Gomez!). Justicia argyrostachya Wall. cat. n. 7172. Herba speciosa. Caulis erectus, glaber. Folia cum petiolis 7-8 poll. longa, 3-3½ poll. lata, supra setulis inspersa, subtus glabra, non lineolata. Spicas axillares, solitariae, digitales et paulo longiores, pedunculo villoso articulato conjunctæ, quod fasciculatas indicat a principio. Bracteæ 4 lin. longæ, basi albidae, tenuiter venulosæ, venulis apicem versus in rete densius purpurascente crescentibus. Corolla vix 6 lin. longa, ocrroleuca, labio inferiore purpureo lineato, subtus barbato. Capsula vix quatuor lineas longa, pubescens, pallida. (v. in h. Wall.)
2. A. BETONICA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 103, Wight h. prop. n. 1991), foliis ovatis utrinque acutis supra lineolatis subpubescentibus integerrimis repandis dentatis, spicâ terminali secundâ, bracteis bracteolisque ovato-ellipticis acuminatis ciliatis venoso-reticulatis. ♂ In Coromandel (Roxburgh), in Prome (Wallich!); in sepiibus et nemorosis India orientalis frequens (Wight!), in collibus Mongbir (Hamilt.), in Malabarica interioribus (Lescbenau! in h. DC.), Zeylonæ (Linn. in b. Hooker). Justicia Betonica Linn. fl. zeyl. p. 18, sp. pl. I p. 24, Willd. sp. pl. ed. Dietr. p. 367, Vabl. en. 1 p. 156 et h. Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. I p. 129, Burm. fl. ind. p. 8, Wall. cat. n. 2433 a (ex parte) c, e-h, h. Hamilt. h. DC! ex hort. Liverpool. Justicia pseudo-Betonica Roth nov. pl. sp. p. 17, R. et Sch. syst. I p. 160, mant. I p. 142, Spr. syst. I p. 80, Willd. sp. pl. ed. 2 v. 1 p. 389. Justicia ochroleuca Blum. bijdr. p. 786. Betonica Hormini sativi coma, Amarantbi foliis, Burm. thes. zeyl. p. 47. Betonica frutescens Bont. jav. p. 146. Také Malab Lechenault! n. 858 in b. DC. Bem-Curini Rheed. h. mal. 2 p. 33 t. 21. (v. in h. Wall., Wight, Willd., Hooker etc.)
 

β. foliis inaequaliter dentatis, bracteis candidis laxius reticulatis. — In Nilgherry (h. Zenker!) vidi etiam ex hort. bot. Calcuttensi cultam et in h. Roxburgh. Justicia Betonica Wall. cat. n. 2433 b et d, h. Willd. n. 346 et li. gen. fol. 4, spec. Klein. (v. in h. Zenker et Roxburgh).
3. A. VARIEGATA, rhizomate bulboso foliis oblongis obtusis subsessilibus caule que glaberrimis, spicâ terminali subsecundâ, bracteis ovalibus acutis margine nudis bracteolisque conformibus lanceolatis venoso-reticulatis viridi-suffusis. ♀ In collibus siccis prope Docblî in districtu Sana Abyssiniae, Novembri (Sobimper!). Gendarussa variegata Hochst. in Scbimp. it. abyssin. 2. n. 516. Similis A. Betonica et lupulinæ, differt a utem bracteis minus acutis duplo fere miioribus omnique habitu. (v. in h. un. itin.)
- β. pallidior, bracteis bracteolisque albidis, his lanceolatis. — In Africâ australi, Aapjes River, Octobri (Burchell! n. 514 in h. Hooker et Nees.)
4. A. LUPULINA, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis obtusis repandis glabris margine scabris, spicâ terminali subsecundâ, bracteis ovalibus acutis, bracteolis ovali-oblongis cuspidulatis, utrisque ciliolatis venosoque subtiliter laxaque reticulatis. ♂ In Africâ australi (Drège!) Port Natal (Peddie!, Harvey! in h. Bentham). Justicia lupulina Meyer cat. pl. Drèg. a. 1837. Ab A. Betonica imprimis differt bracteis haud acuminatis sed breviacutis. (v. in h. Drèg., Nees, etc.)
5. A. RAMOSISSIMA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 103), foliis late ovatis acumine obtuso glabris supra obsolete lineolatis, spicis axillaris terminalibusque secundis laxiusculis, bracteis bracteolisque ovato-lanceolatis acuminatis glabris albis venoso-trinerviis reticulatisque margine nudis subciliatis. ♂ In

Coromandel (Roxburgh), Madras (Griffith! in h. Bentham), insulâ Bouton (h. DC!). Justicia ramosissima Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 130 n. 22, R. et Sch. syst. mant. 1 p. 142, Willd. sp. pl. ed. 2 v. 1 p. 389, h. Hamit!. Justicia Betonica Wall. cat. n. 2433 a (ex parte). Afinis quidem A. Betonicae, sed diversa videtur. Caulis subnnullus, rami diffusi, ad genicula repentes, teretes, striati, glabri, novelli puberuli. Folia 3-4 poll. (cum petiolo) longa, 1½-2 poll. lata. Spicæ axillares oppositæ, vel alternæ, et terminales aggregatæ, recurvæ, 2-3-pollicares, pedunculo circiter pollicari. Bractæ et bracteolæ conformes, venis tribus, apicem versus magis sed laxè contextis, viridibus pictæ. Corolla 4 lin. longa, sordida alba, venis labii inferioris aliquot purpureis. Antherarum loculi crassi, semiovales, unus super altero, inferior calcare recurvo. Capsula semi-pollicaris, pubescens, ovalis, compressula, a medio biventricosa. (v. in h. Wallich, DC., Benth., Hook.)

6. A. NILGHERRICA, foliis lanceolatis sessilibus glabris lævibus, spicâ terminali tetragonâ, bracteis bracteolisque ovato-acuminatis venoso-trinerviis glabris, ♂ In inundatis ad Trevacore prov. Tanjore (Wight!), in montibus Nilgherry dictis (Noton! Wallich! 1. c.), in collibus graminosis ad Outakamund, a Martio in Octobrem (Schmidt! Perrottet! in h. DC. et paris. n. 133; Lechenault! ibid.; Russell! in h. Bentham). Adhatoda Nilgherrensis N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 103. Justicia Nilgherrensis Wall. cat. n. 2435 a, b. Justicia pectinata Wight h. propr. n. 1992. Atéquedo, petite plante à tige ligneuse Leschenault! n. 181 in h. DC. Caulis ramosus, fruticosus, ramis tetragonis et foliis glabris, ad genicula barbulatis. Folia carnosula, non lineolata, obsolete venosa. Spicæ fere A. Betonicæ, 1-3 poll. longæ. Bractæ speciosæ, albidae, viridi-venosæ, subtrinerviæ, scil. nervulis binis lateralibus sursum cum ramis nervi medi in plexum submarginali undatum confluentibus. Bracteolæ ovato-lanceolatæ. Flores alterni, solitarii in axillis bractearum paulo majorum, ob pressionem bractæ sterilis, quæ opposita est, subsecundi. Corolla bracteas parum superans, intus et extus pubescens, albida, purpureo-striata. Capsula fere ¾ poll. longa, fusca, tomentoso-séreca, firma. (v. in h. Wallich, Wight, DC., Benth., etc.)

7. A. BOJERIANA, foliis oblongo-lanceolatis utrinque acutis subsericeis, spicis terminalibus et infra-terminalibus congestis oppositis secundis, bracteis generalibus propriisque ovatis argute cuspidatis venoso-nervosis rhachique sericeo-villosis, his paulo majoribus calycis villosi laciniis linear-lanceolatæ acuminatas æquantibus, antherarum loculo utroque calcarato. ♂ In aridis sinus Sti Augustiui, Madagascarie (Bojer!). Dicliptera spicata Bojer! in h. DC. Fruticulus humilis, ramosissimus, tri-dichotomus. Folia caulinæ (ex iconæ) fere 3 poll. (cum petiolo brevi) longa, 9-10 lin. lata; summa multo minoræ. Spicæ sessiles, pollicares, densæ, bracteis bracteolisque purpureis venis digitatis prominulis. Corolla purpurea, pollicaris, pubescens, angusta, labio superiore integro, inferiore apice trifido. Antheræ loculi fere recte unus super altero siti, calcare incurvo albo prædicti, superioris calcare minus distincto. Ovarium glabrum. (v. in h. DC.)

8. A. TRINERVIA (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 103, Wight h. propr. n. 1993), suffruticosa, caule procumbente, foliis lanceolatis ovalibusve obtusis sessilibus glabris spicis terminalibus secundis, bracteis bracteolisque æqualibus oblongo-lanceolatis acuminatis venoso-reticulatis. ♂ In India orientali (Vahl! Wallich!). Species hæc, inter A. Nilgherricam et arenariam quasi intermedia, differt ab illâ staturâ minore, foliis diversiformibus, bracteis bracteolisque præsertim multo angustioribus neque tam evidenter venoso-pictis; ab hacce differt foliis nunquam emarginatis, bracteis acuminatis bracteolisque majoribus apicem versus obsolete venoso-trinervibus, nec totis herbaceis, tum corollæ labio superiore immaculato. (v. in h. Vahl, Wallich, Wight, etc.)

α. foliis lanceolatis plerumque integerrimis. — Justicia trinervia Vahl en. 1 p. 156. Dicliptera trinervia Juss. ann. du Mus. 9 p. 169, R. et

- Sch. syst. 1 p. 171, Willd. sp. pl. ed. 2 v. 1 p. 428 et h. fol. 296, Wall. cat. n. 2446 a (ex parte). *Justicia trinervia* Vahl h.! (v. in h. Vahl et Wallich).
- β. foliis ovalibus vel oblongis obtusis subcrenatis. — *Justicia trinervia* h. Heyn.! Wall. cat. n. 2446 a (pars altera), et? b. Formæ α et β formis intermediae connectuntur.
9. A. **CHEIRANTHIFOLIA**, suffruticosa, glabra, caule a basi ramoso coarctato eretto vel ascendente, foliis lanceolatis obtusis basi attenuatâ sessilibus, infimis oblongis, spicis terminalibus subsecundis, bracteis ovato-oblongis acutis trinervibus apicem versus grosse laxeque venoso-reticulatis, bracteolisque lanceolatis acuminatis trinervibus subtilius reticulatis marginenudis. ♂ In Africa australi: Macalis Bay, lat. 25°, Decembri (Burchell! n. 327 in h. Hooker et Nees). *Fruticulus rigidus*, circiter pedalis. Folia 1½ poll. longa, 2 lin. (infima 3 lin.) lata, basi nec apice attenuata, subrepanda, pallide viridæ. Spicæ 2-2½ poll. longæ, densiusculæ, angustæ. Corolla 4½ lin. longa. (v. in h. Hooker et prop.)
10. A. **ARENARIA** (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 103, Wight h. propr. n. 1494), suffruticosa, caule procumbente diffuso, foliis lincaribus obtusis emarginatis glabris sessilibus, spicis terminalibus secundis, bracteis bracteolisque oblongis herbaceis. ♂ In arenosis humidis Vellingany, Negapatam, Tjanjore (Wight!). *Justicia* spec. h. madr. Wall. cat. n. 2446 c. *Justicia trinervia* Wall. cat. I. c. *Planta Helianthemi similitudine*, ad A. *trinerviam* accedens. Radix validissima, fibrosa, fibris angulatis profunde descendens. Caules circiter palmares, tetragonoi, suloati, glabri, ad genicula barbati. Folia unguicularia, lineam unam cum dimidiâ lata, lineariformia, carnosula, utrinque impresso-punctulata. Spica circiter pollicaris. Rhachis acute quadrangularis, ad articulos barbata, Bractæ quoad texturam foliis similes, altera cujusque paris alternatim minor et sterilis. Flores in axillis bractearum majorum solitarii. Bracteolæ basi ciliatae, calyce duplo longiores. Corolla circiter 4 lin. longa, cuxus pubescens, albida, macula purpurea trifida ad insertionem staminum. Capsula clavata, crassa, pubescens, bracteis persistentibus longior. Semina ramentaceo-echinata, ovata, utrinque gibba. Ab A. *trinervia* differt: foliis retusis, bracteis bracteolisque minoribus herbaceis minus acuminatis, corollæ macula purpurea. (v. s.)
- § 2. *Amblyanthus* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 147). — *Corolla ringens*, tubo brevi, fancibus amplis palato laeviusculo. Antheræ basi mucronatae, loculis subcontiguis. Stigma obtusum, glanduloso-scabrum. Ovarium annulo glanduloso crasso cinctum, supra basin quadriovulatum. Semina cordato-orbiculata, laevia, tenuia. Spicæ axillares, oppositæ, pedunculatae, oppositiflora. Bractæ herbaceæ, calyce latiores sæpe et longiores. Bracteolæ calyce in aliis angustiores et longiores, in una specie, cui bractea calyce est brevior, et longiores et latiores calyce. — Species sæpius fruticosæ, Indicæ, Africanae et Americanae.
11. A. **VASICA** (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 103, Wight h. propr. n. 1995), foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis glabris supra minute papillatis, spicis axillariis oppositis ovatis longe pedunculatis, bracteis herbaceis glabris ovatis, bracteolis ellipticis minoribus, antherarum loculis oblique parallelis, infero basi mucronato. ♂ In omnibus Indiae orientalis partibus vulgariter (Roxburgh), in Nepaliâ (Wallich!), in Silet (Wall.), in Rungpur (Hamilton!), in Sirmore (Gérard), in Segæn (Wall.), copiosa in Himalaya alt. 5000' solo aperto inculta, ad sepe exstruendas in promontorio Tjanjore culta (Wight!), Assam, Mergui, Khassyâ (Griffith! in h. Hooker), in Chinâ ad Macao (Callery! in h. Mus. paris. n. 96), circa Lingua Jattie

prov. Cheribon ins. Javae (Blume), in Zeylon et Java (Burmann), in insula Martinicæ, culta? (Sieber!), Cubâ, culta (Drummond! in h. Hooker). Vidi etiam exempla h. madrasp. et Wight. *Justicia Adhatoda* Linn. fl. zeyl. p. 16, Willd. sp. pl. ed. 2 v. 1 p. 385, Vahl en. l. p. 27 et h.!, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 385 et h. n. 345, R. et Sch. syst. 1 p. 159, mant. 1 p. 141, Burm. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 127, Blume bijdr. p. 785, Wall. cat. n. 2434 a-k. bot. mag. t. 861, Wight h. propr.! n. 1995, h. DC. *Justicia Carracasana* Sieber fl. Martin. n. 381 (in h. gen. berol.!). *Adhatoda Zaylanensis* Herm. lugdb. p. 642. c. t. in 643. Plukens. alm. p. 9 t. 173 f. 3, Burm. thes. zeyl. p. 6. Lorek Wutu Javanens. Hoffmanns. in h. DC.! *Adel-Adagam* Rheed. h. mal. 9 p. 81 t. 43 (plurima congruunt præter folia denticulata, quæ Strobilanthe cujusdam esse videantur). Variat foliis ad costam aut undique bracteisque magis vel minus pubescentibus. Arbuscula ped. 15-20 alt. ad construendas sepes adhibita. Genicula supra folia tumentia pedunculis proferunt supraaxillares. Flos speciosus. Corolla pallida, purpureo-lineata et maculis ferrugineis inspersa. Labium superius bifidum, inferius trifidum, lacinias subæqualibus obtusis. (v. v. c. et sp. in omnibus, quæ examinavi, herbariis).

12. *A. CONGRUA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 147), foliis ovali-oblongis attenuatis basi acutis glabris, supra minute papillatis, subtus in costis puberulis, spicis axillaribus oppositis cylindricis pedunculatis folia æquantibus, bracteis herbaceis ovali-oblongis bracteolisque lineari-oblongis cuspidulato-mucronatis margine lanuginoso-ciliolatis calyce longioribus, loculis antherarum hastato-divergentibus infero basi mucronato. ♂ In Brasiliæ loco non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 165). Persimilis *A. Vasicæ*, a quâ imprimis differt spicis longis (4-5 poll. long.), bracteis magis oblongis, bracteolis angustioribus, tam his quam illis evidenter mucronatis margineque lanuginosulis. Calycis laciniae lanceolatae, acutæ, pubescentes. Corolla omnino ut in *A. Vasicæ*. Folia apice magis quam basi attenuata. (v. in h. berol.)
13. *A. MORITZIANA*, fruticosa, caule holosericeo-tomentoso incana, foliis ovato-oblongis acuminate basi acutis supra laxe subtus dense molliterque pubescentibus, spicis axillaribus folio duplo brevioribus ovatis pubescentibus, bracteis obovatis mucronatis obtusive bracteolisque lineari-cuneatis mucronulatis calycis lacinias subulatis longioribus. ♂ In prov. Truxillo Columbiæ ad Escueca secus vias publicas, Octobri (Moritz! n. 1277 in h. gen. berol.). Proxime accedit ad *A. Vasicæ*, sed differt calycis lacinias angustioribus multo magis acuminate, foliis quoque acutioribus, pedunculis brevioribus, bracteolis angustioribus. Flores albidi et lilacini (Moritz). Capsulæ unguis duplo longior parte seminifera. (v. in h. berol.)
14. *A. SCHIMPERIANA* (Hochst. in Schimp. it. abyss. un. itin. sect. 3 n. 1549), foliis ovatis in acumen obtusum attenuatis petiolatis cauleque glabris, spicæ in caule ramisque terminali subsecundâ, bracteis bracteolisque ovatis acutis sculis margine lato membranaceo nudo cinctis in disco venosis. ♀ In vallibus apricis prope Adoam Abyssiniae, in montibus prope Axum Abyssiniae, Novembri (Schimper!), Kira in Abyssiniae (Quartier-Dillon! in h. Mus. paris. n. 471). *Gendarussa* (*Adhatoda*) Schimperiana Hochstett. in Schimp. it. abyss. un. itin. sect. 1 n. 27, sect. 3 n. 1549. Speciosa stirps, foliis 6-7 poll. (cum petiolo) longis 2½ poll. latis. Spica albo et viridi varia. Corolla 7-8 lin. longa. Bracteæ latæ, complicate. (v. in h. Hook., un. itin. et propr.)
15. *A. HOLOSERICEA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 148), fruticosa, holosericeo-tomentosa, foliis ovalibus obtusis, spicis axillaribus tri-quadrifloris folio brevioribus, bracteis bracteolisque fugacibus. ♂ Campo Brabo prev. Sebastianopolitanæ, Julio (Luschnath! in h. Mart. et petrop.). Pubescencia brevissimâ densâ et spicis axillaribus 1-3 poll. longis simplicibus tri-quadrifloris jam tempore antheseos nudis a sequente satis differt. Bracteas duas

tantummodo ad originem floris inferioris vidi, oblongas, parvas; sed reliquæ rum et bracteolarum cicatrices sunt distinctissimæ. Corolla violacea. (v. in h. Mart et petrop.)

16. A. CYDONIÆFOLIA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 148), fruticosa, villosa, foliis ovalibus, pedunculis bifloris, bracteis bracteolisque ovalibus calyce brevioribus cumdemve æquantibus. ♂ Ad Mandioccam et Porto d'Estrella prov. Rio de Janeiro Brasiliæ, Octobri (Martius!), ad Tejucu prôpe Rio de Janeiro et in montosis circa S. Joao Marques, Febr. et Mart. (Pohl! et Schott! in h. mus. palat. vindob. n. 4729 et 5014; Lund! n. 527 in h. DC.), Justicia ongylyantha Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 4729 et 5014. Frutex diffusus, radicans, ramis adscedentibus superiora versus undique inferius bifariam hirsutis. Folia cum petiolo brevi 2-3½ poll. longa, 3-1½ pollata, basi obtusa rariusve acuta, apioem versus paulo angustiora attamen obtusa, utrinque, præsertim tamen subtus hirsuta; petiolus 2-3 lin. longus. Pedunculi axillares, petiolo breviores eumque ad summum æquantes, solitarii, alterni opposite, hirsuti, floribus approximatis capitulum subsessile magnitudine nucis moschatae majusve referentibus. Calycis laciniæ oblongæ, mucronulato-acutæ, hirsutæ, bracteis tenuiores, venosæ. Corolla pollicaris et longior, pubescens, labio superiore purpureo, inferiore violaceo (Riedel); tubus trilinearis, faux ventricosa. Antheræ lineari-oblongæ, dorso herbaceo, loculis subparallelis oblongis contiguis basi mucronatis. Capsula 6 lin. longa, superiora versus ventricosa, late ovata, dura, glabra, venoso-reticulata, fnsca acumine calloso albo. A genere quod ad antheras nonnihil recedit. (v. in h. monac., vindob. et DC.)
- α. foliis obtusis.
- β. foliis acutis. — In umbrosis sylvaticis prope Tejuco, Julio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 1356).
17. A. BAHIENSIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 148), ramis elongatis geniculatis sericeo-tomentosis, foliis oblongis basi acutis supra hispidulo-scabris subtus in costis pubescentibus, spicis axillaribus brevibus compositis bipartitis in terminalem subverticillatam abeuntibus, bracteis subrotundis obtusis sessilibus subinflatæ bracteolisque obovato-spathulatis longe ciliatis. ♂ Ad Bahiam (Riedel! in h. acad. petrop. specimen 1). A. flexuosa similis, differt bracteis bracteolisque majoribus latioribusque. Calyx brevis, 1½ lin. vix longus. (v. in h. petrop.)
18. A. FLEXUOSA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 148), ramis divaricatis geniculatis, foliis ovato-oblongis oblongisve basi acutiusculis glabris costis subtus scabris vel totis subtus hirtulis, spicis axillaribus brevibus compositis bipartitis in terminalem subverticillatam sepe approximatis, bracteis spathulatis bracteolisque lineari- vel spathulato-lanceolatis mucronato-acutis longe ciliatis, antheris basi mucronatis, corollæ tubo brevi, faucibus amplis, labio inferiore trilobo. ♀ In silvis ad Villam Ricam prov. Minaram Generalium Brasiliæ, Aprili (Martius!), in itinere a Monte Video Puerto Alegram in ripâ fluvii Uruguay (Sellow! in h. reg. berol. n. 12 [997]), in fructicetis inter Tanbaté et Mugi, Maio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 1675) et ad S. Carlos, Januario (idem! ibid.). Thyrsuli ex axillis foliorum superiorum oppositi tanquam verticillos formantes foliorum floralium circiter longitudine. Corolla sordide alba. Capsula longitudine bractæ, abortu sepe disperma. (v. in h. monac., berol. et petrop.)

§ 3. *Tyloglossa* — Genus *Thyloglossa* Hochst. — Corolla labio superiore planiusculo inferiore trilobo, ad palatum medium sulcato utrinque rugis (tribus) vel lineis gibbis transversis notato. Aethera loculi in connectivo dilatato obliqui, inferiore loculo basi in rostrum producto, superiore breviore sepe galeiformi. Semina discoidea, rugosa, retinaculis lanceolatis obtusis subtensa. — Flores vel

*axillares solitarii glomerative, vel apicem versus in spicam plus minus foliosam confluentes, vel spicae axillares, vel spica spicave terminales. Bractæ bracteolæque varia, saepe herbaceæ, illæ saepe majores. Plantæ tropicæ vel subtropicæ utriusque hemisphærii, annuae, perennes, suffruticesve. Corollæ purpureæ vel albæ. Galeopsis cujusdam floribus similes. Calycis lacinia superior nonnullis paulo brevior et angustior.*

A. Flores axillares, plerisque solitarii, pedunculo 1-3-floro. Capsula sursum ventricosa, basi brevi spatio contracta.

19. A. PROTRACTA, ramis elongatis striotis retrorsum hispidis internodiis elongatis, foliis ovali-ovatoe oblongis obtusis aut mucronulato-acutis longiuscole petiolatis subtus glanduloso-punctatis hispidulis, floribus axillaris solitariis ternis subsessilibus subverticillatis, bracteis accessoriis ovalibns ovali lanceolatis, bracteolis linearibus nullis, loculi antherarum inferioris caloare brevi aucto bifidove. ♂ In Africâ australi, floret a Junio in Octobrem inter fruticos in campis ad flumen Zwartkopsrivier et in collibus ad S. Elizabeth distr. Uitenhage, in montibus Bosjesman-rivier-hooyde diotis, etiam in viciniâ urbis Grahamstown, distr. Albany; inter fluvium, der groote Fischfluss dictum et terram Caffrorum, distr. Ceded Territory (Ecklon! Drège!). Gendarussa protracta N. ab E. ac. oap. in Linn. 15 p. 371. Justicia capensis Thunb. fl. cap. ed. Schult. 2 p. 178 et spec. orig. Thunb. in h. DC.! Burchell! cat. geogr. pl. afr. austr. extratrop. n. 3364 et h. DC.! Justicia Capensis var. ♂ glandulosa Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 404 (neo descr.). Justicia amygdalina var. b. E. Meyer! cat. pl. Drèg. a. 1837. (v. in h. Ecklon, Drège., Zeyher, Hooker, etc. cum varr.)

β. microphylla, bracteolis linearibus, foliis ovato-ellipticis aut subrotundis obtusis retusis in petiolum longiusculum acute desinentibus geniculisque subciliatis.

γ. laxior, foliis omnibus distantibus præter margines glabris, rarius retusis. — In viciniâ missionis Balfourensis ad flumen Katrivier. distr. Ceded Territory (Ecklon! Drège!). Justicia Pulegium E. M.! oat. pl. Drèg. (v. in h. Ecklon, Drège., Hooker).

δ. strictior, coarctata, foliis ramulorum internodia subæquantibus subtus hispidulo-scabris saepe subrotundis retusis, caule quoque magis hispidulo. — In monte Konabshoogte prope Castellum Beaufort in finibus Caffrorum distr. Ceded Territory.

ε. convexa, foliis ut in β, sed magis confertis crassioribus supra convexis subtus concavis (Drège). — Justicia convexa E. Meyer! cat. pl. Drèg. a 1837. Folii parvis subtus punctatis et floribus haud in spicam terminalem coeuntibus a reliquis facile distinguitur.

20. A. LEPTANTHA, herbacea, pubescens, ramis diffusis, foliis ovatis obtusis petiolatis hirsutis, floribus axillaris oppositis sessilibus, corollæ tubo elongato, saepe filiformi, bracteolis ovalibus petiolatis, loculi antherarum inferioris calcare brevi obtuso. ♂ In silvis primævis jugi « Olifantshoek » ad flumen Bosjesmanrivier distr. Uitenhage Promont. B. Sp., Septembri oum floribus fructuque (Ecklon!), ad Hangklip (Mund! et Mair! ). Gendarussa leptantha N. ab E. ac. cap. in Linn. 15 p. 372. Justicia prostrata Schlechtend.! in h. gen. berol. (spec. Mund! et Mair!) Ab A. protracta, uti ab omnibus confinibus, differt corollæ tubo filiformi longo ( $\frac{1}{2}$  poll. fere). Caulis  $\frac{1}{2}$ -1 ped. longus, a basi ramosus, diffusus, ramis longis ascendentibus, uti reliquis partibus omnibus pubescentiâ patent eglandulosâ vestitis, ad geniculæ infractis. Folia  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, petiolo 3-lineari. Bracteolæ foliorum formâ, et minores. Calycis lacinia parvæ, setaceæ, pubescentes. Corolla purpurascens aut alba, pubescens; labia ratione tubi brevia; superius modice fornicatum,

obtusum ; inferius trifidum , laciniis subequalibus oblongis obtusis. Capsula acuminata , pubescens , tetrasperma. ( v. in h. Ecklon et propr. )

21. A. CAPENSIS , fruticosa , ramosissima , pubescens , foliis oblongis breviperiolatis subveniis obtusis floribus axillaribus subsessilibus solitariis-ternis , bracteolis linearibus calycem æquantibus , loculi inferi calcare incurvo loculum æquante. ♂ In Africâ australi : inter frutices densos collium ad flumen Zwartkopsrivier ibidemque ad Prædium Pauli Maré , Uitenhage , ab Aprili in Septembrem ( Verreaux ! in h. Moricand ). Justicia Capensis Thunb. fl. cap. 2 p. 478. Justicia oleæfolia Schlechtend. ! in h. gen. berol. ( spec. Krebs. ) ex parte. Justicia amygdalium var. α. E. M. ! in h. Drège. Flores purpurei , pubescentes.

α. foliis oblongo-lanceolatis 1-1½ poll. longis cauleque pubescenti-canis glabrescentibusve. — In collibus inter flumina Bosjesmanrivier et Karro-garivier et in monte Bothasberg ad flumen der grosse Fischfluss dictum , prov. Albany. ( v. in h. Eckl. propr. etc. )

α\*. glabrescens. — Justicia oleæfolia Schlechtend. h. Drèg. ! et DC. ; h. gen. berol. spec. Krebs. ( v. in h. Drège, DC. etc. )

β. obovata , foliis obovatis , floribus oppositis subternis quaternis , bracteola utrinque folio simili at minore suffultis. — Justicia n. 555. Eckl. pl. cap. Justicia Capensis Tbunb. quod ad descriptionem.

γ. arenosa , humilis , pubescenti-tomentosa , glutinosa propterea que sepe arenis inhærentibus fuliginosa , foliis floralibus spathulatis approximatis floribusque ideo spicatis. — ( Burchell ! cat. geogr. pl. afr. austr. extratrop. n. 1616 in h. DC. ).

22. A. DIVARICATA , fruticosa , ramosissima , ramorum articulis elongatis juvenilibus pubescenti-hirtis , foliis linear-lanceolatis apice complicato-mucronatis mucrone recurvo basi attenuatis utrinque pubescenti-hirtis viscidulis , floralibus superioribus linearibus , floribus axillaribus sessilibus solitariis oppositis , bracteolis linearibus calyce longioribus , loculi inferioris calcare incurvo loculo breviore. ♂ In Promont. Bonæ Spei ad groote Poort ( Lichtenstein ! in h. Willd. ex h. Comit. de Hoffmannsegg ), in monte Winterhoeksberg Jul. et Augusto ( Zeyher, Ecklon ! ). Justicia divaricata h. Willd. ! n. 355 et h. gen. berol. fol. 2 et 3. Gendarussa incana var. β villosa N. ab E. in Linn. 15 p. 367. Ruellia setigera Zeyher h. ! cap. un. itin. n. 458. Proxima A. capensi var. γ , sed differt foliis angustioribus recurvato-mucronulatis. Pili foliorum molles , densi , ferrugineo-glandulosi. An var. A. capensis ? ( v. in h. Willd. ! Ecklon, propr. etc. )

23. A. MOLLISSIMA , fruticosa , ramosissima , tomentoso-mollis , foliis confertis ovato-subrotundis brevipetiolatis supra papulosis floralibus axillaribus solitariis subsessilibus , bracteolis oblongis calycem æquantibus , loculi antherarum inferi calcare recto loculo breviore. ♂ In Africâ australi ( Drèg. ! ). Justicia mollis E. Meyer ! cat. pl. Drèg. a. 1837. Similis A. capensi , differt foliis laticoloribus unguicularibus crassiusculis dense molliterque tomentosis et in paginâ superiore verruculis distantibus obsitis. ( v. in h. Drèg. , Hooker, etc. )

24. A. NATALENSIS , fruticosa , ramosa , subvilloso-tomentosa , mollis , foliis subsessilibus ovatis oblongis obtusis ramis costalibus ternis subtus prominulis floralibus spicato-capitatis terminalibus , bracteis lanceolatis bracteolisque linearibus calyce paulo longioribus , loculi antherarum inferi calcare recto loculo breviore. ♂ In Africâ australi ad Port Natal ( Krauss ! n. 453 in h. Benth. ). Differt ab A. mollissimâ foliis supra haud papillosis , subtus distincte costatis et floralibus in spicam subglobosam ramos terminantem vel sessilem vel brevipedunculatum bracteis foliis multo angustioribus interstinctam congestis. ( v. in h. Benth. ).

25. A. ROTUNDIFOLIA , caule herbaceo procumbente adscendente foliisque ovato subrotundis obtusis emarginatis brevipetiolatis glabris , floralibus axillaribus solitariis subsessilibus ebracteatis , antherarum loculi inferioris calcare loculo

- breviore.  $\mathcal{L}$   $\odot$ ? In Africâ australi (Drège!). *Justicia rotundifolia* E. M. I cat. pl. Drég. a. 1837. Caule herbaceo et foliis subrotundis apice sæpe emarginatis distinctissima. Florem et fructum perfectos non vidi. Calycis laciniaæ lanceolataæ, ciliolatae. Alabastrum floris vix lin. longius pubescens, nihilominus tamen antheris jam perfectis dehiscentibusque. (v. in h. Drège et Hooker).
26. A. *THYMIFOLIA*, fruticosa, glabra, foliis subrotundis obtusis subemarginatis in brevem petiolum desciuentibus triplinervibus eveniis crassis, floribus axillaribus pedunculatis, pedunculo folio multo breviore unifloro in medio bibracteolato, laciñiis calycis ovalibus mucronulatis, bracteolis oblongis squamiformibus calyce brevioribus, loculo antherarum . . . .  $\delta$  In Africâ australi ad flumen Orange rivier (Lichtenst! in h. Willd.); (Burchell! cat. geogr. pl. afr. austr. extratr. n. 1702 in h. DC! *Justicia cuneata* h. Willd! n. 356 (nec Vahl). (v. in h. DC.)
27. A. *TUBULOSA*, herbacea, pubescens, caule basi repente, foliis ovatis vel ovato-oblongis attenuatis obtusis basi cuneatim in petiolum longum decurrentibus, floribus in ramulis brevibus axillaribus subsessilibus solitariis ternis, bracteolis ovalibus petiolatis calyce longioribus, calycis laciñiis setaceis hirsutis, corollæ tubo angusto longo, labio inferiori late trifido laciñiis obtusis, superiore breviore plano, antheris muticis.  $\mathcal{L}$  In Africâ australi (Drège!). *Justicia tubulosa* et suffruticosa E. M. I cat. pl. Drég. a. 1837. Est species dubia, habitu Diclipterae, foliis teneris molibus. Capsula (immatura) mollis, pubescens, ad basin brevi spatio unguiculata, ab hinc ad medium usque tetrasperma. Stamina labium superius subæquantia; antherarum loculus inferior videtur imperfectus basi attenuatus pallidiorque, neque revera calcaratus. (v. in h. Drég. et propr.)
28. A. *HYSSOPIFOLIA*, fruticosa, glabra, foliis oblongo-lanceolatis obtusis in brevem petiolum attenuatis subeveniis crassis, floribus axillaribus pedunculatis, pedunculo folio multo breviore uni-trifloro in medio bibracteolato, calycis laciñiis subulatis, loculi antherarum inferioris calcare subulato longo incurvo.  $\delta$ .
- a. bracteolis brevibus squamiformibus. — In Insulis Canariis, in rupibus littoris occidentalis insulæ Teneriffæ (Smith! in h. DC. Webb! in h. Hooker). In solo indurato collum apricorum ad Zondagrivier fluv. Prom. Bon. Sp. (h. Hooker!). *Gendarussa hyssopifolia* Linn. Willd. sp. pl. ed. Dietr. I p. 403 et h. n. 353 (spec. Brouss.), Vahl en. I p. 162 et h. R. et Sch. syst. I p. 164, Ecklon pl. cap. n. 552. *Gendarussa hyssopifolia* N. ab E. in Linn. 15 p. 368. *Adhatoda minor* Zeylanensis angustifolia flore luteolo Schmiedel! in h. Schreb. *Lantana* aut *Bignonia*? Gouan in h. Hooker. (v. in h. DC., Willd., Ecklon, etc.)
  - $\beta$  *longebracteolata* (N. ab E. l. c.), bracteolis pedunculi spathulato-linearis internodio suo longioribus. — In collibus « Karro » similibus inter Coega et Zwartkopsrivier flumina, Uitenhage, Octobri (Ecklon!). Differt a Canariensis bracteolis longis, quæ in his fere squamæformes et subseciente internodio breviores sunt. Sed reliqua omnino congruentes. *Fruticulus humilis*, distortus, rigidus, valde difformis. (v. in h. Ecklon et propr.)
  - $\gamma$ . *uncinulata*, foliis mucronulato-acutis mucronulo recurvo, reliquis ut in var.  $\beta$ . — In Promontorio Bon. Sp. (Drège!). *Justicia patula*? c. h. Drég!. Flores sæpe subsessiles.
29. A. *CUNEATA*, fruticosa, ramosissima, glabra, novellis ramulis scabriusculis, ramis divaricatis, foliis cuneiformibus sessilibus subeveniis crassis, inferioribus sæpe emarginatis superioribus plerisque obtuse mucronulatis, floribus axillaribus sessilibus solitariis alternis, bracteolis linearibus calycem æquantibus, loculo antherarum infero calcarato calcare subulato longo incurvo.  $\delta$  In Africâ australi: circa flumen Zwartkopsrivier ad praedium Pauli Maré Uitenhage, Januario (Ecklon! Drège!). *Gendarussa cuneata* N. ab E. in Linn. 15

p. 367. *Justicia cuneata* Vahl en. 1 p. 163 et h.! (*J. cuneiformis*), Meyer! in pl. Drèg. (sub *J. foliolosâ*) h. gen. berol.! (specimen Lichtenstein). Ab *A. hyssopifoliâ* differre videtur floribus sessilibus et foliis infimis emarginatis; sed multis etiam speciminibus folia ad unum fere omnia integra sunt. Forsan *A. hyssopifoliæ* var.  $\beta$ , longe bracteatam quam diximus, hujus, neque *hyssopifoliæ* est varietas. (v. in h. Ecklon, Drèg., Vahl, Hooker).

$\beta$ . *hirtula*, pubescenti-hirta, corollæ tubo brevi, bracteolis oppositis linearibus calycibusque ciliatis, loculi antherarum inferi calcare brevi truncato, foliis obtusis subsessilibus glabrinusculis, ramis pubescenti-scabris. — In planitatē inter montes Krakakammæ et Van Stadens Rivier fluviorum, Uitenhage (Ecklon!). Differt foliis neutiquam emarginatis. An distincta species?

30. *A. INCANA*, fruticosa, ramosa, rigida, foliis linear-i-cuneatis acutiusculis obtusisve sessilibus eveniis ramisque junioribus dense subtilissimeque camotomentosis, floribus axillaribus sessilibus alternis, bracteolis caducis, capsulâ coriaceo-membranacea pallidâ opacâ. ♂ In Africa australi: in deserto Karro et circa Graaf Reynet, in Karro prope Castellum Beaufort (Ecklon! Drèg!), ad Nieuwefeld in districtu Beaufort, in distr. Ceded Territory (Drèg!), ad Doorenrivier, Laggerenberg (Mund! et Maire! in h. gen. berol.), Brack river (Burchell! in h. Hooker). Gendarussa incana N. ab E. in Linn. 15 p. 367. *Justicia Capensis* Meyer! in h. Drèg. Quod ad folia accedit *A. orchioidi*, sed differt integumento omnium partium cano, floribus sessilibus et capsulâ minore haud lignescente. (v. in h. Eckl., Drèg., Hooker, etc.)

31. *A. PATULA*, fruticosa, glabra, erecta, ramis omnibus oppositis patentibus viridibus, foliis ramorum principaliū oblongis in petiolam attenuatis tripli-nervibus, ramulorum saepe minimis obovatis retusivis distantibus, omnibus glabriis margine scabris crassiusculis viridibus, floribus axillaribus pedunculatis, pedunculo unifloro foliolum florale sepe æquante sub flore bibracteolato, bracteolis oblongis calycisque lacinii lanceolatis subtilissime pubescenti-subglandulosi, antherarum loculo infero calcarato. ♂ Augusto et septembri, Uitenhage (Ecklon!), Kommando Kraal, Novembri (Burchell! in h. Hooker). Gendarussa patula N. ab E. in Linn. 15 p. 371. *Justicia patula* Lichtenst. Rœm. et Sch. syst. 1 p. 164, Willd sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 404 et h. n. 357! (specim. Lichtenst. minus perfectum). Viore ramorum distincta species, eleganter opposite ramosa, geniculis incrassatis, internodiis longis, Visci aliquâ similitudine. Flores apertos non vidi. Anne Adhatodæ pygmæa, diosmophylla et patula unius speciei formæ? (v. in h. Willd., Ecklon et Hooker).

32. *A. ORCHIOIDES*, fruticosa, ramosissima, ramis fastigiatis apice foliisque lanceolato-linearibus lanceolatibus sessilibus acutiusculis glaucis eveniis in juventute pruinoso-puberulis, floribus axillaribus alternis, pedunculo subunifloro in medio bibracteolato, capsulâ grossâ lignescente. ♂ In Africâ australi. Gendarussa orchioides N. ab E. in Linn. 15 p. 369.

$\alpha$ . *angustifolia*, caule fastigiato coarctato gracili, foliis lanceolato-linearibus distantibus, floribus subsessilibus, bracteolis linearibus. — Juxta flu-men Olifantsrivier et fontem Brackfonteyn (Clan Willian), solo arenoso, Septembri et Octobri cum floribus (Ecklon! Drèg!). Gendarussa Linaria N. ab E.! in h. Ecklon. *Justicia orchioides* hort. bot. wratislav., Vent. jard. de malm. t. 51? Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 404 et h. n. 354! (spec. Desfont.), Vahl en. 1 p. 162 (neque h. ubi Sesuvii Portulacastrí specimen hoc sub nomine exstat, ab ipso Thunbergio proficiscens). *Justicia patula* a et b h. Drèg.! (v. in h. Willd., Ecklon, Drèg.)

$\beta$ . *latifolia*, caule patulo rigido, foliis lanceolatis aut oblongo-lanceolatis magis approximatis, pedunculo folia æquante aut superante uni-bifloro, bracteolis brevibus ovatis oblongisve. Cum præcedentes et in montibus

Kanaquas locis sabulosis, Septemb. (Ecklon, Drèg.). *Justicia orchidea* E. M.! in cat. pl. Drèg. (v. in h. Drèg.)

33. A. PYGMÆA, fruticulosa, ramosissima, glabra, foliis lanceolatis ovalibus utrinque acutiusculis sessilibus, inferioribus in brevem petiolum acute desinentibus eveniis crassis glaucis, floribus axillaribus pedunculatis, pedunculo uni-trifloro folio suo paulo breviori aut ejusdem fere longitudinis in medio bibracteolato, bracteolis ovatis brevibus vel lanceolatis, loculi antherarum inferioris caloare longo subclavato incurvo. ♂ In Africâ australi: inter frutices deserti Karro natali, circa Couga et Zwartkopsrivier flumina, Uitenhage, Ootobri, cum A. hyssopifolia ♂ longe bracteatâ promiscue. Gendarussa pygmæa N. ab E. in Linn. 15 p. 369. Differt ab A. hyssopifolia floribus duplo minoribus minus hirtis, calcare antherarum obtuso, foliis glaucescentibus duplo minoribus (1-3 lin. longis), plerisque acutis superioribus magis distantibus magisque diminutis, quo denique efficitur ut pedunculi folia æquent, quæ his in locis magis latescunt et elliptica aut subovata iuveniuntur, calycis laciniis brevioribus latioribus. Bracteolæ formæ communis magis accedunt ad bracteolarum A. hyssopifolia var. α formam quam ad illas var. β, linea vero media intercedit inter utrasque, quod ad folia cæterum magis inter se, quam cum A. orchioide congruentes. Pedunculi vetusti spinescent. (v. in h. Ecklon !)
- β. *Serpillum*, foliis subrotundis obtusis cum mucronulo exiguo evidenter petiolatis, braoteolis lanceolatis. ♂ (Mund! et Maire! in h. gen. berol.)

34. A. DIOSMOPHYLLA, fruticosa, rigida, patenti-ramosissima, ramulis novellis strigiloso-vittatis, foliis ramorum ovatis subcordatis mucronato-acutis subdenticulatis sessilibus basi appressis apice recurvis crassis internodio brevioribus, floribus axillaribus pedunculatis, pedunculo unifloro folium æquante inferioris bibracteolato, bracteolis lanceolatis, loculi antherarum inferioris calcare obtuso. ♂ In Africâ austr. in regione flumini Zwartkopsrivier ad prædium Pauli Maré, Februario, Uitenhage (Ecklon!), in fruticetis siccis distr. Albany (h. Hooker!). Omnium haec est rigidissima, caule ramisque crassiusculis pungentibus fastigiatis patulis. Folia inferiora oblonga aut ovalia, ramorum et ramulorum a 3 lin. longis 2 lin. latis in 1½ lin. et 1 lin. longa, 1-2 lin. lata decrescentia, apice mucronato-acuto patenti-recurva, viridia, obscure trinervia, glabra. Flores in superiorum foliorum axillis solitaria, pedicello crasso. Bracteolæ setuloso-cliatæ, siouti et calycis laciniæ, quæ linearis-subulate rigideque acutatae. Corolla alba aut purpurascens, strigiloso-pubescent, 3 lin. longa. Labium superius ovatum, obtusum, inferius profunde trifidum, laciniis obtusis mediâ paulo latiore. Capsula 5 lin. longa, ultra medium compresso-sterilis, acuta, punctulato-aspera, lignescens at tenuior ac A. orchioïdls capsula, nitida, rufescens. (v. in h. Ecklon, propr. et Hooker).

- B. Flores axillares, solitarii, oppositi, verticillati et ex verticillatis in spicam terminali foliacem abeuntes. Capsula depressior.

35. A. GENISTIFORMIS, fruticulosa, glabra, caule inordinate ramosissimo superne scabro, foliis approximatis lanceolatis sessilibus rigidis, floribus in ramulorum apice 2 subspicatis solitariisve, bracteis bracteolatisque lineari-subulatis foliis similibns calyce brevioribus, calycis laciniis elongatis subulatis glandulosis. ♂ In Brasiliæ campis Chapadão de S. Marcos dictis, Augusto (h. acad. petrop.! n. 2512). *Tyloglossa genistiformis* N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 115. Fruticulus 6-12 pollices altus, ramis inordinate suboppositis ternis scutulis exiguis scabris et tereti tetragonis compressiusculis; ramulis brevibus distinctius tetragonis. Folia perfecte sessilia, 5 lin. longa, 1½-1 lin. lata (ramulorum folia decrescentia, sublinearia et fere acerosa, propter margines reflexos subtus bisulca), acuta, glabra nec lineolata, rigide erecta. Bracteæ calycis duplo brevior, obtusiuscula; bracteolæ similes at breviores. Calyx 3 lin. longus. Corolla 5 lin. longa, pallide cœrulea. (v. in h. petrop.)

36. *A. TWEEDIANA*, suffruticosa, caule ramisve rectis erectis sulcatis sulcis planis juvenilibus pubescenti-scabris, foliis oblongo-lanceolatis apice attenuatis basi acutâ in petiolum brevissimum desinentibus punctulato-asperis subtus ad costas marginesque petioloque strigiloso-scabris, floribus axillaribus subsecundis subsessilibus ramulo opposito brevissimo bifloro sæpe abortivo, bracteolis oblongis mucronatis calyce longioribus, lacinia calycis oblongis plus minus cuspidatis apice scabris. ♂ Ad Rio Segundo in prov. Cordoba (Tweedie! in h. Bentham), Parama (Tweedie! in h. Hooker), Buenos Ayres (Tweedie et Gillies! in h. Hooker!). Similis *A. flexuosa*, a quâ notis supra allatis satis differre videtur. Rami sunt stricti, sulcis sensis in fundo planis insculpti; folia  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{3}{4}$  poll. longa, 5 lin. lata; superiora siva floralia paulo breviora basique latiora. Bracteolæ 4-4½ lin. longæ, obtusæ cum brevi mucronulo, in petiolum brevissimum desinentes. Calyx laciniæ 3 lin. longæ, fere glabré. Corolla fere eadem ac in *A. flexuosa*, sed paulo major et amplior. An forma magis evoluta *A. flexuosa*? (v. in h. Bentham et Hooker).
- γ. *angustifolia*, foliis omnibus lanceolatis apice niñus attenuatis.—Panama (Tweedie! in h. Hooker), S. Luis de la Punta (Gillies! in eod. h.), Buenos Ayres (Tweedie! et Gillies! in h. Hooker). *Justicia Bonariensis* et viridis Gillies! in h. Hooker.
37. *A. GILLIESII*, suffruticosa, caule ramisve erectis quadrangularibus juvenilibus pubescenti-scabris, foliis ovatis brevi-acutis basi rotundata in petiolum aoute desinentibus punctulato-asperis ad costas marginesque petioloque scabris, superioribus ovalibus decrescentibus, floribus axillaribus subsecundis subsessilibus, bracteolis lanceolatis ciliatis calyce longioribus foliisque floribus ciliatis glandulosisque, lacinia calycis lanceolatis acuminatis. ♂ S. Luis (Gillies! in h. Hooker), in silvis ad S. Jago de Cordova (Tweedie! n. 1260 in h. Hooker cum A. Tweedianâ). *Justicia australis* et *longistylus* Gillies! in h. Hooker. Differt ab *A. Tweedianâ* foliis latioribus brevioribus, colore opaco, caule haud sulcato, etc. Flores *A. Tweedianâ*, coloris pallide cœrulei labio inferiore subtiliter striato. Folia infima fere Alsinae vel Stellariae nemorum, superiore sæps ex ovalibus oblonga; bractealia parva, bracteolis paulo longiora, exacte ovalia. (v. in h. Hooker).
38. *A. PERIPLOCIFOLIA*, glabra, caule elongato subtetragono, foliis distantiibus lanceolatis longe acuminatis basi acutâ in petiolum desinentibus, floribus axillaribus oppositis sessilibus, lacinia calycis linear-lanceolatis acuminatis. ♂ Ad Caracas (Jacquin!). *Justicia periplocæfolia* Jacq. coll. suppl. p. 5 t. 7 f. 2, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 401, h. Willd. n. 337 (spec. cult.), Vahl en. 1 p. 147. Articuli caulis longi. Folia inferiora cum petiolo 5 poll. longa et 9-10 lin. lata, superiora minora. Flores superiores magis approximati. Corolla 8 lin. longa, purpurea, valde caduca; labium superius bifidum. Calcar antheræ breve, obtusum, recurvum. (v. in h. Willd.)
39. *A. FLEXUOSA*, suffruticosa, caule geniculato-flexuoso repente ramoso, ramis adscendensntibus pilis brevibus reversis lineatis et apicem versus undique pubescenti-scabris, foliis inferioribus ovatis superioribus ovato-oblongis apice subattenuatis obtusisque basi acutiusculis, subtus ad costas marginesque petioloque brevi strigiloso-sericeis, floribus axillaribus oppositis sssessilibus alterrove ex pedicellis longiusculo bifloro, bracteolis linearibus calycem æquantiibus, lacinia calycis lanceolatis acuminatis velutino-scabris. ♂ Ad Coroaba in silvis Brasiliæ (Max. Princ. Wied.! in h. Mart.). *Tyloglossa flexuosa* N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 116. Planta illeipa, distorta, humilis. Caulis inferne teres, apicem versus obscure tetragonus, pubescens flavo-micante. Folia inferiora cum petiolo lin. 1 longo  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa et 4-8 lin. lata; superiora ad summum  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 poll. lata. Flores ex angulis foliorum sæpe solitarii sessiles, nec raro loco alterius floris pedunculus oritur brevis, apice diphyllos, biflorus. Calyx grandiusculus, firmus, 5 lin. longus. Corolla 7-8 lin. longa, alba, tenera. Antherarum loculi in connectivo latius-

culo subparalleli; alter paulo inferior basi obtuse calcaratus, superior basi subtuberulatus. (v. in h. Maxim. Princ., Mart. et propr.)

40. A. CILIATA, suffruticosa, caule ramisque erectis teretiusculis pubescenti-canis, foliis ovatis mucronato-acutis brevipetiolatis puberulis ciliolatis, bractealibus sessilibus ovalibus obovatisve longe ciliatis, spicâ terminali subsessili, bracteolis lanceolatis calyce longioribus, calyois laciniis lanceolato-subulatis. ♂ In insulâ Sanctæ Catharinæ (Tweedie! in h. Bentham). Tyloglossa ciliata N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 116. Folia unguicularia, glau-cescentia, Chenopodii olidi. Corolla lutea, 7-8 lin. longa. Spica e foliis in bracteas transformatis genita, circiter pollicaris, secunda. (v. in h. Bentham).
41. A. DIPTERACANTHA, caule diffuso foliisque ovali-oblongis obtusiusculis pubescenibus ciliatis bracteolis calyce longioribus ovalibus oblongisve in petiolum attenuatis, floribus axillaribus sessilibus alternis oppositive. ♀ Ad Tampico de Tamaulipas (Berlandier! n. 192 in h. DC. et in h. Moricand), Bello Bragosia et S. Felipe in prov. Texas (Drummond! coll. 3 n. 250 in h. Hooker). Dipteracanthus procumbens N. ab E.! in h. Moricand, secundum specimen fructiferum absque flore. Habitus omnino Diptera canthi geminiflori. Caulis ramosissimus, ramis adscendentibus plus minus hirsutis. Folia inferiora ovalia, unguicularia, superiora oblonga dimidio longiora, omnia in petiolum brevem attenuata, subtus pallidiora lineolato-aspera et præter costas et mar-gines, quæ pilis ciliata sunt, sèpè glabra. Calycis laciniæ linearis lanceolatae, hirtæ, apice setacea. Corolla 6 lin. longa, pallide purpurascens, pubescens, tubo cylindrico angusto fere recto, labio superiore angusto obtuso concavo parum incurvo, inferiore venoso-reticulato convexo trifido laciniis æqualibus rotundatis, medias ad fauces biplicata. Antherarum loculi in connectivo oblique lanceolato contigui, alter magis inferior mucronatus. Capsula 3 lin. longa, glabra. (v. in h. DC. et Hooker).
42. A. CANDICANS, fruticosa, caule subsexangulari inferne glabrescente luteo, superius pubescenti-cano, foliis ovatis in petiolum acute desinentibus obtuse attenuatis ad costas villosulis juvenilibus pubescenibus, floribus verticillatis, bracteis ovato-oblongis obtusis calycem æquantibus, bracteolis longitudine calycis calycisque laciniis æqualibus linearibus obtusiusculis lanuginoso-to-mentosis albis. ♂ Ad Oaxaca in Cordilleræ Mexicanae planities alt. 5000 ped., a Novembri in Aprilē (Galeotti! n. 911 in h. Hook.). Folia cum petiolo  $1\frac{1}{2}$  lin. longo incano 1 poll. longa,  $\frac{1}{2}$  poll. lata. Verticilli 6-10-flori densi. Corolla fere pollicaris, purpurea. Labium superius trigonum, obtusum, subemarginatum; palatum pennatum venosum et plicato-ringosum. Antherarum loculi fere paralleli, at sat distantes, inferior basi obsolete mucronatus. (v. in h. Hooker).
43. A. ZOLLINGERIANA, herbacea, caule diffuso geniculato pubescenti-scabro, foliis oblongis utrinque attenuatis brevipetiolatis in costis margineque pubescen-ti-scabris supra opacis bracteis subrotundo-ovatis in petiolum attenuatis caly-cem vel æquantibus vel superantibus, floribus axillaribus alternis sessilibus solitariis vel fasciculato-ternis, antherarum loculo infero calcarato. ♀ In ins. Java (Zollinger! pl. jav. n. 2696 in h. DC.). Calycis laciniæ subulate, scabrae. Corolla pallida? vis 3 lin. longa; labium superius rectum, apice bidentatum, inferius trilobum disco rugoso. Capsula oblonga, depressa, 3 lin. longa, pallida. (v. in h. DC.)
44. A. QUADRIFARIA, herbacea, foliis oblongo-lanceolatis utrinque puberulis, floribus verticillatis, bracteis obcordato-spathulatis. ♀ In Indiâ orientali: in montibus prov. Sillet(Wall!). Gendarussa quadrifaria N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 105. Justicia quadrifaria Wall. cat. n. 2479a. Caulis pedalis et ultra, erectus, strictus, bifarium sulco angusto notatus, obtuse tetragonus, pubescen-ti brevissimâ incurvâ subtomentosus. Folia 3 $\frac{1}{2}$  poll. longa, paulo ultra dimidium pollicem lata, cuneatim sessilia, margine costâ superne subtusque tota pubescenti-scabra, et in pagina superiore setulis raris inspersa; in cultâ plantâ folia elliptica sunt. Bracteæ longitudine calycis, retuso. vel obcordato-spathulatae, trinervæ,

herbaceæ. Bracteolæ brevissimæ, squamæformes, obtusæ, vix  $\frac{1}{4}$  linea longæ. Calyx trilinearis, hirtulus. Corolla calyce paulo longior, pubescens, pallida. Capsula longitudine calycis, oblonga. (v. in h. Wallich et Hooker).

$\beta.$  *culta*, foliis latioribus ovalibus supra glabris. Wall. l. c. n. 2479 b.

45. A. *NEESIANA*, fruticulosa, foliis linear-lanceolatis glabris, floribus axillaribus geminis subverticillatis, bracteolâ utrinque parva spathulatâ, labio superiore angusto concavo, staminibus reflexis.  $\circlearrowright$  In Indiâ orientali : in montibus prov. Sillet (Wall!). Gendarussa Neesiana Wall. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 7 p. 105. Justicia Neesiana Wall. cat. n. 7175 (7174). Justicia fragilis Wall.! in h. Hooker (nec Wall.). Fruticulus est elegans,  $\frac{1}{2}$ -1 pedem altus, lignosus, erectus, inferne aphyllus, multiarticulatus, superne deuse foliosus, simplex vel ramosus, subtetragonus, strigiloso-canescens. Folia internodiis multo longiora,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{3}{4}$  poll. longa,  $2\frac{1}{2}$ -3 lin. lata, in petiolum brevem strigoso-canescem attenuata, obtusa, integerrima, margine nonnihil recurva, crassiuscula. Bracteolæ calyce duplo breviores. Corolla circiter 4 lin. longa, pubescens, lutea? Capsula 3  $\frac{1}{2}$  lineas longa, lanceolata, glabra, lutescens. (v. in h. Wallich et Hooker).

46. A. *ASPERA*, foliis oblongis obtusis basi acute in petiolum desinentibus pubescentibus supra tuberculato-asperis, floribus axillaribus oppositis, bracteâ . . . . . labio superiore obtuso concavo.  $\mathscr{D}$ ? In Philippinis (Cuming! n. 1403 ex parte in h. Bentham). Fragmenta tantum vidi, sed ea jam satis distincta a reliquis foliis supra asperis unguicularibus. (v. in h. Bentham).

47. A. *KOTSCHYI*, caule sexangulari foliisque lanceolatis obtusis in petiolum brevem attenuatis scabris, floribus verticillatis subsenis, verticillis inferioribus valde distantibus supremis approximatis, bracteolis lanceolato-linearibus scabris ciliatisque calyces æquantibus, calycis lacinis linearis-subulatis sub fructu patulis, capsulâ pubescente calycem æquante.  $\odot$  Ad pagum Cordofanum Millbes inter gramine excelsa, Decembri (Kotschy l. c.). Rostellaria sexangularis Hochstett. in Kotsch. it nub. un. itin. n. 293. Tyloglossa Kotschy Hochst. in diar. bot. ratisb. 1843 p. 74. Affinis est A. palustri, sed differt ab hac et a reliquis caule graciliore, foliis minoribus, scabritie, etc. (v. in h. un. it. et Hooker).

$\alpha.$  *simplex*, caule elongato gracili simplicissimo.

$\beta.$  *ramosa*, caule a basi ramoso, ramis infimis elongatis. —  $\odot$  In Senegambia regno Bondou (Heudelot! in h. mus. paris. n. 21).

48. A. *ROSTELLARIA*, caule elongato herbaceo subramoso foliisque distantibus oblongo-lanceolatis acutis utrinque pilosis, floribus verticillato-senis sessilibus, lacinis calycis lanceolatis margine membranaceis subciliatis, bracteis bracteolæ exiguis setaceis, capsulis glabris calyce duplo longioribus.  $\odot$  In Abyssiniâ prope Adoam inter fruticeta minora, Septembri et Novembri (Schimper!), in Abyssiniâ (Quartin Dillon! in h. mus. paris. dupl. n. 93). Rostellaria Schimperi Hochst. et Justicia calcarata Hochstett. in fl. abyss. exsicce. un. itin. n. 106. Tyloglossa Schimperi Hochstett. in diar. bot. ratisb. 1843. p. 73 et in Schimper it. abyss. un. itin. n. 1101. Planta habitu Galeopsis Ladani. (v. in h. un. itin. et Nees).

$\beta.$  *humilis*, caule semipedali firmiore a basi patent-ramoso, floribus paucioribus in verticillo. — In Abyssiniâ (Schimper!). Tyloglossa rostrata Hochstett. in Schimp. it. abyss. n. 1657 et 1659. (v. in h. un. itin. et Nees).

49. A. *MAJOR*, caule ramoso ramisque sexangularibus pube adpressâ subincanis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis acumine obtusiusculo utrinque pubescentibus longiuscule petiolatis, spicâ in caule ramisque terminali pendulatâ verticillatâ densâ, bracteis lanceolatis acuminatis bracteolæque linearibus acuminatis calyce longioribus calycibusque pubescentibus, lacinis calycis linearis-subulatis, capsulâ pubescente calyce duplo bracteolæ

subæquante. ○ In arborum umbrâ ad radices montium vallis fluvii Tacaze in Abyssinâ, Septembri (Schimper!). Tyloglossa major Hochstett. in diari. bot. ratisb. 1843 p. 73 et in Schimper it. abyss. un. it. n. 1251. (v. in h. un. itin. et Nees).

50. A. *LITHOSPERMIFOLIA*, caule ramoso elongato sexangulari pube brevisimâ reversâ scabro, foliis distantibus lanceolatis scabriusculis puberulis, floribus verticillatis senis solitariis, lacinia calycis lanceolatis acutis pubescensibus margine membranaceis. ○ In Peruviâ. *Justicia lithospermifolia* Jacq. hort. schœnbr. 1 p. 3 t. 4, Vahl en. 1 p. 151 et h! fol. 1, h. Willd. n. 339. *Justicia ladanoïdes* Lamk. h. DC.! n. 592 et Vahl! fol. 1 ex h. paris. *Justicia coccinea* Gouan! in h. Hooker. *Dianthera* an ind. or? hort. paris. in h. DC.! *Persimilis* A. Schimperiana et Kotschy!, sed differt calycis formâ et corollâ minore, pallide purpureâ, palato et lacinia mediâ labii inferioris intense violaceo-purpureis. *Calcar antheræ* aliis obtusum, aliis apice bidentatum. (v. in h. Vahl, Willd., DC., Hook., paris. etc.)
51. A. *REFLEXIFLORA*, glabra, caule suffruticoso ramoso, ramis virgatis teretibus, foliis distantibus, infimis oblongis ovalibus superioribus linear-lanceolatis attenuatis basi acutis petiolatis, spicis axillaribus oppositis subsessilibus brevibus terminali capituliformi, floribus approximatis alcornis, bracteis bracteolatisque linearibus æqualibus calycem æquantibus patulo-recurvis. ? In insulâ S. Thomæ (Vahl! Wydler! Ehrenberg!), Portorico (Bertero! in h. DC. et Balbis). *Justicia reflexiflora* Richard Vahl en. 1 p. 157 et h!. R. et Sch. syst. 1 p. 161, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 402, Wydler. pl. ins. St. Thomas n. 78 (in h. Morioand!). *Justicia longifolia* Balbis! (nec Vahl) in h. DC. *Justicia periplocifolia* h. gen. berol. n. 192! (spec. Ehrenberg). Folia superiora 3' poll. longa, 3 lin. lata; inferiora minora, magis oblonga vel etiam ovata et minus ad apioem attenuata. Spicæ unguiculares, dense, verticillos distantes referentes, supremæ terminali capitulo approximatæ. Corolla ½ poll. longa. Antherarum loculi oblique sibi adjecti, basi divergentes rugosi (!); inferior obtuse calcaratus sive appendiculatus. Capsula pubescens, a tergo depressâ. (v. in h. DC., berol., Moricand.).
52. A. *FURCATA*, herbacea, holosericeo-pubescentis, caule erecto teretiusculo, foliis oblongo-ovalibus utrinque attenuatis petiolatis, spicis axillaribus aggregatis brevibus sæpe geminis alterâ breviore, floribus secundis subinde solitariis axillaribus oppositis, bracteolis linear-lanceolatis, labio superiore bifido, inferiore lato convexo trilobo, loculi inferi calcare scrotiformi bifido. ○  In America meridionali.
- α. *terminalis*, spicis in spicam terminalem lobatam transeuntibus, caule cum foliis glabrescente. — Circa Tehuantepec, Mexico (Andrieux! pl. mex. exs. in h. DC. in h. gen. monac. et Hooker n. 133), Oaxaca in silvis prope Oceanum pacificum (Galeotti! n. 917 in h. Hooker), ad fontes minerales prope Peñon de los Baños, Junio (Berlandier! in h. gen. berol. n. 371). (v. in h. berol., monac., DC., Hooker).
- β. spicis distinctius axillaribus floribusque solitariis caule foliisque magis pubescentibus. ○ In Mexico (Cav.! Humboldt et B.!, h. DC.!), Puebla in regno mexic. (Aschenborn! pl. mex. n. 527), Peñon de los Baños (Ehrenberg! in h. gen. berol. n. 99). *Justicia furcata* Jacq. hort. schœnbr. 1 p. 2 t. 3, Willd. sp. pl. ed. 2 v, 1 p. 406 Humb. et Kunth n. gen. 2 p. 29, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 406, h. Willd. n. 338, h. DC! Aschenb.! pl. mex. exsicc. n. 527. *Justicia Peruviana* Cavan. icon. 1 p. 17, Vahl h.! (v. in h. Willd., DC., Aschenborn, etc. et v. c.)
- γ. foliis lanceolato-oblongis, calyce tripartito! (in flore unico observato). — Ex hort. bot. calc., *Justicia Peruviana* Wall. cat. n. 7176. Differt a communi formâ: foliis angustioribus, pubescentiâ minus molli et calyce in axillâ solitario tripartito, lacinia lanceolatis, nec quinquepartito, corollâ paulo minore. (v. in h. Wallich).

53. *A. ODORA* (N. ab E.), fruticosa, floribus axillaribus solitariis aggregatisve, bracteolâ in medio pedicelli brevis exigâ subulatâ, labio superiore bifido inferiore late convexo trifido lacinis obtusis, loculi inferi calcare bidentato, foliis ovalibus cauleque glabris asperiusculis. ♀ In Arabiâ : Surdud , in silvis Arabiæ frequens (Forsk.), in monte Gessr, Arabiæ Felicis , Februario cum floribus fructuque (Schimper!), Djebel Ras in Arabiæ Felici (Botta! in h. mus. paris. n. 212 (ex parte); in montibus Sidr et Kassr Arabiæ Felicis, Febr. (Fischer! n. 18 in h. Hooker). *Dianthera odora* Forsk. descr. p. 8, Vahl symb. 2 p. 11, en. 1 p. 164, Willd. sp. pl. 1 p. 99, R. et Sch. syst. I p. 165, Spr. syst. 1 p. 83, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 405, h. æg.-arab. un. itin. n. 859. Ab *A.* furcatâ haud multum recedit, nisi caule albo-nitente, lineolis asperulo, epidermide in vittas disrupente, cæterum glabro, foliis ovalibus aut subrotundis obtusis mucronulatis glabris lineolato-asperis, calcare antheræ parumper bidentulo. Reliquia congruunt. Sicca odorem spirat Anthoxanthi. (v. in h. un. itin. paris., Nees, Hooker).
54. *A. DIVERSIFORMIS*, caule foliisque ovatis dense lineolatis glabris, floribus terminalibus spicatis axillaribusve solitariis alternis, spicâ terminali subsecundâ, bracteis late ovalibus in petiolum contractis nnidis quinquenervibus, supremis sterilibus, bracteolis linearis-subulatis brevibus patulis , antherarum loculo infero calcarato. ♂ In Indiâ orientali. *Gendarussa diversiformis* N. ab E. in Wight cat. h. propr. n. 1998. Folia pollicaria , ovata , in acumen producta, basi obtusa, obiter repando-subcrenata, supra minutim lineolata, subtus ad costam scabra. Petioli angusti, canaliculati, ciliolati, semipolligares. Flores subsessiles in axillis foliorum inferorum , alterni, ramulo axillæ alterius opposito, in summitate diminutis foliis spicæ similitudo comparata. Bracteolæ, laciñis calycis æquales et similes aut breviores, lineares, acute , margine scabré; laciña calycis superior nonnihil brevior. Capsula longitudine calycis, oblonga , a dorso compressiuscula, pallida. (v. in h. Wallich et Wight).
- a. spicigera*. — In Indiâ orientali (Rottl.! in h. Vahl).
- b. axillaris*, floribus axillaribus. — Ibid. (Wight!). *Gendarussa Orixensis* var. *γ* *axillaris* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 104.
55. *A. TRANQUEBARIENSIS*, fruticulosa, canescens-pubescentia, foliis subrotundis parvis, floribus axillaribus solitariis in spicam terminalem adscendentibus, bracteis orbiculatis retusis, bracteolis calycem æquantibus linearibus. ♀ In Indiâ orientali : prov. Madras, frequentior in collibus interioris regionis ad pedes montium solo glareoso a pluviosis et montium declivitate advecto (Wight l. c.), in Tranquebariâ (Linn.), Pondichery (Perrottet! in h. DC.). *Gendarussa Tranquebariensis* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 105, Wight h. propr. n. 1999 et 2000, ic. t. 462. *Justicia Tranquebariensis* Linn. suppl. p. 85, Vahl symb. 2 p. 17 en. 1 p. 163 et h.! R. et Sch. syst. 1 p. 165, Willd sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 405 et h.! n. 358 (specim. Klein.), Spr. syst. 1 p. 144, Wall. cat n. 2424, a (ex parte), b (ex parte), d (ex parte) et 2462. *Justicia triangularis* h. Heyn.! *Justicia parvifolia* Lam. enc. méth. 1 p. 620. *Dianthera cordata* Vahl ! h. inter synon. *A. Orixensi* similis quidem, minime vero cum. eâdem communitata ; differt : radice crassâ lignosâ tortâ, caule fruticuloso ad basin ramosissimo lignoso intricato trichotomo, cortice albo glabriuscule , ramis elongatis alternatim ramulosis tetragono-teretiisculis mollissime incano-puberulis, articulis elongatis, foliis minoribus articulis ramorum principalius multo brevioribus ad summum pollicaribus sepius 3-4 lin. diametro subrotundis obtusis vel mammilato-acuminulatis molliter puberulis , floribus jam ab inferiore caulis parte vere axillaribus sessilibus ramulo vel ramuli gemmula oppositis denique in summitate ramulorum contractis sensim sensimque artieulis foliisque floralibus ex subrotundo-obtusis retusis factis spicam constructibus, minime autem derepente in spicam abeuntibus a paucis inferis nullisve axillaribus, bracteolis denique longioribus. Ceterum , ubi flores spicati, servato ordine altero, altera bractea etiam in hâc specie restat sterilis, sæpeque im-

minuitur. Corollæ luteæ purpureo-punctatæ et capsulæ structura ut in A. Orixensi. Praeter bracteolas etiam in multis foliola duo exigua spathulata, ramuli florigeri indicia, ad basin calyceum accedunt. (v. in h. Wallich et Hooker).

56. A. CEYLANICA, herbacea, foliis ovato-oblongis acuminatis repando-subcrenatis glabris lineolatis, spicis axillaribus bi-trifidis subsecundis, bracteis bracteolisque subæqualibus spathulatis calycem æquantibus recurvo-patulus glanduloso-ciliata.  $\mathcal{U}$  In Ceylon (h. Arnott-Walker! in h. Benth. et Hook. n. 35). A. amaranthoides N. ab E. in h. W.-Arn. Pluripedalis, caule inferius tereti superioris tetra-hexagono, dichotomo subtrichotomovite glabro lineolato, medullâ amplâ. Folia nonnihil inæqualia, 4-5 poll. longa,  $1\frac{1}{4}$  poll. lata, basi acuta, apice louge attenuata, glabra, lineolata, marginè repanda, superiora paulo breviora ac latiora. Bracteas oppositæ, 1- $1\frac{1}{2}$  lin. longæ, spathulatae, obtusæ, in petiolum angustum attenuatae, patentes, glanduloso-ciliatae. Bracteolas duas oppositæ, spathulatae, subtruncatae, basi longe attenuatae, glanduloso-ciliatae subinde nudæ, bracteæ paulo breviores. Calyx linea longus, ad basin fere 5-fidus, lacinias lanceolatis acuminatis glabris. Corolla 2- $2\frac{1}{2}$  lin. louga, purpurascens; labium superius rectum, conicum, integrum, inferiore brevius; inferius labium ovatum, convexum, ad  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$  trifidum, lacinias subæqualibus obtusis, lineis saturatoribus pictum. Capsula 5 lin. longa, glabra, fusca, a basi ad medium depressa, hinc subcompressa et tetrasperma. Semina muricata, fusca. (v. in h. Benth. et Hook.).

57. A. ORIXENSIS, herbacea, caule pubescenti-scabro bracteolis oppositis linearisubulatis, foliis ovatis dense lineolatis glabriusculis, spicis terminalibus axillaribus subsecundis, bracteis orbiculato-spathulatis ciliatis superioribus sterilibus.  $\mathcal{U}$  In Indiâ orientali: vulgaris inter virgulta solo sicco et sterili oræ Cormandelianæ, floret tempore pluvio (Roxb.), in aridis glareosis (Wight!), solo sicco glareoso locis elatiōribus iu viciniâ Samulcottæ urbis (idem!), in montibus Ventaloor (Wight! Wallich l. c.). Gendarussa Orixensis N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 104 (excl. var.  $\gamma$ ), Wight h. pr. n. 1997. Justicia Orixensis Koen. ms. in Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 133, Rœm. et Sch. syst. mant. 1 p. 145, Willd. sp. pl. ed. 2 v. 1 p. 399, Wall. cat. n. 2424 d, h. Russell! (Wall. l. c. a.). Justicia Tranquebariensis Roxb. fl. ind. l. c. p. 131 (excl. syn. Linn.), Rœm. et Sch. mant. 1 p. 144 (neò vero syst., quæ vera J. Tranquebariensis Linn.), Wall. cat. n. 2424 a (ex parte), d. Justicia brachioidea Roth nov. pl. sp. p. 16, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 398. Justicia brachionodes Spr. syst. 1 p. 82. (v. in h. Wight et Wallich).

$\beta$ . glauca, caule foliisque sæpe densius puberulis. — Vidi in hbb. madrasp. et Heyn. Justicia glauca Rottl. Willd. in act. am. n. ser. berol. 4 p. 219, Rœm. et Sch. syst. 1 p. 165. Spr. syst. 1 p. 83. Willd. sp. pl. ed. 2 v. 1 p. 405 h. Madr.! et h. Heyn.! Wall. cat. n. 2424 b, c. Justicia Tranquebariensis Wall. cat. n. 2424 b (ex parte), c. (v. in h. Wallich et Hooker).

$\gamma$ . axillaribus, floribus plerisque axillaribus, calycis lacinias bracteolisque majoribus, caule foliisque glabris. (h. Wight!).

58. A. MINOR, herbacea, caule ramoso ramisque sexangularibus subtilissime puberulis subincanis, foliis obtusis ciliolatis et utrinque sparse puberulis, inferioribus subovatis in petiolum longiusculum decurrentibus, superioribus oblongo-lanceolatis lanceolatis in brevem petiolum attenuatis, floribus verticillato-subsensis in spicam terminalem foliosam caulis ramorumque basi interruptam apice coeuntibus, lacinias calycis lineari-lanceolatis ciliatis, capsula calycem æquante pubescente.  $\odot$  Ad rupes in Abyssiniae prov. Modat prope Mai Oui, Aprili (Schimper!), Bahr-el-Abiad in Arabiâ (Sabatier! in h. Mus. paris. dupl. n. 53). (v. in h. un. itin. et Nees).

59. A. ACUMINATA, caule elato erecto ramoso ramisque sexangularibus pubescentia scabris, foliis oblongis acuminatis utrinque sed magis subitus dense pubescentibus basi iu petiolum brevissimum cuneatim desinentibus, spicâ terminali elongata pedunculatâ glanduloso-hirsutâ, bracteis bracteolisque lineari-

- acuminatis calyce paulo longioribus, laciinis calycis linearis-subulatis, capsula pubescente calycem æquante. ♂ In Abyssinîa (Schimper! l. c.). Tyloglossa acuminata Hochst. in diar. bot. ratib. 1843 p. 73 et in Schimp. it. abyss. nn. itin. sine num. Habitus A. majoris, sed folia crassiora et supra intencius viridia, corollæ majores, et palati nervus intermedius venas 6-7 turgescentes utrinque emittens, quarum infimæ ramosæ. (v. in h. un. itin. et Nees).
60. A. SUAVEOLENS, herbacea, ramis patentissimis diffusis 6-4-sulcatis subtilissimi strigilos-pubescentibus, foliis omnibus ovatis obtusis in petiolam brevem acute desinentibus utrinque dense strigilos-pubescentibus, spicis axillariis terminalibusque brevibus brevipedunculatis verticillatis densis basi foliosis, bracteis communibus oblongis obtusiusculis, partialibus bracteolisque lanceolatis obtusis pubescentibus ciliatis calyce longioribus, calycis laciinis brevibus lanceolatis ciliatis, corollæ vix bracteis longiore, capsula bracteas æquante calyce longiore. — Ad Djebel Ras in Arabiâ Felici (Botta! in h. Mus. paris. et Nees n. 203). Propinquæ A. minori, differt imprimis ramis longioribus fere dividatis, foliis conformatibus omnibus ovatis, tum corollæ vix  $\frac{2}{3}$  lin. longâ obscure purpureâ, quæ in A. minore 4-5 lin. longa, pallide purpurascens. Antherarum cornu longum. Capsula 3 lin. longa, brevi spatio a basi 4-spermâ. Odor plantæ gratus Anthoxanthi. (v. in h. paris. et propr.)
61. A. FLAVA, fruticosa, foliis lanceolato-oblongis, spicis terminalibus, floribus geminiis, bracteis lanceolatis obtusis. ♂ In Arabiâ (Forsk., Vahl!). Dianthera flava Vahl symb. 1 p. 5, en. 1 p. 139. Dianthera Americana × flava Forsk. descr. p. 9. Caulis teretiusculus; rami obsoletæ angulatæ, subpubescentes, lateribus lineâ exarati; articuli pollicares. Folia articulis duplo longiora, rare pilosa, petiolis brevis. Spica pedunculata, 2-pollicaris, subpilosa, densa. Bracteæ 2 sub singulo flore, obtusæ, subtus villosæ, unicâ majore longitudine floris. Calyx 5-fidus, villosus, laciinis subulatus (Vahl en.). (In symb. legimus: perianthium duplex! exterius profunde tripartitum, laciinis linearibus obtusis villosis, bracteis dimidio brevioribus, interius etc., ut supra). Corolla, flava ex Forsk. extus villosa, labium inferius 3-fidum, laciinis lateribus lanceolatis, intermedia oblongâ obtusâ. Anthera inferior aristata ex Vahl. An eadem ac A. minor Hochst.?
62. A. SULCATA, caule herbaceo sulcato, foliis cordato-ovatis, spicis terminalibus, floribus verticillatis, antherarum loculo infero calcarato. ♂ In Arabiâ Felici (Vahl). Justicia sulcata Vahl symb. 2 p. 13, en. 1 p. 112, Willd. sp. pl. ed. Dietr. I p. 390. Dianthera sulcata Vahl symb. 1 p. 4. Caulis 6-sulcatus, pubescens. Folia 1½ poll. longa, obtusa, subvillosa, petiolo longitude folii. Spica triplicaris, sessilis. Flores utrinque tres, inferiores remoti. Bracteæ 2 sub singulo verticilleto, lanceolatae, unguiculares, margine villosæ, longitudine floris. Aliæ duas bracteæ, sub singulo flore, lineares, villosæ. Calyx exterior (!) longitudine fere bractearum, 4-partitus, laciinis linearibus; interior dimidio brevior, 5-fidus, laciinis lanceolatis ciliatis. Corolla extus villosa, alba, venis purpureis picta. Antheræ purpureæ, inferior aristâ albâ. — In h. Vahl non exstat hæcce species, quæ sane maxime suspecta. Namque quoad calyceem duplimentum scriptum, Hypoësti generi tribuenda esset, nisi repugnarent antheræ biloculares et calcaratæ. Proximam equidem puto A. suaveolenti, et calycem exteriorem vel Hypoëstis floræ admixto tribuendum, vel rectius speciem hujusmodi calycis exortam bracteâ cum bracteolis binis una cum calyce eidemque adhærentibus obiter adspectis. In symb. l. c. pro: « perianthium 4-partitum », quod habet enum., legitur tripartitum.
63. A. PLICATA, herbacea, canæ basi repente pubescente, foliis ovatis vel ovali-oblongis brevipetiolatis, supremis oblongo-lanceolatis subsessilibus obtusiusculis cum mucronula in costis utrinque marginibusque pubescentibus, spicâ in caule ramisque terminali brevipedunculata tetragnâ verticillata densâ, bracteis oblongo-lanceolatis obtusis longe ciliatis bracteolisque linearibus longe ciliatis calyce longioribus, calycis laciinis puberulis triangulari-subulatis pu-

bescentibus coloratis, capsula glabrâ bracteis longiore.  $\mathcal{L}$ ? In Guinéa (Thonning). *Justicia plicata* Schum. pl. guin. in act. soc. phys. havn. 3 p. 31 n. 2. Vahl en. 1 p. 157 et h.!, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 397. A. majori accedit. Corolla lutea, 3 $\frac{1}{2}$  lin. longa, pubescens, labio superiore integro, inferiore trilobo sursum piloso, palato pennatim undulato-rugoso. Capsula 4 lin. longa. (v. in h. Vahl).

$\beta$ . *extensa*, caule altiore, articulis longis inferioribus glabris, superioribus hirtis, foliis ovatis ovalibusve. — In ins. Fernando Po, in littore, Novembri (Vogel! in h. Hooker).

$\gamma$ . *hirsuta*, tota hirsuta, flaccida. — Cum var.  $\beta$  (Vogel! in h. Hooker).

64. A. *PALUSTRIS*, caule simplici foliisque lanceolatis ad costas marginesque pubescens, floribus verticillato-subensis in spicam terminalem coeuntibus, lacinii calycis linearis-subulatis bracteolisque hirsutis.  $\odot$  Ad montem Cordofanum Arasch-Cool solo limoso juxta stagna. *Tyloglossa palustris* Hochst. in Florâ 1843 p. 72. Gendassura palustris Hochst. in Kotsch. it. nub. n. 80. Praecedentibus major, firmior. Caulis obsolete sexangularis. Folia 4 poll. longa, 7-8 lin. lata, ohtusa. Spica 4-pollicaris, pari foliorum ad basin. Bractae et bracteolæ lanceolatae, pilis longis sparsis ciliatae et hirsuta; communes propriis paulo latiores et longiores. Calyx bracteolis brevior, tenerior, lacinii acuminate hirtis. Capsula 5 lin. longa, dense pubescens. (v. in h. un. itin. et Nees).

65. A. *NUDA*, herbacea, caule ramoso adscendentem ramisque obtuse quadangularibus glabris, foliis oblongis utrinque attenuatis apice obtusiusculo longiuseule petiolatis glabris in costâ puberulis, spicâ terminali pedunculatâ verticillis subsexforis, rhachi velutino-pubescente, bracteis infimis lanceolatis majoribus, reliquis lanceolato-linearibus calyce paulo longioribus bracteolisque linearibus paulo brevioribus obtusiusculis lanuginoso-ciliatis, lacinii calycis linearibus immarginatis puberulis, capsula glabrâ calyce longiore.  $\odot$  Djinnat in Arabia Felici (Botta! in h. mus. paris. n. 205). Habitu accedit ad A. majorem, sed differt glabritate, etc. (v. in h. paris. et ex eo in h. Nees).

66. A. *PETIOLARIS*, caule adscendentem subhexagono strigiloso-pubescente, foliis ovalibus utrinque subtilissime puberulis 3-4-pollicaribus obtuse acuminatis in petiolum longum decurrentibus, spicâ bipollucari terminali verticillis approximatis, bracteis lanceolatis, bracteolis linearibus calycem æquantibus, corollâ 6-lineari, palato bullato-rugoso, seminibus angulatis tuberculatis.  $\mathcal{L}$  In Africâ australi (Drège!), ad sinum Delagoa Africæ (Forbes! in h. Bentham). *Justicia petiolaris* E. M.! cat. pl. Drég. a. 1837. *Athlianthes* Endl. gen. mant. 2 p. 63? Folii latioribus a reliquis differt. (v. in h. Drège!, Bentham, Hooker).

$\beta$ . foliis apice minus attenuatis, floribus inferioribus axillaribus sessilibus alternis ramulo oppôsito. — In Promontorio B. Spei, in humidis districtus George, Uitenhage et Albany (h. Hooker!). Flores rubri. Ad sect. 1 hæc forma accedit, et cum A. mollissimâ congruit. (v. in h. Hooker).

67. A. *FASCIATA*, caule erecto sexangulari ramoso pilis retrorsum adpressis strigoso, foliis ovato-oblongis ovatis obtusis longiusculae petiolati laxe hirsutis, spicâ terminali pedunculata elongata basi interruptâ hirsutâ, bracteis oblongo-lanceolatis apice attenuatis, bracteolis linearibus calycis lacinii subulatis longioribus, labio corollæ inferiore trivittato.  $\mathcal{L}$  In Africâ australi (Drège!). *Justicia fasciata* E. M.! cat. plant. Drég. a. 1837. Distinctissima corollæ labio inferiore trilobo, disco rugoso lineis tribus latiusculis longitudinalibus in sicco specimine nigris in vita probabiliter violaceis notato. Folia formâ et magnitudine varia; infima et plantæ luxuriantis ovata, 1-2 poll. longa,  $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, basi obtusa, vel in petiolum  $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$  poll. longum brevissime acutata. Strigæ caulis flavicantes. Spica caulis terminalis 3-4 poll. longa. Corolla circiter trilinearis. Capsula 2 $\frac{1}{2}$  lin. longa, pubescens. Semina grosse tuberculata. (v. in h. Drég. et Hooker).

68. A. CARTHAGENENSIS, berbacea, caule erecto inferne tercti lœvi glabro apice tetragono, foliis ovalibus aut oblongis acuminc obtuso basi cuneiformibus petiolatis, spicâ terminali compositâ, partialibus brevibus capituliformibus subsessilibus, bracteis bracteolisque conformibus obovato vel oblongo-cuneiformibus ciliatis calycis lacinis lanceolatis longioribus, corollæ labii inferiores disco saturate purpureo.  $\mathcal{U}$  In Carthagena. Justicia Carthagensis Linn. sp. pl. 1663, Rœm. et Sch. syst. 1 p. 153.

$\alpha$ . foliis oblongis basi valde attenuatis subinde etiam magis ovalibus, bracteis bracteolisque angustioribus oblongo-linearibus. — In Mexico (Hänke!). Justicia Carthagensis Jacq. am. p. 5 t. 5. (v. in h. Hänke).

$\beta$ . foliis ovalibus brevioribus latioribusque, bracteis bracteolisque obovato-cuneatis petiolisque pubescentibus et ciliatis. — Cum præcedente, ad Guayaquil (Sinclair!), Guatemala (Skinner! in h. Hooker et Benth.), St. Vincent (Guilding! in h. Hooker). Justicia Carthagensis bot. reg. t. 797. Justicia spathulata Klotzsch in h. gen. berol.

$\beta^*$ . glabra, foliis et bracteis ut in  $\beta$ , sed glabris vel bracteis vix ciliatis, spicâ breviro. — In sinn Itonsecá (Sinclair! in h. Benthem).

$\beta^{**}$ . minor, subglabra, foliis omnibus brevissime petiolatis, inerioribus basi obtusis subovatis. — In Peruvia (Mc Lean! in h. Hooker).

### C. Spicæ axillares graciles, paucifloræ.

69. A. LEPTOSTACHYA, caule herbae piloso quadrisulco a basi ramoso, foliis ovali-oblongis obtusis basi acutis glabriusculis lineolatis, petiolis hirsutis, spicis axillaribus oppositis folia suhæquantibus pedunculatis gracilibus paucifloris, floribus secundis, bracteis bracteolisque setaceis calyce plus duplo brevioribus hujsusque lacinis linear-setaceis glabris, corollæ parvæ palato trituberculato.  $\odot$  Ad Djennat in Arabiâ Felici (Botta! in h. mus. paris. n. 204. Planta spithamea et quod excedit, patulo-ramosa. Corolla 1½ lin. longa, lutea?; labium superius bidentatum, inferius trilobum lobis obtusis. Capsula 2½ lin. longa, superne turgidula, depressa, pubescens, membranacea. Semina alveolata. (v. in h. paris. et ex eod. in h. Nces).

70. A. ANAGALLOIDES, herbacea, radice multicauli, caulis simplicibus adscendentibus subpuberulis, foliis ovalibus obtusiusculis basi acutâ in petiolum brevem decurrentibus glabris laxe ciliolatis, spicis axillaribus alternis pedunculatis folio longioribus gracilibus biforis, bracteis bracteolisque setaceis calyce duplo brevioribus hujsusque lacinis linear-subulatis glabris, corolla parvæ palato ruguloso.  $\mathcal{U}$  In Africâ australi ad Apjesrivier (Burchell! in h. Hooker). Differt ab A. leptostachya toto habitu, foliis minoribus 4-6 lin. longis, corolla (in sicco) miniatâ, etc. Fructus ut in illâ. Spicæ juveniles recurvæ. (v. in h. Hooker).

71. A. ANSELLIANA, glaberrima, caule basi repente, foliis lanceolatis obtusiusculis in petiolum basi attenuatâ decurrentibus, spicis axillaribus oppositis folia æquantibus pedunculatis gracilibus paucifloris floribus secundis, bracteis bracteolisque subulatis calyce multo brevioribus hujsusque lacinis linear-subulatis margine membranaceis, corollæ parvæ palato basi ruguloso.  $\odot$  Ad prom. Palmas, locis apertis (Ansell! in h. Benth., Vogel in h. Hooker). Similis A. leptostachya, sed differt foliis angustioribus, calyce minore, glabritie cæt. Corolla alba, palato rubro-punctato. (v. in h. Benth. et Hook.).

72. A. HOOKERIANA, caule quadrangulari juvenili pubescenti-scabro adulto glabro subsexangulari ramoso flexuoso inferne radicante, foliis lanceolatis obtusis in petiolum brevem cuneatim decurrentibus, spicis axillaribus foliis longioribus flexuosis paucifloris, floribus infimis oppositis, bracteis bracteolisque spathulatis, his angustioribus, corollæ parvæ palato cristato.  $\mathfrak{z}$  In ins. Ceylan (h. Hooker!). Folia fere Gendarussæ vulgaris. Caules cum ramis et spicis valde flexuosi. Corolla 3-4 lin. longa, palato in medio longitudinaliter tumente et muricato-cristato. (v. in h. Hooker).

73. A. *ORBIGNIANA*, pubescenti-hirta, foliis ovato-oblongis apice attenuatis e basi rotundata cuneiformibus, petiolo margine aequali, spicis axillaribus oppositis trifidis, bifidis secundifloris paucifloris, floribus solitariis sessilibus bracteis bracteolisque subulatis calyce brevioribus, calycis quinquepartiti aequalis laciniis linearis-subulatis hirsutis, antherarum loculis valde distantibus, inferiore calcinato, corollæ brevis ventricosa labio inferiore trilobo palato ovali pectinato-venoso.  $\mathcal{L}$ ? In Boliviæ prov. Chiquitos (d'Orbigny! in h. Mart.). *Rhytidlossa pectoralis* N. ab E! in h. Hænk. *Rhytidlossis quibusdam*, v. c. leucophloæ et pectorali subsimilis est. Caulis paniculatus. *Labium superius ovatum*, cuspidatum, trinervé. Color corollæ purpureus. (v. in h. Mart. et Hænke).  
*?3. minus pubescens, foliis longioribus. In Mexico (Moritz!) iu h. gen. berol.)*

D. *Spicæ axillares densiores.*

74. A. *EUSTACHYANA*, caule herbaceo frutescente teretiusculo glabro, foliis oblongis in acumen obtusiusculum attenuatis basi acutis petiolatis glabris in margine scabriusculis, pedunculis axillaribus oppositis folio brevioribus capitulo cymosove-tri-plurifloris, floribus infinitimis oppositis, inflorescentia terminali subinde magis elongatâ et racemosâ, bracteis bracteolisque linearis-spatulatis acutis scabris calyce brevioribus, calycis laciniis linearis-lanceolatis acutis scabris, corollæ labii inferioris disco rugosulo, superiore labio bidentato.  $\mathcal{L}$   $\delta$  In collibus apricis aridis insulae S. Eustachii (Jacquin), in Montserrat (Ryan! in h. Vahl), Antigua (Nicholson! in h. Hooker). *Justicia Eustachiana* Jacq. pl. am. 1 p. 4 t. 4, h. Willd. n. 332! (excl. ch. Vahl, ex h. Swartz). *Justicia Ryani* Vahl ecl. am. 1 p. I, en. 1 p. 14 et h., K. et Sch. syst. 1 p. 157, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 400. Pedunculi in aliis biflori, scil. floribus duobus oppositis, ramo intermedio abortivo, prædicti et subcapitati, modo, ramo medio perfecto, et in racemum alterniflorum abeunte, 3-7-flori. Capsula fere 6 lin. longa. *Justicia Eustachiana* Vahl diversissima sane a J. *Eustachiana* Jacq. nobis est *Dactylostegium Portoricense*. (v. in h. Vahl, Willd. et Hooker).
75. A. *LONGIFOLIA*, caule tetragono scabriusculo, foliis lanceolatis in acumen obtusum longe attenuatis basi acuto in petiolum mediocrem angustum desinentibus in costis marginaque scabris, spicis axillaribus geminis solitariisve petiolo subduplo longioribus pedunculatis densis pubescenti-scabris, floribus alternis, bracteis lanceolatis acutis calycis æquantibus, oppositâ minore sterili, bracteolisque subulatis calyce brevioribus adpressis, corollâ parvâ viscidulopubescente.  $\mathcal{L}$  In insula Mahé (Commerson! in h. Vahl, a Thouin dat.). *Justicia longifolia* Vahl symb. 2 p. 4, en. 1 p. 124 et h!, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 338. Folia inferiora 6 poll. longa, vix 7 lin. lata, petiolo  $\frac{2}{3}$  lin. longo. Pubescentia, spicas iuvestiens, viscidula, nonnihi canescens. Corolla 2 lin. longa, calyx linearis-subulato duplo longior; antherarum calcar rectum, obtusum. Capsula 2 $\frac{1}{2}$  lin. longa, oblonga, acuta, depressa, glabra, pallida. (v. in h. Vahl).

76. A. *TRISTIS*, caule erecto acute quadrangulo hirto foliis ovalibus obtuse brevicuspidatis in petiolum longum cuneatim desinentibus subtus costisque supra subtilissime pubescentibus, spicis axillaribus folium subæquantibus pedunculatis, floribus 3-1 oppositis, bracteis bracteolisque ovato-lanceolatis calyce brevioribus laciniisque calycis linearis-subulatis nervosis scabris, capsula longe unguiculata pubescente fuscâ.  $\mathcal{L}$  In insula Fernando Po silvis, locisque aperiis ad prom. Palmas, Novembri (Roscher! in coll. Vogelii h. Hooker). Planta speciosa. Caulis subsimplex, 3-4 ped. alt. Folia cum petiolo sesquiplicari hirto 10-11 poll. longa, 3 poll. lata, firma, nitida. Calyx 4 lin. longus. Corolla calycis longitudine, fusco-lurida, pubescens, labium superius integrum formicatum; inferioris laciniæ obtusa, laterales lineares, media oblonga; palatum obtuse biplicatum. Antherarum loculi parum obliqui, inferior demissior basi brevimucronulatus. Capsula 8 lin. longa. (v. in h. Hooker).

77. *A. GLANDULOSA*, caule herbaceo glabro obtuse tetragono sulcis oppositis latis alternatim exarato, foliis oblongis glabris acuminatis irregulariter repandis basi acutâ in brevem petiolum plus minus decurrentibus, inferioribus ovali-oblongis superioribus lanceolatis, summis in bracteas decrescentibus, spicis axillaribus in terminalē tri-dichotomam coeuntibus virgatis subfastigiatis elongatisque, floribus oppositis distantibus, bracteis lanceolatis calyce longioribus bracteolisque calycem æquantibus calycisque laoiniis linear-lanceolatis piloso-glandulosis, corollæ tube brevissimo palatoque convexo pectinatum venoso amplis.  $\mathcal{L}$  In Ilhâ do Pao insulâ Brasilie (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 5007. Tyloglossa glandulosa N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 117. Justicia glandulosa Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 5007. Caulis erectus, firmus, plurium pedum altitudine. Folia superiora 3 poll. longa, 1- $\frac{2}{3}$  poll. lata, suprema et ramorum florentium infima 9-6 lin. longa, lanceolata. Spicæ 7-9 poll. longæ, erectæ, articulis rhacheos calycibus cum bracteis triplo saltem longioribus, inferioribus glabris, superioribus pilis glandulosis raris conspersis. Bracteæ calyce paulo longiores, parce glandulosæ, bracteolæ et calyces 3 lin. longæ, dense glandulosæ. Lacinia calycis supera reliquias  $\frac{1}{4}$  minor angustiorque. Corolla (purpurea?) 8-9 lin. longa. (v. in h. vindob. et Hooker.)
78. *A. PILOSA*, hirsuta caule basi repente superne patentि-hirsuto, foliis ovatis in acumen obtusiusculum attenuatis basique acutâ in petiolum mediocrem hirsutum subdecurrentibus, spicis axillaribus oppositis sessilibus simplicibus folio brevioribus terminalibus geminis, bracteis fertilibus orbiculato-spathulatis cuspido-lanceolatis alternis approximatim alteraque in longiorem petiolum attenuatis, sterilibus dorsalibus bracteolisque linearibus longe ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Peruviâ ad Vitœ (Ruiz! in h. gen. berol.), Juan del Rio (Matthews n. 1524 in h. Hooker). Dianthera pilosa Ruiz! n. 29, Tafalla! in h. gen. berol. (v. in h. berol.)
79. *A. LINDENIANA*, caule geniculato adscendente scabriusculo, foliis ovali-oblongis acuminatis in petiolum acute desinentibus glabris, costâ supra petioloque hirtulis, spicis axillaribus alternis oppositivis brevipedunculatis capituliformibus paucifloris, bracteis ovatis in petiolum contractis acutiusculis subciliatis, bracteolis lanceolatis calyce paulo longioribus ciliatis, calyce pubescenti-scabro subciliato laciñis oblongo-lanceolatis setaceo-cuspidatis, corollæ palato amplo venoso-reticulato, antherarum loculis dorso hirtis.  $\delta$  In Novâ Grenadâ (Linden! n. 1525 in h. Hooker). Corolla pollicaris, pallida. Capsula pubescens, omnino ad typum generis formata, 6 lin. longa, libera, specimini adjecta, nescio an revera ad id pertineat, quare dubius tantum huc refero. Calyce solito latiore a reliquis abludit, cæterum *A. Eustachyanæ* et pilosæ haud est incongrua. (v. in h. Hooker.)
80. *A. CUNEIFOLIA*, foliis obovato-ellipticis acutiusculis basi cuneiformi sessilibus glabris, spicis axillaribus oppositis simplicibus folio brevioribus, bracteis orbiculato-spathulatis ciliatis.  $\mathcal{L}$  Ad viam Felisbertiam, Decembri (Max. Princ. Wied.! in h. Mart. et Nees), in prov. Bahiensi (Blanchet! n. 2395 in h. Moricand.). Amphiscopia cuneifolia N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 130. Justicia cuneiformis N. et M. in nov. act. ac. nat. cur. 11, 1 p. 58, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 409. Variat foliis minoribus (3-4 poll. longis) basi mediocriter attenuatis, et majoribus (7-8 poll. longis) basi in petiolum angustiorem longioremque attenuatis; his etiam spicæ sunt longiores et bracteæ omnino rotundatae, illis spicæ breviores sunt bracteæque subinde mucronulatae. Antherarum calcar saepè reflexum loculoque retro adpresso. (v. in h. Maxim. Princ., Mart., Nees, Moric.).
81. *A. MARTIANA*, foliis oblongo-ovalibus in petiolum cuneiformi-attenuatis acutis bracteisque orbiculato-spathulatis rotundatis glabris, spicis axillaribus oppositis simplicibus folio brevioribus.  $\mathcal{L}$  In silvis Japurensibus (Martius!), in silvis prope Castel-Novo, Novembri (Riedel! in h. acad. petrop. n. 513)

*Amphiscopia Martiana* N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 130. Differt imprimis ab A. cuncifoliâ foliis petiolatis nec cuneiformi-sessilibus et bracteis margine nudis. Bracteolæ calyce breviores. (v. in h. petrop.)

82. A. *WYNAADENSIS*, fruticosa, caule tereti lœvissimo lineato, foliis oblongis utrinque attenuatis supra substrigosis, inferioribus crenato-dentatis, spicis axillaribus patentibus nutantibus basi diphyllos glanduloso-pubescentibus, floribus solitariis oppositis, bracteis ovatis deciduis bracteolisque linearisubulatis calyce brevioribus. ♂ In India orientali. *Gendarussa Wynnaadensis* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 104. *Justicia Wynnaadensis* h. Heyn.! Wall. cat. n. 2474 et h. Wight. Wall. cat. n. 2496 c. *Justicia lineata* Wall. cat. n. 2486. Rami crassitie pennæ gallinaceæ. Folia 4-5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, oblonga, obtuse denticulata, supra minute punctulata et strigulis paucis appressis pressim in ambitu inspersa; superiora minora 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longa, fere sessilia, integerrima. Bracteæ appressæ, lineam longæ, ovatæ, supremæ angustiores; inferioris paris quandoque lanceolatae reflexæ. Calyces tres lin. longi, glanduloso-pubescentes. Bracteolæ subulatæ, calyce  $\frac{1}{4}$ -dimidio breviores. Corolla 4 lin. longa, pubescens, purpureo-venosa, quasi anguste campanulata, labiis erectis. (v. in h. Wallich, Wight, etc.)

E. Spicæ in caule ramisque terminalies vel ex axillaribus terminalies.

83. A. *FELISBERTIANA*, fruticosa, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis in petiolum longum cuneiformi-attenuatis glabris subcoriaceis, spicis secundifloris axillaribus in terminalem confluentibus foliis brevioribus, bracteis orbiculato-ovatis obtusissimis basi in petiolum brevem contractis venoso-nervosis ciliatis, corollæ labio superiore integrissimo, inferioris laciniis oblongis obtusis pubescentibus, plicâ ad basin staminum dentatâ. ♂ In viâ Felisbertiâ Brasiliæ, Januario (Max. Princ. Wied.). *Orbtotactus Felisbertianus* N. ab F. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 132. *Justicia Carthaginensis* N. et M. in nov. cat. ac. nat. cur. 11' p. 56 (excl. synn.). Caulis 3-4-pedalis. Folia inferiora 8-9 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, superiora minora, omnia subtus lineolis punctiformibus aspera. Spicæ axillares subsessiles, ovales  $1\frac{1}{2}$  poll. longæ, aebeunt in spicam terminalem oblongam. Bracteæ violaceæ, 6 lin. longæ, 4 lin. latæ, e basi rotundatæ in formam petioli lin. longi latiusculi contractæ, longis ciliis cinctæ. Bracteolæ calyce paulo longiores, lanceolatae lineares, longe ciliatae. Calycis laciniæ coloratae. Corolla 8 lin. longa, intense violacea. Capsula fusca, glabra,  $3\frac{1}{2}$  lin. longa. (v. in h. Maxim. Princ., Mart. et Nees).

84. A. *UMBROSA*, fruticosa, spicis secundifloris axillaribus in terminalem confluentibus, vel solâ spicâ terminali subsessili brevi simplici, vel bi-trifida, bracteis orbiculatis obtusissimis in petiolum longum attenuatis pubescenti-glandulosis bracteolisque linearibus calyce longioribus longe ciliatis, foliis oblongo-lanceolatis obtusis in petiolum brevem acute desinentibus glabris costis utrinque rubiginoso-scalbris, corollæ labio superiore emarginato, caule basi repente adscendente ramosissimo, ramis quadrisulcatis viscido-pubescentibus pubescenti reversâ brevi. ♂ In Brasiliæ umbrosis, loco non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 163 et 164). *Orthotactus glandulosus* N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 132. Differt ab A. *Felisbertianâ*, cui quoad inflorescentiam et bracteas similis est, bracteis cuneiformi-longe petiolatis, foliis minoribus, caule tenuiore dichotomo-ramosissimo basi repente. (v. in h. berol.)

85. A. *DIVERGENS*, herbacea, spicis in caule ramisque terminalibus basi sub-compositis, bracteis ovato-oblongis subrhomboidibus utrinque attenuatis et in petiolum angustatis pubescentibus, foliis ovatis obtusis vel in acumen obtusum attenuatis basi acutiusculâ in petiolum mediocrem desinentibus, ramis divergentibus. ♀ In Americâ merid. (Swartz! in h. DC.). Caulis et folia fere glabra, summitas caulis quinquefida in nostro specimine. Bracteolæ lineares longitudine calycis. Anthere loculus inferior muticus. (v. in h. DC.)

86. *A. ORIGANOIDES*, foliis ovatis acutiusculis in brevem petiolum acute desinentibus obiter repandis bracteisque orbiculatis obtusissimis sessilibus scabris margine nudis, spicis terminalibus geminis ternis subsessilibus. ♂ Ad Havanam. (Greene! n. 17 in h. Hooker). Caulis videtur valde ramosus. Rami tetragoni, alterni angulis strigiloso-soabri. Folia circiter pollicaria. Bracteoleæ lanceolatæ, obtusaæ, calyce subulato scabro longiores. Corolla 3<sup>½</sup> lin. longa. (v. in h. Hooker).
87. *A. SCABRA*, fruticulosa, caule novello pubescenti-strigoso, foliis oblongis utrinque attenuatis obtusiusculis basi cuneatâ in petiolum brevem desinentibus glabris, spicis terminalibus fasciculato-ternis quinque brevibus confertis oppositifloris folio brevioribus, bracteis ovalibus mucronato-acutis longe ciliatis, spicæ media latioribns subsessilibus æquilateribus, spicarum lateraliū inaequaliteribus in petiolum attenuatis, antherarum loculis recta distantibus infero calcarato. ♂ Ad Cumana (Füncke! n. 592 in h. Hook.). Bracteæ spicarum lateraliū, quæ modo solitarie modo geminæ ex eodem angulo oriuntur, valde inaequaliteres, altero latere 3-nervis costalibus gaudent, altero uno nullove omnino. Corolla semipollucaris. (v. in h. Hook.).
88. *A. AURICULATA*, caule herbaceo foliisque oblongo-ovalibns in acumen obtusum attenuatis basi cuneatâ in petiolo longo auriculatum desinentibus utrinque lineolatis glabris thyrsi terminali elongato nudo subverticillato, ramis oppositis ad basin usque bipartitis simplicibusve ramulisque secundifloris dimidiato-conicis intermedio brevioribus, bracteis bracteolique calyce longioribus spatulato-cuneatis obtusis subtruncatis glanduloso-ciliatis. ♂ In silvis Macabé Brasiliæ, Junio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 792). Bolopone auriculata N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 138. Singularis est foliorum basi in petiolo hinc 6-8 linearnm spatio nudo abrupte desinente et margine utroque ita reflexa ut auricula utrinque parva promineat. Rhachis pubescens-scabra, canescens. «Caulis suffruticosus? 2-3-pedalis. Flores ex viridi albidi, fuscō punctulati » (Riedel). (v. in h. petrop.)
89. *A. VENTRICOSA*, fruticosa, articulata, foliis oblongis glabris spicis in caule ramisque terminalibus subverticillifloris, bracteis universalibus decussantibus ovalibus orbiculariis ciliatis, propriis subulatis parvis, labio superiore plana. ♂ In Indiâ orientali. Caulis teres, glaber. Folia 4-5 poll. longa, 1<sup>½</sup> lata, acuminata, petiolo brevi canaliculato. Spicæ 2-3 poll. longæ, non admodum dense, basi bifoliatae. Bracteæ 4-5 lin. longæ, oblongo-ellipticæ, in formâ β\*\* apice rotundatae, in formâ β\* contra mucronato-acutæ, subpubescentes, minute ciliolatae, venosæ, virides vel purpurascentes. Flores subterni, laterales tribracteati, bracteis linearisubulatis, medius ebracteatus. Corolla 4-5 lin. longa, pubescens, luteola?, purpureo-lineolata et reticulata.
- α. bracteis ellipticis, foliis oblongis. — In montibus Sillet (Wallich!), in Amherst (Wall!). Justicia fragilis Wall. cat. n. 7174. (v. in h. Wallich).
- β. bracteis orbicularibus, foliis ovali-cuneiformibus. — In ripâ fluminis Attrani Martabanæ (Wall!), Kogun ? (idem!), in hort. bot. calc. e Chinâ introducta a J. Reeves. Justicia ventricosa Wall. pl. as. rar. 1 p. 80 t. 93, cat. n. 2436, Hook. bot. mag. n. 2766, Spr. fil. suppl. p. 1, Willd. sp. pl. ed. 2 v. 1 p. 366 (inter species loculis parallelis?) (v. in h. Wallich et Hooker, spec. cult.)
- β\*. bracteis mucronato-acutis (Carey! in h. Hooker et W. Arnott.). (v. v. c.)
- β\*\*. bracteis obtusissimis; ex horto (Edgeworth).
90. *A. VASCULOSA*, fruticulosa, caule inferne tereti repente apice adscendente, foliis ellipticis oblongo-ellipticis utrinque attenuatis supra lineolatis, spicis terminalibus compositis ramis secundis, floribus oppositis, bracteis bracteolique calyce paulo brevioribus ovato-lanceolatis. ♂ In Indiâ orientali in montibus prov. Sillet (Wall!), Assam (Griffith! in h. Hooker). Vidi etiam exempla culta ex hort. bot. calc. Justicia vasculosa Wall. cat. n. 2469 a, b. Ruellia

*rivinæfolia* Wall. cat. n. 2413 (exempla flore imperfectiore). Fruticulus Rivinæ levius habitu. Folia 3-3<sup>½</sup> poll. longa, unum poll. lata, acuminata, inferiora longe petiolata, basi attenuata, integriflora, glabra, margine scabra. Bracteæ tam infra ramos quam florales circiter linearis, ovato-lanceolatae, acutæ. Calyx vix linea longior, campanulato-patulus, ultra medium quinquefidus, lacinia linearis brevioribus acutis æqualibus. Bracteolæ ovatae vel ovato-lanceolatae, acutæ, calyce breviores. Corolla 4-5 lin. longa, pubescens, alba. Stamina corollam æquanta; filamenta glabra; antherarum loculi semiovales, granulosi, albi. (v. in h. Wallich et Hooker).

91. A. *ADENOSTACHYA*, canæ herbaceo glabro quadrangulari, articulis superioribus apice compresso-ancipitibus foliis oblongis acutis basi cuneiformi in petiolum usque ad basin fere decurrentibus glabris, spicæ terminali (axillariæ?) gracili pubescenti-glandulosa simplici trifidâ, floribus oppositis, bracteis bracteolatisque subulatis æqualibus calyce brevioribus, calycis lacinia linearibus brevibus, corollæ palatae argute marginato. *Tocaiæ* in Brasiliâ (Schott! in h. palat. vindob. n. 4752), in loco incerto Brasiliæ (Sellow! in h. reg. berol. n. 148). *Tyloglossa adenostachya* N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 117. *Justicia micrantha* Pohl! ic. in b. palat. vindob. n. 5752. Corolla parva, 3 lin. longa, pallida, labio superiore integro, inferioris trifidi laciniaæ æqualibus oblongis obtusis planis; discus labii linearis-elevatus marginibus gibbi acutis oblique adscendentibus, disco canaliculato oblique pectinatum striato. Caulis pluripedalis geniculis obcuneiformibus compressis veluti marginatis. Folia 7 poll. longa, 2 poll. lata, cuspidato-acuta, basi cuneiformi longa subinde inæquali et undulata vel sessilia vel in petiolum brevissimum glabrum rotundato-desinentia. (v. in h. vindob. et berol.)

92. A. *CHRYSOTRICHOMA*, fruticosa, flavo-lanata, caule erecto simplici coarctatoe ramoso, foliis confertis ovatis subcordatis acutis sessilibus, spicæ terminali simplici quadrangulari, bracteis ovatis bracteolatisque oblongo-lanceolatis mucronulatis calyce longioribus, corollæ tubo brevi, labii inferioris trilobi disco inflato pectinato-venoso. *J* In Brasiliæ prov. Goyaz: in viâ a Rio Bagagem ad Cachoeira (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 1961). *Tyloglossa chrysotrichoma* N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 116. *Justicia chrysotrichoma* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 1961. Species lanâ seu villis in sicco saltem flavis conspicua. Caulis obtuse tetragonous nodis approximatis haud incrassata. Folia  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{4}$  poll. longa 1 $\frac{1}{4}$  poll. et quod excedit lata, basi rotundata emarginata sessilia, subtus lanâ longiori vestita, costâ ramisque costalibus valde tumentibus instructa. Spica 3 poll. longa, sessilis, densa. Bracteæ et bracteolæ 6-7 lin. longæ, valde lauate. Calycis lacinia lanceolatae, acuminatae, lanato-sericeæ, 5 lin. longæ. Corolla purpurea, 9 lin. longa, pubescens. (v. in h. vindob.)

93. A. *DECUSSATA*, fruticosa, caule tetragono pubescenti-hirto decussatim ramoso, foliis ovatis in petiolum attenuatis glabriusculis supra linearis, spicis terminalibus elongatis interruptis dense pubescentibus, floribus glomerulato-vorticillatis, bracteis parvis spathulatis, bracteolis linearis-lanceolatis, corollæ ringentis labio inferiore convexo, antherarum loculo utroque calcarato. *J* In Indiâ oricatali: in regione supra Rangoon sitâ (Roxb.), Prome (Wallich!), ad Amherst et in ripâ Attran fluminis (Wall.!). *Gendarussa decussata* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 104, *Justicia decussata* Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 128, Roem. et Sch. mant. 1 p. 141, Willd. sp. pl. ed. 2, 1 p. 402, Wall. cat. n. 2476 a-d. Rhachis spicarum dense molliterque villosula. Bracteæ fasciculis florum subjectæ, subrotundæ, petiolatae ideoque subspathulate; superiores lanceolatae, demum deciduae. Bracteolæ, linearis-lanceolatae calycisque laciniaæ obtusiusculæ. Flores in singulo fasciculo pedicellato 3-6 plures. Antheræ bicarcaratae. Corolla carnea, pubescens. (v. in h. Wallich, spont. et cult. ex hort. calcutt.)

94. A. *SPICATA*. fruticosa, glabra, spicæ terminali densâ, rhachi crassâ, bra-

cteâ ovatâ margine membranaceâ obtusâ longitudine calycis, bracteolis subulatis brevissimis, foliis lanceolato-cuneiformibus obtusis in petiolum attenuatis. ♂ In arenosis montosisque circum flumen Omlahi ad sinum S. Augustini insulae Madagascar (Bojer! in h. DC.) Lasiocladus spicatus Bojer! l. c. Caulis albidus, teres, dichotomus. Folia circiter bipanicaria, 2 lin. lata, evenia. Spica brevipedunculata, bipanicaria. Bractæ late, subitus biventricosæ. Calyx lineâ paulo longior, glaber, rigidulus, lacinias lanceolatis. Capsula aspera, 6 lin. longa. (v. in h. DC.)

95. A. BOERHAAVIÆFOLIA, fruticosa, caule tereti albo-tomentoso, spicis terminalibus bifidis subtrichotomis glandulosis, floribus secundis, bracteis bracteolisque subulatis æqualibus calyce brevioribus, foliis subrotundis integerimis. ♂ In arenosis aridis ad sinum Sti Augustini ore austro-occidentalis insulae Madagascar (Bojer! in h. DC.) Lasiocladus boerhaaviæfolius Bojer! l. c. Rami trichotomi cum petiolis albo-tomentosi, subleprosi. Folia ranularum unguicularia, paulo majora, ovato-cordatoe subrotunda, obtusa, asperula. Pedunculi inserti caulis et ramorum apicibus, graciliores, sicut bractæ, calyces et fructus setulis brevissimis capitatis obsiti. Calyces parvi. Corolla 4-5 lin. longa, glandulosa. Calcar antherarum longum, incurvum. Capsula 2-4-sperma, parva. (v. in h. DC.)

96. A. SPHÆROSPERMA, herbacea, caule erecto angulato superne tetragonono foliisque ovato-oblongis basi acutiusculis apice paulo magis attenuatis obtusiusculis glabris, spicis axillariibus oppositis in terminalem thyrsoidem confluentibus sessilibus, bracteis lanceolatis acuminatis bracteolisque linearibus calyce longioribus pubescenti-scabris, calycis lacinias lanceolato-subulatis tenuioribus, seminibus subglobosis lœvibus. ♀ In Caribæis, St Vincent (Anderson! in h. Vahl et Bentharn ex h. Forsyth). Justicia sphærosperra Vahl symb. 2 p. 3, en. 1 p. 123 et h.!, Willd. sp. pl. 1 p. 86, ed. Dietr. 1 p. 379. Justicia Carthagensis h. Benth.! ex h. Forsyth (nec Vahl). Justicia vulgaris Bert. in R. et Schult. syst. veg. mant. 1 p. 135, Wild. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 390. Corolla pollicaris, glabra, labii inferioris lacinias oblongis. Anthera-rum loculi oblique unus super altero positi; inferior basi obtuse corniculatus, hinc locus inter species monantheras dictas erroneus, quod quomodo factum sit elucet e specimine h. Vahliani, cui flores desunt. Specimina h. Benthamiani, ex eodem (Forsythiana) proiecta, floribus gaudent licet minus perfectis. Capsula 8 lin. longa, basi sterili rugosâ. Semina globoso-compressiuscula, pallida. (v. in h. Vahl, Bentharn et Hooker).

### *Species dubiae hujus generis.*

97. A. SUBSERRATA, caule erecto ramisque glabris leniter quadrangularibus, foliis lanceolatis acuminatis lucidis obtuse serratis serraturis distantibus parum conspicuis, racemis terminalibus trifloris, floribus sessilibus, bracteis lanceolatis, calycis lacinias lati, corollæ labio superiore attenuato emarginato, inferiore lato trilobo lobo medio latiore, palato tumido, antheræ loculis discretis. ♂ In Bayang securis flumen Maghinao, rara. Dianthera subserrata Blanco fl. de philipp. p. 16. Frutex altitudine humana, colore caulis et foliorum livido (morado), odoris ingratii. Blanco l. c.

98. A. VELASQUEZII, foliis late ovatis acuminatis longe petiolatis subrepandis, racemo composito densissimo racemuloso-verticillato, floribus ramosissimis, corollis falcatis, labiis conniventibus. ♀ In Guatimalâ (Velasquez). Justicia Velasquezii Bertol. florul. guatimal. in nov. comment. acad. scient. inst. bonon. 4 p. 406. Vulgo flor amarillo. Caulis obtuse tetragonous, insculptus sulco prope singulum angulum, pubescens-velutinus, opposte ramosus. Folia opposita, late ovata, acuminata, basi angustata, subrepanda, tenuissime puberula præsertim in nervis et venis, 3-4-pollicaris sine petiolo. Petioli supra leviter canaliculati, pubescens-velutini, majores subpollicares. Racemi terminales et axillares, crassi, densissime floriferi, racemulî partialibus

oppositis vix pedunculatis, ut flores dense verticillati appareant. Flores in quovis racemulo et verticillo valde numerosos. Bracteæ primariae oppositæ sub racemulis, ovatae, acutæ, puberulæ, partiales ad divisiones racemuli lanceolatae calyce longiores. Calyx exiguis, quinquefidus, laciniis lanceolato-linearibus acuminatis puberulis. Corolla tubulosa, gracilis, falcata, pollicaris, lutea; extus tota puberula. Labia brevissima, æqualia, conniventia, ut corolla videatur unilabiata, superius integrum, obtusum, inferius trilobum. Genitalia inclusa, corollam subæquantia. Antheræ cordato-oblongæ. Stigma emarginatum. Pubescentia planta fulva. Sub dubio nomine Dicliptera frondosæ dedit Velasquezius, sed non est (Bertol.).

CXXI. GENDARUSSA Rumph., N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 103, Wight ic. 2 t. 468, Lindl. intr. ed. 2 p. 285. b.—Genderussa Endl. gen. p. 705, Meissn. gen. p. 296 (205). — Justiciae spec. Linn. et autt.

Calyx regularis, 5-partitus, basi bracteis parvis instructus. Corolla bilabiata, labio superiore fornicato, inferiore transversim oblique plicato, tubo brevi. Stamina duo, infra fauces inserta. Connectivum rhombeo-lanceolatum, obliquum; loculi alter super altero oblique positi semiovati, inferior calcaratus. Capsula angusta, a basi ad apicem depressa, 4-sperma, basi rigida, superior tenuis. — Species Indica, fruticosa, foliis angustis, ubique fere culta, rarissime fructifera. Inflorescentia e floribus axillaribus pedicellatis spicata. Bracteæ parvæ; bracteolæ parvæ, angustæ.

G. VULGARIS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 104), fruticosa, foliis lanceolatis glabris, spicis terminalibus subverticillifloris basi foliosis, bracteis parvis. ♂ Indigena in valibus prov. Madure (h. Wight! et Hooker.), Rangoon et Taong Dong (Wall!), mont. Sillet (Wall!), Patna (Hamilt!), Assam, Mergui (Griffith! n. 1098 in h. Hooker), Malacca (Griffith! in h. Hooker), insulæ Java (Blume! Zollinger! pl. jav. n. 437, in h. DC.), Zeylon (h. Vahl!), Philippinis (Cuming! n. 1043 et 1640, in h. Hooker, Chamisso! in h. gen. ber., Bentham et in h. gen. berol. n. 905, Madagascar (Martin! n. 143 in h. DC.), insulæ Sti Mauriti (Bojer! in h. Hooker), insulæ Martinicæ et Trinitatis culta? (Sieber!)—h. Wight prop. n. 1996, Wight ic. t. 468. Decaisne pl. tim. in nov. a-n. du mus 3 p. 382, h. DC. n. 614. Justicia Gendarussa Linn. suppl. p. 85, Vahl en. 1 p. 134 et h!, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 387 et h. n. 319! (spec. Klein et hort.), Rœm. et Sch. syst. 1 p. 152, Jacq. ecl. t. 11, Burm. fl. ind. p. 10, Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 129, Wall. cat. n. 2442 a-g, Sieb. fl. martin. n. 364, Trinid. n. 304, Schult. mant. 1 p. 135. Blume bijdr. p. 785, Blanco fl. de philipp. p. 14. Justicia salicina h. Vahl! Gendarussa rosea Rumph.! h. amb. 4 p. 70 t. 28 et 29. Vada K. di Rheede h. mal. 9 p. 79 t. 42. Flores plerumque in singulo verticillo inferiore decem, quinque ex utroque latere, quorum tria et bina fasciculata. Bractea sub singulo fasciculo una, e basi latiore subulata. Foliorum minorum par verticillos inferiores suffulcit, superiores aphylli sunt. Calycis laciniæ linearisubulatæ, æquales. Corolla miniato-purpurea. Capsula lanceolata, semipollucaris. (v. v. cult. et sicc. in hbb. plurimis).

β. Dohona, foliis apicem versus repando-crenatis. — Dhupari et Nageswari (Hamilt!). Justicia Dohona h. Hamilt! Wall. cat. n. 2442 f.

*Adnot.* Inter specimina innumera fere, quæ vidi, unum solum inventi fructiferum a cl. Wight lectum et in h. Hookeriano asservatum, idque uno solo fructu prædictum, qui immaturatus quidem, perfectam tamen exhibuit structuram.

CXXII. MONECHMA Hochst. in Flora 1841, p. 374, Endl. gen. suppl. 2,  
p. 62, Meisn. gen. comm. p. 367.

Calyx regularis, basi bracteis propriis parvis instructus. Stamina duo, infra fauces inserta. Connectivum rhomboe-lanceolatum, obliquum; loculi, alter super altero oblique positi, semiovati, inferior basi calcaratus. Corolla bilabiata, labio superiore breviore subfornicato. Capsula basi brevi spatio contracta, hinc suborbicularis compressa disperma, loculis 4-spermis.—Herbae vel frutices Africæ septentrionalis et australis, etiam Arabiæ; una species Americam temperatam incolit. Inflorescentia in genuinis spicata vel glomerato-spicata, axillaris, abiens in spicam terminalem, his bracteæ communis sunt imbricatae, quadrifariae, herbaceæ, latæ; in unâ eâque Americanâ specie flores sunt axillares, sessiles, alterni vel oppositi. Flores vel fasciculato-terni, fasciculis oppositis, vel solitarii oppositi, et tunc vero spica solummodo terminalis. — Differt a Gendarussâ et Adhatodâ capsulâ dispermâ nec tetraspermâ.

\* Gerontogœ.

1. M. DEBILIS, caule basi suffruticoso, foliis ovali-oblongis obtusiusculis scarbusculis brevissime petiolatis, spicis axillaribus brevibus subsecundis in terminalem longiore abeuntibus, bracteis ovatis subcordatis mucronatis longe ciliatis. ♂ Inter frutices Arabiæ Feliciæ (Forskol); in monte Maummarâ Arabiæ Feliciæ (Botta! in h. Mus. paris. duppl. n. 218). Dianthera debilis Forsk. descr. p. 9, Vahl symb. 1 p. 4. Justicia debilis Vahl en. 1 p. 135, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 400. Variat foliis ovalibus subciliis oblongis lanceolatisque in brevem petiolum attenuatis internodia æquantibus iisdemque duplo brevioribus in eodem specimine. Ubi folia sunt latiora, ibi bracteæ subcordatae sunt et omnino sessiles, ubi angustioria sunt folia, ibi bracteæ sunt subpetiolatae. (v. in h. paris. et Nees).
2. M. BRACTEATUM (Hochst. in Flora 1841 p. 375, 1842 p. 225, 1843 p. 75, Kotschy it. nub. in un. itin. n. 261), caule herbaceo, foliis oblongis obtusiusculis in petiolum brevem attenuatis scabris, spicis axillaribus internodia æquantibus subsecundis, bracteis suborbiculato-spathulatis mucronulatis ciliatis scabris. (2) (Kotschy). Gendarussa debilis N. ab E. in Linn. 16, p. 302 (excl. synon.). A præcedente vix specie differt.  
 β. rupestre, caule humili, dense ramoso. — In rupibus Arabiæ Feliciæ prope Ferihé (Schimper!) in h. arab. un. iftu. n. 821, Fischer! in h. gen. monac. n. 150. (v. cum var. α in h. un. it., monac., Hooker).
3. M. AFFINE (Hochst. in Flora 1843 p. 76), spicis axillaribus terminalibus que, bracteis ovato-lanceolatis obtusis dense ciliatis. (C) In Abyssiniâ (Schimper!). Valde simile M. bracteato, sed foliis minoribus, floribus majoribus (bracteæ duplo longioribus licet calyx sit bracteæ brevior), bracteis oblongis earumque nervis costalibus oboletis (qui in M. bracteato valde conspicui sunt) satis differt. (v. in h. un. it.)
4. M. VIOLACEUM, caule fruticoso ramoso incano, foliis lanceolato-oblongis obtusis scabris, spicis terminalibus sæpe cernuis, bracteis ovalibus cuspidulato-mucronatis ciliatis scabris. ♂ In Arabiâ Felici (h. Forsk.), ad Djebel-Ras in Arabiâ Felici (Botta! in h. Mus. paris n. 212 (ex parte), in fruticis provincia Modat prope Adegnanum Abyssinia, Aprili (Schimper!). Justicia violacea Vahl symb. bot. 2 p. 15, en. 1 p. 138, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 388. Monechma ciliatum Hochst. in Schimper it. abyss. n. 1005. Justicia dubia Forsk. cat. pl. arab. p. cii. n. 23? Caulis pubescens subtilissimâ canescit. Corolla angusta, labio superiore et labii inferioris profunde trifidi lacinias subæqualibus linearibus. Rami et ramuli valde flexuosi. Folia 1-1½ poll. longa. Calycem exteriorem, quem dicit Vahlius 1. c., bracteæ sunt, quarum, ubi gemini oriuntur flores, abortiente plerumque altero, 3-4 inveniuntur.

5. *M. ANGUSTIFOLIUM*, caule herbaceo, foliis lanceolatis acutiusculis pubescentibus, scabris, spicis axillaribus internodiis brevioribus subsecundis, bracteis ovalibus mucronato-euspidulatis pubescentibus ciliatis. (1) In Africâ australi (Drège!). *Justicia blepharostegia* E. M.! cat. pl. Drég. a. 1837. A Mouechma debili vix differt, nisi foliis angustioribus et quam pro latitudine longioribus. Nomen blepharostegiae suppressi, cum reliquæ omnes species, quæ bracteis instructæ, iisdem et ciliis prædictis gaudeant. (v. in h. Drège et Hooker).

\*\* *Americana.*

6. *M. PILOSELLA*, caule diffuso ramis infimis flagelliformibus pilosis, foliis ovalioblongis obtusis in petiolum attenuatis in margine costisque pilosis, floribus axillaribus sessilibus, bracteolis spatulato-lanceolatis calyce longioribus. (2) In Texas (Drummond ! coll. 3, n. 255, in h. Bentham). Caulis basi ramosus, ramis  $\frac{1}{2}$ -1 ped. longis pilosis diffusis. Folia 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 4-6 lin. lata, ciliata, costis 2-3 debilibus subtus imprimis pilosis. Corolla 9-10 lin. longa, tubo 6 lin. longo sursum parum dilatato; labium superius rectum, bidentatum inferius trifidum, lacinias oblongis obtusis, palato venoso. Antheræ oblique sagittatae, loculis angustis, demissiore basi calcarato. Capsula parva ( $1\frac{1}{2}$  lin.) lœvis, fusca, in nostro monosperma. Semen (immaturum) aurantiacum, cordatum, tuberculatum. (v. in h. Bentham).

CXXIII. *SIMONISIA N. ab E. (1) in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 144.*

Calyx profunde quinquepartitus, rigidus, lacinias longis in alabastro conum referentibus. Corolla ringens, tubo mediocri vel brevi, labio superiore rectiusculo concavo, inferiore lato trifido ad fauces inflato, lacinias latis rotundatis. Stamina duo; filamenta tubo faucibusque longo tractu adnata; antheræ biloculares, loculis in connectivo semisagittato oblique distantibus altero altiore, demissiore basi mucronato calcarato. Stigma capitatum, leniter emarginatum. Capsula (S. Riedelianæ) a basi ad medium usque depressa, lata, asperrima, hinc bilocularis, tetrasperma, septo lato. Semina colorata, oblique subrotunda, crassa, retinaculis latis suffulta. — Frutices Brasilienses, humiles, varie ramosi, foliis coriaceis, floribus brevipetioliatis speciosis teneris. Spicæ breves, secundæ, dense, in capitulo thyrsulive terminalis formam compositæ. Bracteæ communes foliaceæ foliisque similes nisi minores, superne nullæ. Bracteæ propriæ et bracteolæ subulataæ, rigidæ.

1. *S. ROSEA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 144), foliis oblongis basi acutis supra totisve glabris lœvibusque, calycibus bracteisque birsutissimis, bracteis partialibus bracteolique calyce brevioribus. (3) In silvis ad Aldea Vella, Martio (Max. Princ. Neuwied ! specimen unicum), in Brasiliâ, loco non adnotato (Sellow ! in h. reg. berol. n. 271 et in h. Bentham ! n. 996). Caulis bipedalis, basi repens, mox adscendens, canescens, nodosus, apicem versus obtuse tetragonus, pubescentia brevi scaber. Folia 4-4 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. lata, argute acuminata, basi enneata in petiolum brevem desinentia, integerrima. Capitulum sessile, nucis juglandis voluminc, compositum e spicis partialibus pluribus secundis parvibracteatis, et interstinctum bracteis foliaceis lanceolatis acuminatis 1- $\frac{1}{2}$  poll. longis. Calyx pilis patentissimis rigidis hirsutus, lacinias lanceolatis subulato-acuminatis rigidis poll. 1 longis. Bracteæ et bracteolæ linearis-subulataæ, hirsute, tres lin. longæ, strictæ, subæquales. Corolla intense rosea, 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa. (v. in h. Maxim. Princ., Mart., Bentham et berol.).

*S. parviflora*, foliis subtus vel undique vel saltim in costis pubescentibus

(1) Simonis, hortulanus, Maximiliani Principis in itinere Brasiliensi comes, colligendis plantis strenue operam dedit.

- floribus duplo fere minoribus, antheris crispulis. — H. acad. petropol. n. 78 ex parte (cum Schaueria laclustachya).
2. S. RIEDELIANA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 145), foliis ovatis basi cuneatis in petiolum desinentibus glabris, calycibus aristatis pubescenti-scabris, bracteis setaceis calycem superantibus ciliatis. ♂ In umbrosis graminosis ripæ fluminis Rio Madeira (Riedel ! in h. imp. petrop. n. 34 et 1332), Maynas (Pöppig ? in h. mus. palat. vindob. ex h. Endlich. n. 2065 et add. n. 171, in h. acad. petrop.! specimen fructiferum bracteis bracteolisque maximis). Caulis bipedalis, teretiusculus, pubescenti-scaber. Folia superiora cum petiolo 3-3½ poll. longa, utrinque attenuata longeque in petiolum cuneata; inferiora cum petiolo ultra bipollicari 9½ poll. longa, 2½ poll. lata, basi minus attenuata; etiam suprema basi parum attenuata. Thyrsus compactus 1½-1½-5 poll. altus, sessilis. Bractea et bracteola linear-setacea, longe patenti-ciliatae, 8 lin. longae. Calyx 6 lin. longus, pilis brevibus scaber, lacinia lanceolatis aristato-acuminatis. Corolla bipollicaris, coccinea, tubo longo, labiis tubo triplo brevirioribus, superiore angustiore integro inferiore lato, trifido, lacinia brevibus obtusis. Capsula pollicaris, pubescens. (v. in h. vindob. et petrop.)
3. S. ASCLERIADEA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 145), foliis ovato-oblongis acuminatis basi obtusa subsessilibus velutino-scabris vcnoso-reticulatis, calycibus bracteisque glabris glandulosive, his calyce aquantibus paulo superantibus. ♂ In campis siccis arcnosis inter frutices jugi Serra da Chapada prov. Brasiliæ, Junio (Riedel ! in h. acad. petrop. n. 14, 21 et 1063). Frutex 1-1½ pedes altus. Caulis glaber, dichotomus, geniculis nodosus et a foliorum pulvillis veluti apophysis. Folia venoso-reticulata, venis transversim extensis in utrâ pagina, magis tameu subtus conspicuas, superficies setulis brevissimis incumbentibus holosericeo-opaca; inferiora 2-2½ poll. longa, 10 lin. lata, basi rotundata, subinde subcordata, petiolo brevissimo, vix ½ lin. longo prædicta, costis senis ante marginem confluentibus per parias approximatis fere multiplinervia; superiora folia et imprimis floralia minora, angustiora, fere lanceolata. Spicæ terminales tres, unâ alterâve axillari accidente, breves, rigidæ, disticho-secundæ. Bractea et bracteola pâtuæ, 7-8 lin. longæ, linearis-subulatae, glabrae; illæ paulo longiores. Calyx 6 lin. longus, rigidus, extus subscaber, lacinia lanceolatis setaceo-acuminatis dorso leniter canaliculatis. Corolla circiter 8 lin. longa, alba, tenera, tubo brevi, labio superiore ovato-lanceolato, inferiore trifido lacinia subæqualibus obtusis, palato convexo rugoso. (v. in h. petrop.)
- β. spicis omnibus axillaribus, caule flaccidio. — Ad Rio Pardo, Brasiliæ (Riedel ! in h. acad. petrop.)

CXXIV. BELOPERONE N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 102, Endl. gen. p. 705. Meisn. gen. p. 296 (205), N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 135. — Justiciæ spec. Jacq. et Link. — Orthotacti spec. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 93 et 132.

Calyx profunde quinquefidus, lacinia æqualibus latis vel latiusculis, tubo angusto. Corolla ringens, tubo labioque superiore concavo conicis rectis, inferiore labio trifido æquali, disco laevi. Stamina duo, tubo infra medium inserta. Antheræ biloculares, loculis basi calcaratis in connectivo semisagittato-ovali oblique distantibus, altero altiore. Stigma subulatum (in specie anomala obtusum). Capsula a basi ad medium compresso-unguiculata, asperma, apice tetrasperma. Semina colorata. — Frutices America tropicæ (rarius herbae) speciosi, corollis elongatis purpureis vel coeruleis, bracteis saepè coloratis. Spicæ axillares terminalesque, breves, secundæ. Flores alterni, bracteis patulis bracteolisque saepè æqualibus longis linearibus lanceolatisve.

§ 1. *Bracteola calycem subæquantes eove longiores.*

1. B. SPATHULATA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 136) foliis oblongis utriusque attenuatis pubescentibus glabrescentibus longe petiolatis, spicis axillaribus oppositis bifidis secundis, bracteis bracteolisque spatulatis rotundatis calycibusque ciliatis, antherarum loculis subparallelis altero paulo demissiore basi obtuse appendiculato. ♂ Ad viam Felisbertiam prov. Bahiensis Brasiliæ, Januario (Max. Princ. Neuwied! in h. Mart.), in ripis fluminum ad S. José do Uruguay (Sellow! in h. reg. berol. n. 162 [1023]). Justicia spathulata Nees et M. in nov. act. ac. nat. cur. 11, 1 p. 55, Willd. sp. pl. ed. Dietr. p. 381. Frutex 15 ped. altus. Foliorum lamina 4-5 poll. longa, petiolo pollicari pubescente. Spicæ petiolo paulo longiores, altero ramulo breviore 2-4-floro, altero longiore 4-8-floro. Calycis lacinia lanceolata, acutæ, ciliatæ,  $\frac{3}{2}$  lin. longæ. Corolla pallide hyacinthina, pollicaris, labio saturatus picto. Antherae retrorsum arcuatae. Appendix loculi ovalis, plana, candida. (v. in h. Maximil. Princ., Mart. propr. et berol.)
2. B. GLANDULOSA, caule basi repente ascendentente ramosissimo, ramis quadruplicatis viscido-pubescentibus pubescentiâ reversâ brevi, foliis oblongo-lanceolatis obtusis in petiolum brevem acute desinenteribus glabris costis utriusque rubiginoso-scabris, spicis secundifloris axillaribus in terminalem confluentibus, vel solâ spicâ terminali subsessili brevi simplici, vel bi-trifida, bracteis orbicularis obtusissimis in petiolum longum attenuatis pubescenti-glandulosis bracteolisque linearibus calyce longioribus longe ciliatis, corollæ labio superiore emarginato. ♂ In Brasilia umbrosis, loco noo adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 163 et 164). Orthotactus glandulosus N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 132. Fruticulus sesquipedalis, bipedalis et altior, a basi ramosus. Rami juveniles dense pubescentes plus minus glandulosi et profundius sulcati. Folia cum petiolo 3-4 lin. longo  $1\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{4}$  poll. longa,  $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, apice attenuata acumine obtuso. Spica  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, oblonga, cernua, vel basi subramosa, vel magis composita, e spicis axillaribus longioribus conflata. Bracteæ 4 lin. longæ, laminea subtundata, in petiolum æquilongum vel (in superioribus) longiore angustum cuneatim attenuata, obtusissimæ, opposita angustior, sterilis, subinde fere linearis. Calycis lacinia coloratæ. Corolla 6 lin. longa, purpurea, pubescens. Capsula 5 lin. longa, glabra. (v. in h. berol.)
3. B. DICLIPTEROIDES (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 136), caule herbaceo strigiloso-tomentoso incano, foliis ovalibus acutis-basi cuneatâ in petiolum decurrentibus supra hispidis subitus imprimis in costis velutino-pubescentibus, spicis axillaribus oppositis geminis ternisve seriatim in paniculam terminalem trichotomam collectis bi-quadrifloris secundifloris, bracteis obovato-cuneatis obtusissimis viscido-pubescentibus bracteolisque lanceolato-linearibus calyce longioribus. ♂ In Brasiliâ, loco haud adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 39). Caulis aliquot pedum altitudine, herbaceus, medullâ amplâ, obtusangulus, sulcatus, uti rami incanus, articulis compressis. Folia 6-6 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 3-3 $\frac{1}{2}$  poll. lata, breviacuta, basi longe attenuata. Pedunculi ex singulo angulo superiora versus 2-3, 1-2 poll. longi, exteriore breviores. Plerique apicè trifidi, radiis 2-4-floris, spicis brevibus. Bracteæ 6 lin. longæ, coloratæ ?, oppositæ sterili. Bracteola bracteæ breviores, 6 lin. longæ. Calyx 4 lin. longus, lacinia lanceolato-linearibus acutis coloratis. Capsula infra medium tetrasperma, ventre inter semina constricta. Semina compressa, lævia. (v. in h. berol.)
4. B. PORTORICENSIS, herbacea, molliter villosa, caule bifariam pubescenti-lineato juvenili toto villosulo, foliis ovalibus ovatoe oblongis in acmen obtusum exæuntibus basi acutis rariusve obtusis, spicis terminalibus geminis ternisve densis imbricatis, bracteis subrotundis obtusis basi contractis pubescentibus villoso-ciliatis, bracteolis oblongo-lanceolatis acutiusculis, labio corollæ superiore obtuse bidentato. ♂ In ins. Portorico (Plée! in h. Mus. paris. n. 270).

- Accedit ad B. Rohrii, a quâ differt bracteis magis obtusis haud glandulosis, foliis pubescentibus hand acutis, corollæ labio superiore bidentato nec integrō. Antherarum loculi oblique divergentes in connectivo oblongo, inferior basi appendice obconicâ candidâ præditus. Calycis laciniaæ linearis-subulatae, valde ciliatae, bracteolas æquantes. Capsula ut in B. Rohrii. (v. in h. paris. et ex hoc in h. Nees).
5. *B. ROHRII*, herbacea, foliis ovalibus acutis longe petiolatis glabriusculis, spicis in paniculam terminalalem collectis oppositis imbricatis, bracteis late ovatis obtuse acutatis dense glanduloso-pubescentibus, bracteolis ovali-oblongis, antheris calcariatis loculo superiore margine ciliato, labio corollæ superiore integro, inferiore trifido laciñiis ovali-oblongis obtusis.  $\mathcal{U}$  In Americâ meridionali. Calycis laciñiæ latiusculæ, lanceolatae, pubescentes. Antheræ oblique sagittatae; loculi inferioris calcar substipitatum obtusum. Capsula dorso capriculata, tetrasperma. Semina tuberculata.
- $\alpha$ . foliis inferioribus basi attenuatis.  $\mathcal{U}$  In Guianâ Gallicâ (de Rohr! in h. Vahl). Justicia Rohrii Vahl symb. 3 p. 6 en. 1 p. 136, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 392. (v. in h. Vahl).
- $\beta$ . *latifolia*, foliis omnibus basi obtusis grandioribus. — In prov. Stæ Martha (Bertero! in h. Balbis et DC.). Justicia comosa h. DC. l. c. (nec R. et Sch.) (v. in h. DC.)
6. *B. LAMARCKIANA*, foliis ovatis acuminatis repandis e basi obtusâ in petiolum longum acute desinentibus utrinque cauleque sparsim puberulis, spicis terminalibus subgeninis densis imbricatis, bracteis ovatis obtusis pubescentibus, bracteolis oblongis basi cuneiformibus calycem æquantibus.  $\mathcal{U}$  In insulis Indiæ occidentalis (Vahl! de Rohr! West! in h. DC.), in Martinicâ (Isert! in h. Willd. et Schreb.) Justicia mirabiloides Lam. ill. gen. I p. 39. Justicia Carthagensis Vahl! en. 1 p. 64 et h. (excl. syn. Jacq.) Willd! sp. pl. 1 p. 86 (excl. synn. Linn. et Jacq.), ed. Dietr. 1 p. 396 (excl. synn. Linn. et Jacq.) et h! n. 322 fol. 1 (spec. Isert.). Satis distincta foliis latiusculis evidenter repandis. Corolla  $\frac{1}{2}$  poll. longa. Antherarum loculus inferior appendice obtusâ basi contractâ albida auctus. Capsula compressa, 2-4-sperma, pubescens. (v. in h. Vahl, DC., Willd. et Schreb.)
7. *B. NEMOROSA*, herbacea, foliis ovali-oblongis ovatis acuminatis anguste petiolatis ad costas totisve puberulis, spicâ spicis terminalibus, bracteis ovatis acuminatis acutis venosis subvillosis.  $\mathcal{U}$  In Americe meridionalis insulis, in Jamaicâ (Swartz! in h. Vahl et DC.; McFadyen! in h. Hook.). Justicia nemorosa Swartz prodr. p. 14, fl. ind. occ. 1 p. 37, Vahl, en. 1 p. 137 et h! Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 392 et h. n. 323! (spec. Swartz). Justicia formosa Willd. en. 1 p. 28, Link en. 1 p. 29 Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 388, h. Willd. n. 347! h. DC. ! ex horto genevensi. Justicia grandiflora h. DC. ! ex hort. monsp. Justicia coccinea (nec Aubl.) hort. monsp. in h. DC. Dianthera justicioides Sw. in h. DC. Folia alii ovata e basi obtusâ in petiolum angustum acute desinentia, aliis et basi attenuata. Bracteæ ovatae, venosæ, undique pubescentes, basi parum attenuatae. Labium superius emarginatum.  $\mathcal{U}$  In Indiâ occidentali. (v. in h. Vahl, DC., Willd., Hooker, etc.)
- $\beta$ . *glabra*, caule magis ramoso, solo apice novello tenuissime puberulo, foliis vix in costâ mediâ puberulis, bracteis haud villosis sed sollemmodo pubescenti-scabris, superioribus obtusiusculis obtusisve. —  $\mathcal{U}$  In Jamaicæ saxosis calcareis (Swartz), in silvis Jamaicensibus (Daucer! in h. Benth. ex h. Forsyth!, Willson! in h. Hooker). Justicia nemorosa var. nisi repanda? Swartz l. c. p. 38. Justicia purpurea h. Forsyth! (nec Linn.) — Licit pluribus a formâ communis recedere videatur, vix tamen specie differt et in universum optime congruit. Loculus anthere inferior in utrâque formâ ad basin corniculo brevi obtuso albo armatus est. (v. in h. Benth. et Hooker).

8. *B. COMOSA*, herbacea, molliter villosa, foliis ovalibus ovatoe oblongis obtusis basi acutis, spicis axillaribus terminaliqa densis imbricatis, bracteis ovato-oblongis, superioribus acutis coloratis purpureis, inferioribus obtusis, bracteolis linearibus. ♀ In Mexico (h. Hænke, nbi cum Geudarussâ furcatâ mixta), prope Tampico de Tamaulipas (Bérlandier! pl. mex. n. 123 in h. Moricand; in h. gen. berol.! et in h. DC.! in dumetis Papantlae (Schiede! n. 1160 in h. gen. berol.), prope Hacienda de Guadalupe, Rio Grande in imp. Mexicano, Decembri (Ehrenberg! n. 1221 in h. gen. berol.), in Cordillera Mexicanâ alt. 6000 ped. a Jun. in Octobrem (Galeotti! n. 936 in h. Hooker). *Justicia fulvicoma* Schlecht. in Linn. 6 p. 369. Affinis *B. formosa*, sed differt villositate caulis, foliorum, bractearum conspicuâ patulâ, foliis obtusis, bracteis majoribus, comam viridi-purpurascen tem fere ut in *Salvia Hormino* efficientibus, corollâ pallidiori (14 lin. longâ). (v. in h. Hænke, Moricand, berol. et Hooker).
9. *B. FIMBRIATA*, foliis oblongis acuminatis basi longe cuieiformi in petiolum angustum acute desinentibus confertim lineolatis subtus præsertim in costis puberulis, spicis terminalibus ternis densis imbricatis sericeo-pubescentibus in spicam ovatam compactis, rhachi sulcato-angulatâ glabriuscula, bracteis bracteolisque ovali-oblongis obtusiusculis lanuginoso-ciliatis imbricatis, illis calyce longioribus, his calycem æquantibus, calycis lacinias oblongo-lanceolatis acutiusculis pareius ciliatis, corollæ elongatae labiis integris apicem versus rufo-hirsutis, antherarum loculo utroque basi mucronato. ♂ In silvis densis fluminis Teapa prov. Tabasco (Linden! h. austr. n. 178 in h. Hooker). *Caulis* geniculatus, divergenti-ramosus. *Corolla flava*, fere bipollicaris. Distinctissima species et probabiliter distincti generis. Spicæ tres simul sumpæ capitulum pollicare, ovale ovatumque struunt, sericanti-canum. *Calyx* ratione corollæ brevior est. (v. in b. Hooker).
10. *B. MONTICOLA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 142), caule juvenili foliisque linearibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis brevipe-tioliatis præsertim in margine costisque utrinque strigoso-tomentosis, spicæ terminali composita simplici trifidâ densâ imbricata, bracteis oblongo ovalibus vel acutis vel obtusis cum mucronulo pubescentibus coloratis, infimis ovatis acutiusculis, bracteolis lanceolato-linearibus calyce longioribus vel paulo brevioribus, antheris appendiculatis. ♂ In silvis prope Antonio Pereira et Villam Ricam prov. Minarum Generalium, Aprili (Martius!), in eadem prov. (Gardner! n. 5135 in h. Bentham), Conconhas do Campo in prov. Minarum Generalium (Stephan! in h. Mart.), (Claussen! in h. Hochstetter n. 342), in collibus umbrosis prope Villam Ricam, Septembri (Riedel! in h. acad. petrop.), Facenda do Padre (Sellow! in h. reg. berol. n. 206). *Frutex* 3-4-pedalis. *Folia* 4-7 poll. longa, 1- $\frac{1}{2}$  poll. lata, basi magis quam apice attenuata, acumine obtusiusculo subinde acuto. *Spica* oblongo-ovalis, 2-4 poll. longa, vel triplex, vel una e tribus pluribus arcta conjunctis constans. *Bractæ*  $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{4}$  poll. longæ, 4-8 lin. latæ, purpureæ, venis viridibus. *Bracteola* in aliis 7-8 lin. longæ, 1 lin. lata utrinque attenuata, in aliis (majoribus) 5 lin. longæ,  $\frac{1}{2}$  lin. latæ, lineares. *Calycis laciniae* 4-6 lin. longæ, lanceolatae, acuminatae, dense pubescentes. *Corolla* pollicaris-bipollicaris, flavo-miniata (Mart.), (purpurea basi aurantiaca ex Riedel). Affinis est *B. comosæ* et *birsutæ*, sed distincta integumento breviore et magis disperso, corollæ colore. (v. in h. monac., vindob., petrop., Mart., Bentham, Hochstett., Hooker, etc.)
- z. minor*, bracteolis lanceolatis calyce longioribus, corollâ pollicari. — *Lophostachys monticola* Mart. obss. n. 948.
- β. major*, spicæ majore, bracteis majoribus, corollâ bipollicare. — Ante Vas in prov. Goyaz (Pohl! in b. mus. palat. vindob.). *Justicia thyrsoidæ* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 3529.
11. *B. HIRSUTA* (N. ab E. in Eudl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 143), birsuta, foliis ovali-oblongis obtusis vel acutiusculis subsessilibus spicæ terminali composita dense imbricata bracteatâ, bracteis communibus ovalibus, floralibus

oblongis bracteolisque linearibus, cunctis coloratis calycem æquantibus vel eo paulo longioribus. ♂ In silvis Serra do Mar ad Villa das Areas prov. Rio de Janeiro, Decembri (Martius !), in Minis Generalibus Brasiliæ (Ackermann ! in h. Mart.), Camargos in Brasiliæ (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 3530 et Sellow! in h. reg. berol. n. 170 et 204), Quartel dos Pintores (Sellow! in h. reg. berol. n. 205 [c. 487]). Apbelandra hirsuta Mart. in sched. Justicia villosa Pohl! ic. in h. palat. vindob. n. 3530. Justicia Vellozii R. et Sch. syst. 1 p. 66? Species similis B. comosa: differt foliis fere sessilibus, bracteis angustioribus et hirsutis rudiore. Caulis et folia rufo-hirsuta; adultus caulis glabrescit. Folia 2-4½ poll. longa, ¼-1½ poll. lata, in petiolam brevissimum desinentia, vel obtusa vel brevi acumine eoque modo acuto modo obtusiusculo prædicta, rigida, supra pilis bulbosis subtus pilis mollioribus hirsuta, demum magis glabra et nitida. Spica bi-trifida, compacta, purpurea, bracteæ sub ramo singulo unâ ovali vel ovali-oblongâ 6-12 lin. longâ ramum tegente stipata. Flores alterni, imbricati. Bractea 6-7 lin. longa, purpurea, hirsuta, obtusa vel breviapiculata, inæquilatera; bracteæ oppositæ sterilesque, tum et superiores spicæ magis lanceolatae, apiceque magis attenuatae. Bracteolæ et calycis lacinia 6 lin., haæ sœpe 8 lin. longæ, coloratae; illæ lineares, haæ lanceolatae, acuminatae. Corolla purpurea, 1½ poll. longa; labii inferioris lacinia linearispathulatae, obtusæ. Antherarum appendices obtusæ, albæ. (v. in h. monac., vindob., berol., Mart., Hook.)

*B. longifolia*, foliis ohlongis apicem versus paulo angustioribus neque tam en acutis. — In prov. Minarum Generalium (Ackermann ! in h. Mart., Schüch! in h. mus. palat. vindob.), in silvis inter Sabara et Caéte, Novembri (Riedel in h. acad. petrop. n. 2789). Beloperone villosa Mart. in sched. « Caulis 2-4-pedalis. Flores aurantiaci » (Riedel). (v. in h. Mart., vindob., petrop.)

12. *B. SELVOLIANA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 136), caule foliisque oblongis acuminate cuneatim in petiolam attenuatis repandis hirsutis, spicis axillaribus oppositis simplicibus oppositifloris pedunculatis folio brevioribus, bracteis oblongo-lanceolatis bracteolisque lanceolatis obtusis pubescens-tibus calyce longioribus, antherarum loculis obliquis basi mucronatis. ♂ In Brasiliæ loco non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 45). Caulis herbaceus, erectus, subsimplex, flavantic-hirsutus. Folia 5½ poll. longa, 1½ poll. lata. Pedunculi hirsuti, 1-1½ poll. longi. Spicæ densæ, oblongæ, 2½-3 poll. longæ. Bracteæ florum inferiorum 1½ poll. longæ, 4 lin. latæ; bracteolæ 1½ poll. longæ, 2 lin. latæ, obtusæ rariusve acutiusculæ, basi parum attenuatae. Calyx 11-12 lin. longus, lacinia acuminatis pubescens subcoloratis. Corolla fere bipollucaris, purpurea. Antheræ grossæ. (v. in h. berol.)

13. *B. BULLATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 141), glabra, caule fruticoso eretto geniculis dilatatis, foliis ovatis subcordatis brevissime petiolatis apice obtuse attenuatis inter costas subulatis, spicis axillaribus solitariis binis ternis in eodem angulo seriatim oppositis pedunculatis pedunculo brevioribus subcapitatis paucifloris folio brevioribus, interioribus compositis, bracteis oblongis acutis adpresso marginè subciliatis calycem æquantibus, bracteolis linearibus ciliolatis calyce brevioribus, calycis lacinia lanceolatis acuminatis. ♂ In Brasiliæ, loco non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 117 et 287 [1211, 622]). Foliis subsessilibus basi obtusissimis vel subcordatis bullato-rugosis spicisque axillaribus parvis more Diclipterarum sœpe seriatim distinctissima. Folia approximata, 3-3½ poll. longa, 1½-1¾ poll. lata, apice vel evidenter vel parum attenuata. Pedunculus, ubi 3 in codem orientur angulo, exterior 3, interior 5-6 lin. longus, hic apice trifidus, medius bifidus. Spica 2 lin. longa, ovalis, densa, 3-5-flora. Calyx et bracteæ apice substrigosæ, 2 lin. longæ. Corolla fere pollicaris, purpurea; labii inferioris lacinia breves, hirtæ. Connectivum angustum. Capsula 7 lin. longa, superiora versus lanceolata, acuminata, fusca, longe unguiculata. (v. in h. berol.)

14. *B. MICROSTACHYNA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 137), caule

ramoso divaricato, foliis oblongis acuminatis basi acutis repando-crenatis tenuibus, spicis axillaribus terminalibusque brevibus capituliformibus pedunculatis, bracteis imbricatis oblongis acutis acuminatisve molliter laxaque oiliatis, bracteolis linear-lanceolatis calycem aquantibus, oalyeis laoiniis lanceolatis acuminatis glabris coloratis, corollæ labio inferiore barbato.  $\S$  In Brasiliâ loco haud adnotato (Sellow! iu h. reg. berol. n. 173 et 238). A reliquis distincta caule ramis recto angulo patentibus braohiato tereti laxe et inflorescentiâ. Folia 3 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 poll. lata, mediocriter acuminata, basi attenuata in brevem petiolum acute decurrentia, mollia. Spicarum par ex angulis paris penultiimi foliorum, alterum idque minus ex angulis paris extremiti. Pedunculus 6 lin. longus, glaber. Spicae 5-6 lin. longæ, ovato-subglobosæ. Bracteæ molles, sessiles, inferiores saepè in petiolum attenuatæ, 4-5 lin. longæ, laxe ciliatæ, opposita sterilis. Calyx cum bracteolis 3 lin. longus. Corolla pollicaris, subincisa, pubescens, purpurea, labio inferiore trifido laciinis obtusis barbatis. Antheræ loculus inferior basi mucrone brevi recto obtuso albo armatus. (v. in h. berol.)

15. B. LONGEPETIOLATA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 137), foliis ovato-ellipticis acutis basi obtusis utrinque lineolatis flaccidis, spicis terminalibus solitariis ternis trifidis simplicibusve oppositifloris basi foliosis, bracteis linear-spathulatis bracteolosique linearibus calyce longioribus ciliatis.  $\mathcal{U}$  In silvis antiquis prope St. Annam, Decembri (Beyrich), in silvis ad Rio de Janeiro (Martius) Schott! Gaudichaud! in h. mus. paris. n. 241). Justicia longepetiolata h. imp. vindob. n. 5965 cum ioone (Schott!). Radix fasciculata, fibris crassis fusiformibus fuscis. Caulis erectus, 1-2 ped. altus, apice di-trichotome divisus, ibidem strigoso-subtomentosulus canescens. Folia longe petiolata, pendula, margine soabra, apice attenuata, ad costas, presertim subtus, pubescentia. Rami extremi saepè terni, trifidi, ad divisionem bifolii; ramuli spicigeri. Spica pollicares, disticho-secondæ. Bracteæ calyce duplo longiores, lineares vel linear-spathulatæ, ciliatæ. Bracteolas consimiles, magis lineares. Calyois 1 $\frac{1}{2}$  lin. longi laciinæ linear-lanceolatæ, acutæ. Corolla semipollucaris, angusta, subpubescens, purpurascens, labio inferioris laciiniis barbatis. Antherarum loculi obliqui, unus fere super alterum siti; inferior calcare acuto albo. Capsula hirta, semipollucaris. (v. in h. vindob., monac., paris.)

16. B. GLOMERATA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 137), foliis oblongis in acumen obtusum attenuatis basi cuneatis et in petiolum longe decurrentibus utrinque lineolatis glabris, thyro terminali elongato nudo subverticillato, ramis oppositis ad basin usque triquadrifolitis ramulisque secundifloris dimidiato-conicis gracilibus internodia aequantibus, bracteis bracteolosique lineari-spathulatis basi subfiliformibus calyce longioribus una cum rhachi calyceque pubescenti-scabris.  $\mathcal{U}$ ? In umbrosis ad Basso de Serra et Agna de Serra Brasilie, Februario et Martio (Pohl!) in h. mus. pal. vindob. n. 5012). Justicia glomerata Pohl! ic. in h. mus. pal. vindob. n. 5012. Species a reliquis generis recedens inflorescentiâ longâ aphyllâ, ramis brevibus gracilibus ad basin divis quasi verticillari. Caulis basi lignescens et teretiusculus, dichotomus, ramis herbaceis quasi pulverulentis. Folia 4-5 poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata (cum petiolo 3-4 lin. longo) obscure viridia, saepè repanda, laxa, apice plus minus attenuata, semper obtusa. Thyrsus terminalis 1 $\frac{1}{2}$  ped. altitudine et altior, pedunculo 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longo, rhachique pubescenti-scabris. Bracteæ communes ad basin verticillorum inferiorum spathulato-lanceolatæ ramo suo haud longiores; superiores lineares. Flores in ramis secundi, brevipedicellati, pedicellis ad basin nudis; bractea pedicello opposita parva, subulata. Bracteæ ad pedicelli apicem tres, scil. uua bractea et duæ bracteolæ, 3 lin. longæ, anguste spathulatae, basi longo spatio fere filiformes; bracteolæ paulo breviores sunt et in superioribus floribus saepè filiformes. Calyx inter bracteas sessilis, 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus, coloratus, laciiniis linear-setaccis. Corolla 3 lin. longa, purpurea. Antherarum loculi contigui, connectivo angusto; inferior calcare albo incurvo valido armatus. (v. in h. vindob.)

17. *B. ATROPURPUREA*. (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 138), foliis ovalibus brevi-obtusisque acutis basi cuneatâ in petiolum brevissimum acute obtuseve desinentibus (subinde auriculatis) utrinque lineolatis cauleque herbae. cœo-glabris thyrsos terminâ elongata nudo subverticillato, ramis oppositis ad basin usque bipartiti simplicibus ramiisque secundifloris dimidiato-conicis, bracteis bracteolatisque ealyce longioribus spathulatis obtusissimis mucronulatisque basi gracilibus una cum rhachi calyceque pubescenti-scabris glandulosisque.  $\Delta$  In silvis prope Castel novo Brasiliæ, Novembri (Riedel! in h. acad. petrop. n. 532). Differt a *B. glomerata* foliis amplioribus (6-7 poll. longis 3-3 $\frac{1}{2}$  poll. latis), subsessilibus, quippe parte petiolarî vix linea longiore. Thyrsis ramis et bracteis longioribus haud ciliatis accedit *B. glomerata*, sed bracteæ et bracteolæ apice latiores sunt. Corolla atro-purpurea venis lætiорibus (Riedel!). Capsula 5-6 lin. longa, fuscescens, inter semina a tergo constricta. *B. glomerata* et atropurpurea nescio an ejusdem speciei sint varietates. (v. in h. petrop.)
18. *B. AMHERSTIAE* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 102 n. 1 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 139, h. reg. berol. n. 228), foliis ovatis ovatoeve oblongis acuminatis repandis lateve crenatis glabris supra dense lineolatis, spicis axillaribus oppositis subsessilibus folio multo brevioribus sursum subsecundis densis, bracteâ recurvo-patulâ bracteolisque linearibus subæqualibus calycem æquantibus longioribusve, calycis lacinia oblongis lanceolatisve acutis, corollæ pubescenti-viscidule labio superiore integro, antheris muticis basi submucronatis.  $\S$  Ex horto ill. Amherstiae specimen, a Bollokio in Indianam orientalem translata, primum vidi in h. Wallich. In sepiibus ad Lagoa dos Frayles prov. Rio de Janeiro (Beyrich! Riedel! in h. acad. petrop. n. 791, Tweedie! et Caley! in h. Bentham, Luschnath!, Harrison!) in Serra d'Estrella ejusd. prov. (Schott in h. mus. pal. vindob. n. 5727, h. gen. berol. n. 118), in silvis ad Serra do Mar prope S. Cruz prov. Sebastianopolitanae, Decembri (Martius!), ad Capo Frio (Maxim. princ. Neuwied!), in prov. Minarum Generallum (Ackermann!), Brasiliæ tropicæ (Boaz! in h. Bentham), in insulâ St. Catharinae Brasiliæ! (h. Hooker!). Beloperone cristata Mart. h. fl. bras. n. 1047 et 1118 a. *Justicia Brasiliiana* Roth in nov. pl. sp. p. 17, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 416 (Harrison! in h. Lehm. et Mart.). *Justicia crenata* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 4727. *Justicia nodosa* Hook.! bot. mag. t. 2914. *Justicia temulenta* hort. Liverpool. in h. Hooker? Fruter 4-5 pedum altitudine. Spicæ glomeruliformes, pedunculo vix lin. longo. Bracteæ fertiles linearis, puberulae, calycem æquantes eov longiores, patulo-recurvæ; opposita exigua vel nulla, istam autem mox sequitur altera fertilis. Flores omnes sursum tendunt. Calycis lacinia oblongæ vel lanceolatae, acuminatae, bracteis plus duplo latiores; duæ inferiores paulo angustiores. Corolla coccinea, pubescens, pollicaris, sesquipollucaris. Antheræ violaceæ, basi submuticæ. Capsula semi-pollucaris, fusca, nitida. Folia 4-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, brevi-petiolata, argute acuminata, repando-subcrenata; superiora decrescentia. Capsula brevis, clavata, fusca, parte fertili subglobosâ!
- $\alpha.$  spicis minoribus subsessilibus, bracteis evidentius recurvis glabris, calycis lacinia oblongis minus acuminatis coloratis. — Mart. h. fl. bras. n. 1047, etc. (v. in h. Wallich, monac. Hooker, Mart., etc., etc., cult. ex horto Liverpool. in h. Hooker, Tweedic! ibid. n. 1265.)
- $\beta.$  debilis, spicis majoribus plurifloris pedunculo evidentiore (licet brevi) præditis, bracteis rectiusculis glabriusculis, calycis lacinia lanceolatis acuminatis viridulis. — In silvaticis editis, ad torrentes nec non in viâ publicâ versus S. Pauli civitatem, et in umbrosis silvaticis prov. Januariensis ex. gr. ad predium Mineiros dictum, Decembri (Martius!), Porto Alegro in nemorosis (Sellow! in h. reg. berol. n. 119 [2495]), (Lund! n. 19 in h. DC.), in insulâ St. Catharinæ (Chamiso! in h. acad. petrop.) (v. in h. monac., berol., DC., et petrop.)

- y. lanceolata*, foliis lanceolatis subrepandis, spicis ut in var.  $\alpha$ . — In vertice montis Butacaray Brasiliæ (Sellow! in h. reg. berol. n. 120 [d 1504]). (v. in h. berol.)
- δ. ciliaris*, bracteis bracteolisque calyce duplo longioribus ciliatis rectiusculis, spicis in apice caulis ramorumque congestis. — In Brasiliâ, loco non adnotato Sellow! in h. reg. berol. n. 145).
- ε. graciliflora*, tubo corollæ angustiore, spicis longitudine dimidii folii paulo laxioribus minus divisis, bracteis bracteolisque recurvis, calyce duplo longioribus, calycis laciniis lanceolatis acutis, foliis ut in var.  $\alpha$ . — Rio Grande in silvis (Tweedie! n. 752 in h. Hooker et Bentham).
19. B. PLUMBAGINIFOLIA (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 139), foliis lanceolatis oblongis acuminatis glabris, spicis axillaribus terminali que trifida brevibus, bracteis bracteolisque lanceolatis, calycibus oblongo-lanceolatis cuspidatis, antheris basi calcaratis. ♂ In silvis Corcovadensis (Serra do Mar) prov. Rio de Janeiro, Septembri (Martius!), ad fontem Corcovado rivuli, Junio (Beyrich), ibidem Luschnath! in h. Mart. n. 454, in h. petrop. n. 2 et 789), in silvis umbrosis jugi Serra d'Estrella, Jan.-Mart. (Riedel!), Punta negra Brasiliæ (Pohl! in h. mus. palat. vindob.), (Gardner! n. 840 in h. Hooker), (Sellow! in h. reg. berol. n. 229). Justicia plumbaginifolia Jacq. ecl. p. 20 t. 12, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 369, Pohl! ic. fl. bras. ined. in inus. imp. vindob. n. 4753. Justicia amena h. Mart. ex hort. bot. monac. Justicia lateritia h. Willd! u. 321. Beloperone oblongata N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 102, bot. reg. t. 1657. Justicia oblongata Link et Otto pl. sel. p. 115 t. 54, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 381 (in icona spicæ omnes axillares pictæ sunt, propter caulem nondum ad apicem usque evolutum). Caulis subscandens, 6-8-pedalis (Riedel). (v. in h. monac., Mart., berol., vindob., petrop., Hooker, etc., et v. c.)
- $\beta.$  *angustifolia*, foliis oblongo-lanceolatis lanceolatis, bracteis lanceolato-linearibus (h. Moricand!) — In Serrâ d'Estrella, Jan.-Mart. (Riedel! in h. acad. petrop., Graham et Luschnath! in h. Hooker). Justicia coccinea Luschn. l. c. excl. synon. Aubl. (v. in h. petrop.)
- γ. macrophylla*, foliis late ovalibus amplis utrinque acuminatis, spicæ terminali simplici magis elongatâ. — In silvis umbrosis jugi Serra d'Estrella, Martio (Riedel! in h. imp. petrop.) — Monstrositas potius quam varietas appellanda. Folia 7-8 poll. longa, 3-3½ poll. lata. Spica 2½ poll. longa. (v. in h. petrop.)
20. B. NODICAULIS (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 140), glaberrima, foliis oblongis ovalibusve acuminatis basi cuneiformi in petiolum brevem desinenteribus, spicis axillaribus in terminalem trifidam confluentibus brevibus paucifloris et subcapitatis, bracteis bracteolisque patulis spathulatis obtusiusculis obtusisve his calycem æquantibus, calycis laciniis oblongo-lanceolatis acuminatis coloratis. ♂ Corralinho et Sta Cruzin prov. Goyaz Brasiliæ (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 1529 var. *angustifolia*), ante Antes in Serrâ Macano, Orixas (Pohl! in h. mus. palat. vindob. n. 1727 fol. 1, 2, 3 var. *latifolia*), (Pohl! in h. vindob. n. 2591 var. *angustifolia*), in silvis montium Serra da Chapada, Maio (Riedel! in h. acad. petrop. n. 1062), in prov. Minarum Generalium (Guillemin! in h. mus. paris. n. 250). Justicia nodicaulis Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 1529. Justicia psychotrifolia Pohl! l. c. n. 2591 (var. *angustifolia* petiolis paulo longioribus). Accedit ad B. plumbaginifoliam, at differt bracteis (9-12 lin. longis) bracteolisque brevioribus patulis apiceve recurvis obtusis cum vel absque mucronulo obtuso. Calyx 6 lin. longus, purpureus, glaberrimus, laciniis ut in B. plumbaginifoliâ, at non adeo cuspidatis sed potius acuminatis dorso concavis. Corolla 1½ poll. longa, coccinea. Antheræ grandes. Frutex 3-4-pedalis. Caulis nodosus, trichotomus, glaber, angulis costâ angustâ acutatis, in inferioribus denticulatâ et sæpe undulatâ. Folia firma, cum petiolo 3-9 lin. longo 5-8 poll. longa, 1½-3 poll. lata, nitida. (v. in h. vindob., petrop. Hooker).

21. *B. FRAGILIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 140), caule herbaceo glabriusculo geniculis carnosis siccando fragilibus, foliis ovato-oblongis apice attenuatis basi acutis subrepandis glabriusculis, spicis axillaribus oppositis brevibus sessilibus sursum secundis in terminali compositam apice simplicem coeuntibus, bracteis linear-lanceolatis rectis bracteolisque linearibus subæqualibus pubescenti-scabris calycem æquantibus paulo eo longioribus, calycis lacinias lanceolatis acuminatis.  $\mathcal{L}$  In silvis Catingas ad Villa Nova da Rainha, prov. Bahiensis, Martio (Martius!). Caulis medullâ laxè farctus, geniculatus, ramosus ramis erectis. Folia internodiis breviora,  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 poll. lata, basi acutiuscula petiolo brevi, apice longe attenuata acuminata obtusiusculo, in margine et supra ad costas pubescenti-scabra. Spicæ folio duplo breviores, subsessiles, paucifloræ, glomeriformes, superiores sensim in spicam terminali confluentes. Calyx cum bracteis semipollucaris. Corolla pollice longior, purpurea. Antheræ angustæ, loculis parum obliquis sed altero altiore, utroque basi calcare obtuso albo prædicto. Capsula semipollucaris, viridis, pubescens. (v. in h. monac.)
22. *B. LANCEOLATA* (Mart. obs. n. 1218, N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 141), caule compresso-quadrangulari pubescenti-tomentoso, foliis lanceolatis utrinque attenuatis subtus pubescenti-tomentosis, bracteis lanceolato-linearibus acuminatis bracteolisque linearibus pubescentibus, spicâ terminali compositâ thyrsoidæ imbricatâ basi foliosâ, antherarum loculis contiguis, infero basi obtuse callosa-subcalcarato.  $\mathcal{J}$  In umbrosis Serra de Piedade prov. Minarum Generalium, Maio (Martius!), Morro do Pilar, Octóbre (Sellow in h. gen. berol. n. 37 et 27). Frutex altitudine humana, ramis patentibus quadrangularibus dense pubescentibus mollibus. Folia 6 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, longe acuminata, supra nitida et ad costas scabra, subtus transversim reticulata, atque subtomentosa. Petioli brevis, canescens. Spica sessilis, 3-4 poll. longa, oblonga, ramis oppositis brevibus paucifloris bracteisque imbricatis pubescentibus. Bractea sub singulo ramo lanceolato-linearis, ramum suum subæquans. Bracteolæ calycis longiores. Flores superiores ramorum spicæ alterni, infimi oppositi. Calycis lacinia oblongo-lanceolata, acutæ, pubescentes. Corolla angusta,  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, coccinea, pubescens. (v. in h. monac. et berol.)
- $\beta.$  *latifolia*, foliis 7- $8\frac{1}{2}$  poll. longis, 2 poll. latis subtus parum puberulis solis in nervis utrinque sericeo-tomentosis. — Morro do Pilar, Septembri, et Conceissão in prov. Minarum Brasilie (Sellow! in h. reg. berol.)
23. *B. TRIFOLIATA* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 141), caule obtuso tetragono dense tomentoso, foliis verticillato-ternis lanceolatis acuminatis in petiolum breve canaliculatum attenuatis supra laxe pilosis subtus velutino-tomentosis, spicâ terminali compositâ thyrsoidæ imbricatâ basi foliosa, bracteis lanceolato-linearibus bracteolisque linearibus acuminatis hirsutis calyce longioribus, antherarum loculis contiguis, infero basi obtuse calcarato.  $\mathcal{J}$  In Brasiliâ, loco acutius non adnotato (Vandelli! in h. DC.). Justicia trifoliata R. et Sch. syst. 1 p. 166, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 396. Dianthera n. 2. Vandelli in Reem. script. de plant. hisp. lusit. bras. p. 71. Similis B. lanceolata, at diversa ab istâ cunctitate reliquis foliis ternis, tum pubescentiâ densiore in caule tomentum crassius formante cauleque non compresso quadrangulari, sed ex tereti tetragono. Corolla 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longa; labium inferius subtus hirsutum. An forma luxurians B. lanceolata? (v. in h. DC.)
24. *B. MOLLIS* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 142), villosomollis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis brevipetiolatis, spicâ terminali basi compositâ densâ imbricatâ, bracteis oblongo-lanceolatis acutis bracteolisque linearibus calycem æquantibus, calycis lacinias lanceolatis acuminatis membranaceis coloratis sericeo-pubescentibus.  $\mathcal{J}$  In Brasiliâ, loco non adnotato (Sellow! in h. reg. berol. n. 32 [1131]). Frutex cortice albo, ramis projecturis 4 angustis angulatis ætate glabris, medullâ laxâ amplâ. Folia 5 poll.

*longa*, 1 poll. lata, acumine obtusiusculo, basi cuneatâ in petiolum brevem canaliculatum decurrentia, apicem versus repando-suberenata, utrinque villosa-volutina, ad costas subtus hirsuta. Spica sessilis, basi foliis duobus parvis stipata, tripollicularis, pubescens, rhachi villoso, accedente subinde ad basin spicâ alterâ parvâ. Spicas partiales ad flores aliquot aggregatos redactæ. Bracteæ et bracteolæ calyce paulo breviores eidemve æquales, 6 lin. longæ, uti calyces purpureæ. Corolla sesquipollicularis, purpurea, pubescens. Acoedit ad B. hirsutam, a quâ differt foliis petiolatis utrinque attenuatis, bracteis angustioribus, pubescentiâ molliore; a B. lanceolatâ recedit villositate caulis et foliorum, bracteis latioribus haud acuminate-attenuatis. (v. in h. berol.)

$\beta.$  *amplior*, foliis amplioribus, spicâ magis compositâ, bracteis latioribus coloratis, caule crassiore evidenter quadrangulari, medullâ adhuc ampliore. — In Qnartel dos Pintores prov. Minarum Brasiliæ, Decembri (Sellow! in h. reg. berol. n. 36 [c. 2323]), Barbacena, Facenda do Padre (idem! ibidem n. 38 [1430]). Folia  $2\frac{1}{2}$ -9 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. lata, adultiora glabrescentia. Spicæ rami longiores, plurifloræ. Bracteæ rami communes oblongæ, subovales, obtusæ vel acutiusculæ, 9-10 lin. longæ; bracteæ proprie sub floribus singulis 9 lin. longæ oblongæ, lanceolatæ. Bracteolæ 6 lin. longæ. Calycis laoiniæ 5 lin. longæ. (v. in h. berol.)

25. B. SCORPIOIDES, fruticosa, caule subsexangulari novello pubescenti-scabro, foliis oblongis lanceolatis obtusis scabris in petiolum brevissimum canescens acute desinentibus, spicis axillaribus terminaliæ sursum secundis, bracteis lanceolatis obtusis, fertilibus majoribus adscendentibus, bracteolis linearis-subulatis calycem æquantibus, calycis brevis arcte sessilis lacinis subulatis scabris. ♂ In prov. Tucumana (Tweedie! in h. Bentham). Rami fruticis spithamei, lutescentes. Folia approximata,  $\frac{3}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 4-3 lin. lata, rigidula, integerima; inferiora breviora et latiora. Petiolus vix  $\frac{1}{2}$  lin. longus. Spicæ axillares et terminalis sessiles  $\frac{3}{4}$ -1 poll. longæ, etiam breviores, arcu revræ, densæ. Bracteæ foliis similes, fertiles sursum spectantes, inferiores 6, superiores 4 lin. longæ; steriles inferne incumbeentes  $2\frac{1}{2}$ -lin. longæ. Flores sessiles, spirales. Calyx 2 lin. longus, bracteolis æqualis. Rhachis albo-hirsuta. Corolla purpurea, sursum tendens et itaque ad speciem resupinata, police longior, hasi albida; labium inferiori trifidum, plagi palatinâ lanceolatâ pallidâ apice oblique pectinatum rugosâ. Antherarum loculi angusti, oblique distantes, subparallelî; inferior basi obtuse mucronatus. Capsula 5 lin. longa, a tergo depressa, glabriuscula. Semina tuberculata. (v. in h. Bentham, etc.)

26. B. SCHOMBURGKIANA (N. ab E. in Bentham pl. Schomb. Lond. journ. bot. 4 p. 636), caule glabro, foliis lanceolatis acuminatis utrinque pubescentibus, spicâ terminali comppositâ thyrsoidæ imbricatâ basi foliosâ, bracteis linearis-lanceolatis acuminatis bracteolisque linearibus longe ciliatis, antherarum loculis uno super altero distantibus, inferiore calcarato. ♂ In Guianâ Anglicâ (Schomburgk). Rami divaricati. Folia  $2\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, 6 lin. lata, integerima, basi acuta, apice attenuata acumine obtusiusculo, costis 5-nis utrâque pagina sparsim pubescentibus. Spica terminalis constat e spicis simplicibus axillaribus oppositis alterâ breviori, unguicularibus, superioribus valde approximatis, omnibus secundifloris. Bracteæ et bracteolæ conformes, 5-6 lin. longæ, pubescentes, ciliatae. Calycis laciniae 5 lin. longæ, linearis-lanceolatæ, acuminatæ, pubescentes, margine membranaceæ nec ciliatae. Corolla pollicaris, glabra, coccinea; labii inferiori trifidi laciniae oblongo-lineares, obtusæ, subæquales. Capsula 7 lin. longa, a medio tetrasperma. Semina suborbiculata, laviuscula ? fusca. (v. in h. Bentham).

## § 2. Bracteolæ calyce breviores vel eum ad summum æquantes.

27. B. CILIATA, herbacea, glabra, caule basi repente, foliis oblongis acuminatis in petiolum longiusculum attenuatō-decurrentibus confertim lineolatis,

- spicis axillaribus oppositis terminalibusq; ternis brevibus brevipedunculatis bracteis ovatis subulato-acuminatis basi in petiolum brevem contractis ciliatis herbaceis, bracteolis linear-lanceolatis utrinque attenuatis subulato-acuminatis ciliatis calycem longe subulatum æquantibus.  $\mathcal{U}$  In Peruvia Andium nemoribus (Rulz! in h. gen. berol.). Dicliptera ciliata Ruiz et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 12 t. 14 f. a. Justicia ciliata Pers. synops 1 p. 23. Justicia radicans Vahl en. 1 p. 137, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 410. Bracteis, bracteolis calycisque laciniis in acumen strictum rigidum ciliatum productis facile dignoscitur. Corolla semipollucaris. Antheræ generis. Capsula calyce brevior. (v. in h. berol.)
28. B. DENUDATA, caule herbaceo erecto foliisque oblongo-ovalibus acutis basi cuneatis in petiolum decurrentibus supra glabris subtus in costis subtilissime velutinis, spicis axillaribus oppositis tripartitis in paniculam terminalem collectis, ramis bi-tripartitis exterioribus minoribus, floribus imbricatis distichosecundis, bracteis bracteolisque oblongo-lanceolatis acuminatis subæqualibus, his calyce duplo brevioribus.  $\mathcal{U}$  Maynas alto (Peppig! in h. gen. berol.), Peruvia, Pangoa, Julio (Matthews! n. 1208 in h. Hooker). Quod ad habitum similis B. diclipteroidi, sed longe aliis characteribus. Caulis pluripedalis, medullâ amplâ, obtuse tetragonus, mollis, ad genicula compressus. Folia 10-14 poll. longa, trans medium 2½-4 poll. lata, acuminata, petiolo fere 1½ poll. longo, ramea fere lanceolata, 4 poll. longa, 1 poll. lata, cuncta integrerrima, juvenilia subtus rufo-velutina. Panicula terminalis ¾ ped. alta, ovata, velutino-mollis, ramis oppositis. Rami ad basin fere tri-(subinde bi-) partiti, trunco communis brevissimo valde compresso, ramus exterior reliquis brevior, simplex vel bifidus, medius trifidus, interior majorque medio tri-quinquefidus. Spicæ propriæ ½-1 poll. longæ, in ramo suo terminales, subsecundæ, dense, plurifloræ. Bracteolæ ½-1 lin. longæ; inferiores deciduae. Bractæ subinde calycem æquantes, bracteolis conformes. Calyx 2-2½ lin. longus, profunde neque ad basin usque quinquefidus, laciniis lanceolato-lineariibus acutis vel obtusisculis parum velutinis trinervibus. Corolla sesquipollucaris, coccinea, angusta. Connectivum antheræ lanceolatum, loculi basi parum divergentes, inferior calcaratus, calcare albo obtuso bursiformi. Capsula ¾ poll. longa, fusca, a medio 4-sperma. (v. in h. berol. et Hook.)
29. B. APPENDICULATA, caule berbaceo erecto foliisque ovali-oblongis acuminatis basi cuneatâ in petiolo longe auriculatum desinentibus repandis glabris, spicis axillaribus ternis in paniculam terminalem collectis ramis tripartitis inæqualibus, floribus secundis, bracteis bracteolisque oblongo-lanceolatis æqualibus calyce brevioribus.  $\mathcal{U}$  In Peruia Andium nemoribus, ad viuum Pozuzo, Septembri et Octobri (Ruiz! in h. gen. berol. et Lambert). Dianthera appendiculata Ruiz et Pav. fl. peruv. et chil. 1 p. 12 t. 11 f. a. Justicia appendiculata Vahl en. 1 p. 159, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 413. Caulis orgyalis. Folia fere quadripalmaria. Corolla rubra, 1½ poll. longa. Proxima est B. denudata et diclipteroidi. (v. in h. berol.)
30. ? B. CALYCINA (N. ab E. in Benth. pl. Schomburgk. Lond. Journ. bot. 4 p. 637), caule herbaceo glabro, foliis amplis ovali-oblongis cuspidiatis in petiolum attenuatis supra glabris nitidisque subtus subtilissime velutinis, thyro terminali denso ramis inferioribus verticillatis, bracteis bracteolisque setaceis calyce multo brevioribus, calycis brevipedicellati laciniis linear-acuminatis longissimis, antheræ loculis calcaratis suboppositis at connectivo oblongo discretis, fructu....  $\mathcal{U}$  In Guiana Anglicâ (Schomb. sine num.). Caulis crassus, probabiliter albus. Folia 10-11 poll. longa, 3-3½ poll. lata, repando-crenata. Thyrsus terminalis, pedunculatus, circiter 4 poll. longus, o u s. Racemi inferiores circa 1½ poll. longi, terni, bini in fasciculis oppositi, brevipedunculati, pubescentes. Flores oppositi, aut subsecundi. Caly pol li ce longior, laciniis æqualibus valde attenuatis ciliolatis laxis. Corollaæ q uipollucaris, coccinea. Stamina exserta. Antherarum loculi basi et apice non levantes, basi calcarati. Stigma capitatum ? (v. in h. Schomb. et Benth.)

**31. B. INVOLUCRATA** (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 143, Mart. h. fl. bras. p. 264 n. 455), foliis ovato-oblongis ovalibus utrinque acutis, spicis axillaris solitariis 2-5-nive fasciculatis capituliformibus folio duplo brevioribus bracteis duabus ovatis ad basin suffultis, bracteis bracteolisque propriis brevissimis subulatis strigiloso-hirtis, calycis lacinii lanceolatis. ♂ In silvis et sepiibus prope Sebastianopolin, Septembri, Decembri (Martius! Riedel! Luschnath!), ad viam Felisbertiam Brasiliæ, Maio (Luschnath!), Januario (Maxim. princ. Neuwied!, Schott! in h. mus. palat. vindob. n. 4734), inter frutices montis Tijucanare (Khotzky! in h. DC.). Di-cliptera speciosa Nees et M. in nov. act. ac. nat. cur. 11 p. 61. *Justicia trichantha* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. t. 4734. Differt a reliquis hujus generis bracteis binis ad spicæ basin ovatis acutiusculis brevissime petiolatis ventricosis pubescens circiter semipollicaribus et paulo longioribus rhachin totam occultantibus speciemque capituli exhibentibus. Rhachis recurva. Flores inferiores secundi, superiores suboppositi. Bractea et bracteolæ æquales, calyce multo breviores, brevi-subulate, strigiloso-hirtæ. Calyx 3 lin. longus, pubescens, lacinii oblongo-lanceolatis acutis apice strigiloso-barbatis. Corolla  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, purpurea, pubescens, tubo incurvo, basi intus maculis tribus magnis strigiloso-sericeis inter stamina notato, quæ notâ ad Sericographidem genus accedit hæc species. Caulis 6-7 pedes altus, ad genicula nodosus divaricato-ramosus. Folia  $3\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, 1 poll. lata, in costâ et venis costalibus strigilosa, cæterum glabra, obscure repando-crenata. (v. in h. Maximil. princ., Mart., monac., petrop., vindob., Hooker).

*B. microphylla*, foliis involucro corollâque minoribus. — In Brasiliâ (Pohl! l. c., Lund! n. 504 in h. DC.), in umbrosis prope Rio Janeiro, Augusto (h. imp. petrop.! n. 786). Frutex 6-8-pedalis ramis divaricatis (Riedel!). *Justicia microphylla* Pohl! ic. in h. mus. palat. vindob. n. 5692. Folia  $2\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 7-6 lin. lata, sæpe fere lanceolata. Involucrum 5 lin. longum. Corolla pollicaris. (v. in h. vindob., petrop., et DC.)

#### CXXV. ANISOTES (1). — *Justiciae spec. Forsk. et autt.*

Calyx profunde quinquefidus, lacinii æqualibus lanceolatis herbaceis. Corolla ringens, tubo brevissimo, labio superiore oblongo-lanceolato late fornicato, labium inferius bâsi involvente apice bilobo, labio inferiore duplo angustiore at æque longo fere linearie apice trifido laciniiæ æqualibus. Stamina duo, tubo inserta, labia æquantia. Antheræ biloculares, loculis in connectivo lanceolato obliquis, uno dimidio altius posito utroque basi corniculato. Stigma obtusum. Capsula.... — Frutex humanae altitudinis, Arabicus, rigidus, ramosissimus, ramis flexuosis distortis cicatricoso-nodulosis, juvenilibus foliis capitulisque pubescens-canis, corollis magnis coccineis. Flores capitato-gemini terni, capitulis brevipedunculatis axillaribus, bracteis 2 oppositis angustis involucratis, bracteolæ calyce brevioribus.

**A. TRISULCUS.** ♂ In Arabiâ Felici (Forskol!), ad Djebel Ras Arabiæ Felici (Botta! in h. mus. paris. n. 217), ad Wadi el Birsch prope Taas Arabiæ Felicis Januario (Lunz! n. 39 in h. Bentham et in h. gen. berol.). *Justicia trisulca* Vahl! symb. 2 p. 10, en. 1 p. 161 et h., Willd. sp. pl. 1 p. 97, ed. Dietr. 1 p. 403. *Justicia biflora* Lam. enc. méth. 2 p. 629. *Dianthera trisulca* Forsk. descr. p. 7. Folia oblongo-ovalia, obtusa, petiolata, pollicaria. Pedunculus petiolo duplo breviores, triquetri, plerique biflori. Flores exacte sessiles. Bracteæ involucrales lanceolatae, calycem in nostris æquantes. Bracteolæ ovato-lanceolatae, obtusiusculæ, calyci adpressæ eodemque duplo breviores. Corolla sesquipollucaris, pubescens. Ratio nominis trivialis nos latet. (v. in h. Vahl, paris., Nees, Bentham et Hooker).

(1) Doleo quod nomen jam adhibitum fuerit, sed non mulavi quia *Anisotes* Lindl. sectione solum (ex Endl. gen. 6149) videtur generis *Lythri*. (Alph. NG.)

*Gendarussea sedis incertæ.*

*JUSTICIA GLOMERATA* (Bl. bijdr. p. 786), caule suffruticoso subramoso erecto, foliis longiter petiolatis oblongo-lanceolatis acutis basi in petiolum angustatis parum denticulatis glaberrimis, spicæ terminali, floribus verticillatis, bracteis ovatis calyce brevioribus, corollæ labio superiore fornicato emarginato, inferiore semitrilobo. ♂ In umbrosis insulæ Nusæ Kambangæ, Octobri (Blume l. c.)

Subtribus VII. *ERANTHÈMÆ* N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 151 (excl. nonnullis generibus). Subtrib. *Justicieæ* div. 3 *Eranthemæ* Endl. gen. p. 705, Meism. gen. p. 297. *Justicieæ* div. 3 *Eranthema* N. ab E. in Wall. pt. as. rar. 3 p. 76 et in Lindl. introd. ed. 2 p. 285.

Calyx 5-partitus. Corolla hypocraterimorpha vel breviter infundibuliformis, tubo elongato limbo vel regulari subregulari 5-fido vel bilabiato labio superiore angusto. Stamina perfecta plerisque 2 infra fauces inserta, paucis 4 didynamia, tubo fauces versus innata. Antheræ biloculares, loculis parallelis muticis, rarius uno super altero posito. Capsula evidenter longiter unguiculata, a medio 2-4-sperma. Flores spicati vel glomerati, bracteis aliis latis, aliis parvis bracteolisque conformes. Spicæ vel simplices vel 2-3-chotomæ.

*CONSPECTUS GENERUM.*† *Corolla bilabiata.*

CXXVI. *Justicia* Linn. — Labium corollæ superius reflexum. Capsula 2-sperma. Spica latibracteata. — India orientalis, Africa australis.

CXXVII. *Rhinanthus* N. ab E. — Labium corollæ superius rectum. Capsula 4-sperma. Paniculæ axillares trichotomæ, floribus in apicibus ramulorum glomeratis parvibracteatis. — India orientalis, Madagascar.

? CXXVIII. *Sericospora* N. ab E. — Labium corollæ superius. Capsula 2-sperma. Spica infraterminalis parvibracteata. — America tropica.

†† *Limbus corollæ æqualis vel subæqualis.*

CXXIX. *Anisacanthus* N. ab E. — Corollæ limbus profunde 4-sfidus, laciniis linearibus recurvis, alterâ profundius discretâ. Stamina 2. Capsula 2-sperma. Flores axillares, subsessiles, secundi, foliis bractealibus decrescentibus. — Mexico, Insulæ Canariæ?

CXXX. *Eranthemum* R. Br. — Corolla hypocraterimorpha vel subinfundibuliformis. Stamina fertilia 2 subexserta, adjectis 2 abortivis dentiformibus. Capsula 4-sperma. Spicæ terminales et axillares, bracteis latis vel parvis subulatis. — India orientalis, Africa tropica, America tropica et extratropica, Nova Hollandia.

CXXXI. *Chamæranthemum* N. ab E. — Corolla infundibuliformis tubo mediocri. Stamina 4 didynama, inferiorum antheræ vel 1-loculares vel 2-loculares. Capsula tetrasperma. Spica vel spicæ terminales parvibracteatae. — America tropica, Mexico.

CXXXII. *Anthacanthus* N. ab E. — Corolla infundibuliformis tubo

mediocri. Stamiua 4, quorum 2 sterilia dentiformia; antherarum loculi plano-contigui. Capsula 4-sperma. Flores axillares solitarii vel fasciculati. Frutices plerique spinosi. — India occidentalis, Madagascar, Austrasia. Plautæ insulares.

CXXXIII. *Chætacanthus N. ab E.* — Corolla infundibuliformis, tubo angusto. Stamina 2. Capsula depresso-tetragona, in medio 4-sperma. Flores axillares solitarii, sessiles. Calycis laciniae angustæ, elongatæ. — Africa australis.

CXXVI. JUSTICIA N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 108 et in Lindl. introd. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 706, Meissn. gen. p. 297 (205). — Justiciae spec. Linn. et auct.

Calyx ad basin fere quinquepartitus, parvus, laciinis æqualibus. Corolla bilabiata-hypocraterimorpha, tubo longo, labio superiore angusto reflexo, inferiore trifido laciinis æqualibus. Stamina duo; antheræ biloculares, loculis parallelis basi subinæqualibus muticis. Capsula basi compressa, asperma, apice dilatata, depressa, ovata, cuspidata, bilocularis, disperma. Semina profunde cordata, margine elevata cincta, compressa, tuberculata, retinaculis suffulta. Retinacula uncinata, valida. — Frutices Indiae orientalis, Asiae minoris etc., foliis firmis, floribus rubicundis. Spica terminalis, bracteis herbaceis demum deciduis latis, floribus oppositis solitariis, bracteolis parvis subulatis.

1. J. *GYMNOSTACHY*, foliis ovato-ellipticove-oblongis subtus pubescentibus, spicâ terminali basi foliosâ, bracteis ovatis acutiusculis tomentosis calyce brevioribus, labio superiore lineari. § In Arabia Felicis monte Gebel Horeib, Junio Zuccarini ! in h. Hooker), Port Natal in Africâ australi ( Krause ! in h. (Bentham). Simillima J. *Ecbolio*, sed differt bracteis, pro generè exiguis. Reliquo habitu cum specimenibus J. *Ecbolii* in monte Gebel Horeib lectis congruit. An forma monstrosa J. *Ecbolii* ? (v. in h. Bentham et Hooker).
2. J. *EBCOLIUM* (Linn. fl. zeyl. p. 17, sp. pl. 1 p. 85), foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis pubescentibus subinde glabrescentibus, spicâ terminali tetragonâ, bracteis ovalibus integerrimis ciliatis mucronatis (rariusve muticis) fructum æquantiibus, labio superiore lineari reflexo. § In insula Zeylon (Burmann), in Indiæ nemoribus (Roxb. fide h.; sed reliquarum collectionum omnium exempla ad J. dentatam spectant), in præruptis montis Sedder (Sidr) prope Harames in valle Arabicâ Fatme, Martio (Schimper! Fischer!), Djennat in Arabiâ (Botta !), in monte Gebel Horeib Arabiæ Felicis. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 108. Fabr. helmst. p. 217, Mill. dict. n. 8, Willd. sp. pl. 1 p. 85, ed. Dietr. 1 p. 365 (excl. syn. Rheed. et Plucken.), Willd. h. ! n. 307 (spec. Klein.), Vahl symb. 1 p. 2, 2 p. 14, en. 1 p. 117 et h. ! (spec. Rottler), Rœm. et Sch. syst. 1 p. 144, Ait. hort. hew. ed. 1, 1 p. 26, Willd. en. hort. berol. 1 p. 117, Link en. 1 p. 29, bot. mag. n. 1847, Burm. fl. ind. p. 7, Wall. cat. n. 2432 i, k (h. madr. ! et Heyne !), Wight h. propri. ! n. 2097, ic. 2 t. 463 h. æg.-arab. un. itin. n. 760. Adhatoda spica longissima, flore reflexo Burm. thes. zeyl. p. 7 t. 4 f. 1. Arbor Zeylanica, floribus cœruleis in spicâ dispositis, Herin. mus. zeyl. p. 33. Adhatoda-Zeylanica, plantaginis folio h. Garcin. Corzaarab. Botta ! in h. mus. paris. dupl. n. 297. Hæc vera est J. *Ecbolium* Linn., cui bracteæ evidenter ciliatæ sunt et integerrimæ. Pubescens, tam caulis quam foliorum, subtilissima quidem, sed satis densa. Folia 3-3½ poll. longa, 1-1½ pollicis lata, apice attenuata quidem, sed obtusa, basi acutâ in brevem petiolum decurrentia, utrinque puberula. Bracteæ unguiculares, obtusæ, mucronulo magis minusve distincto, subinde et omnino rotundatae (h. DC. e Pohdichery), integerrimæ, moliter ciliatæ. Tubus corollæ bracteæ duplo longior; limbus tubum dimidium æquans,

lacinii labii ovalibus, labio superiore linearis bidentata. Capsula vix semipollucaris. (v. in h. Wallich, Wight, Hooker, Willd, etc.)

$\beta$ . folis glabris. — Naoal, regn. Mascate (Aucher-Eloy! herbier de l'Orient n. 5224 in h. Moricand et Hooker).

$\gamma$ . *ligustrina*, caule glabro, foliis pubescentibus oblongis brevipetiolatis bracteis ovali-oblongis oblongis. — India orientalis (Rottler! in h. Vahl). *Justicia ligustrina* Vahl en. 1 p. 118 et h., Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 367. Corolla paulo minor, quam in formâ communis, limbo purpureo-rascente. (v. in h. Vahl).

$\delta$ . *mollis*, tota molliter pubescens, bracteis ovatis obtusissimis muticis. — Pondichery (h. Hooker!), Madras (Griffith! in h. Bentham).

3. J. *LÆTEVIRENS* (Vahl en. 1 p. 118), spicis terminalibus oblongis imbricatis, bracteis foliis lanceolatis attenuatis glabris.  $\mathcal{Z}$  In Indiâ orientali (Vahl). — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 367. Pallide vires. A var.  $\beta$  glabré J. Ecbolii viz aliter differt ac foliis bracteis angustioribus, his margine etiam nudis.

4. J. *STROBILIFERA* (Lam. ill. 1 p. 36), foliis elliptico-lanceolatis, spicis axillaribus terminalibus imbricatis, bracteis ovatis conduplicatis nervosis glaberrimis.  $\mathfrak{Z}$  In Madagascar (h. Lamarck!). — Vahl en. 1 p. 117. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 379. Spicæ biplicares. Corolla J. Ecbolii. Bracteæ  $\frac{2}{3}$  poll. longæ, ovato-lanceolatae (Vahl). An var. J. Ecbolii?

5. J. *EMARGINATA*, foliis ovalibus utrinque acutis pubescentibus, spicâ terminali laxiusculâ, bracteis late obovatis emarginatis ciliatis mucronatis fructu longioribus, labio superiore linearis reflexo.  $\mathfrak{Z}$  Probabiliter ex Indiâ orientali. Vidi specimen vetustum, nomine adscripto: *Justicia Adhatoda* in h. Mart.; Coromandel (Leschenault! in h. mus. paris. et Nees n. 107 Nelli-tcher mal.). Differt a reliquis bracteis late emarginatis saltem rebus mucrone medii sinus sat conspicuo præditis. Quod ad corollam J. Ecbolio similis est. (v. in h. Mart. et Nees).

6. J. *ROTUNDIFOLIA* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 108, h. Wight propr. n. 2008; h. DC.), spicâ terminali tetragonâ, bracteis subrotundis subdenticulatis mucronatis fructu duplo brevioribus foliisque elliptico-ovatis obtusis glabris, labio superiore linearis reflexo.  $\mathfrak{Z}$  In humidis prov. Tanjore prope Negapatam, fréquentissime (Wight!), in planitie circa montes Nilagiricos (Schmidt!). Floret per totum annum. *Justicia Ecbolium* h. Wight. Wall. cat. n. 2432, l.— Ab J. Ecbolio distincta: caule humiliore, foliis parvis, 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longis, sessilibus obtusis elliptico-subrotundis, bracteis subrotundis apice rotundatis basi nonnihil attenuatis, inæqualiter argute denticulatis brevi mucronulo præditis, capsulâ semper brevioribus; corollâ minore, labii inferiores lacinii obovatis, superiore labio subulato. (v. in h. Wallich, Wight et DC.)

7. J. *SYRINGIFOLIA* (Vahl en. 1 p. 117. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 367), foliis subcordato-ovatis glabris, spicâ terminali, bracteis oblongis acutis, labio superiore linearis reflexo.  $\mathfrak{Z}$  In Madagascar (ex h. Thouin. Vahl). Valde affinis J. Ecbolio, differt foliis basi non attenuatis neque apice acuminatis sed solummodo attenuatis (2-pollicariibus). Corolla cœrulea, extus pubescens. (Vahl).

8. J. *LIVIDA* (h. Hamilt. Wall. cat. n. 2482 c.), foliis oblongis utrinque aquatinatis glabris nitidis, petiolis obtuse marginatis (immarginatis), spicâ terminali tetragonâ, bracteis ovalibus longe cuspidatis repando-subdentatis ciliatis capsulâ paulo brevioribus, labio superiore linearis reflexo.  $\mathfrak{Z}$  In Indiâ orientali. *Justicia fasciculata* h. Russell! Wall. cat. 2432 h. *Justicia dentata*. var.  $\alpha$  N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 108. (v. in h. Wall.)

9. J. *DENTATA* Klein (Wight h. propr. u. 2009), foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis glabris, petiolis foliaceo-marginatis, spicâ terminali tétragonâ, bracteis ovatis longe cuspidatis erosio-dentatis pubescentibus capsulam æquantibus, labio superiore linearis-reflexo.  $\mathfrak{Z}$  In nemoribus Indiæ, Segnaen, Avam-contra, in ripâ Gangeta ad Paturgatta (Wallich!), Assam superiore (Jenkins!)

in h. Hooker et Bentham, Griffith! in h. Hooker). *Justicia dentata* var.  $\beta$  N. ah E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 108. *Justicia denticulata* Klein! inh. Willd. n. 359 (spec. Klein et Roxburgh). *Justicia dentata* Link Jahrb. d. Gewachsk. 1, 3 p. 49, Schult. mant. 1 p. 130, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 366. *Justicia Echolium* Wall. cat. n. 2432 h. c. non Linn. Folia hasi cuneiformia, apicem versus attenuata. Bracteæ longe cuspidatæ, inæqualiter eroso-dentatæ, puberulæ. Corollæ tuhos longissimus, labio superiore lineari. Capsula bracteam æquans, vel parumper tantum excedens. (v. in h. Wallich, Wight, berol. etc.)

*Species dubiae.*

10. J. LOUREIRIANA, caule fruticoso erecto 6-pedali, ramis longis debilis sulcatis, foliis elliptico-lanceolatis subserratis glabris, bracteis lanceolatis deciduis, racemis terminalibus compositis oblongis erectis, corolla alba galea concavâ bifida acutâ, labio inferiore trifido, staminibus 2 brevibus faucibus insertis, antheris ohlongis, capsula oblongâ 4-sulcâ hiloculari polyspermâ.  $\delta$  In locis agrestibus Cochinchinæ (Loureiro). Phlogacanthi species videtur.
11. J. LANCEA (Thunb. Linn. transact. 2 p. 338), foliis lanceolatis integris, floribus verticillato-aggregatis. (1) In Japoniâ (Thunberg). Vahl en. 1 p. 113. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 411. Caulis subpedalis, tetragonus, tenuissime pubescens. Folia inferiora ovato-oblonga, superiora lanceolata, pollicaria. Flores sessiles. Bracteæ et calyces apice piliferi (Thunberg).
12. J. RETICULATA (Lam. Vahl en. 1 p. 157. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 412), foliis ohlongis obovatis, spicis axillariis terminalibusque filiformibus, flori-  
hus distantibus, bracteis setaceis. Patria.... Caulis herbaceus, spithameus, hasi repens. Folia  $\frac{1}{2}$  poll. longa, hasi acuta, venis pallidioribus reticulata. Spica biplicaris. Flores parvi. Antheræ una super altera (Vahl l. c.) — Ad genus Rhytidoglossam pertinere, vix duhitahis, et probabiliter inter species accuratius descriptas invenietur.

*Species incertæ sedis et non eruendæ.*

13. J. VELLOZII (Rœm. et Sch. syst. 1 p. 166. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 396), caule erecto subramoso piloso, foliis ovato-oblongis utrinque pilosis, spicis solitariis terminalibus. In Brasiliâ. Dianthera n. 2 Vandelli in script. de plant. hisp. lusit. bras. p. 71. Conf. Beloperone hirsuta n. 28.
14. J. BIFLORA (Vahl symb. 2 p. 9, cn. 1 p. 152, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 399), pedunculus axillarius bifloris folia ovata æquantibus, bracteis subulatis.  $\delta$  In Indiâ orientali (Schuhmacher apud Vahl). Caulis tetragonii articuli triplicares. Folia pollicaria. Petioli laxi, inferiores longitudine foliorum. Pedunculi filiformes. Bracteæ duæ, ohlongæ, petiolatae, ad hasin pedicellorum, florales 3 sub singulo calyce, inæquales, 2 suhulatae. Antheræ geminæ (sensu vet.) An Rhaphidosporæ ciliatae formâ?
15. J. MORETIANA (Vahl en. 1 p. 162, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 114), foliis lanceolatis glabris, floriis axillariis solitariis terminalibus spicatis, labio corollæ inferiore trifido. In arenosis Indiae (Burmann). Adhatoda flore solitario ex singulâ foliâ alâ, etc. Burm. thes. zeyl. p. 7 t. 3 f. 1. Adhatodæ (Tylo-  
glossæ) species esse videtur proxima sane Adhatodæ asperæ et Zeylanicæ.
16. J. NIGRICANS (Lour. cochinch. ed Willd. 1 p. 30, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 372), fruticosa, foliis lanceolato-linearibus obtusis nigricantibus, spicis terminalibus distichis.  $\delta$  In locis agrestibus Cochinchinæ (Lour.), 6-pedalis. Rami et folia lineis nigris notata. Flos albus, rubro variegatus. Corolla lahium superius lanceolatum, integrum, erectum, inferius trifidum, reflexum. Bracteæ setaceæ (Lour.).
- 17? J. TUNICATA (Afzelius remed. guiveens. 3 p. 17, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 378), foliis lanceolatis acuminatis glabris, spicis terminalibus axillariis que, bracteis foliolisque calycinis subulatis. (2) In Sierra Leonæ (Afzelius). Caulis pedalis erectus, parum ramosus, teres, hirtus, nigricans, epidermide

passim in tunicam xerampelinam tandem derumpentem deciduum tumente.  
Folia glabra, petiolo costâque subtus hirtis. Calyx cum bracteis hirtus et subglandulosus. Corolla alba, subbilabiata, labio altero 3-partito altero 3-fido. Tubus gracilis, lacinias plus quam dimidio longior. Antheræ æquales, subexsertæ (Afzelius).

*Species exclusæ.*

- J. ABNORMALIS Pohl = Dicliptera Pohliana.
- J. ACANTHIFOLIUM h. Willd. = Aphelandra acanthus.
- J. ACAULIS Linn. = Elytraria crenata.
- J. ACAULIS var.  $\beta$  Willd. = Elytraria virgata.
- J. ACINOIDES hort. Kew. = Peristrophe caulopsis.
- J. ACKERMANNI Mart. = Rhytidlossa Caracasana.
- J. ACICULARIS Sw. = Anthacanthus acicularis.
- J. ACUMINATA Vahl = Dicliptera acuminata.
- J. ACUMINATA Wall. = Peristrophe acuminata var.  $\beta$ .
- J. ACUTIFOLIA Tafall. = Aphelandra acutifolia.
- J. ADHATODA Linn. = Adhatoda Vasica.
- J. DESCENDENS R. Br. = Rostellularia procumbens var.  $\delta$ .
- J. AJUGOIDES h. Hamilt. Wall. = Nelsonia tomentosa  $\gamma$  ajugoides.
- J. ALATA Vahl = Andrographis alata.
- J. ALBA hort. berol. = Monechma bracteosum.
- J. ALBA Roxb. = Eranthemum album.
- J. ALBIFLORA Bl. = Peristrophe albiflora.
- J. AMABILIS Wall. = Cryptophragnium venustum.
- J. AMERICANA Vahl = Rhytidlossa pedunculosa.
- J. AMENA h. Mart. = Beloperone plumbaginifolia.
- J. AMYGDALINEA E. M. = Adhatoda (Tyloglossa) capensis.
- J. AMYGDALINA var. a. E. M. = Adhatoda (Tylogl.) capensis  $\gamma$  arenosa.
- J. AMYGDALINA var. b. E. M. = Adhatoda (Tylogl.) protracta.
- J. ANAGALLIS Mart. = Rhytidlossa Anagallis.
- J. ANDROSÆMIFOLIA Sieb. = Rhytidlossa androsæmifolia.
- J. ANGUSTIFOLIA Pohl = Rhytidlossa angustifolia.
- J. ANNUA Am. = Dicliptera sexangularis.
- J. ANTIRRHINA Nees et M. = Leptostachya antirrhina.
- J. APPENDICULATA Vahl = Beloperone appendiculata.
- J. APPRESSA Forsk. = Barleria Prionitis.
- J. ARGYROSTACHYA Wall. = Adhatoda argyrostachya.
- J. ARISTATA Vahl = Hypoestes aristata.
- J. ARISTATA Wall. N. ab E. = Anthocometes aristatus.
- J. ARMATA Sw. = Anthacanthus armatus.
- J. ARRABIDE Steud. = Amphiscopia Beyrichii.
- J. (DIANTHERA) ARVENSIS Vell. (Justicia arvensis Steud.) est species ab ordine aliena.
- J. ASPERA Perrott. = Blepharis asperrima.
- J. ASPERULA Wall. = Phlogacanthus asperulus.
- J. ASSURGENS Linn. = Dicliptera assurgens.
- J. ATRAMENTARIA Benth. = Sericographis Mohintli.

- J. AUREA Schlechtd. == *Cyrtauthera aurea*.  
 J. AURICULATA Wall. == *Strobilanthes auriculata*.  
 J. AUSTRALIS Gillies == *Adhatoda* (Tylogl.) *Gilliesii*.  
 J. BAPHICA Spr. == *Peristrophe tinctoria*.  
 J. BARBATA Bertol. == ? *Rhytidlossa barbata*.  
 J. BARBATA Forst. == *Dicliptera Forsteriana*.  
 J. BARLERIOIDES Schott == *Thyrsacanthus harlerioides*.  
 J. BENGALENSIS Spr. == *Nelsonia tomentosa*.  
 J. BETONICA Linn. == *Adhatoda Betonica*.  
 J. BETONICA Wall. == *Adhatoda ramosissima*.  
 J. BETONICÆFOLIA hort. berol. == *Adhatoda ramosissima*.  
 J. BIBRACTEATA Wall. == *Peristrophe tinctoria*.  
 J. BICALYCULATA Vahl == *Peristrophe bicalyculata*.  
 J. BICOLOR Sims == *Eranthemum bicolor*.  
 J. BIFLORA hort. == *Adhatoda* (Tylogl.) *furcata*.  
 J. BIFLORA Lam. == *Anisotes trisulcus*.  
 J. BISPINOSA Forsk. == *Barleria bispinosa*.  
 J. BIVALVIS Linn. == *Dicliptera bivalvis*.  
 J. BIVALVIS Roxb. == *Peristrophe commutata*.  
 J. BLEPHAROPHYLLA Mart. == *Chameranthesmum Beyrichii*.  
 J. BLEPIAROSTEGIA E. M. == *Monechma angustifolium*.  
 J. BLUMEANA Klotzsch == *Rostellularia obtusa*  $\beta$ .  
 J. BONARIENSIS Gillies == *Adhatoda* (Tylogl.) *Tweediana*  $\beta$  *angustifolia*.  
 J. BRACHIATA Pursh == *Dicliptera brachiata*.  
 J. BRACHIATA Rich. == *Thyrsacanthus uitidus*.  
 J. BRACHIATA Salzm. == *Dicliptera mueroniifolia*.  
 J. BRACHIATA Young == *Rhytidlossa brachiata*.  
 J. BRACHIOIDES Roth == *Adhatoda orixensis*.  
 J. BRACHIONODES Spr. == *Adhatoda orixensis*.  
 J. BRACHYSTACHYA h. Willd. == *Rostellularia hrachystachya*.  
 J. BRACTEOLATA Jacq. == *Thyrsacanthus hracteolatus*.  
 J. BRACTEOLATA Willd. en. et h. == *Thyrsacanthus nitidus*.  
 J. BRASILIANA Roth == *Beloperone Amherstiae*.  
 J. (DIANTHERA) BRASILIENSIS Vell. == *Amphiscopia Beyrichii*.  
 J. CALCARATA Hochst. == *Adhatoda* (Tylogl.) *Rostellaria*.  
 J. CALCARATA Wall. == *Rhinacanthus calcaratus*.  
 J. CALLISTACHYA Schlechtend. == *Thyrsacanthus callistachyus*.  
 J. CALYCOTRICHIA Link et O. == *Schaueria calycotrichia*.  
 J. CALYTRICHA Hook. == *Schaueria calycotrichia*.  
 J. CANCELLATA Thunh. == *Hypoestes cancellata*.  
 J. CANESCENS Lam. == *Nomaphila canescens* (*vide supplementum*).  
 J. CANESCENS Wall. cat. == *Dicliptera bupleuroides*.  
 J. CAPENSIS Eckl. == *Peristrophe Capensis et cernua*.  
 J. CAPENSIS h. Eckl. (*ex parte*) == *Rhytidlossa ciliata*.  
 J. CAPENSIS Linn. == *Adhatoda* (Tylogl.) *Capensis*  
 J. CAPENSIS E. M. (*ex parte*) == *Adhatoda* (Tylogl.) *incana*.

- J. CAPENSIS Thunb. == Adhatoda (Tylogl.) protracta.  
 J. CAPENSIS Thunb. defin. == Adhatoda (Tylogl.) Capensis  $\beta$  obovata.  
 J. CAPENSIS  $\beta$  glandulosa Willd. == Adhatoda (Tylogl.) protracta.  
 J. CARACASANA Jacq. == Rhytidlossa Caracasana.  
 J. CARACASANA Sieb. == Adhatoda Vasios.  
 J. CARACASANA h. Willd. == Rhytidlossa secunda.  
 J. CAREYANA hort. bot. et h. Ham. calc. == Rhaphidospora glabra  $\beta$ .  
 J. CAREYANA Newm. == Graptophyllum hortense.  
 J. CARIPENSIS H. B. et Kth. et h. Willd. == Rhytidlossa secunda.  
 J. CARNEA bot. mag. == Cyrtanthera magnifica  $\beta$  minor.  
 J. CARNEA. == Cyrtanthera Pohliana.  
 J. CARTHAGENENSIS h. Bentham. == Adhatoda (Tylogl.) sphærosperma.  
 J. CARTHAGENENSIS Linn. et Jacq. == Adhatoda (Tylogl.) Carthagensis.  
 J. CARTHAGENENSIS N. et M. == Adhatoda (Tylogl.) Felisertiana.  
 J. CARTHAGENENSIS Vahl == Beloperone Lamarciana.  
 J. CARTHAGENENSIS h. Willd. == Blechum Linnæi.  
 J. CAULOPSILA E. M. == Peristrophe caulopsis.  
 J. CEPHALOTES h. Willd. == Lepidagathis hyalina.  
 J. CHINENSIS Burm. == Dicliptera Burmanni.  
 J. CHINENSIS Roxb. == Dicliptera Roxburghiana.  
 J. CHINENSIS var. Roxb. == Dicliptera hirtula var.  $\beta$ . angustifolia.  
 J. CHINENSIS Vahl == Dicliptera Chinensis.  
 J. CHINENSIS Vahl symb. et Wall. == Dicliptera micranthes.  
 J. CHINENSIS, canescens, rotundifolia Wall. (ex parte). == Dicliptera bupleuroides.  
 J. CHINENSIS var. 1. Roxb. == Dicliptera crinita  $\beta$  angustifolia.  
 J. CHINENSIS  $\beta$  h. Hamilt. == Dicliptera cardiocarpa et cuneata.  
 J. CHINENSIS  $\gamma$  h. Hamilt. == Dicliptera hirtula  $\beta$  angustifolia.  
 J. CHRYSOTRICHOMA Pohl == Adhatoda (Tylogl.) chrysotrichoma.  
 J. CILIARIS h. Russell. == Rungia parviflora.  
 J. CILIARIS Linn. == Schwabea ciliaris.  
 J. CILIATA Jacq. == Schwabea ciliata.  
 J. CILIATA Pers. == Beloperone ciliata.  
 J. CINERASCENS h. Willd. == Jacobinia sericeotomentosa.  
 J. CLANDESTINA h. Russell. == Cryptophragmium cordifolium.  
 J. CLAVATA Juss. == Dicliptera clavata.  
 J. CLINOPODIA E. M. == Dicliptera clinopodia.  
 J. COCCINEA Aubl. == Pachystachys coccinea.  
 J. COCCINEA Cav. == Anisacanthus virgularis.  
 J. COCCINEA h. Forsyth. == Rhytidlossa lucida.  
 J. COCCINEA Gouan == Adhatoda (Tylogl.) lithospermifolia  
 J. COCCINEA h. berol. == Pachystachys latior.  
 J. COCCINEA Lusch. == Beloperone plumbaginifolia.  
 J. COCCINEA h. Willd. == Pachystachys asperula.  
 J. COCCINEA h. monsp. == Beloperone nemorosa  $\alpha$ .  
 J. CŒRULEA Poir. == Dicliptera pubescens.  
 J. COLORATA h. Vahl == Erauthemum nervosum.

- J. (DIANTHERA) COMATA Vell. = Adhatoda (Tylogl.) cuneata.  
 J. COMATA Nees et M. = Leptostachya parviflora.  
 J. COMATA Salzm. = Leptostachya Martiana.  
 J. COMATA Sw. = Leptostachya comata.  
 J. COMOSA h. DC. = Beloperone Rohrii  $\beta$  latifolia.  
 J. COMOSA Vahl = Amphiscopia comosa.  
 J. CONFERTIFLORA Pohl = Schaueria lachnostachya.  
 J. CONSANGUINEA N. ab E. = Endopogon consanguineus.  
 J. CONSPICUA Wall. = Barleria conspicua.  
 J. CONVEXA E. M. = Adhatoda (Tylogl.) protracta  $\beta$   $\gamma$  convexa.  
 J. CORDIFOLIA Heyn. = Cryptophragmium cordifolium.  
 J. CORYMBOSA h. Willd. = Rhaphidospora glabra.  
 J. COBYMBULOSA Bertol. = Rhytidlossa corymbulosa.  
 J. COSTATA Mart. = Hygrophila longifolia.  
 J. CRENATA Pohl = Beloperone Amherstiae.  
 J. CRENULATA Pohl = Chætothylax Tocantinus.  
 J. CRINITA h. DC. = Sericospora crinita.  
 J. CRINITA Thunb. = Dicliptera crinita.  
 J. CRISPATA Pohl = Amphiscopia Beyrichii.  
 J. CRISTATA Jacq. = Aphelandra tetragona.  
 J. CRISTATA Pohl = Amphiscopia venosa.  
 J. CUNEATA h. Willd. = Adhatoda (Tylogl.) thymifolia.  
 J. CUNEATA Vahl en. = Adhatoda (Tylogl.) cuneata.  
 J. CUNEIFOLIA h. Hooker. = Anthacanthus cuneifolius.  
 J. CUNEIFOLIA N. et M. = Adhatoda (Tylogl.) cuneifolia.  
 J. CURVIFLORA Wall. = Phlogacanthus curviflorus.  
 J. CUSPIDATA Pers. = Dicliptera Peruviana.  
 J. CUSPIDATA Vahl = Dicliptera micrantha.  
 J. CYMOSA, UMBELLATA et DICHOTOMA h. madr. = Rhaphidospora glabra.  
 J. DALAORA Blanco = Peristrophe Dalaora.  
 J. DASYCLADOS Mart. = Rhytidlossa dasyclados.  
 J. DEBILIS Vahl = Monechma debilis.  
 J. DECUSSATA Roxb. = Adhatoda (Tylogl.) decussata.  
 J. DIANTHERA Vell. = Beloperone plumbaginifolia.  
 J. DICHOTOMA Blum. = Rhaphidospora dichotoma.  
 J. DICHOTOMA Rottl. et Willd. = Rhinacanthus communis  $\beta$  scandens.  
 J. DIFFUSA Vahl en. = Rostellularia Vahlii.  
 J. DIFFUSA Willd. = Rostellularia diffusa.  
 J. DIFFUSA  $\alpha$  imberbis Vahl = Rostellularia Vahlii.  
 J. DIVARICATA Lichtenst. = Adhatoda (Tylogl.) divaricata.  
 J. DIVARICATA h. madr. = Eranthemum montanum var.  $\delta$ .  
 J. DIVARICATA h. Willd. = Adhatoda (Tylogl.) divaricata.  
 J. DOHONA Hamilt. = Gendarussa vulgaris  $\beta$ .  
 J. DUBIA Forsk. = Monechma violaceum.  
 J. ECHIOIDES Linn. = Andrographis echioides.  
 J. ELEGANS Pohl = Sarotheca elegans.

- J. ELEGANS Pal. de Beauv. = *Eranthemum elegans*.  
 J. ELONGATA Vahl = *Cryptophragmum elongatum*.  
 J. ENSIFORMIS Elliott = *Rhytidglossa pedunculosa*.  
 J. ERIANDRA Salzm. = *Geissomeria nitida*.  
 J. EUSTACHIANA Jacq. = *Dicliptera Vahliana*.  
 J. EUSTACHIANA Vahl = *Dicliptera Vahliana*.  
 J. FALCATA Lam. = *Dicliptera lævigata*.  
 J. FASCIATA E. M. = *Adhatoda (Tylogl.) fasciata*.  
 J. FASCICULARIS N. ab E. = *Eranthemum Haenkeanum*.  
 J. FASTIGIATA Lam. = *Eranthemum montanum*.  
 J. FASTUOSA Linn. = *Hypoestes fastuosa*.  
 J. FILIFORMIS Ruiz = *Arrhostoxylum pedunculosum*.  
 J. FLAVA Dcile = *Barleria flava*.  
 J. FLAVICOMA Lindl. = *Schaueria calycotricha*.  
 J. FLEXIBILIS Bojer = *Hypoestes flexibilis*.  
 J. FÖTIDA Forsk. = *Dicliptera bivalvis*.  
 J. FOLIOLA h. Willd. = *Adhatoda (Tylogl.) cuneata*.  
 J. FAMOSA Willd. = *Beloperone nemorosa*.  
 J. FORSKOLII Vahl = *Hypoestes Forskolii*.  
 J. FORSKOLII h. Willd. (ex parte) = *Hypoestes purpurea*.  
 J. FRAGILIS Wall. = *Adhatoda (Tylogl.) ventricosa*.  
 J. FRAGILIS Wall. (ex parte) = *Adhatoda (Tylogl.) Neesiana*  
 J. FRONDOSA Vahl = *Dicliptera frondosa*.  
 J. FULGIDA Bl. = *Clinacanthus Burmanni*.  
 J. FULVICOMA Schlechtd. = *Beloperone comosa*.  
 J. FURCATA Jacq. = *Adhatoda (Tylogl.) furcata*.  
 J. GANGETICA Linn. = *Asystasia Coromandeliana*.  
 J. GENDARUSSA Linn. (sive *Gendarussa*). = *Gendarussa vulgaris*.  
 J. GENICULATA Vell. = *Beloperone longepetiolata*.  
 J. GENICULATA Sims = *Rhytidglossa geniculata*.  
 J. GENICULATA Wall. = *Rostellularia quinquangularis*.  
 J. GENUFLEXA N. et M. = *Rhytidglossa genuflexa*.  
 J. GLABRA Koenig = *Rhaphidospora glabra*.  
 J. GLABRA h. Rottl. = *Rhaphidospora glabra*.  
 J. GLANDULIFERA E. M. = *Rhytidglossa organoides*.  
 J. GLANDULOSA Pohl = *Adhatoda (Tylogl.) glandulosa*.  
 J. GLANDULOSA Roth = *Andrographis glandulosa*.  
 J. GLAUCA Rottl. = *Adhatoda (Tylogl.) Orixensis* ♂ *glaucia*.  
 J. GLOMERATA Bl. = *Gendarussarum species loci incerti*, vide p. 425.  
 J. GLOMERATA Pohl = *Beloperone glomerata*.  
 J. GONYSTACHYA Nees et M. = *Schaueria gonystachya*.  
 J. GRACILIFLORA Wall. = *Eranthemum graciliflorum*.  
 J. GRACILIS Lyall = *Hypoestes gracilis*.  
 J. GRANDIFLORA h. DC. = *Beloperone nemorosa* α.  
 J. GUTTATA Wall. = *Phlogaanthus guttatus*.  
 J. HEMATODES Schlechtend. = *Habracanthus haematodes*.

- J. HEDIOTIDIFOLIA Wall. = *Rostellularia hediotidifolia*.  
 J. HEDIOTIDIFOLIA Wall. bis. = *Phlogacanthus asperulus*.  
 J. HETEROPHYLLA Schlecht. = *Sericographis heterophylla*.  
 J. HETEROSTEGIA E. M. = *Dicliptera heterostegia*.  
 J. HIRSUTA Hornem. = *Strobilanthes hirsuta*.  
 J. HIRSUTA Pers. bis (n. 97.) = *Amphiscoopia inficiens*.  
 J. HIRSUTA Pohl = *Sericographis hirsuta*.  
 J. HIRSUTA Vahl = *Ruellia hirsuta*.  
 J. HIRTELLA Wall. = *Rostellularia procumbens* ♂.  
 J. HISPIDA Willd. = *Eranthemum hispidum*.  
 J. HONAMORIENSIS hort. madr. = *Eranthemum crenulatum* ♀.  
 J. HUMIFUSA Sw. = *Leptostachya comata* β humifusa.  
 J. HUMILIS Green. = *Rhytidglossa Havanensis*.  
 J. HUMILIS Mich. = *Rhytidglossa humilis*.  
 J. HUMULIFLORA Nees et M. = *Schaueria hunuliflora*.  
 J. HYPOCRATERIFORMIS Vahl = *Eranthemum hypocrateiforme*.  
 J. HYSSOPIFOLIA Gouan = *Anisacanthus virgularis*.  
 J. HYSSOFIFOLIA Linn. = *Adhatoda (Tylogl.) hyssopifolia*.  
 J. HYSTRIX Lam. = *Barleria solanifolia*.  
 J. JALAPPÆFOLIA Vahl = *Peristrophe jalappæfolia*.  
 J. JAPONICA Thunb. = *Rostellularia procumbens* β.  
 J. JAVANICA Lam. = *Peristrophe undulata*.  
 J. IMBRICATA Mir. = *Strobilarachis prismatica*.  
 J. IMBRICATA Vahl = *Elytraria tridentata*.  
 J. INÆQUALIS Bentham = *Rhytidglossa inæqualis*.  
 J. INCONSPICUA Wall. (n. 2475.) = species ignota.  
 J. INFICIENS Vahl = *Amphiscoopia inficiens*.  
 J. INFRACTA Burm. Bl., Vahl = *Rungia pectinata*.  
 J. INFUNDIBULIFORMIS Linn. = *Crossandra infundibuliformis*.  
 J. INTERCEPTA E. M. = *Rhytidglossa ciliata*.  
 J. INTERRUPTA Blanco = *Dioliptera loci incerti*.  
 J. INTERRUPTA Kunth = *Thyrsacanthus interruptus*.  
 J. INVOLUCRATA Roxb. = *Peristrophe tinctoria*  
 J. JUNcea R. Br. = *Rostellularia juncea*.  
 J. KERRIANA Steud. = *Dicliptera Vahliana*.  
 J. KLOTZSCHIANA Hoffmannsegg = *Graptophyllum hortense*.  
 J. LADANOIDES h. DC. = *Dicliptera Vahliana*.  
 J. LADANOIDES Lam. = *Adhatoda (Tylogl.) lithospermifolia*.  
 J. LADANOIDES Link = *Dicliptera Vahliana*.  
 J. LÆTA Mart. = *Rhytidglossa læta*.  
 J. LÆVIGATA Vahl ex ins. Jav. = *Dicliptera Javanica*.  
 J. LAMIIFOLIA Roxb. = *Nelsonia tomentosa* β lamiifolia.  
 J. LANCEOLARIA Roxb. = *Peristrophe lanceolaria*.  
 J. LANCEOLATA Forsk. = *Barleria noctiflora*.  
 J. LAPATHIFOLIA Vahl = *Eranthemum lapathifolium*.  
 J. LATEBROSA Koen. = *Dicliptera bupleuroides*.  
 J. LATEBROSA Roxb. = *Dicliptera bupleuroides*.

- J. *LATEBROSA* h. Russell etc. = *Andrographis paniculata*.  
 J. *LATEBROSA* Wight = *Dicliptera cuncata*.  
 J. *LATERITIA* h. Willd. = *Beloperone plumbaginifolia*.  
 J. *LATIFOLIA* Vahl = *Eranthemum crenulatum*.  
 J. *LAVANDULÆFOLIA* Pohl = *Rhytidglossa lavandulæfolia*.  
 J. *LEPTOSPERMIFOLIA* h. DC. = *Dicliptera Vahliana*.  
 J. *LEPTOSTACHYNA* Wall. = *Gymnostachyrum leptostachyrum*.  
 J. *LEUCANTHA* Blanchet = *Erianthemum albiflorum*.  
 J. *LEUCOPHLÆA* N. ab. E. = *Rhytidglossa leucophlœa*.  
 J. *LIGULATA* h. DC. = *Dicliptera resupinata*.  
 J. *LIGULATA* Lam. = *Peristrophe bicalyculata*.  
 J. *LINEARIFOLIA* Lam. = *Rhytidglossa pedunculosa*.  
 J. *LINEARIFOLIA* h. Vahl = *Rostellularia Vahlii*.  
 J. *LINEATA* Pers. = *Rhytidglossa lineata*.  
 J. *LINEATA* Wall. ex parte. = *Andrographis viscosa*.  
 J. *LINEATA* Wall. = *Peristrophe montana*  $\beta$  *silvestris*.  
 J. *LINEATA* Wall. = *Andrographis lineata*.  
 J. *LINEATA* Wall. = *Adhatoda (Tylogl.) Wynnaidensis*.  
 J. *LINEATA* Wight, Wall. = *Andrographis affinis*.  
 J. *LINEOLATA* R. et P. = *Rhytidglossa lineolata*.  
 J. *LINIFOLIA* h. Heyn. = *Rungia linifolia*.  
 J. *LITHOSPERMIFOLIA* hort. paris. = *Dicliptera resupinata*.  
 J. *LITHOSPERMIFOLIA* Jacq. = *Adhatoda (Tylogl.) lithospermifolia*.  
 J. *LITHOSPERMIFOLIA* Vahl en. = *Hygrophila guinanensis angustifolia*.  
 J. *LOBELIOIDES* Wall. = *Erianthera lobelioides*.  
 J. *LONGIFLORA* Heyn. = *Peristrophe montana*  $\beta$  *silvestris*.  
 J. *LONGIFLORA* Vis. = *Cyrtanthera longiflora*.  
 J. *LONGIFOLIA* Balbis = *Adhatoda (Tylogl.) reflexiflora*.  
 J. *LONGIFOLIA* Forst. = *Acanthus repandus*.  
 J. *LONGIFOLIA* h. Heyn. = *Hemichoriste montana*.  
 J. *LONGIFOLIA* Vahl = *Adhatoda (Tylogl.) longifolia*.  
 J. *LONGEPETIOLATA* Pohl = *Beloperone longepetiolata*.  
 J. *LONGISTAMINEA* R. et Pav. = *Thyrsacanthus longistamineus*.  
 J. *LONGISTAMINEA* Poepp. = *Arrhostoxylum pedunculosum*.  
 J. *LONGISTYLUS* Gillies = *Adhatoda (Tylogl.) Gilliesii*.  
 J. *LUCIDA* Andr. = *Rhytidglossa lucida*.  
 J. *LUCIDA* hort. berol. = *Thyrsacanthus nitidus*.  
 J. *LUPULINA* E. M. = *Adhatoda lapulina*.  
 J. *LUTEA* Pohl = *Schaueria sulphurea*.  
 J. *LUTEA* R. et P. = *Pachystachys lutea*.  
 J. *LYTHROIDES* Pohl = *Heinzelia lythroides*.  
 J. *MACILENTA* E. M. = *Rhinacanthus communis*  $\beta$  *scandens*.  
 J. *MACRANtha* Benth. = *Cyrtanthera macrantha*.  
 J. *MACROPHYLLA* Pohl = *Schaueria macrophylla*.  
 J. *MACROPHYLLA* Spr. = *Aphelandra squarrosa*.  
 J. *MACULOSA* Bojer = *Hypoëstes maculosa*.  
 J. *MADURENSIS* Burm. = *Dichoriste littoralis*.

- J. **MAGNIFICA** Pohl = Cyrtanthera magnifica.
- J. **MALABARICA** Ait. = Peristrophe bicalyculata.
- J. **MARTINICENSESIS** Jacq. = Dicliptera Martiniceusis.
- J. **MARTINICENSESIS** Sieb. = Anthacanthus Brownii.
- J. **MARUBIASTRUM** Blanchet = Hygrophila costata.
- J. **MAURITIANA** h. Willd. = Raphidospora glabra.
- J. **MEDIA** h. Hook. = Rostellularia jucea.
- J. **MEDIA** R. Br. = Rostellularia media.
- J. **MEGAPHYLLA** Pohl = Clistax speciosus.
- J. **MELGARIENSIS** h. Willd. = Aphelandra Melgariensis.
- J. **MEMBRANACEA** Rich. = Amphiscozia polystachya.
- J. **MICRANTHA** Pohl = Adhatoda (Tylogl.) adenostachya.
- J. **MICRANTHA** et **HISPIDA** Wall. = Rostellularia mollissima.
- J. **MICRANTHA** et **HISPIDA** Wall. = Rostellularia crinita  $\beta$ .
- J. **MICROPHYLLA** Lam. = Anthacanthus microphyllus.
- J. **MICROPHYLLA** Pohl = Beloperone iuvolucrata  $\beta$  microphylla.
- J. **MIRABILIOIDES** Lam. = Beloperone Lamarckiana.
- J. **MOCTLI** Sessè, Lagasca. = Sericographis Mohintli.
- J. **MOLLIS** E. M. = Adhatoda (Tylogl.) mollissima.
- J. **MOLLIS** Pohl = Sericographis rigida  $\beta$  mollis.
- J. **MOLLISSIMA** Wall. (ex parte) = Rostellularia molliissima.
- J. **MONTANA** h. Heyn. = Eranthemum strictum.
- J. **MONTANA** Rottler = Eranthemum montanum  $\delta$ .
- J. **MONTANA** Wall. = Hemichoriste montana.
- J. **MUCRONATA** R. et P. = Aphelandra mucronata.
- J. **MULTIFLORA** Vahl = Dicliptera multiflora.
- J. **MYSORENSIS** Klein = Dyschoriste cernua.
- J. **NASUTA** Linn. = Rhinacanthus communis.
- J. **NEESIANA** Mart. = Harpochilus Neesianus.
- J. **NEESIANA** Wall. = Adhatoda (Tylogl.) Neesiana.
- J. **NEMOROSA** Bertol. = Tetramerium nervosum.
- J. **NEMOROSA** Sw. = Beloperone nemorosa.
- J. **NERVOSA** Vahl = Eranthemum nervosum.
- J. **NILGHERRENSIS** Wall. = Adhatoda Nilgherrica.
- J. **NITIDA** Jacq. = Thrysacanthus nitidus.
- J. **NITIDA** h. Hænk. = Graptophyllum hortense.
- J. **NITIDA** Nees et M. = Schaueria Maximiliana.
- J. **NODICAULIS** Pohl = Beloperone nodicaulis.
- J. **NODOSA** Hook. = Beloperone Amherstia.
- J. **NUMMULARIA** Mart. = Amphiscozia Beyrichii.
- J. **NUMMULARIÆFOLIA** Vahl = Nelsonia nummulariæfolia
- J. **NUMMULARIÆFOLIA** Wall. = Eranthera serpyllifolia.
- J. **NUTANS** Burm. = Clinacanthus Burmanni.
- J. **OBLONGATA** Link = Beloperone plumbaginifolia.
- J. **OCHROLEUCA** Bl. = Adhatoda Betonica.
- J. **OCYMOIDES** Lam. = Dicliptera umbellata  $\beta$ .

- J. **ODORA** Vahl == Adhatoda (Tylogl.) odora.  
 J. **ODORATISSIMA** Bojer == Rhinacanthus osmospermus.  
 J. **OLEÆFOLIA** Schlechtend. == Adhatoda (Tylogl.) Capensis  $\alpha$  et  $\alpha^*$   
 J. **ONGYLANTHA** Pohl == Adhatoda cydoniæfolia.  
 J. **OPACA** Vahl == Barleria opaca.  
 J. **ORBICULATA** Wall. == Dicliptera micranthes  $\beta$  laxior.  
 J. **ORBICULATA** Wight == Eranthemum crenulatum  $\gamma$  angustifolium.  
 J. **ORCHIDEA** E. M. == Adhatoda (Tylogl.) orchiooides  $\beta$ .  
 J. **ORCHIOIDES** Linn. == Adhatoda (Tylogl.) orchiooides.  
 J. **ORCHIOIDES** h. Vahl (spec. Thunb.) == Sesuvium portulacastrum.  
 J. **ORGANOIDES** Vahl == Nelsonia tomentosa.  
 J. **ORIXENSIS** Roxb. == Adhatoda Orixensis.  
 J. **OVATA** Dietr. == Dicliptera Peruviana.  
 J. **OVATA** E. M. == Rhytidglossa ovata.  
 J. **OXYPHYLLA** DC. == Barleria micans.  
 J. **PACHYRRHIZA** Mart. == Eranthemum modestum  $\beta$  minus.  
 J. **PALATIFERA** Wall. == Eranthemum palatiferum.  
 J. **PANICULATA** Burm. == Andrographis paniculata.  
 J. **PANICULATA** Forsk. == Hypoestes Forskallii.  
 J. **PARASITICA** Lam. == Agamyla staminea.  
 J. **PARVIFLORA** Retz. == Rungia parviflora.  
 J. **PARVIFLORA** Vahl == Dipteracanthus parviflorus.  
 J. **PARVIFOLIA** hortnl. == Anthacanthus acicularis.  
 J. **PARVIFOLIA** Lam. == Adhatoda (Tylogl.) Tranquebariensis.  
 J. **PATULA** E. M. == Adhatoda (Tylogl.) hyssopifolia  $\gamma$ .  
 J. **PATULA** var.  $\alpha$ . E. M. == Adhatoda (Tylogl.) orchiooides.  
 J. **PATULA** Lichtenst. == Adhatoda (Tylogl.) patula.  
 J. **PAUCIFLORA** Vahl == Rhytidglossa sessilis.  
 J. **PECTINATA** Bl. == Rungia origanoides.  
 J. **PECTINATA** Linn. == Rungia pectinata.  
 J. **PECTINATA** h. madrasp. == Rungia parviflora  $\gamma$  submutica.  
 J. **PECTINATA** h. Vahl et Wall. == Rungia parviflora.  
 J. **PECTINATA** Wight == Adhatoda Nilghericæ.  
 J. **PECTORALIS** Jacq. == Rhytidglossa pectoralis.  
 J. **PECTORALIS** h. Willd. == Rhytidglossa scabra.  
 J. **PEDUNCULOSA** Michx. == Rhytidglossa pedunculosa.  
 J. **PENTASTICHA** h. Hamilt. == Nelsonia tomentosa.  
 J. **PERIPLOCÆFOLIA** Jacq. == Adhatoda (Tylogl.) periplocaefolia.  
 J. **PERIPLOCIFOLIA** h. gen. berol. == Adhatoda (Tylogl.) lithospermifolia.  
 J. **PERUVIANA** Cav. == Adhatoda (Tylogl.) fureata.  
 J. **PERUVIANA** Vahl == Dicliptera Peruviana.  
 J. **PETIOLARIS** E. M. == Adhatoda (Tylogl.) petiolaris.  
 J. **PICTA** Linn. == Graptophyllum hortense.  
 J. **PLICATA** Vahl == Adhatoda (Tylogl.) plicata.  
 J. **PLUMBAGINEA** Wall. == Asystasia plumbaginea.  
 J. **PLUMBAGINIFOLIA** Jacq. == Beloperone plumbaginifolia.

- J. POLYGONOIDES H. B. K. = Rhytidlossa polygonoides.
- J. POLYSPERMA Roxb. = Hemiadelphe polysperma.
- J. POLYSTACHYA Allam. = Tetramerium hispidum.
- J. POLYSTACHYA Lam. = Amphiscopia polystachya.
- J. PROCUMBENS Bl. = Rostellularia obtusa.
- J. PROCUMBENS Linn. = Rostellularia procumbens.
- J. PROCUMBENS Wall. ex parte. = Rostellularia peploides.
- J. PROCUMBENS Vahl en. = Rostellularia rotundifolia.
- J. PROCUMBENS δ Vahl = Rostellularia diffusa.
- J. PROCUMBENS et MOLLISSIMA Wall. ex parte = Rostellularia rotundifolia.
- J. PROLIXA E. M. = Rhytidlossa prolixa.
- J. PROSTRATA Schlecht. = Adhatoda (Tylogl.) leptantha.
- J. PRUNELLÆFOLIA Pohl = Ampliscopia Beyrichii β prunellæfolia.
- J. PRUNELLOIDES Lamk. = Ruellia hirsuta.
- J. PSEUDO-BETONICA Roth = Adhatoda Betonica z.
- J. PSYCHOTRIFOLIA Pohl = Beloperone nodicaulis.
- J. PSYCHOTRIODES h. Willd. = Rostellularia psychotrioides.
- J. PTYCHOSTOMA Wall. = Rhytidlossa ptychostoma.
- J. PUBESCENS Lam. = Cryptophragmum canescens.
- J. PUBESCENS Lam. = Nomaphila stricta.
- J. PUBESCENS Ruiz = Jacobinia sericeo-tomentosa.
- J. PUBESCENS Schult. = Adhatoda (Tylogl.) furcata.
- J. PUBESCENS Vahl = Dicliptera pubescens.
- J. PUBIGERA Wall. = Peristrophe pubigera.
- J. PULCHELLA Carey = Dicliptera angustifolia.
- J. PULCHELLA var. Carey = Dicliptera hupleuroides.
- J. PULCHELLA Roxb. = Eranthemum nervosum.
- J. PULCHELLA Wight = Eranthemum montanum γ fastigiatum.
- J. PULCHERRIMA Jacq. = Aphelandra pulcherrima.
- J. PULCHRA Pohl = Sericographis polita α pulchra.
- J. PULEGUM E. M. = Adhatoda (Tylogl.) protracta β microphylla.
- J. PUMILA Dietr. = Anisacanthus pumilus.
- J. PUNCTATA Vahl = Rhytidlossa punctata.
- J. PUNDUANA Wall. = Rungia Punduana.
- J. PURPURASCENS h. Hamilt. = Eranthemum purpurascens.
- J. PURPUREA h. Forsyth. = Beloperone nemorosa β glabra.
- J. PURPUREA Linn. = Rostellularia diffusa.
- J. PURPUREA Lour. = Peristrophe tinctoria.
- J. PURPUREA Poit. = Dicliptera Vahliana.
- J. PURPUREA Vahl = Hypoestes purpurea.
- J. PURPUREA h. Wight. Wall. = Peristrophe montana.
- J. PUSILLA Pohl = Nelsonia Pohlia.
- J. QUADRANGULARIS Hooker, Lindl. = Phlogacanthus asperulus var. violaceus.
- J. QUADRIFARIA Wall. = Adhatoda (Tylogl.) quadrifaria.
- J. QUADRIFARIA Vahl = Anisacanthus virgularis.
- J. QUINQUANGULARIS Koen. = Rostellularia quinquangularis.

- J. QUINQUANGULARIS Koen., Roxb. = *Rostellularia procumbens*  $\alpha$ .  
 J. QUINQUANGULARIS Wall. ex parte. = *Rostellularia Vahlii*.  
 J. RACEMOSA R. et P. = *Plagianthus racemosus*.  
 J. RACEMULOSA Wikstr. = *Tetramerium racemulosum*.  
 J. RADICANS Vahl = *Beloperone ciliata*.  
 J. RAMOSA Pohl = *Dregera ramosa*.  
 J. RAMOSISSIMA Roxb. = *Adhatoda ramosissima*.  
 J. REFLEXIFLORA Vahl = *Adhatoda (Tylogl.) reflexiflora*.  
 J. REPANDA Forst. = *Anthacanthus repandus*.  
 J. REPENS h. Deless. = *Rostellularia Royeniana*.  
 J. REPENS Linn. = *Rungia repens*.  
 J. REPENS Pers. = *Dicliptera tomentosa*.  
 J. REPENS h. Vahl = *Rungia parviflora*  $\beta$  *aspera*.  
 J. REPTANS Sw. = *Rhytidlossa reptans*.  
 J. REPTANS var. W. Arn. = *Rungia latior*.  
 J. RESUPINATA Hegew. = *Aphelandra Hænkeana*.  
 J. RESUPINATA ? Nuttall = *Dicliptera brachiata*.  
 J. RESUPINATA Vahl = *Dicliptera resupinata*.  
 J. RETORTA Vahl = *Dicliptera parvibracteata*.  
 J. RIVINIÆFOLIA Vis. = *Peristrophe speciosa*.  
 J. RIVINOIDES Wall. cat. = *Pædrota minima* h. Wight. *secundum* Steud.  
 J. ROHRII Vahl = *Beloperone Rohrii*.  
 J. ROSTRATA Bertol. = ? *Sarotheca rostrata*.  
 J. ROTTLERIANA Wall. = *Rhinacanthus Rottlerianus*.  
 J. ROTUNDIPOLIA E. M. = *Adhatoda (Tylogl.) rotundifolia*.  
 J. ROTUNDIFOLIA Wall. = *Rostellularia rotundifolia*.  
 J. ROXBURGHIANA Bl. = *Peristrophe Blumeana*.  
 J. ROXBURGHIANA h. hort. berol. = *Nomaphila corymbosa* Bl.  
 J. ROXBURGHIANA Røm. et Sch. = *Peristrophe tinctoria*.  
 J. RUBICUNDA h. Hamilt. = *Eranthemum crenulatum*  $\beta$ .  
 J. RUBRA Rohr = *Stemonacanthus macrophyllus*.  
 J. RUBRA Vahl = *Thrysacanthus ruber*.  
 J. RUBRA Wight = *Peristrophe montana*  $\beta$  *silvestris*.  
 J. RUPESTRIS Hochst. = *Monechma bracteosum*  $\beta$  *rupestre*.  
 J. RYANI Vahl = *Adhatoda (Tylogl.) Eustachiana*.  
 J. SALICARIA Pohl = *Rhytidlossa læta*.  
 J. SALICINA Jacq. = *Jacobinia sericea*.  
 J. SALICINA h. Vahl = *Gendarussa vulgaris*.  
 J. SALVIÆFLORA Kunth = *Sarotheca salviæflora*.  
 J. SALVIÆFOLIA Kunth = *Sarotheca salviæflora*.  
 J. SANGUINEA h. Willd. = *Habracanthus sanguineus*.  
 J. SANGUINOLENTA Vahl = *Cryptophragmum sanguinolentum*.  
 J. SCAERA h. Vahl = *Aphelandra pectinata*.  
 J. SCANDENS Michx. = *Dicliptera Vahliana*.  
 J. SCANDENS Vahl = *Rhinacanthus communis*  $\beta$  *scandens*.  
 J. SCHOTTII Pohl = *Schaueria Schottii*.

- J. SCORPIOIDES Linn. == *Henrya scorpioides*.  
 J. SECUNDA h. hort. berol. == *Rhytidlossa lucida*.  
 J. SECUNDA Vahl == *Rhytidlossa secunda*.  
 J. SECUNDIFLORA R. et P. == *Leptostachya secundiflora*.  
 J. SECUNDIFLORA Poepp. == *Leptostachya Poeppigiana*.  
 J. SERICEA R. et P. == *Jacobinia sericea*.  
 J. SERPENS h. DC. == *Hypoestes Alsine*.  
 J. SERPENS Vahl == *Hypoestes serpens*.  
 J. SERPYLLIFOLIA Rottler == *Erianthera serpyllifolia*.  
 J. (DIANTHERA) SERRATA Vell. == (*Justicia serrata* Steud.) est species ab ordine aliena.  
 J. SERRATA Humh. == *Barleria micans*.  
 J. SERRULATA Heyn. Wall. == *Cryptophragmum serrulatum*.  
 J. SESAMOIDES h. madr. == *Endopogon hypoleucus*.  
 J. SESSILIS Jacq. == *Rhytidlossa sessilis*.  
 J. SETIBRACTEA Pohl == *Rhytidlossa leucophleba*.  
 J. SEXANGULARIS h. gen. berol. == *Dicliptera assurgens*.  
 J. SEXANGULARIS Forsk. == *Dicliptera Chinensis*.  
 J. SEXANGULARIS Güldenst. == *Dicliptera Vahliana*.  
 J. SEXANGULARIS Linn. == *Dicliptera sexangularis*.  
 J. SEXANGULATA Cav. == *Dicliptera resupinata*.  
 J. SILVATICA Lour. == *Rhinacanthus communis*  $\beta$  scandens.  
 J. SILVESTRIS h. madr. Wall. == *Peristrophe montana*  $\beta$  silvestris.  
 J. SIMPLEX Don == *Rostellularia procumbens*.  
 J. SINUATA Banks == *Anthacanthus sinuatus*.  
 J. SPARSIFLORA Pohl == *Dicliptera (Dactylostegia) sparsiflora*.  
 J. SPATHULATA Klotzsch == *Adhatoda (Tylogl.) Carthagagenensis*.  
 J. SPATHULATA Nees et M. == *Beloperone spathulata*.  
 J. SPECIOSA Roxb. == *Peristrophe speciosa*.  
 J. SPHÆROSPERMA Vahl == *Adhatoda (Tylogl.) sphærospерma*.  
 J. (DIANTHERA) SPICATA Vell. == *Schaueria Schottii*.  
 J. SPICATA R. et P. == *Pachystachys Riedeliana*.  
 J. SPICIGERA Schlechtend. == *Sericographis Mohintli*.  
 J. SPINOSA Linn. == *Anthacanthus spinosus*.  
 J. SPINULOSA Hochst. == *Dicliptera micranthes*.  
 J. SQUAMOSA h. Willd. == *Rostellularia tenella* var.  $\beta$  squamosa.  
 J. STAMINEA Vahl == *Thrysacanthus longistamineus*.  
 J. STRAMINEA h. Willd. == *Jacobinia barlerioides*.  
 J. STRICTA Pohl == *Sericographis rigida*.  
 J. STRICTA Vahl == *Nomaphila stricta*.  
 J. SUAVEOLENS h. Willd. == *Rhytidlossa polygonoides*.  
 J. SUFFRUTICOSA E. M. == *Adhatoda (Tylogl.) tubulosa*.  
 J. SULCATA Vahl == *Adhatoda (Tylogl.) sulcata*.  
 J. SULPHUREA Pohl == *Schaueria sulphurea*.  
 J. SUPERBA hortul. == *Anisacanthus virgularis*.  
 J. TEMULENTA hort. Liverp. == *Beloperone Amherstiae*.

- J. *TENUIFLORA* R. et P. == *Rhytidoglossa tenuiflora*.  
 J. *TENUIFLORA* Wall. == *Haplanthus tener*.  
 J. *TENUIFOLIA* Spr. == *Rhytidoglossa tenuifolia*.  
 J. *TETRAGONA* h. Hooker == *Eranthemum tetragonum*.  
 J. *TETRAGONA* Vahl == *Aphelandra tetragona*.  
 J. *THYRSIFLORA* Roxb. == *Phlogacanthus thyrsiflorus*.  
 J. *THYRSOIDEA* Pohl == *Beloperone monticola* var.  
 J. *THYRSOIDES* Roxb. in h. Willd. == *Phlogacanthus thyrsiflorus*.  
 J. *TINCTORIA* Allam. == *Sericographis Mohintli*.  
 J. *TINCTORIA* h. calc. == *Peristrophe speciosa*.  
 J. *TINCTORIA* Hoffmannsg. == *Rhaphidospora dichotoma*.  
 J. *TINCTORIA* Lour. == ? *Dicliptera baphica*.  
 J. *TINCTORIA* Roxb. == *Peristrophe tinctoria*.  
 J. *TOMENTOSA* Willd., Roxb. == *Nelsonia tomentosa*.  
 J. *TOMENTOSA* Vahl == *Dicliptera tomentosa*.  
 J. *TRANQUEBARIENSIS* Linn. == *Adhatoda (Tylogl.) Tranquebariensis*.  
 J. *TRANQUEBARIENSIS* Roxb. == *Adhatoda (Tylogl.) Orixensis*.  
 J. *TRIANGULARIS* h. Heyn. == *Adhatoda (Tylogl.) Tranquebariensis*.  
 J. *TRIBRACTEATA* Spr. in h. hort. berol. == *Beloperone longepetiolata*.  
 J. *TRICHANTHA* Pohl == *Beloperone involucrata*.  
 J. *TRIDENTATA* E. M. == *Ramusia tridentata*.  
 J. *TRIFASCIATA* E. M. == *Adhatoda (Tylogl.) fasciata*.  
 J. *TRIFLORA* Forsk. == *Hypoestes triflora*.  
 J. *TRIFOLIATA* R. et Sch. == *Beloperone trifoliata*.  
 J. *TRINERVIA* Vahl == *Adhatoda trinervia*.  
 J. *TRINERVIA* Wall. ex parte. == *Adhatoda arenaria*.  
 J. *TRINERVIS* h. Vahl == *Adhatoda trinervia*.  
 J. *TRISULCA* Vahl == *Anisotes trisulcus*.  
 J. *TUBÆFORMIS* Bertol. == *Thyrsacanthus tubæformis*.  
 J. *TUBIFLORA* Wall. == *Phlogacanthus tubiflorus*.  
 J. *TUBULOSA* E. M. == *Adhatoda (Tylogl.) tubulosa*.  
 J. *UMBELLATA* Heyn. == *Rhaphidospora glabra* β.  
 J. *UMBELLATA* Vahl == *Dicliptera umbellata*.  
 J. *UMBELLATA* Wight == *Dicliptera parvibracteata*.  
 J. *UMBELLATA* Wall. == *Dicliptera cuneata*.  
 J. *UMBROSA* Benth. == *Cyrtanthera umbrosa*.  
 J. *UNDULATA* Vahl == *Peristrophe undulata*.  
 J. *VAHLIANA* Roth == *Rostellularia Vahlii*.  
 J. *VAHLII* Dœtr. == *Amphiscopia comosa*.  
 J. *VAHLII* β imberbis Roth == *Rostellularia rotundifolia*.  
 J. *VARIABILIS* Zuccar. == *Adhatoda (Tylogl.) furcata*.  
 J. *VARIEGATA* Aubl. == *Thyrsacanthus variegatus*.  
 J. *VASCULOSA* Wall. == *Adhatoda (Tylogl.) vasculosa*.  
 J. *VELASQUEZII* Bertol. == ? *Adhatoda (Tylogl.) Velasquezii*.  
 J. *VELLOZIANA* Rœm. et Sch. == ? *Beloperone hirsuta*.  
 J. *VENOSA* Pohl == *Amphiscopia venosa*.

- J. *VENOSA* h. Wight = *Endopogon Amomum*.  
 J. *VENTRICOSA* Hook. = *Adhatoda* (*Tylogl.*) *ventricosa*.  
 J. *VENUSTA* Wall. = *Cryptophragmum venustum*.  
 J. *VERTICILLARIS* Linn. = *Hypoestes verticillaris*.  
 J. *VESTITA* Schult. = *Nelsonia tomentosa*.  
 J. *VILLOSA* Pohl = *Beloperone hirsuta*.  
 J. *VINCOIDES* Lam. = *Anthacanthus vincoides*.  
 J. *VIOLACEA* Vahl = *Monechma violaceum*.  
 J. *VIRGATA* Wall. = *Leptostachya virgata*.  
 J. *VIRGULARIS* Salisb. = *Anisacanthus virgularis*.  
 J. *VIRIDIFLORA* Buckl. = *Rhytidlossa viridiflora*.  
 J. *VIRIDIS* Blanco = *Dicliptera loci incerti*.  
 J. *VIRIDIS* Gillies. = *Adhatoda* (*Tylogl.*) *Tweediana* ? *angustifolia*.  
 J. *VIScosa* Moon cat. = *Endopogon viscosus*.  
 J. *VITELLINA* Roxb. = *Endopogon* ? *vitellinus*.  
 J. *VULGARIS* Bertol. = *Adhatoda* (*Tylogl.*) *sphaerosperma*.  
 J. *WIGHTIANA* Wall. = *Rungia Wightiana*.  
 J. *WYNAADENSIS* Wall. = *Adhatoda* (*Tylogl.*) *Wynaadensis*.

*Species non nisi nomine note*.

- J. *CHELIONIDA* Rafin. fl. lud. p. 39.  
 J. *CRISTATA* Jacq. ic. pict. (?) f. 138.  
 J. *CYNANCHIFOLIA* R. Br. in Salt abyss.  
 J. *INCONSPICUA* Wall. cat. n. 2475.  
 J. *ROTTLERIANA* Wall. cat. n. 2477.

CXXVII. *RHINACANTHUS* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 108 et in  
*Lindl. introd. ed. 2* p. 285, *Endl. gen. p. 706*, *Meign. gen. p. 297* (205). —  
 Justiciae specc. Linn. et aut.

Calyx regulariter quinquepartitus, bracteis bracteolisque parvis subulatis. Corolla hypocraterimorpha, bilabiata, tubo longo gracili, labio superiore angusto, inferiore trilido lacinias æqualibus. Stamina duo, faucibus inserta; antheræ biloculares, muticæ, loculo altero supra alterum serie fere linearí positæ. Capsula clavata, basi longo tractu compressa, commissuræ valvularum contigua, asperma; in parte superiori quadriovulata, tetra-vel abortu disperma. Dissepimentum completum, adnatum. Semina ovalia, biconvexa, retinaculis suffulta odorata. Retinacula concava, obtusa. — Fructices Indici, laxi, subscandentes. Paniculæ axillares in terminalè trans-euntes, trichotomæ, ramis bifidis. Flores circa apices ramulorum agglomerati vel brevispicati, albi vel rubicundi.

1. *R. COMMUNIS* (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 109, Wight h. propr. n. 2010, ic. 2 p. 464), paniculis axillaribus terminalique bi-trichotomis patulis, labio superiore linearí recto, foliis oblongis vel ovato-oblongis. In Indiæ orientali.

α. Glabra vel pubescens, foliis oblongis utrinque æqne attenuatis canaque glabriusculis, paniculis lateralibus sepe dichotomis. — In Madras et Negapatam, culta autem et vix indigena iis locis (Wight in litt.) « Non nisi in hortis inventi, neque scio, unde sit introducta. Floret per totum annum, sed nunquam maturat fructus (Roxburgh); in collibns, Deyra vicinis (Wall. cat. n. 2498 ex parte); in Govindungā et Daudnaghur (Heyne!); in Madras (Wight!); Ambala ex horto (Edgeworth). Justicia nasuta Linn. sp. pl. p. 63, Willd. sp. pl. ed. Dietr. I p. 383 et h.! n. 333, Vahl en. I

- p. 144 et h.! h. DC.! R. et Sch. syst. 1 p. 156 mant. 1 p. 139, Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 121 ed. a. 1832 p. 120, Blume bijdr. p. 785, Wall. cat. n. 2440 a-d, f., g et n. 2498 b (ex parte casu admixta), Blanco fl. de filip., p. 14, Sieb. fl. Maurit. n. 247. *Justicia Gendarussa Macrae!* n. 425 in h. Bentham. *Pulicilli Rheede* herb. malab. 9. p. 135 t. 69. *Naga-mallighi Tamul* (*Leschenault!*). *Nomen sanscr. Yoothika-purnee.* Beng. *Jovi-pana Teling*, et *Tamul*. *Nagamulli vel Jasminum Cobre* de *capella* (Roxb.), *Javan-Trebe*. Japan, Kalawara, damon Sarong Burung (Blume), (v. in h. Wallich, paris, (spec. Sonnerat.), Hooker, berol. etc.).
3. Magis minusve villosa, foliis ovato-oblongis, basi minus angustatis, ratione longitudinis latioribus, paniculis lateralibus trichotomo-dichotomis, ramis scandentibus? — Spontanea in angustiis nemorosis montium Paul-gat Chury chita (Wight!), Pondicheri Commers.! in h. Hooker, Perrottet! in h. Bentham.), Tanschanibr (Koenig! in h. Vahl), Mergui (Griffith! in h. Hooker), insulâ Ceylon ad Paradeniam (Macrae! in h. Bentham, Walker! in h. Hooker), in Javâ ad sepes, floret omni tempore (Blume, Zollinger! pl. jav. n. 627), insulâ Mauriti (Sieber!), in Madagascar et Bourbon (Commers.! in h. Vahl). In Prom. b. sp. (Drège!) *Rhinacanthus communis* Moritz! in Zolling. pl. jav. p. 48 n. 627, in h. DC. *Justicia scandens* Vahl symb. 2 p. 7, en. 1 p. 131, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 383, R. et Sch. syst. 1 p. 150, Wall. cat. n. 2440. e. *Justicia macilenta* E. M.! cat. pl. Drèg. a. 1837. *Justicia dichotoma* Rottl. et Willd. in nov. act. nat. cur. berol. 4 p. 221. *Justicia silvatica* Lour. cochinb. 1 p. 26, Vabl. en. 1 p. 145, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 400. *Dianthera paniculata* Lour. cochin. ed. Willd. 1 p. 32. *Puhescentia* magis minusve conspicua in caule paniculisque villosula, et foliis magis ovatis, sed nullâ alia re differre videtur. — Capsulae, in hac varietate obviæ, clavatae, apice compressiusculæ, obtuse mucronatae, pubescentes, tetraspermæ, abortu dispermæ; semina obovata, utrinque convexa, basi inæquali anguste emarginata. (v. in h. Wallich., Vahl, Willd., Bentham, DC. etc., etc.)
2. R. OSMOSPERMUS (Bojer in sched.), foliis oblongis glabris subtus in costâ scalbris, paniculis axillaribus terminaliæ trichotomis divaricatis cauleque pubescitibus, labio superiore linearis lanceolato recto. ♂ In collibus et ad margines agrorum prope Emirna in insulâ Madagascar (Bojer! in h. DC., in ripis fluvii Ranu-Munti prov. Emirnae (idem!). *Justicia odoratissima* Bojer! in h. DC. « Caulis 5-6 ped. altus, ramosissimus, floribus albo-roseis. Semina lenticularia, nigra, odorem balsamicum gratissimum spirantia, a mulieribus indigenis in collaria conseruntur, quæ festis diebus ferunt. (Bojer). *Rhinacantho* communi var. β scandente per quam similis et ejus forsitan varietas est. Differt præter paniculas earumque ramos maxime divaricatos ramulis autem circa ramorum apices densius confertis brevioribusque (sed vidi etiam paniculam probabiliter terminalem ramis brevissimis ideoque minus patentibus fere spiciformem), corollâ majore limbo latiore præditâ. (v. in h. DC. et Hooker).
3. R. ROTTLERIANUS (N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 109), caule scaberrimo, foliis oblongo-cuneiformibus obtusis, paniculâ terminali corymbosâ trifida, labio superiore linearis recto. ♂ In Indiâ orientali (herb. madr.). *Justicia Rottleriana* Wall. cat. n. 2477. Differt a Rh. communi, cui admodum similis est: ramis gracilioribus, lineolis confertissimis elevatis setulisque incurvis scaberrimo, ramis florentibus axillaribus paucis vel nullis, sed ternis terminilibus longioribus gracilioribus dichotomis fastigiatis paniculam corymbosam constituentibus, foliis (mediis saltem) brevissime petiolatis, ex oblongo ovalibus basi cuneatim attenuatis, apice vel obtusis vel brevissime acutis, confertim lineolatis, cæterum glabris; superioribus lanceolato-vel oblongo-cuneiformibus sessilibus, limbo corollæ, ratione tubi, paulo breviore. Calycis, bractearum, corollæ, staminum reliqua structura non differt. (v. in h. Wallich).

4. R. CALCARATUS, foliis ovali-oblongis paniculâ terminali trichotomâ, labio superiore linear-attenuato incurvo apice angustissime bifido. ♂ In montibus prov. Sillet ( Wall.!), floret mense Martio ( Wallich! ). *Justicia calcarata* Wall. pl. as. rar. 2 p. 9 t. 113, cat. n. 2426 a, b. Proxime affinis est R. communi, sed magis speciosus. Caulis strictus, simplex, penuae anserinæ crassitie, tetragonus, supra gueicula tumidulus, glaber, medullâ multâ laxâ faretus. Folia 7-8 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{4}$  poll. lata, glabra, supra obsoletissime minutissimeque lineato-punctulata, lâste viridia, nitida. Panicula semipedalis, terminalis, rigida, subtilissime glanduloso-pubescent; rami oppositi, ut rachis tetragoni; medii ad basin bifidi, tum, ut reliqui, trichotomi. Bracteæ ad basin ramificationem parvæ, e basi triangulare subulatæ, patulæ, a  $2\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  lineæ longitudine in bracteolas formâ constante decrescentes. Ramuli basi nudî, a medio fere thyrsulo  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longo ornati. Pedicelli 1- $1\frac{1}{4}$  lin. longi. Calyx lin. duas longus, glanduloso-pubescent, lacinias lanceolatis acutis. Corolla pollicenris, pubescens, alba; labium superioris inferiore longius, e basi latiore longissime attenuatum, lineari-subulatum, apice in lacinulas duas fere setaceas fissum; inferiorius crassius, trifidum, lacinias subequalibus ovatis obtusis. (v. in h. Wallich.).
5. R. OBLONGUS, fruticosus, foliis lanceolato-oblongis repandis brevissime petiolatis, paniculis axillaribus oppositis terminalique di-trichotomis, floribus fasciulatis, bracteis parvis subulatis, labio superiore plano. ♂ Prope sedem « Cbali, » regis Caffrorum, in monte Chumi (terra Caffrorum). Junio enm fl. et fructu (Ecklon!). Peristrophe oblonga N. ab E. ac. cap. in Linnaë 15 p. 375. Corolla brevior quam in praecedentibus labio inferiore ratione habitâ superioris minore. (v. in h. Ecklon).

*Species exclusa.*

R. GRACILIS Bojer = *Hypoëstes gracilis*.

CXXVIII? SERICOSPORA.

Calyx herbaceus, quinquepartitus, rigidus grandis, lacinias angustis. Corollæ tubus longus, gracilis, cylindricus intus ad apicem lâvis absque staminum projecturis ut in reliquis Eranthemiis; limbus et stamina desunt nostris speciminibus. Capsula a basi ad medium depressa valvulis continguis, asperma, superius bilocularis, disperma. Dissepimentum adnatum. Semina discoidea, lanato-sericea, retinaculis angustis suffulta. — Frutex Americæ tropicæ, caule basi repente ramoso geniculato, juvenili strigosohirsuto, ætate glabrescente, foliis oblongo-cuneiformibus acutis brevissime petiolatis utrinque pilosulis subtus in costâ hirsutis, bracteis bracteolis calycisque lacinias patentihirsutissimis. Spica ad apicem caulis axillaris, hinc ad speciem terminalis, sessilis, brevis et capituliformis, subsecunda, bracteis bracteolisque lacinias calycinis similibus paulo brevioribus.

S. CRINITA. ♂ In Antillis. *Justicia crinita* mspt. (nobis ignoti) in h. DC. Folia 3 poll. longa et trans medium 1 poll. lata; floralia minora. Petiolus vix lin. 1 longior. Calyx 8-9 lin. longus, lacinias lineari-subulatus acutissimis. Corollæ tubus (residuus) 7 lin. longus. Capsula 4 lin. longa, testacea, parte superâ ovali-orbiculata cuspidata compressa asperula glabra. (v. in h. DC.)

CXXIX. ANISACANTHUS N. ab. E. in Linn. 16 p. 307, Meisn. gen. p. 367. — *Justiciæ* sp. autt.

Calyx quinquefidus, bracteolatus. Corolla tubuloso-infundibuliformis, profunde et inæqualiter 4-fida, lacinias angustis, alterâ paulo profundiarius discretâ magisque ad alterum latu conversâ. Stamina 2, prope fauces

inserta; antherarum loculi parallelæ, contigui, basi mutici. Stigma obtuse bidentatum. Capsula a basi ad medium fere depressa, elocularis, asperma, hinc ovata, subinflata, non compressa, bilocularis, tetrasperma. Semina discoidea, radiatim plicata, retinaculis subtensa. — Frutices Americæ (et insularum Canariensis?) temperatae, viminei. Folia angusta. Flores sessiles axillares solitarii, alterni. Folia floralia decrescentia.

1. A. **VIRGULARIS**, foliis subsessilibus lanceolatis glabris, floribus axillaribus sessilibus secundis, calycibus glabris, limbi corollæ laciniis tubo brevioribus. ♂ In Novâ Hispaniâ: Oaxaca, Zimapan, in Cordillerâ, in planicie Mexicanâ sterili (Septembri Allaman! in h. DC. a Junie in Aprilem, Galeotti! n. 912 et 927 in h. Hooker et Bentham), prope Zimapan et Hacienda de Derodi (Ehrenberg! in h. gen. berol. n. 1101), Sierra S. Pedro Nolasco, Talea, etc. (Jürgensen! coll. 1843-4, n. 620 in h. Hooker), insulis Canariensis (Gouan! in h. Hooker). *Justicia virgularis* Salisb. parad. lond. n. 50. *Justicia coccinea* Cav. ic. 2 t. 199. *Justicia quadrifida* Vahl en. 1, p. 124 et h.! (ex horto paris.), Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 384 et h. n. 363! (specimm. culta), Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 231, Kunth syn. 2 p. 31, Andr. h. am. t. 277, Aschenb. pl. mex. n. 215. *Justicia hyssopifolia* Gouan! in h. Hooker. *Justicia superba* hort. in h. hort. berol. Corolla pollicaris et longior, coccinea. (v. v. c. et s. sp. in h. Aschenborn, DC., Hooker, etc.)
2. A. **PUMILUS**, foliis petiolatis lanceolatis acuminate glabris, floribus axillaribus subsessilibus secundis, calycibus pubescenti-tomentosis, limbi corollæ laciniis tubum æquantibus longioribus. ♂ In Mexico (Jürgensen n. 496! et Bates! in h. Hooker). *Justicia pumila* Dietr. gartenlex. suppl. 4 p. 197, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 384. A præcedente differt calycibus brevipedicellatis tomentosis et tubo corollæ ad limbum collato breviore. (v. in h. Hooker).

CXXX. ERANTHEMUM Linn. fl. zeyl. R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1, p. 476, opp. ed. N. ab E. 3 p. 332. N. ab E. in Wall. pl. as. rar 3 p. 76 et 106, in Lindl. introd. ed. 2 p. 285 et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 151.—*Justicia* spec. Vahl et Aut.

Calyx quinquefidus, æqualis. Corolla hypocraterimorpha vel elongato-infundibuliformis, tubo longo gracili, limbo subæquali. Stamina duo fertilia circa os tubi adiutia, longe decurrentia, duo sterilia brevissima, filamentis longiorum basi connexa, in speciebus nonnullis anomalis (num. 43 et 44) nullis observatis. Antheræ exsertæ, biloculares, muticæ, loculis parallelis contiguæ, texturæ densioris. Capsula inferne depressa, valvulis contiguis, asperma; superior bilocularis, tetrasperma. Dissepimentum adnatum. Semina discoidea, retinaculis suffulta. — Frutices vel suffrutices Asiae, Americae, Africae et Novæ Hollandiae calidioris et tropicæ, plerique monticolii, speciosis floribus insignes Phlogi similibus, cœruleis, roseis, albis varie pictis, foliis vel integrerimis vel serratis. Flores spicati; bracteis communibus majoribus vel minoribus, bracteolis omnium parvis oppositis.

### § 1. *Genuina, corollæ limbo subæquali.*

#### a. *Grandibracteata.*

1. E. **NERVOSUM** (R. Br. l. c. p. 333, caule quadrangulari lateribus excavatis, foliis ovatis ellipticis utrinque acuminatis suberenatis integerrimis lineolatis glabris, spicis axillaribus oppositis imbricatis, bracteis ellipticis longe acuteque cuspidatis venoso-reticulatis, limbi corollæ diametro tubum æquate. ♂ Locis siccis umbrosis inculisque in variis Indiæ orientalis tractibus, v. c. circa Malacca (Ad. Delessert! in h. DC.), Assam (Griffith! in h. Hooker.), florens tempore frigido summâque pulchritudine florum superbiens Februario (Roxburgh), in Sillet (Wall.), in insulâ Bouton, Cavaras, ex adverso Pulo-Pinang (Delessert! in

h. DC.), in Nepaliâ (Wallich n. 2493 e), in Hurdwar (Wallioh n. 2493 f), prope Hurdwar et Sebathoo, Martio et Aprili in Himalayæ alt. 4000' (Edgeworth), in insulâ Ceylan (h. Hook.!), e Madras cultum (h. Wight), ex hort. bot. calc. (Wall. n. 2493 b. et suppl.), in insulâ Trinitatis (planta culta? Sieber!), in insulâ Cuba (de la Ossa! in h. DC.), Surinam (Hostmann! n. 340 in h. Bentham.), Martinicâ (Plœsel in h. mus. paris. et Nces n. 278.) — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 106, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1. p. 445, Wall. cat. n. 2493 b, d, e, h, i, k, Wight h. propr. n. 2002. Eranthemum pulchellum Andr. rep. t. 88, Willd. en. hort. ber. suppl. p. 2, h. Willd. n. 264! Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 111, ed. a. 1832 p. 111, h. madr.! h. Wight!. Justicia nervosa Vahl en. 1. p. 164 et h. Ait. hort. kew. 1. p. 42, Bot. mag. n. 1358, Bot. cab. n. 146. Justicia pulchella Roxb. pl. coron. p. 41 t. 177, Ker rec. pl. repos. p. 41, h. Heyn.! (Wall. cat. n. 2493 i). Ruellia varians Vent. hort. ceis. t. 46, Willd. en. hort. ber. p. 657, de La Roche in h. DC.! Justicia? colorata h. Vahl! Sieb. fl. ins. Trinit. n. 230 (in h. petrop.! et in h. DC.!) Species in hortis vulgarissima, corollis lâete cœruleis iusignis. (v. in plur. h.)

- β. *scabrum*, foliis minoribus crenatis non lineolatis supra costisq[ue] scabris, spicis brevioribus. — Ad Srinaghur et Rungpur (Wall. l. c.). Eranthemum nervosum (Wall. cat. n. 2493 g). Fortasse propria species habenda, differt: caule ad angulos scabro, foliis ad summum 5 poll. longis toto ambitu confertini tuato-crenatis, costis approximatis subtus valde prominentibus venulisque rugosis, iisque subtus pubescenti-scabris, supra minime lineolatis, sed setulis sparsis rigidis iucundibutibus scabris, spicis brevioribus; h[ab]et autem in nostro exemplo, longo ante anthesin tempore decrepto, nimis imperfectas sunt; quo commoti, varietatis loco recensere placebat. (v. v. c. et s. sp. in h. Wall. etc. etc.)
- γ. *confluens*, bracteis propter venas sursum confluentibus subconcoloribus obscure viridibus. — In Indiâ orientali (Lamarre-Picquot! in h. gen. berol.) Assam (Griffith! in h. Hooker).
2. E. **EDGEWORTHIANUM**, caule tetragono lateribus amplioribus convexis, foliis ovatis obtuse cuspidatis subcrenatis integrerrimis lineolatis glabris, spicis axillaribus oppositis terminalibusque imbricatis cylindricis, bracteis ovatis late obtuse cuspidatis venoso-reticulatis, limbi corollæ diametro tubo duplo breviore. ♂ In Himalayâ alt. 2000-3000', Mar Bar, Septembri 1840 (Edgeworth! cat. n. 246). Similis E. nervoso, differt foliis magis distantibus minoribus basi breviter acutis apice brevicuspidatis cuspidé obtuso minus costatis, spicis longius pedunculatis, bracteis, quæ simili ratione coloratæ et venosæ, extra medium cuspidato-productis in acumen latum obtusumq[ue] subparabolica, corolla purpurascens? tubo pollicari, limbi lacinia obvoluta retusisque vix  $2\frac{1}{2}$  lin. longis, cum Eranth. nervosi corollæ tubus sit ad summum 9 lin. longus, limbi lacinia autem  $4\frac{1}{2}$  lin. longæ sint. Capsula 6 lin. longa, lanceolata, compressa, lâvis, lutescens, tetrasperma. (v. s.)
3. E. **MACROPHYLLUM** (Wall. cat. n. 7179, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 106), foliis elliptico-cuneiformibus acutis infra apicem dentatis margine scabris, spicis axillaribus basi infractâ libracteatis, bracteis ellipticis mucronulatis retinlatis. ♂ In Promæ montibus Taong dong, in rupibus ad Pengee in ripâ Irawaddi fluminis (Wall.!), in silvis Tectoniæ (Helfer! in h. Hooker n. 255). Caulis herbaceus, quadrangularis, erectus cum ramis pubescenti-scaber. Folia inferiora pedalia et sesquipedalia, 5-6 poll. lata, in petiolum longum decurrentia, acuta, apicem versus remote denticulata, ad costas utrinque, tum circa margines scabra, et in pagina superiore setulis rarís adspersa, superiora minora petiolis brevioribus. Spicæ in ramis axillaribus foliorum superiorum terminales, folium vix superantes, 2-3 poll. longæ. Pedunculi patentes; inferiores trifidi, in medio bifolii, foliis ovatis pollicaribus, superiores aphylli. Spicæ ad originem angulo erectæ, in situ cauli parallelo; bracteæ duæ,

seu potius folia orbiculata, ad basin spicæ. Bracteæ unguiculares, elliptico-subrotundæ, mucronatæ, membranaceæ, venoso-reticulatae, ad costas et margines pubescenti-scabræ, subglandulosæ, purpurascentes. Bracteolæ lanceolatae, acuminatae, calyce breviores. Calyx ad  $\frac{1}{2}$  quinquefidus! basi tubulosus; laciniaæ subulatæ, scabré. Corolla  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  pollicem longa, coccinea, pubescens; laciniaæ ovatae, quarum tres emarginatae, due subretusæ. Stamina exserta. (v. in h. Wallich, Hooker, berol., etc.)

4. E. VISCIDUM (Bl. bijdr. p. 793), caule obsolete quadrangulari, foliis oblongis utrinque acuminatis repandis lineolatis glabris, spicis axillaribus terminalibus que imbricatis, bracteis oblongo-spathulatis obtusis venoso-reticulatis pubescenti-glandulosis viscidis. ♂ Tjernai in insulâ Javâ, alt. 2000 p., Augusto (Jungluhn!), in montosis Javæ (Blume, Spanoghe! in h. Hooker). Simile E. nervoso, at gracilius; folia basi et apice magis attenuata, teneriora, bracteæ obtusæ et viscidæ; corollæ majores, lilacinae (lacinia late ovatis). Capsula semipollucaris, acuminata, glabra. Ab E. tetragono differt bracteis reticulatis ut in E. nervoso et viscidis, tum caule haud apprime tetragono. (v. in h. Jungluhn).
5. E. ELEGANS (R. Br. ex Rœm. et Sch. syst. 1 p. 174, Willd. sp. pl. ed. Dietr. I p. 444), caule subtereti, foliis oblongis utrinque attenuatis acuminatis glabris petiolatis, spicis terminalibus geminis ternis, bracteis imbricatis ovatis acuminatis mucronatis venosis concoloribus membranaceis, corollæ limbi laciniai profundi obovatis retusis. ♂ Oware et Benin (Pal. de Beauv.! in h. DC. ex h. Delessert). Justicia elegans Pal. de Beauv. fl. d' Ow. et de Ben. p. 88. Poir. enc. meth. suppl. 2 p. 112. Folia 9 poll. cum petiolo longa, 2- $2\frac{1}{2}$  poll. lata. Corolla minitata, tubo gracili pollucari recto. (v. in h. DC.)
6. E. TETRAGONUM (Wall. cat. n. 7180, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 106), caule fruticoso glabro spicis terminalibus axillaribus tetragonis, foliis ovato-oblongis acuminatis lineolatis glabris, bracteis imbricatis elliptico-oblongis hirtis, corollæ laciniai subrotundo-ovatis. ♂ In Indiâ orientali, Troglia, Martio (Wall!) Rami coarctati, punctati, projectur scabris, tetragoni. Folia 4 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, in brevem petiolum decurrentia, repando-subcrenata. Spicæ axillares et terminales, solitariae, duos circiter poll. longæ, pedunculo crasso villosa  $\frac{1}{2}$  poll. longo. Folia duo lanceolata circa apicem pedunculi. Bracteæ unguiculares, acutiusculæ, basi nonnihil angustata, herbaceæ, rigidulæ, virides, penninervi-venulosa, hirtæ pubescientiæ glandulosæ interspersæ ciliatae. Bracteolæ longitudine calycis, linearis-lanceolatae. Calyx ad medium usque quinquefidus, lacinia linearis-subulata. Corolla vix pollucaris coccinea?, limbo subæquali tubo quadruplo breviore laciniai rotundatis. Capsula bracteæ longitudine, pubescientiæ glandulosæ inspersa, valvula superiora versus carinatae. Capsula hujus speciei Strobilanthis magis esse videtur quam Eranthemi, et inflorescentia quoque Strobilanthes indicat; sed corolla et staminum constructio Eranthemi nexus utriusque generis æque ac terminos demonstrat.
7. E. ROSEUM (Rœm. et Sch. syst. 1 p. 175), foliis ellipticis glabris subtus in venia scabris, spicis axillaribus pedunculatis imbricatis, bracteis ovalibus subcuneiformibus acutis longe ciliatis venoso-reticulatis. ♂ In Indiâ orientali (Vahl) circa Bombay (Perrottet! n. 138 in h. mus. paris. et ex hoc in h. Nees.), in montibus Purimdar ab Octobri in Decembrem (Perrottet! in h. DC.), Assam (Griffith! in h. Hook., et Nees). — Willd. sp. pl. ed. Dietr. I p. 445. Folium in nostro specimine (absque petiolo) 5 poll. longum, 2 fere poll. latum. Pedunculus quadriguerter, inferne glaber, superne pilosus et crassior. Infra spicam par foliorum minorum oblongorum sessilium longe ciliatorum. Bracteæ fere E. nervosi, apice nonnihil patulæ, basi cuneatim nec multum attenuatae, in secco pallidiores venis subtus prominulis reticulatae, 8 lin. longæ,  $\frac{1}{2}$  ab apice 4 lin. latæ. Corolla rosea, 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, limbo brevi laciniai obovatis. (v. in h. paris. et prop.)
8. E. PURPURASCENS (Wight h. propr. n. 2003), caule tetragono foliisque late

ovatis cuspidato-acuminatis repaudo-crenatis glabris, foliis superioribus subcordatis brevissimae petiolatis, spicis axillariis oppositis imbricatis, bracteis ovato-rhombeis rostrato-attenuatis acutis obtusis ciliatis. ♂ In Moughir et Monihari, Oetobri (Hamilt.) — Wall. cat. n. 2492 e, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 106. — *Justicia purpurascens* h. Hamilt.! Wall. l. c. Caulis superne acute quadriquetter, pallidus. Folia inferiora 5-7 poll. longa, 2 $\frac{1}{2}$ -4 poll. lata, acuminata, basi acutâ in petiolum decurrentia; superiora 4-2 poll. longa, 2-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, acuminata, basi rotundata et subcordata, petiolo vix linearis; omnia glabra, rigidula, costata et venoso-reticulata; ramulorum folia 2, pollicaris, ovato-subrotunda, obtusa, in formâ γ involucrantia. Pedunculi in α et β basi diphylli, apicem versus aphylli, 1 $\frac{1}{2}$ -2 in var. β autem 5-7 poll. longi. Spicæ 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longæ, in var. β vix poll. longæ, pleræque breviores. Bracteæ laxè imbricatæ, inferiores 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longæ, ex ovato attenuatae, supramæ ellipticæ, basi cuneatae, omnes in acumeum longum obtusiusculum productæ, penninervi-venosæ. Bracteolæ calycis longitudine, lancolato-subulatae, carinatae, subciliatae. Calyx ad medium usque quinquefidus, glaber. Corolla pollicaris, purpurea, limbi laciniis æqualibus obovato-truncatis subciliolatis. (v. in h. Wallich et Wight).

β. spicis abbreviatis squarrosis, inferioribus longissime pedunculatis (Wight, l. c.). In montibus Dindygul et Courtallum (Wight!).

γ. spicis brevipedunculatis involucratis.—In Nepaliâ (h. Mus. paris. ! n. 135, in h. Nees.)

9. E. SUFFRUTICOSUM (Roxb. fl. ind. or. ed. Wall. 1 p. 112 ed. a. 1832. p. 111), suffruticosum, erectum, foliis ovato-oblongis glabris, spicis terminalibus, bracteis cuneiformibus glabris, antheris semiexsertis. ♂ In insulis Andaman (Kyd.). — Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 107, *Eranthemum barleroides* Roxb. fl. ind. or. ed. Wall. 1 p. 114, ed. a 1832. p. 113, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 447. Fruticulus parvus, lente crescens; rami juveniles puberuli. Folia subcypanda, petiolis brevibus. Corollæ tubus bracteatum æquans; limbus regularis, pallide coeruleus. Stamina duo sterilia ad basin fertilium.
10. E. STRICTUM (Colebr. Roxb. fl. ind. or. ed. Wall. 1 p. 114), caule suffruticoso foliisque elliptico-oblongis utrinque acuminatis subtus pubescenti-scabris, spicis in caule ramisque terminalibus elongatis, bracteis quadrifariis patulis oblongis ciliatis, antheris inclusis. ♂ In montibus Sillet conterminis, unde in hort. bot. calcutt. illatum floret Januario, Februario et Martio mensibus (Wallich!). Vidi exemplum cultum ex hort. bot. calc. et h. (Heyn!) — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 448. Bot. reg. t. 867. Bot. mag. t. 3068. Wall. cat. n. 2494 b., *Eranthemum montanum* Wall. cat. n. 2492, a. *Justicia montana* h. Heyn.! (in Wall. cat. n. 2492 a). Spicis 1  $\frac{1}{2}$  ped. longis Lythri fere similitudine, bracteis oblongo-lanceolatis ciliatis approximatis nec vero imbricatis, veluti foliacis bene distinctum est. Corolla pollice longior, saturate coerulea, tubo angusto incurvo pubescente, limbus triplo et ultra superante; lacinia obliquæ obovatæ. Antheræ violaceaæ, faucom æquantes. Filamenta sterilia brevissima, subulata, quandoque conspicua. (v. in h. Wall., Hook., Nees, berol., etc., et culta ex hort. glasg.)
11. E. SALACCENSE (Bl. bijdr. p. 792), caule suffruticoso foliisque oblongis ovali-oblongis utrinque acuminatis glabris his subtus in costis scabris, spicis axillariis terminaliæ brevipedunculatis tetragonis, bracteis linearibus obtusis erectis calyce longioribus rhachique lanuginoso-puberulis subglandulosis, antheris inclusis. ♂ In ins. Java, in monte Salak (Blume), in monte Brambanan, prope rudera arcis antiquæ imperialis solo limoso-humoso silvestri per silvam late dispersa, Augusto (Junghuhn!). Caulis erectus, subdecumbens. 3-4 ped. alt. Bracteolæ lanceolatae, acutæ, calycem subæquantes. Corolla pollicaris, læte coerulea, limbi laciniis obovato-truncatis. Affine E. stricto. (v. in h. Junghuhn et in h. berol. specim. a comite de Hoffmannsegg datum.)
12. E. MONTANUM (Roxb. fl. ind. or. ed. Car. et Wall. 1 p. 110, ed. a. 1832

l p. 110), caule tetragono foliisque oblongis utrinque attenuatis repando-erectatis glabris, pedunculis terminalibus trichotomis spicisque pubescenti-viscidis, bracteis lanceolato - attenuatis ciliatis.  $\Sigma$  In Indiâ orientali, ad montes tractuum Circars dictorum floretque tempore frigido (Roxburgh). — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 107. Eranthemum capense foliis lanceolato-ovatis petiolatis Linn. fl. zeyl. n. 15, amoen. acad. p. 385, Willd. sp. pl. 1 p. 51, Pers. syn. 1 p. 10, R. Br. opp. ed. N. ab. E. 3 p. 333, obs., Richter opp. Linn. n. 61. *Ephemerum lychnidis* flore Africano Herm. parad. bat. p. 153. Caulis herbaceus, crecens, trichotomus. Folia 6-4 poll. longa, 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. lata, decrescentia sed conformia, in petiolum longum gracilemque decurrentia, levitor repanda et subcrenata, nitida, oppositum saepè minus, subtus vel omnino glabra, vel ad costas scabra. Inflorescentia terminalis, trifida, ramis trifidis, folio brevioribus vel id æquibus, medio duplo longiorè, pilis glandulosis densissime vestitis, qui in præcedente articulo saepè penitus desunt. In var.  $\beta$  villi plurimi inter glandulas accedunt. Bracteæ ad divisiones lanceolatae, in var.  $\delta$  oblongæ, acuminate, in var.  $\beta$  obtuse attenuatae, longitudine pedunculorum vel breviores. Pedunculi 1 poll. longi, nudi. Bracteæ semipollicares-pollicares, lanceolatae, vel oblongo-lanceolatae, in acumen longitudine varium, obtusum, obtusiusculum, vel acutum attenuatae, herbaceæ, ciliatae et glandulosopubescentes, capitularum autem una vel altera tantum lanceolata, vel linearilanceolata, attenuata, reliqua breves, oblongo-lanceolatae, acutæ. Calyx ultra medium 5-fidus, laciniis subulatis herbaceis glandulosis. Corolla 1-biuncialis, cœrulea ?, glabra vel parcis puberula; tubus gracilis; limbus patens, profunde quinquefidus, laciniis obovatis, duabus inferioribus majoribus. Synon. E. capense haud improbable, quum hac species sola frequens in insula Ceylon proveniat, et verba Linnei « tubo corollæ longissimo » cum omni descriptione quadrent. (v. in h. Wallich, Nees, Wight, berol.)

- $\alpha.$  spicis laxioribus, bracteis distantibus e basi oblongo-lanceolata longissime attenuatis. — In ins. Ceylon (Walker! in h. Walker-Am. et Hooker), in vallibus montanis prov. Maduræ (Wight! in h. Hooker). H. Wight propr. n. 2004 ic. 2 t. 466, Bot. mag. t. 4031. Eranthemum montanum Roxb.l.c. Eranthemum fastigiatum h. Hook!. Ruellia varians h. Heyn.! Wall. l. c.
- $\beta.$  *parabolicum*, spicis laxioribus, bracteis distantibus minoribus, inferioribus e basi ellipticâ in breve obtusumque acumen productis, foliorum quoque acumine obtusiore, inflorescentia villosâ et glandulosâ. — In h. Heyn. cum E. crenulati et stricti specimenibus mixtum. Eranthemum montanum Wall. cat. n. 2492 a, h. Heyn.! l. c.
- $\gamma.$  *fastigiatum*, spicis brevibus lanceolatis, bracteis imbricatis e basi oblongo-lanceolata vel oblongâ longe attenuatis hirsutis et valde glandulos. — H. Wight! propr. n. 2004 b et Wall.; e montibus Dindigul et Courtallum et in h. madr.! ad pedem jugi Nilagirici, Februario (Schmidt!). Eranthemum montanum Wall. cat. n. 2492 d. Eranthemum Wightianum Wall. cat. n. 2495. Eranthemum fastigiatum Spr. syst. veg. 1 p. 89. Justicia fastigiata Lam. ill. p. 41, Vahl en. 1 p. 166. Eranthemum spec. Wight h. olim. Justicia pulchella h. Wight! Wall. l. c. Justicia divaricata h. madr.! Wall. cat. n. 2492 d.
- $\delta.$  spicis brevioribus, bracteis majoribus latioribus patulo-imbricatis oblongo-acuminatis ciliatis glandulis magis dispersis, foliis brevioribus ellipticis caulinis angulis scabris. — Exemplum Rottler. in h. Wall. n. 2492 c.; in Ceylon (Walker! n. 180 in h. Hooker). Eranthemum montanum Wall. cat. n. 2492. c. Justicia montana Rottl. Wall. l. c.

13. E. WIGHTIANUM (Wall. cat. n. 2495 a.), fruticosum, caule tetragono pubescens-tomentoso, foliis ovatis utrinque acutis glabris, floralibus subrotundis, spicis terminalibus corymbosis, bracteis linearilanceolatis acutis strictis pubescens-scabris.  $\delta$  In montibus Dindygul et Courtallum (Wight! h. Russell!). Wighth. propr. n. 2005, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. p. 107. Eranthemum monta-

num h. Russell! Wall. cat. l. c. Frutex, ramis inferne teretiusculis glabriusculis, cortice subfuscō, apicem versus densius scabridis ramosis; rami pubescētiā subtilissimā densā vestiti, quā et inflorescentiā partes et novella folia inducuntur. Folia ramorum speciosa, ampla, inferiora elliptica, 6 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  poll. lata, sequuntur magis ovata, 8 poll. longa,  $3\frac{1}{2}$  lata, brevius petiolata, suprema denique ovato-subrotunda, petiolo pollicari, 4 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  poll. lata, bæc omnia acuta; ramulorum folia  $\frac{3}{4}$  poll. longa et lata, e basi rotundatâ vel subcordatâ fere orbicularia, brevissime petiolata, mucroniformi-cuspidulata, cuncta folia integerrima utrinque lineolata, glabra, subtus ad costas scabriuscula. Spicæ in ramulis composite, circa caulis et ramorum apices in corymbum densum polystachyū congestæ. Pedunculi vix unciales, nudi. Spicæ inferiores circiter pollicares, lanceolatæ; superiores magis extenuatæ, 2-3-pollicares, lineares. Bractæ semipollicares, acutiusculæ, pubescenti-scabré, subglandulosæ. Calyx ad medium quinquefidus. Corolla pollicaris, pubescentiā glandulosâ inspersa, tubo longo gracili, limbo quinquefido laciniis subrotundis. Filamenta duo sterilia exigua ad basin fertilium. (v. in h. Wallich et Wight).

- b. *Parvibracteatae*. Bractæ in plerisque omnes aut superiores saltem calyce breviores aut ejus longitudine, angustæ.

\* Spicæ racemive terminantes.

14. E. ALATUM, herbaceum, foliis cordatis ovatis obtuse brevicuspidatis in petiolum longum e sinu alatin recurrentibus glabris tenuibus, spicâ terminali gracili basi subdivisâ, rhabci caulisque suturis medianis subtilissimè strigilosæ, floribus fasciculatum oppositis distansibus, calycis laciniis brevibus.  $\mathcal{L}$  Tlacolula in imperio Mexicano (Ehrenberg! n. 1167 in h. gen. berol.). Caulis tener, lineâ mediâ inter folia decurrente elevatâ strigilosâ notatus. Folia patentissima, petiolo  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{4}$  poll. longo superius latiore, laminâ  $3\frac{1}{2}$ -4 poll. longâ  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{4}$  poll. lata apice in cuspidulam brevem obtusam contractâ. Ad basin spicæ, ubi ramulus oritur, bractæ parva, orbicularis, mucronulata, sessilis. Glomeruli pluriflora, infimi bractæ linearis suffultæ. Bractæ exiguæ, ovato-triangulares. Calyx cum pedicello vix lin. 1 longior, glaber, laciniis subulatis. Corolla deficit. Capsula 6 lin. longa. (v. in h. berol.)

15. E. CORDATUM (Nees ab E. in Beutb. bot. Sulpb. p. 147), foliis ovali-oblongis in acumen obtusum attenuatis basi anguste cordatis subrepandis glabris tenuibus, spicâ terminali simplici, rhabci cauleque superne puberulis, floribus glomeratim simpliciter oppositis approximatâ, bractæ subulatis brevissimis, corollæ tubo calyce subglandulosu multo longiore, limbo brevi.  $\mathcal{L}$  In Columbiâ ad Atacamam (Sinclair!). Folia valde tenuia, inferiora (cum petiolo angusto  $1\frac{1}{4}$  poll. longo) 9 poll. longa, 3 poll. lata, basi rotundata et ad petioli insertionem emarginata, nonnihil inæqualia, late viridia, utrinque lineolata. Corolla pollicaris, angusta, laciinis limbi obtusis oblongis vix trilinearibus. Stamina duo, exserta; sterilia nulla. Capsula virescens, 7 lin. longa, tetrasperma, ungue longo. (v. in h. Benth.)

16. E. HISPIDULUM, foliis oblongis in petiolum brevem acute desinentibus apice parum angustatis, acumine obtuso, costis subtus cauleque simplici erecto hirsutulis, floribus oppositis, inferioribus axillaribus, superioribus denique, in spicam terminalam basi foliaceam densam transeuntibus, bractæ sessilibus, inferioribus oblongis cum vel sine mucronulo decrescentibus, superioribus calyce paulo longioribus oblongo-lanceolatis acuminatis basi cuneatis calycibusque pubescenti-hirtis viscidulis, corollæ tubo calyce multo longiore.  $\mathcal{L}$  In silvis prope Vera Cruz, Februario (Galeotti! n. 929 in h. Hook.). 2-6 poll. altum. Folia inferiora  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 8 lin. lata; bractæ alia a pollicaribus in semipollicaria decrescent. Bractæ superiores denique  $3\frac{1}{2}$  lin. longæ,  $1\frac{1}{2}$  lin. latæ. Corolla lilacina, 10 lin. longa, limbi laciniis subæqualibus oblongis obtusis patentibus. (v. in h. Hook. et Benth.)

17. *E. CUSPIDATUM* (Nees ab E. in Benth. pl. Hartweg. p. 148), foliis subovalibus in petiolum longum attenuatis utrinque punctulato-asperulis glabris costive subitus scabris, spicâ terminali simplici, rhachi calycibus cauleque superne pubescentibus, floribus oppositis solitariis geminisve distantibus, bracteis inferioribus infimâ saltem subrotundis euspidatis, corolla tubo calyce multo longiore.  $\mathcal{L}$  Ad Guayaquil (Hartweg!), Caripe (Humboldt!), in silvis Jalapensis (Schiede in h. gen. berol.). Eranthemum filiforme h. Willd. n. 266. *Justicia proxima* interrupta H. B. K. Schlechtend. in Linn. 5. p. 95. Simile *E. verbenaceo*, differt autem caule teneriore superne spicâque pubescentibus et flore multo majore. Corolla superiores spicæ clausæ et imperfectæ defluere solent. (v. in h. Benth., Willd. et berol.)
18. *E. LANCEUM*, foliis lanceolatis acuminatis glabris subitus in costis scabris, inferioribus in petiolum brevem longe decurrentibus, superioribus basi arcte cordatis subsessilibus, spicis axillaribus terminalique brevibus, floribus oppositis, bracteis infimis lanceolatis linearibus calycoe longioribus superioribus, bracteolis calycibusque glabris, corollæ tubo calyce quadruplo longiore.  $\mathcal{L}$  Cuello in Columbiâ (Goudot! in h. Hooker). Folia media 3-3½ poll. longa, 6-7 lin. lata, inferiora breviora et paulo latiora. Rami spiciferi inferne foliis parvis præediti. Calyx brevis, lacinias subulatis. Corolla 5 lin. longa, alba. Capsula 6 lin. longa. (v. in h. Hooker).
19. *E. VERBENACEUM* (Nees et M. in nov. act. acad. nat. cur. XI t. 1 p. 65), foliis oblongis basi cuneato-attenuatâ in petiolum decurrentibus utrinque lineolatis glabris, pulvillis truncatulis, spicâ terminali simplici trifidâve, floribus oppositis, bracteis ovato-subulatis calyce dimidio brevioribus.  $\mathcal{L}$  In silvis primâvis secus ripas fluviorum ad viam Felisbertiam prov. Bahiensis, Decembri (Max. Princ. Neuviel! in h. Mart. et Nees.), in prov. Bahiensi (Blanchet! n. 23 et 3127 in h. Moricand), in silvis ad fluvium Peraguaçu et in silvis ad V. dos Ilheos, prov. Bahiensis, Novembri, Decembri (Martius!), in silvis prope Castel Novo Brasiliæ (Riedel! in h. imp. petrop. n. 573). — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 450, N. ab E. in Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 156. Caulis 1-2 ped. altus. Folia basi annulo membranaceo conjuncta; pulvilli haud multum prominuli. Corolla alba, tubo calyce duplo longiore incurvo. Stamina sterilia brevissima. (v. in h. Princ. Neuviel, Mart., monac., Moricand, petrop.)
20. *E. DETRUNCATUM* (Nees et M. in nov. act. acad. nat. cur. XI t. 1 p. 64), foliis ovato-oblongis in petiolum attenuatis subpubescentibus glabrescentibus argute euspidatis, pulvillis detruncatis, spicis axillaribus terminalibusque simplicibus trichomisve, bracteis subulatis serrulato-ciliatis.  $\mathfrak{Z}$  Ad Viam Felisbertiam in Brasiliâ, Januario (Max. Princ. Neuviel! in h. Mart. et Nees), in silvis prov. Bahiensis (Blanchet! n. 528 in h. Moricand), in Brasiliâ (Sel-low! in b. reg. berol. n. 274 et 137), in silvis prov. Minarum Generalium, Julio (Riedel! in h. imp. petrop. n. 333). — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 450. N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 156. Accedit ad *E. verbenaceum*, sed dignoscitur pulvillis valde prominentibus hemicylindricis apice detruncatis excavatis, petioloque ampliore et calyce minore. Signum dubitandi l. c. dcendum est; est enim hæc genuina hujus generis species. Corolla violacea (Riedel). (v. in h. Princ. Maximil., Mart., Moricand, berol., petrop.)
21. *E. FECUNDUM* (Lindl. bot. reg. t. 1494), foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis integerimis junioribus pubescentibus, bracteis minimis, corollæ lacinias obtusis tubo arcuato brevioribus, spicis terminalibus subsimplicibus.  $\mathfrak{Z}$  In Brasiliâ (Gordon in bot. reg. I. c.) Caulis tetragonous, ad nodos tumidis, pedalis sesquipedalisve, parum ramosus. Folia atroviridia, supra glaberrima, subconcreta, brevius petiolata, subtus cum petioliis ramulisque pubescentia. Bracteæ subulatae et sepalæ pubescentia. Corolla lilacina. Memorabilis in hæc plantâ proclivitas est florentes ramos loco sterilium et foliiferorum gignendi. Ubiunque enim incrementum plantæ casu quodam, v. c. aere siccо aut calore nimis diminuto etc. reprimitur, eo statim oriuntur in omnium foliorum axil-

- lis florum fasciculi, quibus obruta stirps ista perit, nisi auxilium aliunde parcatur. (Lindl. l. c.) An Chameranthemi Beyrichii forma, culturâ producta?
22. E. *NACROPHYLLUM* (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 157), foliis oblongo-ovalibus acuminatis basi acutâ in brevem petiolum decurrentibus glabris, racemo terminali simplici trifidove, floribus oppositis brevipedicellatis adproximatis, bracteis subulatis brevibus calycibusque rubiginoso-hirtis subtomentosis, ♀ In silvis umbrosis prov. Bahiensis (Luschnath! n. 39 in h. imp. petrop.). Caulis glaber. ad genicula anceps. Folia 10-12 poll. longa, 3-3½ poll. lata, obiter repanda, summa paulo minorata. Petiolus vix ¼ poll. longus, validus, deorsum anguste marginatus. Spica 5-6 poll. longa, pedunculo communis 3-4-pollicari rhachique pubescentibus. Bracteæ et bracteolæ lin. 1 longæ. Flores internodia excedentes. Pedicelli inferiores 1½ lin. longi, superiores vix ½ lin. longi. Corolla alba, 7 lin. longa, laciniis ovalibus emarginatis, subinde et tribus eaurum integris. Capsula pollicaris, nngue 6-7-lineari, pubescens. (v. in h. petrop.)
- β. angustifolium*, foliis lauceolatis, spicâ breviore. — Ad Bahiam (Blanchet!) n. 3128 in h. Moricand).
23. E. *RIEDELIANUM* (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 156), foliis oblongo-ovalibus in acumen obtusum attenuatis basi obtusa brevissime petiolatis nitidulis costis caule inflorescentiâ rubiginoso-hirtis, spicâ terminali simplici compositâ, floribus fasciculatim oppositis, bracteis inferioribus lanceolatis calycis æquantibus, superioribus bracteolatisque subulatis calyce brevioribus. ♂ ? Ad rivulum S. do Mantiquera, Maio (Riedel! in h. imp. petrop.). Folia cum petiolo vix 1 lin. 1 longo 4-4½ poll. longa, 1½-2 poll. lata, basi obtusa in petiolum desinente. Caulis pube rubiginosâ laxe vestitus. Spica in pedunculo ½ poll. longo. Flores terni plures, subsessiles. Calyx 2 lin. longi, laciniis subulatis glanduloso-hispidulis æqualibus. Bracteæ et bracteolæ superiores calyce duplo breviores. Corolla coccinea. Capsula 6-7 lin. longa. (v. in h. petrop.)
24. E. *ALBIFLORUM* (Hook. bot. mag. t. 4225), foliis ovali-oblongis breviusculis basi cuneatâ sessilibus utrinque lineolatis glabris, spicâ terminali elongatâ simplici compositâ; floribus fasciculatim oppositis, bracteis subulatis pedicellis breves vix superantibus. ♂ In silvis ad S. Juan aliasque in locis camporum Brasiliæ, Septembri (Maximil. Princ. Neuwied! in h. Nees et Mart.), in silvis primævis opacis prov. Bahiensis (Blanchet! n. 84 in h. Moricand et 441 in h. DC. Salzmann! in h. imp. petrop. et Bentham), (Sellow! in h. reg. berol. n. 109, 142 et 220 [195]), prope Almadam, Decembri (Martius!) — Mohl et Schlecht. bot. zeit. 1846. p. 392). Eranthemum sessile Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 156. *Justicia leucantha* Blanchet! n. 3714 in h. DC. Salzmann in h. imp. petrop. Differt ab E. modesto statû majore, scil. caule 3-pedali, et floribus fasciculatis, tum foliis basi mediocriter coangustatâ sessilibus vel in petiolum brevissimum vix visibilem contractis. Caulis inferne lutescens, superne viridis, alternatim compressus, glaber. Folia per paria approximata, 4½-5½ poll. longa, 1½-2½ poll. lata. Spica cum pedunculo semipedali pede longior, erecta, ad basin interrupta, ex omni parte pilis brevissimis dense vestita et nonnihil canescens, basi interrupta, subverticillata. Pedicelli brevissimi. Bracteæ subulatae, breves. Calyx 2 lin. longus. Corolla 4-4½ lin. longa, nivea, tubo longitudine limbi, limbi laciniis oblongis obtusis æqualibus. Stamina inclusa, sterilia setacea, incurva. Capsula fere pollicaris. Variat spicâ glabrâ et pubescente. (v. in h. Maxim. Princ., Mart., Moric., DC., berol., petrop.)
25. E. *LEPTOSTACHYUM* (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 157), foliis oblongis in acumen obtusiusculum attenuatis basique acutâ in petiolo decurrentibus confertim lineolatis subtus pallidioribus cauleque comppresso-tetragono glabris, spicâ terminali simplici filiformi longe pedunculata pedunculoque pubescentibus, floribus oppositis distantibus, bracteis subulatis calyce duplo bre-

- vioribus calycibusque adpressis.  $\mathcal{U}$  Ega, ad flumen Amazonum, Octobri (Poppig! in h. imp. petrop. absque numero). Spicæ longæ gracili longe pedunculata et foliis supra obscure viridibus subtus glaucescenti-pallidi subrepandis inter congenera est distinctissimum. Caulis inferne testaceus, laevissimus. Calyx 1  $\frac{1}{2}$  lin. longus, lacinias subulatis, rachi valde adpressus. (v. in h. petrop.)
26. E. CINNABARINUM (Wall. pl. as. rar. 1 p. 20), foliis oblongo-ellipticis attenuatis longissime acuminatis glabriusculis, racemis terminalibus recurvato-patentibus paniculatis, bracteis filiformibus, floribus subsessilibus secundis, corollæ lacinias ovatis. ♂ Ad Troglia in prov. Martabanâ, basud longo itinere a Saluen fluvio (Wallich!) — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 449, Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 1 t. 21. 3 p. 108. Floribus letissime coccineis ex longinquo ab E. crenulato dignoscitur. (v. in h. Wallich).
27. E. DECURRENS (Hochst. in Kotschy it. nub. n. 276 et in Schimper it. abyss. 2 n. 773), suffruticosum, caule tetragono laevissimo, foliis ovatis acuminis obtuso, e basi latâ in petiolum attenuatis subrepando-crenatis glabris nitidis, spicæ terminali simplici, floribus solitariis ternisve oppositis, inferioribus distantibus, bracteis bracteolisque subulatis brevibus, calycibus, rbachi ramulisque juvenilibus glanduloso-scabris, lacinias calycis subulatis adpresso, corollæ hypocraterimorphâ subregnari, lacinias ovalibus obtusissimis impunctatis. ♂ Ad pagum Cordofanum Milbes juxta fluvium pluviale Cboor in umbrosis Septembri (Kotschy!), in umbrâ arborum ad fluvium Taccaze, Octobri (Schimper!). Proximum sane E. crenulato, sed differt: caule haud teret sed obtuso tetragonon, foliis latioribus, hand æquo pede ad basin et apicem attenuatis, sed e basi latiore derepente in petiolum cuneiformem longum attenuatis, apice minus acuminatis acumine magis obtusato, floribus majoribus, tubo scil. 9 lin. longo limbo 8 lin. lato, lacinias latioribus, alterâ minore, roseis fauce purpureâ, anthoris prominulis, capsula majore, fere pollicari, seminum latere exteriore convexo laevi, interiore depresso reticulato-rugoso. (v. in h. un. itin. et propr.)
28. E. CRENULATUM (Wall. in Bot. reg. t. 879), fruticosum, erectum, caule inferne foliisque oblongis utrinque acuminatis repando-crenatis glaberrimis, racemo terminali simplici composite pluribusve axillari-aggregatis simplicibus, floribus fasciculato-congestis subverticillatis secundis, bracteis bracteolisque subulatis brevibus calycibusque glanduloso-scabris, corollæ lacinias ovatis obtusis aequalibus. ♂ In Indiâ orientali. Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 107.
- a. caule ad inflorescentiam usque glabro, racemis erectis verticillatis. — In Sillet et in Penang (G. Porter!), in montosis calcareis insulæ Javae (Blume, Zollinger! pl. jav. n. 44 in h. DC. et Moritzi pl. Zoll. p. 48, Spanoghe! in h. Hooker), Malacca (Cuming! n. 1658 et 2357, in h. Bentham, Griffith! in h. Hooker), Ceylon (Walker! n. 1600 in h. Hooker). Eranthemum crenulatum Wall. in bot. reg. t. 876, Spr. cur. post. in syst. veg. p. 19, Willd. sp. pl. ed. 2 p. 448, Wall. cat. n. 2491 a, b, c, d, e et 2492 a (ex parte). Justicia latifolia Vahl symb. 2 p. 4, en. 1 p. 124 et h.! (spec. Koenig.), Willd. sp. pl. 1 p. 88, ed. Dietr. 1 p. 370. Eranthemum diantherum Bl. bijd. p. 792 (nec Roxb.). Justicia Honamoriensis h. Madr.! Wall. cat. n. 2491 a.
- β. glandulosum, racemo terminali bi-trifido recurvato-patente, floribus sursum secundis, caule sæpe ad inferiores articulos usque glanduloso-scabro humiliore. — Ad ripas Attran fluvii supra Ussame ad Amherst et inter Amherst et Chappedong (Guill. Gomez!), in Mateabo (Hamilt.). Vidi exempla ex hort. bot. calc., ubi e Penang illatum est (Wall. cat. n. 2491 e), e Penang (Wall. cat. n. 2491 d), ex h. Wight! (Wall. cat. n. 2491 c et Heyn! Wall. cat. n. 2491 b et 2492 a ex parte). Justicia rubicunda h. Hamilt.! Wall. cat. n. 2480.

*y. angustifolium*, foliis augustioribus fereque lanceolatis. — In Philippinis (Cuming! n. 2389), Malacca (Th. Lobe! et Griffith! iu h. Hooker). *Justicia orbiculata* Wight Wall. cat. n. 2489 b in h. Hooker. Est forma *angustifolia* varietatis *g.* (v. iu h. Hooker).

Species est variabilis, sed distincta cortice laxe brunneo ramorum adultiorum (præsertim in siccis), et racemo vel spicâ glanduloso-pubescente, ob fasciculos florum oppositos subverticillata, corollæ limbo regulari ratione tubi parvo. Corollâ pallide lilacinâ. Variant formæ  $\alpha$  et  $\beta$  1<sup>o</sup> magnitudine. Exempla h. madr. cœteris minorâ, vix pedalia, foliisque minoribus latioribus rigidulis, ejusmodi specimina etiam cl. Junghuhn ad sinum Wiukops Bai insulæ Javæ legit. 2<sup>o</sup> Pubescentiâ glandulosâ inflorescentiæ magis minusve ad inferiores articulos descendente, proximis circa radicem tamen semper cortice illo lœvi et quasi tumente pallide brunneo vestitis. In exemplo, quod *Justicia rubicunda* Hamilt. nomine vidi, caulis glabrescens; sed similia quoque Gomezius adulit exempla. 3<sup>o</sup> Fasciculis florum, ubi rami racemi terminalis patent et recurvantur, sursum ascendentibus. (v. v. et s. in h. Wall., Hook., herol. etc.)

29. E. GRACILIFLORUM (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 107), herbaceum ?, erectum, caule punctulis exasperato, foliis ovalibus cuspidatis in petiolam longum desinentibus repando-subcrenatis subtus ad costas scabris, racemo terminali simplici ternisve spiciformibus, rhachi multisulcatâ, floribus spicatin subverticillatis confertis, bracteis bracteolisque subulatis brevibus calycinisque scabris, corollâ subtilabiata laciinis ovatis obtusis.  $\mathcal{Y}$  In montibus prov. Penang, ad flumen Kosea (G. Porter!). *Justicia graciliflora* Wall. cat. n. 2427. Primo intuitu E. crenulatum refert, ad monstrositatem fasciatam tendens. Caulis humilis, herbaceus, subsimplex, tuberculis exiguis acutis asper. Folia ampla, inferiora cum petiolo triplicari 9-10 poll. longa, 3 poll. lata, superiora parum decrescentia obiter repando-crenata. Racemus foliis brevior, 4 poll. longus, spiciformis, simplex basive trifidus. Rhachis crassâ, pubescens-scabra nec glandulosa, costata, costis elevatis in dentes pro florum insertione cebros desinentibus. Flores approximati. Calyx pedicello vix longior, ut ille scaber, profunde quinquefidus, laciinis subulatis. Corollæ plurimæ spiratim simul florentes, sequipollulares, glabriuscule, pallide purpureæ ?; tubus gracilis, limbi laciinis quadruplo longior; limbus quinquefidus, laciinis obovatis, tribus æqualibus magis ad alterum latus spectantibus, duabus basi paulo altius cohærentibus ab illis magis distantibus. Authoræ exsertæ. (v. in h. Wall.)

30. E. HYPOCRATERIFORME (R. Br. ex R. et Sch. syst. veg. 1 p. 175, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 445), foliis ovatis utrinque attenuatis, spicis terminalibus, bracteis setaceis, corollis subhypocraterimorphis.  $\mathfrak{z}$  In Guineâ (Vahl). *Eranthemum affine* Spr. syst. 1 p. 89. *Justicia hypocrateiformis* Vahl en. 1 p. 165. Rami glabri, acute tetragoni. Folia sesquipollilaria, glaberrima, obtusiuscula. Spica 2-3-pollicaris. Flores approximati. Bracteæ sub lente margine villosæ, in setam semipollarem attenuatae. Calyx glaber. Corollæ tubus sesquipollicularis, limbi laciiniæ obovatae, limbo triple breviores. Filamenta tubo parum longiora. Capsula fere sesquipollicularis, clavata (Vahl 1. c.). In h. Vahliano deest.

31. E. TETRAGONUM (Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 377), fruticosum, caule quadriquetro glabro lœvi, foliis ovato-lanceolatis acutis, thyrsis terminalibus spiciformibus, rhachi quadrangulari hirtâ, floribus in ramulis brevissimis cymuloso-globératis, bracteis parvis, corollæ limbo subæquali.  $\mathfrak{z}$  In Antillis (h. Hook.!). *Justicia tetragona* h. Hooker! (nec Vahl). Caulis apice subsericeus, pedalis ascendens. Spica 2-2½ poll. longa, deusa, basi evidentius ramosa. Folia remota, 1-1½ poll. louga, acuta, brevipetiolata, basi ipsâ acuta, glabra. Bracteæ et bracteolæ calycem æquantes, ovato-lanceolatae. Capsula 1⅔ poll. longa, clavata. (v. in h. D.C.).

32. E. LAPATHIFOLIUM, fruticosum, glabrum, foliis oblongis obtusiusculis

- basi acutâ in petiolum longiusculum decurrentibus apicem versus repando-crenatis, racemo terminali trichotomo, floribus solitariis fasciculatis brevipedicellatis subsecundis, bracteis bracteolisque subulatis brevibus glabris, corollâ subbillabiatâ laciniis duabus superioribus angustioribus breviribusque. ♂ In Indiâ orientali (h. Vahl!). *Justicia lapathifolia* Vahl en. 1 p. 126 et h. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 374. Folia 3-4 poll. longa, costâ mediâ subinflatâ, apice parum attenuata, obtusiuscula. Bracteola pedicello impositæ. Corolla sesquipollicaris; limbâ laciniis superioribus oblongis, inferioribus ovalibus. (v. in h. Vahl).
33. *E. ALBUM*, fruticosum, glabrum, folijs ovato-lanceolatis brevipetiolatis undulatis, spicis axillaribus terminalibusque folijs longioribus, floribus distantibus oppositis sessilis, bracteis bracteolisque parvis, corollâ tubo filiformi limbo bilabiata. ♂ In insulâ Andaman et in hort. calc. (Wallisch!). *Justicia alba* Roxb. fl. ind. or. ed. Wali. 1 p. 117, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 378. Corolla alba, tubo longo. Labii superioris laciniæ duæ erectæ, cuneiformes, ultra dimidium coalite; inferioris tripartiti laciniis latioribus deflexis. Filamenta brevia. Antheræ extra faucem. An idem atque *E. lapathifolium*?
34. *E. RACEMOSUM* (Roxb. fl. ind. or. ed. Wall. 1 p. 113), suffruticosum, glabrum, folijs oblongis ventricosis integerrimis in petiolum acute decurrentibus, racemis terminalibus, floribus oppositis brevipedicellatis, bracteis bracteolisque subulatis brevibus, corollâ subbillabiatâ utroque labio tripartito. ♂ In insulis Moluccis (Wall. ex h. calc.) — Willd. sp. ed. Dietr. 1 p. 447, N. ab E. in. Wall. pl. as. rar. p. 107. Planta valde suspecta propter corollas labium superius tripartitum descriptum, quâ notâ forsitan ex ordine Acauthacearum excluditur. nisi errore calamis irreperitur. Ceterum *E. lapathifolium* persimilis esse videtur. (v. in h. Wallisch).
35. *E. ZOLLINGERIANUM*, caule suffruticoso erecto, folijs lanceolatis (oblongo-lanceolatis Bl.) acutis brevipetiolatis subrepandis glabris, racemo terminali longe pedunculato, floribus subfasciculatis, bracteis bracteolisque subulatis brevibus calycibusque glabriusculis, corollâ laciniis subovalibus obtusis supero minore, medio inferiore emarginato. ♂ In insulis Philippinis (Zollinger!) *Eranthemum dianthum* Bl. bijdr. p. 792 (nec Roxb.), Moritzi, Zoll. pl. Jav. p. 47 n. 162. In specimenis Zollingeriano folia (5 poll. longa, 7 lin. lata), apice falcato-incurva sunt. Corolla *E.* fasciculat. (v. s.)
36. *E. PUNCTATUM*, caule tereti asperulo, folijs ovalibus oblongis utrinque acutis subrepando-crenatis glabris nitidis, spicâ terminali simplici, floribus inferioribus distaitibus ternis, bracteis bracteolisque subulatis brevibus, calycibus rhachi ramulisque juvenilibus scabris, laciniis calycis subulatis adpressis, corollâ bilabiata-hypocraterimorphæ laciniis ovalibus obtusissimis subæqualibus, infimâ paule latiore purpureo-punctata. ♂ In Indiâ orientali. Colitur in horto vratisl. Simillimum *E. crenulatum* Wall., a quo differt: caule vetusto punctulis aspero nec lœvi, ramis et calycibus setulis brevissimis scabris nec glandulosis, laciniis calycis latioribus strictis adpressis nec fere setaceis patulis, tum corollæ laciniis tribus inferis a duabus superis magis dehiscentibus, infimâ punctis purpureis confluentibus pictâ, reliquis pallide rubicundis, duabus superis arcte sibi contiguis nonnihil recurvis, lateralibus primum convexis deinde ad latus magis decurvis. Tubus  $\frac{1}{4}$  poll. longus, apice incurvus. An *E. crenulatum* var.? Ab *E.* bicolor distinguuntur inflorescentiâ spicata et corollæ limbo angustiore subregulari. (v. v.)
37. *E. MODESTUM* (N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 157 t. 29), folijs ovato-oblongis sessilibus supra hirsutis, racemis axillaribus terminalique, floribus distantibus verticillatis oppositis glanduloso-pubescentibus, bracteis setaceis. ♂ In America tropica. Teneritate et floribus minoribus pallide ceruleis faciliter negotio distinguuntur, folia hirsuta ut taceamus. Stamina non-nihil exserta.
- a. majus*, folijs majoribus plerisque acutis, racemis et axillaribus et terminali, floribus inferioribus fasciculato-ternis. ♂ Ad Viam Felisbertiam

Decembri (Maximil. Priuc. Neuwied! in h. Mart. et Nees). Eranthemum modestum Nees et M. in nov. act. acad. nat. cur. xi, 1 p. 63, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 449, n. 29.

$\beta.$  minus, foliis brevioribus obtusis, racemo terminali, floribus oppositis.  
— In silvis ad Almada et Ferradas prov. Bahiensis, Decembri et Januario (Mart.!). *Justicia pachyrrhiza* Mart. in h. brasili. monac.

38. E. VARIABILE (R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 477 op. ed. N. ab E. 3 p. 333), suffruticosum tenuissime pubescens basi glabrescens, foliis ovatis oblongis integerrimis vel subdentatis, rhachi floribusque plus minus glanduloso-hispidulis, racemis terminalibus laxis, floribus solitaris ternis opposite, pedunculis axillaris paucifloris iufimo subcorymboso, bracteis bracteolique setaceis pedicello brevioribus, calycis laciuiis subulatis.  $\delta$  In Novâ Hollaudiâ. — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 444. Corolla vix 6 lin. longior. Antheræ parum exsertæ. Caulis inferne cortice lœvi testaceo vestitus.

$\alpha.$  integrifolium, foliis ovatis basi plerumque obtusis, racemo terminali multifloro, accedentibus axillaribus inferiorum foliorum paucifloris subcorymbosis. — Ad Port Jackson et inter tropicos Novæ Hollandiæ (R. Br.), ad Brisbane fluvium etc. (Cunningham! n. 43 in h. Hooker), in insulis Pisang islands (Gaudichaud! in h. DC.), in insula Rawal (idem! ibid., R. Br. l. c.). Eranthemum micranthum hort. berol. ex hort. angl.! — (v. s. sp. et cult. ex hort. kew. in h. DC. et ex h. berol.)

$\beta.$  dentatum, foliis angusto-oblongis repando-dentatis, racemo multifloro. — Inter tropicos Novæ Hollandiæ (R. Br.) (v. in h. DC. ex h. Lambert et Gaud.) Variat foliis-oblongis basi attenuatis obiter repandis vel integerimis. — In New S. Wales (h. Hooker!)

$\gamma.$  lineare, foliis obsolete dentatis, pedunculo paucifloro. — Cum var.  $\beta$ , quâcum forsitan distinctam a var.  $\alpha$  exhibet speciem. (R. Br. l. c.)

\* \* Pedunculi (vel flores subsessiles) axillares.

39. E. BICOLOR (Schrank h. monac. t. 8), caule puberulo, foliis subovatis repandis glabriusculis in petiolum attenuatis acumine acuto obtuso, pedunculis axillaribus cymoso-suhtrifloris petiolum subæquantibus, bracteis bracteolique subulatis, corolla albæ tubo longissimo, limbo plano lacinia oblongo-ovalibus media infera paulo latiore sanguineâ notata.  $\delta$  In insulâ Luzon, in silvis montanis Javæ (Blume), in insula Timor (Decaisne! Gaudich.! in h. DC., in Philippinis (Cumming! n. 608 in h. Hook. et berol.) — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 443. Sims bot. mag. t. 1423, Eranthemum pulchellum Gartenmagaz. 1810 p. 176 t. 17. *Justicia bicolor* Sims bot. mag. t. 1423. Andr. h. am. t. 319. Eranthemum fasciculatum Blume bijdr. p. 792, Decaisne h. timor. in nouv. ann. du mus. 3 p. 384, et h. DC. Eranthemum diantherum Roxb. fl. ind. or. ed. Car. et Wall. 1 p. 112, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 447, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 108, Zollinger! n. 16 in h. DC. Antheræ fauces æquantes. Variat petiolis longis et brevibus, quibus et pedunculi respondent, qui petiolo subinde dimidio duplo sunt longiores. Ad basin cymes bracteæ seu folia involucralia sæpe accedunt 2-linearia, ramulos subæquantia. Specimina Javanica et Timorensia petiolis brevioribus et pubescentiâ in costis foliorum evidenter differunt. (v. in h. paris., Nees Junghn., DC., berol. etc. et viv. cult.)

40. E. HISPIDUM, hirsutum, foliis oblongo-lanceolatis acutis subsessilibus, floribus terminalibus subfasciculatis, calycis lacinia longissimis linearie-subulatis longe ciliatis, corollæ albæ immaculatae tubo gracili calyce subduplo longiore, limbi plani lacinia superis ovalibus, inferioribus ovatis paulo latioribus.  $\delta$  In Sierra Leone (Thunberg! in h. Willd.). *Justicia hispida* Willd. sp. pl. 1 p. 84, ed. Dietr. 1 p. 374 et h. n. 306! Vahl en. 1 p. 116. — E. bicolori affine. Ab omnibus differt calyce prælongo rigido et corollâ totâ albâ. (v. in h. Willd.)  $\delta$

41. *E. HÆNKEANUM*, foliis oblongo-lanceolatis in petiolum longe decurrentibus supra dense lineolatis glabris in costis scabris, floribus terminalibus capitato-subfasciculatis, bracteis bracteolisque calyce longioribus lanceolato-lineari-e-subulatis longe ciliatis, calycis lacinis lanceolatis apice subulatis ciliatis, corollæ tubo gracili, limbi lacinis duabus superis minoribus. ♂ In insulâ Luzon (Hænke!). *Justicia fasciculata* N. ab *E.* in h. Hænk. Propter magnam *E.* hispida similitudinem hue refero. Rami laxi, tenues, inferne simplices, teretes, glabri, superne divisi, subtetragonii et lineis oppositis setularum falciformium, e foliorum junctione decurrentibus, scabri; genicula parum incrassata. Folia poll. 3-3½ longa, 9 lin. lata, in petiolum attenuata, late viridia, lineolis copiosis utrinque exasperata. Fasciculus terminalis florum pedunculo communis vix semiuncialis subtetragono scabro suffultus, apice jugo foliorum lanceolatorum vel oblongorum praeditus, trifidus, capituliformis; fasciculi proprii tri-quadriflori. Bractea et bracteola calyce longiores, ciliatae, illæ lanceolato-acuminatae, ha linearie-subulatae. Calycis lacinia lanceolata, apice subulata, longe ciliatae. Corolla fere pollicaris, purpura, pubescens, tubo longo æquali incurvo, limbo bilabiato, labio superiore oblongo, inferiore trifido, lacinia latiusculis. Stamina exserta; antherarum loculi sursum conniventes, basi inæquales. (v. in h. Hænk.)
42. *E. HETEROPHYLLUM*, caule demum glabrescente testaceo floribus axillaribus fasciculatis subinde et geminis ternis brevissime pedicellatis hypocraterimorphis, foliis inæqualibus, altero cujusque paris ovato-oblongo apice attenuato brevissime petiolato, altero duplo et triplo minore oblique cordato-orbiculato obtuse cuspidate subsessili, utroque subitis cauleque novello pubescente, supra hispidulo, pulvilliis truncatis. ♂ Ad Padre Correa (Pohl! in h. palat. vindob. n. 58, Beyrich! in eod. h. ex h. Endlicher), Rio de Janeiro (Sellow! in h. reg. berol. n. 26 et 188, 11 [c. 459]), (Raven! n. 215 in h. Mart.). *Veronica fluminensis* Velloz. fl. fl. 1. t. 25. Caulis aliquot pedes altus, trichotomo-ramosus, epidermide nitidâ testacea punctulato-asperâ vestitus; partes juveniles pubescentes, alternatim bicostulatae costis approximatis magis hirtis. Folia caulina 2½-3 poll. longa, 1 poll. lata, ramea cujusque paris majora, 1½ poll. longa, 6-7 lin. lata, basi obtusiuscula in petiolum brevissimum desinente, cuncta ad costas præsertim pubescencia et supra setulis parvis inspersa. Pulvilli lineæ elevata conjuncti, post folia delapsa truncati. Flores in angulis foliorum majorum idœque alternatim subinde etiam opposite in cymulâ sessili brevi trifidâ 6-9-floris dispositi, in aliis gemini, terni, raro solitarii, pedicello brevissimo præediti. Bractea et bracteola subulatae, longitudine pedicelli, scabrae. Calyx cum pedicello 2 lin. longus, lacinis subulatis scabris. Corolla pollicaris, lacinis limbi æqualibus ovalibus obtusis. Stamina sterilia brevissima, setacea. Capsula 10 lin. longa. (v. in h. vindob., berol. et Mart.)
43. *E. EXÆQUATUM* (Nees ab *E.* in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 158), foliis æqualibus ovali-oblongis subsessilibus basi apiceque brevattenuato obtusis supra laxe strigulosis, caule hispido demum glabrescente testaceo, floribus ad apicem caulis axillaribus geminis ternis brevissime pedicellatis hypocraterimorphis. — Propri Sumidouro in Serra d'Estrela, Octóbre (Riedel! in h. imp. petrop.). Differt ab *E. heterophyllum* foliis cujusque paris æqualibus. An varietas? Flores cærulei ex Riedel. (v. in h. petrop.)
- § 2. *Corollæ limbo subbilabiato.*
44. *E. PALATIFERUM* (Nees ab *E.* in Wall. pl. as. rar. 3 p. 108), fruticosum, erectum, foliis oblongis acuminatis integerimis brevipetiolatis glabris, racemi terminalibus subternis spiciformibus recurvis, floribus erecto-seundis bilabiatis, bracteis bracteolisque subulatis brevibus. ♂ In montibus prope Sillet (Wall.!). Floret Martio et Aprili. Fructus maturescunt Maio. *Justicia palatifera* Wall. pl. as. rar. 1 p. 80 t. 92. Caulis simplex vel parce ramulosus, purpurascens, pubescens. Folia merithallis longiora, lanceolato-oblonga, subcrenata vel integerrima, basi acuta, 5 poll. longa, coriacea, supra glaberrima, opaca,

subtus in costâ elevatâ pubescens, summa linearie-oblonga bi-tripollucaria valde approximata. Petiolus semipollucaris. Racemis terminalis et ex axillis supremis oppositi, simplices, breviter pedunculati, secundi, 3-4-pollicares. Pedunculi pubescentia glauculoso-capitata obsiti; pedicelli brevissimi, carnosii, tumidi. Calyx oblongus, 3-linearis, profunde divisus in lacinias 5-lineares obtusas ciliatas parallelas. Corolla tubus gracilissimus, filiformis, 1½-2-pollicaris, limbus subbilabiatus, tubo fere ½ brevior; labium superius bifidum, adscendens, lacinias oblongis obtusis parallelis; inferius descendens, duplo fere latius, trifidum, lacinias lateraliibus lacinias labii superioris similibus, intermedia majore subdeflexa ovata purpureo-marginalia versus basin convexa et elevata in palatum ovatum sulcatum subretusum flavum nigro-punctatum subtus concavâ. Capsula clavata, disperma? unguiculata, pubescens. (v. in h. Wallich).

45. E. BIFARIUM, fruticosum, caule inferne tereti superne bifariam hirsuto, foliis ellipticis utriusque acumiatis glabris lineolatis repando-denticulatis, racemulis axillaribus spiciformibus scabris, floribus solitariis oppositis, bracteis bracteolatis lineari-subulatis calyce brevioribus. ♂ In rupibus ad Pingee in ripâ Irawaddi. (Vidi exemplum unum cum fructu, absque floribus.) Gendarussa bifaria N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 104, Wall. cat. n. 7173. Rami lignosi, teretes, glabri, cortice albicante, juniores tetragonoi, bifariam hirtotomentos, hirsutus lateribus cum foliis alternis respondente. Petioli 1-1½ poll. longi, ciliati; lamina foli 4½-7 pollices longa, 1½-3½ poll. lata, basi in petiolum decurrens. Racemuli 2-2½ pollices longi. Rhachis scabra, articulata. Flores ad articulos oppositi, solitarii, distantes. Bractea calyce brevior. Pedicelli 1-1½ lin. longi, crassiusculi. Bracteola dñe, subulatae, opposita juxta basin pedicelli eodemque paulo longiores. Calyx profunde quinquepartitus, lacinias lanceolato-subulatis. Capsula fere pollicaris, a medio bilocularis, disperma. (v. in h. Wallich).

*Species dubiæ et non extricandæ.*

46. E. PUBESCENS Roth nov. pl. sp. p. 1), foliis ovatis obtusis, spicis terminalibus subdistichis, bracteis imbricatis obovali-oblongis mucronatis carinatis dense pubescentibus, calycibus inæqualibus scariosis. ♂ In Indiâ orientali (Heyne). Corollam huic plantæ autor tribuit Eranthem, calycem et fructum Lepidagathidis; quod quomodo fieri potuerit, judicent alii, quibus perlustrandi herbarii Rothiani data sit occasio.

47. E. SEMPERFLORENS (Roth nov. pl. sp. p. 2), foliis ellipticis utrinque attenuatis glabris, spicis pedunculatis axillaribus geminis, terminalibus solitariis, bracteis imbricatis ovali-acuminatis glabris venoso reticulatis, calycibus inæqualibus scariosis. ♂ ? In ins. Martinicâ (h. Roth !), in Indiâ orientali (Heyne! in h. Roth). De hac planta eadem, quæ ad E. pubescens Roth adnotavimus, valent.

*Species exclusæ.*

E. ACANTHOPHORUM Rœm. et Sch. = Barleria acanthophora.

E. ACICULARE Rœm. et Sch. = Anthacanthus acicularis.

E. AMBIGUUM Schult. = Anthacanthus acicularis.

E. ANGUSTATUM Linn. = Agathelpis angustata.

E. ANGUSTIFOLIUM Linn. = Agathelpis angustifolia.

E. ARMATUM R. Br. = Anthacanthus armatus.

E. CRISTATUM H. B. = Barleria micans.

E. EMARGINATUM Desf. = Anthacanthus emarginatus.

E. FLAVUM hort. et Willd. = Barleria flava.

E. LYCIOIDES Willd. = Anthacanthus lycioides.

E. MICROPHYLLUM R. Br. = Anthacanthus microphyllus.

E. PARVIFLORUM Berg. = Agathelpis parvifolia.

- E. PARVIFLORUM R. Br. = *Dipteracanthus parviflorus*.  
 E. PARVIFOLIUM Link = *Anthacanthus acicularis*.  
 E. PARVIFOLIUM Linn. = *Agathelphis parvifolia*.  
 E. REPANDUM R. Br. = *Anthacanthus repandus*.  
 E. SALSOLOIDES Linn. = *Campylanthus salsooides*.  
 E. SALSOLOIDES h. Desf. = *Teucrium filiforme Poir.*!  
 E. SERPYLLIFOLIUM Willd. = *Erianthera serpyllifolia*.  
 E. SINUATUM R. Br. = *Anthacanthus sinuatus*.  
 E. SPINOSUM Lour. = *Barleria acanthophora*.  
 E. SPINOSUM R. Br. = *Anthacanthus spinosus*.  
 E. VERTICILLATUM Spr. = *Haplanthus verticillatus* (excl. syn. E. spinosi Lour.)  
 E. VINCOIDES R. Br. = *Anthacanthus vineoides*.

CXXXI. CHAMERANTHEMUM Nees ab E. in Lindl. introd. ed. 2 p. 285 et 445, Endl. gen. p. 706, Meissn. gen. p. 297 (205), Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 151 et 154 t. 28.

Calyx profunde 5-fidus, æqualis. Corolla hypocraterimorpha vel elongato-infundibuliformis, tubo longo gracili, limbo subæquali. Stamina 4 fertilia, infra os tubi paulo profundi inserta, inclusa, per paria basi contigua. Antheræ staminum majorum biloculares, minorum 4-2-loculares. Capsula inferne depresso, valvulis contiguis asperma, superius bilocularis, 4-sperma. Dissepimentum adnatum. Semina discoidea, retinaculis suffulta. — Herbae vel suffrutes Brasilienses habitu Eranthemi sed nani, floribus etiam minoribus. Spica floribus oppositis, parvibracteatis.

I. C. BEYRICHII (Nees ab E. in Lindl. Intro. I. c. et in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 155 t. 28), caule petiolisque strigoso-tomentosis, foliis ovalibus oblongis margine scabris.  $\Sigma$  In Serra d'Estrelæ Brasil. umbrosis, Junio (Beyrich!), in silvis ad Bananal supra Serra do Mar prov. Rio de Janeiro, Decembri (Martius!), Schott! in h. palat. vindob. n. 37, 1739 et 4735, Gaudichaud! in h. mus. paris. et Nees n. 243, in h. DC. n. 685, Lund! in h. DC. n. 11, in monte Corcovado prope Sebastianopolim, Julio (Luschnath! in h. Mart.), in umbrosis silvarum prope Rio de Janeiro, Octobri (Riedel! in h. imp. petrop. Harrison! in h. Lehm., Sellow! in h. reg. berol. n. 71, 260, 261, 153 ex parte, 146, forma minor, 136). *Justicia blepharophylla* Mart. in sched. Semipedale. Folia aliquot parum, ratione plantæ magiora et firma, glabriuscula, utrinque obtusiuscula. Spica elongata, floribus regularibus, intervallis distantibus. Calyx pubescens. Bractæ lacinii calycinis paulo latiores et æquales. Corolla parva, alba, tubo cylindrico, limbo brevi, lacinii duabus superis (in quiete a tribus inferis tectis) paulo minoribus. Capsula fere semipolicaris. (v. in h. Beyrich, berol., Mart., petrop., Lehmann, etc.)

$\beta$ . foliis oblongis, capsulâ in sulco ad latus suturæ fusco tuberculatâ. — In umbris silvarum prope Rio de Janeiro, in monte Corcovado, Junio, Augusto (h. acad. petrop.!, Tweedie! in h. Hooker). (v. in h. petrop. et Hook.)

$\gamma$ . rotundifolium, foliis subrotundis, obtusissimis. — In montibus Cabo canensisibus prov. Sebastianopolitanæ (Riedel! in h. acad. petrop.)

Variat in universum spicis in caulis apice vel solitariis vel corymboso-ternis pluribusve, tum etiam petiolis foliorum inferiorum longioribus cæteris aequalibus, foliis autem in speciminiibus majoribus magis oblongis, in minoribus autem brevioribus ovatisque, his vero semper longiori petiolo præeditis margini-

busque subinde setis incumbentibus densioribus tanquam limbo rufescente pallidore ornatis.

2. C. GAUDICHAUDII (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 155) : molliter velutinum, foliis subcordato-ovatis acutis. ♂ In Brasiliâ (Gaudichaud! in h. DC., Tweedie! in h. Hook.). Differt a C. Beyrichii integumento omnium partium velutino denso, foliisque latioribus, inferioribus longiusculæ petiolatis, tum authoris minorum staminum in universum bilocularibus. Caulis basi repens. Folia cum petiole semipollucari 3½-4 poll. longa, 2½ poll. lata, basi plus minus cordata; superiora minora breviori petiolo. Spica terminalis solitaria, circiter sesquicinalis. Flores distantes. Bracteæ triangulares subnudæ calycem æquantes, margine lanuginosæ; inferiores linear-lanceolatae calycem superantes. Bracteolæ bracteis similes, calyces breviores. Calycis laciniæ subulatæ, 1½ lin. longæ, basi pallidæ. Corolla calyce duplo longior, limbo brevi. (v. in h. DC. et Hook.)

- CXXXII. ANTHACANTHUS Nees ab E. (Eranthemi species armatae R. Br.) Eranthemum sect. c. Hesperanthemum Endl. gen. p. 706.

*Calyx regularis*, quinquepartitus. Corolla infundibuliformis tubo cylindrico, limbo erecto-patente quinquepartito laciniis æqualibus. Stamina quatuor, quorum duo sterilia dentiformia. Antheræ fertilia bilocularis, loculis parallelo contiguis secundis, in § 2 magis explanatis, dissepimento angusto discretis, dorso carinato supra basin filamento adfixæ. Stigma obtusum. Capsula usque ad medium a basi angustâ elocularis, asperna, hinc bilocularis, 4-sperma. Semina retinaculis suffulta, discoidea. — Fructiculi vel frutices Americæ tropicæ, Africæ et Indiæ orientalis microphylli, distincti spinis figuræ in aliis aliae, e quarum latere ramulus primordialis abortivus unum pluresque flores edit. Fores brevipedicellati, plerique ad basin lateralem ramuli brevis supraaxillaris spinescentis solitarii vel fasciculati, in unâ æque dubiâ specie axillares ramis inermibus. Bracteæ et bracteolæ ad basin pedicellorum parvæ, illæ sæpe spinescentes; in unâ specie spica terminalis.

#### § 4. *Armati.*

1. A. SPINOSUS, foliis ovalibus oblongis retusis muticis, spinis oppositis recurvulis petiolo longioribus, pedunculis fasciculatis (6-7) folio brevioribus. ♂ in Americâ meridionali, ad Santa Cruz (Carelsen! in h. DC. Eranthemum spinosum R. Br. ex Roem. et Sch. syst. 1 p. 176, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 441, h. Willd.! n. 271 (Isert.). Justicia spinosa Linn. sp. pl. p. 1663, Jacq. am. 2 t. 2 f. 1.? (v. in h. Willd., Vahl).

♂. *horridus*, ramis elongatis simplicibus, spinis crebris folia vel æquantibus vel superantibus, foliis parvis late ovatis obtusis coriaceis.—In Insulâ S. Thomæ (Wydler! n. 12 in h. berol., Bentb., in h. DC.), Martinique (Pleyé! in h. mus. paris. et Nees n. 280). An distincta species? (v. in b. paris. berol., DC., Benth., Hook., etc.)

2. A. ARMATUS, foliis ovalibus oblongis emarginatis muticis basi cuneatis, spinis axillaribus rectis basi squamosis, folio multo brevioribus, pedunculis axillaribus unifloris. ♂ In rupibus montium Jamaicæ (Swartz!) Eranthemum armatum Roem. et Scb. syst. veg. 1 p. 176, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 441, h. Willd.! n. 272 (spec. Swartz). Justicia armata Swartz prodr. p. 13, fl. ind. occ. 1. p. 28, Willd. sp. pl. 1. p. 101, Vahl en. 1 p. 168. Folia coriacea, nitida, fere 1-2 poll. longa. Squamae ad basin spineæ latæ trigonæ. Corolla coccinea, limbi laciniis duabus superioribus inflexis, inferioribus lateralibus acutis, mediâ reflexâ. (v. in h. Willd., Vahl).

3. A. ACICULARIS, foliis ovatis ovato-oblongis apice vel attennatis acumine obtusiusculo, vel rotundatis emarginatis mucronulatis muticis glabris bre-

- vissime petiolatis spinas superantibus, spinis oppositis setaceis rectis adultis subfalcatis, pedunculis axillaribus solitariis fasciculatis unifloris, ramis divaricatis scabriusculis juvenilibus hirtis. ♂ In calcareis fruticetis Jamaicæ (Swartz, Wilson ! in h. Hook.). *Eranthemum aciculare* Rœm. et Sch. syst. veg. 1. p. 177, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1. p. 440, h. Willd.! n. 273. *Eranthemum ambiguum* Rœm. et Sch. mant. 1. p. 154. *Eranthemum parvifolium* Link en. alt. p. 28. *Justicia acicularis* Swartz prodr. p. 13, fl. ind. occ. 1. p. 29, Willd. sp. pl. 1 p. 101, Vahl en. 1 p. 160. *Justicia parvifolia* hortul. Frutex 8-pedalis. Rami tenues punctulis elevatis asperulisi, glabrescentes, graciles, ramosissimi. Folia tenuia, 6-7 lin. longa, 2-3 lin. circiter lata. Spinæ 4 lin. longæ. Corolla albida limbi laciniis obtusis (v. in h. Willd., Vahl, DC., Hook. et viv. c.)
4. A. *MICROPHYLLUS*, foliis oblongis ovato- vel obovato-oblongis cuneatis obtusis submarginatis, spinis axillaribus rectis rigidis pedunculis axillaribus unifloris ramulosis apicem versus pubescens-hirtis. ♂ in Santa Cruz et Domingo (Lam. West! Isert! in h. Willd. Bert.! in h. DC.), Jamaicæ (h. DC!). *Eranthemum microphyllum* Rœm. et Sch. syst. veg. 1. p. 176, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1. p. 441, h. Willd.! n. 274. *Justicia microphylla* Lam. ill. 1 p. 37, Vahl eel. 2 p. 1, en. 1 p. 168. Rigiditate ramorum strictorum eorumque ramulorum distincta. Cortex palidus. Folia semi-unguicularia, subcoriacea, evenia et enervia, rigida cum ramuli spinescentis foliis fere fasciculata, glabra. Spinæ folio breviores. Pedunculi vel solitarii vel 2-8 fasciculati, folia æquantes, foliis gemmæ seu spinæ minoribus stipati. Corolla subunguicularis. (v. in h. Vahl et DC.).
- β. *serpyllifolia*, ramis rigidioribus strictis sulcatis, foliis 2  $\frac{1}{4}$  lin. longis minoribusque. (in h. Willd., Vahl).
5. A. *LYCIOIDES*, foliis oblongo-cuneiformibus obtusis rigidis, spinis axillaribus subulatis rectis rigidis folia æquantibus, floribus axillaribus solitariis. ♂ In Antillis (Desfont.! in h. Willd. n. 275). *Eranthemum lycoides* Desfont. l. c. Link jahrb. 1 p. 47, Rœm. et Sch. syst. mant. 1. p. 154, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1. p. 442. Rami tenues, ferruginei, parum ramosi, pubescens-scabri. Folia 2 lin. longa,  $\frac{3}{4}$  lin. vix lata. Pedunculi longitudine folii vel paulo longiores. Corolla 5 lin. longa, laciniis oblongis obtusis. (v. in h. Willd.).
6. A. *CUNEATUS*, hirtus, foliis oblongo-cuneiformibus obtusis rigidis, spinis axillaribus subulatis patentibus rectis rigidis hispidis folio longioribus, floribus axillaribus... ♂ In Jamaicæ (Fadyen! in h. Hooker). *Justicia cuneifolia* h. Hooker. Differt ab A. lycioide caule foliisque utrinque et spinis pilis brevibus densis tectis hirtis. An var.? Spinæ ad angulum 45° patentes. (v. in h. Hooker).
7. A. *EMARGINATUS*, foliis subtundido-ovatis emarginatis muticis basi brevicutatis obtusisque, spinis axillaribus subulatis subrecurvis, floribus terminalibus glomerato-spicatis. ♂ S. Thomas (Desfont.! in h. Willd. n. 276). *Eranthemum emarginatum* Desf. l. c. Link jahrb. 1 p. 47, Rœm. et Sch. syst. mant. 1. p. 154, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1. p. 442. Rami glabri. Folia Buxi, 5 lin. longa, 1 lin. lata, coriacea. Spinæ folio duplo breviores. Spica densa, pauciflora. Au A. arnati corolles? (v. in h. Willd.)
8. A. *SPRENGELII*, ramis pubescentibus, foliis oblongis coriaceis utrinque attenuatis, spinis alterius remotis subtrifidis (?) erecto-patentibus, pedunculis axillaribus subgeminis unifloris. ♂ In Hispaniolâ. *Eranthemum acanthodes* Spr. syst. 1 p. 88. Species dubia.
- § 2. *Inermes.*
9. A. *VINCOIDES*, fruticosus, glaber, foliis oblongis obtusis integerrimis petiolatis, pedunculis in gemmâ axillari brevi muticâ ad speciem fasciculatis bi-bracteatis 1-3-floris, corollâ subinfundibuliformi. ♂ Madagascar (Commerson! in h. Lam. et Vahl). *Eranthemum vincoides* Rœm. et Sch. syst. 1 p. 176,

Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 442. *Justicia vineoides* Lam. enc. méth. 1 p. 621, ill. 1 p. 37, Willd. sp. pl. 1 p. 100, Vahl en. 1 p. 167 et h!. Rami glabri, cani, ruguloso-striati, pulvinis crassis truncatis. Folia 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 6-8 lin. lata, in petiolam acute decurrentia. Pedunculi in gemmâ brevissimâ oppositi, bracteâ parvâ linearie suffulti, folio duplo breviores, citra vel ultra medium bracteolis 2 subulatis prædicti, hinc 1 vel 3-flori. Laciñæ calycis breves, subulatæ. Corolla 6 liu. longa, pubescens, limbi laciniis subovalibus obtusis profunde discretis. Anthera ovata, plane. (v. in h. Vahl.)

10. A. *SINUATUS*, suffruticosus, foliis linearibus (linearis-oblongis), sinuato-pinnatifidis, pedunculis axillaribus trifidis (simplicibusve). ♂ (?) In insulâ Tannâ (Forster!). *Eranthemum sinuatum* Rœm. et Sch. syst. 1 p. 175, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 444, h. Willd.! p. 268. *Justicia sinuata* Banks et Soland. Vahl symb. 3 p. 11, en. 1 p. 166 et h!. *Justicia longifolia* Forst. prodr. p. 13. Folia 2 $\frac{1}{4}$  poll. longa, obtusa, inter lobos 3 lin. lata, lobis utrinque 2 obtusis suboppositis. Pedunculi axillares, folio triplo breviores. Calyx cernuus. Corolla et fructus nos latent. (v. in b. Willd. spec. b. Sprengel).
11. A. *REPANDUS*, fruticosus, foliis ellipticis repandis, pedunculis axillaribus trifidis, corollis hypocrateriomorphis. ♂ In insulâ Tannâ (Forster). *Eranthemum repandum* R. Br. ex Rœm. et Sch. syst. 1 p. 175, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 444. *Justicia repanda* Forst. prodr. n. 12; Vahl. en. 1 p. 166.

CXXXIII. CHÆTACANTHUS Nees ab. E. in Lindl. introd. ed. 2 p. 445 et in Linnæa. (1841) 15 p. 356, Endl. gen. p. 4042, Meisn. gen. p. 295 (203).

Calyx profunde quinquefidus, laciniis longis setaceis rigidis. Corolla infundibuliformis, tubo angusto, limbo subæquali. Stamina 2, a basi ad os usque faucium tubo adnata, subexserta. Antherae cordatae, loculis subparallelis basi muticis. Capsula oblonga, depresso-tetragona, rigidula, in medio tetrasperma. Flores axillares sessiles, basi bracteolis duabus subulatis. — Fruticuli Africæ australis mytilloides, ramosissimi, foliis parvis, floribus parvis roseis.

1. C. *PERSOONII* (Nees ab E. in Linn. 15 p. 356), glabriusculus, foliis obovatiss., corollæ tubo laciniis calycis breviore. ♂ In Africâ australi (Thunberg, Mundt, Ecklon! Drège!). Corollæ laciniæ ovales, tubus basi hinc gibbus. (v. in h. Ecklon, Drèg. etc.)
- α. foliis obtusis pubescenti-scabris.
  - β. *aristatus*, foliis obovato-cuneatis saepe acutiusculis glabris. — *Ruellia setigera* Pers. synops. 2 p. 176. *Ruellia aristata* Thunberg fl. cap. ed. Schult. 2 p. 479. *Eranthemum obovatum* var. c. E. Meyer! cat. pl. Drèg. a. 1837. *Ruellia thymifolia* b. Vahl! (spec. Dahl.) Minor, ramis magis coarctatis, floribus magis sparsis, calycis laciniis paulo brevioribus glabris.
  - γ. *grossus*, calycibus ventricosis oblongis ovatisve (semipollicaribus), laciniis conniventi-parallelis aucto numero, ventre uredine fæto. — N. ab. E. l. c. In summo vertice montis Bothasberg latere urbem Grabamstown spectante (Ecklon!). (v. in h. Ecklon, Drèg., berol., etc.)
2. C. *GLANDULOSUS*, dense glanduloso-pubescentis, foliis ovali-oblongis utrinqua acutiusculis, corollæ tubo æquali laciniis calycis æquante iisve longiore. In Africâ australi (Drège!). *Eranthemum obovatum* var. b. E. Mey. l. c. Corollæ (dimidio longioris quam præcedentis) laciniæ oblongæ. (v. in h. Drèg.)
3. C. *BURCHELLII*, laxe hirsutus, foliis ovalibus acutiusculis basi attenuatâ sessilibus ciliatis, corollæ tubo æquali laciniis calycis birsutis paulo longiore. ♂ Shaba Unea in prom. B. Sp. (Burchell! in h. Hooker). Corolla paulo minor quam præcedentis, laciniis oblongis, tribus inferiöribus paulo majoribus retusis. (v. in h. Hooker).
4. C. *COSTATUS*, caulinis ex rhizomate crasso pluribus crectis subsimplicibus

superne cano-pubescentibus, foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis glabriusculis costis 3 subtus valde prominulis, corollæ tubo æquali laciniis calycis setaceis glabriusculis duplo longiore. ♂ Macalisberg in prom. B. Sp., Novembris (Burchell! in h. Hooker cum Fabriæ pilosâ). Caule digitales et paulo longiores. Folia brevissime petiolata, margine (statu sicco) undulata, erecta, rigida. Corolla pubescens, nonnihil incurva. Antheræ ovatæ, breviores quam in reliquis. (v. in h. Hook.)

Subtribus VIII. *DICLIPTERÆ* Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 159.

— Acanthaceæ trib. VI. Dielipteræ Endl. gen. p. 706. Meisn. gen. p. 297.  
— Echmatacanthi subtribus VI. Dielipteræ N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 76 et 109 et in Lindl. introd. ed. 2 p. 285.

Calyx 5-partitus, æqualis, tener, parvus. Corolla bilabiata, plerisque propter torsionem tubi resupinata, labiis subæqualibus conformibus planis haud profunde divisiis aut solummodo dentatis, superiore (ex torsione) tridentato latioreque, inferiore bidentato; in paucis labia sunt diversiformia. Stamina in uno genere 5, in uno 4 inclusa, didynama, reliquis 2, exserta, tubi plus minus elongati terminis inserta; antheræ vel uniloculares, vel biloculares, loculis vel parallelis vel altero altius posito, inferiore vel mutico vel rarius calcarato. Capsula plerisque brevis, vel subtetragona, vel compressa, ungue depresso plerisque brevi, paucis elongata. Semina 4-8. Dissepimentum apud plerasque maturo fructu ab imo sursum elastice resilens capsulae parietes vel simul attollens vel seorsim assurgens, retinacula uncinata, sessilia, basi affixa, secum auferens; in alijs totum solubile secendensque a valvarum dorso; in paucis denique fixum persistensque. Inflorescentia vel spicata, spicis bracteatis, bracteis in spiram distractis, vel capitata, capitulus parvis sœpe bracteis duabus majoribus valvatim inclusus, vel involucre 4-phyllo cruciato cinctis, umbellatum vel flabellatum in caule ramisque axillaris, vel denique panicula involucre uniflora vel flores nudos ferens 2-3-chotoma, laxiflora. — Plantæ pleræque herbaceæ, caule plus minus distincte 6-angulari vel 4-5-sulcato, foliis laxis, floribus teneris, licet subinde speciosis, albis, roseis, purpureis.

#### CONSPECTUS GENERUM.

##### + *Dissepimentum solubile.*

CXXXIV. *Pentstemonacanthus* N. ab E. — Stamina 5. Corolla infundibuliformis, subregularis. Dissepimentum cum retinaculis a basi demum solutum, nonnihil reflexum. — Brasilia.

CXXXV. *Blechum* Juss. — Stamina 4. Corolla infundibuliformis, regularis. Dissepimentum a valvis discedens, solubile. — America tropica et in primis insulæ Indiæ occidentalis, Manilla, insulæ Marianæ.

CXXXVI. *Tetramerium* N. ab E. — Stamina 2. Corolla infundibuliformis, inæqualiter 4-fida. Antherarum loculi paralleli. Dissepimentum basi solutum cum retinaculis brevi spatio reflexum. — Mexico.

CXXXVII. *Rungia* N. ab E. — Stamina 2. Corolla bilabiata. Antherarum loculi alter oblique super altero positi, inferior basi appendiculatus seu calcaratus. Dissepimentum cum parietibus capsulae a dorso valvarum discedens, arcu adscendens. Spicæ secundifloræ. — India orientalis.

CXXXVIII. *Dicliptera* Juss. — Stamina 2. Corolla bilabiata. Antherarum loculi recta, alter super altero positi, mutici. Dissepimen-

tum cum parietibus capsulae a dorso valvarum discedens, arcu adscendens. Capitula involucrata, flabellatim umbellata subverticillataque. — Asia, Africa America, Australia calidior.

CXXXIX. *Henrya N. ab E.* — Stamina 2. Corolla bilabiata. Antherarum loculi paralleli, mutici, basi inaequales. Dissepimentum dispernum, cum retinaculo basi a dorso capsulae solutum, uncinatum reflexum. Involucra uniflora, submonophylla, ore bidentato, racemosa. — America meridionalis.

† † *Dissepimentum persistsens. (Stamina 2).*

a. *Antheræ biloculares.*

CXL. *Brochosiphon N. ab E.* — Stamina inclusa, filamentis brevibus, autheraruī loculi paralleli, recti. Involucra bivalvia, subcapiata, axillaria, subsessilia. — Nova Hollandia.

CXLI. *Peristrophe N. ab E.* — Stamina exserta, antieræ demuni tortæ, loculo altero altius posito. Involucra bivalvia, flabellatim umbellata, vel di-trichotomo-pauiculata. — Asia tropica et Africa.

CXLII. *Rhaphidospora N. ab E.* — Stamina exserta. Antheræ loculus alter super altero positus, superior major. Flores capitaterni, abortu solitarii, trichotomo-paniculati, bracteis bracteolisque parvis. — India orientalis et Abyssinia.

b. *Antheræ uniloculares.*

CXLIII. *Hypoëstes R. Br.* — Flores capitati, capitulo unifloro. Involucrum tetraphyllum, cruciatum foliolis plus minus connatis liberisve, alterniis brevioribus. — India orientalis, Asia minor, Africa tropica et extratropica Madagascar.

CXLIV. *Lasyocladus Bojer.* — Flores capitati capitulo unifloro. Involucrum 6-phyllum, foliolis imâ basi coalitis inaequalibus, dorsali maximâ, tum binis inferis majoribus, lateralibus minoribus. — Madagascar.

CXLV. *Brachystephanus N. ab E.* — Flores racemosi, parvibracteati. Corolla bilabiata, tubo longo, labiis brevibus conformibus subintegerrimis. — Madagascar.

CXLVI. *Clinacanthus N. ab E.* — Flores cymulosi, parvibracteati. Corolla (resupinata) bilabiata, labio superiore trifido inferiore angustiore canaliculato bidentato. Capsula in medio tetrasperma. — Ceylon.

CXXXIV. PENTSTEMONACANTHUS *Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fusc.*  
7 p. 159.

Calyx profunde trifidus, laciniâ unâ alterâve apice bifidâ. Corolla infundibuliformis, tubo angusto recto, faucibus obovatis, limbi laciniis subaequalibus, duabus inferioribus paulo latioribus. Stamina quinque, tubi apici inserta, quinto sive medio paulo breviore, cunctis fertilibus; antheræ lineares, biloculares, basi sagittatae, quinti staminis brevior. Stigma lan-

ceolatum, compressiusculum, margine supero calliferum. Capsula ovalis, brevi spatio a basi bilocularis et tetrasperma, dissepimentum cum retinaculis a basi demum solutum nonnihil reflexum. Semina compressa. — Herba Brasiliensis, caule simplici, basi repente, hinc erecto; foliis inferioribus distantibus, superioribus infra flores confertis. Flores terminales, approximati, oppositi, foliis bractealibus brevioribus suffulti, bracteolis parvis stipati.

P. MODESTUS (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 l. c.) *2?* (I.)?  
In silvis Catingas ad Catendas prov. Minarum Generalium, Julio (Martius!). Ruellia modesta Mart. in sched. n. 1605. Caulis  $\frac{1}{2}$ -1 ped. altus, basi procumbens et repens, hinc erectus, simplex ramulove præditus, quadrangularis, quadrangularis sulcis alternis profundioribus, apicem versus strigiloso-hirtus. Folia oblonga, 2 poll. (cum petiolo trilineari) longa, 6-7 lin. lata, utrinque attenuata, acuta, subitus punctis glandulosis inspersa, ad costas et in margine strigilosa pilis maxime adpressis, inferiora paria 3 distantia, superiora 1-2 floribus adproximata. Folia floralia 8-6 lin. longa, lanceolata. Flores in apice caulis 2-4 oppositi, sessiles, approximati. Calyx cum pedicello brevissimo 2 lin. longus, lacinis scabris et scabrido-ciliatis acutis. Corolla pollicaris, alba?, pubescens; fauces subito ampliores, ad medium usque quinquefidæ, lacinis patulis ovatis emarginatis. Stamina fauces æquantia. Antheræ pallidæ, loculorum basi æqualium margines post dehiscentiam revoluti. Stigma lanceolatum, stylo paulo crassius. Capsula 4 lin. longa, oblonga, lœvis, testacea, glabra, parietibus tenuibus membranaceis cum dissepimento probabiliter ut in Blecho demum solubilibus. (v. in h. monac.)

CXXXV BLECHUM Browne Jam. p. 261, Sm. in Rees cycl. suppl.; Juss. in ann. mus. 9 p. 269, Kunth synops. 2 p. 35, Nees ab E. in Wall. pl. as: rar. 3 p. 103, in Lindl. introd. ed. 2 p. 285, Endl. gen. p. 706, Meisn. gen. p. 297 (205). — Alvarezia Pavon in h. Moricand. — Ruellie spec. Linn. et aut.

Calyx profunde quinquefidus, regularis. Corolla infundibuliformis, tubo longo subæquali; limbo brevi regulari quinquefidio patulo rotundato. Stamina 4, inclusa, didynama, tubo fere medio inserta. Antheræ bilocularis, ovales, muticæ, loculis parallelis subæqualibus. Capsula ovata, subventricosa, utrinque convexa, a basi seminifera, bilocularis, ad basin 8 pleiosperma. Dissepimentum completum, a dorso valvulae demum soluble corniforme cum retinaculis validis decidens, a basi clausa capsulae articulatum sejunctum. Semina suborbiculata, compressa, pelliculâ mucilaginosâ vestita. — Herbæ, pleræque America tropicæ, nonnullæ etiam Indiæ orientalis insulis et insulâ Madagascar indigenæ. Spicæ axillares, plerisque autem terminales, crassiusculæ vel crassæ. Bracteæ lateæ, herbaceæ, quadrifariæ, plerumque ciliatæ. fasciculum glomeralem florum plerumque terminalum vel binorum tegentes, cui utrinque bractea angustior opposita. Bracteolæ ad basin florum lateralium singuli fasciculi subpedicellatorum binæ, parvæ, calycis laciiniis subsimiles. Aliis fasciculi florum axillares, subsessiles.

1. B. LINNÆI, foliis ovalibus lineolatis serrulato-ciliatis subintegerrimis, spicis axillaribus terminalibusque tetragonis, bracteis ovatis longe ciliatis bi-trifloris, corollis bracteas sœpe superantibus gracilibus limbo tubo breviore. (O?) In regno Mexicano (Hænke!), inter Tampico et Real del monte, Maio (h. DC.!), ad litus lacus Tacarigœa et in insulâ Cura prope Turbaco, Novo-Granatenium (Humboldt!), Guayaquil et Panama (Sinclair!). Blechum Brownei Kunth in H. ct B. nov. gen. et sp. 2 p. 238, Kunth synops. 2 p. 35. Ruellia foliis ovatis integerrimis, spicis ovatis, bracteis interioribus geminis, floribus binis sessilibus. Linn. amen. ac. 5 p. 400. Sloane Jam. 2 p. 173 t. 109 f., t.

*Justicia Carthagenaensis* h. Willd. n. 322 f. 2. A Blecho Brownei Juss. notis indicatis abunde differt, magisque accedit B. laxiflora, quod quidem jam foliorum formâ, qua multo angustiora sunt, satis discrepat. (v. in h. Hænke, Willd., Bentham, DC., etc.)

β. *laxum*, floribus spicæ inferioribus nonnihil distantibus axillaribus, corollâ paulo breviore. — Ad Guayaquil (Sinclair!). (v. in h. Bentham.)

γ. *nanum*, caule humili subdiffuso, foliis minoribus subincanis. — Panama (Sinclair!). (v. in h. Bentham.)

δ. *parviflorum*, foliis oblongo-lanceolatis supra densius hirsutis, corollâ bracteas subæquante. — In Peruvia (Pavon!). Alvarezia parviflora Pavon! in h. Moricand. Alvarezia sp. nov. id. ibid. (v. in h. Moricand.)

2. B. TRINITENSE, foliis oblongis acuminatis subrepandis glabris costis utrinque scabris, spicis axillaribus terminalique tetragonis, bracteis late ovatis, obtuse breviuspidatis longe ciliatis bifloris, corollis bracteas superantibus limbo tubum cylindricum æquante.  $\mathcal{L}$  In insulâ Trinitatis (Baro de Schack! in h. Hooker sub nomine Dianthera Eustachiana), Jamaicâ (Mac Fadyan! in h. Hooker). Corollâ ampliore a B. Linnæi, ororollâ duplo longiore a B. Brownei differt, cui quidem posteriori et folia supra semper plus minus strigosa sunt. Bracteolæ lanceolatæ, obtusæ, ciliatæ. (v. in h. Hooker.)

β. ? Folis supra strigosis. — In Jamaicâ (Mac Fadyan in h. Hook. apud Benth.).

— Foliorum circumscriptione omnino congruit cum B. Trinitensi, sed strigositas accedit, qualis in B. Brownei. Flores perfecti desiderantur.

3. B. TWEEDEII, foliis ovatis oblongisque subtus glanduloso-punctatis margine brevicaliolatis subintegerrimis, fasciculis axillaribus 1-3-floris brevipedunculatis, bracteis oblongis ciliolatis glanduloso-punctatis, corollis bracteas longe superantibus limbo campanulatis.  $\mathcal{L}$  In Panamâ (Tweedie! in h. Hooker). Folis subtus glanduloso-punctatis et corollis 1 $\frac{1}{4}$  poll. longis tubo 8 lin. longo a reliquo, præserit a var. β B. Linnæi satis differt. Caulis glaber. Folis supra dense lineolata, in costis scabra; superiora oblonga, inferiora e basi obtusa in petiolum acutata. Occurrunt et flores axillares sessiles, ebracteati. Calyx scaber quinquefidus, lacinias brevibus linearisubulatis obtusiusculis, binis utrinque altius a basi coherentibus, quinta ad basin discreta. Limbi lobi bilobi. Capsula ut in reliquo, octosperma. (v. in h. Hook.)

4. B. BROWNEI (Juss. in ann. du Mus. 9 p. 270), foliis ovatis ovalibus repandis supra strigosis longe petiolatis, spicis axillaribus terminalique ovatis tetragonis, bracteis subrotundo-ovatis acutiusculis ciliatis bi-trifloris, corollâ bracteas æquante.  $\mathcal{L}$  In Jamaicâ (Daneer! h. Forsyth! in h. Benth. et Hook.), in insulâ S. Martiniæ et Trinitatis (de Rohr! in h. Vahl), Martinicâ (Sieber! Plée!), Cubâ (Otto! in h. gen. berol.), Haiti et Sti Thomæ (Ehrenberg! in h. gen. berol. Germain! in h. DC.), Portorico (Wydler! n. 231 bis in h. gen. berol. et Hooker, Bertero! in h. DC. ex h. Balbis), Portobello (Billberg! in h. gen. berol.), in paludosis prope Guayaquil (Hartweg! et Sinclair! in h. Bentham), in itinere a Puebla viejo ad Real del monte prov. Tamaulipas (h. Moricand n. 281. Berlandier! in h. gen. berol.), insulis Philippinis (Cuming! n. 654 in h. Bentham, berol., Hooker, etc.), Marianis (h. DC.), Luzon (Hænke!). Blechum Luizonium N. ab E. in rel. Hænk. ined. Ruellia Blechum Swartz obs. p. 243. fl. ind. occ. 2 p. 1069. adnot. h. Schreb (spec. Swartz!). Willd. sp. pl. 3 p. 362 et h. n. 1162! Ruellia Rohri h. Vahl! Ruellia Gairae Rohr! in h. Vahl. Ruellia bracteata h. Vahl! Justicia Martinicensis Sieb. fl. martin. n. 253. Differt a B. Linnæi: foliis longius petiolatis ovatis bracteisque latioribus setis distantibus inspersis; a reliquo plerisque autem non solum foliorum latitudine, sed etiam marginibus eorum integrerrimus. (v. in h. Hænke., Schreb., Willd., berol., Bentham., Moric., paris., DC., Nees, etc.)

β. *laxum*, spicis axillaribus incompletis, ad pedunculos breves bi-trifloros

- bibracteatos, bracteis oblongis, redactis. — In Indiâ occidentali (Dryander! in h. Vahl). *Ruellia* (Blechum) Montin ! in h. Vahl!). (v. in h. Vahl).
5. *B. ANGUSTIFOLIUM* (R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 478 opp. ed. N. ab E. 3, 1 p. 334. Spr. syst. 2 p. 826), foliis caulinis linear-lanceolatis integerim glabris, spicis terminalibus oblongis laxiusculis, bracteis ovatis acuminatis hirsutis ciliatisque 1-2-floris. (?) In Caribæis (Swartz). *Ruellia angustifolia* Swartz prodr. fl. ind. occ. p. 93. fl. ind. occ. 2 p. 1070. Willd. s. pl. 3 p. 363.
  6. *B. LAXIFLORUM* (Juss. in ann. du mus. 9 p. 270), glabrum, foliis ovato-lanceolatis acuminatis subintegerrimis, spicis terminalibus ovatis, bracteis ovato-subrotundis plerisque obtusis, margine nudis 1-2-floris, corollâ bracteis longiore. (?) In silvis montium umbrosi Jamaicæ occidentalis (Swartz! in b. Schreb.). *Blechum erectum* DC. in sched. *Ruellia blechioides* Swartz prodr. fl. ind. occ. p. 93. fl. ind. occ. 2 p. 1068 et in h. DC. ! Willd. sp. pl. 3 p. 362. Glabritie et bracteis margine nudis sat distincta species. Petioli breves, pubescentes. Bracteæ inferiores acutæ, superiores obtusæ. (v. in h. Schreber et DC.)
  7. *B. ANGUSTIUS*, caule fruticoso brachiatto cortice testaceo, foliis . . . , spicis axillaribus terminalibusque tetragonis, bracteis ovatis acutiusculis longiusculæ petiolatis pubescentibus subciliatis unifloris, corollâ bracteis paulo longioræ. (?) Ad Carithagena de Columbia (Billberg! n. 1. in h. gen. berol.). Quod ad bracteas simile est *B. Brownei*, sed differt ab hoc cunctisque reliquis spicis duplo angustioribus et propter bracteas longius petiolatas ad speciem laxioribus, bracteisque sollemmodo pubescenti-ciliatis. (v. in h. berol.)
  8. *B. HÆNKEI*, foliis oblongis repando-crenatis supra strigosis, spicis terminalibus ovatis tetragonis, bracteis ovato-oblongis acutis repandis basi ciliatis bifloris. — In Marianis et in regno Mexicano (Hænke). Differre videtur a *B. Brownei* foliis angustioribus in petiolum attenuatis, supra setis incumbentibus inspersis, spicâ minore terminali, bracteis longioribus angustioribus minime cordatis, multo parcius ciliatis, caule etiam teneriore. Bracteæ communes ex ovato-oblongo sunt, basin versus hirto-canæ, cæteræ sursum sparsius hirtæ. Flores sub singulâ 1-3, utrinque bracteæ lanceolata basi attenuata. Bracteolæ lineares, lacinias calycis subæquales, paulo latiores, ut istæ ciliatae. Calycis laciniae subulatæ. Capsula hilinearis, ventricosa, octosperma, pubescens.

#### *Species e genere excludenda.*

*B. STERNBERGII* Nees ab E. in h. Hænk. == *Tetramerium nervosum* var.  $\beta$ .

CXXXVI. *TETRAMERIUM* Nees ab E. in Benth. bot. of the Sulphur p. 147. — Justiciæ spec. aut.

Calyx parvus, quadrifidus, lacinias æqualibus, bracteolatus. Corolla tubuloso-infundibuliformis, profunde et inæqualiter quadrifida, lacinias angustis, alterâ laciñiâ magis ad alterum latus conversâ. Stamina duo, prope a faucibus inserta; antherarum loculi paralleli, contigui, basi multi. Stigma obtusum. Capsula bivalvis, bilocularis, basi brevi spatio depresso et unguiculata commissurâ valvularum planâ, apicem versus compressa, dorso valvularum angusto plano, tetrasperma. Dissepimentum maturo fructu a dorso valvularum earumque parietibus basi solutum brevi spatio, quoad retinacula ei inserta sunt, unci ad instar reflectitur. Semina discoidea, papillosa, retinaculis acutis suffulta. — Fruticuli Mexicanæ et insularum Indiæ occidentalis, ramosi, polystachyi, foliis mediocribus petiolatis, bracteis plus minus ciliatis. Spicæ in ramulis axillaribus terminales, bracteatae, quadrifariæ. Flores sub singulâ bracteâ 2-3 sessiles. Bracteæ latæ, herbaceæ. Bracteolæ lacinias calycinis similes. Corolla parva, tenera, pallida.

1. T. *POLYSTACHYUM* (Nees ab E. et Beuth. in bot. of the Sulph. p. 147), caule ramosissimo, petiolisque patenti-hirsutis, foliis ovatis basi obtusis apice attenuatis, spicis in ramulis brevibus axillaribus oppositis terminalibus, bracteis oblongo-ovalibus mucronatis. ♂ In insula Tiger Island sinus Fonsecensis, America meridionalis (Sinclair!). Frutex 1-2-pedalis, dense ramosus, patenti-hirsutus, incanus, infra genicula alteruatim compressus; rami iuperius genuflexi. Folia (ramorum) inferiora cum petiolo 4-5 lin. longo augeo hirsuto 1½-2 poll. longa et 6-8 lin. ad basin lata, hinc apicem versus attenuata, apice obtusiusculo, ciliata, repanda, tenuia, ramis costalibus 4-5 subtus hirtis; folia superiora et bractealia iufra spicas minoras, magis lanceolata. Spicae cum ramulo suo folio breviores, ovaless, foliorum rami summo pari suffultae. Bracteæ 4 lin. longæ, obtuse cum mucrone, dorso et margine hirsute, tri-vel obscure 5-nerves, flavo-virides. Bracteolas calyce longiores, lanceolatae, ciliatae (3 lin. longæ). Calycis quadrifidae laciniae subulate, ciliatae, 1 lin. longæ. Corolla 6 lin. longa, pallida, tubo gracili, limbi lacinias lanceolato-linearibus obtusis patentibus, uno ramotiore. Stamina parum exserta, antheris linearibus basi parum inaequalibus. Ovarium ovale. (v. in h. Benth.)
2. T. *RACEMULOSUM*, caule ramoso superiora versus lineâ pilosâ decurrente notato, foliis subcordato-ovatis obtusis retusis pubescens glabrescentibus, spicis in ramulis brevibus axillaribus oppositis terminalibus, bracteis foliis similibus. ♂ In insula Sti Bartholomæi et in insula Jamaicæ (Wikstrom). Justicia racemulosa Wikstr. fl. S. Barth. in act. holm. a. 1825 2 p. 411. ed. sep. p. 16. et Feruss. bull. des sc. nat. 1828, mai, p. 83. Sp. syst. cur. post. p. 18, Linn. 1828, litteratur. p. 108. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 385. Folia 2-6 lin. longa, 2-5 lin. in medio lata. Bracteolas calyce breviores (½ lin. longæ?). Calycis laciniae lanceolatae, acuminate, lin. 1 longæ. Corolla 9 lin. longa.
3. T. *NERVOSUM* (Nees ab E. et Benth. in botany of the Sulphur p. 148 t. 48), caule ramoso bifarium piloso, foliis ovatis acuminatis longe petiolatis supra parce pilosis (nec lineolatis), spicis in ramulis brevibus axillaribus alternis adscendentibus tetragonis, bracteis arcte incumbentibus ovatis mucronato-acutis villosis ciliatis venoso-quinque nervibus. ♂ In Punâ prope Guayaquil (Sinclair! in h. Benth, Gaudich.! in h. DC.), Stâ Marthâ (Bertero!). Justicia nemorosa h. Bertero ex h. Balbis. in b. DC.! Caulis et rami graciles, laxi, ad genicula compresso-tetragoni, cortice bruneo confertim griseo-punctato. Folia cum petiolo ½-1 poll. longo hirto, 2½-2½ poll. longa, circa basin 10-12 lin. lata, hinc attenuata, basi obtusa, supra raris pilis conspersa, subtus ad costas et in margine scabra, ramis costalibus 5 debilibus. Spicae ratione ramorum contractæ sepe incurvæ, 1-1½ poll. longæ. Bracteæ virides, basi brevi spatio crassæ et pallidæ, longis villis ciliatae, 4 lin. longæ, 3 lin. latæ. Calyx cum bracteolis lin. 1 longus, lacinii lanceolato-subulatis mollibus longe ciliatis haud ad basin divisis. Corolla 5-6 lin. longa, lacinii linearibus? (incompletis in nostro specimine). Capsula bilinearis, pubescens, pallida. Semina matura fusca, grosse tuberculata. (v. in h. Benth. et DC.)
- β. *angustifolium*, foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis. — Tepic, Realego (Sinclair! in h. Hooker). Blechum Sternbergii N. ab E. in h. Haenk. (v. in h. Haenk. et Benth.)
4. T. *HISPIDUM*, caule ramoso superne laxe setoso bifariumque pubescente, foliis..., spicis in caule ramisque terminalibus quadrangularibus, bracteis apice patulis ovalibus spinuloso-acuminatis laxe hirsutis denseque ciliatis venoso-quinquenervibus. ♀ In Mexico prope las Ajuntas ad flumen Montezuma, Januario (Ehrenberg! n. 1072 in h. gen. berol., Allaman! in h. DC., Parkinson! in h. Hooker in prov. Vera Cruz, Maio, Linden n. 191 in h. Hooker et Bentham), Bejar (Hooker!) Justicia polystachya Allaman! in h. DC. An var. T. nervosi? Differt autem spicis longioribus et duplo angustioribus, bracteis rigidioribus laxius dispositis rigide hispidis hirsutisve angustioribus longiorie acumine subpungente praeditis. Caulis plurimi ex una radice, a basi

patenti-ramosi. Variat bracteis plus minus ciliatis et acumine reflexo aut rectiusculo præditis. (v. in h. gen. berol., Hook. et DC.)

CXXXVII. RUNGIA Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77 et 109 et in Lindl. bot. ed. 2 p. 285. Endl. gen. p. 706. Meisn. gen. p. 297 (205). — Diclipterae spec. Juss. — Justiciæ spec. Linn.

Calyx quinquepartitus, regularis. Corolla bilabiata, labio superiore bidentato, inferiore trilobo palato biplicato. Stamina duo. Antherarum loculi oblique alter super altero positi; inferior appendice orbiculata lamellari. Capsula bivalvis, bilocularis, tetrasperma, a basi seminifera; dissepimento membranaceo una cum parietibus capsulae lateralibus a dorso valvularum dehiscentium secedente. Semina concentrica rugosa, compressa, retinaculis suffulta, quorum inferius a basi dissepimenti reflectitur. — Herbae Indiæ orientalis, sæpe repentes, bracteis spicarum albo-marginatis mucronatis cuspidulatis insigne. Flores et capsulae parvi. Spica quadrisariam bracteata, bracteis margine membranaceis, ordinum duorum superiorum vacuis, inferiorum unifloris. Bracteæ propriæ duæ, oppositæ, linearis, calyce vix longiores. Calycis lacinia linearis, ciliatae, membranaceæ.

1. R. LINIFOLIA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 110), caule foliisque lanceolatis obtusis scabris, bracteis fertilibus sterilibusque subæqualibus conformibus ovalibus cuspidato-mucronatis eveniis subtilissime ciliatis margine membranaceis, bracteolis linearis-subulatis, spicis terminalibus pedunculatis incurvis.  $\mathcal{L}$  In Indiæ orientali (h. Heyn.!) Justicia linifolia h. Heyn. Wall. cat. n. 2447. Est planta tenera, gracilis. Caulis palmaris, semipedalis, fili linei fortioris crassitie, teretiusculus, articulatus, purpurascens, lineolis crebris punctulatis elevatis præsertim apicem versus, scaber, ad basin trichotomus; rami alternati ramosi; ramuli patentes. Folia 8-9 lin. longa,  $2\frac{1}{2}$  lin. lata, sessilia, summi paris folia ovato-oblonga acutiuscula, et in ramo florente minima ovato-subulata, quasi bracteæ pedunculi mediæ. Spica solitaria,  $\frac{1}{2}$  poll. longa, incurva, crassitie culmi secalini. Bracteæ lineam longam, subtilissime ciliolatae, scabriusculæ; dorsales, quæ steriles, paulo latiores. Bracteolæ bracteis paulo breviores, scabrae. Corolla 2 lineas longa, glabra, labio subtus setulosis lineato, pallide purpurea (vel alba?). Capsula lin. 1 longa, ovalis, depresso-tetragona, sessilis, pubescens, pallida. (v. in h. Wallich.)

2. R. PARVIFLORA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 110), caule diffuso repente, foliis ovalibus lanceolatis obtusiusculis, bracteis fertilibus suborbiculatis mucronatis muticisve nervoso-venosis glabris ciliatis margine membranaceo, sterilibus ovalibus oblongis uno duobusve lateribus marginatis acutis ciliatis, bracteolis membranaceo-marginatis emarginatis mucronatis, corollâ parvâ, labio superiore acuto.  $\mathcal{L}$  In Indiæ orientali. Species est elegans, tota grosse lineolata. Bracteæ superiores anguste marginatae, inferiores, quæ rhombo-orbiculatae, latius. Bracteolæ duæ calyce majores eumque amplectentes, obcordatae, margine membranaceo candido sursum magis dilatata parte autem viridi ovata, inter lobos marginis candidi mucronuli formâ emergente. Calyx ciliatus, membranaceus. Corolla et capsula duplo minores quam in R. repente. Corolla latae cerulea, labio superiore ovato in acumen contracto. (v. cum var. in b. Wall., Wight, DC. etc.)

z. Bracteis sterilibus ovali-acuminatis acumine rigido. — In Javæ monte Salak (Blume! Boudon! ex b. Belanger n. 131 in h. DC.), in pascuis humidis Indiæ orientalis continent. (Wight!), in Monghir et Nibinaghur (Hamilt.!), Assam superior (Jenkins! in h. Hooker et Bentham), Asam, Mergui (Griffith! in h. Hook.), in Nepaliâ inferiore, et Turraya, Ne-

- paliam versus ( Wallich , Perrotet ! in h. DC. ), in Moalmyne ( Wall.! ), infra Nahu in silvis umbrosis , Octobri ( Edgeworth ! ). Justicia parviflora Retz. obs. 5 p. 9, Willd. sp. pl. 1 p. 101. Dicliptera repens h. Willd. ! n. 295 fol. 1 et 2. Justicia pectinata h. Vahl ! ( forma minor , bracteis fertilibus mucronulatis , dorsalibus uno latere tantum membranaceis ), h. Willd. ! n. 294 ( Klein ), Roxb. fl. corom. 2 p. 29 t. 153, fl. ind. ed. Car. et Wall. cat. n. 2458 a, b, c, e ex parte, g, h, Wight h. propr. n. 2011. Justicia ciliaris h. Russell ? Dicliptera cœrulea Blum. bijdr. p. 790. ( v. s. )
- β. *aspera*, caule lineolis setulisque magis exasperato, bracteis dorsalibus simpliciter acutis mucronulo breviore utroque latere marginatis, fertilibus orbiculatis plerisque muticis flavido-marginatis. — In montibus Sillet ( Wall.! ), Mahuyadabur ( Hamilt. ! ) vidi etiam in h. Heyn. Justicia repens h. Vahl ! Justicia pectinata caule repente h. Hamilt. ! Wall. cat. n. 2458 c. Justicia pectinata h. Heyn. ! Wall. cat. n. 2458 f. Dicliptera repens h. Willd. ! n. 295 fol. 3. Dianthera parviflora h. Roxb. ! Ruellia dependens h. Hooker. Differt foliis cauleque densissime et grosse lineolato-exasperatis, spicis paulo brevioribus, plerisque ternis axillari-aggregatis, bracteis fertilibus in plerisque rotundatis muticis margine latiore flavante cinctis, sterilibus brevioribus minus acuminatis. ( v. in h. Vahl , Willd. , berol. , Wall. , Hook. , etc. )
- γ\*. caule erecto ?, foliis latioribus ovatis vel ellipticis. — In montibus, Promæ oppositis ( Guil. Gomez. ! ), Rohilcund , in planitie umbrosâ , Octobri ( Edgeworth ! ).
- γ. *submutica*, glabra, bracteis sterilibus subtrinervibus oblongo-lanceolatis subimmarginatis vix mucronatis, fertilibns obovatis. — In ins. Ceylon ( h. Hooker ! ) Wall. cat. n. 2458 e, ex h. madrasp. ( ex parte ); ad pedem montis Tjerimai insulae Javae ( Blume ! ). Justicia pectinata h. madrasp. Wall. cat. n. 2458 e ( ex parte ). Dicliptera cœrulea var. b Blume bijdr. p. 791 ( v. in h. Wallich , Willd. , Vahl , Wight , berol. , etc. )
- δ. *hirsuta*, caule adscendentem foliisque paulo latioribus, his apice sepe attenuatis. — Circa Kaitis in Neelgherries , Novembri ( Perrottet ! in h. DC. ). Flores pallide cœrulei. Dicliptera pectinata Vahlii certo ab hac est distincta, fortasse etiam Linnaeana ejusdem nominis planta. ( v. in DC. )
3. R. PECTINATA , caule diffuso geniculato repente, bracteis fertilibus orbiculatis mucronulatis muticis trinervibus villosis ciliatisque margine membranaceo lato integro, sterilibus ovato-cuspidatis villosis subimmarginatis trinervibus, bracteolis interioribus linearie-lanceolatis late membranaceis emarginatis longo ciliatis, foliis ovalibus obtusiusculis ad costas scabris. ⓐ In Ceylon Burmann ! in h. Vahl , Java ( Junghuhn ! ). Dicliptera pectinata Juss. in ann. du mus. 9 p. 169. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 427. Justicia pectinata Linn. ann. acad. 4 p. 299. sp. pl. 1 p. 22. Lam. ill. 1 t. 13 f. 3, Vahl symb. p. 16 en. 1 p. 154 ( diagnosis nec descriptio , nec syn. J. parvifloræ Retz. ). Justicia infracta Vahl en. 1 p. 155 et h. Dietr. sp. 1 p. 386. Errores, qui hanc speciem oppressere, præcipue eo profecti sunt, quod Vahlius , herbario teste , sub Justiciæ pectinata et repentis nomine diversas formas Rungiæ parvifloræ distinxerit, veram autem Justiciam pectinatam, spicis villosis insignem alieno Justiciæ pectinatae sub nomine exhiberet. ( v. in h. Vahl , Junghuhn et Nees. )
4. R. MURALIS ( Royle ), caule humili lignescens ramosissimo ramis confertis, bracteis punctato-asperis mucronatis nervoso-venosis ciliatis fertilibus ovalibus margine membranaceo, sterilibus lanceolato-oblongis margine nudò angustissime membranaceo, bracteolis membranaceo-marginalis emarginatis mucronatis, foliis subtundo spatulatis. ⓑ In muris Bernhampore ad Gangem fluvium , in Courtallum ( Wight ! ), Coromandel ( Macé ! in h. Mus. paris. et Nees. n. 114 )

Proxima R. parviflora, a qua in primis differt caule denique lignescente digitali semidigitali ab origine in ramos multos adscendentibus confertosque soluto, et foliis subrotundis, nec lanceolatis. (v. in h. Roxb., Wall., Royle, Wight, Benth.)

5. R. POLYGO NOIDES (Nees ab E. in Wall. pl. as rar. 3 p. 110. Wall. cat. n. 7181), caule basi repente, bracteis communibus suborbiculatis mucronulatis trinerviis, bracteolisque navicularibus margine lato membranaceo cinctis ciliatis, foliis inæqualibus obtusis, inferioribus ovalibus minoribus superioribus lanceolatis, spicis axillaribus glomeruliformibus.  $\mathcal{U}$  In Indiæ orientali : Tavoy, Novembri (Wall. !), Bombay (Roux! in h. Hooker, n. 62), Pegu (Reynaud! in h. mus. paris. et Nees, n. 93). Planta herbacea, forma Polygoni avicularis. Caulis et rami basi repentes, adscendentibus, graciles, glabri. Folia inferiora unguicularia, ex subrotundis in elliptica transcurrente, obtusa, superiore lanceolata pollicaria, alterum singuli paris minus et saxe difforme. Spicas pisi magnitudine, axillares, sessiles, subglobosæ, alternae vel oppositaæ. Bracteæ omnes fertiles ?, late marginatae, apice non raro emarginatae cum mucronulo, dorso virides trinerves, nervo medio ad basin binervi, lateralibus membranaceam partem contingentibus. (v. in h. Wall., Hook., paris. et Nees).

$\beta.$  major, caule a basi erecto, spicis majoribus ternis glomeratis. — Pegu (Reynaud! in h. Mus. paris. et Nees, n. 92).

6. R. LONGIFOLIA (Nees et W. Arn.), foliis lanceolato-linearibus obtusiuseculis glabris inferioribus paulo latioribus, bracteis sterilibus oblongis acutis anguste marginatis, fertilibus bracteolisque ovalibus late marginatis ciliatis obtusis, pedunculis axillaribus oppositis solitariis geminis, altero mono altero distachyo, terminali quo distachyo, corollâ bracteâ longiore, labio superiore acuto.  $\odot \mathcal{U}$ ? In insula Ceylon (Walker! in h. Arnott et Hooker), in Philippinis (Cuming! n. 1276, in h. Bentham, gen. berol. et Hooker). Ad R. polygonoidem accedit, sed differt foliis multo longioribus. Caulis longus, parce ramosus, nodis tumidus, lineolato-asper. Folia inæqualia, 3½-4 pôll. longa, 2 lin. lata, brevi-petiolata, apice parum attenuata et obtusiusecula, subrepanda, lata viridia, nervo costali bisulco, venis costalibus subtilibus 6-8, arcubus prope a costâ conjunctis. Pedunculi vel axillares, oppositi, alter pollicaris tristachyus, alter brevior 1-2-stachyus, accedit extrorsum longiori pedunculo quandoque alter ad basin brevis et monostachyus, vel solummodo spicæ duæ terminales in pedunculo communis brevi. Spicæ unguiculares et minores, ovales, obtusæ. Bracteæ dorsales sterilesque 3 lin. longæ, unam lin. latæ, acutæ, margine albo angustiore : fertilis 2½-2½ lin. longa, 1 lin. paulo latior, latius marginata, ciliata, obtusa cum mucronulo exiguo. Bracteolas 2 lin. longæ, 1 lin. latæ, obtusæ et muticæ, omissis trinerves. Corolla 4 lin. longa, pallida. Variat foliis latioribus angustioribus. (v. in h. W. Arnott, Hook., Benth., berol.)

7. R. ORIGANO IDES (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 110. Wall. cat. n. 7182. a, b), foliis lanceolatis obtusis glabriusculis, bracteis orbiculatis muticis villosis margine lato membranaceo cinctis, bracteolis duplicitibus, interioribus linearibus, exterioribus navicularibus obtusis subtomentosis, spicis axillaribus sessilibus secundis brevibus.  $\mathcal{U}$  Loci umbrosis Indiæ orientalis, floret tempore frigido (Roxb.), in ripis Attram et Saluen fluminum (Wall. !), circa Linga Jattie prov. Cheribon, Javæ, ubi floret Septembri (Blume, Junghuhn!). Nomen Javanicum Katumpan lanang (Blume). Justicia pectinata Blum. bijdr. p. 790. A confratribus differt : spicis plerumque solitariis. rarius geminis, oppositis axillaribus, circiter unguicularibus, sessilibus, hirti-incanescensibus; bracteis communibus obovato-orbiculatis margine integro ad apicem latissimo cinctis, cuspidé partis viridis non vel rarissime tantum penetrante, calyce quadribracteolato, i. e. intra bracteolas exterioreas navicularares obtusas villoso-tomentosas inarginatasque adjectis aliis duabus ad ipsam basin calycis linearibus, lacinias calycis simillimis, quæ magis ad latus exterius spectantes alterius floris rudimentum produnt. Calyx, ut in reliquis, valde villosus. Corolla vix duas lin.

*longa*, lœte cœrulea (Roxb.). Capsula lin. 1. longa, alba, glabra. (v. in h. Wallich.)

8. *R. REPENS* (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 110), foliis oblongo-lanceolatis acutis, caule repente bracteis ovatis cuspidatis enervibus margine lato argenteo subciliato, bracteolis lanceolatis.  $\mathcal{L}$  In pascuis Indiæ orientalis, floret tempore pluvio frigidoque (Roxb.), Caunacoræ frequens (Wight!), in Chittadroog (Heyne!), Rajmahal (Wallich!), in Munghir et in Balahat (Hainilt!), in Ceylon (Burmann), in pratis, præsentim humidis, ad castellum Sirhind, Mobarikpur, Decembri (Edgeworth!), Madras (Griffith! in h. Lindl., Benth., Hook., Nees), in insulâ S. Helenæ (Lady Dalhousie! in h. Hooker). — Wall. cat. n. 2459. a-g. Wight h. propr. n. 2012. ic. t. 465. *Justicia repens* Linn. fl. zeyl. p. 20. Burm. fl. ind. p. 8. Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 133. Dicliptera retusa Juss. in ann. du mus. 9 p. 269. Dicliptera repens Röem. et Sch. syst. 1 p. 171. maut. 1 p. 148. Willd. sp. pl. ed. 2, 1 p. 427. R. Br. fl. nov. holl. p. 476. ed. N. ab E. 3 p. 332. h. Hooker, n. 429. Adhatoda spicata, flosculo ex foliolis membranaceis producens. Burm. thes. zeyl. p. 7 t. 3 f. 2. Flores pallide rosei, parvi. (v. cum var. in h. Wall., Wight, Bentham, Edgeworth, Hook., Lindl., paris. Nees, etc.)

$\beta$ . *villosa*, caule cum foliis bracteisque plus minus villosis, foliis nonnihil latioribus. — Frequens in Decan ad Purimdar prope Sassoor, Octobri (Perrottet! in h. DC. Flores albi (v. in h. madrasp. et DC.)  
 $\gamma$ . *nana*, caule vix aliquot pollicum longitudine. — Cachemir (Jacquemont! in h. Mus. paris. et Nees, n. 162.)

7. *R. DIVERSIFORMIS*, foliis glabris patentissimis bracteis sterilibus majoribus ovalibus fertilibus minoribus oblongis, utrïque cuspidatis venoso-nervosis sursum late albo-membranaceis subtilissime puberulo-ciliatis, bracteolis subulatis, spiculis terminali solitariâ laxiusculâ.  $\mathcal{L}$  In Philippinis (Cuming! n. 1080, in h. DC., Benth., Hook. et berol.) Similis *R. longifoliae*, differt bractearum steriliæ et fertiliæ rationibus diversis. Caulis gracilis, videtur erectus. Folia in var.  $\alpha$  3 $\frac{1}{2}$  poll. longa 3 lin. lata, in  $\beta$  3 poll. longa 9 lin. lata, apice attenuata; petioli vix lin. 1 longi. Foliorum basis obtusa. Bracteæ majores 3 $\frac{1}{2}$  lin. longæ, 1 $\frac{1}{2}$  lin. latæ, discus viridis, pectinatim simpliciter venosus, in cuspidem cum limbo hyalino procurrit. Corollæ palatum cœruleo-maculatum. (v. in h. DC., Hook., berol.)

$\alpha$ . foliis linearibus elongatis bracteis longe cuspidatis.

$\beta$ . foliis lanceolatis, bractearum cuspside breviore, sœpe mucronuliformi.

10. *R. LATIOR*, foliis ovalibus utrinque modice attenuatis obtusiusculis, caule repente diffuso, corollæ bracteas excidente labio superiore acuto, bracteis conformibus obovatis retusis brevissime mucronulatis subtrinervibus ciliatis margine membranaceo, bracteolis subulatis.  $\odot$  In insulâ Ceylon (Walker! in h. Arnott. et Hook., n. 271), Courtallum, Februario (Wight!), ad Ootacamund (Perrottet! in h. mus. paris. et Nees, n. 139). Rungia reptans var. W.-Arn. Rungia Wightiana var. W.-Arn. in h. Wight. Quod ad habitum magis accedit *R. parvifloræ*, quam repenti, sed differt corollâ duplo maiore, corollæ *R. repentis* simili. Ab istâ autem differre videtur: foliis latioribus fere ovatis, cum petiolo  $\frac{3}{4}$  poll. longo bipollicularibus, 9-10 lin. latis, spicis minoribus, terminalibus fasciculato-ternis quinque, bracteis paulo minoribus margine angustiore præditis trinervibus, nec cuspidato-mueronatis sed apice retusis interjectâ in bracteâ sterili mucronulo exigu. Bractea fertilis paulo minor, mutica. An var. *R. repentis*? (v. in h. W.-Arn., Hooker, paris. et Nees).

11. *R. WIGHTIANA* (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 110), caule herbaceo, foliis ovato-oblongis apice valde attenuatis, bracteis venosis marginibus apicem versus hyalinis subtilissime ciliatis, sterilibus oblongis acutiusculis, fertilibus rhombo-cuneiformibus obtusis, bracteolis membranaceis ovalibus mucronulatis, spicis laxis terminalibus.  $\mathcal{L}$  In Indiæ orientali. *Justicia Wightiana* Wall. cat. n. 2472. Soli *R.* Punduanæ affinis est. Tota planta fere glabra, petiolis

foliisque margine scabriusculis, foliis in paginâ superiore setis crassis raris incumbentibus, hispidulis in florescentiâ subtilissime puberulâ. Color lâte virens. Caulis erectus, inferne teretiusculus, in novis ramis e compresso-hexagono-tetragonous, supra genicula tumens carnosus exsiccandoque constrictus. Folia caulinâ media cum petiolo fere bipollarii angusto apicem versus supra bi-quadrato-costato 6 poll. longa, supra basin  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, ovato-oblonga, in acumen longum obtusum attenuata, basi acutâ in petiolum anguste decurrentia, supra sparsim setulosa, nervis costalibus quinis. Spica terminalis 1-3 poll. longa, basi ramosa, ramis unius vel plurium parium oppositis brevibus, in alis simplici, pedunculo spicæ longitudine tetragono, glabra, rhachi pubescenti-scabri alternatim compressi et laterè angustiore canaliculatâ. Bractæ æquali spatio distantes, patulæ, articulis tamen duplo longiores, parium obliquitate spirales,  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{4}$  lin. longæ, apicem versus marginè membranaceo cinctæ, teneræ in disco venoso-trinerviæ, scabriusculæ margine subtiliter ciliatæ; steriles paulo minores, oblongæ, mucronato-acutiusculæ, fertiles ex obovato-rhombeo-cunei-formes, apice rotundatae, marginè membranaceo latiore cinctæ. Corolla ad apicem usque rotabii superioris tres circiter lineas longa, subpubescens, tubo (an tota?) rosea. Capsula 3 lin. longa, ex ovali-oblonga, basi angustior, glabra, pallida, solito more dehiscentia, tetrasperma. Retinacula incurva, brevia, cochleariformia. Semina suborbicularia, hinc concava? brunnea, tuberculata. (v. in h. DC., Wall., Hook., etc.)

12. R. PUNDUANA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 110), canle fruticoso, foliis oblongis utrinque attenuatis, spicis axillaribus latiusculis bracteis rhombeo-spathulatis acutis venosis, steriliū margine exteriore, fertiliū terminaliū bus membranaceis ciliatis, bracteolis lanceolatis. In Indiâ orientali ad Pundua (Wall.). Justicia Punduana Wall. cat. n. 2453. Rami pennæ gallinaceæ crassitie, et treti tetragomi, alternatim compressi, cortice fusco rimuloso aspero, et apicem versus pubescentiâ densâ rigidulâ, tanquam tomento vestiti. Folia 5-6 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. lata, ex oblongo-cuneiiformia, acuta, basi attenuata in petiolum crassum canaliculatum longe decurrentia, firma, utrinque punctulata, subtus ad costas strigilosa. Spicæ axillares, pollicares vel paulo longiores, oppositæ, solitariae vel geminæ, pubescentiâ subtili viscidulâ vestite, pedunculo brevi, uno altero pari bracteolam minorum lanceolatarum dissimilatum instructo. Bractæ disticho-alternæ, approximatæ, 3- $3\frac{1}{2}$  lin. longæ, acutæ, dense puberulæ, venulosæ, margine exteriore ab apice ad angulum exteriorem membranaceo-hyalino, minute ciliolato; inferiores fertilesque paulo longiores, basin versus lenius cuneatim attenuatae, acutiusculæ, margine utroque ab apice ad angulum albo-membranaceo ciliatae, basi calycem sessilem amplectentes. Bracteolæ calyce paulo longiores, 3 lin. longæ, lanceolatæ, acutæ, membranaceæ, tenerrimæ, uniherves, puberulæ. Capsula 2 lin. longa, oblonga, compressa, pubescentia, disperma; dissepimentum a valvis dehiscente sursumque adscendente. Retinacula parva, obtusa, emarginata. (v. in h. Wallich.)

XXXVIII. DICLIPTERA Juss. in ann. du Mus. 9 p. 367. excl. sect. 3 et 4. Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77 et 111. Endl. gen. p. 706. Meissn. gen. p. 297 (205). — Diantheræ spec. Solander et Ruiz et Pav. — Justiciæ spec. Linn. et Aut.

Calyx æqualis, quinquepartitus, in capitulo bracteato plerumque bivalvi sessilis. Corolla resupinata, bilabiata, labiis planis vel concavis, superiore (post conversionem) tridentato, inferiore integro vel bidentato. Anthere bilocularis, loculis altero pone alterum positis muticis semi-ovalibus post pollem ejectum membranaceis undulatis (nec contortis). Capsula bivalvis, bilocularis, basi brevi spatio compressa unguiculata aspera, commissurâ valvularum planâ, apicem versus depressa, dorso valvularum angusto plano, tetrasperma, vel sessilis juxta basin tetrasperma. Dissepimentum maturo fructu a dorso valvularum parieti-

busque discedens arcuque adscendens, retinacula ad apicem elevans. Semina retinaculis suffulta, discoidea. Retinacula uncinata.—Herbæ, rarius frutices inter tropicos totius orbis, maximeque Indiæ orientalis, Africæ australis et Americæ crescentes, habitu laxo. Caulis plerumque sexangularis. Capitula, bracteis involucralibus plurimum ordinum, exterioribus binis oppositis majoribus, inclusa, in umbellulas axillares et denique terminales flabellatim disposita.

**§ 1. Platystegia. Bracteæ involucrales orbicularares, ovatae, ovales vel oblongo-ovatae, basi haud cuneiformi attenuatae.**

a. *Bracteæ involucrales obtusa, brevi-mucronulatae vel cuspidato-mucronatae.*

1. D. *THLASPIOIDES*, glabra, caule acute sexangulari, foliis oblongis utrinque attenuatis in costis subtus pubescenti-scabris, capitulis 1-floris umbellato-ternis saepè nutantibus, pedunculis oppositis, pedicellis longitudine pedunculi, bracteis æquilibus obovato-subrotundis muticis glabris laevibusque. (In America meridionali, ad latus occidentale Cordilleræ (herb. Moricand.) Accedit ad D. resupinata. Distincta ab omnibus involucris seu bracteis ex longis pedicellis saepè ab apice recurvis glabris laevibus, siliculam Thlaspeos aut ejusmodi plantæ bene referentibus. (v. in h. Moricand.)
2. D. *RESUPINATA* (Juss. in ann. du Mus. 9 p. 268, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 428 et h. n. 290), glabra, caule acute sexangulari, foliis ovatis obtusis, capitulis 2-3-floris umbellato-ternis quinisve, pedunculo communi brevissimo, pedunculo proprio medio subinde valde elongato, involueri proprii 4-6-phyllo foliolis duobus exterioribus multo majoribus dilatato-triangularibus rotundatis obtusissimis retusisve planis. (In Novâ Hispaniâ. Justicia resupinata Vahl en. 1 p. 114 et h. ! Justicia sexangulata Cav. ic. 3 p. 2. t. 203, h. DC. ex h. Thibaud ! Justicia litbospermifolia Jacq. hort. paris. in h. DC. ! Dianthera malabarica Gouan in h. DC. ! ex hort. paris. et in h. Hook. ! nec Linn. (v. v. et sicc. in h. DC. Nees, berol., Hook., etc.)
3. D. *ZEYLANICA*, foliis ovato-oblongis apice attenuatis basi acutisculnis repando-subcrenatis in costis scabris, pedunculis axillaribus brevibus bi-trifidis, capitulis 1-2-floris longius pedicellatis, bracteis suborbiculatis brevi-mucronatis luxe venosis puberulis margine scabris inæqualibus. (In Ceylon (Walker) in h. Hook.) Planta parva diffusa. Folia (ramea) cum petiolo  $\frac{3}{4}$  poll. longa. Pedunculi capitulorum 2-3 lin. longi. Bractea major 5 lin. longa, 4 lin. lata, basi apiceque rotundata mucronato apieis brevi subtilique, altera dimidio minor basique magis attenuata. Corolla bracteæ majore virg longior. (v. in h. Hooker.)
4. D. *FRONDOSA* (Juss. in ann. du Mus. 9 p. 269. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 432), glabra, foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, umbellis axillaribus oppositis folia æquauntibus iisque longioribus tri-quinquefidis, capitulis aggregatis subternis bifloris, involuci foliolis speciosis rhomboeo-ovovatis obtusissimis glabris venosis, altero paulo minore. (In insulâ Otaheiti (Banks et Solander !, Muntin ! in h. Vahl), insulæ Amicorum, Junio (Mathews ! in h. Hooker n. 133.) Justicia frondosa Vahl symb. 2 p. 8. en 1 p. 145 et h. ! Antherratum loculi valde distantes. (v. in h. Vahl et Hooker.)
5. D. *CARACASANA*, caule geniculato angulato glabro ad genicula hispido, foliis ovatis apice attenuatis repando-subcrenatis basi brevi-acutatis glabris petiolo mediocri hirto, superioribus ovato-oblongis, umbellis axillaribus geminis tri-quinquefidis brevipedunculatis, bracteis puberulis ciliatis mucronatis inæqualibus, superiore suborbiculari infraiore oblongo breviore angustioreque. (Caracas (Moritz ! in h. gen. berol.) Folia 5 poll. longa, 2-2½ poll. lata. Umbellarum veluti verticilli speciosi. Bracteolæ basi haud contractæ, 5-nervio-venosæ. Corolla 1½ pollicaris, purpurea. (v. in h. berol.)

6. D. FORSTERIANA , caule obsolete quadrangulari glabro apice puberulo, foliis floralibus ovalibus argute acuminatis basi acutâ in petiolum brevem desinenteribus subpuberulis, umbellis oppositis capitulisque subsessilibus verticillatim congestis, superioribus in spicam densam verticillarem confluentibus, capitulis bitrifloris, bracteis late ovalibus setaceo-mucronatis basi acutiusculâ sessilibus venoso-quinquenervibus extus puberulis margine nudis, alterâ minore basique paulo magis attenuatâ. (?) Patria.....Justicia barbata Forst. ex hort. Liverpool. in h. gen. berol. ! Distincta a D. bivalvi Juss. bracteis majoribus basi acutis et capitulis glomeratim congestis subsessilibus. Mucro bractearum albus, brevis et angustus. (v. in h. berol.)
7. D. PUBESCENS (Juss. in ann. mus. 9 p. 269), suffruticosa, caule tomentoso sulcato, foliis ovatis acutis obtusisve subtus pubescenti-tomentosis supra pubescentibus, umbellis axillaribus oppositis brevipedunculatis tri-quadrifidis involucri folioliis inaequalibus ovato-subrotundatis mucronatis in ambitu pubescens ciliatisque. § In Botanices insula prope Novam Caledoniā (Forster!) — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 431, h. Willd. ! n. 298. Justicia pubescens Vahl symb. 2 p. 9, en. 1 p. 46 et h. Dianthera cerulea Forst. prod. n. 24. Justicia cerulea Poir. enc. méth. suppl. 2 p. 106. Dianthera clavata Forsk. ! in h. gen. berol. (ex h. Forster. liverp.), nec Dianthera clavata Forst. Folia ramea in specimine Willden. unguicularia, obtusa. Involucri folioli basi contracta, alterum dimidio brevius altero. Capsula pubescens. (v. in h. Willd.)
8. D. CILIARIS (Juss. ann. mus. 9 p. 268), caule subhexagono ad genicula hirto, foliis ovato-oblongis acuminatis apice mucronatis basi acutis glabris in ambitu scabris, umbellis axillaribus oppositis brevissime pedunculatis trifidis, involucri subinæquali folioliis suborbiculatis cuspidulato-mucronatis longe ciliatis venoso-tri-quinquenervibus subbifloris, capsula obovato-cuneiformi pubescente. ¶ In Guianæ silvis umbrosis (Juss.! Schomburgk! n. 192 in h. DC. Leprieur! in h. mus. paris. et Nees n. 259), in Brasiliâ ad Pernambuco (Gardner! n. 1112 in h. palat. vindob., Benth., Moric., Hook.), ad Bahiam (Salzmann! in h. imp. petrop. [sub nomine J. Martinicensis] et Blanchet! n. 646, in h. Moric.,) in prov. Bahiensis sabulosis umbrosis (Blanchet! n. 443, in h. DC. et in h. Hook. sùb nomine Justicia brachiata), Madagascar, locis siccis prov. Emirnœ (Bojer! in h. DC.) — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 435. Ruellia Chinensis ? Lamk. Bojer! in h. DC. Herba diffusa. Flores purpurei, bracteis duplo longiores. Variat in Cajenne foliis luxuriantibus, umbellis laxis raris paucifloris (h. DC.!). (v. in h. Schomb., DC., Benth., vindob., paris., Nees., Moricand, etc.)
- ? §. pedunculis ternis seriatis longioribus inæqualibus, umbellis 5-7-fidis, involucri foliis brevissime mucronatis. — Iuins. Johannâ Comor. (Forsyth! in h. Benth. h. DC. ! ex h. Thibaud.)
9. D. BIVALVIS (Juss. in ann. mus. 9 p. 268) foliis ovato-oblongis basi acutis linearolis hispido-scabris, pedunculis axillaribus petiolo longioribus tri-fidis, capitulis bi-trifloris, bracteis ovato-subrotundis dilatatis aristato-mucronatis quinquenervibus hispidulis margine nudis. § In Indiâ orientali : Courtallum (Wight!) — Röem. et Sch. syst. 1 p. 168 (excl. syn. Rumph.), Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 434, Justicia bivalvis Linn. sp. pl. 1 p. 23, Vali symb. 2 p. 13, en. 1 p. 149 (excl. syn. Rumph. et Forsk.), Willd. sp. pl. 1 p. 82. Rami superne sexangularis pilisque minimis falcatis scabri, inferne subtetragoni glabri. Folia caulina bipinnicaria, petiolata, subtus pallidiora, pilis adpressis scabra, simpliciter venosa, ramea et floralia  $\frac{1}{2}$  poll. longa, in petiolum brevem decurrentia, apice longe attenuata, callosa-mucronata, utrinque setulis exiguis incurvis scabra, integerrima, venis costalibus subsenis simplicibus pallidis praedita. Pedunculi communes oppositi. solitarii, 3-5 lin. longi, trifidi, cruribus lateralibus 2  $\frac{1}{2}$ , medio 3-4 lin. longis, hispidulis. Bracteæ ad divisionem pedunculi due opposite, subulate, patentes, ramo suo breviores. Bracteæ involucrales 5-6 lin. latæ, 4 $\frac{1}{2}$ -5 $\frac{1}{2}$  lin. longæ, subrotundæ, apice subouspido-con-

tractæ et mucrone aristiformi terminatae, costis quinibus, quarum duas crassiores sunt, prædictæ, magis quam folia pubescentes. Bracteola pubescentes, subulatæ, calyce duplo breviores. Corolla semipollucaris, pubescens, carnea. Capsula obovata, 3 lin. longa, pubescens. In Vahlii descriptione folia floralia mucrone longo terminata dicuntur. In nostris folia hæc acuminata quidem inveniuntur, nec vero aristata. — *Justicia bivalvis* Roxb. toto caelo distat. (v. in h. Wight!)

b. *Bracteæ involucrales acutæ vel acuminatæ, nec cuspidatæ.*

10. D. *MADAGASCARIENSIS*, glabra, caule sexangulari angulis carinato-acutis, foliis ovatis in acumen obtusum attenuatis, pedunculis axillaribus oppositis folijs sequantibus iisve longioribus altero breviore, inferioribus bifidis, superioribus simplicibus, umbella 3-5-fida, bracteæ involucralibus ovalibus inæqualibus obtusiusculis cum mucronulo 5-nervibus glabris margine nudis, altero breviore et angustiore.  $\mathcal{U}$  In ins. Madagascar (Lyall! in h. Hook.). *Ruellia Chinensis* Lyall! n. 347 in h. Hook. Glabriticæ involucrorum breviorique horum acumine a binis sequentibus differt. (v. in h. Hooker).
11. D. *CANESCENS*, herbacæ, caule divaricato-ramoso sulcato sexangulari juvenili pubescenti-scabro, foliis ovatis obtusis basi breviacutâ in petiolum brevem desinibus glabris, umbellis axillaribus geminis subsessilibus trifidis (3-5-fidis?), involucris subsessilibus verticillatis 2-3-floris, bracteis inæqualibus ovalibus sessilibus pubescenti-tomentosis subglandulosis lanuginoso-ciliatis, superiore mucronato-acutâ, inferiore paulo breviore nec angustiore orbiculari obtusa mutica, capsula suborbiculari apice puberula.  $\mathcal{U}$  In ins. Javâ (Labillardière! in h. Moricand). Pubescencia totius inflorescentia densa at brevissima. Folia (ramorum) parva, cum petiolo vix pollicaria. Bracteæ circiter trilineares, canescentes. Affinis D. pubescens et micrantha (v. in h. Moricand.)
12. D. *JAVANICA* (Nees ab E. in Zoll. pl. jav. n. 2939), caule obliquo angulato ad angulos puberulo, foliis oblongis acuminatis in petiolum longum cuneatim decurrentibus glabris, umbellis sessilibus 3-4-floris, inferioribus in pedunculo axillari distantibus glomeratis semiverticillos referentibus, bracteis subulatis patentissimis brevibus suffulti, superioribus axillaribus alternis, capitulis unifloris, involuci foliis inæqualibus ovalibus acutis mucronatis subpubescensibus lanuginoso-ciliatis. — Ad margines fluviorum prope Buitenzorg, Julio-Octobri (Commersou in h. Vahl, Blume, Zollinger!) Dicliptera bivalvis Bl. bijdr. p. 789 (nec Juss.). *Justicia lœvigata* h. Vahl! ex insulâ Java. Distincta ramis inferioribus nudis subverticillatum spicæformibus. (v. in h. Vahl et Zollinger).
13. D. *LÆVIGATA* (Juss. in ann. Mus. 9 p. 268), caule fruticoso glabrescente, foliis ovatis apice angustioribus obtusiusculis basi obtusis acutis levibus, pedunculis axillaribus trifidis, capitulis bifloris, bracteis oblongo-ovalibus acutis 3-5-nervibus pubescensibus ciliatisque, alterâ duplo minore.  $\mathfrak{z}$  In silvis umbrosis montis Pauce, ins. S. Mauritiæ (Juss., Sieber! Vahl! in h. Willd. fol. 1, Bojer, h. mus. paris. in h. DC.). — Vahl symb. 2 p. 9, en. 1 p. 149. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 433 et h. n. 2881). *Justicia falcata* Lam. ill. gen. p. 38, enc. méth. 1 p. 622, h. Willd. n. 288! fol. 2, Sieber! fl. maurit. n. 356, (in h. gen. berol.) Bojer in h. DC. Bouton! ibid. n. 42 et in h. Hooker! Pedunculi proprii pedunculo communi, in aliis brevissimo in aliis petiolum fere sequante, duplo longiores, bracteis linearibus patentí-reflexis suffulti. Corolla pubescens, fere pollicaris, filamenta decurva. (v. in h. Vahl, Willd., DC., Hook., paris. etc.)
14. D. *GLABRA* (Decaisne pl. timor. in nouv. ann. mus. 3 p. 383, h. mus. paris. et Nees n. 74), rami erecti ramulisque subtetragonis glabriusculis, foliis....., umbellis axillaribus subsessilibus trifidis, capitulis 3-5-floris, bracteis communibus subulatis spinosibus, involuci foliolis inæqualibus ovali-subrotundis mucronato-acutis venosis coriaceis glabris margineque nudis.  $\mathcal{U}$  In insulâ Timor (Decaisne! l. c., h. DC.). Similis D. Martinicensi, differt invo-

lucris quicquam minoribus rigidioribus et involucro communis spinescente. Segmenta calycina linearis-lanceolata, acuta, ciliolata. Corolla glabra. Capsula orbicularis, compressa, glabra, ciliolata, basi et apice breviter et obtusè appendiculata. Semina orbiculata, ciliolata (v. in h. Mus. parisi., Nees et DC.)

15. D. ERIANTHA (Decaisne pl. timor. in nouv. ann. Mus. 3 p. 384), ramis gracilibus diffusis subtetragonis puberulis, foliis ovatis integerrimis subacutis petiolisque glabriusculis, involuci foliolis subrotundis acutis extrosum tomentosum introrsum glabriusculis unifloris, bracteolis subulatis, segmentis calycinis linearis-subulatis, floribus extrosum puberulis roseis, capsula obovato-subrotundâ subcompressâ tomentoso-ciliata.  $\mathcal{U}$  In insulâ Timor (Decaisne l. c.)
16. D. INTERRUPTA (Bl. bijdr. p. 790), caule herbaceo erecto, foliis inferioribus longiter petiolatis ovato-oblongis superioribus subcordatis subsessilibus integerrimis, spicâ terminali subramosa interruptâ, bracteis ovatis acuminatis ventricosis nervosis glanduloso-pilosusculis subæqualibus.  $\mathcal{U}$  In umbrosis montanis insulæ Javae, Augusto (Blume). Species dubia.

c. Bracteæ involucrales cuspidae.

17. D. PROPINQUA (Nees ab E. in Liun. 15 p. 373), pubescens, caule diffuso basi repente, foliis ovatis obtusiusculis longe petiolatis, pedunculis axillaribus solitariis bi-trifidis folium subæquantibus, bracteis ovali-subrotundis setaceo-cuspidatis basi acutis quinque nervis parce venosis.  $\mathcal{U}$  In promont. Bon. Sp. ad Coega rivier et trans montes Winterhoeksberge in Karro prov. Uitenhage, Februario deflorata (Ecklon!). Differt imprimis a D. Capensi bracteis haud obovatis basi cuneiformibus et ex superiori fine rotundato obtusissimo brevimucronatis, sed leni arcu cuspidatis cuspide subulata et subpungente (v. in h. Ecklon).
18. D. CHINENSIS, foliis ovalibus vel ovali-oblongis acutis cum mucronulo glabris in petiolum cuneatim attenuatis, umbellis axillaribus simpliciter ternis quinis seriatim trifidis brevissime pedunculatis, involuci diphyllo foliolis inæqualibus ovalibus sessilibus mucronato-cuspidatis ciliatis basi membranaceis, capsula suborbiculari compressâ brevissime unguiculata subvillosa.  $\mathcal{U}$  In Chinâ, Indiâ orientali (Burm.! et Kœnig! in h. Vahl), Javâ (Zollinger!). Justicia Chinensis Vahl symb. 2 p. 13, en. 1 p. 110 et h. Willd. sp. pl. p. 80 (diagnosis nec synon.), Zoll. pl. jav. n. 629 in h. DC.! Differt a D. Burmanni maxime bracteis exacte lateque ovalibus neque basi valde cunctatim attenuatis et capsula haud tomentosa, sed (apice præsertim) laxe molliterque pubescentibus subvillosa. An var.? (v. in h. Vahl spec. Burm. et Koenig ex Ind. or.). Propinqua D. ciliata, cui involuca sunt breviter mucronata; a D. Peruviana recessit folis in petiolum attenuatis, bracteis minus villosis sed tantummodo in nervo medio ciliatis nec trinervibus. Bracteæ communes et in hac specie, ut in D. Burmanni, spinescentes, sed verticilli sunt densiores magisque compacti. (v. in h. Vahl., DC., etc.)
19. D. UNGUICULATA (Nees ab E. et Benth. in bot. Sulph. p. 149), caule geniculato obsolete angulato apicem versus pubescentia brevi reversâ scabro, foliis ovatis utrinque acutis longe petiolatis lineolatis margine hispido-scabris, florum umbellis sessilibus axillaribus vel in spicas axillares terminaliæ compactis, bracteis inæqualibus scabris ciliatis trinervibus, superiore suborbiculari aristato-cuspidata basi longe cuneiformi, inferiore duplo minore spatulato-lineari truncata aristato-cuspidata.  $\mathcal{U}$  Ad Guayaquil (Sinclair!). Caulis videtur procumbens et diffusus; valde est geniculatum flexus, inferne glaber et fere teres. Folia cum petiolo semipollicari 2-3 poll. longa, 1-1½ poll. lata, acumine arguto prædicta et basi etiam acuta. Bracteæ basi luteæ, subtilissime pubescenti-scabre, mucrone longo setaceo cuspidatae, ciliatae, superior 5 lin. longa, inferior 3 lin., et ea arcte incumbens. An eadem ac D. pilosa Kunth? repugnant autem « bracteæ villosæ, » et in descriptione: « tres, qua-

- rum laterales lineari-subulatae, » omnino bractea inferiore, quæ singulari suæ structurâ oculos effugere nequibat. (v. in h. Benth.).
20. *D. PILOSA* (Kunth in H. et B. n. gen. et sp. 2 p. 237), caule sulkato-angulo foliisque strigoso-hirtis ovatis breviter petiolatis, floribus verticillatis et capitatis, bracteis obovatis longissime mucronatis villosis.  $\mathcal{L}$  In Novâ Granatâ (H. et B.). — Kunth syn. 2 p. 34, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 430. Differt a *D. multiflorâ* caule ramosiore subhirsuto, foliis breviter petiolatis bracteisque longe mucronatis.
21. *D. MUCRONIFOLIA* (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. 7 p. 161), pubescens, caule subtetragono elongato, foliis oblongis utrinque acutis mucronatis longiusculae petiolatis, florum umbellis trifloris geminis ternis sessilibus verticillatis in spicam terminalem longam verticillatam transeuntibus, hracteis inæqualibus oblongo-bovatis mucronato-acutis pubescentibus ciliatis venosotrimervibus.  $\odot$  Ad rivos prope Igreja Valha prov. Bahiensis (Blanchet! n. 3409 in h. Moric.), in prov. Bahiensis sabulosis umbrosis (Blanchet! in h. Benth.), in prov. Piauby Brasiliæ tropicæ (Gardner! n. 2462 in h. Benth.). *Justicia* (Dicliptera) brachiate Salzmann in h. Benth. Distinguitur a reliquis pubescentiâ omnium partium tenui hand admodum conferta foliisque omnibus mucrone brevi rigidulo præditis, quo charactere quidem accedit *D. Peruviana*, huic autem bracteas sunt multo latiores et rigide cuspidatæ, nec brevi mucronulo acutatæ. *Corolla alba* (Blanchet) 9 lin. longa. Variat iuvolueri foliis exterioribus majoribus minoribusve, ciliis hirsutieque vel longioribus vel brevioribus instructis. *Corolla rosea*. (v. in h. Moric., Benth., Hook.).
22. *D. HETEROSTEGIA*, foliis ovatis utrinque acutis supra substrigosis, umbellis axillaribus geminis, alterâ plurifida foliigerâ, involuci proprii diphyllo foliolis inæqualibus pubescentibus ciliatis venoso-septinervibus, inajore ovato acuminate acumine setigerâ, ninorc subtortu obtusissimo vel brevissimo mucronulato.  $\mathcal{L}$  In Africâ australi (Drèg.). *Justicia heterostegia* E. Meyer! in cat. pl. Drèg. a. 1837. A *D. Roxburghianâ* et aliis isti similibus distinguitur iuvolueri structurâ. (v. in h. Drèg. et Nees).
23. *D. MARTINICENSIS* (Juss. in ann. Mus. 9 p. 268), caule suhhexagono juvenili pubescente, foliis ovali-oblongis apice attenuatis basi acutis integerrimis utrinque lineolatis in costis et margine scabris, umbellis axillaribus oppositis trifidis (abortu bi-unifloris), capitulis suhfloris pedunculatis, involucro diphyllo puhecenti-scabri foliolis elliptico-ovatis mucronato-acutis tri-quinqe-nervibus margine scabris, altero paulo breviori.  $\odot$  Ad sepes insulæ Martinicæ (Jacquin! Bredemeyer! in h. Willd., de Rohr! in h. Vahl, Steinheil! in h. mus. paris. et Nees n. 285, Plée! ibid. n. 273, Duby! in h. DC.), in insulis Trinitatis (Sieber! n. 174), Stæ Luciæ (h. Benth. ex h. Forsyth!). — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 434 et h.! n. 280, Sieb. fl. trinit. n. 173. *Justicia Martinicensis* Jacq. am. p. 5 t. 2 f. 3 pict. p. 8 t. 6. Vahl en. 1 p. 150 et h.! Pedunculi subinde gemini, exteriore unifloro, interiorc trifloro umbellato. Involueri communis umbellæ folia 2 opposita, linearia, patentissima. « Intrat in compositionem Elixirii amari, » Duby in h. DC. (v. in h. Vahl, paris., Sieber, DC., Benth., etc.)
24. *D. CONFINIS* (Nees ab E. et Benth. bot. Salph. p. 149), caule sexangulari glabro novello sparsim piloso, foliis oblongis acuminatis basi acutis longe petiolatis utrinque lineolatis glabris, florum umbellis sessilibus in spicam terminalem foliosam transeuntibus, bracteis late ovatis cuspidato-acuminatis glabris ciliatis trinervibus nervis lateralibus trifidis.  $\mathcal{L}$  In Guayaquil (Sinclair!). Differt a *D. Peruviana* caule fere glabro nec nisi pilis raris adsperso, foliisque angustioribus et hracteis, præter harum cilia, fere omnino glabris. An var.? (v. in h. Benth.).
25. *D. PERUVIANA* (Juss. in ann. Mus. 9 p. 269), caule teretinsculo striato foliisque ovatis cuspidato-acuminatis mucronatis basi acutiusculis brevipedio-

- latis molliter hirsutis, florum umbellis sessilibus pedunculatisque axillaribus in spicam terminalem foliorum transeuntibus, involuci foliolis exterioribus ovatis cuspidato-acuminatis villosis ciliatis trinervibus nervis lateribus trifidis. **26.** Ad Cbancay Peruviae (Ruiz! in h. reg. berol.), Lima in umbrosis (h. DC.!), Sesuya (Mathews! n. 3147 in h. Hook.). — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 430, h. Willd. n. 289. Dianthera mucronata R. et Pav. fl. per. 1 p. 11 t. 16 f. a, h. Willd. n. 289! Justicia Peruviana Vahl en. 1 p. 148. Justicia cuspidata Pers. 1 p. 23. Justicia ovata Dietr., Steud. nomencl. ed. 2 p. 838. Folia cum petiole vix semipollucari  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata. Bracteæ propriæ exteriores omnino ut in D. confini, sed dorso villosa. Caulis dense villosus-hirsutus. Variat involuci foliolis (bracteis propriis) late ovatis et elliptico-ovatis. (v. in h. berol., Hook. et DC.)
- 26. D. SPICATA** (Decne pl. timor. in nouv. ann. Mus. 3 p. 384, h. Mus. paris. et Nees n. 75), ramis ramulisque subtetragonis glabris, foliis . . . , umbellis axillaribus sessilibus approximatis 1-3-floris ad apicem ramulorum dispositis spicam mentientibus, bracteis involucralibus inæqualibus ovali-oblongis longissime subulato-acuminatis acumine pungente ciliatis extus pubescens-tomentosus basi angustatus, inferiore breviore recurvo subcincinnato, capsula orbiculari hirsutula, seminibus papilloso-granulatis. **27.** In insulâ Timor (Decaisne 1. c., h. DC.!). Involucris squarrosis subspinescentibus distinctissima species. Folia specimenibus mus. paris. omnibus desunt. (v. in h. paris., DC., Benth., Nees).

### § 2. *Sphenostegiaæ. Foliolis involucralibus basi plus minus cuneatis.*

a. Apice obtusissimo retusove, mutico vel brevissime mucronulato.

- 27. D. MORITZIANA** (S. Schauer in ind. sem. hort. bot. vratisl. a. 1843), caule subhexagono ad genicula hirto toto hirsuto, foliis ex ovato oblongis basi apicis attenuatis utrinque lineolatis marginibusque strigoso-hirtis, umbellis axillaribus oppositis brevissime pedunculatis multifidis, involuci proprii diaphylli foliolis subinæqualibus obovatis mucronulatis pubescentibus ciliatisque venoso-trinervibus basi expallescens convolutis, capsula ovali-subrotundâ compressâ unguiculatâ hirsutâ. **(1)** Ad Caracas (Moritz! hort. berol. h. S. Schauer). Dicliptera ciliata S. Scb. in ind. sem. hort. vrat. n. 1840. Proxima accedit D. Roxburghianæ Nees ab E., quæ Justicia Chinensis Roxb. (nec Vahl). Differt: foliis quam pro latitudine longioribus, floralibusque præsertim magis oblongis, margine strigoso-hirtis et subtus quoque ad costas hirtulis nec supra tantummodo, tum maxime umbellis brevius pedunculatis densioribus bracteisque basi pallidis, fructu etiam minore. D. flabelliflora Nees ab E. in h. Haenck. In Guayaquil lecta differt bracteis angustioribus magis cuneiformibus foliisque floralibus superioribus longe cuspidatis. Capitula 4-5-flora. (v. v. c. et sicc. in h. Schauer).

**b. hirsuta**, caule hirsuto, foliis supra subtusque in costis pilosis, involuci foliolis hirtis obtusissimis mucronulo exiguo. — In Texas (Drummond! n. 218 et sect. 3 n. 254 in h. Benth.).

- 28. D. SEXANGULARIS** (Juss. in ann. Mus. 9 p. 269), caule sexangulari, foliis ovatis, umbellis axillaribus trifloris, bracteis cuneiformibus. **(1)** In Verâ Cruz et in Jamaicâ (Vahl! Amman!). — Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 435. Justicia sexangularis Linn. sp. pl. ed. Willd. 1 p. 83, Vahl symb. 1 p. 13, en. 1 p. 115. Justicia annua h. p. 271. Anguli caulis pilosi. Folia mucronata. Pedunculi triflori apice involucro 2-phyllo setaceo. Bracteæ calyces tegentes mucronatae. Calyx bracteis brevior (Vahl). An eadem ac D. Moritziana? (v. in h. Vahl).

- 29. D. BRACHIATA** (Spr. syst. 1 p. 86) caule sexangulari brachiatâ-ramosissimo glabro, foliis ovato-oblongis in acumen obtusum attenuatis basi acutis glabris subtus in costis tenue pilosis longe petiolatis, pedunculis axillaribus geminis ternis inæqualibus 3-5 fidis, capitulis 2-3-floris, involuci proprii foliolis inæqualibus

mucronulatis basi cuneatis pallidioribusque venoso-trinervibus in costis et margine laxe subciliatis sub fructu inflatis, capsula ovali mucronata a medio sursum pubescente.  $\mathcal{D}$  In insulis fluvii Roanok Carolinae superioris, Julio et Augusto (Pursh!), Arkausas (Nuttall! in h. DC.), Georgiæ (h. Hooker!), Texas ad S. Felipe (Drummond! 2 n. 213, 3 n. 253 in h. Hooker). Justicia brachiatæ Pursh fl. am. sept. 1 p. 13, Rœm. et Sch. syst. mant. 1 p. 167, Nutt. gen. p. II. Dicliptera resupinata? Nuttall! in h. DC. et Hooker l. c. Accedit ad D. cardiocarpa. Differt a plorisque involucris fructiferis ventricosis. Involucra  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{3}{4}$  lin. longa, late viridia, basi albida. Corolla parva, involucro vix dimidio longior. (v. in h. DC.)

30. D. HOOKERIANA, foliis ovatis acutis in petiolam brevem acute desinentibus cauleque hirsutis, umbellis axillaribus geminis oppositis 5-fidis, inferioribus inaequaliter pedunculatis, superioribus sessilibus, involucris sessilibus, foliolis exterioribus inaequalibus cuneiformibus obtusis cum mucronulo acuto trinervibus hirsutis densissime patenti-ciliatis.  $\mathcal{D}$  In Peruviâ, ad Purruchua, in prov. Banta, Aprili (Mathews! n. 465 in h. Hook.). Dianthera mucronata Math. l. c. excl. syn. R. et Pav. Involuci foliolis elegantissime ciliatis sive fimbriatis distincta. Etiam bracteolæ, quæ lineari-subulatae, longe ciliatae sunt. Quod ad caulem et folia haud adeo absimilis est D. Peruvianæ Juss. seu mucronata R. et P., sed involucrorum figura longe est alia. (v. in h. Hook.)
31. D. CARDIOCARPA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 111), foliis ovatis basi acutis supra lineolatis glabris, pedunculis axillaribus geminis brevibus triquinquefidis, capitulis subbifloris, involuci ciliati foliolis inaequalibus, majore obovato-cunciformi obtuso vel retuso cum mucronulo, fructu obcordato hirsuto.  $\mathcal{D}$  Ad castellum Sirhind frequens, Martio (Edgeworth! n. 259), in Nihinaghur Hamilt.!, in Chinâ ad Macao (Callery! in h. mus. par. et ex eo in h. Nees). Justicia Chinensis var.  $\beta$  h. Hamilt.! Wall. cat. n. 2466 b (ex parte et ex parte in h. berol.). Differt a D. riparia: umbellulis pedunculo quidem brevi prædictis, nec sessilibus, inter nodis floralibus minus hirsutis, neque bracteis etiam undique hirsutis sed tantum ad margines ciliatis, fructu perfecte obcordato hirsutoque, neque elliptico pubescenti-sabro. A D. cuneatâ jam e ciliis bractealibus, quibus ista caret, multisque aliis absque negotio distinguitur. Articuli florales pubescenti-sabri. Capsula  $2\frac{1}{2}$  lin. longa, cordata, basi cuneiformi, dense pubescens. (v. in h. Wall., Edgcw., berol.)
32. D. RIPARIA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 112, Wall. cat. n. 7183 a, b), foliis ovatis basi acutis cauleque minute lineolatis glabris, floribus verticillatis subcapitatoe-axillaribus, involuci foliolis cuneiformibus retusis mucronulatis hirsutis, capsula unguiculata ovali pubescenti-sabre mucronata.  $\mathcal{D}$  In Promontoribus regni Avæ et in ripâ Attrani fluvii (Wall.!), ad Belin Mellooon in Martabaniæ (idem!), Pegu (Reynaud! in h. mus. paris.), Caulis ad inflorescentiam usque cum foliis glaber, repens, ex tereti sexangularis. Folia basi acuta, apice attenuata, solâ costa scabra; bractealia minora, subsessilia, hirtula. Articuli caulis florales hirsuti vel puberuli. In singulâ axillâ capitula flororum 2-3, 2-3-flora, subsessilia, verticillum constituent. Bracteæ involucrales duæ, abortu unifloræ, pleræque autem ab origine bifloræ. Bracteolæ propriæ lineari-acuminatae, ciliatae, calyx longiores. Calyx tener, laciinis subulatis equalibus pubescens. Corolla semipollucaris, purpurea, pubescens. Capsula pubescens, ovalis, ob basin angustiore compressam subclavata, compressa, apice depresso-tetragona, tetrasperma; dissepsimentum una cum laterum parietibus recurvato-dehiscens. (v. in h. Wall., paris, et Nees.)
33. D. SCABRA, caule foliis involucrisque pilis brevibus scabris foliis ovatis cuspidato-acutis basi acutiusculâ in petiolam desinentibus, umbellis axillaribus alternis brevipedunculatis 3-5-fidis, involuci proprii foliolis subæqualibus obovato-cuncatis obsolete mucronulatis vel simpliciter rotundatis margine nudis undique costis saltem omnibus scabris basi expallescens.  $\mathcal{D}$  Ad sepes prope Quito (Jameson! in h. Hooker), in Pichinchâ m. 19,000 p. alt. (Hall !

in eod. h.) Distincta a D. Moritzianâ involucris scabris, foliolis obtusis mucronulo saepe deficiente aut minimo (v. in h. Hooker).

34. D. TOMENTOSA, suffruticosa, sericeo-tomentosa, canescentis, caule basi ramoso et repente obsolete sexangulari, foliis ovatis acutis basi acutiusculâ in petiolum brevem desinentibus, umbellis axillaribus oppositis (subinde geminis) brevipedunculatis trifidis, involuci subinæquali foliolis obovato-cuneiformibus cuspidatulo-mucronatis dense glandulosis subbifloris, capsula... ♂ Ad Lîmam, Chancay aliquis in partibus Peruviæ (Ruiz ! in h. gen. berol.), Lomas Surin, Maio (Mathews ! n. 536 in h. Hooker). Justicia tomentosa Vahl en. 1 p. 160. Justicia repens Pers. syn. 1 p. 23. Dianthera repens Ruiz et Pav. fl. per. 1 p. 10 t. 15 f. b. Canescens, pedalis. Folia parva. Bracteæ glandulæ sessilibus lutescentibus dense obsitæ. Corolla purpurea, pubescens, pollice paulo longior, labis concavis rectis, infero brevissime tridenticulato (v. in h. berol. et Hooker).
35. D. CUNEATA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 111, Wight h. propr. n. 2015), foliis ovatis basi acutis cauleque minute lineolatis glabris, pedunculis axillaribus petiolo longioribus 3-5-fidis, involuero communi subulato umbellâ breviore, capitulis subbifloris, involuci proprii diphyllo foliolis cuneiformibus mucronatis trinervibus pubescenti-scabris, margine nudis. ♂? In Travancore (h. madr.!), in Courtallum (Wight ! l. c.), in Muniyari (Hamil.!). Justicia umbellata Wall. cat. n. 2467 a, c. d. Justicia Chiensis var. β h. Hamilt.! Wall. cat. n. 2466 b (ex parte). Justicia latebrosa h. Wight! Wall. cat. n. 2467 d (ex parte). Similis D. bupleuroidi, differt involuci foliolis non ciliatis, basi magis attenuatis, bracteolis calycibusque minus acuminatis neque adeo fere capillaceis. Bracteola duæ setaceæ cingunt calycom. Calyx æqualis, quinquepartitus, lacinij linearie-subulatis. Corolla 4-5 lin. longa, pubescens, purpurea, bilabiata, labii subæqualibus oblongis obtusis integris? Antherarum loculi semiovati mutici, unus alteri superpositus. Capsula pubescens, unguiculata, sursum elliptica, compressa, bivalvis, tenuis; loculi dispermi. Dissepimentum a basi arcu adscendens, valvulam, a quâ discedit, saepe laceram relinquit. Retinacula validâ, falcata. Caulis a basi est ramosissimus. (v. in h. Wallich, Wight, Hooker, berol., etc.)

b. Apice etiam angustiore attenuatove, plus minus mucronata.

36. D. CAPENSIS (Nees ab E. in Schlecht. Linn. 15 p. 373), pubescens; caule diffuso, foliis ovatis obtusis longe petiolatis, pedunculis axillaribus solitariis 2-3-floris folio brevioribus, bracteis propriis obovato-subrotundis mucronatis basi cuneatis reticulatis 5-nervibus 2-3-floris. ♂ In Prom. B. Spei, circa flumen Zwartkopsrivier ad Prædium Pauli Maré (Uitenhage), Martio cum floribus fructuose maturo (Ecklon !). Folia Origani, semipollucaria. Corolla pubescens, 4-5 lin. longa, purpurascens. (v. in h. Ecklon et berol.)
37. D. SERICEA (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 161), caule subsexangulari pubescente, foliis ovatis ovatoe oblongis in acumen obtusum attenuatis basi acutis utrinque pubescenti-tomentosis longiusculæ petiolatis, capitulis 1-2-floris verticillatim glomeratis pedunculo communi brevissimo, involuci proprii hexaphylli foliolo altero lineari oblongo mucronato-acuto acuminè recurvo breviter ciliato extus sericeo-pubescente, reliquis lanceolatis acuminatis puberulis chartaceis vix brevioribus, corolla involuero triplo longiore. ♂ In Brasiliâ (Schlech! in h. palat. vindob.), locis umbriosis siccis ad Sorocaba, Februario (Riedel ! in h. imp. petrop. n. 1984). Pubescens densa, involuerorum partialium foliolo majore minore angustioreque arguto mucronato, sive potius cuspidato cuspide subpungente recurvo a D. Pholiiana differt; a D. multiflora, differt involueri foliolo majore apicem versus minus dilatato et corollâ dimidio majore, tum bracteis accessoriis cuspidatis nullis, que, capitulis nbi in spicam abeunt, immiscuntur. Calyx profunde quinquefidus longitudine fere foliolorum involueri minorum. Variat in codem individuo in-

volucrorum nonnullorum exteriorum foliolo majore subrhombico longius cuspidati basi pallidiore subtriplinervi. (v. in h. vindob. et petrop.)

38. D. *POHLIANA* (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 162 t. 30), foliis ovatis (raneis ovato-oblongis), iu acumen obtusum attenuatis submu-cronulatis basi acutis repando-subcrenatis supra hispidulis subtus subtiliter pubescentibus, capitulis subbifloris axillaribus sessilibus pedunculatisque capítatis, bracteis communibꝫ capitulo communi longioribꝫ, involuero proprio hexaphyllo, foliolo uno reliquis majore oblongo-cuneiformi mucronato subtrinervi pubescente minute ciliato, reliquis plerisque lanceolato-attenuatis subæqualibus basi pallidis marginæque nudis.  $\mathcal{U}$  Ad Tazenda de Roma in prov. Minarum Generalium Brasiliæ (Pohl! in h. palat. vindob. n. 2973). *Justicia* abnormis Pohl! ic. in h. palat. vindob. n. 2973. Planta inter congeneres speciosa, pluripedalis, erecta. Caulis nodosus, inæqualiter sexangularis et ad angulos imprimis pubescenti-hirtus. Folia lata viridia; inferiora circiter 3 poll. longa et poll. 1 lata, subinde magis oblonga; superiora minora. Petiolas brevis. Capitula sive involucra propria in capitulis disposita sunt secundum typum hexameri quorum alterum aëguli singuli atque exterius sessile sœpe ad pauciora capitula, ino ad unum reducitur, alterum, idque interius positum, pedunculo 1-2 poll. longo valido nudo extollitur, in eujus apice folia duo pollicaria ovato-obtusa brevipetiolata tanquam involucrum commune efficiunt; subinde, præsertim in inferiore parte caulis, utrumq[ue] capitulum cujusque anguli est pedunculatum. Involucri foliolum exterius majus est, 5-7 lin. longum, prope ab apice 1-3 lin. latum, hinc basin versus leniter attenuatum, sœpe et oblongo-lineare apice rotundatum cum brevi mucronulo, viride, obsolete trinerve, venulosum, pubescens vel scabrum, alterum brevius at illi simile, vel et cum 5 interioribus chartaceo-pallidum parum pubescens, 2-4 lin. longum. Calyx ad medium usque quinquefidus. Corolla pollicem longa. Capsula vix 4 lin. longa, pubescens, viridis. (v. in h. vindob. et Hooker).
39. D. *TWEEDIANA*, glabra, foliis oblongis obtusis submu-cronulatis basi acutis capitulis 2-5-floris axillaribus verticillatimque sessilibus capitatisque longe pedunculatis, capitulis pedunculatis involuero diphyllo, foliis lanceolato-oblongis capitulo longioribus præditis, involuero proprio 4-t-phyllo glabro foliis rigidulis punctulato-asperis margine nudis, exteriorum altero altero plus duplo majore lanceolato obtusiusculo cum mucronulo brevissimo, altero lanceolato-linearí acentiusculo, ntroque a medio deorsum membranaceo-marginato pallido, interioribus linearí-subulatis acuminatis brevioribus.  $\mathcal{U}$  Secus ripas Uruguay fluvii in itinere c monte Video ad Porto Alegre (Sellow! in h. gen. berol. n. 13 [585] et 16 [d 531], Bacch! in h. Moricand et DC.), S. José de Uruguay, Febrero (Sellow! in h. gen. berol. n. 11), Buenos Ayres, frequens in sepium marginibus (Tweedie! in h. Benth. et Hook. n. 754), Panama (?) (Tweedie! in h. Hooker). (v. in h. cit.).

- $\beta$ . *microphylla*, foliis minoribus (unguicularibus) ovalibus aut ex ovalibus subparabolicis apicem versus minus attenuatis, ramis plerisque approximatis, inflorescentiæ minus explicata (formæ macræ). —Ad Valdonado in campis prov. Montevidensis, Maio (Sellow! in h. gen. berol. n. 16 et 17).  
 $\gamma$ . involucris purpurascens (Sellow! in h. gen. berol. n. 15).

Differit constanti charactere a D. Pohlianæ involucris duplo angustioribus valde inæqualibus marginibus neque integris a medio deorsum pallidis. Typus inflorescentiæ est umbella 5-7-fida, flabelliformis, pedunculo diversæ longitudinis sœpe brevissimo, capitulis sessilibus.

40. D. *PROCUMBENS* (Humboldt! in h. Willd. n. 292. Linn. Jahrb. 1, 3 p. 48. Rœm. et Sch. syst. mant. 1 p. 149), herbacea? glaucescens, caule procumbente adscendente 4-sulcato pubescente demum glabrescente, foliis (superioribus) ovato-oblongis acutis lineolato-asperis glabris, umbellis axillaribus oppositis, inferioribus pedunculatis, pedunculus folio longioribus subsecundis trifidis,

involucris obovato-oblongis cuneiformibus mucronato-acutis rigidulis subtriangularibus glabris subbifloris.  $\mathcal{U}$  In Americâ meridionali (Humboldt! n. 3639, in h. Willd. l. c.). Planta tenera, e specimine circiter  $\frac{1}{2}$ -pedalis. Involucrum foliolum majus 4 lin. longum. (v. in h. Willd.)

41. D. BURMANNI (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 112. Wight h. propr. n. 2016), caule obsolete tetragono juvenili ramisque pubescenti-scabris, foliis ovalibus lanceolatis utrinque acutis mucronatis supra substrigosis glabrisve, umbellis axillaribus simpliciter dupliciter quaternis quinise seriatis trifidis brevissime pedunculatis, involucri proprii diphylly foliolis inaequalibus spatulato-lanceolatis aristato-~~cuspidatis~~ longe ciliatis basi membranaceis, capsula orbiculari compressâ tomentosa brevissime unguiculata.  $\mathcal{U}$  In Indiâ orientali (Wight, ex herbario Rottleriano teste schedulâ additâ), ad Canton, in imperio Chinensi (h. Arnott!), insula Timor (Decaisne!). Dicliptera Burmanni var.? Henslow in ann. of hist. nat. 1838. 1 p. 344. Dicliptera ciliata Decne! h. timor. in nouv. ann. du mus. 3 p. 384. h. mus. paris. iu. h. Nees n. 76. Dicliptera Timoriensis h. Moricand! Justicia Chinensis Burm. fl. ind. p. 8 t. 4 f. 1. Linn. sp. pl. p. 22? Loureiro fl. cochinch. ed. Willd. 1 p. 30. Vahl symb. 1 p. 4. Wall. cat. n. 2466. c. Folii longis angustisque facile distinguuntur. Verticilli densi, approximati. Capsula strigiloso-echinulata, suborbicularis, compressa, disperma. Corolla 4 lin. longa. Semina confertim echinata. (v. in h. Wallieh, Wight, paris. et Nees)

$\beta.$  laxior, caule graciliore, foliis ovatis acutis longiuscule petiolatis basi acutiusculâ in petiolum desinentibus, umbellis rarioribus solitariis gemitivis subsessilibus trifidis distantibus. — In Javâ (Labill. ! in h. Moric.).

42. D. ROXBURGHIANA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 111), foliis ovatis utrinque acutis supra substrigosis, umbellis axillaribus quaternis quinise seriatis tri-quinquefidis, involucri proprii foliolis inaequalibus obovatis mucronulatis ciliatis venoso-trinervibus, capsula ovali-subrotundâ compressâ unguiculata hirsuta. — In Assam (Griffith! in h. Hooker). Dicliptera Chinensis Rœm. et Sch. syst. mant. 1 p. 146 Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 434 (excl. syn. pl. Justicia Cbinensis Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 125. ed. 2. a. 1832 p. 124. Rœm. et Sch. mant. 5. v. 1 p. 146 (locus fl. Roxburgh). Wall. cat. n. 2466. a. Similis D. Burmanni, sed differt: caule lineatum pubescente, foliis majoribus longioribus, petiolis donatis ( $2\frac{1}{2}$  poll. longis ovatis), in pagina superiori parciis strigosis, umbellis majoribus longius pedunculatis (decrecente exteriora versus longitudine \), bracteis majoribus latioribus ( $5\frac{1}{2}$  lin. longis,  $2\frac{1}{2}$  lin. latis), ex obovato ellipticis, basi multo minus angustatis, nec membranaceis, obtusiusculis cum mucronulo, trinervibus, a medio ad basin ciliis multo tenerioribus praeditis (scabris, altera  $\frac{1}{4}$  minore), capsulae ungue fere  $\frac{1}{2}$  omnis longitudinis explete, reliqua parte minus compressâ ovali-subrotundâ mucronata pubescentia patulâ vestitâ tetraspermat. Corollæ ad apicem labii supini quadrilinearis puberulae labium supinum late lineare tridenticulatum, dentibus apice barbulatis; labium resupinum latius, ovali-subrectundum, obsolete emarginatum, quandoque integerrimum. (v. in h. Wall., et berol. specim. cult. ex hort. calcutt., spont. in h. Hooker).

43. D. REPTANS, caule repente apice ramisque adscendentibus glabris, foliis ovali-oblongis obtusis basi acutis glabris, umbellis axillaribus solitariis gemitivis oppositis tri-fidis, involucri proprii foliolis parum inaequalibus subrhomboidatis acutis cum mucrone pubescentibus ciliatis venosis basi cuneatis pallidioribusque.  $\mathcal{U}$  Ad Mergui (Griffith! in h. Hooker). Differt a D. Roxburghiana caule longe repente et involucris angustioribus magisque acutis, etc. (v. in h. Hooker).

44. D. CLINOPODIA, foliis ovato-oblongis apice attenuatis cum mucronulo basi obtusis subtus scabris, caule sulcato-angulato angulis scabris, pedunculus axillaribus geminis brevissimis 3-6-fidis capitulis sessilibus verticillis densos

ad apicem canolis contiguis exhibentibus, involucri proprii foliolis inæqualibus lanceolatis acuminate extremitate setaceâ basi trineribus apice venosis scabris, disco baseos hyalino.  $\mathcal{U}$  In Promont. Bonæ Spei (Drège! in h. Hooker). *Justicia clinopodia* E. M.! iu h. Drég. Involucri foliolum majus 6-7 lin. longum, alterum  $\frac{1}{2}$  brevius. (v. in h. Hooker).

45. *D. HYALINA*, caule glabro, inferne 4-angulari, superne 6-angulari flaccido, foliis lanceolatis (forsan et oblongis) utrinque attenuatis acuminatis mucronatis glabris, capitulis unifloris in umbellis sessilibus oppositisque brevissime petiolatis ideoque dense verticillatis, bracteis communibus subulatis patentibus, involucri proprii foliolis duobus exterioribus perum inæqualibus oblongis ex apice obtusiusculo aristato-mucronatis, basi attenuata sessilibus trineribus basi byalinis superius laxe venosis in costis et margine viscido puberulis, interioribus oblongis apice capillari-attenuatis pubernis, calycis laciis tenuissimis setaceis.  $\mathcal{U}$  In insulâ Johanna Comores, in fruticetis ad margines rivularum (Bojer! in h. DC.). Quod ad characteres haud multum differre existimares a *D. Burmanni*, sed tota planta est multo tenerior, probabiliter herbaceo-succulenta; verticilli fere sessiles sunt, involucra tenuia, etc. (v. in h. DC.)
46. *D. UMBELLATA* (Juss. in ann. du Mus. 9 p. 268), caule suffruticoso inferne 4-angulari superne 6-angulari glabro, foliis oblongis acutis basi in petiolum acute desinentebus glabris, pedunculis axillaribus oppositis brevissimis solitariis geminis subquinquedidis, capitulis umbellatis bifloris, bracteis laxc villosis longe ciliatis inæqualibus mucronato-acuminatis, exterioribus oblongo-lanceolatis basi hyalino-marginatis alterâ paulo minorc, interioribus 3 duplo minoribus lanceolato-subulatis undique angusteque hyalino-marginatis. (?)  $\mathcal{U}$  Ad Calam, ad Senegal fluvium (Jussieu! in h. Vahl), in Senegambiâ (Perrottet! in h. mus. paris. et Nees n. 33. h. DC.); ibid., in regno Ouallo (Leprieur! in h. mus. paris. et Nees u. 29). — *Rœm. et Sch. s. v. 1 p. 170.* *Justicia umbellata* Vahl en. 1 p. 115 et h. *Caulis pedalis*, superne profunde angulatus. Folia cum petiolo 2-lineari 1 poll. longa, 4 lin. lata. (v. in h. Vahl, paris. et Nees).

$\beta$  *ocymoides*, caule herbaceo, foliis ovatis (cum petiolo 3-lineari  $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longis, 6-8 lin. latis), pedunculis solitariis brevissimis, capitulis capitato-sessilibus. —  $\mathcal{U}$  Ex horto havn. *Justicia ocymoides* Lam. ill. p. 39. euc. méth. 1 p. 630. *Justicia dubia* h. Vahl! spec. cult. ex hort. havn. Dicliptera *ocymoides* Juss. ann. du mus. 9. 1. c. Rœm. et Sch. syst. 1 l. c. Willd. sp. pl. cd. Dietr. 1 l. c. Est planta ejusdem speciei imperfectior, ante anthesin decerpta. (v. in h. Vahl).

47. *D. MICRANTHES* (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 112), foliis ovatis acuminatis, umbellis axillaribus subsessilibus tri-quinqefidis, subseriatis, floribus capitatis ternis, involuci proprii diplylli foliolis inæqualibus sessilibus oblongis partialibusque quaternis lanceolatis mucronato-cuspidatis basi utrinque membranaceis ciliatis, capsulâ sessili oblongo-tetragonâ.  $\mathcal{U}$  In Indiâ orientali (h. Wight! var.  $\alpha$  et  $\beta$ ), Decan (Edgeworth! h. Benthham), ad pagum Cordonatum Milbes in umbrâ Mimosarum (Kotschy!), e regno Fazohel Kotschy! n. 513. in h. Hooker). *Justicia Chinensis* Vahl symb. 2 p. 13. Wall. cat. n. 2466. *D. spinulosa* Hochstett.! in Kotsch. it. nub. n. 277. *Justicia cuspidata* Vahl symb. 2 p. 9. en. 1 p. 149. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 400? *D. micranthes* et reliquis statim dignoscitur floribus fere verticillatis a basi caulis frequentibus, verticillis villosulis, corollâ exigua vix bracteas excedente, et capsulâ sessili ovali tetragonâ, nec basi unguiculata. Vix differt a *D. umbellata* Vahl. (v. in h. Wall., Edgeworth, Moric. et un. itin.)

$\beta$  *laxior*, depauperata inflorescentiâ, pedunculis umbellularum nonnullis magis elongatis. — *Justicia orbiculata* Wall. cat. n. 2489 ex parte (casu probabiliter admixta). Var. d, seu juvenilis potius plantæ status, fallaci specie oculos decipit, præsertim propter umbellas hoc tempore adhuc in

spicularum formam contractas, bracteolisque illis setaceis basi stipatas, quæ, quum paulo longiore pedunculo præditæ sint, spicam graminis exammussum referunt.

18. D. **MACULATA**, foliis ovatis acuminatis basi acutis subtus in costis scabris, caule 5-sulcato glabro, pedunculis axillaribus, involucro communi umbellæ diphylo foliolis lanceolatis subulatisve patentissimis, proprii foliolis duobus exterioribus inæqualibus oblongo-ovalibus mucronato-acutis basi attenuatis maculisque duabus pallidis signatis venoso-trinervibus viscido-pubescentibus margine nudis.  $\mathcal{L}$  In Africâ tropicâ. A D. cuneatâ differt staturâ majore, pubescentiâ, pedunculus capitulorum longioribus (capituli longitudine), bracteis majoribus, etc. Capitula uniflora. (v. in h. Schimp. un. itin.)

$\gamma$ . *panicularis*, caule altiore trichotomo, foliis supra dissite hirtis, pedunculis inferioribus petiolo longioribus trifidis, superioribus trichotomo-paniculatis folio longioribus 3-7-fidis. — In præruptis rupium locis umbrosis prope Dscheladscheranne in Abyssinâ, Novembri (Schimper!). Peristrope maculata Hoebst.! in Schimper it. abyss. un. itin. 2. n. 701.

$\beta$ . *Senegambia*, caule laxiore, pedunculis brevissimis oppositis sæpe geminis verticillos densos distantes in foliorum superiorum angulis struuntibus. — In Senegambiæ insulâ Bravae arvis incultis (Baumann! in h. Hook.).

49. D. **BUPLEUROIDES** (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 111), foliis ovatis acuminatis basi acutis supra lineolatis glabris integerimis, pedunculis axillaribus simpliciter vel composite umbelliferis, floribus capitatis geminis, involucro communi subulato linearive umbellâ breviore, involuci proprii diphylli foliolis inæqualibus oblongo-lanceolatis glabris mucronatis margine laxe ciliatis scabris, bracteolis acuminato-crinitis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali ad Sillet (Wall.!), in Nepaliâ (Wallich!), in h. madr.! cum Lepidagathia cristatâ promiscua (Wall. cat. 1. c.), Afghanistan, Mergui (Griffith! in h. Hooker)? Justicia Chinensis Wall. cat. n. 2466 d. Justicia canescens Wall. cat. n. 2423. Justicia rotundifolia l. c. n. 2489 ex parte (incompleta). Justicia pulchella var. Car. in h. Arnott! Justicia latibrosa Koen. Roxb. fl. ind. cd. Car. et Wall. 1 p. 126. ed. 2 a. 1832 p. 125. Dietr. sp. pl. 1 p. 416? Caulis obsolete hexagonus, glaber, ad genicula tumidus. Folia  $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$  poll. longa  $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. lata, acumine obtuso. Pedunculi inferiores longiores, superiores denique geminati et breviores, apice flabellatum quinquefidi. Pedunculi proprii  $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longi, alii capitulo simplici, alii 3-5 brevipedicellati. Involuci foliola duo, oblongo-lanceolata, basi modice attenuata, obtusa cum mucrone, trinervia, plus minus ciliata, subinde et margine solunimodo scabra; alterum 6 lin. longum, alterum 4 lin. longum. Capitulum biflorum; bracteolæ propriæ  $3\frac{1}{2}$  lin. longæ, setaceo-acuminatae, apice fere capillari, scabrae. Bracteola loco floris intermedii deficiens dueæ minutissimæ, triangulares. Corolla semipollucaris, angusta, pubescens, carnea. Capsula  $2\frac{1}{2}$  lin. longa, basi-compresso-contigua, superius depresso-orbiculata, truncata cum mucrone, pubescens. (v. in h. Wallich, berol. etc.)

$\beta$ . *sessilis*, umbellis sessilibus. (Jacquemont! in h. mus. paris. n. 327, in h. Nees n. 158). Ad Assam (Griffith! in h. Hooker).

50. D. **CRINITA**, umbellis axillaribus solitariis, bracteis oblongis ciliatis.  $\odot$  In Japoniâ prope Nangasaki (Thunberg). Justicia crinita Thunb. in Linn. transact. 2 p. 338. Vahl symb. 2 p. 16. en. 1 p. 114. Willd. sp. pl. ed. Distr. 1 p. 411. Dianthera Japonica Thunb. fl. jap. p. 21 t. 4. Pedalis, erecta, hexagona, tenuissime villosa. Folia pollicaria, oblonga, attenuata, villosa. Pedunculi solitarii, pedicelli 2-3-4-flori. Bracteæ dueæ subulatæ ad basin pedicellorum, dueæ oblongæ ad basin calycis, unguiculares, 1-3-floræ. Calyx exterior 4-phyllus (bracteolæ 2 capituli 2-flori). Corolla purpurea, bracteis longior. An eadem ac D. bupleuroides?

51. D. **HIRTULA**, foliis ovatis acuminatis basi acutis supra lineolatis hirsutis

crenatis, pedunculis axillaribus simpliciter vel composite umbelliferis inæqualibus, floribus capitatis geminis ternis congestis, involuci communis foliis lanceolatis umbellâ paulo brevioribus, involuci proprii diphyllo foliolis inæqualibus altero oblongo-lanceolato lanceolatove mucronato, bracteolis calycibusque acumiuato-crinitis. ♂ In Indiâ orientali. Similis D. bupleuroidi, et forsas ejus varietas, differt autem caule foliisque et bracteis sparse hirsutis, foliis amplioribus (6 poll. longis, 2½ poll. latis) inferioribus ounctis grosse crenatis, pedunculis constanter fere in axillis ternis, quorum interior longior subinde compositos, bini exteriora multo breviores simpliciter umbelliferi, involuci solo folioli exteriori oblongo-lineari mucronato, interioro e latiore basi setaceo dimidio fere breviore. Reliqua ut in D. bupleuroide. Caulis basi repens. (v. in h. Wallich, Edgeworth, paris. etc.)

$\alpha$ . *latifolia*, foliis late ovatis crenatis. — Ad Cataractas Simlæ et prope Pandkesar (Panchesar Ritter), in Himalayâ, locis apriis, Octobri (Edgeworth! n. 254).

$\beta$ . *augustifolia*, magis hirsuta, foliis minoribus saepè ex elliptico oblongis, pedunculis saepè brevioribus, unde flores subinde ad speciem verticillatâ vel capitati apparent, involuci foliolis lanceolatis hirsutis. — In Guiparâ (Hamilt.!), in Sirmoore (Gerard!), in planitiis sicca apriacâ propè Simla, Octobri (Edgeworth! n. 236, 256 et 257), in Neelgherries? (Jaquemont! in h. mus. paris. n. 159). Dicliptera bupleuroides var.  $\beta$  N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 111. *Justicia Chinensis* var. prior. Roxb. fl. ind. occ. ed. Wall. I p. 126 adnot. Wall. cat. n. 2466 b et f. *Justicia Chinensis* var.  $\gamma$  h. Hamilt.! Wall. I. c. b. *Justicia pulchella* n. sp. Caley! in h. Hooker. (v. in h. Wallich, paris. et berol.)

52. D. *RUPESTRIS*, foliis ovatis acuminatis basi acutis lineolato-scabris integerimis, pedunculis axillaribus simpliciter umbelliferis brevibus, involuci foliis subinæqualibus bracteolisque setaceis scabris. ♀ In rupibus Himalayæ alt. 11,000 p. prope stationem Rudra prayaga, Maio (Edgeworth! n. 258). Habitat omnino est D. hirtula var. d, sed differit involuci foliolis setaceis conformibus altero tamen paulo breviore, bracteolis longioribus et paulo latioribus. Caulis ½-1 ped. altus, simplex. Folia 2-1 poll. longa, 8-5 lin. lata, glabra, lineolis brevissimis conservis praedita, subtus ad nervos scabra. Pedunculi cum umbellis suis folio duplo breviores, 1-2 in axillâ singula, verticillum exhibent. Calyx, corolla et capsula ut in D. hirtulâ. An D. hirtulæ var. situ macro exorta? (v. in h. Edgeworth.).

53. D. *MULTIFLORA* (Juss. in ann. du mus. 9 p. 268), caule obtuse sexangulari geniculato ramoso juvenili pubescenti-pilosove, foliis ovatis ovatoe oblongis utriusque acutis petiolatis conformitatem lineolatis ciliatis totis plus minus pubescenti hirtis, pedunculis simpliciter flabellato-umbelliferis 3-12-floris ex axillaribus longiusculis in spicam terminalem transeuntibus, bracteis pubescentibus inæqualibus oblongis lanceolatibus basin versus cuneatis apice rotundato-acutis mucronatis, corollæ labio superiore latiore integrō, inferiore angustiore minute tridentato. ♀ In Quito (Humboldt!), ad Guayaquil (Sinclair!), Mexico prov. Leon (Mendez! in h. DC.) in Sierra S. Pedro Nolasco. Talca, etc. (Jürgensen! n. 859. in h. Hooker) — Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 237. Dietr. sp. 1 p. 429. Willd. h. n. 299. — *Dianthera multiflora* Ruiz et Pav. fl. peruv. I p. 10. t. 14. f. b. *Justicia multiflora* Vahl en. I p. 160. — Variat caule, foliis bracteisque plus minus pubescentibus vel fere glabris, florum umbellis vel in parte caulis inferiore geminatis alterâ brevi alterâ longe pedunculatâ (Dicliptera flabelliflora N. ab E. in h. Hænk), vel omnibus in spicâ terminali longâ dispositis, bracteis vel angustioribus et fere lanceolatis vel paulo latioribus evidētiusque cuneiformibus basi pallidioribus. Corolla 9 lin. longa, purpurea; denique caule ramosissimo umbellisque omnibus veluti proliferis. (v. in h. Benth.. DC, berol., Hook., etc.)

*β. tomentosa*, caule superne bracteisque hirsuto-tomentosis, corollâ pollinari. — Ad Farma (h. Hooker!).

54. D. *SQUARROSA* (Nees ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 161), caule sulcato ad angulos scabro hirsutove, foliis oblongis acuminatis brevipediolatis glabriusculis, capitulis 1-2-floris verticillatim glomeratis, pedunculo communi brevissimo, involueri proprii 5-hexaphylli foliolis lanceolatis acuminatis mucronatis recurvis longe ciliatis dorso glabriusculis, unâ reliquis nec multo majore, reliquarum pluribus apice herbaceis mucrone acuminis rigidulo, corollâ involucro triplo longiore. (?) In Brasiliâ, loco non accuratus adnotato (Schüch! in h. palat. vindob.). in umbrosis prope Vargem prov Minaram, Maio (Riedel! in h. imp. petrop.). Similis D. acuminata, a quâ differt foliis non strigosis, involucro scaberrimo nec longe ciliato, corollâ duplo majore. Ex verticillis inferioribus unus subinde pedunculo sat longo extollitur. Corolla coccinea. (v. in h. vindob. et petrop.)

*β. hirsuta*, foliis longius petiolatis; supra hirsutis subtus (in costis et venis præsertim) hispidulis pubescentibus. — Cum formâ communi (Schüch! l. c.), in locis siccis prope Campos, Julio (Riedel! in h. imp. petrop.). An distincta species?

55. D. *ACUMINATA* (Juss. in ann. du Mus. 9 p. 268), caule obsolete sexangulari pubescenti-scabro grosse lineolato, foliis ovatis oblongis longe petiolatis supra strigoso-hirsutis, capitulis 1-2-floris verticillatim glomeratis, pedunculo communi brevissimo, involueri proprii penta-hexaphylli foliolis lanceolatis acuminatis aristato-mucronatis apice recurvis pubescenti-scaberrimis, duobus exterioribus duplo majoribus inæqualibus, interioribus membranaceis, corollâ involucro vix duplo longiore. (?) In Peruviâ ad Huanaco (Ruiz! in h. reg. berol.). Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 432 (errore typographicò D. frondosa appellata, h. Willd. n. 293). Dianthera acuminata Ruiz et Pav. fl. per. 1 p. 10 t. 16 f. b. Justicia acuminata Vahl en. 1 p. 51. Pubescens apice glandulosa in fl. peruv. l. c. dicta in specimine sicco disparuit et vix unquam in eo adfuisse videtur. Reliqua omnino respondent. Verticilos ex parte pedunculatos in hisce non vidi. Variat:

*α. involucris minoribus*, foliolis exterioribus recurvis, interioribus margine scabris, nec patenti-ciliatis.

*β. involucris majoribus*, foliolis exterioribus rectis, interioribus longe ciliatis, quæ vera D. acuminata Ruiz et P. (v. in h. DC. specim. Dom-beyanum).

*γ. spicata*, floribus in apice caulis spicatis spicâ densâ brevi (1-1½ pollicari), caule præter apicem glabro, foliis obsolete strigosis in costis utrinque hirtulis. — Cordillera de Vera Cruz, in declivibus, Junio-Octobri (Galeotti! n. 928 et ibid. ad Mirador Decembri Linden n. 196! in h. Hooker apud Bentham). An distincta spec.?

### § 3. Pedunculares. Capitulis aliis sessilibus, aliis longe pedunculatis in eodem angulo.

56. D. *HÆNKEANA*, caule sexangulari glabro, foliis ovato-oblongis in acumen obtusum attenuatis basi acutis in costis puberulis, petiolo brevi, summis ramoruni sessilibus minoribus, capitulis 1-2-floris verticillatim glomeratis extra-rameis sessilibus uno utrinque longe pedicellato, bracteis duas exterioribus oblongis obtusis mucronulatis trinervibus æqualibus margine puberulis, interioribus lanceolato-subulatis membranaceis. (?) In Mexico (Hænke!). D. multiflora Nees ab E. in h. Hænke excl. synm. Similis D. pedunculari, sed differt bractearum formâ, etc. Constructio florescentiæ hæc est: oriuntur umbellæ duas axillares, pleræque trifidae, sessiles, quarum exterior capitulum medium inter duo sessilia longo extollit pedunculo, interior contra loco capi-

tuli iutermiedii gignit ramum dichotomum pateutem foliosum simili ratione florentem. ( v. in h. Hooker ).

57. D. *PEDUNCULARIS*, caule sulcato sexangulari, foliis ovatis longiuscule petiolatis obtusiseulis, capitulo 1-2-floris verticillatim glomeratis sessilibus uno binisve utrinque longe pedicellatis, involucri foliolis duobus exterioribus linear-lanceolatis mucronato-acutis trinervibus hirsutulis rectis, altero duplo majore apicem versus paulo latiore, interioribus 4 margine membranaceis, corollæ involucro haud duplo longiore. ♂ In Mexico. Similis D. acuminatis, a qua differt foliolis involucri apice haud attenuatis, et D. *squarroso*, a quâ differt foliolis involucri rectis, ab his et reliquis distinguitur pedunculis ab utroque latere uno duobus uno monoccephalis pollicaribus vel sesquipollicaribus erectis hirsutis, quum reliqua capitula (2-3) sint omnino sessilia. Corolla pallida. Capsula oblonga, basi strigosa. Semina aspera, fusca. ( v. in h. Aschenborn et berol. )

α. Caule involucrisque hirsutis, foliis supra strigoso-hirsutis. — Mexico ( Aschenborn ! pl. exs. n. 449 ), prope los Banos in Mexico ( Ehrenberg ! in h. gen. berol. )

β. Caule et involucris propemodum glabris, foliis supra rarissimis setulis conspersis. — Mexico, prope los Banos de Azote, Octobri ( Ebrenberg ! n. 1141. in h. gen. berol. )

#### § 4. *Microstegia*. — *Bracteis involucratibus parvis calyce vix longioribus*.

58. D. *PARVIBRACTEATA* ( Nces ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 111. Wight h. pr. n. 2014 ), foliis ovatis acuminatis basi acutis supra lineolatis setulis adspersis, pedunculus axillaris subgeminis umbelliferis, radiis simplicibus trifidis, floribus capitatis ternis, involuci diphylli foliolis lanceolatis calyces vix æquantibus. ♂ In terris Circars dictis, ad Rajahmundry Indiæ orientalis ( Wight ! ). Justicia retorta Vahl en. 1 p. 157 et h. ! Dietr. syst. 1 p. 414. Justicia umbellata Wight h. pr. n. 51. Caulis tetragonus angulis obtusis, seu octogonus, lineolatus, glaber, albo-lineatus. Folia 3 poll. ( cum petiolo  $\frac{2}{3}$  poll. ) longa, ad margines nervosque setulis raris exiguis inspersa. Pedunculi nudi, glabri plerumque gemini, quorum exterior vix trifidus radiis monocephalis, pollicaris, interior bipollicaris, quinquefidus, radiis alternis monocephalis trifidisque. Bractea primæ divisionis unguiculares, oblongæ, acuta, petiolatæ, secundæ ( seu umbellulæ ) linear-subulatæ scabré. Capitula parva, seminis Cannabis mole, bi-triflora. Foliola involucralia tot quot flores, oblongo-lanceolata, acuta, calyce breviora. Calyx 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus, glandulæ sessilibus scaber. Bracteolæ duæ, lineares, calyce breviores ad basin calycis. Corolla circiter 4 lin. longa, pallida, tenera, glanduloso-puberula. ( v. in h. Wallich et Vahl. )

#### § 5. *Dactylostegia*. — *Bracteis 4-6 in aliis alio modo basi connatis herbaceis duabus majoribus, subinde ad speciem tantum duabus basi brevi spatio connatis bipartitis laciniis inæqualibus. Antheræ ovatae, sagittatae, loculis æqualibus connectivo latiusculo discretis basi divergentibus. Capitula in spicis subsecundis disposita paniculam trichotomam dichotomam foliosam exhibentia. Bractea sub singulo capitulo parva, subulata.*

59. D. *SPARSIFLORA*, involucri foliolis per paria basi connatis, alternis majoribus spatulatis, foliis ovato-oblongis apice attenuatis glabris. ♂ In Brasiliâ ad montes Passatres ( Pohl ! in h. palat. vindob. n. 1270 et 2270 ). Dactylostegium sparsiflorum N. ab E. in Endl. et Mart. fl. bras. fasc. 7 p. 164 t. 31. Justicia sparsiflora Pohl ! ie. in h. palat. vindob. n. 2270. Caulis erectus, trichotomo-ramosissimus 5-6-angularis, glaber, lineolato-

asperulus. Folia caulinæ cum petiolo 8-10 lin. longo  $3\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, pollice paulo latiora, basi obtusa, supra in costis strigiloso-scabra; ramea folia et ramiulorum ordine suo decrestis et paulo angustiora, sed cuncta basi obtusa. Spicæ  $\frac{1}{2}$ -2 poll. longæ, trifidæ vel bifidæ, glandulæ sessilibus dense inspersæ, inæquales. Involucra alternatim sessilia, glandulosa, inæqualia; lacinia longior alterius  $4\frac{1}{2}$  lin. longa, alterius 3 lin. longa, utraque linearis obtusiuscula; minor lacinia utriusque multo est longior illa brevior et sublata. Corolla pollicaris, pubescens, rosea? Capsula 3 $\frac{1}{2}$  lin. longa, viridis, pubescenti-scabra, ungue parte fertili dimidio breviore, illa ovali valde compressa. ( v. in h. palat. vindob. )

60. D. CONGESTA (Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 237), caule hexagono superius pubescente, foliis oblongis acuminatis basi acutâ in petiolum decurrentibus, pedunculis axillaribus folio brevioribus multifloris in spicam terminalem compositam abeuntibus, involucris spicatis geminatim congestis subbifloris glandulosæ-pubescentibus, foliolis duobus exterioribus majoribus inæqualibus linearibus acutiusculis, 4 interioribus duplo minoribus lanceolatis acutis.  $\mathcal{U}$  In Americâ meridionali (Humboldt! ex h. mexie. in h. Willd.). Kunth synops. 2 p. 34. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 431. Willd. h. n. 291. Folia supra sparsim hispidula, subtus, præsertim in costis pubescentia. Involucra dimidio majora, quam in D. sparsiflorâ (6 lin. longa). ( v. in h. berol. )
61. D. ASSURGENS (Juss. in ann. du mus. 9 p. 269), glabra, caule sexangulari sulcato, foliis ovatis acutis acuminatis involuci hexaphylli foliolis duobus exterioribus lanceolato-linearibus apice attenuatis inæqualibus, 4 interioribus minoribus lanceolato-acuminatis liberis basive genuinatim cohærentibus.  $\mathcal{U}$  In Jamaicâ et in insulâ St. Crucis (Sloane, Brown, Vahl! h. ex h. Banks, Mac Fadyan! in h. Hooker), Trinidad (B. de Schach! in h. Hooker), ad Caracas et circa Missionem Angostura in Llanos de Barcelona, Januario (Moritz! n. 110. in h. gen. berol.). Cartagena de Columbia (Bilberg! in h. gen. berol.). — Dietr. syst. 1 p. 425. Willd. h. n. 297!. Justicia assurgens Linn. am. acad. 5 p. 391. Vahl en. 1 p. 116. Browne jam. p. 110 t. 2 f. 1. Justicia sexangularis h. gen. berol. olim. Spicæ axillares, patentes, solitariæ geminæve. Capitula sœpe gemina, altero solitario duplice pedunculata. ( v. in h. berol., Vahl, Hooker ).
- $\beta.$  confertu, spicis axillaribus brevioribus in terminalem compositam subcorymbosam densam abeuntibus. — In Jamaicâ. Dicliptera multiflora hort. bot. berol.!
62. D. PORTORICENSIS (Spr.! in h. Balbis), caule sexangulari sulcato costis scabris, ramis spicigeris erectis, involuci hexaphylli seabinuscui foliolis duobus exterioribus spathulatis mucronatis, superiorum florum linearibus, 4 interioribus liberis minoribus, foliis ovatis acuminatis utrinque hirsutis, ramorum conformibus at minoribus.  $\mathcal{U}$  Portorico (Bertero! in h. Balbis, et ex hoc in h. DC.) — Roem. et Sch. syst. mant. 1 p. 149. Dietr. syst. 1 p. 425. A. Vahlianâ vix differt, nisi foliis in caule magis confertis amplioribus utrinque hirsutis et basi rotundata in petiolum breviter acutatis, tum involucris brevioribus (2-1 lin. longis, quæ in D. Vahlianâ 3-2 lin. longa). Limites inter species quatuor, hac sub sectione ad auctorum fidem descriptas, vix constare videntur; id vero constat, eas aut omnes in unam esse contrahendas, aut neutram cum alterâ esse conjungendam. ( v. in h. DC. )
63. D. VAHЛИANA, caule sexangulari sulcato costis scabris, foliis ovatis obtuse acuminatis cum mucronulo, summis oblongis acutiusculis obtusiuscula mucronatis hispido-ciliolatis ad costas scabris, ramis spicigeris patentibus, involuci hexaphylli hispido-scabri foliolis duobus exterioribus spathulatis mucronatis superiorum florum linearibus, 4 interioribus minoribus lanceolatis acutis inæqualibus basi liberis.  $\mathcal{U}$  In prov. Sanctâ Martâ (Bert.!), ad vias et

fontes prope Port au Prince insulae Haiti (Jæger! in h. imp. petrop., Poiteau! in h. DC. Ehrenberg! in h. gen. berol.), in Cubâ ad Havanam (Green! n. 25 in h. Hooker), ibid. in rupibus madidis ad ripas rivorum (Otto! in h. gen. berol., Poeppig! in h. Hooker de la Sagra! in h. DC. n. 134 et 214), in Antillis (Plée! in h. mus. paris. et Nees n. 281), insulis Bahamensisibus (Crudy! in h. Schreb.) et in Carolinâ (Michaux). *Justicia Eustachiana* Vahl symb. bot. p. 15. en. 1 p. 144. (excl. syn. J. eustachyanæ Jacq.) et h. Bot. mag. t. 2076. Bot. reg. t. 4309. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 378. (excl. syn. Jacq.). *Justicia ladanooides* Link h. DC.! *Justicia purpurea* Poiteau! in h. DC. n. 413. Michaux! ibid. *Justicia scandens* Mich.! in h. DC. D. assurgens h. Willd.! n. 297 (specim. Isert.), Swartz! in h. DC., Bertero! ex h. Balbis in h. DC. *Justicia sexangularis* Güldenstaedt! in h. Schreb., Poeppig! in h. Hooker, Klotzsch in h. gen. berol. Similis D. assurgenti, quæ involuci foliolis duobus exterioribus subæqualibus et basi linearis latiusculâ sursum plus minus spatulato-cuneatove-dilatatis rotundatis obtusissime cum mucronulo distinguitur. (v. in h. Schreb., Hook., DC., petrop., paris., berol., etc.).

64. *D. MOLLIS*, villoso-pubesceus, caule sulcato, ramis spicigeris corymbosis, involuci hexaphylli foliolis duobus exterioribus cuneiformibus obtusis, interioribus minoribus mucronato-acutis linearis-lanceolatis, foliis ovatis obtuse acuminatis cum mucronulo.  $\mathcal{L}$ ? In Mexico, prov. Vera Cruz ad Zacuapan, Febrero (Linden! n. 1081, Galeotti! n. 930. in h. Hooker), in Cordillera de Oaxaca planicie alta 5-6000 p., Novembri-Aprili (Galeotti! n. 923 in h. Hooker). Pubescentia longiuscula molli totam plantam investiente, involucris majoribus conformibus fere omnibus obtusissimis nec mucronatis paucis tantum obsolete mucronulatis, oppositis, subinde ab altera parte aggregatis ramo accidenti additis, satis distincta est a *D. Vahlianæ*. (v. in h. Hook. apud Benth.).

#### *Species dubiae.*

65. *D. CLAVATA* (Juss. in ann. du Mus. 9 p. 269), foliis ellipticis, paniculis axillaribus subumbellatis, bracteis linearis-oblongis.  $\mathcal{L}$ ? In insulis Societatis (Forster). *Dianthera clavata* Forst. prod. p. 4. *Justicia clavata* Vahl en. 1 p. 146. Rami tetragoni, glabri. Folia pétiolata, utrinque acuta, glabra, margine subundulata. Pedunculi axillares, oppositi, folio fere longiores, apice dilatati. Bracteæ subulatae, minimæ! Flores parvi. Bracteæ, in diagnosi « linearis-oblongæ » — « subulatae, minima » in descriptione exhibentur, quo dubia nostra sane augentur.

- 66.? *D. BAPHICA*, foliis lanceolatis, subcrenatis pubescentibus, floribus congestis axillaribus.  $\mathcal{L}$ ? In Cochinchinâ, spontanea (Loureiro). *Justicia tinctoria* Lour. fl. cochinch. ed. Willd. 1 p. 31. Caulis herbaceus, procumbens, longus, sulcatus. Folia ovato-oblonga, acuminata. Bracteæ conicæ, obtusiusculæ. Corolla rosea, labio utroque reflexo, superiore ovato integerrimo inferiore oblongo obtuso trifido. Capsula bilocularis elastica. Folia viridi colore telas pulchre imbuunt.

#### *Species a genere certo aliena, sed sedis incerta.*

67. *D. BRASILIENSIS* (Spr. neue Entdeck. 2 p. 123. syst. veg. 1 p. 86), caule herbaceo erecto, foliis oblongis integerrimis, spicis axillaribus folio brevioribus, bracteis obovatis coloratis calycem subulatum superantibus.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ (Sprengel ex h. Ottonis). Ramæ teretes, pubescentes, crassitie fili emporeti. Folia opaca basi præsertim attenuata, venosa, 2 poll. longa,  $\frac{3}{4}$  poll. lata. Spicæ pedunculatae, erectæ. Bracteæ spatulatae, nervosæ, virides, basi coloratae. Corolla labio utroque integro obovato. Capsula teres (Spr.). In herbario Ottonis, jam herb. gen. berolinensi inserto, specimen hujus speciei non amplius exstat.

*Species e genere exclusæ.*

- D. BRASILIENSIS Nees et M. == *Rhytiglossa leucophloea*.  
 D. CILIARIS h. Willd. == *Schwabea ciliaris*.  
 D. CILIATA Ruiz et P. == *Beloperone ciliata*.  
 D. CŒRULEA Bl. == *Rungia parviflora*.  
 D. IPOTENSIS Roem. et Sch. == *Rhytiglossa leucophloea*.  
 D. PECTINATA Juss. == *Rungia pectinata*.  
 D. RECURVATA Spr. == *Rhytiglossa leucophloea*.  
 D. REPENS Juss. == *Rungia repens*.  
 D. RETUSA Juss. == *Amphiseopia retusa*.  
 D. SCORPIOIDES Linn. == *Henrya scorpioides*.  
 D. SCORPIOIDES h. Willd. == *Drejera Willdenoviana*.  
 D. SPECIOSA Nees et M. == *Beloperone involucrata*.  
 D. SPECTABILIS Lyall. == *Hypoestes Bojeriana*.  
 D. SPICATA Bojer. == *Adhatoda Bojeriana*.  
 D. SPINOSA Lodd. == *Barleria lupulina*. Lindl.  
 D. TETRANDRA N. ab E. == *Herpetacanthus Schultzia*.  
 D. TRINERVIA Juss. == *Adhatoda trinervia*.  
 D. VERTICILLARIS Roem. et Sch. == *Hypoestes verticillaris*.

CXXXIX. HENRYA (1) Nees ab E. et Benthon in botany of the Sulphur p. 148 t. 49. — Dicliptera spec. Juss. — Justicia spec. Linn.

Flores in capitulo unifloro, bracteis involucralibus duabus altero margine connatis altero liberis et igitur rimâ apiceque bidente dehiscentibus inclusio, dispositi. Calyx quinquepartitus, parvus, æqualis. Corolla bilabiata, labio superiore latiore usque ad medium bifido, inferiore bipartito lacinias spathulatis. Stamina duo; antheræ biloculares, muticæ, loculis parallelis contiguis apice æqualibus basi inæqualibus. Stylus longus, filiformis, apice contortus; stigma compressum, obtusum. Capsula ab inferiore parte depressa, valvularum commissurâ plano-contigua asperma, apicem versus incomplete bilocularis disperma, dissepimento angusto basi cum retinaculo suo uncinato obtuso brevi spatio solubili uncinatum reflexo. Semina plano-convexa, dorso setosa, ventre pubescenti-scabra. — Frutices Americæ meridionalis, ramis elongatis involucrisque glanduloso-pilosis, foliis ovatis ovalibusve petiolatis subhirsutis minus glandulosis, involucris in ramis oppositis cauleque terminali spicatis, oppositis, bracteis parvis suffultis, spicis longis, involucris distantibus, bracteis involucro multo minoribus ovato-subrotundis mucronatis.

1. H. SCORPIOIDES (Nees ab E. et Benth. in bot. of the Sulphur p. 148 t. 49), involucris acutis, caule inferne tereti superne subtetragono.  $\frac{5}{2}$  In insulâ Veraguæ oræ occidentalis Americæ meridionalis (Sinclair !), in insulâ Vera Cruce (Houst. ! ex h. Ammam. in h. imp. petrop.), Mirador in prov. Vera Cruz, Januario (Linden ! n. 190 in h. Hooker et Benth.). Dicliptera scorpioides Juss. ann. du mus. 9 p. 269. Justicia scorpioides Linn. sp. pl. I p. 21. Justicia Banks rel. Houst. ! p. 3 t. 1. Foliorum lamina 2 poll. longa, utrinque acuta, integrerrima,

(1) Amatus Henry, instituti lithographici Academicæ Bonnensis Possessor, Academie Leopoldino-Carolinæ Cœsareæ Naturæ Curiosorum Bibliothecarius, dissertationibus suis de genimaru plantarum structurâ styloque artificiosissimo, scientiâ nostrâ ut qui maxime meruit.

*pilosa*, nitide viridis, costis senis parum prominulis; petiolus pollicaris, pilosoglandulosus. Racemi circiter triplicares, laterales oppositi arcu incurvi. Involucra 4 $\frac{1}{2}$  lin. longa, obconoidea, apice bidentata, pubescenti-glandulosa. Calyx vix lin. 1 longus. Corolla tenera, iufundibuliformis, 3 lin. longa, flava. Stamina limbum 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. longum æquantia, erecta. Stylus longior. Capsula 3 lin. longa, straminea, glabra. Seminum setæ dorsales statu humido strictæ, in sicco corrugatæ laxæ lanam referentes. Constant singulæ e pluribus cellis elongatis conjunctis iu quibus hinc inde fibra spiralis vestigia vidisse puto: cellularia interiores obscuriores sunt, quam reliquæ. In superficie setarum subinde denticuli prominent. (v. in h. Benth., Hook. et petrop.)

2. H. BARCLAYANA (Nees ab E. et Bentham l. c.), involucris obtusis, caule quadriquetro. ȝ Manzanilla Bay (Barclay!). Folia brevipetiolata. Involucra densissime pubescenti-glandulosa, apice obtusa, scil. foliolis conjunctis haud mucronatis sed apice rotundatis. (v. in h. Bentham).

#### CXL. BROCHOSIPHON.

Calyx æqualis, profunde 5-fidus, in capitulo bracteato bivalvi sessilis. Corolla resupinata, bilabiata, labio (post resupinationem) superiore tridentato, inferiore latiore trifido, faucibus ovalibus, tubo angusto sæpe prope basin in circulum recurvo. Stamina duo inclusa; filamenta brevia; antheræ lineares, loculis parallelis. Stigma obtusum. Fructus latet. — Involucra in summo caule ramisque subcapitata, opposita, subsessilia, magna, subæqualia, valvatim incumbentia. Bractæ parvæ, angustæ, recurvæ, setaceo-pectinatæ et mucronatæ. — Herba Novæ Hollandiæ, denuo accuratius examinanda.

B. AUSTRALIS. — ♂ Goalba insulæ in littore sept. Novæ Holl. (h. Hook!). Caulis spithameus, ramosus, erectus, glaber, angulatus. Folia lanceolata, acutiuscula, brevipetiolata, obiter repanda, supra hirsuta, margine basin versus setoso-ciliata; inferiora breviora magisque oblonga. Supremum foliorum jugum, infra flores situm, involucrum refert, cuius folia paulo angustiora magisque ciliata sunt. Flores terminales duo, oppositi. Bractæ sub singulo, sive foliim florale, bracteis propriis plus duplo brevius, anguste lanceolatum, aristato-mucronatum, recurvum, setoso-ciliatum. Accedunt hinc inde folia floralia similia sterilia; inflorescentia igitur in aliis forsitan erit pluriflora. Capitula subsessilia, abortu uniflora. Bractæ involucrales duæ, valvatæ, ovatae, acuminatæ, aristato-mucronatæ, glabrae, setoso-ciliatae, planæ altera 6-7 lin. longa, altera paulo minor. Calyx parvus, scaber, lacinias lanceolato-subulatis. Bracteolæ calyce breviores, linear-lanceolatae. Corolla 7-8 lin. longa, viscido-pubescentia, rosea. (v. in h. Hooker).

CXLI. PERISTROPHE Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 112. Endl. gen. p. 707. Meissn. gen. p. 297 (205). — Justiciæ spec. Vahl, Roxb. Wall.

Calyx æqualis, quinquefidus vel quinquepartitus, in capitulo bracteato-bivalvi sessilis. Corolla resupinata, bilabiata, labiis planis, superiore post conversionem tridentato, inferiore integro vel bidentato. Stamina duo. Antheræ angustæ, biloculares, loculis oblique altero pone alterum positæ; directione parallelâ, denum contortis, muticis. Capsula bivalvis, bilocularis, basi elongata sterilis compressa, commissura valvularum plana, sursum a latere dissepimentali compressa, loculis dispermis. Dissepimentum adnatum, persistens. Semina discoidea. Retinacula uncinata. — Plantæ Indiæ orientalis herbaceæ, floribus purpureis speciosis; nonnullæ saltim tinctoriae. Capitula florum, in involucro bivalvi inclusa, in umbellas axillares et denique terminales, simplices vel compositas disponuntur; denique (in una specie) capitula in typum primitivum dichot-

tomiæ cum intermedio flore soluta et quasi disjecta , in paniculam trichotomam , vel potius dichotomam cum solitariis floribus intermediis abeunt. Caulis plerumque sexangularis, ad nodos carnosus. Flores tubo longo prædicti , purpurei.

### § 1. *Flores capitati.*

† *Bractæ involucrales calycibus multo latiores et longiores , foliis bracteisque ramificationum dissimiles.*

1. P. TINTORIA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 113), foliis ovatis obtusis lineolatis subtus cauleque pubescenti-scabris, umbellis axillaribus terminalibusque quinquefidis, radis compositis decompositisque, involucri diphylli foliolis inæqualibus subcordato-ovatis acutiusculis pubescenti-ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali : ad Rungpur (Hamilt.!), ad Taong dong (Wall.!), in Bengalâ (Leschenault ! in h. DC.), Assam (Griffith ! in h. Hooker), Cochinchinâ Loureiro), Japoniâ (Siebold.). Justicia tinctoria Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. I p. 124. ed. 2. a. 1832. p. 123. Wall. cat. n. 2465. a-d. Justicia Roxburghiana Reem. et Sch. mant. I p. 140. Justicia involucrata Roxb. h. Wall. cat. n. 2465. a. Justicia bibractea Wall. cat. suppl. n. 157. Justicia purpurea Lour. Fl. cochinch. ed. Willd. I p. 31. excl. syn. Linn. Dianthera Japonica Thunb. fl. jap. p. 21. t. 4. Justicia crinita Thunb. in linn. transact. 2 p. 338. Vahl symb. 2 p. 16. en. 1 p. 114. et h. Willd. Folium tinctorum Rumpl. amb. 6 p. 51 t. 22 f. 2. Distincta a reliquo involucri foliolis inæqualibus ovatis, basi sepe subcordatis, acutis. Ramificationis vera dispositio haec est : articuli superiores caulis, ubi florere incipit planta, maxime dilatati, compressi et exinde ramifications flabelliformis. Scil. ad extrellum par nascitur foliorum, dein ramorum, in centro autem caulis continuatio. Circa apicem caulis et ramorum simili ratione fit solutio in formam umbellæ tri-quinquefide. Bractæ ramifications inferiorum ellipticæ, tum spathulate, superiorum lanceolatæ, denique subulatae. Bractæ involucrales 9-7 lin. longæ, 4-5 lin. ad basin latae, purpureas, basi subseptemnerves, sursum penninerves. Capitula 3-5? flora. Bracteolæ geminæ, carinatæ, subulatae. Calycis laciniae lanceolatæ, scabré. Siccata planta nigrescit cum purpureâ tintetur. Variat involuci foliolis modo breviacutis, modo apicem versus magis attenuatis angustioribus, et tum vero magis confertis. Vidi ejusmodi specimen ex Assam (Griffith ! in h. Hooker) ( v. in h. Wallich, berol. et Nees ).

2. P. MONTANA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 113. Wight. h. propr. n. 2017 ), foliis oblongis utrinque attenuatis lineolatis cauleque glabris, umbellis axillaribus terminalibusque quinquefidis, capitulis 3-5-floris, involucri diphylli foliolis æqualibus ovato-ellipticis obtusis mucronulatis glabris.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali umbrosis montium ad Courtallum (Wight.). Justicia purpurea h. Wight. n. 49. Caulis glaber, obiter sexangularis. Folia cum petiolis bipaniculicaribus angustis 6-7 poll. longa, apice obtusiusculo. In nodo incrassato compressoque post folium sequitur ramus, dein pedunculus petiolo brevior, apice nodulosus diphyllus, foliis lanceolatis fere pollicaribus. E nodo oriuntur pedunculi quinque, sed ii alternatim sæpe abortivi cicatricem relinquentes, ita, ut umbella trifradiata appareat hoc ordine: folium, pedunculus, cicatricula, pedunculus, cicatricula, pedunculus, folium. Pedunculi iterum divisi, vel uniflori, pedunculo capituli articulo inserto, duplo longiore. Bractæ involucrales 6-7 lin. longæ, ovato-oblongæ cum brevi mucrone, venoso-reticulatae, aquales. Corolla sesquipaniculicaris, purpurea; tubus gracilis, hirsutus; labium superius oblongum trifidum, lacinias obtusis; inferius (resupinatum) amplissimum ovato-subrotundum, apice bidentatum. Capsula clavata, pubescens, mucronata. ( v. in h. Wight. )

P. silvestris, foliis oblongis acuminatis basi acutis, umbellis terminalibus

singulis ternis 3-5-fidis radiis trifidis, capitulis 2-3-floris, involucri diphyllo foliolis æqualibus oblongis obtusis mucronulatis oalyce multo longioribus. — In Courtallum (Wight !) Travancore ( h. madrasp ! ), Khasiya, Assam (Griffith ! in h. Hooker). *Justicia silvestris* h. madrasp ! Wall. cat. n. 2468. a, b, c. *Justicia rubra* h. Wight ! Wall. cat. n. 2468. b. *Justicia longiflora* h. Heyn ! Wall. cat. n. 2468. c. *Justicia Wynnaadensis* h. Wight ! Wall. cat. n. 2486. c. sub *Justicia lineata*. *Ruellia* ? *moutana* Wall. cat. n. 2391. *Barleria montana* et *Barleria dianthera* h. madr. ! Wall. cat. l. c. A. P. *montanæ* var.  $\alpha$  differt : foliis longissime acuminatis, basi autem minus attenuatis et cuneatis, sed simpliciter acutis et in petiolum longum desinentibus; umbella terminali ( solitaria vel termis lateralibus tum brevioribus ) quinquefidâ, radiis ( tribus mediis saltem ) tricephalisch, vel trifidâ radiis monocephalisch, capitulis plerisque bi- vel unifloris, involucris longioribus et angustioribus, pollicariis oblongis, corollâ majore bipollicari. ( v. in h. Wall., Hook. et Wight. )

3. *P. CHINENSIS*, hirsuta, foliis oblongis utrinque attenuatis subrepando-dentatis, umbellis axillaribus terminalibusque bifidis cum pedunculo inter-medio unifloro, lateralibus bi-trifidis, bracteis ad basin umbellæ duabus lanceolatis umbellâ brevioribus, capitulis subtrifloris, involuci foliolis (bracteis involucralibus duabus) inæqualibus obtusiusculis hirsutis, majore ovali-oblongâ, minore oblongâ, corollâ bracteas vix excedente.  $\mathcal{U}$  In China ( h. Hooker ! ). Propinqua *P. montanæ*, hirsutie et corollâ breviore a reliquis facile distinguitur. ( v. in h. Hooker ).
4. *P. PALLIDA*, foliis ovato-oblongis, apice attenuatis, basi acutiusculis lineolatis subtus cauleque subpubescentibus, umbellis axillaribus terminalibusque trifidis, capitulis subtrifloris, involuci diphyllo foliolis æqualibus ovato-oblongis obtusis subpubescentibus. ( ? ) In insula Javâ ( Junghuhn ! ). A *P. montanæ*, præsertim ejus var.  $\beta$ , parum differt; attamen distinctam puto ob foliorum formam diversam, quæ a basi fere in acumen extenduntur, ipsâ basi subrotundatâ et in petiolum denique breviter acutatâ. Pubescens paginae foliorum inferioris rara et subtilissima. Corollæ ( pallidæ seu albide ) tubus pubescens; limbus longitudine tubi; labium superius ovato-subrotundum integrum, inferius oblongum obtuse tridentatum. Filamenta pilis patentissimis hirsuta. ( v. in h. Junghuhn ).
5. *P. JALAPPÆFOLIA*, foliis ovato-oblongis apice attenuatis, basi acutis lineolatis cauleque glabris, umbellis axillaribus trifidis ramis lateralibus trifidis medio 5-fido, capitulis trifloris, bracteis involucralibus subæqualibus oblongo-lanceolatis obtusiusculis pubescens.  $\mathcal{U}$  In Javâ ( Vahl, ex h. Thouin, Spanoghe ! in h. Hooker ). Peristrophe tinctoria Spanoghe in h. Hooker. *Justicia jalappæfolia* Vahl en. 1 p. 160. A *P. Blumeana* vix aliter differt nisi bracteis involucralibus duplo fere latioribus, a *P. pallidæ* bracteis involucralibus angustioribus. ( v. in h. Hooker ).
6. *P. ALBIFLORA* ( Hasskarl cat. hort. bogor. alt. p. 152 ), caule herbaceo erecto, foliis petiolatis ( altero sœpe abortivo ) oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis inæqualiteribus subintegerrimis subtus pubescentibus, capitulis 3-8-floris fasciculatis terminalibus, involucris diphyllo lineari-lanceolatis æqualibus, corollæ labio superiore tridentato, inferiore rotundato.  $\mathcal{U}$  In montosis insulæ Javæ, Julio ( Blume ). *Justicia albiflora* Bl. bijdr. p. 787. A *P. Blumeana* præcipue differt formâ foliorum et calycis laciniis multo longioribus subulatis ( Blume ).
7. *P. ANGUSTIFOLIA*, foliis lanceolatis utrinque attenuatis in costis scabris, capitulis terminalibus subcorymbosis paucis bi-trifloris, involuci diphyllo foliolis ovato-oblongis inæqualibus ciliatis, capsulâ pubescente. ( ? ) In Javâ ( Zollinger ! pl. jav. n. 1393. in h. DC. ). Caulis erectus, apice

- pubescens. Folia 3 poll. longa, 3 lin. lata. Capitula in apice caulis 3-4 e cymâ abortivâ orta. P. ( Justicia ) salicifoliae Bl. affinem esse existimarem, nisi huic involucra « linearis-lanceolata » esse diceret auctor. ( v. in h. DC. )
8. P. BLUMEANA ( Hasskarl cat. hort. bogor. alt. p. 152 ), foliis inferioribus ovali-oblongis superioribus oblongo-lanceolatis oblongisque subfalcato-attenuatis basi acutis cauleque glabris, capitulis in apice caulis subumbellatis bitrifloris, umbellis bi-tricephalis subumbellatis, involucri foliolis linearilanceolatis acutis inæqualibus capsulâque scabris.  $\mathcal{U}$  In Javâ ( Zollinger ! pl. jav. n. 57. in h. DC. ). Justicia Roxburghiana ? Bl. bijdr. p. 786 ( nec Rœm. et Sch. ). Planta tenera. Capitula fere P. bicalyculatæ, sed folia angustiora. Corolla rosea, labiis obovatis. ( v. in h. Hook. et DC. )
9. P. FRAGILIS ( Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 113. Wall. cat. n. 7184 ), caule scabro, foliis oblongis apice longe attenuatis lineolatis, umbellis axillaribus quinquefidis, pedunculis anticipitibus, bracteis generalibus subulatis, involucralibus æqualibus oblongis venosis calye duplo longioribus.  $\mathcal{U}$  Tavoy ( Wall ! ). Caulis sexangularis, dense lineolatus, ad summitem scaber. Petioli  $\frac{1}{2}$  poll. longi, hirsuti. Folia mollia, tenuera, 4-5 poll. longa, 1- $\frac{1}{2}$  lata, basi acuta, ad costam scabra. Pedunculi  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longi, scabri, apice bifolii foliis oblongis vel lanceolatis; pedunculi proprii flabellati 2-3-5-fidi, valde compressi, ad divisuras bracteolis parvis subulatis dentiformibus. Involucra bi-triflora, puberula, ciliata. Capsula glabra, dimidiâ superiore parte oblonga, a latere compressa, disperma! Differt a P. montanâ involucris multo minoribus ad summum  $4\frac{1}{2}$  lin. longis, nec coloratis. ( v. in h. Wallich. )
- † † Bractæ involucrales calycibus longiores, neque nullo latiores, bracteis ramifications vel dissimiles illisque angustiores, vel consimiles et sub capitulis denique majores.
10. P. SPECIOSA ( Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 113 ), fruticosa, foliis ovatis basi acutis supra lineolatis cauleque obtuse hexagono glabris, pedunculis axillaribus trifidis trichotomis, floribus umbellato-capitatis involucratis, bracteis exterioribus cuneiformi-linearibus obtusis, propriis lanceolatis acutis, dissepiamento adnato.  $\mathfrak{J}$  In interioribus Bengaliæ tractibus, floreusque tempore frigido sumnum est silvarum hoc tempore decus ( Roxburgh, Leschenault ! in h. DC. ), in Nepaliâ Wallich. !, in Sillet ( Wall. ! ), in Himalaya alt. 3-4000' ad Sirmur, Septembri locis umbrosis, tenerima at ampla, nonidum flores ( Edgeworth ! ), prope Murma, alt. 5-6000 p. ( idem ! ). Justicia speciosa Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 123. ed. 2. a. 1832 p. 122. Rœm. et Sch. syst. mant. 1 p. 139. Bot. mag. t. 1722. Wall. cat. n. 2464 a-e. Justicia tinctoria hort. bot. calc. in h. Wallich. Justicia riviniæfolia Vis. cat. h. pat. 1839 et 1842 p. 141. Schlecht. Lin. inn. 14. litt. p. 137. Frutex glaber, obtuse hexagonus, purpureus, nodosus; ramuli teneri et inflorescentiae partes cum bracteis pube tenuissimâ tanquam pruinâ suffusâ. Folia obtusiuscula, basi acuta, obsolete crenulata. Rami florigeri oppositi stricti, patuli, a 6-8 poll. decrescentes, glabri vel sparsim villosuli; inferiores bis terre trifidi, superiores denique simpliciter; supremi plerique gemini, exteriore breviore minusque diviso; omnis autem ramifications tandem absolvitur capitulis binis lateralibus vel uno alterius lateris altero opposito evanescente alteroque minore ramo continuacionem ad latas declinantem claudente. Capitulum singulum constat e binis terminis capitulis subsessilibus, in axilla folii seu bracteæ spatulatæ petiolatae sitis. Haec capitula componuntur e binis capitulis, singulo bracteis binis oppositis cuneiformi-linearibus 6-7 lin. longis obtuse mucronulatis basi margineque membranaceis stipato, altero praecoxiore unifloro bibracteolato, altero trifloro magis minusve completo, etiam bibracteolato; bracteolæ istæ quatuor conformes, linearis-lanceolatæ, acuta, ciliolata, 4 lin. longæ, quasi involu-

crum iuterius struunt; in altero autem capitulo bracteolarum adhuc minorum sel consimilium tria paria accidunt. Corolla pollicaris, purpurea. Capsula 8 lin. longa, pubescens, acuta. (v. c. et sicc. spont. in h. Wallich, Wight, Edgeworth, Hooker, berol. etc.)

11. *P. ACUMINATA* (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 113), foliis oblongo-lanceolatis longissime acuminatis lineolatis exasparatis ad nervos scabris, pedunculis axillaribus subgeminis umbellatis, floribus capitatis subternis, involuci diphylli foliolis lanceolatis acuminatis, calycibus scaberimis.  $\mathcal{L}$  In Tavoy, Septembri (Wall.!). Caulis herbaceus, 6-angularis, glaber. trichotomus. Folia 5 poll. longa, inferiora  $1\frac{1}{2}$ , superiora 1 poll. lata. Pedunculi angulati, folii longitudine; pedicelli 2-4 lin. longi, stricti, medius longior. Bractae duas subulatae parva ad umbellulae articulum. Involucrum bivalve, calycibus longius, foliolis carinatis scabris infero paulo breviore. Corolla  $\frac{2}{3}$  poll. longa, purpurea, pubescens; tubus gracilis, incurvus; labia oblonga, aqualia, plana. Post fecundationem bractae duas involucrales in aliis floribus increscent ad semipollarem longitudinem suntque oblongo-lanceolatae apice attenuatae acutiusculae herbaceae, tum planta, praesertim quum plures flores non impregnati ceciderint, multoque magis etiam, quum inferiores plerique ramuli plantae florent, per se breviores, adhuc in statu quietis restent, alienum adspicetum præbet. Ejusmodi est var. nostra  $\beta$ . (v. in h. Wallich.)

$\beta$ . Rami florentibus brevioribus, bracteis capitulorum superiorum cum fructu auctis oblongo-lanceolatis duplo majoribus. — In montibus prov. Sillet (Wall.!) *Justicia acuminata* Wall. cat. n. 2425.

12. *P. UNDULATA*, foliis lanceolato-undulatis repando-dentatis, umbellis terminalibus simplicibus, trifidisque.  $\mathcal{L}$  In Malabarâ (Koenig! in h. Vahl.). *Justicia undulata* Vahl. symb. 2 p. 8. en. 1. p. 145. Dietr. syst. 1 p. 395 (excl. syn. *Justicia Javanica* Lam. et *Dianthera hyssopifolia* Burm.). Simillima *P. acuminata* et ejus fortassis var., differt foliis (ramorum) minoribus, multo minus acuminatis evidenter repando-dentatulis et habitu speciminis, a Vahlio descripti. Est pars trunci ramis geminis elongatis fastigiatis simplicibus bi-trifidise, singulis cruribus umbellâ 3-5-fida terminatis, cui foliorum par. caulinis similius at minorum subjectum est. Capitulorum, involucrorum etc. structura eadem omnino ac *P. acuminata*. (v. in h. Vahl.)

13. *P. LANCEOLARIA* (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 114), foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis lineolatis sebriusculis, paniculâ terminali trichotomâ viscido-hirtâ, floribus capitato-ternis, involuci foliolis ternis lanceolatis acuminatis viscido-hirtis.  $\mathfrak{Z}$  In montibus prov. Sillet (Wall.!). *Justicia lanceolaria* Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wallich 1 p. 122. ed. 2. a. 1832. 1 p. 121. Rœm. et Sch. syst. mant. 1 p. 139. Wall. cat. n. 2463. a, b. Caulis lignosus, obsolete tetragonous, griseus, scaber, lineæ et sesquilineæ spatio supra genicula annulatim contractus, ideoque quasi articulo brevi intercalari instructus. Folia 3-4 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$  poll. lata, subtus lævia, ad costas venasque geminatim approximatæ scabriuscula. Bractæ divisionum due oppositæ, lineares. Flores ramulos coronantes 2-3, subsessiles. Bractea sub singulo flore una, et binæ ad pedicelli exigui basin, 6-8 lin. longæ linear-lanceolatæ, hirtæ, rigidæ, queæ in ramo bifloro, altero flore saepè abortiente, calycem exteriorum magnum sextupitum mentiuntur. Calyx bracteis brevior. Corolla pollicaris-sesquipollicaris, pubescens, rosea. Capsula semipollicaris, glanduloso-exasperata, in superiore parte tetrasperma. (v. in h. Wall., Hook. et berol. )

14. *P. BICALYCULATA* (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 113.), caule hexagono hirto-hirsutove, foliis ovatis acuminatis lineolatis glabris puberulive, pe-

dunculis axillaribus bi-trifidis ramis dichotomis, capitulis unifloris cum rudimento, involucro communi monophyllo linearis capitulo duplo longiore, proprio pentaphyllo basi subconnato, calyce parvo membranaceo.  $\textcircled{Y}$  Communis in ruderatis, ad margines viarum et sepes Indiæ orientalis, floret tempore pluvio frigidoque (Roxb., Wight! h. n. 2018), in cultis Himalayæ et montium Sivalensem frequens, ad Salarumpur, Augusto (lady Dalhousie! in h. Hooker), Patna, Pirygur Hamilt.! Wall. cat. n. 2457 b.), in Ghazepur (Wall, l. c.), in Promontoribus paulo supra Pagha Mew, Decembri, et Segain, Novembri (Wall!), in agris siliceo-saxosis ad Metapaliund Augusto (Schmidt!), in Arabiâ Felici, Hais (Botta! in h. mus. paris. et Nees n. 219), Nubiâ (Arnaud! h. mus. paris. et Nees n. 50), Abyssinâ (Schimper it. abyss. in h. un. itin. n. 694). *Justicia bicalyculata* Vahl, symb. p. 13 en. 1 p. 113 et h. Willd sp. pl. ed. 2, 1 p. 410 et h. n. 304. Rœm. et Sch. syst. I p. 143, mant. I p. 130. Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. I p. 127, ed. 2 a. 1832, p. 126. Blume bijdr. p. 783. Wall. cat. n. 2457, a-g. *Justicia ligulata* Lam. ill. gen. t. 12, f. 2, enc. meth. I p. 625. Cav. icon. I p. 52, t. 71, *Justicia Malabarica* Ait. hort. kew. 1 p. 27. *Dianthera Malabarica* Linn. suppl. n. 85, Klein! in h. gen. berol. fol. 2. *Dianthera bicalyculata* Retz. act. holm. a. 1775, p. 297, t. 9, obs. bot. 1 p. 10. *Dianthera rugosa* Perrottet! in h. DC. *Dianthera paniculata* Forsk. deser. I p. 9? Quæ bractæ « exteriore semipollicares oblongæ » dicuntur in Linn. sp. pl. l. c., has bracteas esse divisionum inflorescentiæ intelligas. Capituli involucrum commune ex uno folio constat, 5 lin. longo, linearis, erecto, mucronato-acuto; foliola 4-5 involueri proprii duplo breviora, linearis-lanceolata, aristato-acuminata, membranacea-marginata, rigida, binos flores produnt, quorum alter abortu fere semper evanescit. Calyx hoc involucro brevior, albido-membranaceus, ultra medium quinquefidus, vel lusu quodam quadrifidus. Corolla 5 lin. longa, angusta, rosea, pubescens; labium superius ovatum, obtuse-bidentatum; inferius ellipticum, tridentatum, dentibus parvis obtusis conniventibus. Capsula pubescens (v. in h. Wall. Nees, DC. berol., Hook., etc., etc.).

2. *depauperata*; pedunculis axillaribus bi-trifloris, foliis ovatis.— Ad Madras (Wight! Wallich l. c.), in Javæ graminosis prov. Tjanjor (Blume), in rupibus vallis Ferihé Arabiâ felicis, Februario (Schimper!), in saxosis monticulorum vallis Bucharæ et Fatme, Martio (Fischer! in h. gen. monac. et Hooker), insulis prom. viridis (Jos. Hooker! in h. Bentham), Senegambiâ, (Leprieur! in h. mus. paris. et Nees. n. 25), h. Hooker! Geoffr! Sparrman! Perrottet! in h. DC., Sennar (Acerbi! in h. DC.). *Justicia bicalyculata* h. Wight! Wall. cat. n. 2457, d. h. æg. arab. un. itin. n. 759, h. Willd. n. 304 (specimen dextrum.) (v. in h. DC., Wall., Wight, Hook., Benth., etc.).
15. P. *COMMUTATA*, fruticosa, foliis lanceolatis, pedunculis axillaribus terminibusque 3-6-fidis, lateralibus saepe 3-fidis, divisionibus extremis terminatis, capitulo parvo, bracteis 2-lineariibus inæqualibus, capsula clavata.  $\textcircled{Z}$  In Moluccis (Roxb.). *Justicia bivalvis* Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. p. 125, ed. 2 a. 1835, p. 124 nec. Linn. et Willd.
16. P. *KOTSCHYANA*, caule quadrangulari angulis scabris, foliis (superioribus) oblongo-lanceolatis acutis lineolatis margine nervisque scabris, pedunculis axillaribus bi-trifidis ramis bifidis, capitulis unifloris cum rudimento, involucro communi monophyllo lanceolato subulato capitulum æquante, proprio pentaphyllo basi subconnato, calyce involucrum subæquante.  $\textcircled{Y}$  Ad montem Cordofanum Arash-Cool inter saxa et in umbrâ Mimosarum, Octobri (Kotschy!), in valibus districtus Ilaramat prope Geraz Abyssinæ, Decembri (Schimper!). P. bicalyculata Hochst. in Kotsch. it. nub. n. 161. P. Schimperiana Hochst. in Schimp. it. abyss. un. itin. 2, n. 1095. Differt a P. bicalyculata caule ad angulos setulis subadpressis scabro, foliis angustioribus, involucro communi involueri proprii foliolis conformi apice subulato, nec longiore linearique

apice saepe paulo latiore, denique et calyce longiore corollæque (roseæ) paulo majore (v. in h. un. itin., Nees, Hook., et berol.).

17. P. CAULOPSILA, caule hexagono foliisque ovatis ovatoe oblongis acutis glabris pedunculis axillaribus subbifloris incurvis, capitulis 3-4-floris, involucro communi diphylo capitulum haud superante cum bracteis florum lanceolatis subulato-acuminatis involucrum hexaphyllum mentiente, calyce bracteas sequante.  $\mathcal{L}$  In promont. Bonæ Spei (Drége!, Krebs! in h. gen. berol. et DC. Burchell! cat. geogr. pl. Afr. extratr. n. 3263, in h. DC.), Bouie ad flumen Zondagsrivier in dumetis (h. Hooker!). Justicia caulopsila E. Meyer ind. pl. Drège. Justicia acinoides hort. kew. h. Hooker! Differt imprimis a P. cernuâ glabritie. An var.? (v. in h. Drège., Nees, Hooker).
18. P. CERNUA. Nees ab E. in Schlechtend. Linn. 15 p. 374), caule hexagono hirto, foliis ovatis acutis hirsutis, pedunculis axillaribus trifidis, capitulis tri-quadrifloris recurvis, involucro communi diphylo capitulum haud superante cum bracteolis florum lanceolatis subulato-acuminatis involucrum 4-6-phyllo mentiente, calyce bracteolis sequante.  $\mathcal{L}$  (?) In Promont. Bon. Spei inter frutices in campis ad flumen Zwartkopsrivier (prov. Uitenhage i oam Ilytiglossa ciliata, Octobri (Ecklon!). Justicia capensis, Eckl. pl. cap. n. 556 (ex parte). Flôres incarnati? Capitula oblonga. Bractæ imbricatae lanceolatae, acuminato - subulatae seabrido - puberulæ; interiores minores, quarum una communis esse videtur totius capituli, reliquæ axis abortivæ cum flore binisque propriis. Abortivibus autem nonnullis e floribus inferioribus horum bracteæ bracteolæque involucrum indeterminate polyphyllum singunt, flores 2-3 undique cingens. Corolla 6-8-lin. longa, pubescens. Antherarum loculi haud contorti videbantur. Capsula ad medium usque compressa et sterilis, superne tasperma, tenuioris texturæ ac in reliquis, immatura scilicet, neque satis perfecta. Antheris peractâ anthesi haud tortis a genere recedit (v. in h. Ecklon, Nees, berol., Hook., etc.).
19. P. CUMINGIANA, caule subhexagono laxe hispidulo glabrescente, foliis ovato-oblongis in acumen obtusiusculum attenuatis supra laxe strigoso-hirsutis basi obtusis, pedunculis axillaribus trifidis, capitulis bifloris recurvis, involucro communi diphylo capitulum haud superante cum bracteolis subulatis paulo brevioribus involucrum 6-phyllo mentiente puberulo, calyce bracteolas sequante.  $\mathcal{L}$  In Philippinis (Cuming! n. IO15, in h. Benth. berol.! Hooker! etc.). Differt a P. cernua foliis angustioribus apicem versus multo magis attenuatis, pedunculis longioribus magis divisis, involucro minore (2-lin. longo) foliolis angustioribus linearis-subulatis acutis nec adeo acuminatis pubescenti-subincanis. Antherarum loculi contigui in unum confluentes. Capsula bispida (v. in h. berol., Benth., Hook., etc.).

## § 2. Flores dichotomo-paniculati.

20. P. PUBIGERA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 114), frutieosa, pubescens, foliis rhomboe-oblongis repandis, paniculis axillaribus oppositis terminaliæ dichotomis, bracteis parvis subulatis, corollæ labio superiore fornicate.  $\mathcal{A}$  In Indiâ orientali, in Bhuddrinath, Kamroop (Wallich). Justicia pubigera Wall. cat. n. 2490. Rami subteretes, sexstriati, pubescenti-hirtuli. Folia 5 poll. longa, 2 poll. lata, lateribus inæqualibus, basi cuneatim in petiolum angustum  $\frac{1}{2}$  poll. longum desinentia, in acumen obtusiusculum producta, inæqualiter repanda, utrinque hirtulo-pubescentia. Pedunculi axillares, in paniculam terminalem adscendentæ, æquales, bipollicares eirciter, bis-terte dichotomo-cymosi cum flore in diehotomiâ pedunculato-ebraeteato, hirtuli. Bracteæ primariæ c foliis sensim decrescentibus, summis vix semi-pollicariibus, oblongo-lanceolatis petiolatis enatae; ramorum omnium divisionum minimæ, subulatae, pubescentes. Pedicelli vix lineam, calyces tres fere lin. longi, pubescentes, subviscidi; in pedicellis lateralibus terminantibus bracteolæ duæ exiguae subbu-

latae ad basin. Corolla pollicaris forsitan, pubescens, atropurpurea. Capsula  $\frac{1}{4}$  poll. longa, pubescens. Hac in specie inflorescentia capitellata generis penitus in dichotomiam dissolvitur. (v. in h. Wallich.).

*Species dubia.*

21. P. DALORA, caule erecto lavi articulis inflatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis subcrenatis nitidis rugosis, petiolo folio suo  $\frac{2}{3}$  breviore, floribus axillaribus, pedunculo bifido, involucro communi ad pedunculi apicem diphylo foliolis inaequalibus, altero grandiusculo altero exiguo subulato, bracteis propriis diphyllis foliolis ovatis inaequalibus quinquefloris, calycis 5-partiti basi squamulâ suffulti lacinias acuminatis, corollâ bilabiata amplâ, tubo filiformi tetragono, labiis praesertim superiore recurvis, isto tridentato, inferiore truncato, staminibus longe exsertis, antheris basi brevicaudatis, stigmate bilamellato crasso.  $\mathcal{U}$  In Philippinis (Blanco). Justicia Dalaora Blanco fl. de Philipp. p. 14. Herba bipedalis. Flores purpurei, subobscuri. Folia late viridia, 5 poll. longa. Folia, aquâ cocta, colore rosarum impuro vestimenta tingunt. Nomen apud indigenos Dalaora. (Blanco.) Vix differre puto a P. tinctoria.

*Species e genere exclusæ.*

P. CILIATA h. Royl. = Rhaphidospora ciliata.

P. DICHOTOMA Hassk. = Rhaphidospora dichotoma.

P. MACULATA Hochst. = Dieliptera maculata.

P. OBLONGA Nees. = Rhinacanthus oblongus.

CXLII. RHAPHIDOSPORA Nees ab E. in Wall. pl. As, rar. 3 p. 115. Endl. gen. p. 707 Meissn. gen. p. 297 (205).

Calyx parvus, quinquefidus. Corolla plerumque resupinata, tubo recurvo, labio superiore (jam infero) concavo, supero latiore trifido. Stamina duo, exserta; antherarum loculi unus supra alterum positi, superior brevior, inferior basi calcaratus. Capsula basi compressa asperma angustior, apice tetrasperma; dissepsitum completum. Semina retinaculis uncinatis sustensa, discoidea, echinato-hispida. — Herbea Indiae orientalis, tam continentis quam insularum (Philipp., Java etc.), Abyssinia insularumque Mauritii et Madagascar, laxæ, plus minus diffusæ, foliis latiusculis, inflorescentiâ expansâ. Paniculæ axillares trichotoma, quandoque in terminalem abeuntes. Flores capitato-terni, ob abortientes flores laterales plerumque solitarii, ad speciem octo-novem bracteis cincti, nempe duabus aut tribus paulo minoribus, et geminis bracteolis floris singuli, quarum nonnullæ sâpe obliterantur; bracteæ et bracteolæ exiguae, setaceæ. Corolla parva aut mediocris.

1. R. CORDATA, glaberrima, pedunculis axillaribus trifloris, foliis oblongis cordatis amplexicaulibus.  $\mathcal{U}$  Ad latus montium secus flumen Tacaze infra Selassaqueum Abyssiniæ, Septembri (Schimperl). Gendarussa cordata Hochst. in Schimper it. abyss. 2, n. 1250. Leptostachya cordata Nees ab E. supra p. 378 n. 7. Folia 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, obtusa, brevissime petiolata. Pedunculus longitudine folii, glaberrimus, apice triflorus. Flores brevipedicellati, cernui. Calyx glaber, lacinias margine membranaceo-albis. Corolla 6 lin. longa, tubo inter stamina intus hirsuto, capsula 9 lin. longa (immatura) (v. in h. un. itin. Nees, Hooker, etc.).

2. R. GLABRA (Nees ab. E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 115, Wight h. propr. n. 2019), pedunculis axillaribus multifloris, foliis ovatis apice attenuatis glabris.  $\odot$  Inter frutices, solo sicco et sterilis, ore Coromandelianæ, floret tem-

pore pluvio frigido (Roxb.), in Chellunbrun (Wight!), in insulâ Mauritii (Aub. du Pet. Thouars! in h. Willd.). *Justicia glabra* Kœnig, Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1 p. 132. Rœm. et Sch. mant. 1 p. 144. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 411. Wall. cat. n. 2453. a-d. *Justicia Mauritiana* h. Willd. n. 340! (specim. paniculis conicis folio brevioribus). *Justicia cymosa*, unbellata et dichotoma h. madr.! Wall. cat. n. 2455. b. h. Hooker! *Justicia glabrata* h. Rottl.! Wall. cat. n. 2455 c. *Justicia corymbosa* h. Willd. n. 334 fol. 1 (spec. Klein.) Folia in acumen longum sæpe obtusum subinde acutum producta, quandoque ovato-subrotunda. Petioli puberuli. Paniculae nunc glaberrimæ, inferiores folio suo breviores, superiores folium æquantes, a medio fere trifidæ, ramis bis tercè bifidis, inter ramifications magis minusve glauduloso-scabre. Ramuli sæpe valde divergentes. Sub singulo ramo paniculæ bracteola exigua setacea patula; similes duæ, minores, alternae, patulæ ad basin calycis. Pedicelli vix lineam longi. Calyx parvus, subcampanulatus, lacinias lanceolato-acuminatis. Corolla 3 lin. longa, roseo-luteo-viridique varia, resupinata; tubus brevis, subcylindricus; labium superius (jam inferius) ovatum concavum bifidum; inferioris latum sursum conversum trifidum, lacinias oblongis obtusis. Capsula pubescens, mucronata. (v. in h. Wall., Willd., berol., Hook., etc.).

- β. Paniculis dense glandulosis paulo rigidioribus. — *Rhaphidospora glabra* Wight! h. propri. n. 2019. *Justicia glabra* Wall. cat. n. 2455 c. *Justicia glabrata* Nees ab E. h. ad exempl. Heyneanum! *Justicia Careyana* hort. bot. calc. Wall. cat. n. 2456 b. c. ex hort. bot. calc. *Justicia Careyana* h. Hamilt.! ex hort. bot. calc. (Wall. l. c. n. 2456 c.). *Justicia corymbosa* h. Willd. n. 334, fol. 2! (spec. Heyn.). *Justicia umbellata* Heyn. in h. Willd., (v. in h. Willd., Wight, Nees.).
3. R. ABYSSINICA, pedunculis axillaris multifloris cauleque juvenili pubescentibus glandulosisque, foliis ovatis obtuse acuminate ad costas puberulis.  $\mathcal{U}$  In arborum umbrâ vallis Tacaze Abyssiniae, Decembri (Schimper!). *Gendarussa dichotoma* Hochst.! in Schimper. it. abyss. n. 903. *Persimilis* R. glabrae, nec diversa fere nisi pube caulis juvenilis et panicularum patente longiuscula immixta pubescentiâ multo breviore capitata. Semina in nostris alba, qne R. glabrae rufa. An varietas? (v. in h. un. itin. et Nees.).
4. R. DICHOTOMA, caule inferne procumbente radicante, ramis dichotomis, foliis longe petiolatis ovato-oblongis acuminatis basi acutiusculis subrepandis utrinque puberulis, ramis axillaris bifidis in paniculam terminalem glandulosopilosiusculam abeuntibus, floribus fasciculatis secundis, corollæ labio superiore emarginato, inferiore trilobo.  $\mathcal{U}$  In insulae Javæ umbrosis silvaticis (Blume, Zollinger pl. jav. n. 528! Lobb! in h. Hook.), in Philippinis (Cuming! in h. gen. berol. n. 548). *Justicia dichotoma* Blum. bijdr. p. 783. P. dichotoma Hassk. cat. hort. bog. alt. p. 152. *Leptostachya dichotoma* supra p. 379. (v. in h. Junghun., DC., Hook. et berol.).
5. R. CILIATA, pedunculis axillaris trifloris dichotomis, foliis ovali-oblongis glanduloso-pubescentibus.  $\mathcal{U}$  In Indiâ orientali. Caulis ad genicula tumidus, in parte inferiore sæpe glaber aut glabriusculus, subsimplex. Folia 3½-4 poll. (cum petiolo ¼-1 pollicari) longa, 1 ½ poll. lata, ovali-oblonga, acuminata, basi acuta, subcrenata. Pedunculi oppositi, graciles, pubescentes, in var.  $\alpha$  folio suo duplo triplo breviores, triflori, flore intermedio brevissime pedicellato, lateralibus longioribus apice bracteatis cum flore intermedio sæpe abortiente. Bracteæ subulate, calyce duplo breviores, pubescentes et glandulosæ. Calyx pubescens immixta glandulis, lacinias subnatis. Corolla 6 lin. longa, pubescens, purpurea. Ludit foliis magis minusve pubescentibus.
- α. Pedunculis folio brevioribus trifloris. — In umbrosis Himalayæ alt. 5-6000 p. prope Mussun, Junio (Edgeworth! n. 253. P. ciliata h. Royle! (v. in h. Edgeworth, et Royle).
- β. Pedunculis folio longioribus dichotomis plurifloris, in apice caulis pani-

culam construentibus. — In vallis Vishnu Gangetis locis apriis, Octobri (Edgeworth! n. 255. h. DC. Hügel in h. Mart. Pedunculi longius in crescunt, bis terve bifidi cum flore intermedio, in extremis saepe solo obvio; tum folia superiora angustiora fiunt et minora, quo caulis summitas in paniculam foliacem transformatur. ( v. in h. Royl. et Mart. ).

6. R. *LEPTANTHA*, hirsuta, caule ramoso, paniculis terminalibus gracillimis panicifloris pubescentibus laxis, foliis ovatis utrinque acutis longiuscule petiolatis.  $\mathcal{L}$  Madagascar (Lyall! n. 252 in h. Hooker.). Caulis flexuosus. Rami dense foliosi. Folia unguicularia. Hirsuties densa, rufescens, mollis. ( v. in h. Hooker.)
- 7.? R. *TENELLA*, caule herbaceo patentí-ramoso, floribus terminalibus paniculatis ramis gracilibus, foliis ovatis obtuse acuminatis glabris in costis scabris, inferioribus in petiolum longiusculum acute desinentibus, summis sessilibus, antheris muticis?  $\mathcal{L}$  In Javâ (Zollinger! pl. jav. n. 2210). Flores flavi? Labium inferius in medio hirsutum. (v. in h. Zollinger.).

CXLIII. HYPOESTES R. Br. (ex Soland. ) prodr. 1 p. 474. opp. ed. N. ab. E. 3. 1 p. 330. Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 114. et in Lindl. bot. ed. 2 p. 475. Endl. gen. p. 707. Meisn. gen. p. 297 (205). — Justiciae spec. Linn. Vahl.

Calyx quinquefidus vel quinquepartitus, in quibusdam coalescentibus lacinias diphyllos, rarius quadripartitus (in H. gracili), æqualis, in capitulo subunifloro involucro tetraphyllo foliolis liberis vel basi coalitis inclusus. Corolla bilabiata, labio inferiore profunde trifido. Stamina duo. Antheræ uniloculares, ante evolutionem cohærentes; loculi in connectivo angusto laterales. Stigma bifidum. Capsula ab inferiore parte compressa valvularum commissura plano-contigua asperna, apicem versus bilocularis tetrasperma. Dissepimentum adnatum, completum. Semina retinaculis suffulta, ovato-subrotunda, biconvexo-compressa, tuberculata. Retinacula subulata. — Herbae, frutices vel arbusculæ, Indianam orientalem, Asiam minorem, Africam tropicam et extratropicam australiorem, tum et Novam Hollandiam incolentia, maximâ autem abundantia in insulâ Madagascar provenientia, pleraque floribus multis speciosis purpureis roseisve superbientia, foliis integerrinis vel crenato-dentatis. Inflorescentia Diclipteræ est, ad minorem numerum partium capitulorum eamque ob causam magis regularem et constantem reducta. Involuci foliola duo exteriora, eaque majora et inter se saepe inæqualia, bracteæ steriles sunt; duo interiora, distantia  $\frac{1}{2}$  cum præcedentibus posita, basi rhacheos communis brevi callo inserta rudimentum saepe gerunt flosculi; in vertice rhacheos aliquantum sublatto flos mediis, pedicello brevissimo insertus, bracteolarum bases saltem formâ lineæ transversalis prominulæ, involuci majoris foliolis oppositæ, ostendit. Si flosculus unus vel alter, medio flori ad latus positus, interiit, locus eius bracteolis duabus angustis membranaceis laciniarum calycis similitudine indicatur.

### § 1. Involucro tereti.

#### A. Capitula nuda vel parvibracteata, axillaria solitaria, vel spicata.

1. H. *SERPENS* (R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 474.), caule repente, foliis spatulato-ovalibus oblongisve (vix unguicularibus) obtusis glabris, pedunculis axillariis brevibus monocephalidis inferioribus alternis, involuci uniflori scabri

laciiniis ad medium usque connatis alternis linear-i-oblongis latioribus obtusisculis lanceolatisque acutis paulo brevioribus, superiore paulo longiore, calycis quinquefidi laciiniis ovato-lanceolatis acutis involucro duplo brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Mauritio (Vahl ! h. DC.! et h. Willd. n. 303!) Justicia serpens Vahl symb. 2 p. 2. en. 1 p. 112. et h.! fol. 1 et 3 (specim. Commes.). Ruellia? h. Schmiedel ! in h. Scrb. Accedit ad typum H. saxicolæ, sed multo minor, habitu Peplidis. Capsula  $3\frac{1}{2}$  lin. longa, a medio tetrasperma, pallida. (v. in h. Schrb., Willd., DC., etc.)

2. *H. ALSINE*, caule repente adscendente, foliis ovatis obtusis glabris, floribus axillaribus oppositis sessilibus, involuci uniflori laciiniis ad medium usque connatis pubescenti-ciliatis alternis linear-i-oblongis latioribus acutisculis lanceolatisque acutis paulo brevioribus, calycis quinquefidi laciiniis ovato-lanceolatis acutis involucro multo brevioribus.  $\mathcal{L}$  In insulâ Mauritiî (h. DC.! ex h. mus. paris. Differit ab H. serpente staturâ majore, foliis latioribus ovatis ovalibus, caule basi tantum repente. (v. in h. DC.)

3. *H. DESCENDENS*, tota pilis patentibus hirsuta, caule repente, foliis ovalioblongis brevipetiolatis, floribus axillaribus oppositis sessilibus, involuci uniflori hirsuti laciiniis ad medium usque connatis pubescenti-ciliatis alternis linear-i-oblongis latioribus acutisculis lanceolatisque acutis paulo brevioribus, calyce involucro multo breviore.  $\mathcal{L}$  In Madagascar, locis inundatis prœv. Emirinæ et ad viarum publicarum margines circa urbem Tananarivou (Bojer ! in h. DC. et in h. gen. monac.). An præcedentis var.? (v. in h. monac.)

4. *H. ELEGANS*, foliis ovatis apice attenuatis acuminis obtuso subtruncatis petiolisque pubescentibus, spicis infra apicem axillaribus brevibus albo-tomentosis, involucris bifloris hexaphyllis, foliolis linear-i-oblongis canaliculatis, duobus exterioribus longioribus basi coadunatis apice planis obtusis longe barbatis, 4 interioribus liberis calyce longioribus obtusisculis barbulatis.  $\mathfrak{z}$  In arenosis maritimis insulæ Madagascar, ad Vohemar (Richard ! in h. mus. paris. et Nees, n. 60). Caulis 4-suleatus, novellus subtilissime griseo-tomentosus. Folia cum petiolo 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longo 4-4 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. lata. Spica 5-6 lin. longæ, involucris 6 oppositis in planum patentibus. Involucra cylindrica tenuissime, sed dense albido-tomentosa, barba apicis in singulo foliolo longa patula. Bractea parva sub singulo involucro. Corolla videtur rubra. (v. in h. paris. et prop.)

5. *H. THOMSONIANA*, foliis ovalibus utrinque acutis glabris nitidis, spicis infra apicem axillaribus brevibus cauleque griseo-tomentosis, involucris imbricatis bifloris hexaphyllis, foliolis exterioribus longioribus linear-i-oblongis canaliculatis apice planis obtusis patent-i-hirsutis, interioribus liberis.  $\mathfrak{z}$  In Madagascar (Thomson ! n. 186 in h. DC.). Similis *H. eleganti* sed diversa involucris sibi incumbentibus, apicem versus lobisque eorum patulis hirsutissimis. (v. in h. DC.)

6. *H. CERNUA*, foliis oblongis utrinque attenuatis ramisque glabris, pedunculis axillaribus oppositis solitariis geminis 1-3-floris secundis in apice ramorum magis confertis, involucris cylindricis albo-tomentosis apicem versus pubescenti-hirtis ore conniventibus cernuis, laciiniis æqualibus rigidulis, exterioribus fere ad apicem usque coadunatis interioribus liberis, omnibus obtusisculis.  $\mathfrak{z}$  In Madagascar. ad sinum Baie de Rigny et Diego Suarez (Richard et Feuillé ! in h. mus. paris. et Nees, n. 59). Affinis *H. eleganti*, sed involucris clausis nec bilobis secundis et cernuis bene distincta. Ramuli teneri, subtomentosi. (v. in h. mus. paris. et Nees).

7. *H. RICHARDI*, fruticosa, glabra, caule erecto, foliis oblongis in acumen obtusum attenuatis basi acutis, capitulis spicatis, spicis terminalibus subternatis secundis cauleque apice glanduloso-hirtis, bracteis lanceolatis adpressis alternis sterilibus, involucro bracteis duplo longiore ad basin quadripartito laciiniis

æqualibus lanceolatis acutiusculis rigidis, calycis lacinias lanceolato-subulatis. ♂ In nemoribus insulae Madagascar, circa Vohemar (Richard! in h. mus. paris., n. 61). Capsula involucro paulo longior, pubescens. (v. in h. paris.)

8. *H. LASIOCLADUS*, caule trichotomo, ramis oppositis patentissimis densissime albo-hirtis, adulto glabrescente, foliis (ramorum) oblongo-ovalibus obtusiusculis brevissime petiolatis pubescentibus, involucris in ramis aphyllis spiciformibus oppositis sessilibus distantibus bifloris hexaphyllis foliolis 2 exterioribus longioribus linearibus canalieulatis dense albo-hirtis apice planis obtusis barbatis, 4 interioribus lanceolatis acutis subtilissime puberulis et ciliolatis. ♂? In umbrosis silvarum insulae Madagascar ad Diego Suarez (Richard! in h. mus. paris. et Nees, n. 58). Rami maximam partem aphylli Salicorniam aut Cassytham hirsutam mentiuntur. Structura involueri et florum omnino ut in *H. elegante*, sed magnitudine inferiores sunt haec partes et corolla videtur pallida. (v. in h. paris. et Nees).
9. *H. SAXICOLA*, caule basi repente, foliis ovatis ovato-oblängis basi acutiusculis apice attenuatis obtusisque subtus petiolisque pubescentibus, racemis axillaribus oppositis terminalibusque laxis oppositis brevibus secundis, involucris unifloris pubescentibus foliolis linear-oblängis, exterioribus basi coadunatis interioribus liberis ealyceum æquantibus, calyx bipartitum lacinia altera bifida altera tridentata. ♂ Locis umbrosis humidiusculis inter saxa repens in insula Marosse ora orientalis insulae Madagascari et in monte Tananarivo inter saxa (Bojer!). Ruellia? *saxicola* Bojer! in h. DC. Herba bi-tripedalis, basi repens, caule adulto glabrescente. Folia cum petiolo semipollicari 3-2 poll. longa, 1- $\frac{1}{2}$  poll. lata. Bracteæ inæquales, subspatulatae, major florifera involucrum æquans. Pedicellus involuero brevior. Corolla extus intusque pubescens, tubo recurvo rubro, labio inferiore trifido lacinia mediæ latiore ciliata. Filamenta hirsuta. Capsula euspidata. (v. in h. DC. et Hooker).
10. *H. TEUCRIFORMIS*, fruticosa, caule bifariam strigoso lineato, foliis ovato-lanceolatis apice attenuatis obtusis basi rotundatis glabris subtus discoloribus, petiolo brevissimo, spicis axillaribus oppositis folium æquantibus basi foliosis, capitulis solitariis geminis oppositis unifloris, involucri tetraphylli foliolis ad  $\frac{1}{4}$  a basi coadunatis sebris subulato-attenuatis calyx chartaceo lanceolato-attenuato vix  $\frac{1}{4}$  longioribus, corollæ pubescente. ♂? Madagascar ad margines silvacum prov. Emirne (Bojer! in h. DC.). Folia 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 5-6 lin. lata, in secco specimine supra obscure nitida, subtus rufescens. Involuera vix 3 lin. longa, facie ealycum Teucrui seu Thymi. Folia floralia vix unguicularia, evato-oblänga. (v. in h. DC.)
11. *H. ANISOPHYLLA*, caule lineis alternati opositis pubescenti-hirtis exasperato, foliis cuiusque pars fæqualibus, altero subovali altero minoreque ovato, brevissime petiolatis in acumen obtusum attenuatis subrepandis glabris margine sebris, ramulorum majore suborbiculari minore exiguo spathulato, racemis axillaribus alternis paucifloris secundis, involucris unifloris glabris, lacinias lanceolato-linearibus æqualibus marginæ apicem versus sebris, exterioribus obtutis interioribus acuminatis. ♂ In Madagascar (h. Hooker!). Folia majora caulis 2 poll. longa, 9 lin. lata, minoræ 9 lin. longa, 6 lin. lata; haec autem regulariter decrescunt. In ramulis denique folia majora sunt 4-3 lin. longa fereque et lata, obtusa, opposita his minoræ vix lin. 1 longa, spathulata; ejusmodi autem folia exigua flores superiores suffulciant, opposito majore deficiente, flores inferiores ex angulo majoris folii floralis oriuntur. Involuera 2 lin., pedicelli lin.  $\frac{1}{2}$  longa. Corolla involuero duplo longior, pubescens. (v. in h. Hooker.)
12. *H. MACULOSA*, caule cresto foliisque lanceolatis utrinque obtusis sessilibus glabris, floralibus decrescentibus oblongis, capitulis subunifloris opositis sessilibus in spicam terminalem brevem paucifloram excurrentibus, involueri gla-

bri foliolis liberis alternis brevioribus linearis-lanceolatis acutis.  $\mathcal{L}$  In Madagascar collibus montibusque altis locis siccis et aridis prov. Emiræ prope Tananarivo (Bojer! in h. DC.). Justicia maculosa Bojer! l. c. Planta vix semipedalis. Caulis profunde quadrangularis, scabriusculus, parum ramosus. Folia inferiora latiora et breviora, fere obovata. Corolla semipollucaris, resupinata, labio iuferiore (sursum directo) trilobo, superiore integro. (v. in h. DC.)

13. *H. HIRSUTA*, tota patenti-hirsuta, caule adscendente, foliis oblongis obtusis sessilibus, floralibus decrescentibus ovalibus, capitulis unifloris oppositis sessilibus in spicam terminalem brevem paucifloram excurrentibus, involuci foliolis liberis, exterioribus lanceolatis acuminatis hirsutis, interioribus oblongis obtusis apicem versus puberulis chartaceis.  $\mathcal{L}$  In Madagascar (h. Hooker!). Affinis *H. maculosa*, differt hirsutie, foliis latioribus, etc. Stamina parum ultra fauces prominent. (v. in h. Hooker.)

14. *H. LASIOTECIA*, tota patenti-hirsuta, caule erecto, foliis ovalibus obtusis in petiolum brevem acute desinentibus, spicâ terminali compositâ trifida, bracteis subulatis involucro brevioribus, capitulis unifloris, involuci foliolis liberis æqualibus conformibus herbaceis linearibus hirsutissimis, exterioribus obtusiusculis interioribus acutis marginibus membranaceis.  $\mathcal{L}$  Madagascar (h. Hooker!). Distinctissima involuci foliolis angustis, inter se sene distantibus, setis flavicantibus patentibus densissime vestitis. Folia poll. 1 longa, 6 lin. lata, inferiora basi breviter cuneata, superiora pure ovalia. (v. in h. Hooker.)

15. *H. MICROPHYLLA*, foliis ovato-oblongis obtusis a basi ad medium dentatis pilosis ciliatisque, spicis axillaribus subtriangularibus pedunculatis folio longioribus, involuci subuniflori glandulosotomentosi foliolis discretis linearis-subulatis æqualibus calyce duplo longioribus. ♂ Ad rupe calidas regionis inferioris in parte australi montis Scholoda, Decembri (Schimper!). Hypoestes uniflora Hochst.! in Schimp. it. abyss., un. itin., n. 400. Nomen abyss. Tatam Gehie. Fruticulus humilis, ramosissimus. Folia vix semipollucis longiora. (v. in h. un. itin., Nees, berol., etc.)

### B. Spicae axillares vel terminales bracteatae . bracteis grandit-

### sculis.

16. *H. FASCICULARIS*, glabra, geniculis hispidulis, caule erecto, foliis oblongis utrinque attenuatis acumine obtuso, fasciculis axillaribus in terminalem paucidorum transversentibus bracteatis bracteis ovatis, capitulis alternatis geminis terminalique solitario unifloris glabris, laciinis involuci alte connatis subæqualibus oblongis subulato-acuminatis glabris, calyce primo ad medium usque dein profundius quinquefido laciini lanceolatis setaceo-acutis.  $\mathcal{L}$  In silvaticis montosis prov. Emiræ Madagascar (Bojer! in h. DC.). Caulis acute quadrangularis. Folia bipollucaria, repanda, petiolo brevi. Pedunculi folio breviores. Bracteæ in petiolum brevem attenuate, obtuse brevi-cuspidatæ, capitulis longiores. Capitula in singulo fasciculo plerumque bis gemina cum quinto terminali. Bracteolæ spatulato-oblongæ. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, incurva, rosea, limbo bilabiato brevi, laciiniis labii inferioris lateralibus minoribus, labio superiore angustiore. Capsula lanceolata, in medio 4-sperma. (v. in h. DC. et Hook.).

17. *H. SPICATA*, fruticulosa, glabra, caule erecto, foliis ovalibus in acumen obtusum attenuatis basi acutis, capitulis spicatis, spicis terminalibus solitariis geminis ternis brevipedunculatis tetragonis, bracteis imbricatis ovatis acuminatis in petiolum latum indurescens contractis alternis sterilibus, capitulis solitariis, involuci foliolis demum profunde discretis oblongo-lanceolatis punctulato-asperulis aristatis rigidis subæqualibus, calycis ad medium usque



quinquefidi laciñiis lanceolato-acuminatis. ♂ In dumetis ad versuras agrorum prov. Emirnæ Madagascar (Bojer! in h. DC. Lyall! n. 247 in h. Hooker). Accedit ad H. fascicularem, differt autem foliis latioribus magis coriacieis (fere Citri) nitidis, et inflorescentiâ spicatâ, spicis ovalibus Ruellie seu Strobilanthi, tum vero et bracteis acuminatis et involucris ex apice contracto in cuspide aristiformem ferc æquiloniam excurrentibus. Flores spicæ in bractearum oppositarum alterius angulo tantum positi et itaque alterni. Corolla rosea, tubulosa, incurva, 1½ poll. longa, labio superiore lato bifido laciñiis triangularibus acutiusculis. (v. in h. DC. et Hook.)

18. H. OXYSTEGIA, hirsuta, foliis ovalibus acutis (infinis obtusis) basi obtusâ in petiolum brevissimum desinentibus inæqualibus, spicis axillaribus terminaque brevibus sessilibus, bracteis imbricatis rhombœo-ovatis acuminatis basi cuneiformi sessilibus sursum patenti-hirsutissimis, involueri foliolis liberis lanceolato-linearibus acuminatis, exterioribus superioris hirsutis, interioribus glabris duplo minoribus. ♂ In Madagascar, locis humidis silvaticis umbrosis. Arbuscula elegans, spicis florū lâte rubris splendens, exsiccando nigrescens. Habitu H. spicatae, sed spicis hirsutis et bracteis magis acuminatis facile distincta. Bracteæ coloratae? (v. in h. Hooker.)
19. H. MOLLISSIMA, molliter hirsuta, foliis oblongis acuminatis acumine obtususcule basi acutiusculâ in petiolum mediocrem desinentibus obiter repandis molliissimis, fasciculis terminalibus geminis ternis capitatis, involueri tetraphylli discreti uniflori foliolis lanceolatis acutis conformibus, exterioribus in dorso villosis, interioribus scabriusculis. ♀ In Madagascar (Thouin! in h. Willd.). Ruellia mollissima Vahl symb. 3 p. 82 et h. Willd. sp. pl. 3 p. 369. Folia pendula, palmaria et ultra, pollicem lata, viridia. Involucra 4 lin. longa, chartacea, semper tetraphylla! Calycis laciñiæ breves, ciliatæ, apice setaceæ. (v. in h. Willd.).
20. H. PULCHRA, fruticosa, caule scandente glabro, foliis ovali-oblongis obtuse acuminatis basi acutis glabris, capitulis spicatis, spicis terminalibus subsolitariis pedunculatis secundis, bracteis lanceolatis acuminatis alternis sterilibus involucrisque coloratis et pubescenti-viscidis, involueri foliolis ad basin discretis lanceolatis acuminatis interioribus minoribus, calycis quinquepartiti laciñiis lineari-subulatis glabris. ♂ In sylvis Béfouroun prov. Bé-tâni-mena insulae Madagascar (Bojer! in h. DC.). Planta pulcherrima, bracteis incarnatis, corollis (pollicaribus) albis. H. spicatae affinis, a quâ quidem bracteis angustis cauleque scandente satis differt. Involucra foliola interiora pallidiora sunt. Corollæ (resupinatae?) labium inferius breve, trifidum, faux linc subventricosa. Filamenta in margine anteriore ciliata; antheræ dimidiato-ovalis, suturâ albâ. Capsula 4 lin. longa, brevi spatio a basi tetrasperma. (v. in h. DC. et Hook.).
21. H. FLEXIBILIS, caule sarmentoso (scandente?) foliisque lanceolatis obtuse acuminatis basi acutis glabris, capitulis spicatis, spicis terminalibus solitariis pedunculatis secundis nutantibus, bracteis lanceolatis oblongo-lanceolatis obtusis alternis sterilibus involucrisque coloratis pubescenti-scabris, involueri foliolis usque ad basin discretis lanceolatis exterioribus obtusis interioribus acuminatis paulo minoribus, calycis 5-partiti laciñiis lineari-subulatis glabris. ♀? ♂? In Madagascar (Lyall! n. 251 in h. Hooker). Justicia flexibilis Bojer! in h. Hooker. Similis H. pulchra, at diversa foliis angustioribus (2 poll. cum petiolo longis ½ poll. latis, margine scabris) et caule ratione foliorum longo, flagellari, ramis paucis apice spicigeris, spicis minoribus, etc. (v. in h. Hook.).
22. H. CANCELLATA, herbacea, caule acute sexangulari glabro, foliis distantibus lanceolatis acuminatis in petiolum brevissimum attenuatis pubescenti-scabris, capitulis inferis axillaribus, plerisque in spicam terminalem compositam capituliformem sessilem ovatam compactis 2-floris, bracteis capitulum aequalibus

- lanceolatis et involucri quadripartiti liberi lacinis duabus exterioribus aristato-acuminatis aristis setos-ciliatis.  $\mathcal{L}$  In Sierra Leone (Thunberg! in h. Willd.). Justicia canellata h. Willd. n. 311. Caulis gracilis, articulis prolongis. Spica terminalis, pollicaris, setis bractearum et involucrorum pectentissimis longis flavicantibus ad speciem cancellata. Involucrum foliolum exterius alterum paulo magius, ex apice truncato-bidentato emitens acumen herbaceum aristiforme recurvum setosum, alterum in simile acumen attenuatum; pars inferior eorum, et duo inferiora foliola tota, chartacea subsericea; accedunt duo foliola membranacea obtusa, duplo breviora. Calycis lacinia subulata, pubescentes. Corolla deest. Capsula generis, bilinearis, pallida. (v. in h. Willd.)
23. H. GRACILIS, caule basi repente stolonifero diffuso glabro apice scabro, foliis glabris obtusis, superioribus linearibus vel lanceolato-linearibus sessilibus, inferioribus infimis saltem brevioribus subspathulatis, capitulis unifloris geminis ternis glomeratis axillaribus, inferioribus distantibus, superioribus in spicam terminalem brevem bracteis linearibus interstinctam confertis, involuci pubescenti-glandulosi foliolis liberis lanceolatis, exterioribus folinoco-attenuatis interioribus duplo brevioribus setaceo-acuminatis, calyce 4 partito.  $\mathcal{L}$  Ad Madagascar, in pratis humidis inter graminea prov. Emirnæ (Bojer! in h. DC. Lyall! in h. Hook.). Rhinanthus gracilis Bojer! l. c. Justicia gracilis Lyall! n. 250, l. e. Planta laxa et mollis. Spica in nostro specimenine constat glomerulis duobus oppositis capitulo terminali subjectis, alteroque glomerulo minore ex angulo folii inferioris longe distantis. Folia superiora poll. 1 longa, lin. 1- $\frac{1}{4}$  lata, inferiora decrescendo 4-3 lin. longa, basi attenuata, latitudine superiorum. Corolla 3 lin. longa, pallida. Antherae valvulae purpureæ. (v. in h. DC. et Hook.)
24. H. TRIFLORA (Reem. et Sch. syst. v. 1 p. 88.), caule ramoso articulis elongatis, foliis ovatis obtusiusculis repando-dentatis pilosis, pedunculis alternis oppositivis folio longioribus brevioribus apice capitato 3-4-floris, involucro communis diphyllo foliolis involucris propriis brevioribus linear-lanceolatis obtusis, involucris propriis villosis 4-6-phyllo foliolis basi connatis, duobus exterioribus lineari-oblongis basi cuneatis apice herbaceis, reliquis minoribus lineari-lanceolatis acutis scariosis.  $\mathcal{L}$  In India orientali, Arabia, Asia minore, Abyssiniæ.
- $\alpha$ . Caule pedunculisque hirsutis. — In Arabiæ felicis montibus (Forsk.! in h. Vahl!), ad Adowa in Abyssiniæ (Quartin-Dillon! in h. mus. paris. et Nees n. 42), Justicia triflora Forsk.! deser. 4 n. 10. Vahl synb. 1. p. 81, en. 1 p. 111. Involucri folia majora semipollucaria. (v. in h. Vahl.)
- $\beta$ . caule diffuso simplici, pedunculis glabris. In Abyssiniæ monte Scholoda et ad Arbatenses (Quartin-Dillon! in h. mus. paris. et Nees n. 38 et 45), in Arabiæ felici (Botta! in h. mus. paris. et Nees n. 215), in Abyssiniæ, ad latns boreale montis Scholoda prope Adoam et locis apricis vallum et ad ripas rivorum prope Adoam, Septembri (Schimper!), in Nepalijâ (Wallich!). II. Wallichii Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 114. Wall. cat. n. 2466 e. H. aequinata Hochst.! in Schimp. it. abyss. un. it. 3 n. 1985. H. Adoensis Hochst.! ibid. 1 n. 108 (v. in h. Mus. paris., Nees, Wall., un. itin., etc.).
25. H. ROSEA, herbacea, glabra, foliis oblongis acuminatis glabris tenuibus obliteris repandis basi attenuatis, capitulis in spicâ terminali foliosâ laxe dispositis solitariis pluribus oppositis subsessilibus, foliis floralibus caulinis similibus at minoribus involucris autem multo longioribus glabris, involucri foliolis ad basin discretis lanceolato-linearibus acuminatis apice ciliatis, interioribus paulo brevioribus, calycis quinquefidi lacinis setaceis subciliatis, eorollæ labio inferiore elongato-spathulato trilobo, superiore angusto breviore.  $\mathcal{L}$  In Benin (Beauv.! in h. DC. ex h. Delessert.) (v. in h. DC.)
26. H. BOJERIANA, caule erecto vel adscendente foliisque ovali-oblongis apice

attenuatis basi acutis glabris, pedunculis axillaribus alternis oppositivis folio brevioribus, capitulis 2-3-spicatis alternis bracteatis bracteis cordato-subtundis, involueri uniflori glabri foliolis liberis subæqualibus subulato-cuspidatis, calycis quinquefidi lacinias lanceolato-setaceis.  $\mathcal{L}$  In silvis umbrosis secus rivulos prov. Emirnæ insulae Madagascar Bojer! in h. DC. Lyall! n. 117 in h. Hooker. Dicliptera spectabilis Lyall! in h. Hooker. Herba 5-pedalis, floribus roseis sesquipollicularibus. Distincta pedunculis 1-2 poll. longis apice paribus 2-3 bractearum inæqualium instructis, quæ bractæ 6 lin. longæ,  $3\frac{1}{2}$ -4 lin. late, basi subcordatæ, sessiles, apice obtuse cuspidatæ capitulum in angulo alterius bractæ situm penitus tegunt. Tota planta glaberrima. Folia petiolata, 4-pollicaria, repando-subcrenata. (v. in h. DC. et Hooker.)

C. Congestæ. Spicis axillaribus densis in speciem verticillorum congestis.

27. H. FASTUOSA ( Soland. ex Rœm. et Sch. syst. 1 p. 140 ), glabra, foliis ovalo-oblongis utrinque attenuatis repando-subcrenatis acuminis angusto obtuso emarginatoe, basi acutæ in petiolum mediocrem desinentibus, spicæ terminali composita densa, spicis partialibus oppositis adpresso seundifloris brevibus, bracteis brevissimis ovatis acutis, involueris bifloris tetraphyllis foliolis alte concretis acutis mucronatis glabris subciliatis.  $\beta$  In India orientali (Vahl!). Justicia fastuosa Linn. mant. p. 172. Vahl symb. 1 p. 2 t. 1, 2 p. 13, en. 1 p. 108 et h.! Distincta foliis speciosis, 5-6 poll. longis, 1  $\frac{1}{2}$  poll. latis, spicæ terminali 4-pollicari et longiore, pedunculo ultra 2-pollicari. Flores pollicares fore. Acumen folii angustum at obtusum, rarius emarginatum. Bractæ adpresso, lineæ vix longiores, mucronatæ. (v. in h. Vahl.).
28. H. VERTICILLARIS ( Soland. ex Rœm. et Sch. syst. 1 p. 140, mant. p. 129), herbacea, ramosa, foliis ovalibus utrinque acutis, spicis axillaribus suboppositis seundis basi compositis, involueri 4-fidi biflori lacinias muticis, exterioris apice herbaceis obtusis, lateralibus paulo minoribus acutis.  $\mathcal{L}$  Ad Prom. B. Spei: in monte Bothasberg ad flumen der grosse Fischfluss dictum prov. Albaay, inter frutices circum silvas Adovenses, in Konabshoogde, ad prædium Pauli Maré juxta flumen Zwartkopsrivier, in silvis primævis montis Olifantschoek, ad flumen Boschesmân-rivier, et in Krakakammæ jugo prov. Uitenhage, in silvis montanis districtus Hassagaybosch, floret a Maio in Septembrem (Ecklon! Drège!). — Nees ab E. in Linnæa, 1841 p. 376. Justicia verticillaris Linn. suppl. p. 85. Thunb. fl. cap. el. Sch. p. 479. Hypoestes polymorpha Schlecht. Meyer! in pl. Drèg. et in h. gen. berol. Flores non verticillati, sed spicati, spicis axillaribus seundis in axillis superioribus magis magisque confertis. Bracteola parvæ, lancolatæ. Corolla incarnata, labio inferiore trifido lacinias obtusis, mediâ latiore. Stamina recurva, filamentis inferne altero latere barbatis. Antheræ in siccis amoenè roseæ. Capsula pubescens. Variat floribus tetrandratis staminibus didynamis. (v. in h. Ecklon., Drèg., Nees, berol. etc.).

$\alpha$ . tota holoscirco-pubescentia.

$\beta$ . denudata, minor, glabra, involueris ad speciem simpliciter verticillatis ob spicas ad involuera pauca redactas. — In Africæ australi extratropicæ (Burchell! cat. n. 2987 in h. DC. ).

29. H. FORSKOLII (R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 474), foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ad costas subtus scabris, spicis axillaribus subcompositis microphyllis, involueri subuniflori glabri foliolis exterioribus longioribus oblongo-lanceolatis basi coadunatis, duabus interioribus lanceolato-acuminatis calyce paulo longioribus.  $\mathcal{L}$  Prope montem Melhan Arabiæ felicis frequens (Forsk.!), in monte Scholada Arabiæ felicis, Octobri (Schimper! in h. un. itin. n. 186), in monte Moammarra Arabiæ felicis (Botta! in h. mus. paris.

et Nees n. 218), in Abyssinîa (Scbimp. h. un itin. n. 405. Quartin Dillon! in h. mus. paris et Nees n. 44). *Justicia paniculata* Forsk. descr. p. 4. *Justicia Forskallii* Vahl symb. 1 p. 2, 2 p. 13, en. 1 p. 109. Willd. sp. pl. 1 p. 79. (v. in b. un. itin., paris., Nees.)

*β. angustifolia*, foliis lanceolatis, involuci laciñiis apice birtis. — In monte Moammara Arabiæ felicis (Botta! in h. mus. paris. et Nees, n. 209), Africâ australi extra tropicum (Burchell! cat. n. 2182, in h. DC.) (v. in h. paris., Nees et DC.)

30. *H. CLINOPODIA* (E. M. cat. pl. Drèg. a. 1837), herbacea, ramosa, caule retrorsum foliis ovalibus acuminatis basi acutiusculis subtus pubescens-velutinis, spicis axillaribus oppositis secundis sœpe totis compositis, involuci quadrifidi bi-triflori laciñiis mucicis, lateralibus paulo minoribus.  $\mathcal{X}$  In Africâ australi (Drègel!). Similis *H. verticillari*, differt foliis apice magis attenuatis cauleque retrorsum appresse velutino. Spicæ magis compositæ, internodiis semper longiores, involuci laciñiæ apice lanceolatæ latiores longiore tractu virentes, magis villosæ quam in *H. verticillari*, flores paulo majores. (v. iu h. Drèg. berol., Nees, etc.)

31. *H. LAXIFLORA*, foliis ovalibus acuminatis basi cuneiformi-attenuatis glabris, spicis axillaribus terminalique subracemosis aphyllis, laciñiis involuci tubulosi lanceolato-acuminatis alternis paulo minoribus.  $\odot$  In insulâ Javâ (Junghuhn!), in Pbilipinis (Cuming! n. 1019, in h. Benth., Hook., berol., etc.). Differt ab *H. Decaisneana* foliis (caulinis) amplioribus multo magis et basi et apice attenuatis omnino glabris, atque inflorescentiâ. Pedunculi communes axillares, folio triplo quadruplo breviores, glabri, a basi fere pedicellos preferentes brevissimos oppositos 1-3 floris, parium 3-4, contractos, quo fit, ut flores axillares spicati spicis lanceolatis aut paulo latioribus appareant, in spicam denique terminaliæ nudam decompositam strictam abeunt. Folia in pedunculis communibus præter bracteas parvas subulatas nulla adsunt. Reliqua ut in *H. Decaisneana*.  $\mathcal{X}$  In Javâ, Novâ Hollandiâ.

*α. caule simplici, involucre apicem versus hirsuto.* — (Junghuhn! I. c. Cuming! l. c.) (v. in h. Benth., berol. et Nees.)

*β. caule ramoso humiliore, spicis laxioribus capitulis distantibus evidenter secundis, involucris subtilissime scabris.* — Zollinger! pl. jav. n. 2286, in h. DC.), Port Essington (Armstrong! n. 573, in h. Hooker), Goalba insulæ in littore septentrionali Novæ Hollandiæ ad Point Smith, Port Essington, Maio (h. Hooker, n. 573!) Huntersriver (h. Hooker!). Variat: laciñiis involuci obtusiusculis breviterque acutis, spicis firmioribus, foliis latioribus. (In Pbilipinis Cuming! n. 3, O. N. in h. gen. berol.).

*γ. ut in β. sed caule superiore, pedunculis involucrisque pubescentibus.* — In Javâ (Labillard. in h. Moricand).

32. *H. DECAISNEANA*, foliis ovatis utrinque acutiusculis, supra glabris, subtus ad nervos ramisque pubescenti-hirtis, thyrsis axillaribus terminalique spiciformibus secundis, foliis floralibus ovatis, laciñiis involuci tubulosi hirsuti lanceolatis acutis alternis minoribus.  $\mathcal{X}$  In insulis Javâ (Blume, Junghun!), et Timor (Decaisne!). *Hypoestes rosea* Decaisne! in nouv. ann. du mus. 3 p. 381 et in b. mus. paris. et h. Nees, n. 12, h. DC. ! Zollinger! pl. jav. n. 428, in b. DC., et Benth.! Moritz pl. Zolling. p. 48. *Hypoestes* Forskali Blume bijdr. p. 782 (excl. synon.). Differt evidentissime ab *H. purpurea* et *Forskallii* foliis latioribus (4- $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$  poll. longis, 2-1 poll. latis) ad costas sicut caule magis hirtis, involucris hirsutis immixtis glandulis, laciñiis omnibus lanceolatis acutis, calyce 5-dentato (vcl potius trifido laciñiis dñabus latioribus breviter bifidis) nec profunde quinquefido, corollæ labio superiore (deorsum spectante) linear-lanceolata acuto angustiore, inferioris laciñiis brevibus ovatis. Bractea sub singulo involuco subulata, involucri brevior. Involucri pleraque uniflora. Corolla fere pollicaris, pallide purpurea. Pedunculi

culi axillares, solitarii aut gemini, inaequales, inferiorum alter sœpe folium suum subæquans, capitato-di-tristachyi; supremi, decrescentibus foliis, in spicam, quam vertillatam interruptam dicunt, abeuntes. (v. in h. Junghuhn, paris., Hooker.)

33. *H. LATIFOLIA* (Hochst. in Kotschy it. nub. n. 296), foliis ovatis acuminatis basi acutis repandis (integerrimis) glabris, internodiis superioribus patentivillosis, fasciculis axillaribus spiciformibus secundis in spicam terminalalem transeuntibus, foliis floralibus ovatis, laciinis involueri tubulosi villosi alternis minoribus.  $\mathcal{U}$  In valle ad montem Cordofanum Turra, locis umbrosis (Kotschy!). Differt ab *H. Decaisneana* foliis basi minus attenuatis glabris, inflorescentia angusta in spicam foliosam terminalalem abundante, et corollâ minore, di midio pollice paulo longiore. (v. in h. un. it., Nees, berol., etc.)

$\beta.$  *integrifolia*, foliis integerrimis, acumine breviore obtusoque.  $\mathcal{U}$  In Sene-gambiâ secus flumen Casamance (Heudelot! in h. mus. paris. et ex eo in h. Nees, n. 6, et in Hooker), Sennaar (Acerbi! in h. DC.) (v. in h. paris. DC., Nees, Hook.).

34. *H. PURPUREA* (R. Br. prodr. fl. nov. holl. I p. 474. opp. ed. N. ab E. p. 330.), foliis ovalibus utrinque acuminatis integerrimis subtus ramisque pubescenti scabris thyrsis axillaribus terminalique spiciformibus angustis, foliis floralibus ovatis laciinisque involueri tubulosi mucronatis.  $\mathcal{U}$  In Chinâ ad Macao (Callery! in h. Mus. paris., ex eo in h. Nees n. 81, e Chinâ in hort. bot. cale., ad Assam (Griffith! in h. Hooker), in Manilâ (Chamiso! in h. gen. berol.). — N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 114. *Justicia purpurea* Vahl symb. 2 p. 13 (nec Linn.), en. 1 p. 109 et h. Willd. sp. pl. 1 p. 80 (quod ad definitionem). Wall. cat. n. 2473. *Justicia Forskolfii* h. Willd.! n. 301 nec Hypoestes Forskolfii R. Br. (specimen Kleinianum ex Ind. or.) *Justicia Chinensis* h. Mart. Caulis pubescens-scaber, canescens. Folia utrinque minutissimis pilis scabra. Ramuli axillares foliis plerique breviores, a medio fere involucra ferentes axillaria foliorum floralium, solitaria, alternatis subsecunda, approximata, spicam exhibent foliis floralibus ovatis petiolatis mucronatis a  $\frac{3}{4}$  ad  $\frac{4}{5}$  poll. decrescentibus interstinctam. Involucra 3 lin. longa, obconica, pubescens-scabra, ad  $\frac{4}{5}$  quinquefida, laciinis mucronatis, alternis rotundatis ovatisque. Corolla semiplicaris et paulo longior, angusta, pubescens, purpurca; labium superius oblongum, emarginatum; inferius tripartitum laciinis linearibus. Capsula involucro paulo longior, oblonga, acuta, apice puberula. *Justicia purpurea* Linn. ad hanc speciem non pertinet, sed ad Rostellulariam diffusam, quæ Bungum Rumph. amb. 6. t. 22. f. 2. (v. in h. Wall., Vahl, Willd., berol., Mart., Hooker).

35. *H. FLORIBUNDA* (R. Br.! prodr. fl. nov. holl. I p. 474. opp. ed. N. ab E. 3, p. 330.), foliis elliptico-lanceolatis acuminatis glabris, thyrsis axillaribus terminalique compositis decompositisque, foliis floralibus lanceolatis, involueri obconici brevis glabri laciinis triangularibus acutis muticis margine scabris, inferioribus paulo minoribus.  $\mathcal{U}$  In ora orientali Nova Hollandia intra tropicum (Rob. Brown! in h. DC.). Differt ab *H. purpurea* jam solis involucris dimidio brevioribus evidenter obconicis. In adnot. Browneana ed. Nees loco. «*Justicia purpurea* differt etc. » legendum: A *Justicia purpurea* differt etc. (v. in h. DC.).

36. *H. ARISTATA* (Soland. in Rœm. et Sch. syst. 1 p. 140), foliis ovatis basi ut plurimum obtusis acutis ramisque villosis, capitulis verticillatis, cymulis subsessilibus, bracteis ovalibus, involueri triflori foliolis basi conjunctis, exterioribus aristatis aristâ hirtâ glandulosâque.  $\mathcal{U}$  Ad Promontorium Bonæ Spei, inter frutices in præruptis montium fluminis Vanstadens rivis et in collibus saxosis ad Port Elizabeth (Uitenhage) solo humoso e ligno destructo a Decembri in Aprilem (Ecklon! Drège!), ad sinum Delagoa Africæ australis (Forbes! in h. soc. linn. lond. et ex eo in h. Mart., Benth. et DC.).

*Justicia aristata* Vabl, symb. 2 p. 2, en. 1 p. 110 et b. Flores inearnati. (v. in h. Ecklon., Drég., Berol., Hooker, etc.).

*β. macrophylla*, foliis amplioribus acuminitatis basi subtruncatis. — Hypoestes plumosa var. a et b E. M.! in pl. Drég. (v. in h. Drég. et Hooker.).

### § 2. Involucro plano.

37. H. DICLIPTEROIDES, fruticosa, capite retrorsum sparsim scabriusculo, foliis glabris oblongis apice attenuatis basi acutis subrepandis, capitulis unifloris terminalibus fasciculatis, iuvolucris plauo-compressis foliolis exterioribus æqualibus ovalibus obtusis basi breviter attenuatis et extus plagâ ovatâ acutiusculâ elevatâ venoso-nervosâ notatis, interioribus subulatis longitudine calycis, corollâ subinfundibuliformi, labio inferiore latissimo trifido lobis obtusis, superiore oblongo. ♂ In Madagascari (Bojer! in h. DC., Lyall! in h. Hooker.). Folia cum petiolo 2-3-lineari 5 poll. longa 1-1½ poll. lata, tenuia. Capitula in caulis apice opposita, brevipedicellata, solitaria vel gemina, approximata, fastigiata, bracteâ subulatâ suffulta, ¼ poll. longa, petioli ad instar basi contracta, plagâ subrhombé ad ½ a basi extensâ foliolum exterius quadram arce incumbens fingente. Corolla pollicaris, tubo angusto, a medio hinc nonnihil gibboso, limbo lato, labii inferioris lobo medio latiore. (v. in h. DC. et Hook. )

#### Species e genere exclusa.

H. GLANDULOSA Hochst. = Rostellularia glandulosa.

### CXLIV. LASIOCLADUS Bojer. ined.

Calyx quinquepartitus, æqualis, in capitulo unifloro involucro hexaphyllo foliis imâ basi coaliis inclusio. Corolla . Stamna .. Stigma acutum. Capsula a basi ad medium fere depresso et asperma, hinc tetrasperma. Semina retinaculis uncinatis obtusis fulcrata. Inflorescentia glomerato-vorticillata vel spicato-capitata. — Frutices Madagascarienses, ramis teretibus, cortice pallido lanuginoso vestitis, foliis angustis coriacieis, involuci folioli dorsali reliquis latiore, tum binis inferis dein binis lateralibus per gradus angustioribus.

1. L. ANTHOSPERMIFOLIUS (Bojer herb.), foliis linearibus marginibus revolutis, floribus glomerato-vorticillatis. ♂ In aridis secus flumen Omlahi Madagascar, ad sinum Augustinum Bojer! in h. DC.) Rami, folia juniora, adultiora subtus et glomeruli florum strigiloso-argentei. Folia roris marini, ob margines revolutos depresso-teretia, supra glabrescinta, subtusque unisulcata. Glomeruli subsessiles, pluriflori, bracteolis brevibus distincti. Involuci foliola lanceolata, setaceo-acuminata, venosa, tenuia, villosa. Calyx laciniæ membranaceæ, acuminatæ, ciliatæ. Corolla, in nostris incompleta, videtur infundibuliformis, parva (v. in h. DC.).
2. L. CHLOROTRICHOS (Bojer), foliis linear-i-cuneiformibus planis, juvenilibus caeruleo incanis, floribus terminalibus spicato-capitatis, bracteis, involucris calycibusque glandulosi-hirsutissimis. ♂ In montibus Madagascar, locis aridis circa flumen Omlahi ad sinum S. Augustini Bojer! in h. DC.). Caulis virgatus, ramis brevibus patentibus distantibus. Folia 1-1½ poll. longa, apicem versus 2½ lin. lata, obtusissima. Capitulum terminale magnitudine nucis juglandis. Bracteæ lineari-spathulata, unifloræ, uti involucra et caulis infra capitulum pilis longis patentibus flavis plerisque glanduloso-capitatis vestitæ. Involuci foliolum superioris bracteis simile, reliqua linearia et linearis subulata. Calyx laciniæ lanceolatae, acuminatae, glandulosæ, firmiores, quam in præcedente. Capsula 5 lin. longa, utrinque attenuata (v. in h. DC.).

#### Species e genere exclusa.

L. BOERHAVIÆFOLIUS Bojer = Adhatoda spieata Boerhaviæfolia.

L. SPICATUS Bojer = Adhatoda (Tyloglossa) spicata.

## CXLV. BRACHYSTEPHANUS.

Calyx 5-partitus, æqualis, non involucratus, laciñiis longis attenuatis. Corollæ tubo longo gracili, limbo bilabiato, labii æqualibus conformibus brevibus subintegerrimis. Stamina duo, longe exserta; antheræ uniloculares, loculus semiovalis, membranaceus, dorso angusto medio affixus. Stigma acutum. Fructus — Herba Madagascariensis, probabiliiter palustris, caule basi repente. Spica (sive racemus) terminalis, adjectis aliquot brevioribus ex angulis foliorum proxime inferiorum. Flores plerique alterni, brevipedicellati. Bractæ et bracteolæ breves. — Flores graciles, habitu Eranthemi.

B. LYALLII.  $\mathcal{L}$  In Madagascar (Lyall! in h. Hooker). Caulis 1-2 ped. altus, simplex, basi fibris longis repens, apice angulatus, glaber. Folia oblonga, acuminata, in petiolum cuñatim decurrentia, glabra, mollia,  $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$  poll. longa, 10-12 lin. lata. Spica terminalis, 3-policaris, brevipedunculata, densa. Rhachis gracilis, compressa, glabra. Flores inferiores oppositi, reliqui alterni; oppositæ bractæ subulata sterili. Bractæ et bracteolæ subulata, calyce duplo breviores, ciliolata. Calyx 4 lin. longus, laciñiis herbaceo-mollibus linear-setaceis, siccando flexuosis, apice hispidis. Corolla pallida? tubo pollicari subfififormi, limbi laciñiis bilinearibus ovatis obtusis patentibus. Stamina supra medium tubum inserta, limbo longiora (v. in h. Hooker).

CXLVI. CLINACANTHUS. — *Justicia* sp. *Burm.*, *Linn.*

Calyx quinquepartitus, æqualis, non involucratus. Corolla resupinata, bilabiata, labio inferiore (sursum spectante) trifido, superiore angustiore concavo bidentato. Stamina duo. Antheræ uniloculares, loculus in connettivo lanceolato in medio affixo lateralis, muticus. Stigma bifidum, breve. Capsula a medio tetrasperma. Semina muricata. — Plantæ Indicæ et Madagascarienses, herbaceæ, glabræ, foliis vel irregulariter denticulatis vel integerrimis, brevipetiolatis. Cymulæ breves pubescenti-glandulosæ, in apice caulis et ramorum ex axillaribus terminales, abortu 4-2-floræ, unde flores in apice rami elongati solitarii genuinive apparent, bracteis bracteolæsque parvis, floribus coccineis brevipedicellatis nutantibus, — Est Hypoestes absque involucro calyce herbaceo.

1. C. BURMANNI, foliis ovato-lanceolatis acuminatis irregulariter denticulatis, floribus cymulosis, corollâ elongatâ.  $\mathcal{L}$  In Javâ (Burmann! in h. Vahl.), Moluccis Blume). *Justicia* nutans Burm. fl. ind. p. 10 t. 5 f. 1. Vahl symb. 2 p. 6, en. 1 p. 132 et h.! Willd. sp. pl. 1 p. 89 et h. n. 316! (nec Vahl!). *Justicia fulgida* Bl. bijdr. p. 784. Beloperone? fulgida Hassk. cat. hort. bogor. secund. p. 157. Folia in costis hirtula. Calyx 4 lin. longus, laciñiis linearibus acutis. Bractæ et bracteolæ vix pedicello ( $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$  longo) longiores. Corolla policaris, pubescens. Filamenta crassa, ad insertionem acuminata (v. in h. Vahl et Willd.).
2. C. ANGUSTUS, caule paniculato, ramis microphyllis, pedunculis axillaribus simplicibus trifidis laxis, floribus solitariis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis brevissime petiolatis integerrimis in costis hirtis.  $\mathcal{L}$  Madagascar in silvis securis rivulos prov. Be-Zongzong Bojer!. *Kuellia angusta* Bojer! in h. gen. monac. et *Ruellia salicifolia* Bojer! in h. DC. Herba bipedalis, erecta, ramis elongatis filiformibus. Nodi caulis tumidi in secco statu contracti. Folia alia basi obtusiuscula, alia et basi et apice attenuata. Antheræ muticæ? (v. in h. monac.).

Subtribus IX. *ANDROGRAPHIDEÆ* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77 et p. 115, et in Lindl. bot. ed. 2 p. 485. Endl. gen. p. 707. Meissn. gen. p. 297 (205). — *Justicieæ spec. Linn. et Autt.*

Calyx quinquefidus, æqualis. Corolla bilabiata, labio superiore bidentato inferiore trifido, sæpe resupinata. Stamina 2, exserta. Antheræ vel abortu uniloculares, loculo infero in lanam seu villos soluto, vel si biloculares, tum infero loculo saltem minus completo plus minus barbato vel lanato. Stigma parvum, subcapitatum. Capsula linearis-oblonga, tota depresso, a basi 6-8-sperma. Dissepimentum angustum, adnatum. Semina retinaculis brevibus subtensa usque supra basin inserta. — Herbae (vel suffrutices). Indice, elegantiores, floribus mediocribus aut parvis, inflorescentiâ sæpe glanduloso-hirtâ. Flores axillares, solitarii vel racemosi, plus minus secundi. Bracteæ parvæ. Bracteolæ sæpe deficientes.

#### CONSPECTUS GENERUM.

**CXLVII.** *Haplanthus* N. ab E. — Corolla subinfundibuliformis limbo subbilabiato. — India orientalis.

**CXLVIII.** *Erianthera* Wall. — Corolla bilabiata, resupinata. Antheræ loculus inferior abortivus in barbam laniformem solutus. Flores axillares. — India orientalis.

**CXLIX.** *Andrographis* Wall. — Corolla bilabiata, resupinata. Antheræ biloculares, loculis parallelis basi barbatis. Racemi axillares, secundiflori. — India orientalis.

**CXLVII. HAPLANTHUS** Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77 et 115, et in Lindl. bot. ed. 2 p. 485. Endl. gen. p. 707. Meissn. gen. p. 297 (205). — *Justicieæ spec. Wall.*

Calyx æqualis, quinquepartitus. Corolla subinfundibuliformis, tubo incurvo, limbo quinquefido subbilabiato. Stamina duo inclusa; antheræ uniloculares, connectivo loculoque altero abortivo tomentosis villosive; filamenta basi introrsum dilatata. Capsula linearis, depresso, a basi 8-16-sperma, seminibus parvis angulatis. — Herbae Indiæ orientalis erectæ, ramosæ. Rami floriferi sæpe difformes, spiciformes, pauciflori, vel racemulus subspicatus terminalis partitus, bracteis partialibus propriis que parvis subulatis, vel flores ad basin ramulorum fasciculato-subverticillatorum rhachi aduersi solitarii, pauci.

**I. H. TENER** (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 115), ramis axillaribus oppositis folio longioribus, floribus in apice ramorum caulisque racemosis. (1) In Indiæ orientali. Herba facie Raphidosporæ glabra vel potius Andrographidis paniculata. Caulis in var.  $\alpha$  spithameus, graeulis, erectus vel basi procumbens et ad genicula repens, quadrangularis, articulatus, pilis albis multiarticulatus subhirsutus, ramosus vel simplex. Folia primordialia subtrotundo-spathulata, parva; reliqua, parium circiter quatuor, 2-2½ pollices longa, ovata, integrifolia vel subserrata, tenuia, supra pilis articulatis inspersa, subtus glabra et obsolete lineolata. Ramuli folio breviores, apice pauciflori. Racemus terminalis triplex, pauciflorus. Rami tetragonii, glabri. Flores circa apices 3-6, alterni, subsecundi. Pedicelli graciles, 1-1½ lin. longi, glandulosopuberuli. Bracteæ duæ subulatæ, pedicello breviore, ad originem singuli pedicelli binæ minores in ipso pedicello ad basin. Calyx parvus, quinquepartitus, lacinias linearis-acuminatis glandulosopubescentibus. Corolla 4 lin. longa, pubescens, purpurca, tubo crasso incurvo, limbo brevi, lacinias ovatis obtusis, superioribus paulo minoribus minus profunde discretis. Stamina inclusa; antheræ basi

cohærentes; connectivum linearis-lanceolatum, in dorso dense albo-tomentosum; loculus fertilis dimidiato-oblongus; sterilis fertili subparallelus, sed minor, callosus et in dorso tomentosus. Stigma bidens. Capsula 5 lin. longa, tenuis, linearis, acuta, compressa, glandulos-pubescentia, ad basin bilocularis, loculis octospermis. Semina parva, rufa, obovata, rugulosa. (v.  $\alpha$  et  $\beta$  in h. Wallich).

$\alpha$ . *humilis*, racemo terminali trifido. — Tavoy et Taong-dong (Wall! cat. n. 7285 a).

$\beta$ . *elongatus*, racemis axillaris terminalibusque quaternis. — Tavoy et Taong-dong (Wall! cat. n. 7185, b, c). *Justicia tenuiflora* Wall. n. sp. Differt caulo pedali et altiore ramoso dichotomo, foliis fere glabris, superioribus ovato-lanceolatis vel lanceolatis subsessilibus, summis sæpe ternis. Rami axillares oppositi, summi terni, longiores, validiores. Filamentum interius ala latâ membranaceâ semiovatâ.

2. *H. VERTICILLARIS*, ramis axillaris fasciculatis verticillatis folio brevioribus crinitis pilisque glandulosis hirtis apice bispinulosis basi unifloris, foliis oblongis longe petiolatis apice attenuatis supra pilosis. (In montosis Purimdar dictis, circa Sasroor in Decan, a Septembri in Novembrem (Perrottet! in h. DC. Jacquemont! in h. mus. paris. et Nees n. 192), in Neelgherries (Perrottet! in h. mus. paris. et Nees, n. 131), Assam (Griffith! in h. Hooker). Planta singularis ramorum axillarium brevium spiniformium congerie, in foliorum axillis verticillos formante. Radix parce ramosa. Caulis herbaceus, simplex, erectus, 6-12 poll. altus, glaber, superne pubescenti-scabriuscus, basin versus nudus. Folia ovato-oblonga, in longum petiolum attenuata, supra pilosa, apice attenuata. Rami in singuli folii axilla circiter 6, basi conjuncti ibidemque bracteis exiguis lanceolatis mucronatis interstineti, petioli longitudo, recurvi, rigidi, apice spinulis duabus raro tribus divergentibus, subinde et latere denticulo armati, aphylli, quadriquetri, striati, pilis brevibus glandulosis dense vestiti et basin versus etiam setis longis patentissimis criniti, singuli juxta basin introrsum uniflori. Flos subsessilis, bracteis bracteolisque calyce brevioribus e basi latiuscula spiniformibus suffultus. Calyx lin. I longus, glabriuscus, lacinias subulatis inermibus. Corolla 6 lin. longa, structura ejusdem ac in praecedente, lilacina (Perrottet), labii inferioris laciniae laterales basi violaceo-lineatae, palatum gibbum, pallidius. Antherarum loculus sterilis pubescente a tergo apicem versus laxe barbati. Capsula 4 lin. longa, glandulos-pubescentia, 8-sperma. (v. in h. DC., Hook., paris. et Nees).

$\beta$ . *glabrescens*, caule, ramis sterilibus foliisque pilis glandulosis exuti, ramis autem sterilibus, uti solent, crinitis. — Assam (Griffith! in h. Hooker).

3. *H. TENTACULATUS*, ramis axillaris fasciculatis verticillatis bifido-ramosus folio longioribus crinitis et glandulos-pubescentibus rauulisque basi unifloris secundis apice bidentatis, foliis ovalibus obtusis in breve petiolum decurrentibus glabriuscus. (In India orientali (Plukenet Heyne!), Mandov in India centrali, Januario (Edgeworth! in h. Benth.). *Ruellia tentaculata* Linn. cent. pl. 2 in am. acad. 4 p. 320, sp. pl. p. 826, Willd. sp. pl. 368, Burm. fl. ind. p. 134, t. 40 f. 1. *Ruellia aciculata* Roth nov. pl. spec. p. 301, h. Vahl! (specim. Lamarck). *Euphrasia Acinos*, latiore folio, maderaspatana, caulinis pubescentibus Pluken. phytogr. p. 279 f. 7. Differt ab *H. verticillari* foliis minoribus unguicularibus neque pilosis sed, nisi glabris omnino, pubescentia tantum subtilissimâ conspersis, ramisque inflorescentia magis divisis mucronibus apicis brevioribus callosis nec spiniformibus albisque, et pubescentia inter setas longas patentes brvissimâ densâ subglandulosa, glandulis igitur subsessilibus. In solo sterili rupestri humilis, 3-4-pollicaris, solo pingui ad 2-3 pedum altitudinem crescit. (v. in h. Vahl et Benth.)

CXLVIII. ERIANTHERA Wall. *Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77 et 115, et in Lindl. intr. ed. 2 p. 485, Endl. gen. p. 707, Meisn. gen. p. 297 (205). — Justicæ et Andrographidis spec. Rottl. et Wall.*

Calyx quinquepartitus, laciinis æqualibus. Corolla bilabiata, labio superiore latiore bifido, inferiore trifido. Stamina duo, exserta. Antheræ abortu uniloculares, loculo supero pollinifero, infero in barbam lanatam soluto. Stigma parvum, capitatum. Capsula oblonga, depressa, bilocularis, a basi ad medium hexa-pleiosperma. Dissepimentum adnatum, breve. Semina retinaculis brevibus pedicellata. — Suffrutices Indici, humiles, parvifolii, serpylli habitu. Flores axillares ebracteolati, pedunculis uni-bifloris.

1. E. SERPYLLIFOLIA (*Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 115, Wight h. pr. n. 2021*), caule procumbente, foliis suborbiculatis subsessilibus, floribus axillaribus, pedicellis uni-bifloris. ♂ In umbrosis prov. Mysore (Wight!), in Palamcottah (h. Roxburgh!), ad Bengalore (Klein! in h. Willd.). *Justicia serpyllifolia* Rottl. Vahl en. 1 p. 169, Rœm. et Sch. syst. 1 p. 165. *Justicia nummularifolia* Wall. cat. n. 2461 a, b, c, Klein! in h. Willd. *Eranthemum serpyllifolium* h. Willd. n. 270! *Andrographis humifusa*, an orbiculata? Wall. Wight! h. pr. n. 55. Radix (Rizoma) pro magnitudine plantæ crassa, fusca. Caulis digitalis, palmaris, pedalis, prostratus, villosus. Folia 4-7 lin. longa et lata, inferiora sæpe latiora quam longiora et hæc plerumque retusa, alia obtusa, superiora quandoque ovata aut ovalia, omnia petiolo vix  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$  lin. longo hirsuto prædicta, punctulato-sabrinacula, ad venas hispidula, rarius supra undique hirsutula ciliata; in grandioribus ramulis provenient graciles, microphylli, in racemulos subsecundos transentes. Pedunculi ex plurimis axillis, hirsuti, adscendentes, glanduloso-pilosuli, ebracteati; quandoque inferiores longiores biflori. Calyx 3½ lin. longus, glanduloso-pubescent, laciinis linearibus acutis subinæqualibus. Corolla 4 lin. longa, pubescens, alba; labia obtusa, ovata; inferius (superius) bilobum, lobis lineis tribus purpureis punctatis pictis; superius trifidum, ex alterâ parte laciiniis quandoque lineis tribus pictis ex alterâ concoloribus, aut cunctis trilineatis. Filamenta pilosula; anthers violaceæ, ob loculum inferiorem laniformem basi quasi lanâ involutæ. Capsula 5 lin. longa, valde depressa, apicem versus hirsuta. In ipsâ fere basi semina duo, et bina circiter paria inde ad medianam capsulam. Pars ejus superior bilocularis et cava, sed (in nostris) asperna. Retinacula parvos seminum stipites exhibent, apice brevi dilatato seminum insertionem excedentes et fulcium præstantes. (v. in h. Wallich, Wight, Willd., Nees, berol., etc.)

2. ramis caulinisque apice attenuatis microphyllis multifloris racemos secundos fingentibus. — Wall. l. c. b ex. h. Heyneano. Courtalluni (Wight!), Palamcottah (idem!, Heyne! in h. Mart.). *Erianthera Neesiana* W. Arn. in h. Wight.

2. E. LOBELIOIDES (*Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 115, Wight h. pr. n. 2022*), caule suffruticoso diffuso, foliis petiolatis, floribus terminalibus racemosis. ♂ In Indiâ orientali. Truncus pennae gallinaceæ et scriptoræ quoque crassitiae, e hasi in ramos divisus, diffusus, pollicaris-semipedalis. Rami opposite ramulosi, pubescenti scabri. Folia in var. a perfecte orbiculata, cum petiolo bilinearî 7 lin. longa et lata, obsolete mucronulata, basi acuta, setulis, præsertim in paginâ superiore, modo densis modo rarî, in margine confertis inspersa, punctulato-asperula. Rami terminantur racemo florum I-2-3-pollicari, ante anthesin nutante, cum bracteis calycibusque dense glanduloso-pubescente. Flores distantes, oppositi, vel ad alterum latus subfasciculati. Bractæ oppositæ, subulata, lineam longe. Bracteolæ vix ullæ. Pedicelli 1-5 lin. longi, erecti. Calyx, corolla et stamina ut in præcedente, sed calyx ratione corollæ minor et corolla major, hujus labium superius fere orbiculatum, et color totius

corollæ purpureæ in limbo obscurior, nullis lineis variegatus. (v. in h. Wallich, Wight, DC.)

$\alpha.$  *rotundifolia*.—In pascuis montium Nilgherries (Wight!), in graminosis siccis ad Ootacamund et in agris circa Metapalium, Februario (Schmidt!).

*Eranthera lobelioides* N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 115. Wight h. propr. n. 2022. *Justicia lobelioides* Wall. cat. n. 2484 (ex h. Wight).

$\beta.$  *ovalifolia*, foliis ovatis ovalibus oblongisve.—*Copiosa* in campis siccis circa Kaitis in Nilgherries (Perrottet! in h. DC.).

CXLIX. ANDROGRAPHIS Wall. Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 77 et 116 et in Lindl. intr. ed. 2 p. 485, Endl. gen. p. 707, Meisn. gen. p. 197 (205).—*Justiciae* spec. Linn. et autt.

Calyx profunde quinquepartitus, æqualis, laciniis angustis. Corolla bilabiata, labio superiore integro bifido, inferiore trifido, ubi resupinata, ad speciem sensu contrario divisa. Stamina duo; antheræ biloculares, loculis parallelis basi barbatis. Capsula ovalis vel lanceolata, depressa, ad basin usque bilocularis, tetra-polysperma. Dissepimentum adnatum. Semina ovalia, obtusa, teretiuscula, basi oblique truncata, alveolato-scorbiculata, hilo profundo. Retinacula pedicellata, dilatato-squamiformia, decidua. — Herbae sœpe annuae vel suffrutices Indiæ orientalis, erecta. Caulis et rami acute quadranguli. Racemi axillares, graciles, simplices vel dichotomi trichotomive, secundi. Bractæ duæ oppositæ, calyce breviores, bracteolæ duæ minimæ ad basin pedicelli, subinde nulæ. Flores plus minus hirti glandulosive, albo purpureo-que varii. Calycis laciniæ filiformes, capsulæ linear-oblängæ planæ.

1. A. *PANICULATA* (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 116), herbaea, caule foliisque lanceolatis in petiolum attenuatis glabris, racemis axillaribus bifidis dichotomis, capsulis polyspermis. (In Indiæ orientalis locis siccis sub umbrâ arborum et fruticum; floret maturaque fructum tempore pluvio et frigido (Roxb.!), in prov. Circare dictâ, in Courtallum etc., locis nemorosis (Wight!), in Travancore (h. madras., Wall. cat. n. 2454 c), in Sibgunj et Habora (Hamilt.! Wall. cat. n. 2454 e), Coromandel (Macrae in h. paris.), in Assam superiore (Jenkins! in h. Benth. et Hook., Griffith ibid.), Ceylon ad Paradeniam (Macrae! n. 417 in h. Benth. ex h. soc. hort. lond.), Ceylon et Malabararia (Burmann), circa Bataviam locis siccis (Blume); — nec non in montosis prope Port Royal Jamaicæ (Hartweg! in h. Hook. et Benth.), in insulâ Cubâ ad Havanam (de Ossa! in h. DC.), St. Vincent (Gielding! in h. Hook.). — Wall. cat. n. 2454, N. ab E. in Benth. pl. Hartweg. n. 1554, Wight h. propr. n. 2023. *Justicia paniculata* Burm. fl. ind. p. 9. Vahl symb. 2 p. 5, en. 1 p. 130. Wild. en. hort. berol. 1 p. 26, et h. n. 314! (spec. Klein.), Reem. et Sch. syst. 1 p. 150, mant. 1 p. 134, Spr. syst. I p. 80. Blume bijdr. p. 788. R. Br. prodr. fl. nov. holl. ed. N. ab E. 1 p. 331, Wall. cat. n. 2454 a-g, Wight h. propr. n. 68, Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. 1. p. 119? *Justicia latebrosa* h. Russ., Hamilt.! et Wight! Wall. cat. 1. c. d, e, f. Cara Caniram Rheed. hort. mal. 9 p. 109 t. 56. Adhatodæ similia planta h. Gare! ap. Burm. Nomen Benghalense Kala-megh, Kalup-nath, vel Muhatita, quod regem amaritudinis vel amarorum significat. In lingua Telingana Nella-vemoso. Remedium est inter species amaras magni estimatum. Pedicelli 1½-3 lin. longi, pubescentes, calyces 1½-2 lin. longi, pubescentes immixtis glandulis pedicellatis. Filamenta antrosum hirta. Antheræ alter tantum loculus basi barbatus. Capsula lanceolata, seminibus 12-16, sœpe ita disposita, ut octo in medio alterius valvulae, 4-6-8 in alterâ magis inferiora superioraque accedant. (v. v. c. et sicc. in h. Wallich, Wight, Benth., Hook., DC., paris. etc.)

2. A. **ALATA**, caule foliisque lanceolato-linearibus in petiolum attenuatis glabris, racemis axillaribus elongatis subramosis ramisque brevibus divergentibus floribusque distantibus, capsulâ. .  $\mathcal{L}$   $\odot$  In India orientali (Koenig! in h. Vahl). Justicia (Dianthera) alata Vahl en. I p. 139 et h.! Varietas videtur Andrographidis paniculata extenuata et angustifolia. Caulis ut in hæc quadrilatera angulis argutissimis, in specimine h. Vahl (imperfecto, floribus carente) compressione nonnihil læsus, in reliquis cum formâ communis congruit. Folia 2-3 poll. longa, 2-1 $\frac{1}{2}$  lin. lata. (v. in h. Vahl).
3. A. **GRACILIS**, herbacea, caule glabro, foliis ovato-lanceolatis glabris lineolato-punctatis margine muriculato-scabris, inferioribus in petiolum brevem desinentibus superioribus subsessilibus angustioribus, racemis axillaribus simplicibus gracillimi paucifloris glabriusculis.  $\odot$  In Courtallum (Wight!). Differt ab A. paniculata et viscosulâ, quibus proxima, foliis, praesertim inferioribus, basi haud attenuatis, sed fere rotundatis breve spatio in petiolum decurrentibus, his brevioribus, cum petiolo suo circiter 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. longis atque ad basin 4-5 lin. latis, tum reliquis superiori versus magis magisque angustioribus ex oblongis denique lanceolatis apice nec basi attenuatis subsessilibus, cunctis autem foliis lincolis exiguis fuscescentibus crebris adspersis costis utrinque ternis purpurascenti-fuscis prominulis præeditis glabris in margine setulis brevissimis rigidis exasperatis, et denique racemis axillaribus filiformibus gracilimis simplicibus 4-6-floris ferme glabris, calycibus etiam glabris paucis setulis glandulosis conspersis, quam pro pedicellorum brevitate longioribus, lacinia setaceis acutissimis. Bractæ et bracteolæ subulatæ, pedicello breviores. Corolla 5-6 lin. longa, glanduloso-pubescent, tubo subcylindrico sursum non-nihil dilatato labioque superiore (reverso) emarginato albis, labio inferiore trifido, lacinia ovalibus obtusis æqualibus purpureis. Capsula semipollicularis et paulo longior, lanceolata, compressa, pubescentia glandulosâ rara adspersa, 12-14-sperma. (v. in h. Wight).
4. A. **LINEATA** (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 116, Wight! h. propr. n. 2024), herbacea, caule foliisque ovato-oblongis sessilibus glabris, racemis axillaribus di-trichotomis glanduloso-pubescentibus, lacinia calycis subulatis, capsulâ polyspermâ.  $\mathcal{L}$  Neelgherries, imprimis in ruderatis umbrosis (Schmidt!). Justicia lineata Wall. cat. n. 2486 a (ex parte). Rami lignosi, quadrilateri, glabri, ad genicula fimbriolati. Folia ex ovato-ellipticis in ovato-lanceolata transiunt, inferiora obtusa, superiora acuta, sessilia, glabra. Racemi ex axillis superioribus trichotomi, dichotomive, 2-pollicares patuli, in inflorescentiam terminalem abeunt, dense glanduloso-pubescentes. Bractæ ad ramifications parvæ, linearis-subulatæ, ad basin florum oppositæ, vix semilineares, subulatæ. Flores alterni, vel cum fasciculo abortientium sociati. Pedicelli lincam longi. Bracteolæ ad basin pedicellarum exiguae, subulatæ. Calyx fere duas lineas longus, lacinia triangulari-subulatis densissime glanduloso-pubescentibus. Corolla 5 lin. longa, pubescens; tubus longitudine limbi, cylindricus, basi incrassatus; faux ad basin labii inferioris ventricosa; labium hoc trifidum, saturate purpureo-punctatum, lacinia ovatis obtusiusculis, lateralibus angustioribus; labium superius oblongum, bidentatum. Filamenta triangulari-acuminata, extus purpurascenti-glanduloso-punctata, superiora versus setulis reflexis hirta; antheræ violaceæ, loculis fasciculo pilorum barbatis. Color plantæ (an semper?) intense purpureus (Schmidt). (v. in h. Wight, Nees, Schmidt, berol. etc.)
5. A. **MACROBOTRYS**, herbacea, caule foliisque lanceolatis acuminatis subsessilibus glabris, racemis axillaribus elongatis bifidis calycibusque subulatis glanduloso-hirtis, capsulâ polyspermâ.  $\mathcal{L}$  In ins. Ceylon ad Paradeniam (Macrae! u. 357 in h. Benth.). Proxima A. lineata, differt foliis angustioribus longe acuminatis et racemis folio multo longioribus (6-7 poll. longis) laxe at rigidule glanduloso-pilosis. Folia e basi obtusiusculâ brevissime petiolata. Capsula 9 lin. longa, pilosa. An var. angustifolia A. Wightianæ? (v. in h. Bentham).

6. A. WIGHTIANA (Arn.), herbacea, caule racemisque glanduloso-hirsutis, foliis subcordatis apicem versus attenuatis subsessilibus glabris margine et in ambitu supino scabris, racemis axillaribus terminaliisque simplicibus aut bifidis, floribus brevipedicellatis, lacinis calycis subulatis, fructu 12-spermo. (1) In Malabarica (Wight!). Katu-Karivi Rheed. h. mal. 9 p. 83 t. 44 (1). Radix ramosa, fusca. Caulis 1-1½ pedes altus, strictus, simplex, acute tetragonus, pilis articulatis capitatis patentibus vestitus. Folia opposita, articulis caulis breviora, 2½-2¾ lin. longa, prope a basi ½-1 poll. lata, hinc apicem versus attenuata acumine obtusiusculo, basi (nec profunde) cordata, petiolo brevisimis innixa, amplectentia. Folia inferiora et supraea paulo minora magisque ovata; summa denique in bracteas subulatas abeuntia. Racemi ex superiorum foliorum, inde a medio caule, axillis provenientes, a 3½-4 poll. decrescentes, patentes, stricti, plerique simplices, infimi basin versus ramulo breviore praediti, pollicis ferme spatio a basi florentes, tetragoni, glanduloso-pilosii. Flores distantes. Bracteæ oppositæ, ½-1 lin. longæ, lanceolato-subulatæ, subappressæ, glabrae, florigera paulo minor. Pedicelli bracteam subæquantes, glandulosos-asperi. Calyx 1½-1½ lin. longus, glaber. Corolla 4 lin. longa, glandulosopubescentia, purpurea. Barba antherarum densa, alba. Capsula 8 lin. longa, lanceolata, obtusa, apicem versus pilis glandulosis raris inspersa. (v. in h. Wight).
7. A. AFFINIS (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 116, Wight h. prorr. n. 2025), herbacea, foliis ovali-oblongis obtusis brevissime petiolatis supra strigosis subtus pubescens, racemis axillaribus dimidiato-cymosis trifidis dense glandulosopubescentibus, bracteis calycisque lacinis lanceolato-subulatis, capsula polyspermâ? (2) India orientalis in ruderatis umbrosis jugi Nilagirici (Schmidt!), prope Kaitis in Nilagiris, locis siccis (Perrottet! in h. DC. et in h. Nees ex h. mus. paris.), in montibus Marouguedo (Leschenault! in h. D.C.). Justicia lineata h. Wight! Wall. cat. n. 2486 a (ex parte). Ab A. lineata differt foliis (2 poll. longis ¼ poll. latis) ovali-oblongis obtusiusculis in petiolum 3 lin. longum canaliculatum birtulum desinentibus, in medio nec versus basin latioribus, supra setis incumbentibus strigosis et punctulatis subtus puberulis, racemulis ex superioribus axillis brevioribus (hinc caulis apice angustior) ½-1 poll., summis nudis, omnibus revrora bifidis cum flore intermedio, sed propter ramum internum plerumque abortivum et florem medium longius pedunculatum dimidiato-cymulosum, calycinis lacinis brevioribus et latioribus lanceolatis acutiusculis, bracteis etiam bracteolisque paulo latioribus. Corolla 5 lin. longa, pubescens, pallida, purpurea lineata. Antheræ violaceæ, basi distincte barbatæ. Variat caule glabro et laxe glanduloso-hirsuto. (v. in h. Wallich, Wight, DC., paris. etc.)
8. A. VISCOSULA (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 116), fruticosa, caule foliis oblongo-lanceolatis in petiolum attenuatis glabris, racemo terminali trifido glandulosopubescente, floribus secundis, capsula ovali octospermâ. (3) In India orientali (h. Heyn!). Justicia lineata Wall. cat. n. 2486 b. Fruticulus facie Myrtilli. Rami lignosi, dichotomi, trichotomi, coaretati, projecturis tetragoni, cortice glabro lenticellis griseis inæqualibus adsperso. Folia approximata, 1-1½ poll. longa, 5 lin. lata, rigidula. Inflorescentia terminalis, 2-4-pollicaris, subcorymbosa, pubescentia rigida capitata omnium partium, nulla immixta lanugine, vestita, composita ex racemulis partialibus oppositis, foliis superiorenum valde decessentibus axillaribus, 2-3 parium 2-1 poll. longis. Flores brevi spatio a basi ramuli incipientes, infimi quandoque oppositi, plerique alterni distributione secundi. Bracteæ et bracteolæ subulatæ, pedicello sesquilineari breviores. Calyx 2-2½ lin. longus, glandulosus, lacinis subulatis, inferiore, torsione superiora spectante, paulo breviore. Corolla 5

(1) Figura bona, sed ea, ut solet pictor h. mal., major solito. In descriptione styli nomine stamina, junctim considerata, cum suis antheris « capitulum » formantibus, graphicè describuntur.

lin. longa, pubescenti-glandulosa, albida, nervis quatuor principalibus purpureis lineata, præterque eos nervo singulo utrinque in latere laciniarum labii inferioris et superioris labii picta. Antherarum loculus inferior fere triangularis, basi in barbam producta; situs locularum magis quam in reliquis parallelus. Capsula semipollice longior, ovalis, depressa, dorso valvularum profunde canaliculato, glanduloso-hirta, in medio octosperma. Retinacula stipitata, lamellâ ovatâ obtusâ semen fulcipientia. (v. in h. Wallich).

9. A. CEYLANICA, herbacea, caule hirtulo, foliis oblongis brevissime petiolatis supra strigosis subtus pubescentibus, racemis axillaris terminalique dimidiatis glanduloso-pubescentibus, floribus longiusculae pedicellatis, laciinis calycis subulatis, capsula oblongo-lineari hirsuta 10-spermâ.  $\mathcal{U}$  In Ceylon (Walker-Arn.! in h. Hooker). A. viscosula propinquâ est foliorum figurâ et pedicellis longiusculis, differt autem hirsutie caulis et foliorum, racemis gracilioribus minus compositis et antherarum barbulâ exigua et paucis setulis constante. Ab A. affini, cui quod ad integumentum foliorum analoga, differt foliis minoribus apicem versus evidenter attenuatis, nec ovali-oblongis apice et basi parum decrescentibus obtusiusculis, nervis quoque minus fortibus. Folia 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, infra medium 3-4 lin. lata. Petiole linea vix longiores. Racemi pauciflori. Corolla glanduloso-pubescentis, resupinata 5' lin. longa. Reliqua omnino generis. Capsula ferè pollicaris. (v. in h. W.-Arn. et Hooker).
10. A. GLANDULOSA (Wight, N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 115, Wight h. propri. n. 2026), frutescens, caule foliis ovalibus petiolatis racemisque axillaribus bifidis subcymosis glanduloso-villosa, capsulis tetra- (octo?) spermis.  $\mathfrak{Z}$  In Mysore (Heyne!): *Justicia glandulosa* Roth nov. pl. sp. p. 13, Rœm. et Sch. syst. I p. 167; mant. I p. 146, Wall. cat. n. 2485. Caule lignoso pubescentia molli longâ apico capitata patente, immixta breviore, foliis minoribus pollicaribus sequipollicularibus obtusis longiusculae petiolatis, paniculis seu racemulis paucifloris laxis, calyce ratione corollæ amplio et latiusculo hoc in genere satis distincta species. (v. in h. Wallich et Wight).
11. A. ECHIOIDES (Nees ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 117, Wight h. propri. n. 2027, ic. t. 467), herbacea, hirsuta, foliis oblongis subsessilibus subcrenatis, racemis reflexis, capsulis tetraspermis.  $\odot$  In Coronandeliæ ruderatis frequens, floret per totum annum. (Roxb.! Wight!), ad Melloom in ripâ Irawaddi fluminis (Wall!), in Amata (Hamilton!), prope Pondichery (Perrottet! in h. DC. var.  $\alpha$ ), Cachemyr (Jacquemont! in h. mus. paris. et Nees n. 160 var.  $\beta$ ), ad castellum Sirhind, Augusto 1836 (Edgeworth! n. 260), prope Nahu in Himalaya alt. 3000', Octobri (Edgeworth! n. 261), Madras (Griffith! in h. Bentham), in Malabaræ et Ceylonæ locis incultis humidis et sordidis (Burmann Zeyl!) *Justicia echoides* Linn. fl. zeyl. p. 21, Vahl symb. 2 p. 14, en. I p. 123 et h.! (var.  $\alpha$ ), Willd. h. n. 362, fol. 1 (var.  $\alpha$ ) Rœm. et Sch. syst. I p. 119, mant. I p. 182, Roxb. fl. ind. ed. Car. et Wall. I p. 119, Burm. fl. ind. p. 9, Wall. cat. n. 2439 a-g. *Digitali* similis planta, bicapsularis, flore tubuloso, galea trifida et labio integrō obtuso constante Burm. thes. zeyl. p. 88. *Euphrasia* affinis Indica Echooides Herm. Lugdb. p. 668 ic. n. 669. Cominel. fl. nial p. 28. *Gratiola* affinis Echooides Zeylanica major Breyne. prodr. 2 p. 54. Petiv. act. lond. n. 244 t. 36. *Buglossum echooides* Zeylanicum, foliis Convolvuli Indici minoris corulei Breyne. cph. ac. nat. cur. ann. 4 et 5 obs. 159. Ray hist. I p. 428. Asperifolia Indica, foliis ex adverso hinis Ray hist. 3 p. 660? Pee Tumba Rheed. h. mal. 9 p. 87 t. 46. Kawatuwa et Kawatumba mus. zeyl. p. 13. Caulis erectus, strictus, pilis patentibus hirsutus. Racemi spiciformes floribus dissitis, folio in var.  $\alpha$  breviores, deflexi, in var.  $\beta$  sœpe longiores, dichotomi, patuli. Bractæ parvæ, altera opposita vacua patula, altera calyci appressa illoque multo brevior. Calycis laciñiae filiformes, pubescentes, hirtæ. Corollæ labium superius ovatum, integrum, album; inferius trifidum, apice purpureum, striatum, laciñiae ovatis obtusis, lateralibus angustioribus. Antherarum loculus inferior in primis longe denseque barbatus. (v. in h. madr.. Wallich, Wight, Bentham, paris., etc.).

- α. racemis subsimplicibus.
- β. racemis dichotomo-paniculatis.
- γ. *angusta*, foliis anguste cuneiformibus, racemis brevissimis paucifloris. — Sesamum digitalis hirsuta Ceylanica h. Mart. (Moll.). Justicia echioïdes h. Willd. n. 362 fol. 2 et 3 (spec. Vahl. hortense h. Royenii in h. DC.). Ruellia n. 780 Leschenault in h. DC. Balloe wanasse e Ceylon h. gen. berol. et Maha OEdetta ibidem.

*Species exlusa.*

A. HUMIFUSA Wight == *Erianthera serpyllifolia*.

---

N. B. Confer ad calcem volum. de Acanthaceis addendis



## Ordo CXLVI. PHRYMACEÆ (1).

Flores hermaphroditæ irregulares racemosi. Calyx liber, persistens, gamophyllum, tubulosus, limbo inæqualiter bilabiato. Corolla hypogyna gamopetala, tubulosa, limbo bilabiato. Stamina tubo corollæ inserta, 4, didynama. Antheræ didymobiloculares; loculis rimâ longitudinali dehiscentibus. Ovarium liberum, monomerum, uniloculare. Stylus terminalis, simplex; stigma bifidum; ovulum solitarium e basi fere ovarii erectum atropum (ut aiunt quidam orthotropum). Fructus caryopsideus, monospermus, calyce plicato-costato reconditus styloque persistente aristatus. Semen exalbuminosum. Embryon rectum, inversum, cotyledonibus ovalibus circa axim convolutis radiculâ hilo oppositâ superâ (2). — Herba Americana et simul Asia-tica, caulis tetragonis articulato-nodosis, foliis oppositis.

Ordo ex unico genere, *huc usque inter Verbenaceas aut Labiatas* (Bartl. ord. nat. p. 183) recepto constitutus; diversus tamen ab utrisque germine monomero, radiculâ superâ, cotyledonibus convolutis, neque minus habitu peculiari. Fructu Globularieis proxime accedit; differt autem ab iis ovuli insertione et situ, albuminis defectu, tum etiam inflorescentiâ et vegeta-tione.

I. PHRYMA Linn. amæn. 3 p. 19 et gen. n. 738. Gærtn. de fruct. 1 p. 363 t. 75. Lam. illustr. t. 516, non Forsk. — Leptostachya Mitch. gen. II.

Calyx tubulosus, 5-nervis, bilabiatus, labiis post anthesin conniventibus, superiore tripartito laciñi subulatis apice reduncis, inferiore brevissimo bifido. Corollæ tubo labiis calycis superius æquante, limbo bilabiato, labio superiore emarginato, inferiore majore trilobo, fauce nudâ. Stamina inclusa. Ovarium oblongum. Stylus filiformis; stigma breviter bifidum, cruribus anguste lamellaribus. Caryopsis calyce inclusa; pericarpio membranaceo, 5-nervi, stylo persistente terminato, semini adnato. Semen cavitatem pericarpii omnino implens. Reliqua ut in charactere ordinis. — Genus structurâ et patriâ per insigne, a nonnullis cum Privâ, maxime alieno, confusum, fructu jam a Gærtnero eximie explorato.

P. LEPTOSTACHYA (Linn. sp. pl. 838). (1) Hab. 1<sup>o</sup> in Americâ septentr. in umbris siccis fertilibus a Canadâ ad Carolinam (Ell., Bosc!), in Pensylvaniâ (Poeppig! Darling!), Vermont (h. Hook!), Ohio (Frank! un. itin. a. 1835); 2<sup>o</sup> in Nepaliâ Asiæ (Wall! cat. n. 2088). — Gærtn. 1. c. Lam. 1. c. — Plukenet alm. t. 380. f. 5. P. Carolinensis Walt. fl. car. p. 166. Herba, ut videtur, annua, pluripedalis, erecta, simplex vel brachiata. Caules tetragoni, lateribus alternis sulcati, supra foliorum insertionem articulato-nodosi, pubescentes. Folia opposita, ovato-oblonga, in petiolum longum attenuata, acuminata, grosse crenato-serrata, tenuiter membranacea, 5-7-nervia, utrinque piloso-hispida, subtus pallescentia. Racemi terminales et axillares, rhachi-

(1) Auctore Joanne Conrado Schauer.

(2) Semina perfecta in herb. rara, sed characteres ipse videt cl. auctor, ut monet in lit. et jam cel. Gærtner radiculam superam delineavit. (Alph. DC.)

strictâ basi longe denudatâ exserti. Flores oppositi paribus remotis, sub anthesi patentes, brevissime pedicellati, bracteâ bracteolisque duabus setaceis stipati. Calycis tubus lineam vix longus, glabriusculus, limbo oris pubescente; labium sup. e laeiniis 3 setaceis sibimet corollæque tubo parallelis apiceque reducens purpuraseentibus factum, calycis tubi tertium æquans; inferius brevissimum et obtuse bidentatum. Cor. albido-purpurascens. Calyces fructiferi reflexi, argute costati, clausi, in specim. Americanis 3, in Nepalensibus autem 4 lineas cum labio super. longi, præter quam mensuræ differentiam vero nullam inter utraque videbam. Caryopsis matura levigata, subtiliter 5-costata. ( v. s. in h. DC. aliisque. )

*Excludenda.*

PHRYMA Forsk. = Priva.

P. DEHISCENS Lin. fil. = Bouchea cuneifolia. ( Verbenacea. )

Ordo CXLVII. VERBENACEÆ (1) *Juss. in Ann. du Mus.* 7  
*p. 63. R. Brown prodr. p. 510. Bartl. ord. nat. p. 178.*  
*Lindl. introd. ed. 2 p. 277 Endl. gen. p. 632. Meisn. gen.*  
*tab. 290 et comment. p. 197 Mart. consp. p. 23. Benth. in*  
*Tayl. annals of nat. hist. 2 p. 446 et in Hook. journ. of*  
*bot. 2. p. 51. — Vitices Juss. gen. 106 (excl. sect. 3). —*  
*Pyrenaceæ Vcnt. tabl. 2 p. 315. DC. fl. franz. 3 p. 501. —*  
*Verbeneæ (Labiatarum sectio) ex parte Reichenb. consp.*  
*p. 117 et handb. des nat. Pflanzsyst. p. 190.*

Flores hermaphroditæ rarius polygamo-dioici, 4-5-meri, rarissime pleiomeri, nunc regulares vel subregulares, nunc bilabiati, unibracteati, bracteis post anthesin interdum increscentibus. Calyx liber, gamophyllus, 4-5- vel rarissime 6-8-fidus dentatusve, tubulosus vel cyathimorpho-campanulatus ore æquali vel obliquo vel subbilabiato, persistens, post anthesin magis minusve ampliatus et fructum maturum subtendens vel includens. Corolla hypogyna, decidua, gamopetala, tubulosa; limbo 4-5- vel rarissime (in Symphoremate) 6-12-fido, plerumque inæquali subsecundo subbilabiato, vel bilabiato, rarius vere æquali; laciniaæ æstivatione imbricatis, infimâ (anticâ) intimâ lateralibus tectâ, supremis (posticis) extimis. Stamina tubo corollæ inserta, inclusa vel exserta, 4-5 rarissime pluria, sæpiissime didynamia et omnia fertilia, rarius superiora ananthera vel rudimentaria. Antheræ biloculares, loculis rimâ longitudinali vel rarissime poro apicali dehiscentibus, parallelis, divaricatis, aut verticaliter superpositis; connectivum interdum appendice glandulosâ cristæformi vel claviformi auctum. Ovarium liberum, integrum, disco sæpius conspicuo annuliformi insidens, e carpidiis duobus vel quatuor confectum, carpidorum marginibus nunc disseminata primaria præbentibus 2-4-loculare, nunc iisdem in disseminata cavitatem bipartientia introflexis 4-8-loculare. Ovula in loculis plerumque solitaria, rarissime gemina collateralia vel bina opposita, in Verbeneis e basi loculi erecta vel adscendentia anatropa, in reliquis tribubus e spermophoro parietali in angulo centrali loculi adscendentie subpendula, amphitropa, micropyle inferâ. Stylus terminalis, simplex; stigma indivisum capitatum, aut obliquum declive aut bifidum crure altero dentiformi altero eoque stigmatifero complanato vel utroque acuto. Fructus aut capsularis 2-4- vel rarius 6-coecus, coccis sive nuculis maturitate secedentibus clausis monospermis et a receptaculo basilari disci-

(1) Auctore Joanne Conrado Schauer.

formi vel rarius unilaterali obliquo deciduis; aut drupaceus sarcocarpio vel succoso vel carnoso vel spongioso vel subnullo, pyrenis 2-4 jam intra carnem discretis, jam connatis, nec nisi basi ad axim perforato-distinctis, 1-2-loocularibus, putamine coriaceo, lignoso vel osseo, lævi vel rugoso vel lacunoso; aut capsulam coriaceam indehiscentem aut capsulam 4-valvem septicidam et simul loculicidam exhibens. Semina erecta, exalbuni-nosa; embryone recto, cotyledonibus crassis oleosis arte applicatis germinatione foliaceis, radiculâ brevi inferâ. — Herbae vel sæpius fruticuli vel frutices, interdum arbores elatae ligno duro, plerumque vestitæ et sæpe glandulis resinosis sessilibus punctatae ideoque aromaticæ vel fætidæ caulibus imprimisque ramulis tetragonis. Folia opposita vel verticillata, rarissime alterna nunc simplicia incisa vel divisa rariusve integerrima nunc digitata. Stipulæ nullæ. Inflorescentia vel indefinita (centripeta) racemosa spicata capitata, vel definita (centrifuga) di- aut trichotomo-cymosa, cymis axillaribus aut in paniculam terminalem collectis. Calyx cum pedicello et bracteis sæpius coloratus, fructiger sæpius valde auctus membranaceus aut induratus aut fatiscens aut cum fructu partibilis. Corolla alba, rubescens, violacea, cœrulea, flavescentia coccinea, plerumque exigua, paucis conspicua.

Verbenaceæ magnâ copiâ crescunt inter tropicos utriusque hemisphærii; Verbeneæ in Americâ prævalent, Viticeæ in Asiâ; pauca species in Africâ et Australasiâ, paucissimæ in Europâ occurunt. Singulæ species sæpius per vastissimas plagas sunt distributæ, imprimis Americanæ; nonnullæ simul in Americâ merid. et Africâ australi proveniunt (*Lippia asperifolia*); paucissimæ cosmopolitæ (*Verbena officinalis* et *Lippia nodiflora*) in temperatis et calidissimis circa orbem habitant. Parco omnino numero in temperatis vigint; frigidas hiemes fere omnino fugiunt.

Ordo, heterogeneis plantis sic depuratus, naturalissimus, Labiatis sane proxime affinis, tum etiam Boraginearum et Scrophulariacearum hinc inde commonens. Labiatis proxima tribus est Verbenearum, quæ vero maxime recedit ab illis inflorescentiâ centripetâ, et insuper, ut et reliquæ tribus, ovario integro, stylo terminali, et fructus fabricâ. Cum Selagineis et Myoporineis iis affinitas est minus arcta; illis habitu nonnullæ Verbeneæ accedunt; distinguitur uterque ordo radiculâ superâ, ille insuper antheris unilocularibus et foliis sparsis. — Phrymaceæ, hic primum separatæ, recedunt ovario monomero, radiculâ superâ. — Quod ad generum circumscriptionem sumini Jussiæi verba

meminisse non abs re videbatur : " Le fruit suffit pour établir les principales différences entre les genres.... ; il doit fournir dans cette famille les premiers caractères génériques. "

*Bravaisia* DC. (cfr. vol. 9. p. 240 adn. 1), propter habitum neque minus ovarii et ovulorum conditionem horumque insertio-  
nem certo non ad Verbenaceas pertinet, sed et nostro judicio ad  
Bignoniaceas referenda videtur donec fructus innotuerit. —  
*Buchia* Kunth in H. et B. pertinet ad Rubiaceas. — *Chilianthus*  
Burch. ad Scrophulariaceas vol. 10, p. 435. — *Hilsenbergia* (Tausch  
in Sieb. fl. maur. exs. 2. n. 160. Reichenb. consp. n. 2932.  
Meisn. gen. comm. 198), quantum ex imperfecto specimine  
cognovi certo non ad Verbenaceas sed potius ad Solanaceas  
pertinet, uti putat Meisnerus. — *Nuxia* Lam. ad Scrophulariaceas  
v. 10, p. 434. — *Patagonula* Linn., quod genus ad Verbena-  
ceas verisimiliter referendum opinatur cl. Alph. De Candolle  
(v. 9, p. 467 adn.), ab eo ordine discrepat habitu, inflorescen-  
tiâ, calyce et fructu. — *Perama* Aubl. — *Mattuschkia* Schreb.,  
a *Jussiæo* et *Kunthio* Verbenaceis inscripta, pertinet ad Rubia-  
ceas Spermacoreas ! (conf. Endl. gen. n. 3128 et Walp. Repert.  
2 p. 467). — Plantæ aliorum ordinum generum Verbena-  
earum titulo perperam ornatae ad calcem eorum generum sunt  
indicatae.

## CONSPECTUS TRIBUUM.

### Tribus I. VERBENEÆ.

Inflorescentia indefinita. Ovula e basi loculi erecta, anatropa.

#### A. Ovarii loculi binovulati.

Subtribus I. *Spielmannieæ*. — Flores singuli axillares. Calyx 5-partitus.  
Drupa monopyrena, bilocularis. — Frutices Capenses... Gen. I.

#### B. Ovarii loculi uniovulati.

Subtr. II. *Monochileæ*. — Racemi laxiflori. Calyx subbilabiatus. Cor.  
unilabiata. Drupa subcarnosa. — Herba Brasiliensis..... Gen. II.

Subtr. III. *Cassellieæ*. — Racemi axillares pauciflori. Calyx tubulosus.  
Cor. infundibularis. Drupa subcarnosa. — Herbæ vel suffrutices Americæ  
tropicae..... Gen. III—IV.

Subtr. IV. *Verbeneæ*. — Capitula vel spicæ vel racemi. Calyx campanu-  
latus vel tubulosus. Corolla tubuloso-subhypocraterimorpha, limbo obliquo  
vel subbilabiato vel ringente. Capsula demum in coccos clausos separabilis.  
— Herbæ et frutices..... Gen. V—XII.

Subtr. V. *Lantaneeæ*. — Capitula vel spicæ. Calyx brevitubulosus mem-  
branaceus. Corolla tubuloso-subhypocraterimorpha, limbo obliquo subbilabi-  
ato. Drupa dipyrena, pyrenis unilocularibus. — Frutices plerumque  
Americanæ..... Gen. XIII.

Subtr. VI. *Duranteæ*. — Racemi laxiflori. Calyx tubulosus vel cyathimorphus, frutiger valde auctus. Corolla campanulata aut hypocaterimorpha. Drupa 2-4-pyrena, pyrenis bilocularibus. — Frutices Americani..... Gen. XIV—XV.

Subtr. VII. *Petreaæ*. — Racemi laxi. Calyx cyathimorphus 5-dentatus, epicalyx magno 5-phyllo colorato inferne tubo calycis coadunato auctus et involucratus. Capsula coriacea indehiscens. — Frutices Americani plerumque volubiles..... Gen. XVI.

### Tribus II. VITEÆ.

Inflorescentia definita, di-trichetomo-cymosa. Ovula supra basin loculi ad angulum centralem inserta, pendula, amphitropa vel sub-anatropa.

Subtr. VIII. *Symploceæ*. — Cymæ contractæ paucifloræ, involucratae. Capsula coriacea indehiscens. — Frutices volubiles Indiæ orientalis..... Gen. XVII—XIX.

Subtr. IX. *Caryopterideæ*. — Cymæ exinvolutrate. Capsula maturitate 4-valvi partibilis. — Frutices Asiatici..... Gen. XX—XXIII.

Subtr. X. *Viticeæ*. — Cymæ exinvolutrate. Drupa succosa, carnosa, spongiosa-tuberosa, rarissime nucamentacea. — Arbores et frutices..... Gen. XXIV—XXXVII.

Sequuntur genera Vitcea dubia nonnulla.

### Tribus III. AVICENNIEÆ.

Inflorescentia capitata vel spicata centripeta. Flores bractea bracteolisque geminis squamæformibus imbricatis sussulti. Calyx 5-phyllo. Corolla subregularis 4-fida. Ovula in loculo gemina, ex apice axeos pendula, amphitropa. Capsula coriacea, indehiscens, embryo intra pericarpium germinante deinde effracta. — Arbusculæ ad oras maritimæ limosas inter tropicos totius orbis gregarie crescentes. Gen. XLII.

### Tribus I. VERBENEÆ.

Inflorescentia indefinita, racemosa, spicata vel capitata. Ovula e basi loculi erecta, anatropa. — Herbæ aut frutices, rarissime arbores. Folia simplicia, sæpius divisa, nunquam vero composita. — Verbeneæ Benth. l. c. ex parte.

#### A. Ovari loculi binovulati.

##### Subtribus I. SPIELMANNIEÆ.

Flores singuli axillares. Calyx 5-partitus. Drupa monopyrena, bilocularis.

I. SPIELMANNIA *Med. act. acad. theod. palat. vol. 3 phys. 196. tab. 10. Juss. gen. p. 109. Endl. gen. n. 3694. Meissn. gen. p. 291 et comment. p. 199. Harvey gen. of south-af. pl. p. 270. — Oftia Adans. fam. 2, p. 199.*

Calyx 5-partitus, persistens. Corolla hypocaterimorpha, tubo basi subgloboso ovarium ambiente, fauce villis clausâ, limbo 5-fido subæquali pa-

tente. Stamina 4, corollæ tubo inserta, didynama, inclusa; antheræ loculi oppositi paralleli. Ovarium bilocular, ovis in quolibet loculo geminis, fenestræ dissepiimenti basi affixis. Stylus brevis, persistens. Stigma uncinatum. Drupa succosa, monopyrena; pyrenâ biloculari, dissepiimento in medio fenestrato, fenestrâ amplâ membranâque sub maturitate obolescente clausâ; putamine duro reticulato-rugoso. Semina in utroque loculo bina, amborum loculorum sæpius coherentia, testâ atrâ striatâ alutacea. Embryonis radicula infera recta. — Frutices Capenses. Folia opposita ternave, denticulata. Flores in axillis summis solitarii, sessiles, ebracteolati. Corolla alba. Drupæ nigræ.

1. S. JASMINUM (Med. l. c.), tota hirtella pilisque glanduligeris scabrida, folijs confertis oppositis oblongo-vel elliptico-ovatis sessilibus alâque angustâ utrinque decurrentibus acuminatis marginèque reflexo tenuiter et inæqualiter acute dentatis lineato-subrugosis undulatis, calyce quam corollæ tubo cylindrico duplo breviore glanduloso-hirtello, laciñiis lanceolato-subulatis.  $\beta$ . Vulgaris in campis capitis Bonæ Spei (Sieber! fl. cap. n. 156. Drège!). S. Africana Willd! spec. 3 p. 321. Bot. Mag. t. 1899. S. decurrens Mœnch. Lantana Africana L. hort. cliff. 320. Lant. Capensis Thunb. fl. cap. 453. Lant. crispa Thunb. ibid.? Commel. pl. rar. amst. 6. tab. 6. Frutex adscendens aut procumbens, ex soli et loci conditione variabilis. (Harvey l. c.)

$\beta$ . nitida, foliis duplo minoribus scabridis utrinque nitidis tubo corollæ calycem æquante, limbo exiguo. Drège! pl. cap. promiscue cum genuinâ. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)

2. S. REVOLUTA (E. Meyer! comm. pl. afr. 1 p. 274), tota canescens subter hirsutie sparsâ simplici pube densâ glanduloso-hirtâ, foliis imbricatis ternis lanceolatis sessilibus revolutis margine denticulatis acutis, calyce quam corollæ tubo infundibulari duplo breviore hirto, laciñiis linearisubulatis.  $\beta$ . In Capite Bonæ Spei in montosis saxosis ad Elleboggfontein et Kuil (Drège! Eckl. et Z.). S. desertorum Eckl. et Zeyher! pl. cap. exs. Frutex ramosus, ramis undique foliis obtectis. Folia 4-6 lin. longa, valde revoluta. Cor. tubus 3 lin. longus, intra calycem glaber, superius et in faucibus hirsutiusculus. (v. in h. DC.)

### B. Ovariū loculi uniovulati.

#### Subtribus II. MONACHILEÆ.

Racemilaxiflori. Calyx subbilabiatus. Corolla tubulosa, unilabiata. Drupa subcarnosa.

II. MONOCHILUS Fischer et Meyer ind. sem. hort. petrop. l. (1835) 34. Endl. gen. n. 3686. Meissn. gen. 290 et comm. 199.

Calyx fere cyathimorphus, subbilabiato-obliquus, 5-fidus. Corolla inferne tubulosa, limbo antice fisso in labium ascendens 5-fidum porrecto. Stamina 4, subæqualia, medio tubo corollæ inserta, exserta; antheræ cernuæ, basi sagittatae. Ovarium annulo hypogyno insidens, 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus capillaris, stamna æquans, stigmate punctiformi. Drupa calyce valde aucto basi velata, subcarnosa, pyrenis 4 (vel abortu paucioribus), putamine coriaceo. Semen erectum. Cotyledones crassæ sibimet applicatae. Radicula brevis.

M. GLOXINIFOLIUS (F. et M. l. c.)  $\mathcal{U}$  In Brasiliæ silvis primævis ad Macahé (Riedel!). Herba humilis, subviseide pubescens, rhizomate repente. Folia alterna vel subopposita, longe petiolata, membranacea, oblonga, utrinque acuminata, repando-dentata, supra viridia, subtus saepè purpurascens. Racemi axillares et terminales, digitales, laxiflori; flores pedicellati, pedicellis in medio bibrac-

teolatis. Corolla albidæ tubus 4, limbus 3 lineas longus, hujus laciniis laterilibus reflexis. (v. s. in h. caes. petrop.)

Subtribus III. CASSELIEÆ.

Racemi axillares pauciflori. Calyx tubulosus. Corolla infundibularis. Drupa subcarnosa.

III. CASSELIA Nees ab E. et Mart. nov. act. acad. nat. cur. xi. p. 73. tab. 6. Endl. gen. n. 3688. Meissn. gen. 290 et 199, non Dumort.

Calyx tubulosus, sursum paulatim ampliatus, plicato-5-costatus, valleculis membranaceis, costis herbaceis in dentes 5 æquales excurrentibus. Corolla infundibuliformis, tubo brevi cylindrico, limbo 5-fido lobis subinæqualibus. Stamina 4, didynama, in inferiore tubi parte abscondita; filamenta brevissima, superiora sensim in connectivum nutans dorso cristâ glandulosâ auctum abeuntia. Antherae connectivo dorsali insertæ, biloculares, loculis longitudinaliter dehiscentibus: antheralorum superiorum et connectivo pendulus divergentibus, inferiorum parallelis. Ovarium biloculare, loculis uniovulatis, ovulo prope basin ad angulum internum loculi affixo. Stylus stamna inferiora adæquens; stigmate terminali oblique peltato. Drupa obcordiformi-subturbinate, calyce ampliato velata, subcarnosa, dipyrena, pyrenis unilocularibus maturitate secedentibus, putamine coriaceo. Cotyledones applicitæ. Radicula brevissima. — Fruticuli aut herbæ Brasiliensia humilia, radice nodosâ, foliis membranaceis oppositis integrerrimis serratis subtus pallidis, racemis axillaribus laxis paucifloris, floribus parvis minute bracteolatis.

1. C. INTEGRIFOLIA (Nees et Mart. l. c. tab. 6 B.), fruticulosa, ramis tetragonis scabro-pubescentibus, foliis oblongo-lanceolatis in petiolum attenuatis acuminatis integrerrimis aut antice dente uno altero serratis glabris nitidis, racemis pedunculatis folio multo brevioribus, calyce pedicello duplo longiore dentibus triangularibus acuminatis, corollâ calycem dimidio excedente. ♂ In Brasiliæ silvis aboriginibus prov. Bahiensis (Princ. Maximil. Wied!) et pr. Rio de Janeiro (Riedel!). Duranta Fischeberi Mart.! in Flora 21, 2. Beibl. p. 60. Fruticulus vix pedalis, recemis superne 3-5-floris. Corolla alba extus pallide lilacina. (v. in h. Mart. et caes. petrop.).
2. C. SERRATA (Nees et Mart. l. c. t. 6. fig. A), fruticulosa, ramulis-tetragonis petiolisque hirtello-pubescentibus, foliis lanceolato-oblongis oblongisve utrinque acuminatis basi integrerrimâ in petiolum marginatum abeuntibus dentibus ellipticis grosse serratis margine subtusque in nervis scabris reliquo lœvibus, racemis folio brevioribus, calyce quam pedicellus duplo longiore dentibus e basi lato-triangulari subulato-acuminatis, corollâ calyce paulo longiore. ♂ In Brasiliæ prov. Bahiensi (Princ. Maximil. Wied!). Fruticulus subpedalis patentissimæ. Folia penninervia, venosa, subtus pallidissima, dentibus muticis. Racemi scabri, remote 5-8-flori, rhachi tenuissimâ. Corolla alba fauca purpureo-variegatis. (v. s. h. Mart.)
3. C. MANSOI (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), herbacea, caulinibus quadrangularibus puberulis aut glabriusculis, foliis ovatis basi subtruncato-cuneatâ subito in petiolum brevissimum coarctatis acuminatis dentibus ellipticis grosse serratis lœvibus, pedunculo folio breviore, calyce pedicello duplo triplo longiore dentibus subulatis, corollâ calycem dimidio excedente. ♀ In Brasiliæ Morro do Ernesto pr. Cujaba (da Silva-Manso! in Mart. h. bras. n. 1025). Sequenti proxima, tamen diversa racemis brevius pedunculatis, floribus conspicue minoribus. Foliorum serraturæ antrorsæ acuminatæ. Pedunculi circ. 8 lineas longi, apice racemulum plerumque triflorum gerentes. Calyx sesquilineam longus, scabro-pubescentis. (v. in h. Mart.)

4. C. CHAMÆDRYFOLIA (Cham.! in Linnaeâ 7, p. 365), herbacea, caulis quadrangularibus tenuissime puberulis glabrisve, foliis ovatis ovato-ellipticis oblongisve basi integerimâ in petiolum breve attenuatis coarctatisse auctis subaeuminatis dentibus ellipticis grosse serratis laevibus, pedunculo folium subæquante vel excedente, ealyce pedieello duplo triplove longiore dentibus e basi triangulare subulato-euspidatis, corollâ ealyce duplo majore.  $\mathcal{L}$  In Brasilâ paseuis uliginosis, ad Bom-Retiro (Sellow!), ad fl. Paranahyba et Rio-Preta (Pohl!), in prov. Piauhy et Goyaz (G. Gardn.! n. 3371). Radix tuberosa, caules adseidentes spithameos-dodrantales emittens. Folii serraturæ latæ obtusiusculæ, acutæ vel acuminatæ. Pedunculi tenues, sæpius longo exserti, apice sæpissime 2- rarius 3-4-flori. Calyx  $2\frac{1}{2}$ -3 lineas longus. Cor. pro genero magna. (v. s. in h. berol., vindob. et Mart.)
5. C. VERONICÆFOLIA (Cham.! l. e. p. 364), herbacea, caulis tetragonis pubescensibus, foliis lanceolatis vel lanceolato-oblongis basi integerimâ in petiolum brevissimum attenuatis acuminatis grosse et acute serratis adultis glabratâ ambitu scabro, pedunculis bifloris, pedicellis pedunculo et ealyce longioribus folio vero multo brevioribus, ealyceis dentibus subulatis, corollâ ealyce duplo majore.  $\mathcal{L}$  In Brasilâ meridionali (Sellow! Pohl! Vauthier!). Caules spithamei. Flores erecti; ealyx 3 lin. longus. (v. s. h. berol. et vindob.)

IV. TAMONEA Aubl. guian. 660 t. 268. Gertn. de fruct. 3 t. 213. Endl. gen. n. 3696. Meisn. gen. 291 et comm. 200. — Gbinia Schreb. gen. n. 42. Siv. fl. ind. occid. 2. p. 1087 t. 21. — Leptoearpus Willd. mss. ex Link Jahrb. d. Gew. 1, 3 p. 51. — Kämpfera Houst. reliq. p. 3 t. 2. — Ischnia (1) DC. in Meisn. pl. vase. gen. p. 298, comm. p. 206. prodr. 9, p. 257 (inter Sesameas).

Calyx tubulosus, plicato-5-costatus, valleculis membranaceis, costis herbaceis in cuspides 5 subuliformes et subæquales super os truncatum exsertis. Corolla subinfundibuliformis, tube gracili calycem subæquante, limbo æqualiter et obtuse 4-lobo: lobo supremo cresto, infimo deflexo, lateribus minoribus brevioribusque. Stamina 4, didynama, in inferiore tubo abscondita; filamenta brevissima. Antheræ biloculares, e connectivo dorsali nutantes; connectivo antherarum superiorum dorso citra apicem appendice grossâ elevata glandulosa munito, inferiorum mutico; loculis rimâ longitundinali delhiscentibus. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus stamina inferiora adæquans, apice grosse capitatus, stigmate unilaterali obliquo. Drupa subcarnosa, subturbinata, calyco membranaceo cyathiformi semivelata, monopyrena, pyrenâ 4-loculari, putamine axi perforato dissepmensisque osseis. Semen erectum. Cotyledones applicitæ, Radicula brevissima. — Suffrutices aut herbæ Americanæ, caulis ramisque strictis quadrangularibus striato-sulcatis, foliis oppositis parvis inciso-serratis, racemis axillaribus unilateralibus solitariis strictis, corollâ parvâ cœruleâ.

1. T. VERBENACEA (Swarz prodr. fl. ind. occid. 94), pubescens, ramis tetragonis, foliis ovatis petiolatis inciso-serratis superioribus subpinnatifidis, racemis erectis elongatis sparsifloris, drupâ ad angulos verticis 4-spinosâ spinis patentibus.  $\mathfrak{z}$  In insulis Caribœis (Sw.). Ghinia verbenacea Sw. fl. ind. occid. 2 p. 1089. tab. 21. f. a. Verbena eurassavica L. sp. p. 28. Tamonca curassavica Pers. syn. 2 p. 139. Kämpfera Houst. Banks reliq. Houst. 3 t. 2. Hermann parad. 240. Caulis basi suffruticosus, erexitus, subramosus, sesquipedalis, ramulis erectiuseulis. Folia nervosa. Flores subsessiles, remoti, parvi, albidi.

(1) Ischnia, quam pater ex iconie imperfectâ Fl. mexie. ined. descriptis, vere species præsentis generis videtur. Convenit fere cum T. scabriæ, sed planta figura vix ultra semipedem longa, et herbacea, annua, nec suffruticosa. An specimen junius figuravit pictor? (Alph. DC. )

- Calyx suhcampanulatus, membranaceus, dentibus aristæformibus suhnlatis. Drupa carnosa, turbinato-tetragona (Swartz.)
2. T. SCABRA (Cham. et Schlecht! in Linnæa 5, p. 99), undique scabride pubescens, ramis quadrangularibus lateribus foliis subjectis tenuiter 2-3-sulcis, foliis ovatis acutis in petiolum acuminatis grosse et argute serratis, racemis filiformibus erectis elongatis sparsifloris, drupâ ex angulis verticis 4-spinosâ, spinis anticis distansibus longioribus patentibusque, posticis approximatis erectis. ♂ In Mexici region. calidis, ex. gr. pr. Punta del Rey, Hacienda de la Laguna inter Mesachica et Mapilque (Schiede! pl. mex. n. 138). Ischnia verbenacea DC. prodr. 9 p. 257? Suffruticosa, sesquipedalis aut minor, a basi ramosa. Folia  $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$  pollicaria, longiusculæ petiolata, penninervia basi trinervi, subtus pallida et in nervis præcipue pubescentia. Racemi rhachi basi longe denudatâ exserti, semipedales. Flores satis remoti, brevipedicellati. Calyx fere 2 lin. longus. Drupa turbinato-tetragona vertice depresso, spinis tereti-subulatis, anticis lineam longis. Proxima certo præcedenti, sin modo diversa. (v. s. in h. reg. berol.)
3. T. minor (Cham. et Schl. in Linnæa 6 p. 373), foliis minoribus, drupâ paulo majore brevius spinosâ usque ad spinarum basin calyce tectâ. In Mexico ad littora arenosa ad Laguna Salada reg. calid. (Schiede!). Flores magni. Corolla pallide rubella fauce atropurpurea. (v. s. h. berol.)
3. T. JUNCEA (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), undique scabride pubescens, ramis quadrangularibus lateribus foliis subjectis profunde trisulcis, foliis subtriangularibus basi truncatâ brevissime petiolatis grosse inciso-serratis margine revoluto, racemis abbreviatis, drupâ ad angulos verticis depresso subquadriati corniculata, corniculus anticis brevibus, posticis subboletis gibbiformibus. ♂ In Brasiliæ prov. Bahiensi (Blanchet! n. 2566 et 3397). Sequenti babitu simillima, sed notis allatis bene distincta. (v. in h. DC.)
4. T. SPICATA (Aubl.! l. c.), piloso-subhirsuta, ramis quadrangularibus, lateribus foliis subjectis profunde trisulcis, foliis subovatis basi subtruncatâ petiolatis inciso-serratis, racemis exsertis, drupâ muticâ vertice rotundato. ♂ In India occid. (Sw.), in siccis apricis Venezuela (U. et B., E. Otto! n. 983 et 1041), Guiane (Aubl., Perrottet! Leprieur!), et Brasiliæ prov. Bahiensi (Sell.! Blanchet! n. 403 Salzm! n. 434). T. mutica Swartz prodr. 94. et fl. ind. occid. 2 p. 1090. Leptocarpus chamædrifolius Willd. h. Link l. c. (v. in h. DC. et reg. berol.)

### *Species exclusa.*

T. LAPPULACEA Poir. = Priva echinata Juss.

### Subtribus IV. VERBENEÆ.

Racemi, spicæ vel capitula terminalia et axillaria. Calyx campanulatus vel tubulosus. Corolla tubuloso-hypocraterimorpha, limbo obliquo subhilabiata vel ringente. Capsula maturitate in cocos separabilis.

### *CONSPECTUS GENERUM.*

V. *Mallophora*. — Flores capitati. Cal. 4-partitus. Stam. 4. Capsula globosa, fragilis, quadrilocularis axi hiante. — Frutices Novæ-Hollandiæ.

VI. *Chloanthes*. — Flores axillares solitarii. Calyx campanulatus 5-fidus, patulus. Corolla tubulosa ringenti-subhilabiata. Stam. 4. Capsula dicocca, coccis bilocularibus. — Frutices Novæ-Hollandiæ.

VII. *Priva*. — Flores racemosi vel spicati. Calyx tubulosus. Corolla fere hypocraterimorpha limbo subinæquali obliqua. Stam. 4.

*Capsula dicocca*, coccis bilocularibus, vel abortu unilocularibus. — *Herbæ Americanæ, Africanæ et Asiaticæ.*

**VIII. *Dipyrena.*** — Flores spicati. Calyx tubulosus. Corolla infundibuliformis tubo elongato. limbo inæquali. Stam. 4. Capsula dicocca, coccis bilocularibus. — *Frutex Andiculus.*

**IX. *Verbena.*** — Flores spicati vel capitati. Calyx tubulosus. Stam. 4. Capsula 4-cocca, coccis unilocularibus. — *Herbæ, rarius suffrutices, in Americâ copiosissimæ, in reliquo orbe sparsæ.*

**X. *Bouchea.*** — Flores brevipedicellati laxe racemosi. Calyx tubulosus plicatus. Stam. 4, antherarum loculis appositis. Capsula dicocca, coccis elongatis unilocularibus. — *Herbæ vel fruticuli partim Africani et Asiatici.*

**XI. *Stachytarpha.*** — Flores sessiles spicati vel capitati. Calyx tubulosus plicatus. Stamina 2, antherarum loculis superpositis. Capsula dicocca, coccis elongatis unilocularibus. — *Herbæ vel fruticuli Americani, pauci Africani et Indici.*

**XII. *Lippia.*** — Flores capitati vel spicati, bracteati. Calyx membranaceus brevis (villosum). Stamina 4, anther. loculis appositis. Capsula dicocca, coccis brevibus unilocularibus. — *Frutices vel herbæ præcipue Americani.*

**V. MALLOPHORA** *Endl. gen. suppl. 1 n. 3694 et in annal. des Wien. Mus. 2. p. 206, Meisn. gen. p. 291 et comm. 199.*

Calyx 4-partitus, persistens, lacinii linearibus. Corolla infundibuliformi-tubulosa, tubo recto æquali calycem superante, limbi 4-fidi lacinii æqualibus obtusis erectiusculis. Stamina 4, corollæ fauci inserta, breviter exserta, æqualia. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis, ovulis adscendentibus. Stylus filiformi-subulatus, exsertus, stigmatè obtuso. Drupa secca calyce connivente recondita, globosa, fragilis, quadrilocularis, axi hiante. Semina in loculis solitaria, erecta. — *Frutices Novæ-Hollandiæ austro-occidentalis, dense lanato-tomentosi, foliis oppositis subsessilibus rigidis, capitulis terminalibus solitariis vel corymbosis, floribus bracteatis bracteis exterioribus involucrantibus, corollis albis* (*Endl.*). — *Genus Chloanthi affine videtur. Num vere hujus loci?*

1. **M. GLOBIFLORA** (*Endl. l. c.*), capitulis solitariis. ♂ In Novæ-Hollandiæ austro-occidentalis interioribus (*Röö*). Ramuli subfastigiati apice dichotomi, tomento stellari adpresso sordide ferrugineo obtecti. Folia elliptica, utrinque obtusa  $2\frac{1}{2}$  lin. longa, 1 lineam lata, petiolo brevissimo subsessilia, supra pallide viridia tomento cinereo raro conspersa marginibusque revolutis rugosa, subtus tomento densissimo cinereo nervo medio prominulo obtecto. Pedunculi in ramulis terminales, solitarii, semipollicares, tomentosi, monocephali. Pedicelli sesquilineares, seni-quindeni subcorymbosi, in capitulum approximati, lanâ densâ candidissimâ patente vestiti, singuli bracteâ linearî laxatâ stipati, extinorum 4-5 bracteis oblongo-lanceolatis obtusis sesquilinearibus ferrugineo-tomentosis involucrum constituantibus. Calycis laciniae obtusæ, lineam longæ, intus virides, extus lanâ densâ candidâ in pedicellum docente vestitæ, in globum diametri bilinearis conniventæ. Corollâ tubo calycem paulo superante. Drupa parva, globosa, tomentosa, styli delapsi cicatricula umbilicata, fragilima, 4-locularis, dissepiamento ad axim hiante (*Endl.*).
2. **M. CORYMBOSA** (*Endl. l. c.*), capitulis terminalibus corymbosis. ♂ Crescit

cum præcedente (Roë). Differat ab eâ : ramis ramulisque densissime lanato-tomentosis ; foliis 4 lin. longis 1 lin. latis, utrinque densissime lanatis, marginibus revolutis rugosissimis glabratris ; pedunculi terminalis pollicaris lanâ longâ fuscescente; capitulis corymbosis paucifloris; involucri bracteis calycibusque lanâ laxiore longiore vestitis; floribus paulo majoribus (Endl.).

VI. CHLOANTHES R. Br. prodr. p. 513. Ferd. Bauer illustr. pl. nov. Holl. t. 4.  
Endl. gen. n. 3691. Meisn. gen. p. 280 et 194.

Calyx campanulatus, 5-fidus vel 5-partitus, subæqualis, patulus. Corolla tubulosa, tubo supra ovarii verticem interne annulo lanato prædicto, fauce ampliatâ, limbi ringentis labio superiore bifido, inferioris tripartiti lobo intermedio longiore. Stamina 4, corollæ tubo inserta, didynama, nunc exserta nunc inclusa; antheræ supra basin bifidam dorso insertæ, oblique incumbentes, loculis parallelis. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis, stamina subæquans. Stigma bifidum cruribus acutis. Capsula calyci inclusa, obovata, receptaculo brevissimo disciformi insidens, dicocca, basi perforata; cocci commissurâ lœvi planâ a basi ad medium tamen canaliculato-impressâ sibimet arcte appliciti, maturitate subsponte secedentes, biloculares, loculis arctis monospermis lacunâ ampliusculâ inani commissurâ contrariâ disjunctis, putamine osseo. Embryon in albumine tenui peripherico axile, erectum, radiculâ inferâ. — Fruticuli Novæ-Hollandiæ extratropicæ, habitu mire congruo, densifolii, vestiti, foliis oppositis ternisve sessilibus et sæpius decurrentibus linearibus revolutis bullato-rugosissimis-tuberculatisve, floribus axillariis solitariis brevipedunculatis bibracteolatis citra apices ramulorum sæpe racemoso-congestis.

1. C. GLANDULOSA (R. Br.! l. c.), ramis foliorumque costâ dorsali calyce corollâque piloso-villosis et cum foliorum paginâ inferâ grosse glanduloso-punctatis, foliis oppositis alato-decurrentibus lanceolato-linearibus sursum sensim attenuatis supra muriculatis pubete glandulosâ scabridis bullato rugosissimis margine revolutis, pedunculis basi bracteolatis, calyce semiquinquefoli lacinias lanceolato-subulatis revolutis, corollâ calycem duplo superante. ♂ In Novâ-Hollandiâ orientali ad Port Jackson (R. Br.! Sieber! fl. nov. holl. exs. n. 581. All.-Cunn.!). Fol. infer. patentissima,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, prope basin 2-4 lin. lata. Calyx fere semipollicaris, lacinias uninerviis marginibus revolutis non rugosis. Cor. flavescens. Stamina inferiora longe exserta cernua, superiora latio super. applicita. (v. in h. DC.)

2. C. BARTLINGII (Lehm.! ind. sem. hort. Hamburg. a. 1844), ramis foliorumque dorso lanâ albâ tomentosis, foliis sparsis ternisve subverticillatis erecticulis rite sessilibus linearibus superne paulo attenuatis supra demum glabratris nitidis tuberculato-bullatis, pedunculis inferne bracteolatis, calyce profunde 5-partito lacinias bracteolisque anguste linearibus acutis membranaceis planis lanato-villosissimis, corollâ calycom triente superante villoso-tomentosâ. ♂ In Novâ-Hollandiâ austro-occid. (Drumnn.!), in calculosis ad radices jugi montium Darling's-Range (Preiss! n. 2340). — Bartl.! in Lehm. pl. preiss. 1, p. 352. Folia internodiis duplo fere longiora, haud decurrentia, supra obscure viridia, tuberculis marginalibus majoribus subrotundis subdepressis uniseriatis, tuberculis areæ minoribus subquadriserialibus. Flores in spicam terminali, digitalem, laxiusculam, pilis albis longis ramosis eximie villosam congesti. Folia floralia lanceolata, acuminata, subtrinervia, margine bullato-tuberculato; superiora oblongo-lanceolata, acuta, plana, lœvia, albido-lanata, flores superantia. Calycis laciniae 5-6 lin. longæ. Bracteolæ lacinias calycis simillimas easque longitudine subæquantes, utræque virides. Corolla pallide rosea, subcampanulato-tubulosa. Genitalia inclusa. (v. in h. DC.)

3. C. COCCINEA (Bartl.! in Lehm. pl. preiss. 1 p. 352), ramis foliorumque dorso

lanâ niveâ tomentosis, foliis oppositis ternisve erectis connato-decurrentibus anguste linearibus supra muriculis raris scabris cæteroquin glabris nitidis, pedunculis medio bracteolatis, calyce profunde 5-partito extus hirsutissimo, lacinias bracteolisque membranaceis lanceolato-linearibus margine reflexis totis coloratis interne glabris, corollâ calycem plus duplo superante hirsutiusculâ. ♀ In Novâ-Hollandiâ austro-occid., in confragosis silvaticis (Preiss ! n. 2339). Folia subimbricata, pollicaria-sesquipollicaria, obtusa, supra lâte viridia, seriatim bullato-tuberculata valdeque revoluta ut pagina infera omnino fere obtegatur. Flores brevipedunculati, citra apicem ramulorum in spicam brevem collecti, coccinei. Bracteola haud tuberculata, pedunculum excedentes et cum eo calyceque coloratae et grandulosâ-punctatae. Calyx semipollicaris. Genitalia longe exserta. (v. in h. Lehm. et DC.)

4. C. PARVIFLORA (Walpers! repert. 4 p. 58.), ramis foliorumque dorso lanâ albâ tomentosis, foliis imbricatis oppositis basi amplexicauli-connatis a latiori basi linearibus supra muricato-hispidulis tuberculato-bullatis revolutis, pedunculis basi bracteolatis, calyce profunde 5-partito lacinias bracteolisque membranaceis linearibus dorso marginaque subrevoluto albo-lanuginosis, corollâ fauce campanulatâ calycem æquante. ♀ In interioribus Novæ-Hollandiæ orientalis (Lhotzky!). Folia ad basim sessilem  $2\frac{1}{2}$  lin. lata. Flores axillares. Calyx 4 $\frac{1}{2}$  lin. longus, fere usque ad basin partitus, pilis ramosissimis lanuginosus, lacinias bracteolis simillimus et cum iis viridibus. Corolla extus sublanuginosa; tubus 2 lin. fere longus, angustus, sub staminum insertione annulo lanae densissimæ clausus; fauces exinde campanulato-ampliatae; limbus brevis, labio super. paulo porrecto exciso, lacinias reliquis ovalibus obtusis subæqualibus. Genitalia brevissima inclusa. Habitu sequenti proxima, sed et ab ea et a reliquis distinctissima. (v. s. sp. orig. h. cl. Lucas Berol.)

5. C. STECHADIS (R. Br.! l. c.), ramis cum foliorum dorso calyceque præter laciniarum margines lanâ niveâ tomentosis, foliis confertis oppositis adnatodecurrentibus anguste linearibus supra muricibus ramosis hispidulis pubeque minutissimâ glandulosâ scabridis margine revolutis tuberculato-bullatis, pedunculis medio bracteolatis, calyce semi-5-fido lacinias lanceolato-subulatis margine revoluto viridi ballato-crenato, corollâ calyce duplo-triplove longiore lanuginosa. ♀ In Novâ-Hollandiæ orientali circa Port Jackson (R. Br.! Sieber! fl. nov. holl. exs. n. 186, All.-Cunn.! d'Urville! Gaudich.!). C. lavandulifolia Sieber! n. 185. Ferd. Bauer ill. pl. nov. holl. 514, tab. 4. Folia semipollicaria-pollicaria, peræquata, obtusa, margine revoluto quasi ballato-crenata. Flores infra apices ramulorum axillares, racemum foliosum struentes. Pedunculus brevissimus ad calycem bracteolis linearibus stipatus. Calyx 4 lin. longus. Corolla flavescens, tubo gracili, lauiginosa. Stamina breviter exserta. Capsula tubo calycis paulo longior, obcordiformis, coccis dorso tenuiter lanuginosis obscure reticulatis, commissurâ lævi. (v. in h. DC.)

VII. PRIVA Adans. fam. 2 p. 505. Juss. ann. mus. 7 p. 75. Endl. gen. n. 3690 (excl. syn. L. et Mitch.). Meisn. gen. 200 et comm. 198. — Blaria Gærtn. de fruct. t. 56. f. 1 (excl. reliq. spec.). — Verbenæ sp. L. sp. 28. — Tortula Rozb. ap. Willd. sp. plant. 3 p. 359. — Streptium Rozb. pl. coromand. 2 p. 25 t. 146. Hook. journ. of bot. 1 t. 130. — Castelia Cavan. icon. 6 p. 60 t. 583.

Calyx tubulosus, interdum subventricosus, 5-plicatus, breviter et subæqualiter 5-dentatus. Corolla fere hypocraterimorpha, tubo cylindraceo, limbo 5-fido subinæquali obliquo. Stamina 4, didynama, corollæ tubo inserta, inclusa. Antheræ erectæ, basi bifidæ, biloculares, loculis rimâ longitudinali hianti dehiscentibus, connectivo dorsali inappendiculato. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus stamna inferiora adæquans, stigmata laterali sublaminari sæpius refracto. Capsula calyci aucto membranaceo apice sæpius contorto prorsus inclusa, matura septicide secedens in coccus duos nunc biloculares nunc vero abortu uniloculares; peri-

carpium siccum et durum, dorso nunc tuberculato nunc angulato angulis muricatis aculeatis echinatisve, rarius lœvi. Cotyledones oblongæ, crassiusculæ. Radicula infera. — Herbæ Americæ, Africæ et Indiæ calidæ, campestres vel ruderales, perennes, rhizomate lignoso sæpius tuberoso, caulis quadrangularibus, foliis oppositis petiolatis grosse serratis, racemis spicis singulis terminalibus alaribusque filiformibus elongatis sparsifloris, floribus brevi-pedicellatis minute bracteatis.

### Sectio 1. EUPRIVA.

Calyx fructifer inflatus, capsulam laxè ambiens. Coccii biloculares, dispermi.

1. *P. LÆVIS* (Juss.! ann. mus. 7 p. 70), glabra, subglaucescens, caulis e rhizome tuberoso-recente surgentibus erectis, foliis ovato-oblongis in petiolum cuneato-attenuatis acutis obtusisve grosse mucronato-serratis subtus pallidioribus opacis, racemo terminali subverticillato, calyce tubuloso acute 5-fido, fructifero ventricoso capsulam lœvem fovente.  $\mathcal{U}$  In republ. Argentinensi in planicie ad urbem Mendozam (Cav., Gill.) et in dit. Cordovæ alt. 1000-2500 ped. (Gill.); in regno Chilensi ad Copiapo (Meyen!). Castelia cuneato-ovata Cav. icon. 61 t. 583 et annal. de cienc. 3 p. 134. Verbena tuberosa Grah. in Edinb. phil. journ. 1840, Octob. Verb. lobelioides hort. Verb. orchiooides Walp.! repert. 4 p. 36. Nomen vern. Bapilla (Gill.). Caules pedales-sesquipedales, tetragoni, sèpius ramosi. Folia crassiæscens, cum petiolo subpollicari inferius angusto 2½ poll. circiter longa. Flores remote oppositi vel subverticillati, brevipedicellati, bracteæ ovatæ acuminatæ undulatæ vel complicatæ subtensi. Calyx puberulus, 4 lin. longus, plicatus, lacinia longe acuminatis, post corollæ lapsus cum apice tubi contorti. Corolla rubicunda, tubo calycem subæquante, limbo magno bilabiato 5-fido lobis subrotundis, fauce subvillosa. Capsula (ex Cav.) intra calycem ampliatum, ovato-acuta, grani piperis magnit., maturitate dilabens in coccus 2 biloculares dorso convexos facie planos. (v. s. c. et spont. in h. reg. berol.)
2. *P. LEPTOSTACHYÀ* (Juss.! 1. c.), caule ramisque puberulis, foliis subcordato-ovatis in petiolum deltoideo-productis acuminatis grosse crenato-serratis utrinque piloso-hispidulis strigillosisve subtus pallidis calycibus fructiferis laxis subdidymo-globosis apice breviter contortis pube uncinatæ canescensibus, capsulâ obcordiformi basi attenuatâ ad angulos obtusos subbiseriatim muricato-ecbinatâ ceteroquin rugosâ, commissurâ excavatâ marginatâ.  $\mathcal{U}$  In rudera-  
tis umbrosis Indiæ orientalis (Wall.! cat. n. 2657). Tortula aspera Roxb. in Willd. sp. pl. 3 p. 359. Streptium asperum Roxb. pl. corom. 2 p. 25. tab. 146. Wight in Hook. journ. of bot. 1. 230. t. 130. Habitus omnino *P. echinatæ*, fructu distinctissima. Calyx cum corollâ albâ ipso duplo longiore exeunte antebi spiraliiter contortus, fructiger ceruuus. (v. in h. DC.)
3. *P. BAHIENSIS* (DC. mss.), caule ramisque anguste quadrangularibus glabriusculis, foliis subcordato-ovatis basi triangulare et sinu in petiolum productis acutis grosse crenato-serratis supra nitidis et sparse hispidis subtus pallidis strigilloso-pubescentibus, calycibus fructiferis inflatis laxis subdidymo-globosis uncinato-hispidis ore connivent, capsulâ obcordata basi valde attenuatâ obtuse tetragonâ ad angulos aculeis subbiserialibus tenuibus longis rugisque dorsalibus transversis conjugatis echinatâ, commissurâ coccorum excavatâ membranaceo-marginatâ.  $\mathcal{U}$  In Brasiliæ prov. Bahiensi, in herbidis, ad sepes et aquas (Mart.! Sellow! Salzm! n. 438, Blanchet! n. 1027). *P. ecbinatæ* habitu quidem similis, sed corollâ duplo triplove majore et fructu distinctissima. (v. in h. DC., Mart., et r. Berol.)
4. *P. DENTATA* (Juss. 1. c.), caule ramisque acute quadrangularibus tenuiter puberulis, foliis ovatis acutis basi cuneatâ in petiolum brevem angustatis serratis utrinque strigoso-bispidulis subtus pallidis, calycibus fructiferis laxis subdidymo-globosis apice breviter contortis pube uncinatâ canescensibus, coc-  
cis capsulæ arcuatâs obtuse tetragonis dorso oinnino exsculpto-rugosis angulis

- brevidentatis, commissurâ planiusculâ sulco exarata.  $\mathcal{U}$  Crescit in Arabiâ Felici (Forsk.), circa portum Natal Afr. austro-orient. copiosa (Krauss! pl. cap. exs. n. 420) et in promont. Bone-Spei ad Edon (Drège!). Phryma Forsk. cat. pl. arab. p. 115. Verbena Forskallii Vahl symb. 3 p. 6. Priva Forskallii E. Meyer! comment. pl. afr. I p. 275. Zapanja Arabica Poir. dict 8. p. 844. Similis sequenti, sed omnino distincta. Calyoe cum P. leptostachya magis convenit, capsula tamen maxime ab eâ recedit. (v. in herb. r. berol.)
5. P. ECHINATA (Juss. l. c.), caule ramisque piloso-hispidalis, foliis cordato-ovatis e siu in petiolam acuminatis acutatis grosse crenato-serratis utrinque strigis sparsis scabris hispidulis supra nitidis subtus pallidis, calycibus fructiferis latis ovatis apice coarcatis breviter rostratis pilis uncinatis hispidis, capsula obovato-tetragona ad angulos aoutos aculeis brevibus rectis dentata utroquin rugulosa, commissurâ cocorum planiuscula.  $\mathcal{U}$  In America aequinoctiali, in Hispaniolâ (H. et B., de la Ossa!), Jamaicâ (Sw!), S. Dominico, Portorico (h. DC!), S. Thomâ (Wydler! n. 77. C. Ehrenb.! n. 107), Martinicâ (Sieber! fl. mart. n. 316), in Mexico (Schiede! n. 187), ad Guayaquil Quitens. (H. et B.), Carthagena de Columbia (Billberg!), in Venozuelâ ad Caraccas (Vargas! Moritz! n. 126), in Guianâ Gallicâ (Leprieur!), in Brasiliâ prov. Matto-Grosso (Riedel!). P. lappulacea Pers. syn. 2 p. 139. Verbena lappulacea L. sp. p. 28. Jacq. obs. p. 37. t. 24. Zapania lappulacea Lam. illustr. n. 251. Tamonea lappulacea Poir. dict. 7 p. 568. Busseria Löffl. it. hist. 194. Blairia Houst. — Sloane hist. Jam. 1 p. 174. t. 110. f. 1. (v. in h. DC., Mart., reg. berol. et ces. petrop.)

## Sectio II. APARINARIA.

Calyx fructiger capsulam arcte ambiens et cum eâ bipartibilis. Coccii laculo altero abortivo uniloculares, monospermi.

6. P. HISPIDA (Juss. l. c.), caule ramisque pilis reversis uncinulatis hirtello-pubescentibus, foliis subcordato-ovatis brevipetiolatis subsessilibus aoptis grosse serratis supra strigoso-scabris subtus pallidis piloso-hispidalis, calycibus fructiferis artis tomento uncinato canescensibus, capsula globoso-didymâ, cocciis in dorso convexo exangulato inermi undique tuberculato-rugosis, commissurâ arcuatâ immarginatâ lœvi.  $\mathcal{U}$  In temperatis Mexioi, ad margines agrorum cet. (H. et B.), in dumetis pr. Jalapam (Andr. n. 139). — Kunth in H. B. nov. gen. 2 p. 278. Verbena Mexicana L. syst. 66. Willd. sp. 1 p. 116. Zapania Mexicana Lam. ill. t. 6. f. 1. Poir. dict. 8 p. 845. Blairia Mexicana Gaertn.! fruct. 1 p. 265. t. 56. f. 1. Blairia cordifolia Mœnch meth. 423. Zapania hispida Zuccagni hort. flor. P. Mexicana Pers. syn. 2 p. 139. Verb. Mexicana trachelii folio, fructu Aparinæ Dill.! hort. elth. p. 407. t. 302. f. 389. Habitus reliquarum. Caules firmi, argute quadrangulares, angulis magis pubescentibus, lateribus alternis canaliculato-exaratis. Flores subsessiles. Corolla mediocris, calyce duplo longior, lilacina. Capsula cocci semper unilocularis, monospermi. (v. v. c. et s. sp. in h. DC. et berol.)

7. P. ASPERA (Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 278), caule ramisque pilis reversis uncinulatis pubescentibus, foliis ovatis acuminatis in petiolam brevem deltoideo-acuminatis apiculato-crenatis supra strigoso-hispidis soabrisse subtus pallidis pubeque canescens scabridis, calycibus fructiferis artis soabrido-puberulis, capsula globoso-didymâ, cocciis dorso convexo exangulato inermi tuberculato-rugosis, commissurâ obliquâ subrotundâ profunde exsculptâ margineque lœvi cinctâ.  $\mathcal{U}$  In Mexico inter Arios et Aguasares alt. 800 hox. (H. et B.) in dumetis ad Jalapam (Schiede! pl. mex. n. 136), in rupibus basalticis prope Moreliam (Galeotti). P. crenata Schrad. ind. sem. hort. Gott. a. 1831 ex Linnaeâ 8. Literatt. p. 24. P. tracheloides Martens et Gal. bullet. acad. Brux. 2 p. 324. Proxima præcedent eique habitu simillima, sed foliis, pube calycis et capsula omnino distincta. Flores pedioello bracteâ linearî paulo breviore suffulti. Calyx 1½ lin. longus, dentibus brevibus aoutis. Corolla caly-

cem fauce ampliatâ pubescente excedens. Coccii suâ sponte dilabentes, areâ commissurali citra basin sitâ obliquâ, excavatâ, margine lævi conspicuo cincta, membranâ tenui a loculi inanis rudimento separata; loculus fertilis dorsalis. ( v. s. c. et sp. in h. DC. et r. berol. )

*Species exclusa.*

P. VIRGATA Spr = *Lippia* (*Aloysia*) urticoides.

VIII. DIPYRENA Hook. bot. misc. 1 p. 365. non R. Br. Endl. gen. n. 3689. Meisn. gen. 290 et comment. 199. — *Wilsonia* Hook. et Gill, ibid. p. 172. tab. 49.

Calyx tubulosus 5-dentatus, dente antico longiore. Corolla infundibuliformis, tubo elongato superne ampliato, limbo 5-fido inaequali. Stamina 4, corollæ tubo superne inserta, didynama, inclusa. Ovarium basi glandulâ cinctum 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, subexsertus, stigmate dilatato subobliquo seu laterali. Capsula basi calyce demum longitudinaliter rumpente circumdata, in coccus duos plano-convexos, læves, biloculares secedens. Radicula infera. — A Privâ vix distinctum.

D. GLABERRIMA ( Hook et Gill. 1. c. ). ♂ In convallibus Andium merid. prope Mendozam, alt. 5000—6000 ped. ( Gill. ). Frutex erectus, rigidus, subvirgatus, undique glaberrimus, habitu Verbenæ asperæ similis. Ramuli subspinescentes. Folia alterna, parva, oblongo-spathulata, crassisusculta, subcarnosa, obtusa, uninervia sessilia, in ramis junioribus fasciculata. Flores in spicam terminaliæ laxiusculam congesti, bracteati, odorati. Calyx brevissime pedicellatus, oblongo-cylindraceus, 5-dentatus, parvus. Corolla calyce quadruplo longior, tubo cylindrico, superne incrassato ( Hook ).

IX. VERBENA Linn. gen. plant. n. 23 (excl. spec. plur.) Cham. in Linnaæd 7 p. 254 sqq. Meisn. gen. 299 et comment. 199. Gærtn. de fruct. 1 p. 315. t. 66. Mirbel in Ann. du Mus. 15. t. 14. f. 1-5. Spennér in F. Nees ab E. gen. pl. fl. germ. fasc. 21, n. 420. — Verbenæ vera Endl. gen. sub n. 3685. — *Glandularia* J. F. Gmel. syst. veg. (1791) p. 920. Nutt. journ. acad. sc. phil. 1821 p. 123. — *Billardiera* Mænch meth. (1794) p. 366. — Schuttleworthia Meisn. gen. 290 et comment. 198 (1839). — Uwarowia Bunge in Bullet. scient. de l'acad. S. Petersb. (1840) 7 p. 278. Fisch. et Meyer in mém. de l'acad. S. Petersb. ser. 6. II p. 153. cum icono.

Calyx tubulosus, plicato-5-costatus, plicaturis plerumque membranaceis, costis herbaceis in dentes sæpe inaequales ( postico vel posticis tunc minoribus ) abeuntibus. Corolla subhypocraterimorpha; tubo cylindrico, sursum sensim vel subinflatō-ampliato, recto vel curvato, interne saltem ad staminum insertionem villoso fauceque barbato; limbo subbillabiato-obliquo, 5-fido, lacinias magis minusve inaequalibus, emarginatis. Stamina 4 (in unicâ specie 2), in superiori parte tubi inserta, inclusa, didynama. Antheræ ovatae, biloculares, subdidymæ, loculis appositis rimâ hiantc dehiscentibus; connectivo dorsali angusto mutico, vel (in sect. *Glandulariæ*) appendice dorsali glandulosâ magis minusve conspicuâ auctum. Ovarium receptaculo annuliforme sublobato insidens, 4-(rariissime 6-) loculare, loculis uniovulatis, ovulo e basi erecto anatropo. Stylus stamina adæquans, sensim dilatatus, apice bifidus vel bilobus, lobo vel crure altero stigmatifero subpulvinato-papillifero, altero vero lævi corniculiformi stigmati adsito. Capsula calyce ventricoso demum fiso superius connivente aut contorto inclusa, matura septicide secedens in coccus 4; pericarpio arcto, sicco, dorso jugis longitudinalibus striato, valleculis lævibus vel totis vel partim rugis transversis areolatis scrobiculatisve, commissurâ angulatâ alutaceo-granulatâ. Embryon rectum; cotyledonibus crassis applicitis;

radicula inferà. — Genus naturalissimum ideoque non nisi invitâ naturâ divellendum. Herbae aut suffrutices, maximo numero in Americâ, peregrine vero in orbe antiquo nascentes, campestres; caulis tetragonis interdum filiformibus et repentibus; foliis oppositis, ternis vel rarissime alternis, integris vel tripartito-laciniatis; floribus in spicas vel capitula terminalia deinceps alaria collectis, singulis bracteâ subtensis.

### Sectio I. VERBENACEA.

Connectivum antherarum superiorum inappeudiculatum, muticum.

§ 1. *Pungentes.* — *Flores ad apices ramulorum subgemini vel pauci subcapitati.* — *Fruticuli andicoli ranosissimi, humiles, sâpe cæspitoso-pulvinati, foliis imbricatis acerosis demumque spinescentibus.*

1. V. SERIPHOIDES (Gill. et Hook. in Hook. bot. misc. 1 p. 164), fruticulosa, ramulis brevissimis numerosis foliis densissimis connatis ovato-triangularibus crassis carinatis superne canaliculatis obtusis glabris, spinis oppositis connatis late subulatis subfoliaceis ciliatis demum elongatis rigidissimis integris trifidise, floribus in apicibus ramulorum subsolitariis. ♂ In republ. Argentinâ in prov. merid. Mendoza (Gill.). Folia vix 2 lin. longa. Bracteæ ovatae. Corolla calyce dimidio longior albescens-lilacina (Hook.).
2. V. CÆSPITOSA (Gill. et Hook. l. c. 165), fruticulosa, cæspitosa, canescens, ramis brevibus tortuosis foliis annotinis spinescentibus munitis, ramulis brevissimis, foliis parvis firmulis quadrifariam arcte imbricatis connatis oblongis obtusis canaliculatis appressae lanatis, spinis oppositis connatis subulatis rigidis simplicibus, floribus terminalibus geminis, calyce tubuloso subulato-dentato birtello. ♂ In editis Andibus Chilenis, in Paramillo de Uspallata (Gill.) et in prov. Coquimbana (Gay!). Fruticulus in densum cæspitem coactus. Folia ramea subulata semipollucaria basi lîncam lata, altero anno parenchymate abolescente nervoque ligamentum abeuntia in spinam validam pungentem, in axillâ ramulum gerentem. Folia ramulorum sesquilinearia, patentissima, summa bracteantia erecta. Calyx sessilis, totus membranaceus, pallidus, 2 lin. longus. Cor. calyce tertio longior, glabra, tubo infundibulari. (v. s. in h. DC.)
3. V. ASPARAGOIDES (Gill. et Hook l. c.), foliis fasciculatis linearis-oblongis obtusis pubescentibus majoribus revolutis, spinis tripartitis, capitulis paucifloris, bracteis lanceolatis dentibusque calycis spinosis, floribus pubescentibus. ♂ In summo fere Andium jugo Uspallata ad Cerro de Portezuelo (Gill.). Folia lineam-sesquilineam longa. Spicae juniores margine angustissime foliaceæ. (Hook.).
4. V. ERINACEA (Gill. et Hook. l. c. 164. t. 48), fruticosa, cæspitosa, foliis densis oppositis connatis acerosis strictis ciliatis pungentibus demum elongatis spinescentibus, capitulis paucifloris inter folia immersis, bracteis ovato-lanceolatis mucronatis calyce elongato tubuloso striato hirtello quadruplo brevioribus, calycis dentibus pungentibus. ♂ In summis andibus Uspallatenium ad Mendozam reipubl. Argentinæ (Gill.). Radix crassa lignosa. Tota planta spinosissima. Corolla calyce dimidio fere longior.
5. V. MINIMA (Meyen! Reise um die Erde 1 p. 451), fruticulosa, pulvinato-cæspitosa, foliis oppositis confertissimis quadrifariam imbricatis subrecurvo-patulis basi connatis subulatis apice triquetris pungentibus glabris breviter ciliatis, floribus ad apices ramulorum axillaris solitariis geminis, bracteis ovatis calycem subæquantibus, calyce puberulo 5-lobo lobis æqualibus obtusis ciliatis. ♂ In Andibus Peruanis, ad lacum de Titicaca, alt. 12400 ped. (Meyen!) et in Andibus Argent.? (Lag.). V. polycnemoides Lag. gen. et sp. pl. 18 ex inopi diagnosi vix diversa. Folia sesquilineam longa. Calyx ses-

silis, inter folia summa immersus, unâ lineâ paulo longior, corollæ tubum adæquans. Corollæ purpureæ faux barbata, limbus parvus, 5-partitus, explanatus. (v. s. in h. reg. berol.)

§ 2. *Nobiles*. — *Spicæ confertæ, virgineæ fastigiato-capitatae, sub anthesi sensim elongandæ simulque relaxandæ*. — *Suffrutices repentes Americae australis temperatae, calyce elongato-tubulosæ capsulam duplo excedente, corollâ magnâ speciosâ, lobis emarginatis*.

6. V. CHAMÆDRIFOLIA (Juss.! Ann. du Mus. 7 p. 73), caulis filiformibus furcato-ramosissimis repentibus hirtis, apicibus ramisque adscendentibus foliis oblongis ovatis basi late cuneatâ in petiolum brevem coartatis crenato vel subinciso-serratis supra strigosis subtus præcipue in nervis hirtis, pedunculis elongatis adscendentibus, spicâ solitariâ, bracteis lanceolato-subulatis ciliatis calyce pube hirtâ canescente plus duplo brevioribus. § In campis civit. Platemium (Gill., Bacle! Arsène-Isabelle!) et Brasiliæ meridionalis, (Sellow!). — Cham.! in Linnæa 7, p. 270. Hook. bot. misc. I, p. 167. Bot. mag. t. 3333. Mound et Henslow the Botanist 3 t. 129. V. veronicæfolia Sm. in Rees cyclop. vol. 36. V. Melindres Sweet! br. fl. gard. 2. ser. 1. t. 9. Erinus Peruvianus Liun. sp. plant. p. 879. Lychnidea Veronicæ folio, floræ coccineæ Feuill. Peruv. 3, 25, f. 3. Planta floribus magnis splendide scarlatinis maxime spectabilis, hortorum europæorum nunc vulgare tamen eximium deus. Præter stirpem primitivam autem coluntur permulta hybridae ex eâ et affinibus arte prognatae, eleganti colorum et foliorum varietate excellentes. Varietates sylvestres hæ sunt :

α. *Melindres*, foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis inæqualiter inciso-serratis minusque hirtis. Gracilior est et siccata colore pallidum lâte viridem conservat.

β. *Melindroides*, foliis ovatis subæqualiter vel duplicato-crenato-serratis magisque hirtis. V. melindroides Cham.! l. c. — Siccata colore obscuriore subnigrescente herbae, flavescente corollæ paginæ exterioris insignis videtur. Hæc in Brasiliæ provinciis australis lecta est, in prov. S. Pauli (Riedel! Lund!), ad fretum S. Catharinae (Cham.!). (v. s. utramque in h. r. berol. et DC.)

7. V. PHLOGIFLORA (Cham.! in Linnæa 7, p. 266), caulis ascendentibus, ramis erectis brachiatò-ramosissimis tetragonis retrorsum hirtellis, foliis oblongo-vel lanceolato-triangulibus acutis basi cuneatâ integrerrimâ in petiolum longe attenuatis margine subrevolutis inæqualiter subinciso-serratis venoso-rugosis supra strigosis subtus hirtis vel substrigilloso-hirtellis, spicis terminalibus pedunculatis vel solitariis vel ternis interdum cymoso-pauiculatis, bracteis brevibus ovatis vel subulato-lanceolatis calyce hirtello glandulisque stipitatis depresso-globosis consperso duplo brevioribus. § In umbrosis humidis camporum civit. Platemium (Tweedie) et in Brasiliæ provinciis S. Pauli (Sellow! Pohl! Riedel! Lund!), Rio-grande do Sul (Arsène-Isabelle) et Minarum (Pohl! Stephan! Reynell!) Similis quodammodo præcedenti, sed jam staturâ validiore, ramis erectis diversa prætereaque foliis latioribus manifeste petiolatis, floribus majoribus magis purpureis vel lilacinis. In hortis nunc compluribus varietatibus coloris inter rubrum et cœruleum ambigentibus culta. Calyx 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. circ. longus, dentibus ovatis acuminulatis. Corolla extus glabra, intus ad fauces villosa, tubo 8-9 lin. longo, limbo amplio laciniis emarginatis. Planta ex loco innumeris modis varians. Formæ memorabiles hæ sunt :

α. *vulgaris*, pube hirtellâ scabré subcanescens, caulis gracilibus decumbentibus, ramis patentissimis diffusis ascendentè-erectis, spicis terminalibus solitariis, bracteis subulato-lanceolatis calyce duplo et quod excedit brevioribus. V. phlogiflora var. β Cham.! l. c. V. Tweediana Niven! in

Hook bot. mag. t. 3541. Paxton mag. of bot. 4, 5, cum joone. Sweet brit. fl. gard. 2, ser. t. 391. V. cunea Vellozo! fl. flum. t. 41.

*β. mucilenta*, major, pube strigosa tenuissimâ rarrâque adspectu glabra, caulinis herbaceis fistulosis ramosissimis erectis, spicis ad apices ramorum saepe ternis longe pedunculatis simplicibus vel uno altero e pari ad basin primariae suhsessilis accedente cymoso-panioulatis. Vur. & Cham.! l. c. V. Megapotamica Spreng. syst. veg. cur. post, 230? (v. s. in h. r. berol. et DC.)

8. V. INCISA (Hook! bot. mag. t. 3628), pubescenti-hirsuta subcanescens, caulinis adscendentibus ramis erectis, foliis ambitu oblongo-triangularibus e basi cuneatâ truncata vel subcordata in petiolum attenuatis pinnatifido-lobatâ grosse inciso-serratis lineato-rugosis, superioribus sublanoeolatis sessilibus inoiso-pinnatifidis, spicis pedunculatis subtornis ad apices ramorum oorymbo-panioulatis, bracteis ovatis calyce hirtello glandulisque stipitatis consperso quater brevioribus. ♂ In campis siccis civitt. Platenium (Tweed n. 460) et in Brasiliæ prov. Rio-Grande do Sul (Tweed n. 504 et 505, teste cl. Hook). V. Arraniana hort. — Proxima præcedenti, sed foliorum figurâ, corollæ roseo-purpurascens tubo glanduloso-pubescente breviore oalycem triente excidente, hirsutis suboanecente distincta. Calyx 5 lin. longus, dentibus brevibus aouinatis. (v. s. c. in h. DC.)

9. V. TEUCRIOIDES (Gill. et Hook! in Hook bot. misc. 1, p. 167), caulinis cæspitosis basi radicantibus adscendentibus teretiunculis patentibus, foliis ovatis vel oblongo-triangularibus basi brevi cuneatâ integerrimâ in petiolum brevem angustatis coarctatis obtuse subsinuato-serratis margine revolutis venoso-rugosissimis supra glanduloso-birtellis subtus hirto-tomentosis nervis hispidulis, spicis terminalibus solitariis glanduloso-hirtellis, bracteis subulato-lanceolatis ciliatis calyce nervoso duplo brevioribus. ♂ In campis Brasiliæ meridionalis (Sellow!), civit. Montevid. (Arsène-Isabelle!) et in Andium jugo Uspallatensi ad Cerro de Portezuela (Gillies). — Hook! bot. mag. t. 3694. V. Platensis Spreng. syst. 2, 748? V. scordoides Cham! in Linnæa 7, 269. Rami adsoendo-erecti dodrantes. Calyx semipollucaris. Corolla magna, alba vel subrosea, sub vespe suaveolens, extus glabra, tubo calyce duplo longiore, fauce ad orificium subpenicillato-barbatâ, laciiniis leviter emarginatis. (v. v. c. et s. in h. r. berol. et DC.)

10. V. MARRUBIOIDES (Cham.! l. c. p. 269), caulinis cæspitosis adscendentibus teretiunculis villoso-hirsutis, foliis subsessilibus cunctato-ovobatis acutiusculis obtusis ante obtusiusculis et grosse crenato-serratis margine subrevolutis lineato-rugosis supra strigoso-hirtis subtus canescens-tomentellis nervis strigoso- vel subsinuato-hirsutiusculis, spicis terminalibus solitariis, bracteis subulato-lanceolatis ciliatis calyce nervoso canescens-tomentoso hirtoe simulque subglanduloso duplo brevioribus. ♂ In campis Brasiliæ meridionalis (Sellow!) Spicæ denique valde elongatas et basi saltem subdissitifloræ Flores patuli. Calyx saepius coloratus, 5 lin. longus. Cor. violacea, extus pubescens, tubo calyce triente longiore, fauce barbatâ, limbo amplio laciiniis uudulatis rotundatis cmarginatis. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)

11. V. HUMIFUSA (Cham.! l. c. p. 271), caulinis filiformibus prostratis subrepentibus hirsutis hirtellis, apicibus ascendentibus, foliis basi cuneatâ integerrimâ in petiolum brevem attenuatis ante dentatis grossè crenatis serratis inciso-trilobis lobo intermedio 3-5-dentato lateralibus plerumque bidentatis triplinerviis nervis semel bisve trifurcatis facie impressis supra margine subtusque in nervis strigoso-hispidis, spicis terminalibus solitariis ternis longe pedunculatis, bracteis ovato-lanceolatis calyce hirto simulque glanduloso triplo brevioribus. ♂ In campis Brasiliæ meridionalis (Sellow!). Folia ambitu nunc subrhomboidea acuta, nunc ante rotundata obtusa. Spica 10-12-flora, floribus suboppositis patulis. Calyx 4 lin. longus. Corolla violacea extus glabra, tubo semipollucari, fauce barbata, limbo amplio laciiniis emarginatis. (v. s. in h. r. berol. )

12. V. RIBIFOLIA ( Walpers ! repert. 4, p. 29 ), fruticulosa , diffusa , ramis adscendentibus , ramulis subterragonis pubescentibus , foliis basi cuneatâ longe , attenuata subpetiolatis trifidis laciñia mediâ pinnatifidâ laciniulis 2-3-dentatis margine revolutis supra lineato-rugosis strigoso-hirtis subtus hirsutis subvillosâ brevi subcænescentibus , spicis terminalibus alaribusque brevipedunculatis multifloris confertis , bracteis linearisubulatis calyce triente brevioribus et cum eo hirtello-pubescentibus . 3 In editis Andibus Chilensem ( Gay ! ) et in ditione urbis Conception ( Filtec ! Besser ! n. 133 ). Folia 6-8 lin. longa , 3-4 lin. lata , nervis subtus prominentibus . Capitulum ineunte anthesi subfastigiatum , deinceps oblongum . Calyx 3 lin. longus , dentibus plicato-subulatis , postico minore . Corolla calyce tertia parte longior , tubo cylindrico ad fauces interne glabras paulo ampliato externe puberulo , limbo pro tubi longitudine parvo purpureo ? . ( v. s. in h. cl. Lucae , reg. berol. et DC. )

§ 3. PACHYSTACHYÆ. — *Capitula vel spicæ, saltem virginea, conferta et abbreviata. — Omnes, exceptâ V. Bonariensi, Americæ calidiori privæ.*

\* *Foliis majoribus frondosæ.*

13. V. CUNEIFOLIA ( Ruiz et Pav. ! fl. per. I , p. 22. t. 32. fig. a ), caule erecto tetragono hispidulo superne corymboso , foliis ambitu lato-ovatis basi cuneato-coronata sessilibus profunde trifidis utrinque strigoso-hispidis laciniis lanceolatis inciso-pinnatifidis grosse serratis , spicis terminalibus subternis brevipedunculatis compactis oblongis demumque cylindricis strigoso-hispidis glandulosisque , bracteis lanceolatis calyce subulato-5-fido triente brevioribus . 2 In arenosis Peruviae ad Huanuco et Mayubamba ( R. et P. Dombezy ! n. 261 ). — Caules bipedales , subsimplices . Folia 2 poll. longa itidemque fere lata , laciniis incisurisque acutis . Spicas subplicares confertæ , subcænescentes . Calyx 4 lin. fere longus . Corolla cœrulea , tubo cylindrico-subinfundibulari calycem tertia parte superante pubescens , limbo mediocri . Capsula calyce superius coustricto subdupo brevior , coccis superne reticulato-tuberculatis . ( v. s. in h. r. berol. et DC. )

14. V. TRIFIDA ( Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 273 , t. 134 ), undique cænescens , ramis tetragonis cum spicis hirsutiusculis , foliis confertis basi cuneatâ sessilibus utrinque strigoso - hispidulis axillis ramulos fasciculato-foliosos emittentibus trifidis subtrifidisque laciniis lanceolatis acuminatis margine revolutis nervo medio supra impresso subtus prominenti , spicis apicalibus pluribus subsessilibus capitatis conglomeratis , bracteis lanceolatis calyce tubulosum subulato-5-fidum subæquantibus . 3 In montibus Mexicanis , inter pagum Totonilco-el-Grande et pontem Dantæ vel S. Virginis , alt. 900 hex. ( H. et B. ! ) et in Columbia ad viam inter Bogota et pagum Zipaquirá . ( Hartweg ! n. 1353 ) . Frutex tripedalis . Species per insignis . Folia  $\frac{1}{2}$  - 1 poll. longa , plerumque trifida , laciniâ intermedia majore , interdum vero laciniâ una vel utrâque laterali obsoletâ bifida aut integra . Spicas brevcs , densissimæ . Calyx 3 lin. longus , nervosus , laciniis conspicuis paulo inæqualibus . Corolla mediocris , tubo calycem paulo excedente , limbi lobis rotundatis emarginatis . ( v. s. in h. cl. Kunth et r. berol. )

15. V. CORYMBOSA ( R. et P. fl. per. 1 p. 22. t. 33 , fig. a ), piloso-hispida , rhizomate repente , caulis striatis tetragonis simpliciusculis superne corymbosis , foliis oblongis vel subtriangularibus acutis basi truncatâ brevissime petiolatis rigidis lineato-rugosis margine subrevolutis utrinque strigoso-hispidulis dentibus inæqualibus ovatis mucronatis grosse inciso-serratis incisuris inferioribus majoribus citra basin saepius divaricato-subtrifidis , spicis brevibus imbricatis brevipedicellatis in paniculam terminalem corymbosam collectis , bracteis ovatis subulato-acuminatis ciliatis calyce subulato-5-fido hirto et glanduloso duplo brevioribus , corolla tubo calycem duplo excedente . 2 In regno Chilensi ( R. et P. ), in Chili australis locis paludosis ad Laguna de S. Jozé-

*Cantara*, isla la Laxa (Poeppig! coll. pl. chil. 2. n. 157); in Peruvia (Dombey! n. 264). V. aspera Kunze! in Poeppig. coll. pl. exs., non Gill. et Hook. *Zapania corymbosa* Poir. encycl. 8 p. 844. Caules ulnares. Folia 1-1½ poll. longa, 9 lin. circ. lata, paginâ inferâ pallescente, nervis prominentibus. Spicæ pollicares confertæ, iu pedunculis subternæ compactæ. Calyx 2½ lin. longus. Corolla violacea, tubo gracili calyce subduplo longiore extus puberulo, fauce lanuginosâ, limbo mediocri lobis retusis. Capsula calyce subduplo brevior. (v. s. in h. r. berol. et DC.)

16. *V. LOBATA* (Vellozo! fl. flum. 1, t. 43), tota hispida, rhizomate repente, caulis tetragonis adscendentibus brachiato-ramosis, foliis ambitu triangularibus subtrilibus acutis & basi truncata vel subcordata in petiolum cuucato-attenuatis rugosus supra strigoso-hispido subtus hispido-hirtis subcaescentibus dentibus ovatis mucronato-acuminatis grosse et inaequaliter inciso-serratis, spicis brevissimis imbricatis brevipedicellatis, pedunculis cymosis una paniculam patentissimam struentibus, bracteis ovatis acuminatis ciliatis calyce brevidentato duplo brevioribus, corollæ tubo calycem piloso-hirtellum eglandulosum paulo excedente.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ meridionali, e. gr. ad Grandahy (Sellow!). *V. corymbosa* Cham.! l. c. *V. Buchnera* fl. flum. t. 42? Folia membranaceæ, lamina inferiorum 1½ poll. longâ, basi pollicem latâ. Calyx 2 lin. longus. Cor. parva, fauce villosâ. (v. s. in h. reg. berol.)
17. *V. HIRTA* (Spreng.! syst. 2 p. 749), caule herbaceo procumbente adscendentiramoso teretiusculo villoso, foliis oppositis ternisve ovatis obovatis rotundatisque basi cuneatâ integrerrimâ sessilibus grosse serratis sublobato-paucidentatis subtrilibusque subrugosis supra substrigoso-hirsutis subtus in rete prominente præcipue hirsutis, spicis densifloris cymosis, cymis axillaribus terminalibusque capitato-congestis aut longe pedunculatis racemosisque verticillatis ternis, bracteis lanceolatis acutis ciliatis calycem brevem in angulis hirtum subæquantibus brevioribusve, dentibus calycis subulatis.  $\mathcal{U}$  In campis graminosis Brasiliae meridionalis, in prov. S. Pauli (Sell.! Pohl! Riedel! Lund!) et Minarum generalium (Regnelli!). Calyx 2 lin. longus. Corolla parva, cerulea aut rubescens, extus lanuginosa, fauce barbatâ, limbi lacinias retusis. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)
18. *V. STRIGOSA* (Cham.! in Linnaeâ 7 p. 256), fruticulosa, erecta, ramosissima, ex toto molliter strigoso-hirsuta atque incana, ramis tetragonis, foliis coriaceo-membranaceis ellipticis postice integrerrimis vel subcuneatis sessilibus vel in petiolum attenuatis antice crenato- aut serrato-paucidentatis basi triplinerviis, spicis paucifloris laxiusculis terminalibus solitariis cymosis racemosisque, bracteis lato-ovatis acutis concavis ciliatis calyce brevi in angulis superne strigoso triplo-quadruplove brevioribus, dentibus calycis brevissimis lato-triangularibus.  $\mathcal{G}$  In Brasiliâ prov. S. Pauli (Sell.! Riedel!) Calyx 2 lin. longus. Corolla pallide cœrulea, tubo 2½ lin. longo exsertâ parte lanuginosâ, fauce dense barbatâ, limbi medicoris lacinias cuneatis retusis. Præcedentis formis parvifolis quodammodo similis, sed jam calycis dentibus corollæque barba magis conspicuâ discernenda. Variat foliorum figurâ et magnitudine neque minus indumento nunc sericeo nunc rarissimo ut planta fere glabra appareat. (v. s. in h. berol. et petrop.)
19. *V. STELLARIOIDES* (Cham.! l. c. 264), rhizomate repente, caulis erectis gracilibus tetragonis acute marginatis glabris, foliis linear-lanceolatis longe acutatis integrerrimis vel medio obsolete serratis uninerviis margine reflexo striguloso-scabro, internodio terminali subviloso, spicâ confertâ demum cylindricâ simplici vel e paucis compactâ, bracteis lanceolatis subulato-acuminatis viloso-ciliatis, calyce tubuloso angulis viloso.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ meridionali (Sellow!) *V. Montevidensis* Spr. syst. 2 p. 747? Habitu Stellariæ Holosteæ hand omnino dissimilis, sed firmior. Bracteæ cum calyce coloratae 3-5 lin. longæ. Calyx 3 lin. longus, dentibus subulatis ascendentibus infimis majoribus supremo brevi. Corolla magna, extus viloso-lanuginosa, tubo calycem duplo superante. Variat:

- $\alpha.$  *decurrens* (Cham.! l. c.), foliis decurrentibus linearibus integerrimis paginis glabris, bracteis calycem excedentibus.
- $\beta.$  *sessilis* (Cham. l. c.), foliis sessilibus anguste lanceolatis obsolete serratis facie strigillis subtilibus conspersis, bracteis calyce nonnihil brevioribus. (v. s. utramque form. in h. reg. berol.)
20. *V. OVATA* (Cham.! l. c. p. 263), caule stricto tetragono angulis scabro ad medium usque dense folioso nodis superioribus remotis subaphyllis, foliis approximatis lato- vel subrotundo-ovatis basi cordata semiamplexicaulibus adnatis acutis inæqualiter grosse dentato-serratis reticulato-rugosis supra nitidis strigisque callosis asperrimis subtus hirtulis subcanescens nervis hispidulis, paniculâ terminali cymosâ compactâ, spicis cylindricis, bracteis membranaceis lanceolatis longe acutatis ciliatis imbricatis, calyce puberulo subduplo longioribus.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ merid. (Sellow!) Species per insignis, uti videtur rara in patriâ. Caulis subquadripedalis. Folia in hac sectione amplissima. Bracteæ nitidas lilacino-coloratae. Calyx sesquilineum longus, brevissime dentatus. Corolla calyce duplo longior, tubo paulo ultra bracteam exerto, limbo exiguo. Capsula constanter 6-cocca. (v. s. in h. reg. berol.)
21. *V. VENOSA* (Gill. et Hook! in Hook. bot. misc. 1 p. 167), rhizomate repente caulis simplicibus ascendentibus tetragonis hirtis, foliis approximatis rigidis oblongis postice subcuneatis integerimis basi semiamplexicauli adnatis acutis serraturis acuminatis patulis inæqualibus grosse subinciso-serratis margine revolutis penninervis supra lineato-rugosis strigisque callosis scaberrimis subtus nitidulis nervisque prominentibus hispidulis, spicis terminalibus subtensis lateribus pedunculatis fastigiatis deinceps cylindricis imbricatis, bracteis subulatis ciliatis calycem hirtum excedentibus.  $\mathcal{U}$  In campis graminosis Brasiliæ meridionalis (Sellow!) et Bonariæ (Gill.).—Hook! bot. mag. t. 3127. Sweet fl. gard. 2. ser. 3. t. 207. Annales Flore et Pom. 1836, cum icon. V. scaberrima Cham.! l. c. p. 267. V. rugosa G. Don in Sweet fl. gard. 2. ser. v. 4. t. 318. V. domiana Steud. nomencl. V. rigida Spr. syst. cur. post. 230? Calyx sesquilineum longus, dentibus brevibus acutis, cum bracteis coloratus. Corolla lilacina aut subceruleans, tubo gracili calyce triplo longiore. Species hirtis europ. familiaris. (v. v. c. et s. sp. in h. reg. berol.)
22. *V. INTERMEDIA* (Gill. et Hook. l. c. p. 166), rhizomate repente, caulis simplicibus strictis tetragonis marginatis scaberrimis, foliis subsessilibus subconnatis arrectis sursum decrecentibus infimis cuneato-oblongis reliquis linear-i-lanceolatis acutis margine reflexis antice argute inciso-serratis integerimis supra lineato-rugosis setisque brevibus callosis asperrimis subtus in rete prominente hispidulis, foliis summis minutis, paniculâ terminali rarâ, spicis confertisculis demum subcylindricis hirtulis glandulosisque, bracteis ovato-acuminatis calycem subæquantibus.  $\mathcal{U}$  In campis graminosis Bonariæ (Gill.) et Brasil. merid. (Sellow!). V. gracilis Cham.! in Linnaea 7 p. 262. V. tenuis Steud. nomencl. ed. 2. V. Chamissonis Walp. repert. 4 p. 18. Caules 1½-3 pedales. Calyx 1½ lin. longus, saepius coloratus. Corolla calyce plus duplo longior, extus villo longo canescens, violacea. (v. s. in h. r. berol.)
23. *V. BONARIENSIS* (Linn.! sp. pl. p. 28), caule stricto tetragono scabro hispidulo subvillosoque superne nudiusculo, foliis lanceolatis basi subauriculata adnato-semiamplexicaulibus acutis a medio inde inæqualiter argute et saepius inciso-serratis margine revolutis penninervis venosis rugosisque utrinque hirsutis scabrisque, panicula terminali cymosâ fastigiata, cymis longe pedunculatis fasciculatis, spicis densifloris denique cylindricis, bracteis lanceolatis acuminatis hirtulis ciliatisque calycem pubescentem angulis hispidulum æquantibus vel excedentibus.  $\mathcal{U}$  In campis graminosis Bonariæ (Bacle!) et Brasiliæ merid., ad fretum S. Catharinæ (Cham.!), in pascuis montis Serra dos Orgaõs (Lhotsky!) et ad Caldas prov. Minarum (Reynell!); ad C. Bonae Spei (Eckl. et Zeyher! Lambert! in h. DC.) et in insulâ Mauritiæ (Sieber! herb. maur. 2. n. 214).—Gærtner! de fruct. 1 p. 315. t. 66. f. 1. Kniph. orig. cent. 2. n. 98. — Dillen! hort. elth. 406, t. 300. f. 387. V. quadrangularis Vellozo!

- f. flum. t. 39.** V. Capeusis Thunb. f. cap. p. 447. Habitū, foliorū figurā et hirsutie scabriā insignis; staturā vero, indumento, panicula ampliore et pauperiore, denique bracteis brevioribus et longioribus varians. Corolla lilacina, externe subtiliter villosa, tubo calyce vix duplo longiore, limbo exiguo. (v. v. c. et s. in h. reg. berol. et DC.)
- 24. V. LITORALIS** (Kunth! in H. B. nov. gen. et spec. 2 p. 276. t. 137), caule erecto ramisque patentibus fastigiatis quadrangularibus marginatis glabris vel ad margines scabris strigillosive, foliis oblongis lanceolatisque basi integerim cuneato-attenuatā sessilibus acuminatis argute vel inciso-serratis margine revolutis lineato-rugosis supra subtusque in rete strigoso-scabris hispidulisve, supremis saepe integerrimis, spicis cylindricis filiformibus elongandis relaxansque substrigoso-hispidulis in apice ramorum subtriternatis omnibusque una fastigiato-paniculatis, bracteis ovato-lanceolatis calycem brevem acute 5-dentatum subæquantibus.  $\mathcal{L}$  In littoralibus Americae tropicæ et temperatae vulgaris. Proxima præcedenti, diversa imprimis caule magis ramoso glabriuscule, foliis basi valde attenuatā sessilibus multo minus rugosis et hirtis, spicis gracilioribus.
- a. pycnostachya**, spicis virgineis densioribus subcylindricis. V. littoralis Kunth! in H. B. l. c. V. Brasiliensis Velloso! fl. flum. t. 40. V. Bonariensis  $\beta$ . littoralis Hook. bot. misc. 1 p. 166: forma campestris Africa, plerumque undique magis hispidula. — In campis siccis Brasiliæ meridionalis (Sellow! Ackerman! Mart.! herb. bras. n. 1033, Vauth.! herb. bras. n. 192. Reynell! herb. bras. ser. 1. n. 326. Lund! Riedel!) et Bonariæ (Bacle!), in littor. Chilii (Meyen! Style!), Peruviae et Venezuelæ (H. et B.). Hujus modi, monticola, magis compacta et glabrior est V. glabrata Kth.! in H. et B. l. c. 276. (herb. Willd.! n. 11133), in Andibus Novo-Granat. lecta.
- $\beta$ . leptostachya**, spicis jam virgineis magis filiformibus, deinceps stetpius valde elongandis. V. Caracasana Kunth! in H. B. l. c. p. 275 (V. lanceolata Willd.! herb. n. 11134) Cham.! in Linnaea 7 p. 255. V. affinis Martens et Galeotti in bullet. acad. Brux. 2. 19 (ex descr.): forma umbrosa, plerumque magis glabrata, spicis pube appressâ subcanescensibus. — In Chilli (Philippi!), Mexico ad Jalapam et Papantlam (Schiede! pl. mex. n. 135 et 1168), ad Tlocalulco alibique (C. Ehrenb.! Galeotti); in Venezuela (H. et B.!, Vargas! Moritz!), Guianâ (Leschen.! in h. DC.), Brasiliâ (Sell.!). (v. s. in h. reg. berol., Mart., DC.)
- 25. V. VALERIANOIDES** (Kunth in H. B. l. c. 277), glabra, caule erecto tetragono, ramis erectis, foliis linearibus sessilibus acutiusculis integerrimis margine revolutis venosis rigidis supra pilis raris conspersis, pedunculis terminalibus ternis tristachylis, pedicellis abbreviatissimis, spicis cylindricis densissimis, bracteis ovatis acutis calyce subduplo brevioribus, calyce brevitubuloso mucronato-5-dentato strigiloso-scabro.  $\mathcal{L}$  In frigidis Andium pr. S. Fé de Bogota et Chipo, alt. 1370 hex. (H. et B.!), in Andibus Columbiæ (Hartw.! n. 1350). Habitū Valerianellis quodammodo accedens. Spicæ 4-8 lin. longæ. Calyx  $1\frac{1}{2}$  lin. longus. Corolla parvæ tubus calycem paulo excedens. Proxima et persimilis præcedenti, tamen uti videtur foliis integerrimis calyceque longiore satis distincta. (v. s. in h. reg. berol., Mart., DC.)
- 26. V. HISPIDA** (Ruiz et P.! fl. per. 1 p. 22. t. 34. f. a.), caule erecto vel ascendente ramoso quadrangulari piloso-hispido, foliis oblongis lanceolatis acuminatis basi cuneato-attenuatā sessilibus semiamplexicaulibus grosse et inæqualiter acuminato-serratis, incisive integris trifidisque lincato-rugosis supra subtusque in nervis strigoso-hispidis paginâ inferâ reliquo hirtello-pubescente, spicis terminalibus subternis pedunculatis densissimis cylindricis hispids et glandulosis, bracteis lanceolatis calycem subulato-dentatum æquantibus vel superantibus.  $\mathcal{L}$  In arenosis secus torrentes Peruviae, ad Huancuo (Ruiz!), in Boliviâ (Pentland!), in Chili ad Valparaiso (Mertens! Philippi! J. Style!), Quillota Rancagua et S. Jago (Bertero!), Mellipilla (Meyen!), in cultis

pr. Concon (Pöppig! coll. pl. chil. 1. n. 158, forma foliis eximie laciniatis). V. glandulosa Moris! ann. di stor. nat. 4 p. 59. Caules ramique rigidi. Follorum incisura secundum locum varia; nervi subtus prominentes. Spicæ longius breviusve pedunculatæ, semper confertissimæ, denique subtripolicates. Calyx unâ lineâ paulo longior. Corollæ tubus calyce subdupo longior, limbus perexiguus. (v. v. c. et s. sp. in h. berol. et DC.)

\*\* *Caulibus subnudis, nudis junceisve.*

27. V. SAGITTALIS (Cham.! l. c. p. 259), rhizomate repente, caulis simplicibus junceis tetraquetris, angulis subalatis acie marginatâ faciebusque scabris, his canaliculatis seriatim scrobiculatis scrobiculis orbicularibus puberulis, foliis parvis sessilibus ovatis vel trianguli-oblongis acutis integerrimis subseratis trinerviis strigoso-scabris, spicis cylindricis densifloris aggregatis subternis, bracteis lanceolatis acuminatis brevibus margine cum angulis calycis hirtulis.  $\mathcal{Z}$  In Brasiliâ meridionali (Sellow!). Caules 1 $\frac{1}{2}$ -2 pedales ad nodos contracti, aspectu subaphyllis internodiis longis striatis valleculis scrobiculatis. Folia police minora. Calyx 2 $\frac{1}{2}$  lin. longus. Corollæ tubus calyce vix longior, limbus parvus. Capsulæ cocci dorso tenuiter striati, marginati. Sequenti similis, sed distinctissima. (v. s. in h. reg. berol.)
28. V. ALATA (Cham.! l. c. p. 258), caule subfastigato, ramis aspectu subaphyllis tetraquetris, angulis subalatis acie marginatâ scabré, faciebus glabris canaliculatis tenuiter striatis, foliis parvis sessilibus ovatis vel trianguli-oblongis acutis integerrimis vel argute serratis trinerviis rugosis strigoso-scabris, paniculâ terminali cymosâ subfastigiatâ, spicis subcylindricis densis brevibus, bracteis lanceolatis acuminatis brevibus angulisque calycis hirtulis.  $\mathcal{Z}$  In Brasiliâ meridionali (Sellow!) — Sweet brit. fl. gard. 2. ser. 1. t. 41, Caules facile orgyales. Folia ramea semipollicaria-pollicaria. Inflorescentia fere V. Bonariensis. Calyx 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus. Corollæ tubus calyce dimidio longior, limbus mediocris. Capsulæ cocci dorso striat. (v. v. c. et s. sp. in h. reg. berol.)
29. V. EPHEDROIDES (Cham.! l. c. p. 261), fruticulosa, ramosissima, subaphylla, ramis tetraquetris marginatis faciebus alternis sulcatis glabris lăvibusque, foliis minutissimis squamiformibus acutis recurvis reflexis, paniculâ amplissimâ fastigiatâ laxâ, spicis singulis ternis pedunculatis laxiusculæ densifloris basique sèpius interruptis ovoideis deinde anguste cylindricis, bracteis ovatis acutis cum calyce oblongo pube strigulosa canescensibus eâque triplo brevioribus.  $\mathcal{Z}$  In civitate Cisplatina (Bacch! Sellow!). Planta habitu valde insignis. Calyx 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus. Corollæ tubus vix exsertus, limbus parvus. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)
30. V. GLAUCÀ (Gill. et Hook. bot. misc. 1 p. 163), suffruticosa, ramis elongatis teretibus filiformibus glaucis, foliis distantibus minutissimis linearibus, spicis capitatis ovatis subpubescentibus densifloris, bracteis exterioribus calyce duplo majoribus cordatis rigidis pungentibus.  $\mathcal{Z}$  In Chili prope flumen del Diamante ad Poxo de los Anos (Gill.). Species glaucoidine caulinum, foliis minutis vix 3 lin. longis, capituloque bracteis rigidis longis magnis prædicto. Bracteæ interiores minores.
31. V. SPATHULATA (Gill. et Hook. l. c. p. 162), suffruticosa, ramosissima, ramis erectis junceis teretiusculis striatis glabris vel glabriusculis, foliis remotis linearie-spathulatis basi attenuatâ sessilibus acutiusculis integerrimis revolutis strigis sparsis scabris, spicis confertis ovoideis, calyce tubuloso dentibus subulatis.  $\mathcal{Z}$  In convallibus Andium Chilensem. Suffrutex bipedalis. Folia subuncialia, angusta. Capitula police breviora. Bracteæ margine scariosæ, dorso striatae, pubescentes. Corolla calycem tertiam parte supcrans, tubo pube reversâ subcanescente.

a. *grandiflora*, bracteis latis ovato-oblongis obtusis calyce triente brevioribus, calyce 2 $\frac{1}{2}$  lin. longo, corollæ limbo majore. — In Chili prov. Coquimbo (Gay!  $\mathcal{J}$ . Style!)

*β. parviflora*, bracteis lanceolato-subulatis aut ex ovata basi acuminatis calyce duplo brevioribus, calyce 2 lin. longo, corollæ limbo duplo minore. — In Andibus Mendozæ (Gill., Bridg.! n. 1220). V. spathulata G. et H. l. c. Hæc siccando nigrescit. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)

\*\*\* *Foliis acerosis.*

32. V. SELAGINOIDES (Kunth!), Walp. repert. 4 p. 15), fruticulosa, ramis teretibus striatis retrorsum hirtis, foliis alternis axillis proliferis linearibus sessilibus obtusis uninerviis revolutis utrinque strigilloso-bispidis, supremis involucrantibus sensim in bracteas abeuntibus, capitulis multifloris confortissimis hemisphaericis, bracteis foliaceis lanceolatis acuminatis calyce paulo longioribus et cum eo hirtis. ♂ In Andibus Chilensis, in prov. Coquimbanâ (Gay!). V. alternifolia hort. Fruticulus subbipedalis, ramis bornotinis virgatis strictis patentibus. Folia semipollicaria, perangusta, glanco-virentia. Capitula cerasi magnit. Calyx 2½ lin. longus, dentibus 5 plicato-subulatis. Corolla azurea, cal. tubo duplo longior, tubo superne ampliato subcurvato extus puberulo, limbo mediocri. (v. s. c. in h. Kunth et sp. h. DC.)
33. V. THYMOIDES (Cham.! l. c. p. 257), fruticulosa, tota subcanescenti-strigosa, caulinis gracilibus tetragonis erectis superne fastigiatis, foliis sessilibus usque ad basin tripartitis, lacinias lateralibus bifidis integrisque omnibus linearibus angustissimis acutis margine revolutis, spicis brevipedunculatis plerumque paucifloris capitatis dein paulo relaxatis, bracteis ovato-lanceolatis acuminatis calyce dense strigoso glandulisque consperso duplo terve brevioribus. ♂ In campus graminosis Brasiliæ meridionalis (Sell.! Riedel!). Habitu fere Thymi vulgaris vel Satureiae. Calyx 2 lin. longus. Cor. exigua, coerulea, tubo calycem vix æquante. (v. s. in hh. reg. berol. et cæs. petrop.)
34. V. JUNIPERINA (Lagasca gen. et sp. pl. p. 19), fruticulosa, ramosissima, pubescens, foliis oppositis profunde tripartitis, lacinias acrosis pungentibus adultioribus rigidissimis persistentibus, capitulis terminalibus, bracteis subulatis calyce longioribus. ♂ In convallibus Andium australium, pr. Mendozam (Gill.). — Gill. et Hook. in Hook. bot. misc. 1 p. 163. Fruticulus 4-5-pedalis, habitu fere Ulicis Europæ vel nanæ. Flores albi aut purpurascentes. Cor. glabra, tubo semiunciali superne inflato, calyce dimidio longiore.
- § 4. VERTICILLIFLORÆ. — *Spicae subverticillatae. — Fruticulosæ Australi-Americanæ. Corolla longe tubulosa, subcernua.*
35. V. ASPERA (Gill. et Hook. bot. misc. 1 p. 163), fruticulosa, ramulis hirtellis, foliis alternis axillis proliferis oblongo-lanceolatis acutis subspathulatis in petiolum brevissimum attenuatis revolutis utrinque substrigoso-hirtellis, spicis multifloris laxe imbricatis elongatis, bracteis subulatis calyce tubulosus inæqualiter 4-fido brevioribus et cum eo subhirtello-pubescentibus. ♂ In Peruvia ad Arequipa (Meyen!) et in civit. Platens. inter Mendozam et jugum Andium necnon in valle Uspallatensi (Gill.). Dipyrena glaberrima Walpers! in act. acad. nat. cur. 19 suppl. 1 p. 379, nec vero Gill. et Hook. Fruticulus rigidus patentirameus. Folia exigua. Spicæ 2-5 poll. longæ. Calyx 2½ lin. longus, dentibus subulato-acuminatis valde inæqualibus, quinto postico obsoleto. Cor. alba, glabra, tubo calyce sesquialiore gracili recurvo, limbo 5-partito. Caps. 4-cocca! (v. s. in h. reg. berol.)
36. V. SCOPARIA (Gill. et Hook.! bot. misc. 1 p. 161 t. 47), suffruticosa, glabra, ramis teretiunculis juncceis strictis sulcatis, foliis remotis exiguis ovali-ellipticis oblongis obtusis vel acuminulatis integerrimis petiolo brevi basi dilatato discolore, spicis terminalibus laxe imbricatis, bracteis ovatis sessilibus subciliatis calyce tubuloso brevissime obtuse et æqualiter 5-lobo multo brevioribus. ♂ In Andibus Chilensis (Bridges! n. 47, J. Style!, Gill. Meyen!). Habitu Spartii. Siccando tota nigrescit. Folia super. sæpissime minuta, infer. majora ad summum pollicaria. Spica 1-2 poll. longa.

- Calyx plicatus. 2 lin. longus, subpuberulus, glabrescens. Cor. tubus calycem duplo excedens subinfundibularis recurvus, fauus villosula; limbus 5-partitus majusculus. Capsula 4-cocca! caiycem subæquans. (v. s. in h. reg. ber. et DC.)
37. V. APHYLLA (Gill. et Hook. l. c. t. 46), suffruticosa, ramosissima, ramis flexuosis teretibus striatis glabris omnino aphyllis, spicis terminalibus multifloris, bracteis minutissimis squamæformibus subtrotundis cum calyce pubescentibus. ♂ In Andibus Chilensis prope Villa Vicenzia et in civit. Platensi prope Menozam (Gill.). Caules 3-4-pedales. Rami squamulis minutis fuscis decidui basi subtensi. Spicæ pollicares-bipollig. Flores Melliodori. Calyx cylindraceus, angulatus, corollæ duplo brevior. Corollæ limbus 5-lobus.
38. V. CINERASCENS, suffruticosa, pubescentia lanuginosa cinereo-canescens, ramosissima, ramis acute quadrangularibus sulcunjuncis erectis, foliis remotis parvis linearis vel oblongo-lanceolatis basi attenuatis integerim utrinque strigoso-hirtis, spicis terminalibus subremotifloris, bracteis linearis-oblongis calyce inæqualiter et acute 5-dentato triente brevioribus. ♂ In Andibus Chilensis a Rio Colorado usque ad la Guardia de los Horrillos (Pœppig ! Gay !). Citharexylum alpinum Pœpp. pl. chil. coll. 2. n. 85 (9). Folia 4-12 lin. longa, postice longius breviusve attenuata, petiolo basi dilatato et discolori in angulos decurrente. Spicæ sæpius rariflora, plerumque subpollicares, floribus sessilibus. Calyx 2 lin. longus, tubo corollæ subinfundibulari leviter recurvatus duplo brevior. Corollæ limbus majusculus, 5-partitus, patens. Fructus non vidi, sed ex habitu et flore certo ad Verbenam pertinet. (v. s. in h. DC.)

§ 5. LEPTOSTACHYÆ. — *Spicæ filiformes vel demum saltem graciles, elongatae. Flores parvi.*

\* *Foliis integris.*

39. V. CARNEA (Med. fide auct.), tota scabro-hirtella, rhizomate repente, caulinis subsimplicibus ascendentibus tetragonis, foliis spathulato-oblongis basi cuneato-attenuata sessilibus obtusis serrato-dentatis rugosis subtus venoso-reticulatis, spicæ terminali subsolitariâ filiformi elongata remotiflora, bracteis lanceolato-subulatis calyce acute dentato triente brevioribus. ♀ In America septentr. civit. australibus, in pinetis arenosis Carolinæ (Beyrich ! Bosc ! Fraser !), in Floridâ (Mitchill !) et Georgiâ (h. DC.!). V. Carolinianus hort. nou L. Species distinctissima. Rhizoma caules hinc inde emittens  $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  pedales, spicæ singulâ vel rarius spicis ternis terminatos. Folia subbiplicaria. Calyx 2 lin. longus. Cor. calycem dimidio excedens, carnea, extus hirtella. Capsula calycem fere æquans, coccis dorso nitidis obsolete striatis et reticulatis. (v. v. c. et s. sp. in hh. reg. berol. et DC.)

40. V. ANGUSTIFOLIA (Michx. fl. bor. amer. 2 p. 14), caule erecto tetragono superne fastigiato-ramoso, foliis angusti lanceolatis basi longe attenuata sessilibus acutiusculis superne argute et sæpius inæqualiter serratis lineato-rugosus supra subtusque in reti prominentes strigis sparsis scabris, spicis filiformibus elongatis conferti usculis terminalibus singulis subternis strigoso-scabridis, bracteis lanceolato-subulatis calycom acute dentatum subæquantibus. ♀ In arvis humidis Americae septentr. (Michx., Torrey !), Kentucky (Peter !), Tennessee (Beyrich !), Missouri (Engelm.!), Carolinæ (Durand !). V. simplex Lehman. pug. pl. nov. 1 p. 37. V. rugosa Mühlb. in Willd. herb. n. 1119. Perinsignis! Caules bipedales, strigis sparsis hispiduli. Folia 2-3 poll. longa, 3-4 lin. lata, læte virentia, nunc subintegerrima, nunc argute et minute, nunc vero grossius et inæqualiter serrata. Spicæ una paniculam fastig. struentes. Calyx 2 lin. longus. Cor. lilacina, glabriuscula, tubo calycem paulo superante. Calyx fructiger angulatus, dentibus recurvis capsulam superans. (v. v. c. et s. spont. in h. berol. et DC.)

41. V. PANICULATA (Lam. encycl. 8 p. 548), caule tetragono sulcato stricto superne erecto-ramoso hirto-scabro, foliis membranaceis, inferioribus interdum

ovatis hasi hastato-productâ longe acuminatis, superioribus omnibus lanceolatis basi angustatâ in petiolum longum decurrentibus acuminatis grosse et inaequaliter acute inciso-serratis utrinque strigoso-scabris, spicis gracilibus subelongatis confertifloris seabridis cum terminalibus tum ramealibus paniculatis omnibusque unâ subpyramidalto-paniculatis, bracteis lanceolato-subulatis calyce aente dentato triente brevioribus.  $\mathcal{L}$  In montosis Americæ septentr. (Pursh, Rafin.! Bott !), in territ. Missouri (Engelm.!) — Bot. Reg. t 1102. V. hastata Linn. hort. ups. p. 8. Herm. parad. t. 242. V. hastata ne tanquam varietas quidem distinguenda, quam in eadē plantâ folia primordialis nunc hastata nunc subhastata nunc, et sèpius, lanceolata hasi cuneatâ invenias. Nomen aptius etsi recentius præferendum habui. Maxime recedit a sequenti foliis, spicis, floribus, paniculâ. Caules subborgales. Folia sursum decrescantia. Panicula terminalis, aphylla; paniculæ axillares tri-plurispicatae, nudæ felliæ basi stipitatae. Spicae denique vix ultra 4 poll. elongatae, strictæ, floribus imbricatis, calycibus fructigeris adhuc contiguis. Cal. 1' lin. longus, mucronibus brevisubulatus. Corolla amœne violacea, glabra, calyx paulo longior. Calyx fructiger apertus, capsulam æquans; cocci lucidi, marginati, dorso sementer obsoletissime striato et reticulato ideoque lăviuscule.

$\beta$ . *pinnatifida*, foliis infer. tripartitis trifidis, superioribus vel omnibus pinnatifido-laciniatis et grosse serratis.  $\mathcal{L}$  In Amer. sept. V. pinnatifida Lam. ill. 1 p. 57. (v. utramque variat. v. c. et s. silv. in h. berol. et DC.)

42. V. URTICIFOLIA (Linn. hort. ups. p. 9, spec. pl. p. 29), caulis tetragonis sulcatis strictis hirtellis pilosive, foliis membranaceis ovatis vel ovato-oblongis et basi coarctato-cuncata in petiolum longum decurrentibus acuminatis grosse apiculato-serratis utrinque strigoso-hirtis pilosive, spicis filiformibus elongatis virgatis laxifloris strigoso-scabridis cum terminalibus tum axillaribus paniculatis, bracteis ovatis acuminatis calyce exiguo triente brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Americæ septentr. civitt. austral., ad vias in civit. Ohio (Frank !), Missouri (Engelm.!), Carolinâ (Bosc !), Louisiana (Taint.!), tum circa Mexicanum (H. et B.) et in Antillis majoribus Cubâ (R. de la Sagra !) et Jamaicâ (Sw.!) — Sabb. hort. rom. 3 t. 55, Kniph. ectyp. cent. 11. Moris. oxon. hist. 3 p. 418 sect. 11 t. 25. V. diffusa Lam. enc. 8 p. 550. V. scabra Vahl ecl. am. 2 p. 27 ad specimen incompl. descripta? Distinctissima a præcedente foliorum figura, spicis gracillimis floribusque minoribus. Caules pluripedales, inferne subsimplices. Folia interdum maxima, laminâ 8 poll. longâ 3 poll. latâ, plerumque 3-4 poll. longâ 1½-2 poll. latâ, petiolo pollicari; serraturæ sèpius iterum uniserratae. Calyx unâ lineâ paulo brevior, dentibus brevibus acutis. Corolla albida, calyx dimidio longior, perexigua. Capsula calycem apertum adæqua, coccis fuscis dorso leviter striato-jugato superne obsolete reticulato. (v. v. c. et s. silv. in h. berol. et DC.)

43. V. CAROLINIANA (Linn. spec. 2 p. 29), caule tetragono sulcato stricto ramoso scabro aut piloso-hispido aut subvilloso-hirsuto, foliis lanceolato-oblongis lanceolatis basi cuneato-angustatâ sessilibus acutis grosse et acute serratis lineato-subrugosis supra strigosis subtus vel solis in nervis vel in totâ paginâ strigoso-hirtis, spicis filiformibus elongatis virgatis laxifloris hirtosabridis cum terminalibus tum axillaribus subternis omnibusque unâ fastigiatopaniculatis, bracteis ovato-subulatis calyce exiguo duplo brevioribus.  $\mathcal{L}$  In regno Mexicano, uti videtur, satis vulgaris; in monte ignivomo Xorullo (H. et B.) ad Real-del-monte (Ehrenb. n. 846 et 516), in convallis Toluceanâ, ad Zacaltipam, inter Puebla-vieja et Real-del-Monte (Alamán ! Berland. pl. mex. n. 252 ! 265 ! 749 ! et 1222!), Jalapa in plateis et circa urbem (Schiede ! n. 134). V. Caroliniana Spr. syst. 2 p. 748, Cham. et Schl. ! in Linnæa 5 p. 98, herb. Willd. n. 1112. V. Carolinensis etc. Dill. ! hort. elth. p. 407 t. 301 fig. 388. V. polystachya Kunth ! in H. et B. l. c. 2 p. 274. V. biserrata Kunth. ! ibid. p. 275. V. recta Kunth. ibid. p. 277 (ex descr.). V. paucifolia Mart. et Gal. bull. acad. brux. 11 p. 324. V. veronicæfolia Kunth ! l. c. forma aprica, sitiens, magis hirsuta, spicis rârioribus brevioribusque.

*V. hirsuta* Mart. et Galeotti ! l. e. p. 321 et *V. mollis* eorumd. ibid. Praecedenti sane proxima, sed distincta foliis, spicis, ternis, flore. Tota planta statuā, indumento et inflorescentiae conditione valde varlat; habitu autem, foliorum figurā, flore et fructu tuto recognoscenda. Caulis 2-3-pedalis, erectus vel adscendens. Folia 2-3-pollicaria longit., 6-8 lin. latit., serraturis sepius inæqualibus dupliceibus. Panicula nunc ditissima ample fastigiatā, nunc pauperior magisque compacta. Spicæ circ. 9-pollicares. Calyx unā lineā paulo longior, dentibus brevissimis subæqualibus ovatis mucronatus. Corolla per exigua, tubo calycem tantum sequante aut vix excedente. Capsula oalyce mucronibus conniventibus clauso velata, coccis fuscis dorso 5-jugato superne obsolete reticulato. (v. s. in h. Willd. Kunth, reg. berol. et DC.)

44. *V. STRICTA* (Vent. hort. cels. p. 53. t. 53), unde cānescenti-hirsuta, caulinis strictis subteretiusculis simplicibus apice corymbosis piloso-hirsutis, foliis approximatis ovatis ellipticisve basi breviteatā subsessilibus acutis grosse et acute inciso-serratis supra rugosis strigoso-hirsutis subtus venoso-reticulatis reti hirsuto, spicis corymboso-paniculatis elongatis confertifloris cylindricis strictis strigoso-hirsutis, bracteis linearī-setaceis calycē breviter acuminato-dentatum æquantibus.  $\mathcal{L}$  In Americæ septentr. austral. et austro-occidentibus (Riehl ! n. 196, Engelmann !). *V. rigens* Michx. fl. bor. am. 2 p. 14. *V. alopecuroides* hort. Calyx 2 lin. longus. Corolla calycem duplo superans, corulea, extus strigoso-blrsuta, faucibus villosus. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)

45. *V. PROSTRATA* (R. Br. in Ait. hort. kew. ed. 2 v. 4 p. 41), villoso-hirsuta, caule prostrato diffuso tetragono a basi ramosissimo hirsuto, foliis ovalibus oblongisve interdum subtrifidis ē basi cuneatā in petiolum longe attenuatis obtusis acutisve grosse et inæqualiter acuminato-serrato-dentatis incisive supra rugulosis utrinque strigoso-pilosis subbirstutis, spicis terminalibus alaribusque elongatis superne confertifloris gracilibus subcylindricis canescenti-hirsutissimis bracteis lanceolatō-acuminatissimis calyce ex ore truncatō subulato-mucronato triente brevioribus.  $\mathcal{L}$  In Novā-Californiā (Dougl.). *V. prostrata* R. Br. fide spec. ex hort. kew., *V. lasiostachys* Link! enum. h. berol. 2 p. 122. Affinis praecedenti, sed jam crescendi modo et habitu longe diversa. Spicæ 3-5-pollicares, inferne remotifloræ, superne laxe imbricatae. Calyx sessilis, 2 lin. patulo brevior. Corolla cornutescens, calycem tertiam superans, externe glabra, circa fauces villosula. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)

\*\* *Folii dissectis.*

46. *V. LUCÆANA* (Walp. repert. bot. syst. 4 p. 23), tota strigoso-hirsuta, caule erecto ramisque patentibus corymbosis tetragonis, foliis sessilibus, inferioribus tripartitis laciniis pinnatifidis grosse dentatis, superioribus ambitu lanceolatis acute pinnatincisis superā paginā subtusque in nervis prominentibus hirsutie strigosa canescentibus, spicis terminalibus strictis elongatis remotifloris subcanescensibus singulis ternis omnibus unā paniculatis, bracteis calycem subulato-dentatum æquantibus.  $\mathcal{L}$  In Amer. sept. civ. Louisiana (Tainturier !), circa Houston (Lindheim.). *V. strigosa* Hook. comp. bot. mag. 1 p. 176, nec Cham., Engelm. et Gray pl. Lindheim. p. 21. Spicæ subpedales, floribus per paria subapproximatis. Calyx 2 lin. longus. nervis viridiibutis in mucrones abeuntibus. Corolla hirtella, tubo dentes calycis subæquante, limbo medicori, fauibus villosula. (v. s. in h. DC. et s. c. ex hort. berol.)

47. *V. OFFICINALIS* (Linn. sp. plant. p. 29), caule tetragono erecto striato superne paniculato glabriuscule angulis scabriusculis, foliis oblongo-lanceolatis oblongis lanceolatis basi cunctato-attenuatā sessilibus subbipinnatifidis trifidisve grosse inciso-dentatis supra nitidis glabris vel scabridis subtus in reti prominentie marginęque subrevoluto strigosis, laciniis dentibusque ovatis acutiusculis obtusisve, spicis terminalibus axillariibusque paniculatis filiformibus strigoso-pubescentibus, bracteis ovatis acuminatis calyce mucronato-dentato subduplo brevioribus.  $\mathcal{L}$  Hab. totum fere per orbem calidorem et temperatum, in

ruderatis, ad vias et sepes, iu omni Europâ temperatâ, in Nepaliâ Asiæ (Wall.! cat. n. 1825, Edgew.!), Japoniâ (Sieb. et Zucc. fl. jap. fam. 2 p. 28), Novâ-Holl. orientali (R. Br.! Khotsky!) in Africæ orâ septentr. (Bové), Abyssiniâ pr. Adoam (W. Scbimper! it. abyss. sect. 1 n. 145: demissa, ramis procumbentibus, spicâ subglandulosâ), in Canariis (h. DC.), insulis Capitis-viridis (Brunner) et in Capite B. S. (Bergius!), in Americâ septentr. (Rafin.! Beyrich! ad vias in Georgiâ), Mexico (H. et B. Schiede! n. 1167, Berland.! n. 159), in Cubâ pr. Havannah (de la Sagra!), in Brasilia merid. et Bonariâ (Sellow!) — Fl. dan. t. 628, Swensk bot. t. 182, Hayne pl. offic. 5 t. 42, Sturm D. fl. fasc. 3 Spenn. in Fr. N. ab E. gen. pl. germ. fasc. 21 n. 420. V. spuria Linn. hort. ups. p. 8 et sp. pl. p. 29. Rafin.! pl. bor.-am. exs. n. 90. V. sororia Don prodr. fl. nepal. 104, Sweet! brit. fl. gard. 3 t. 202. V. setosa Martens et Gal.! bull. acad. brux. 11 p. 321 (fide fragmenti a cl. Mart. comm.). Herba pro latâ patriâ haud admodum varians, major et minor, magis præcipue in foliorum tergo interdum pubescens, spicis subconfertifloris et gracillimis remotifloris subinde glanduloso-pubescentibus occurrentis. (v. v. et s. sp. in h. DC. et reg. berol.)

48. V. EHRENBURGIANA, caule tetragono erecto superne paniculato hirto, foliis in petiolum cuneato-attenuatis trifidis lacinii lanceolato-oblongis acutis grosse incisis serratisque supra strigilosis subtus pallidis reti strigoso-hirto, spicis terminalibus paniculatis filiformibus remotifloris strigilosis, bracteis ovatis acuminateis ciliatis calyce brevi obtuse denticulato ter brevioribus.  $\mathcal{L}$ ? In regno Mexicano, prope los Reyes (C. Ehrenb.!, n. 713). V. xutha Lehm. in Linnæâ 10, literatb. 115? de quâ conf. ad num. 82. Species per se quidem satis insignis, sed quoad habitum fere V. Carolinianæ hirsutioris formam Schizophyllum exhibens. Spicae in apice caulis et ramorum paniculas pauperes stremantes, pluriplicares, gracillimæ, floribus suboppositis pereignis. Calyx  $\frac{2}{3}$  lin. longus, angustus, tubo calyce vix longiore. (v. s. in h. reg. berol.)

49. V. SUPINA (Linn.! sp. plant. p. 29), subsimplex, erecta vel ramosissima, procumbens, undique strigoso-hispida, subcanescens, foliis basi cuneata in petiolum decurrentibus multipartito-bipinnatisectis, lacinulis ultimis oblongis obtusiusculis dentato-incisis trifidisve nervis impressis margine subcortilagineo revoluto, spicis terminalibus et alaribus solitariis pedunculatis inox elongandis, bracteis oblongis acuminateis ciliatis calyce strigoso-canescente brevidentato duplo brevioribus. ① In terris mare Mediterraneum et Pontum Euxinum circumiacentibus in ruderatis, arvis, ad vias; in Italiâ inf. (Ten.!), Siciliâ (Duby!), Græciâ (Sibth., Fraas) et secundum Danubium fl. usque in agrum Pesthinensem (Fenzl!), ad Caucasum (Steven!), in Mesopotamia pr. Mossul (Kotschy! pl. alepp. n. 447), in Nubiâ ad ripas declives Nili cerulei pr. Chartum (Kotsch.! it. nub. n. 323), in omni Agypto juxta Nilum fl. (Acerbi! Coqueb.! Aucher-Eloy! Martins! Wiest! herb. un. it. n. 90), in Algeriâ (Desf.), Hispaniâ merid. e. gr. pr. Malagam (Boiss.!) et in Canariis (Brouss.! Cbr. Sm.!). — Sibth. fl. gr. 6 t. 554. V. procumbens Forsk. Planta ex loco, statura et indumento valdopere varians, plerumque canescens, interdum tamen fere glabrescens atque nitens. Spica primum confertæ brevisimæ, sensim ad pluriplicarem quin ad semipedalem fere long, elongandæ. Flores parvi. Capsula obovoido-tetragona, calyci haud ulterius producto inclusa; cocci dorso costâ obtusâ carinati, superne transversim grosse rugosæ. (v. v. c. et s. sp. in b. reg. berol. et DC.)

50. V. CANESCENS (Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 274 t. 136), undique canescenti-birta, ramosissima, procumbens, ramis tenuibus sulcatis, foliis rigidis oblongo-lanceolatis basi attenuata sessilibus subpinnatifido-incisis lineato-rugosis margine revolutis, lacinii patentibus acutis, spicis terminalibus alaribusve solitariis filiformi-elongandis relaxandisque, bracteis inferioribus saepius filiformibus superioribus sensim deresentibus ovatis lauceolatisve acuminatis calycem brevidentatum paulo superantibus rariusve subæquantibus

et cum eo hirsutie pilis glanduligeris commixta canescentibus. (1) In montanis Mexici, pr. Guanaxuato, Morfil et fordinam Belgrado alt. 1000-1250 hex. (H. et B.! herb. Willd. n. 11141), ad Tampico de Tamaulipas, S. Fernando et inter Santaander et Victoria (Berland. pl. mex. n. 170, 2054 et 2247, Hartw. pl. mex. n. 174 et 177). V. gracilis Desf. cat. hort. paris. ed. 3 p. 393. V. remota Benth. pl. Hartw. p. 21. Herba sequenti proxima et caute distinguenda, primo ictu habitum Myosotidis quodammodo offerens, ramis subsemi pedalibus, rarius simpliciuscula. Folia subpollicaria, subtus nervosa. Spicæ 2-3-pollicares, in aliis inferius remotiflora bracteisque foliacies interstinctæ, in aliis pedunculatae bracteis et infimis integerrimis et nunc omnibus calycem excedentibus nunc imis tantum calyce paulo longioribus superioribus vero eundem modo æquantibus. Calyx lineam longus, nervis herbaceis in mucrones exeuhibus. Corolla calyce dimidio longior, coriacea, fauca, villosa. Capsula calyci ipsi subæquali inclusa, coccis dorso semitereti tenuiter 5-jugo a medio indé reticulato-rugoso. (v. s. in hh. Kunth, Willd. et DC.)

51. V. BRACTEOSA (Michx. fl. bor.-amer. 2 p. 14), virens, undique piloso-hirsuta, ramosissima, procumbens vel adscendens, ramis subtetragonis sulcatis, foliis membranaceis subspathulato-lanceolatis basi longe et anguste cuneatæ in petiolum attenuatis subtrifidis et pinnatifido-incisis sublineatis utrinque strigosis, lacinia oblongis acutiusculis sæpius dentatis, spicis terminalibus alaribusque solitariis elongatis remotifloris, bracteis foliacies inferioribus pinnatisectis superioribus lanceolatis postice attenuatis integerrimis acuminatis omnibus calyce quater-sexies longioribus et cum eo piloso-hispida. (1), 2? In alluvio sabuloso flumen per omnem fere Americae septentr. occidentem (Michx. Dougl.), in territ. Missouri ad S. Louis (Richl. n. 9, Engelm.!), Illinois (Schradener!) — Bot. mag. t. 2910. Zapania bracteosa Poir. ene. 8 p. 843. V. bracteata Lag. et Rodr. in ann. de cienc. V. squarrosa Roth catalect. 3 p. 3. Folia 1-2 poll. longa, pube laxâ virienta. Spicæ demum semipedales, bracteis patentissimis tandem reflexis squarrosæ. Calyx lineam longus, mucronato-dentatus. Corolla lilacina, glabra, tubo gracili calyce triente longiore, limbo pere exiguo. Capsula illi præcedentis prorsus similis. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)

52. V. PINNATISECTA (Schauer! in Endl. et Mart. fl. bras. ined.) tota glabra vel strigilloso-scabra, rhizomate repente, caulibus strictis subsimplicibus tetragonis, foliis pinguis supra nitidis subtus opacis petiolatis tripartitis bipinnatifido-laciñati, segmentis basi cuneato-attenuatis, laciñis subspathulato-linearibus obtusiæculis integerrimis marginibus subrevolutis, spicis pedunculatis terminalibus ternis vel ternato-corymbosis cylindrico-oblongis imbricatis dein paulo elongandis basique relaxandis, bracteis ovatis acutis calyce brevi breviterque acute dentato plus duplo brevioribus. 2? In Brasiliae prov. S. Pauli, in humidis et paludosis pr. Mugy das Cruces (Ried.! Sellow!). Caules subcubitales. Calyx sesquilineam longus, ore subtilissime ciliatus. Corolla extus glabra, tubo calyce nonnihil excedente, fauce barbâ densâ clausâ, limbi facie velutinâ in disco lanuginosâ. Proxima videtur V. crithmifoliae, quæ vero ex descr. differt foliorum laciñis angustioribus linearibus bracteis linearibus, calycis dentibus obtusiæculis et corollâ calyce duplo longiore. (v. s. in h. cæs. petrop. et reg. berol.)

53. V. FILICAULIS (Schauer! l. c. ined.), tota glabra atque lævis, rhizomate repente, caulibus filiformibus flaccidis subsimplicibus subtetragonis, foliis supra nitidis subtus opacis petiolatis tripartitis, segmentis basi cuneato-attenuatis margine revolutis, lateralibus angusto lanceolatis acutis integerrimis bifidis, intermedio trifido, spicis terminalibus longe pedunculatis singulis ternis laxifloris basi interruptis, bracteis ovatis acutis calyce brevi plus duplo brevioribus. 2? In Brasiliae prov. S. Pauli (Lund!) et Minarum Generalium (Sellow! Khotsky!). Calyx sesquilineam longus, ore brevissime ciliatus, dentibus brevibus lato-triangularibus apiculatis. Corolla extus glabra, tubo calyce dimidio superante, fauce dense barbatâ, limbo in disco sublanu-

ginoso. Proxima præcedenti , potissimum teneritate partium foliisque minus di-sectis laciiniis angustioribus diversa. ( v. s. in h. DC. et reg. berol. )

54. V. INFLATA (Kunth ! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 273 t. 135), fruticulosa, proeumbens , ramosa , tota pube strigoso-hispida canescens , foliis sessilibus fere usque ad basin tripartitis , laciiniis angustis 2-3-5-fidis lacinulis linearibus obtusiusculis revolutis , spicis terminalibus confertis demumque relaxandis, bracteis lanceolato-subulatis calyce brevioribus , calyce subulato-5-fido corollæ tubo æquali. ♂ Crescit locis aridis in regno Quitensi, juxta Muello, Riobamba et Tambillo alt. 1500 hex. ( H. et B ! herb. Willd ! n. 11116 V. heterophylla ), in Columbiæ planitie Riobambæ prope Quito ( Hartw. pl. columb. n. 1352 ). Folia pollicaria, laciiniis lateralibus 2-3-fidis, intermedia 3- vel 5-fidæ. Spica virginea oblongæ sessiles, sub anthesi elongandæ, basi demuni laxæ subpendiculatæ. Calyx 2 lin. metiens, nervis herbaceis in mucrones subæquales exsertis. Corolla limbus parvus, lobis rotundatis emarginatis, fancibus obsolete villosis. Stamina 2! Caps. obovata, grossa , calyce aucto ( sed minime inflato ) arte inclusa et paulo superata, cocciis 4 in dorso reticulato-areolatis. ( v. s. in h. Willd., reg. berol. et Kunth. )

55. V. POGONOSTOMA (Klotzsch ! mss. Walp. repert. 4 p. 31), suffruticulosa ?, diffusa, tota subeantescens , ramis hirtello-pubescentibus, foliis suprà subtusque in nervis strigoso-hispidalis basi cuneatâ sessilibus tripartitis, laciiniis angustis superne pinnatifido-incisis dentatisque lacinulis linear-lanceolatis acutis marginie revolutis , spicis strigoso-hirtellis glandulosisque terminalibus alaribusque fastigiatis inter anthesin valde elongandis semper imbricatis, bracteis lanceolato-subulatis calyce subulato-5-fido triente brevioribus, corollæ tubo infundibulari calycem æquante. ♂ Semina e Bonariâ fuisse allata ferunt; ex affinitate typi tamen regnum Mexicanum patriam autumaverim. Mire similis V. ciliata , vero tamen distincta pube , fol. laciiniis magis elongatis, corollâ et antheris super. omni vestigio appendicis parentibus. Folia 1½ poll., laciiniis inferne integerim lineam lati. Spicae brevipendiculatæ, denique semipedalem longit. attingentes, densifloræ. Calyx 3 lin. longus, coloratus , laciiniis inæqualibus e basi lanceolatâ subulato-attenuatis. Corollæ tubus calycem vix excedens , a basi sensim in fauces luteas ad orificium barbatas ampliatas ; limbus mediocris, azurcus, lobis brevibus rotundatis. Capsula calyce duplo brevior, eoccis dorso reticulatis. ( v. s. cult. in h. reg. berol. )

Sectio II. GLANDULARIA. — Glandularia J. F. Gmel. l. c. — Billardiera Mænch. l. c. — Shuttleworthia Meissn. l. c. — Uwarowia Bunge l. c.

Connectivum antherarum superiorum appendice glandulosâ nunc majore clavatâ exsertâ aut inclusâ nunc minus conspicuâ auctum. — Suffrutices et herbea proeumbentes Americæ temperatæ , et Andium editiorum , foliis dissectis, calycibus longius tubulosis , fructigeris capsulâ duplo brevioribus et super ea constrictis contortis.

56. V. CLAVATA ( Ruiz et Pav. ! fl. per. 1 p. 21 t. 33 f. 6 ), suffruticosa , ramosissima, decumbens ramis adscendentibus , tota strigoso-hirta et incana , foliis sessilibus fere usque ad basin tripartitis , laciiniis divaricatis uniuersaque foliorum paris quasi verticillatis integris linearibus obtusis bi-trifidis revolutis , spicis sessilibus capitatis foliis supremis involvatis multifloris, bracteis lanceolatis calycem sulæq; antibus , appendicibus antherarum exsertis clavatis stipitatis curvato-divergentibus. ♂ In desertis Peruviæ, ad Aricam et Huanuco ( Ruiz ! ), in Pampa grande de Arequipa ( Meyen ! ). V. calcicola Walp. ! in nov. act. acad. nat. cur. 19 suppl. 1 p. 378. Shuttleworthia Ruiziana Walp. ! repert. 4 p. 12. Foliiis ab annibus distinctissima, que sunt 3-4 lin. longa, patentia, laciiniis binorum foliorum circa rimulum verticilli ad instar divaricatis. Calyx 3 lin. longus, cum bracteis canescens-hirsutus , inæqualiter 5-fidus, laciiniis plicato-subulatis. Corolla purpurascens, tubo calyce triente vel subduplo longiore superne strigoso-pubescenti, limbo mediocri

lacinis linearis-oblongis emarginatis, faucibus pubescentibus. ( v. s. in h. reg. berol. )

57. V. SULFUREA ( Sweet ! brit. fl. gard. ser. 2. v. 3. t. 221 ), suffruticosa, hirta, procumbens ramis ascendentibus vel erecta, ramis tetragonis calycibusque hirsutiusculis, foliis pinnatipartitis vel subbipinnatipartitis rhachi basi integrâ petiolatis utrinque strigoso-hispidulis, rhachi lacinisque patentissimis linearibus obtusis revolutis, spicis pedunculatis exsertis capitatis multifloris, bracteis lanceolato-acuminatis calyce triente brevioribus, corollâ glabrâ, appendicibus antherarum exsertis clavatis stipitatis recurvo-patentibus. ♂ In Chili arenosis sterilibus maritimis, ad Quintero et Valparaiso, Concon, Coquimbo est. ( Bertero ! n. 1392 et 1809, Poeppig ! n. 157, Cuming ! pl. chil. n. 519, Gaudich.! Gay! Bridges!), in Peruvia ad Chuquito ( Meyen ! ). — Bot. reg. t. 1748 ! Shuttleworthia sulphurea Meisn.! gen. plant. comment. p. 198. Uwarowia sulphurea Bunge! in bull. acad. petersb. 1840 p. 278, Fisch. et Meyer! in mem. acad. petersb. ser. 6. 2 p. 153 cum ic. V. diceras Bertero ! herb. n. cit. Shuttlew. diceras Meisn. l. c. V. dissecta Poepp. l. c. Schuttlew. dissecta Walp. rep. 4 p. 12, nec vero V. dissecta Willd. Folia subpollicaria, lacinis angustissimis integerrimis trifidisque oppositis, infimis a basi remotis. Axillæ sparsim proliferæ. Calyx  $3\frac{1}{2}$  lin. longus, clavatotubulosus, plicato-5-angularis, inæqualiter et acute 5-dentatus. Corolla pallide sulfurea, calycem dimidio superans, glabra, limbo majuscule, faucibus oreque antice barbatis. Appendices violaceæ. Capsula calyce duplo brevior, cocci quaterni (!), interdum abortu bini ternive, dorso reticulato-rugosæ. Variat indumento magis minusve hirsuto hispidove, canescens et viridis. ( v. v. c. et s. silv. in h. DC. et berol. )
58. V. BERTERII, suffruticosa, procumbens ramis adscendentibus, tota canescens-hirta, ramis tetragonis calycibusque hirsutiusculis, foliis pinnatifidis trifidisque lacinia intermedia tridentata utrinque strigoso-hispidulis basi attenuata integrâ petiolatis, lacinis linearis-lanceolatis acutiusculis revolutis, spicis pedunculatis exsertis capitatis multifloris, bracteis linearis-lanceolatis calyce triente brevioribus, corollâ pubescente, appendicibus antherarum dorso impositis vix exsertis. ♂ In arenosis petrosis regni Chilensis imprimis secus torrentes, ad Valparaiso, Quillota, Rancagua ( Bert. ! n. 744, 1389 et 1390, Gaudich.! J. Style ! ), in collibus glareos ad Concon ( Poeppig ! pl. chil. 1 n. 159, in Boliviâ (Filter!). Shuttleworthia Berterii Meisn.! gen. pl. comment. p. 198. V. crinoides Poepp. l. c. Proxima precedenti, sed distinctissima corollâ (uti videtur albida) et appendicem condizione. Differt a V tenerâ foliis, flore, indumento. Calyx  $3\frac{1}{2}$ -4 lin. longus. Corolla calyce triente vel subduplo longior, tubi exsertâ parte pubescente rarius glabriusculâ, limbo majuscule faucibus hinc villosis. Appendices connectivo basi continuæ, antheram apice clavulato paulo supereminentes. Capsula calyce apice contorto triente brevior 4-cocca, cocci helvolis dorso tertii leviter striato apice reticulato-rugoso. ( v. s. in h. DC. )
59. V. LIPOZYGOIDES ( Walpers! repert. 4 p. 16 ), suffruticosa, procumbens ramis adscendentibus, tota canescens-strigoso-hispida hirsutus glandulis commixta, foliis brevipetiolatis bipinnatifidis-multipartitis, lacinis tenuiter linearibus revolutis obtusis, spicis sessilibus capitatis multifloris, bracteis linearibus calyce paucio brevioribus, corollâ glabrâ, appendicibus antherarum dorsilibus fauces aquantibus. ♂ In Chii ( Besser ! n. 136 ). Proxima precedenti, sed foliis tenuiter multipartitis, spicis sessilibus corollâque glabrâ distincta. Caules basi radicantes, rami tenues, breves. Folia subsemipollucaria, axillis proliferis. Calyx 4 lin. longus, inæqualiter et acute 5-fidus. Cor. alba ? tubo calyce semilongiore. Capsula calyce superius clauso duplo brevior, coccis 4 atris, in tergo sulco exaratis et superne subtuberculatis. ( v. s. in h. reg. berol. )
60. V. MICROPHYLLA ( Kunth! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 272 t. 133), suffruticosa, humifusa, ramosissima, repens, strigoso-hispidula, foliis tripartitis

basi cuneatâ subpetiolatis, laciiniis obovato-oblongis obtusis revolutis integerimis vel mediâ trifidâ lateralibus bifidis, spicis terminalibus alaribusque subsessilibus capitatis multifloris, bracteis lanceolatis calyce breviter et acute 5-dentato duplo brevioribus, appendicibus antherarum corniculiformibus fauces æquantibus. ♂ In frigidis Andium Quitensium alt. 1482 hex. ( H. et B. ! ), in solo vulcanico ad Hacienda de San Augustin de Callo et ad Latacunya, Ambata et Riobamba prope Quito ( Hartw. pl. columb. n. 1351 ). Ramuli pubescenti-hirti. Folia parva, 3-5 lin. longa. Spicas breves. Calyx 3 lin. longus, dentibus ovatis acutis. Corolla glabra, tubo calyce vix duplo longiore, limbo mediocri lobis emarginatis, fauce pilosâ. Appendices anther. nigricantes. Capsula calyce duplo brevior, cocciis dorso tenuiter tuberculatis. ( v. s. in h. cl. Kth. et reg. berol. )

61. *V. RADICANS* ( Gill. et Hook. in Hook. bot. misc. 1 p. 170 ), suffruticosa, caule procumbente inferne radicante, foliis trifidis segmentis plerumque iterum trifidis, laciiniis oblongo-linearis subcarnosis glaberrimis, spicis brevibus subcapitatis, corollâ calyce pubescente duplo longiore. ♂ In convallibus Andium austral. pr. Mendoza ( Gill. ) — Mound bot. gard. t. 422. Habitu prope accedit ad *V. microphyllum* H. B. Kth., sed folia majora magisque divisa glaberrima, exsiccata flavicantia. Flores fragrantes ( Hook. ). Vix diversa a sequenti.
62. *V. TENERA* ( Spreng. syst. veg. 2 p. 750 ), suffruticosa, humifusa, ramosissima, repens, ramis adscendentibus, foliis in petiolum brevem decurrentibus pinnatifido-laciiniatis, laciinulis linearibus acutiusculis integerimis margine subrevolutis strigillis conspersis nitidis, spicis terminalibus pedunculatis solitariis ternisve fastigiatis deinceps elongandis relaxandisque subcanescensibus, bracteis lanceolatis acuminatis calyce elongato strigoso-pubescente hirtellove ad angulos glandulis patellæformibus breviter stipitatis consito duplo brevioribus, appendicibus anther. vix exsertis clavulatis subrecurvis. ♂ In campis Brasiliæ meridionalis ( Sell. ! ) et civitt. Platensis ( Arsène-Isabelle ! Bacle ! ) *V. pulchella* Sweet ! fl. gard. 3 t. 295. Shuttleworthia pulchella Meisn. gen. pl. comment. p. 198. Shuttlew. tenera Walp. repert. 4 p. 13. Cal. 3 lin. longus. Cor. violacea, tubo calyce subduplicato longiore, ad anth. insert. intus barbato ceterum vero glabro, limbi mediocris laciiniis cuneato-obcordatis. Caps. 4-cocca, reticulato-scorbiculata. ( v. v. c. et s. silv. in h. DC. et berol. )
63. *V. DISSECTA* ( Willd. herb. n. 11139 ), caulesscenti-hirsutiæcula, caule decumbente, ramis erectis teretiusculis, foliis basi cuneatâ in petiolum decurrentibus tripartito-pinnatifidis-laciiniatis, laciinulis linearibus obtusiusculis integerimis dentatisve margine subrevolutis supra strigosis subtus hirsutis, spicis fastigiatis patentifloris haud elongandis cymoso-paniculatis, bracteis oblongis acutis calyce elongato inter hirsutiæ ad angulos glandulis grossis brevissime stipitatis insperso triplo brevioribus, appendicibus antber. subexsertis. ♂ ( 1 ) ? In campis subhumidis Brasiliæ merid., in prov. S. Pauli ( Sell. ! Ruben ! Riedel ! Lund ! ), in Cibili ( Née in herb. Willd. ) et in Peruviæ altâ planitiæ circa Tissacomam alt. 15000 ped. ( Meyen ! ). Habitus fere sequentis, a quâ vero sicut a præcedente præter alia jam inflorescentiâ paniculatiâ spicisque vix elongandis facile discriminatur. Calyx 4 lin. longus, dentibus inæqualibus subulato-aristatis. Corolla violacea, paulo exserta. Append. nigrescentes. ( v. s. in h. Willd. berol. et DC. )
64. *V. ERINOIDES* ( Lam. ill. 1 p. 57 ), annua, caule strigoso-hirto vel subhirsuto ramosissimo decumbente radicante, ramis adscendentibus, foliis basi cuneatâ in petiolum decurrentibus tripartito-pinnatifidis-laciiniatis, laciinulis lanceolatis acutiusculis integerimis subdentatisve margine subrevolutis utrinque præsentim vero subtus in nervis strigosis, spicis terminalibus alaribusque pedunculatis solitariis fastigiatis mox elongandis relaxandisque canescenti-hirtis, bracteis lanceolatis acuminatis patulis calycem elongatum subæquantibus brevioribusve, appendicibus anther. brevissimis subbarbatis. ( 1 ) In cam-

pis et ruderatis Brasiliæ merid., in prov. Minarum (Sell.! Mart.! Ried.!), in Peruviâ (Bonpl.! in h. DC., Meyen !). V. multifida R. et Pav. fl. per. 1 p. 21 t. 33 f. c. V. odorata Meyen reise 1 p. 481. *Erinus laciniatus* Linn. spec. p. 879. *Lychnidea* etc. Fenill. hist. per.-chil. 3 p. 35 t. 25. *Verbena Selloi* Spreng. syst. veg. 2 p. 750? *Shuttleworthia Selloi* Walp. repert. 4 p. 13. Cal. 4 lin. long., dent. subulato-aristatis. Cor. rubro-violacea, breviter exserta. (v. v. c. et s. in h. berol., Mart. et DC.)

$\beta$ . *contracta*, foliis tripartitis, lacinias inciso-pinnatifidis, ultimis linearis oblongis acutis. V. multifida  $\beta$  contracta bot. reg. t. 1766. V. Sabini Sweet br. fl. gard. 2 scr. 4 t. 347.

65. V. CILIATA (Benth.! pl. Hartw. n. 176), herbacea, diffusa, tota subcaescentis, ramis villosso-hirsutis, foliis utrinque strigoso hispidulis brevipetiolatis tripartitis lacinia mediâ pinnatifidâ vel subbipinnatifidâ lateralibus plerumque bifidis, lacinulis oblongis linearibus acutiusculis margine revolutis, spicis hispido-hirsutiusculis glandulosisque densis inter anthesin elongandis, bracteis subulato-lanceolatis calycem subulato-5-fidum triente brevioribus, appendice antherarum dorsali minuto. (In Mexico (Hartw.! pl. mex. n. 176, C. Ehrenb.! n. 1242). Habitu priori aliquo modo accedens. Folia subpollicaria, lacinulis lineam circiter latas. Calyx 3 lin. longus. Corollæ tubus gracilis calyce triente longior, subtiliter puberulus, ore barbato; limbus mediocris lobis obtusis imfimo emarginat. Conf. V. pagonostomam. (v. s. in h. reg. berol.)

66. V. BIPINNATIFIDA, herbacea, erecta, caule ramis spicisque hirsutis, foliis trifidis bipinnatifido-laciniatis basi angustâ petiolatis utrinque strigoso-hispido, lacinia linearibus acutiusculis revolutis, spicis terminalibus alaribusque solitariis fastigiatis denique elongandis, bracteis lineari-subulatis calycem æquantibus, appendicibus antherarum brevibus fauces æquantibus. (In Americae sept. reg. austro-occid., in collibus calcareis apricis ad fl. Red-River Louis. (Nutt.!), in Texas inter fl. Rio de la Trinidad et urbem S. Ant. de Bexar (Berland.! n. 1749 et 1449). *Glandularia bipinnatifida* Nutt.! in Journ. ac. sc. phil. 1821 p. 123. Folia 1½-3 poll. longa, trifida lacinia mediâ pinnatifidâ vel trifida lacinia bipinnatifidis, viridia, nervis subtus prominentibus imprimis hispido-hirsutis. Calyx 4½ lin. longus, nervis viridibus in dentes exeuntibus longe subulatos inæquales postico reliquis breviore. Corolla extus pubescens, calyce triente longior, lilacina, limbo majuscule. Capsula calyce superne contorta triplo brevior, coccis dorso exsculpto-areolatis. (v. s. spec. orig. in h. DC.)

67. V. ANDRIEUXII, caule diffuso, ramis procumbentibus subtetragonis hispidis, foliis basi cuneatâ sessilibus profunde trifidis impresso-rugosis utrinque strigoso-hispido lacinia mediâ pinnatifidâ segmentis cum lacinia lateralibus patentibus lanceolatis acutiusculis margine subrevolutis integerrimis incisive, spicis termin. alaribusque brevipedunculatis oblongis confertis hispidis subglandulosis, bracteis subulato-lanceolatis calyce subulato-5-fido triente brevioribus, appendicibus anther. dorsalis brevibus. (?) In Mexico, inter Pueblam et Oaxacam (Andr.! pl. mex. n. 138). Rami oppositi elongati. Folia sesquipoll. lacinia subseminalibus, axillis saepe proliferis. Spica pollicaris. Calyx 4 lin. longus. Corollæ tubus calycem dimidio excedens puberulus, limbus mediocris, fauces barbatæ. Capsula calyce duplo brevior. (v. s. in h. DC.)

68. V. EXILIS, canæ ramosissimo prostrato radicante, ramis teneris acute quadrangularibus pubescenti-hirtellis, foliis cuneatâ basi longe attenuatâ quasi petiolatis pinnatifido-incisis nervis supra impressis subtus strigillosis pagina infera subglaucescente, segmentis ovatis obtusiusculis margine revolutis integerrimis aut paucidentatis, spicis terminalibus alaribusque vir exsertis paucifloris compactis strigoso-hirtellis, bracteis oblongis acuminatis ciliatis calyce subulato-5-dentato subduple brevioribus, appendice anth. dorsali minuta. (In Mexico, pr. Huaxalote (C. Ehrenb.! pl. mex. n. 131). Herba teneritudine inter confines insignis. Folia 3-5 lin. longa, laminâ 1½-2 lin. latâ, paribus im-

basi subdilatata fere contigua. Spicæ brevipedunonlatæ, vix e summis foliis emergentes, 3-5-floræ. Calyx plicatus, 3 lin. longus, pube sparsa. Corollæ tubus calycem paulo excedens, limbus parvus. Caps. calyce superius contorto duplo brevior, coccis reticulato-rugosis. (v. s. in h. reg. berol.)

69. V. ELEGANS ( Kunth ! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 273 ), caule ramoso procumbente, ramis ascendentibus hispidis, foliis basi cuneatâ in petiolum brevem abeuntibus pinnatifido-laciniatis supra subtusque in nervis prominulis strigoso-hispidulis, laciniis integerimis linear-i-oblongis obtusiusculis margine subrevolutis, spicis term. alaribusque pedunculatis fastigiatis paulo elongandis hispidulis pube rara glandulosâ immixtâ, bracteis subulato-lanceolatis calyce inæqualiter subulato-5-fido paulo brevioribus, appendice anth. dorsali brevi. (I) In Mexico, in frondosis inter Moran et Regla alt. 1300 hex. (II. et B. ! herb. Willd ! n. 11140), in Vallalpando (Mendez ! fol. figura aliena, cor. majore tubo conspicio exerto). V. moranensis H. et B. I. c. Habitu, formis majoribus, V. erinoidis quodammodo accedens, sed corollâ magnâ jam satis distincta. Folia pollicem circ. longa. Calyx 3 lin. longus, ore dentibus posticis brevioribus obliquo, magis minusve glandulosus. Corollæ tubus calyce subduplo longior, fauces barbatæ, limbus magnus lobis emarginatis. Caps. calyce duplo brevior, coccis superne rugoso-reticulatis. (v. s. h. in Willd. et DC. )
70. V. LAMBERTI ( Ker ! bot. reg. t. 1102 ), caule diffuse ramoso ramisque adseidentibus hirsutiusculis, foliis basi longe cuneatâ in petiolum attenuatis trifidis, laciniis ambitu lanceolatis inæqualiter inciso-pinnatifidis segmentis lanceolatis integerimis acutis utrinque strigoso-hirtellis, spicis term. alaribusque pedunculatis fastigiatis valde elongandis hirsutiusculis subglandulosisque, bracteis lanceolatis calyce inæqualiter subulato-5-fido duplo brevioribus. (I) In Mexico (C. Ehrenb. ! n. 130). — Sweet ! brit. fl. gard. ser. 2 v. 4 t. 363. Intermedia quasi inter præodemem et sequentem, ab illâ foliis minus divisis, floribusque majoribus, ab hac vero foliis profundius incisis incisuris integris patentibus distincta. Flores et fructus omnino V. Aubletia, sed paulo maiores. ( v. v. c. et s. spont. in h. reg. berol. )
71. V. AUBLETIA ( Linn. ! suppl. p. 86 ), caule diffusc ramoso ramisque adseidentibus hirsutiusculis, foliis ovato-oblongis basi cuneatâ in petiolum attenuatis subtrifidis pinnatifido-incisis, segmentis grosse inaeiso-serratis supra subtusque in nervis prominulis sparsim strigoso-hirtellis, spicis term. alaribusque pedunculatis fastigiatis valde elongandis hirtellis subglandulosus, bracteis subulato-lanceolatis calyce inæqualiter subulato-5-fido subduplo brevioribus, appendice anth. dorsali brevi. (I) In America septentr. reg. austro-occid. in arvis et campis, in Texas ( Lindheim. ! ), Carolinâ ( Wait., Fraser ! Rose ! Beyrieh ! ), Louisianâ ( Dougl. ), in civ. Ohio ( Frank. ! ). — Jacq. ! hort. vindob. 2 p. 82 t. 176, Bot. mag. t. 308, Bot. reg. t. 294. V. Obletia Retz. act. holm. 1773 p. 141 t. 5, Med. ! act. acad. theod.-palat. vol. 3 phys. p. 194 t. 7. V. longiflora Lam. ! ill. 1 p. 57. V. grandiflora Michx. Obletia Rozier journ. 1 p. 367 t. 2. Anonymus Carolinensis Walt. carol. p. 240. Glandularia Carolinensis J. F. Gmel. syst. veg. p. 920. Billardiera explanata Mœnch ! meth. p. 369. Forma vel varietas major, speciosior est V. Aubl. var. Drummondii Lindl. ! Bot. reg. t. 1925. Planta ornamentalia hortis europeis familiaris, ab affinis foliis minus dissectis discernenda. Corolla conspicua lilacina, tubo calyce duplo longiore, fauces annulato-barbatæ, limbi magni lobis emarginatis. Caps. calyce duplo brevior, coccis superne reticulato-rugosis. ( v. v. c. et s. silv. in h. reg. herol. et DC. )

*Species non satis note.*

72. V. TRIDACTYLITES ( Lag. nov. gen. et sp. p. 19 ), spicis capitatis terminalibus solitariis, foliis minutis connatis bifidis linearibus. 3 In insulis Maluinis. Fruticulus 1-2-palmatis, V. thymifoliae quoad habitum simillimus.
73. V. THYMIFOLIA ( Lag. l. c. ), suffruticosa, humilis, ramosissima, foliis

- ovatis ciliato-scabris margine revolutis, spicis capitatis terminalibus solitariis.  
♂ Crescit in Porta Desiderato. Habitus Herniariae fructosæ.
74. V. TRIDENS (Lag. l. c.), fruticosa, foliis trifidis lacinii subulatis arenosis, spicis cylindricis, bracteis brevibus tridentatis. ♂ Crescit in Americâ meridionali. Frutex 3-4-pedalis.
75. V. RHINANTHIFOLIA (Martens et Galeotti in bull. acad. brux. II p. 323), caule herbaceo cæspitoso-ramoso prostrato pubescenti-hirto, foliis basi cuneatâ sessilibus ovato-oblongis obtusis remote serratis utrinque adpresso pilosis scabriusculis, spicis terminalibus axillaribusque brevibus laxifloris, bracteis minutis subulato-linearis calyce quintuplo brevioribus, floribus subpedicellatis, corollâ calyce tubulo-so pubescenti-hirto vix dimidio longiore. (1) In Mexico, in rupibus trachyticis ad Moreliam (Gal.). Herba 5-6-pollicaris. Folia vix pollicaria. Spicæ  $\frac{1}{4}$ -1 poll. longæ. Calyces 3 lin. longi. (Mart. in litt.)
76. V. LONGIFOLIA (Mart. et Gal. l. c.), caule herbaceo erecto elato glabro lævi, foliis brevipetiolatis lanceolatis elongatis patentibus a medio usque ad apicem acute serratis utrinque lævibus supra subpuberulis, spicis gracilibus filiformibus elongatis paniculatis glabris, floribus bracteisque minutis. (1) In Mexico (Gal.). Folia 4-5-pollicaria iis Veronicæ longifoliæ similia; inflorescentia V. urticifoliæ. (Martens in litt.)
77. V. TEUCRIIFOLIA (Mart. et Gal. l. c.), glabra, caule prostrato ramoso, foliis obovatis in petiolum attenuatè pinnatifido-laciniatis, lacinii oblongis obtusis, spicis axillaribus solitariis laxis paucifloris, floribus majusculis. (1) In Mexici subalpinis sylvaticis montis Orizabæ (Gal.). Affinis V. erinoidi, sed glabritie foliisque minoribus minus laciniatis mox tamen profunde incisis diversa.
78. V. SCOPARIA (Tausch in Florâ 19 p. 390, nec Hook.), caule herbaceo ramosissimo hirto ascendentè, foliis ovatis lanceolatisse inciso-serratis inferioribus hastato-auriculatis, spicis terminalibus valde aggregatis longissimè hirsutis. ♂? Patria ignota. V. stricta?
79. V. MENTHÆFOLIA (Benth. pl. Hartw. n. 175), caule erecto elato ramoso pilosuscule, foliis obovato-cuneatis subincisis, lacinii acutiusculis grosse dentatis, spicis elongatis gracilibus paniculatis, bracteis parvis, corollâ calyce triple longiore, fructibus remotis. ♂ In Mexico.
80. V. BARBATA (Grah. in Edinb. new phil. journ. 1827 p. 176), caule suffruticoso erecto tetragono angulis barbatis, foliis petiolatis cordato-ovatis acutis crenato-serratis utrinque pubescentibus, spicis terminalibus strictis gracilibus. — In Mexico.
81. V. DELICATULA (Mart. et Zuccar. in Otto et Dietr. allg. gartenztg. n. 245), molliter pubescens, caule humili erecto, foliis petiolatis lato-cordatis ovatis grosse serratis basi subinaequalibus, racemis laxiusculis, floribus erectis, calycibus pentagonis longis 5-dentatis, corollæ tubo angusto curvato, limbo roseo, lobis rotundatis superiore minore. (2) In Mexico ad Tehuantepec (Karwinski).
82. V. XUTHA (Lehm., in Linnæa 10 literaturber. p. 115), caule erecto hispido, foliis canescenti-pilosis, inferioribus oblongis inciso-serratis, superioribus tripartitis subpinnatifidis serratisque, spicis lateralibus terminalibusque simplicibus strictis, floribus remotis, bracteis subulatis addressis calyce brevioribus. ♂ Hab. in Americâ tropicâ. Conf. V. Ehrenbergianam supra n. 48.
83. V. MEGAPOTAMICA (Spr. syst. eur. post. p. 230), caule herbaceo erecto pubescente, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis serratis basi cuneatis glabriusculis, capitulis terminalibus, bracteis minutis ciliatis, calyce elongato glabro. ♂ Hab. in Brasilie prov. Rio-Grande do Sul.
84. V. FLAVA (Gill. et Hook. in Hook. bot. misc. I p. 170), caulis basi procumbentibus, foliis linear-lanceolatis integris pinnatifidisque glabris, lacinii

paucis linearibus trifidis integrisque, floribus laxè spicatis, calyce elongato pubescente dentibus valde inæqualibus, bracteis minutis. 2 In convallibus Andium versus Mendozam et in collibus ad Rio del Diamante (Gill.). Corolla interne flava.

85. *V. CRITHMIFOLIA* (Gill. et Hook. l. c. p. 169), herbacea, erecta, tota scabra, foliis subcarnosis bipinnatifidis, segmentis linearibus obtusis canaliculatis margine revolutis, spicâ oblongâ densâ, bracteis linearibus, calyce ovato-oblongo dentibus obtusiusculis, corollâ calyce duplo longiore. 2 In Andibus ad Mendozam. Conf. *V. pinnatisepta*.

*β. minor*, foliis angustioribus. — In prov. S. Louis reip. Argentinæ (Gill.).  
Conf. *V. filicaulis*.

*Species exclusæ.*

- V *ALPIGENA* Walp. = *Lippia scorodonoides*.
- V *ANGUSTIFOLIA* Mill. = *Stachytarpha angustifolia*.
- V *ARISTATA* Vahl = *Stachytarpha orubica*.
- V *CAYENNENSIS* Rich. = *Stachytarpha Cayennensis*.
- V *CAPENSIS* Thb. = *Lippia asperifolia*.
- V *CAPITATA* Blanco = *Lippia nodiflora*.
- V *CAPITATA* Forsk. = *Lippia nodiflora*.
- V *CURASSAVICA* Linn. = *Tomonea verbenacea*.
- V *DENTATA* Vis. = *Lippia chamædrifolia*.
- V *DICHIOTOMA* Ruiz et P. = *Stachyt. dichotoma*.
- V *FLUMINENSIS* Vell. = *Bouchea pseudo-gervão*.
- V *FORSKALII* Vahl = *Priva dentata*.
- V *GLOBIFLORA* L'Hérit. = *Lippia asperifolia*.
- V *GRATISSIMA* Gill. et Hook. = *Lippia lycioides*.
- V *HYDEROBADENSIS* Rottl. = *Bouchea Hyderobadensis*.
- V *JAMAICENSIS* Linn. = *Stachyt. Jamaicensis*.
- V *JAMAICENSIS* St.-Hil., Vell. = *Stachyt. dichotoma*.
- V *JAVANICA* N. L. Burm. = *Lippia Javanica*.
- V *INDICA* Linn. = *Stachyt. Indica*.
- V *INDICA* Jacq. = *Stachyt. angustifolia*.
- V *JUNCEA* H. et Gill. = *Lippia juncea*.
- V *LANTANOIDES* Willd. herb. = *Lippia geminata*.
- V *LAPPULACEA* Linn. = *Priva echinata*.
- V *LIGUSTRINA* Lag. = *Lippia lycioides*.
- V *LOBELIOIDES* hort. = *Priva lævis*.
- V *MEXICANA* Linn. = *Priva hispida*.
- V *MUTABILIS* Jacq. = *Stachyt. mutabilis*.
- V *NERVOSA* Scheele. = *Buchnera elongata* (Serof.).
- V *NODIFLORA* Linn. = *Lippia nodiflora*.
- V *ORCHIOIDES* Walp. = *Priva lævis*.
- V *ORUBICA* Linn. = *Stachyt. orubica*.
- V *PRISMATICA* Linn. = *Bouchea Ehrenbergiana*.
- V *PSEUDOGERVÃO* St.-Hil. = *Bouchea pseudogervão*.
- V *REPENS* Bertol. = *Lippia nodiflora*.
- V *SALVIÆFOLIA* Hook. et Arn. = *Lippia Chilensis*.

- V. SQUAMOSA Jacq. == *Elytraria caulescens* ( Acanth. )  
 V. STENOPHYLLA Scheele. == *Buchnera lavandulacea*, ( Scroful. )  
 V. STOECHADIFOLIA Linn. == *Lippia stoechadifolia*.  
 V. SUFFRUTICOSA Aubl. == *Lippia stoechadifolia*.  
 V. TRIPHylla Herit. == *Lippia citriodora*.  
 V. TUBerosa Grah. == *Priva laevis*.  
 V. VIRGATA R. et P. == *Lippia urticoides*.

X. BOUCHEA Cham. in Linnæa 7 p. 252, Meissn. gen. p. 290 et comment. p. 199. — *Verbena* b. Bouchea Endl. gen. sub n. 3685. — *Verbenæ* spp. Jacq. icon. rar. 2 t. 208 et St.-Hil. pl. us. des Bres. t. 40. — Chascanum E. Mey. comment. pl. afr. austr. p. 275, Endl. gen. n. 3687. — Pleurostigma Hochst. ex Floræ 1842 intellig. genzbl. p. 58.

Calyx elongato-tubulosus, plicato-5-angularis, subæqualiter 5-dentatus, inter dentes truncatus. Corolla infundibulari-hypocraterimorpha. Stamina ad fauces corollæ inserta, 4 antherifera, didynama, inclusa. Antheræ loculis adpositis subdidymæ, connectivo dorsali adnatae. Germen gynophoro carnoso vel brevi basili vel disciformi sublateralis insidens, bilobulare, dissepimento axi contrario, loculis uniovulatis, ovulo basi inserto erecto anatropo. Stylus terminalis, stamina adæquans, capillaris sursum paulo incrassatus; stigma subacetabuliforme, ex apice stylis altero latere subtruncato oblique adscendens et in laminam subbilobam oblongam subcurvam dilatatum. Capsula calyci nunc inclusa nunc eudem excedens, dicocca, coccis maturitate dilabentibus aut cohærentibus; pericarpium siccum durum, semine repletum. Embryi cotyledones carnosæ, applicitæ, radiculæ brevi inferâ. — Herbæ aut suffrutices Americanæ, Africanæ et Asiaticæ, habitu et statione *Stachytarphus sectionis I proximæ*, floribus in rhachi filiformi subsessilibus vel brevipedicellatis laxè racemoso-spicatis bracteâ et saepius bracteolis binis illi alternis subtensis. — Genus insigne, medium quasi inter Verbenam et *Stachytarpham*, illi corollâ et antheris, huic habitu et capsulâ affine, ab utrâque inflorescentiâ, calycis limbo et stigmate distinctum.

#### Sectio I. RHAGOCARPIUM.

Cocci maturitate suâ sponte secedentes, singuli basi ad commissuram oblique pertuso-excavatâ gynophoro insidentes. — Herbæ Americanæ et Africanæ.

1. B. PSEUDOGERVAO (Cham.! l. c. 253), glabra vel pubescens, ramis obsolete tetragonis, foliis membranaceis elliptico-oblongis postice integerrimis in petiolum acutatis acuminatis grosse arguteque serratis serraturis acuminatis puberulis glabrisse ambitu scabris subtus pallidis, spicis demum elongatis, pedicellis brevissimis crassis minute bibracteolatis, bracteis brevibus e basi latiore subulatis, calyce truncato subulato-dentato, corollâ magnâ, capsula calycem subæquante rostro brevissimo vix attenuato acutâ. ♂ ⊖ In silvis cœduis et in umbrosis humidis Brasiliæ prov. merid. ( St Hil., Mart.! Ried.! Sell.! Regnell ! pl. bras. ser. 1. n. 340 ), ad flumen Amazonum ( Poeppig ! n. 2231). V. Pseudogervao St Hil.! pl. us. t. 40. V. fluminensis Vellozo ! fl. flum. 1 t. 38. Folia 2-5 poll. Calyx 4-5 lin. longus. Cor. pallide lilacina. Capsulae cocci semitereti-subulati, dorso striati. ( v. s. in h. reg. berol. et DC. )
2. B. LÆTEVIRENS ( Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined. ), ramis obtuse tetragonis subcanaliculatis, foliis pergamentaceis lato-vel subrotundo-ellipticis-ovatis basi integerrimâ in petiolum acuminatis obtusis vel abrupte acuminatis grossiusculæ acuminato-serratis supra scabriusculis læteviridibus subtus pallidis margine revoluto scabro, spicis tenuiter pubescentibus, pedicellis brevissimis crassis minute bibracteolatis, bracteis brevibus subulatis, calycis

dentilis breviter suhulato-acuminalnis, corollâ parvâ, capsulâ calycem triente superante rostro brevissimo vix attenuato acutâ. ♂ In collibus et locis tam cultis quam incultis saxosis circa Rio de Janeiro Brasiliæ (Khotsky! Lusch! Riedl!). Stachytarpheta pseudochascanum Walp.! repert. 4 p. 11. Precedenti qnodammodo similis, sed facilis distinctu. (v. s. in h. reg. berol. et cæs. petrop. et DC.)

3. B. AGRESTIS (Schauer l. c.), erecta, dichotoma, tota piloso-hirsuta, caule ramisque patentibus tertiusculis gracibus, foliis ellipticis oblongisve basi integerrimâ in petiolum attenuatis obtusis a medio inde grosse acute serratis subtus pallidis, spicis alaribus terminalibusque gracibus, floribus remotiusculis subpedicellatis patentibusque, pedicello ebracteolato, bracteis linearibus calyce subulato-dentato plus duplo brevioribus. capsulâ calycem aquante rostratâ. ♂ In agris prov. Bahiensis Brasiliæ (Mart.! Blanchet! n. 3731 et 3907). Calyx 5 lin. fere longus. Corolla mediocris, lilacino-rosea. (v. s. in h. Mart. et DC.)
4. B. EHRENBURGII (Cham.! l. c. p. 253), erecta, dichotoma, ramis tetragonis sulcatis rhachique spicæ pilis retrorsis pubescensibus, foliis membranaceis lato-ovatis basi integerrimis-subtruncatis vel oblique in petiolum acuminalnis acutis obtusisve grosse et acute serratis utrinquæ adpresso pubescensibus, spicis digitalibus denum elongatis, pédicellis brevissimis ebracteolatis, bracteis membranaceis lanceolato-subulatis pedicello subduplo longioribus cum calyce subhirtello-pubescentibus ciliatis, calyce ex ore truncato subulato-5-aristato, corollâ parvâ, capsulâ calycem rostro crasso acutiusculo excedente. ♂ In America æquinoctiali, in Mexico pr. Guadeloupe, Cuesta Blanca, etc. (C. Ehrenb.! n. 112, Berland.! n. 838, Hartw.! n. 178), in Venezuela locis humidis apriis ad Caracas et La Guayra (E. Otto! n. 797, Moritz! n. 293, Vargas!), ad Carthagena de Columbia (Billberg!), in insulis Ind. occid. e. gr. Jamaicâ (Swartz! Deppe!), S. Domingo (C. Ehrenb!). Verbena prismatica Linn. spec. pl. p. 27, Jacq.! coll. 2 p. 301, ejusd.! icon. rar. 2 t. 208. Stachytarpheta prismatica Vahl enum. 1 p. 209. Zapania prismatica Poir. encycl. 8 p. 844. Stachyt. bifurca Benth.! pl. Hartw. p. 21. Sloane hist. 1 p. 172 t. 107 f. 2, Plukn. alm. p. 382 t. 70 f. 1. Internodia longa nuda. Calyx  $2\frac{1}{2}$  lin. longns, dentibus per se  $\frac{1}{2}$  lin. metientibus. Cor. cœrulea, tuho calycem paulo excedente. Caps. 4 lin. longa, rostro compresso vix attenuato, coccis multistriatis.
5. B. MARRUBIIFOLIA, dichotoma, undique cano-villosula, ramis teretusculis, foliis ovatis, e basi subtruncata breviter in petiolum productis ambiti obtusissimis dente obtusangulo terminatis grosse serrato-dentatis reticulato-rugosis, spicis alaribus terminalibusque longissimis gracibus laxifloris, bracteis linearis-subulatis calyce subduplo brevioribus, calyce brevidentato, capsulâ obtusa inclusâ. ♂ Crescit in Nubiâ, ad pagum Cordofanum Abu-Gerad in solo pingui planicie leg. Kotschy (Un. it. 1841. n. 32!). Chascanum marrubii-folium Fenzl! in Kotschy pl. nub. n. cit. Habita B. Ehrenbergii non dissimilis. Folia laminâ pollicari, petiolo semipolicari, reti subtus prominente, dentibus latis obtusangulo-acutis. Calyx angustus fere 3 lineas longus, dentibus acutis, costis herbaceis cum bractearum margine scarioso villosis. Corollæ tubus calyce vix duplo longior, limbus parvus. Capsula sesquilineam longa, obtusa, nigrescens, coccis semiteretibus multijugato-striatis apice areolatis. (v. s. in h. DC.)
6. B. PTERYGOCARPA, dichotoma, tota glaucescens et scabrido-puberula, ramis tetragonis, foliis firmulis ovatis vel ovato-ellipticis basi deltoidica in petiolam productis subacuminatis obtusisve grosse et inæqualiter serrato-dentatis undulatis subtus pinnato-nervosis basi triplinervi, spicis alaribus terminalibusque longissimis gracibus confertiusculis, bracteis linearis-subulatis calyce duplo triplo brevioribus, pedicello brevissimo minutissime bibracteolato. calyx plicato-5-angulari brevidentato, capsulâ calycem subæquante coccis alâ membranacea decurrente terminatis. ♂ In Nubiâ, in finibus Cordo-

fanis versus Tckeles inter frutices ad montem Kohn (Kotschy pl. n. 11. un. it. n. 230 ! ), et in collibus prope Adeganna Abyssinie ( W. Schimper, un. itiu. sect. 2 n. 1012 ! ). Chascanum lætum Fenzl ! in pl. exs. un. it. num. cit. Folia semipollicaria-sesquipollicaria, petiolo laminâ subdupo breviori. Calyx 4 lin. longus, scabrido-pubens, fructifer cylindricus. Capsulae cocci obverse lanceolati,  $3\frac{1}{2}$  lin. circ. longi, disco fertili nigro semitereti striato superue obsolete areolato, margine argute alato, alâ fuscens circa apicem expansâ, commissurâ alutaceo-verruculosâ. ( v. s. fructif. in h. DC. )

### Sectio II. CHASCANUM. — Chascanum E. Mey. l. c.

Coccî maturi cohærentes tamen separabiles, areolâ communî commissurâ contrariâ extrorsum unilaterali citra basin exsculptâ gynophoro denique squamæforni membranaceo affixi. — Suffrutices Africæ australis et Indiæ.

7. B. HYDEROBADENSIS ( Walpers ! repert 4 p. 12 ), suffruticosa, glabriuscula, ramis obsoletæ tetragonis, foliis ovato-ellipticis in petiolum cuncato-angustatis acutis grosse argute serratis subtus glaucis , spicis terminalibus pedunculatis digitalibus confertiusculis, pedicellis brevissimis minute bibracteolatis, bracteis lanceolato-subulatis margine membranaceo scabro-ciliatis calyce duplo subtriplo brevioribus , calyce plicato-5-angulari truncato dentibus 5 subulatis inæqualibus, corollâ magnâ, capsulâ . . . ♂ Crescit in Indiæ orient. prov. Mysuriensi ( Wall. cat. n. 6318 ! ). Verba hyderobadensis Rottl. mss. in Wall. cat. n. cit. Habitu toto omnino accedit ab B. pseudogervao, ceterum diversissima. Folia membranacea, penninervia, subtus tenuiter reticulato-venosa, 2-4-pollicaria. Calyx sub anthesi patens rectus subsessilis fere semipollicaris ad angulos pilosus, dentibus brevibus anticis 2 reliquis majoribus postico minimo. Cor. calyce semilongior, glabra, limbo magno. ( v. s. in h. DC. )
8. B. CUNEIFOLIA , glabriuscula, foliis carnosulis flabellato-cuneatis basi attenuatâ sessilibus apice rotundato grosse dentato-serratis dentibus acuminatibus , spicis alaribus terminalibusque elongatis gracilibus laxifloris subtilissime pubescens, bracteis lanceolatis acutis pedicello manifesto basi bibracteolato brevioribus , calyce brevidentato, fructifero antice et inferius fisso , capsulâ calycem subæquante obtusâ rugulosâ basi excavatâ. ♂ Crescit in prom. Bonæ Spei, pr. Weltevrede alt. 2500-3000 ped., inter Zonneberge et Klein-Bruintgeshogte alt. 2000-2500 ped., pr. Glenfelling in elevatis graminosis alt. 1000 ped., et ad portum Natal ( Drège ! Krebs ! Krauss pl. cap. n. 1129 ). Buchnera cuneifolia Thunb. fl. cap. p. 466. B. cernua Houtt. Linn. syst. 8 p. 129 tab. 58 f. 2. Phryma dehiscens L. suppl. p. 277. Chascanum cuneifolium E. Meyer ! comment. pl. afric. 1 p. 276. Maund et Henslow botan. 4 tab. 196 ! Folia parva, subcomplicata, siccando nigrescentia. Calyx plicato-5-angularis , 4 lin. longus, pedicello subsesquilineari, anthesi peractâ superne contortus, fructifer rimâ anticâ inferius hians. Cor. calyce multo longior. Capsula 2 $\frac{1}{2}$  lin. longa , areolâ basilari excavatâ subunilaterali , coccis semiteretibus cohærentibus. ( v. s. in h. DC. et berol. )
9. B. CERNUA , suffruticosa, præter ramulos ad angulos hirtello-pubescentes glabra, foliis confertis oppositis ternisque cuncatis basi attenuatâ sessilibus superne grosse et acuminato-3-7-dentatis apice sæpius circumscriptione truncato coriaceis margine subrevolutis nitidis, spicis terminalibus alaribusque elongatis, bracteis lanceolatis acutis ciliatis pedicello setaceo-bibracteolato triente longioribus , calyce elongato subulato-5-fido. ♂ Crescit in capite Bonæ-Spei ( Forbes ! ), inter Breedcrivier et Gamtoosrivier ( Drège ), in arenosis pr. Winterhoek ( Krauss n. 1086 ). Buchnera cernua L. mant. 2 p. 251. Chascanum cernuum E. Meyer l. c. Folia 9 lin. circ. longa. Calyx 4 lin. longus, pedicello sesquilineari bracteolas æquante. Cor. alba, tubo gracili calyce subdupo longiori recurvato, limbo majusculo circa fauces pulverulento. Fructum perfectum non vidi. ( v. s. sp. in h. DC. )

10. B. GAKEPENSIS; glaberrima, canle ramisque subtetragono-teretiusculis, foliis carnosulis ovatis basi subdeltae in petiolum augustatis grosse et obtuse dentato-serratis, spicis terminalibus elongatis confertiusculis laxis, bracteis linearis subulatis pedicello basi setaceo-bracteolato subduplo longioribus, calyce brevidentato, fructifero rimâ anticâ hiante, capsula brevi tetragonâ obtusâ exsculpto-reticulata, areolâ laterali magnâ excavata margine superne denticulato. ♂ Crescit in interioribus promont. Bonæ-Spei, ad fl. Gariep in elevatis saxosis pr. Verleptpram alt. infra 1000 ped. (Drége!). Chascanum garipense E. Meyer! comment. pl. afr. austr. 1 p. 276. Rami striati. Folia pollicaria petiolo semipollucari. Calyx 3 lin. longus, pedicello lineam æquante. Corolla tubo calyce sesquilongiore cernuo, limbo majuscule. Germen bilocular! gynophoro obliquo antico subfructus maturitate squamiformi-explauco affixum. Capsula matura nigricans, sesquilineam longa, paulo curvata; cocci colherentes tetragoni argute marginati inter marginis transversim rugosi, jugis marginalibus anticis in denticulos excurrentibus ad areolæ fructus maguæ pertusæ limbum superiore prominentes calycemque præmature effringentes. (v. s. in h. DC.)
11. B. PUBESCENS, suffruticosa, undique pilis reversis subtiliter pubescens, foliis ovatis oblongis basi longe cuneato-attenuatis grosse et remote divaricato-dentatis, spicis alaribus terminalibusque brevibus paucifloris, bracteis ovatis acutis bracteolisque brevissimis, calyce sessili 5-dentato fructifero rimâ anticâ hiante, capsula tetragonâ obtusâ exsculpto-reticulata quam areolâ laterali maximâ oblongâ excavata duplo breviro. ♂ In capite Bonæ-Spei (Burchell! cat. geogr. n. 2017). Fol.  $\frac{1}{4}$  pollinis longa. Calyx 5 lin. longus, dentibus brevibus acutis. Cor. calyce duplo longior cernua. Capsula areola 2 lin., pars supera fertilis unam lineam æquans. (v. s. in h. DC.)
12. B. ADENOSTACHYA, suffruticosa, undique pube hirtellâ subcanescens, foliis suboppositis sparsis oblongis acutis basi longe attenuatis superne acute 5-7-dentatis subcomplicatis, spicis elongatis glandulosis, bracteis subulatis calyce subulato-5-fido sessili ebracteolato duplo brevioribus. ♂ In C. B. Spei (Burch.! cat. geogr. n. 2582). Folia 9 lin. longa, superius 3-4 lin. lata. Calyx 4 lin. fere æquans. Cor. tubus gracilis calyce duplo longior. Fructus deest. (v. s. in h. DC.)
13. B. PINNATIFIDA, suffruticosa, a basi trichotoma, undique scabrido-pubescentis, foliis pinnatifidis lacinii integerimis acutiusculis obtusis rhachique linearibus, spicis alaribus terminalibusque brevissimis paucifloris laxis, bracteis linearibus recurvis pedicello brevissimo minute bibracteolato duplo longioribus, calyce brevidentato, fructifero apice contorto antice late hiante, capsula quam calyce triente breviori subtetragona obtusâ exsculpto-reticulata, areolâ citra basin laterali magnâ excavata margine dentato cincta. ♂ Crescit in prom. Bonæ-Spei, in asperis saxosis Nieuwe Hantom alt. 4500-5000 ped., Winterveld pr. Limoefontein et Groot-Gafelberg alt. 3-4000 ped. (Drége!). Buchnera pinnatifida Thunb. flor. cap. 466. Chascanum pinnatifidum E. Meyer! l. c. — Suffrutex spithameus, ramis teretiusculis. Folia pollicaria-sesquipollucaria, 2-3 juga, lacinias lineam circ. latis firmule herbaceis. Spicæ vix pollicares. Calyx  $4\frac{1}{2}$  lin. longus. Corolla tubo calycem duplo excedente gracili in fauces ampliato, limbo majuscule. Capsula 2 lin. longa basi paulo dilatata gynophoro antico squamæformi oblongo lineamque longo affixa, areolâ laterali pertusâ circumcirca marginatâ et paucidentatâ. (v. s. h. DC.)

*Species non satis nota.*

14. B. PUMILA, subacanlis, tomentosa, foliis ovatis inæqualiter inciso-serratis, spicis brevissimis axillaribus. ♂ In prom. Bonæ-Spei, in collibus asperis siccis inter Blaauwekrans et Wilgerboschfontein et inter Dweka et Zwartbulletje alt. 2500-3000 ped. — Chascanum pumilum E. Meyer l. c.

XI. STACHYTARPHA Vahl enum. 1 p. 205 (*ex emend. nom. Link enum. hort. ber. 1 p. 18.*) Cham. in Linnaea 7 p. 243 sqq., Meisn. gen. p. 290 et comm. p. 198, Reichenb. hort. bot. 1 t. 59 et 2 t. 138. — Abena Necke elem. n. 461. — Cymburnus Salisb. parad. p. 53. — Verbena a. Stachytarpheta Endl. gen. sub n. 3685. — Verbenæ sp. Linn. Cod. Linn. ed. Richt. n. 152-154, St-Hil. pl. us. des Brés. t. 39. — Melasanthus Pohl plant. bras. 1 p. 75 t. 60-65.

Calyx tubulosus, compressus, membranaceus, costis herbaceis rarius tantum marginalibus duabus, plerumque etiam facialibus duabus et dorsali obsoletâ instructus, sèpius plicatus, apice truncatus et subæqualiter 5-dentatus, vel postice fissus antice truncatus et 4-dentatus, vel bifidus lobis bidentatis aut integris. Corolla tubulosa, infundibuliformis aut hypocraterimorpha, tubo recto vel subincurvo, fauce subtiliter pubescente, limbo subæqualiter 5-fido. Stamina in superiore tubo inserta, inclusa, filamentis capillaribus brevibus; superiora ananthera, inferiora antherifera. Antheræ basi insertæ, biloculares, loculis linear-oblängis verticaliter divaricatis ideoque superpositis basi contiguis rimâque quasi singulâ cænque verticali-dehiscensibus. Ovarium gynophoro brevi annulari insidens, biloculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, capillaris, stigmate terminali peltato-capitellato. Capsula calyce paulo aucto velata, dicocca, coccis maturitate septicide secedentibus apiculatis rostellatis dorso striatis sèpiusque areolatis. Embryonis cotyledones crassæ, applicatae, radiculâ inferâ. — Herbae et frutices, maximâ copiâ in Americâ calidiori crescentes, paucissimæ Africanæ et Indicæ, caulinis plerumque dichotomis ramisque tetragonis, foliis simplicibus oppositis, inflorcentiâ spicatâ rhachi angulatâ vel demum magis minusve incrassatâ et foveolatâ, bracteis persistentibus plerumque paleaceis rarissime foliaceis, corollâ albâ, cœrulecente, coccincâ vel atropurpureâ.

### Sectio I. ABENA. — Abena Neck. l. c.

Spicæ filiformes aut teretes. Calyx fructiger oblongus, totus immersus vel dorso saltē foveolis rhacheos incumbens. Corolla hypocraterimorpha. Stylus longitudine tubi corollini.

#### § 1. Lepturæ. — Spicæ filiformes, subflaccidae. Rhachis tandem vix vel paulo tantum incrassata. Calyces fructigeri arrecti foveolis rhacheos semiimmersi.

1. S. DICHOTOMA (Vahl! enum. 1 p. 207), dichotoma, ramulis tetragonis internodis superius argute marginatis junioribus ad nodos imprimis sublanuginosis, foliis ovatis vel ovato-oblängis basi coarctatâ in petiolum cuneato-decurrentibus acutis acuminatevis grosse crenato-serratis crenis acuminalatis planis margine scabriusculis supra nitidis subtus opacis et in nervis pilis raris substrigoso-hirsutisculis, paginis glabris vel sparse strigillosis vel superâ scabriusculâ, spicis longis gracilibus, floribus sub anthesi subrecurve-patulis dein arrectis, bracteis angustissimis subulato-aristatis striatis margine angusto scarioso ciliatis basi callo herbaceo magis minusve gibbis cum calyce compresso superne et antice plicato-4-costato et 4-dentato pilosis eumque subæquantibus brevioribus vsc. ♂ Copiose in silvis cœduis, dumetis, ad viarum margines et in campis Brasiliæ, in prov. Rio de Janeiro, Minarum et Bahiensi (Pohl! Sell.! Mart.! Blanchet! n. 3139 a.), in Peruvia silvis ad Cuchero, etc. (R. et P.!), pr. Cumana (H. et B.), in Mexico pr. Papantla (Schiæde! pl. mex. n. 1170). Verbena dichotoma R. et P. fl. per. 1 p. 23 t. 34. Cymburus urticifolius Salisb. parad. Lond. t. 53. S. urticifolia Sims bot. mag. t. 1848! S. gibberosa Reichenb.! hort. bot. 2 p. 15 t. 138 (forma strigilloso-hirtella). Verb. Jamaicensis Vellozo! fl. flum. t. 37, St-Hil.! pl. us. des Brés. t. 39, non Linn. S. Jamaicensis

Gardn.! in Hook. journ. 1 p. 184, non Vahl. S. Cajanensis Cham.! in Linnaeâ 7 p. 243, non Vahl. S. umbrosa Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 280? Folia membranacea 2-4 poll. longa, 8 lin.-2 poll. lata. Spicæ  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$  ped. longæ, apice virgineo bracteis imbricatis aristatis quasi crinito. Calyx 3 lin. longus. Cor. corulea, tubo curvulo calycem vix excedente, limbo mediocri. (v. s. in h. Mart., berol. et DC.)

2. S. CAYENNENSIS (Vahl! l. c. p. 208), subfastigiato-dichotoma, ramis subteretibus canescenti- lanuginoso - pubescentibus, foliis ovatis basi integerrimâ in petiolum brevem coarctatis obtusissimis subacutis acuminato-serratis supra strigillis sparsis scabriusculis subtus pallidis in reti et petiolo oppreso-lanuginosis ceteroquin glabris vel hirta-pubescentibus canescitibusque, spicis gracilis rectis sublanuginosis densifloris, floribus nubibus patulis , calycibus vero fructiferis foveolis rhacheos subincrassatae dorso immersis appressisque demum teretibus elongatisque , bracteis subulatis aristatis inferne margine scariosis calycem brevem compressum facie 4-nervem et subulato-4-dentatum subæquantibus aut brevioribus. ↳ In Brasiliâ forte omni (Blanchet! u. 1384. Salzm! pl. bras. n. 436, Sell.! Mart.!), Guianâ (Schomb.! n. 262), Demerara (Parkr!), Venezuela ad Caracas (Vargas! Moritz! n. 810, E. Otto! n. 883), Mexico ad Papantla (Schiede!). Verbena Cayennensis Rich.! in act. soc. hist. nat. paris. p. 205. S. verouicaefolia Cham.! l. c. p. 246. Lippia cylindrica Scheele in Linnaeâ 17 p. 351 (fid. spec. ab auct. comm.). S. hirta Kunth in H. et B. nov. gen. et spec. 2 p. 280. Forma magis pubescens, foliis subtus imprimis canescenti-pubescentibus, spicâ strigoso-pilosellâ (Schiede! pl. mex. n. 1171). Habitù formis parvifolis præcedentis quodammodo similis, a quâ vero recedit præter lanuginem crebrem foliis minus profunde incisum figurâque alienis, spicis gracilioribus , calycibus conspicue brevioribus corollisque minoribus. Folia majora 1-2 poll. longa, 8-12 lin. lata , interdum complicata. Calyx 2 lin. æquans. Cor. tubus calycem æquans, limbo parvo. (v. s. in h. berol., Mart. et DC.)
3. S. POLYURA (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), subfastigiato-panniculata, ramis ramulisque superius marginato-subtetragonis tenuiter lanuginosis, foliis lato-ovatis basi integerrimâ subito in petiolum longum anguste alatum contractis obtusiusculis acutis grosse crenato-serratis crenis apiculatis supra imprimis ambitu scabriusculis subtus vero pallidis et in reti pectiole sublanuginosis, spicis dodrantalibus gracilibus flaccidis laxe imbricatis piloso-sublanuginosis, calycibus fructiferis foveolis rhacheos vix incrassatae accumulentibus, bracteis subulatis aristatis inferne margine scariosis calycem compressum facie 4-nervem et acuminato-4-dentatum subæquantibus. ↳ In Brasiliâ merid. (Pohl!). Propius accedit ad præcedentem, differt autem foliis amplis, spicis longioribus imbricatis, calycibus longioribus; a reliquis hujus typi recedit jam foliorum figurâ. Folia laminâ inferiorum 3 poll. et quod excedit longit., 2 poll. latit. metiente, petiolo subpollicari, pallide virentia, subopaca. Calyx  $2\frac{1}{2}$  liu. longus , pilosus. Cor. tubus calycem quadrante excedens; limbus parvus. (v. s. in h. cæs. vindob.)
4. S. LACTEA (Schauer l. c.), dichotoma, ramis teretiunculis leviter marginatis, novellis ad nodos imprimis lanuginosis, foliis oblongis basi integerrimâ in petiolum longe attenuatis acutis crenato-serratis crenis apiculatis marginè obsolete strigosis supra lineato-rugosis nitidulis subtus discoloribus reti pilis raris apppresso-lanuginoso gracilibus subarcuatis tenuiter lanuginosis, floribus arrectis laxe imbricatis demumque scrobiculis rhacheos vix incrassatae accumulentibus, bracteis lineari-subulatis tenuiter aristatis striatis ad basin margine scariosis subciliatis canaliculatisque calycem compressum facie plicato-4-nervem et acuminato-4-dentatum subæquantibus aut brevioribus. ↳ In silvis Catingas dictis prov. Bahiensis Brasiliæ (Maxim. Princ. Neuwied!). Recedit ab affinibus S. dichotomâ et Cayennensi foliis magis elongatis rugosis; ab illâ præterea staturâ graciliori, foliis minus grosse serratis, calyce corollaque lacteâ minoribus; ab hac , cui proxima, foliis magis attenuatis, spicis

magis etiam confertis quin immo imbricatis, calycibus longioribus. Indumento cæterum simili modo ludit. Folia firmule membranacea, palmari-spithamæa supra viridia, subtus pallida nervis prominulis. Calyx 2½ lin. longus. Cor. lactea, tubo calycem nonnihil excedente, limbo medioteri. (v. s. in h. cl. Martii).

5. S. SCHOTTIANA (Schauer 1. c. ined.), dichotome ramosissima, ramis quadrangularibus marginatis scabro-pubescentibus, foliis crassiusculis lanceolato-oblongis postice a medio inde integrimis et valde attenuatis acuminatis argute serratis margine subrevolutis glabris, spicis spithamæis gracilibus densifloris scabriusculis, floribus nubilibus recurvo-patulis, calycibus fructiferis scrobiculis rhacheos paulo incrassatae accumbentibus, bracteis lanceolato-subulatis acutissimis margine scarioso scabro-ciliatis calyce compresso postice fiso facie 4-nervi et subulato-4-dentato triente brevioribus. ♂ In arenosis maritimis Brasiliæ (Schott! Sell.! Ried.! Lund!). Fruticulus demissus. Folia supra særpi nitida, siccando nigrescentia, ½-2 poll. longa, 4-6 lin. lata. (v. s. in h. vindob., berol. et DC.)

§ 2. *Pachyuræ*. — *Spicae teretes, strictæ. Rhachis tandem conspicue incrassata et scrobiculis calyces fructigeros foventibus exsculpta.*

6. S. ELATIOR (Schrad. ind. sem. hort. gotting. ann. 1822), caule erecto simplici vel superne patentí-ramoso obsolete tetragono sparse piloso, foliis per anguste lanceolatis basi apiceque attenuatis et integrimis reliquo vero margine remote serratis subcomplicatis utrinque scabris et imprimis ad nervos substrigoso-pilosis, spicis sparsifloris elongatis teretibus strictis glabris, calycibus fructigeris in foveolis profundis rhacheos incrassatae absconditis, bracteis paleaceis oblongo-lanceolatis aristato-acuminatis striatis margine scabris acumine calycem compressum bifidum superius scabriuscum immersum nonnihil excedentibus eumque obtegentibus. (I) In paludosis herbidis camporum Brasiliæ, prov. Bahiensis (Schott! Blanchet! n. 943, Salzm. pl. bras. n. 435), Guianæ (Schomb.! n. 479) et in Venezuelâ ad Orinocum (E. Otto! n. 1001). — Schrad.! dissert. de Blumenb. p. 19 t. 2 f. 1. Reichenb.! hort. bot. 1 p. 44 t. 59. Jacq. fil.! eleg. 2 p. 10 t. 159. S. palustris Schott! cat. hort. vindob. 1823. Caulis 1-5-pedalis, medullosus. Spicas brevipedunculatae, 1-1½ ped. longæ, demum pennæ anserinæ crassitie. Calyx 3 lin. fere longus. Corolla majuscula, saturate cerulea. (v. s. in h. cæs. vindob., berol., Mart. et DC.)

7. S. LYTHROPHYLLA (Schaner 1. c. ined.), caule erecto simplici vel superne patentí-ramoso quadrangulari piloso-hirsutusculo, foliis lanceolatis postice sensim attenuatis integrermis acutis subremote et argute serratis planis complicative utrinque scabris et imprimis ad nervos substrigoso-pilosis, spicis sparsiflorâ tereti strictâ demum elongatâ, rhachi hirsutâ demum incrassata in scrobiculis ealyces subimmersos fovente, bracteis paleaceis lanceolatis aristato-acuminatis striatis scabro-ciliatis cum calyce glabriusculis eumque compressum bifidum superne scaberimum æquantibus. (I) Crescit in campis et pascuis Brasiliæ æquinoctialis (Mart.). Præcedenti proxima, diversa foliis latioribus apice haud attenuatis densius serratis et potissimum caule argutius quadrangulo rhachique minus excavata pilisque longis hirsutâ. (v. s. in h. cl. Mart.)

8. S. ANGUSTIFOLIA (Vahl! enum. p. 205), caule dichotomo ramisque obsolete tetragonis præter marginem interpetiolarem pilosum glabris, foliis lanceolatis utrinque attenuatis a medio inde remote subdentato-serratis undulatis præter costam interdum raripilosam glabris brevibusque, spicis subsessilibus spithamæis sparsifloris teretibus strictis glabris, calycibus fructigeris in foveolis rhacheos incrassatae absconditis, bracteis paleaceis ovatis membranaceo-marginatis subulato-acuminatis calyee compresso bifido immerso paolo brevioribus eumque inferne obtegentibus. (I) In Guianâ (Isert!) et Sene-

- gambia* (h. berol.). *Verbena angustifolia* Mill. dict. 4 p. 595. *Verbena Indica* Jacq.! obs. 4 p. 7 tab. 86. Caulis macilentus. Folia cum petiolo longo margine lato sensim in laminam abeunte subtriplicaria, ; 1 poll. lat. Cor. cœrulea. (v. v. c. et s. c. et sp. in h. DC. et berol.)
9. *S. INDICA* (Vahl enum. 1 p. 206), suffruticosa, dichotoma, glabriuscula, caule ramisque teretibus cum margine interpetiolaris et petioli margine costâque lanuginoso-pilosus, foliis ellipticis vel oblongo-spathulatis in petiolum sensim angustatis obtusis acutis grossissimis et oblique acuminato-serratis margine ciliato-scabris sublineatis undulatis subtus paulo pallidioribus et in nervis rariploris ceteroque glabris, spicis terminalibus alaribusque longissimis strictis tertibus glabris, floribus arrectis demum rhachi incrassata immersis, bracteis oblongo-lanceolatis subulato-acuminatis striatis margine scarioso scabris calycem compressum bifidum subæquantibus et cum eo scabridis. 3 (1) In insulis Mascarenis (h. DC.! Sieber fl. maurit. n. 140!), Zeylonâ iüs. (Royen ap. Linn.), Bengaliâ (Leschenault! Wallich!), Butu-Cawanes (Zoll.! pl. jav. exs. n. 849), juxta Pulo-Pinang (Ad. Deless.!), Javâ ins. (Junghuhn!), in Philippinis (Cuming!). *Verbena Indica* Linn. spec. pl. p. 27, cod. Linn. ed. Richt. n. 153. *S. ciliata* Kunze delect. sem. 1. Lips. 1840. *Simillima S. Jamaicensi* (Linn.!), caule tereti, foliorum figurâ et imprimis serraturâ habituque peculiari distincta. Rami erecto-patentes. Serraturæ nunc magis creniformes acuminare brevi antorso, nunc magis acuminatae antorsum versæ ut folium argute serratum evadat. Flores fere *S. Jamaicensis*, cor. cœrulea. (v. s. sp. in h. DC. et berol.)
10. *S. JAMAICENSIS* (Vahl! enum. 1 p. 206), dichotoma, glabriuscula, caule ramisque subtetragonis cum margine interpetiolaris et petioli margine costâque lanuginoso-pilosus, foliis ovalibus subrotundo-ovatis basi contractis in petiolum longum decurrentibus obtusis acutis grosse acuteque grossissimis striatis teretibus glabris vel pilosiusculis, spicis terminalibus alaribusque longissimis strictis tertibus glabris, floribus arrectis demum rhachi incrassata immersis, bracteis oblongo-lanceolatis aristato-acuminatis striatis margine scarioso scabris calycem compressum bifidum subæquantibus. 3 (1) In fructicetis Americanis, in Cubâ (M. Müller!), Jamaicâ (Sw.!), Dominicâ (Murray!), Porto-rico (Wydler 253 bis!), *S. Crucis* (Carensen!), *S. Thomæ* (Wydler n. 35!), Martinique (Sieber suppl. n. 46!), et in vicinâ Americâ æquinoctiali littorali (Humbr.), Guianâ angl. (Parker!) et gallicâ (Perrottet!). *Verbena Jamaicensis* Linn. syst. p. 66, Sloane! hist. p. 171 t. 107 f. 1, Jacq.! obs. 4 p. 6 t. 85. *S. marginata* Vahl l. c. p. 207. Forma foliis macilenter ovato-subrotundis subglabratibus (C. Ehrenb. n. 190! ex ins. S. Dominici). *S. pilosiuscula* Kunth.! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 279 (h. Willd. n. 455 foliis utrinque scabriusculis apice angustatis). Tota nitida, lætevirens. Folia firmula nervosa, evenia magna et figura varia. Spicæ pennæ gallinaceæ crassitie, pedales et ultra. Bracteæ lineam circ. latæ. Calyx 2½ lin. longus. Cor. cœrulea, mediocris. Fructus 1½ lin. longus, vertice obtusissimo brevissimamente apiculato, coccis jugis subquinis dorsalibus et citra apicem areolis obsolete uotatis. (v. v. c. et s. sp. in h. DC. et berol.)
11. *S. STRIGOSA* (Vahl enum. 1 p. 207), adscendens, undique piloso-hirsuta, ramis subtetragono-teretiusculis, foliis ovatis vel ovato-oblongis basi cuneato-angustatâ subsessilibus obtusis acutis grosse crenato-serratis rugosis subtus pallidis, spicis subsessilibus terminalibus alaribusque spithameis subincurvis teretibus, floribus arrectis demum rhachi paulo incrassata immersis, bracteis totis herbaceo-membranaceis oblongo-lanceolatis aristato-acuminatis striatis calycem 4-dentatum compressum in carinis piloso-ciliatum æquantibus. 3 In S. Thomæ ins. (C. Ebrenb. n. 147!). *S. Jamaicensis* affinis, ceterum distinctissima. Spicæ crassitie pennæ gallinaceæ. (v. s. in h. reg. berol.)
12. *S. SANGUINEA* (Mart. flor. bras. ined.), caule obsolete tetragono stricto pi-

- loso-hirsuto, foliis oblongis basi acuminatâ subsessilibus obtusis grosse vel subinciso-crenatis-serratis supra pilosis utrinque ad nervos hirsutis, spicis longis teretibus sparsifloris undique puberulis, rhachi incrassatâ profunde excavatâ, bracteis paleaceis obverse lanceolatis in cuspide tenuem coarctatis striatis calycem bifidum demum penitus immersum subæquantibus et inferius obtegentibus. (I) In campis herbidis uidis prov. Bahiensis Brasiliae (Mart.! Blan- chet! pl. bras. n. 3120). S. microphylla Walp.! repert. 4 p. 6 (ad fruct. fol. ra- meal. destit. descr., fide spec. orig.). Folia latae viridia. Spica virginæ im- briato-squamosæ. Cal. 5 lin. longus. Cor. magna, sanguinea, tubo calycem vix excedente. (v. s. in h. Mart., Lucæ, et DC.)
13. S. MAXIMILLANI (Schauer 1. c. ined.), suffruticosa, ramis patulis tetra- gonis subcanescenti-hirtellis, foliis ovatis ellipticis basi in petiolum brevem coarctatis acutis vel obtusiusculis grosse apiculato-crenatis subrugosis supra parse strigosis subtus pallidis pubeque crebriori dêpresso canescentibus, spicis sessilibus spithameis sparsifloris strictis teretibus totis canescenti-hirtis, ca- lycibus fructigeris rhachi incrassatae immersis, bracteis rigidulis subulatis subaristato-attenuatis planis calyce postice fisso antice 4-costato et inæqualiter subulato-4-dentato triente brevioribus. (J) In fruticetis subulosis, etc. prov. Bahiensis Brasiliae (Max. Pr. Neuwied.! Salzm.! n. 437, Blanch.! n. 2138 a et 2410). Frutes orgyalis. Folia 2½-3 poll. longa, 1½ poll. lata. Cal. 4 lin. longus. Cor. corulescens, tubo gracili calycem dimidio superante, limbo me- diocri. (v. s. in h. Mart. et DC.)
- β. glabrata*, ramulis lateribus alternis puberulis, foliis spicisque fere glabra- tis. — In Brasiliâ (G. Gardn.!)
14. S. MUTABILIS (Vahl ! enum. 1 p. 209) tota subincana, ramis tetragonis strictis tomentoso-villosis, foliis ovatis ovali-oblongis vel subcordato-ovatis e basi coarctata in petiolum decurrentibus acuminatis mucronato-serratis rugosissuprasparse villosis scabridisque subtus canescenti-tomentosis-villosisive, spicis terminalibus longissimis strictis teretibus strigoso-pubescentibus hirtellis, bracteis herbaceo-membranaceis rigidis striatis oblongo-lanceolatis subulato-acuminatis acumine primum reclinato post anthesin arrecto, calyce compresso inæqualiter subulato-4-dentato bracteæ subæquali longiori per anthesin superne recurvo deinceps arrecto denique rhachi incrassata omnino immerso. (J) Crescit in America æquinoctiali, in convalli Caracasana (H. et B. Vargas! Moritz n. 194!), in ins. Trinitatis (Sieber! n. 240!), in Cubâ juxta Havana nam (de la Ossa!), in Guianâ brit. (Schomb.! n. 831 et 769). — Bot. mag. t. 976. Verbenæ mutabilis Jacq.! coll. 2 p. 334, icon. rar. 2 p. 207! Vent. hort. malm. t. 36! Andr. bot. rep. t. 435. Cymburus mutabilis Salish. parad. lond. 1 p. 49, Tratt. gartenpfz. fasc. 4 n. 36 et tabular. t. 310. Za- pania mutabilis Lam. ill. 1 p. 59. Stachyt. Zuccagni Rœm. et S. syst. 1 p. 205. Spicæ pennæ anserinæ vel cygnæ crassitie. Bracteæ secus marginem præcipue pubescentes, ciliatae. Cor. majuscula, recens coccinea deinceps in roseum ver- gens. (v. v. c. et s. sp. in h. DC. et berol.)
15. S. CANESCENS (Kunth! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 227), subdichotoma, caule foliisque subviscidæ tomentoso-lanatis aut hirsute villosis, ramis tetragonis, foliis ovatis subrotundatis subtus basi breviter coarctata subsessilibus grosse acumi- nato-serratis rugosis subtus incanis, spicis elongatis gracilibus, floribus nu- bilibus subrecurvo-patulis, calycibus fructigeris rhachi demum incrassatae impressis teretibus, bracteis firmis margine scariosis subulatis subaristato-acu- minatis calycem acute 4-dentatum cum rhachi villosum vel pubescentem si- mulque pilosum æquantibus brevioribus. (J) In Brasiliâ æquinoctiali (Max. princ. Neuwied.! Mikan! Sell.! Ried.!), in Peruvia ad littora oceani pacif. (H. et B.!). S. hirsutissima Link! enum. hort. berol. 1 p. 19. S. hirsuta Jacq. fil. ! eclog. 2 p. 10 t. 160. Folia 1½ poll. longa, 9-12 lin. lata. Calyx 3 lin. longus, Cor. calyce subdupo longior, azurea. Variat indumento laxiore et copiosiore, imprimis in spicâ, et glandulis nunc rarioribus nunc crebrioribus immixtis. (v. s. in h. Kunth, cæs. vindob., reg. berol. et Mart.)

16. *S. CRASSIFOLIA* (Schrad.! in gött. gel. anzeig. a. 1821, 1 p. 709), ramis 4-angularibus argute marginatis scabriusculis, foliis coriaceis elliptico vel oblongo-obovatis hasi integerrimâ coarctatâ sessilibus obtusis crenato-serratis serraturis cartilagineo-apiculatis margine revolutis reticulato-venosis supra glabris patentibus subtus pubescenti-tomentosis canescensibus reti prominent glabro, spioâ longâ gracili tereti strictâ glabra, rhaci excavata, bracteis duris ovatis acuminatis calyce compresso immerso breviter 4-dentato subdupo brevioribus. ♂ In Brasiliæ prov. Babiensi (Max. Pr. Neuwied.! Sell.! Mart.! Blanch.! pl. bras. n. 3647). Frutex suborgyalis. Folia 2-3-uncialia. Calyx 4 fere lin. longus. Cor. calyce subdupo longior, azurea. (v. s. in h. Mart., berol. et DC.)
17. *S. ORUBICA* (Vahl! enum. 1 p. 208), undique pubescens, ramis subtetragonis, foliis ovatis in petiolum attenuatis acuminatis grosse et acute serratis lineato-rugosis supra margineque scabris suhtus canescensibus, spicis longissimis strictis, floribus patulis, calycibus demum rhachi incrassate profunde excavate immersis, bracteis latis foliaceis ellipticis basi angustatâ sessilibus concavis cuspidatis laxis reclinatis calyce longioribus eumque obtegentibus. ♂ In America æquinoctiali, in Novâ-Granatâ (H. et B.!) et in vicinis insulis Orubâ (Plukn.) et S. Martbæ (Bertero!, Purdie), nec non in Guianâ (Rohr ex Vahl). Verbena orubica Linn. syst. veg. p. 66. Plukn. alm. t. 327 f. 7. Ehret pict. t. 5 f. 1. V. aristata Vahl eclog. 2 p. 2. et icon. t. 11! S. aristata Vahl icon. 1 p. 206. Species spicâ sesquipedalis undique laxe folioso-bracteata maxime insignis, ceterum vero *S. mutabilis* sane simillima. Bracteæ 2-2½ lin. latæ, multinerves, venosæ, strigoso-pubescentes, ciliatae. Calyx compressus, hirtellus, 3 lin. longus. Cor. violacea, fauce dilutiore. (v. c. in h. Kunth et DC.)

### Sectio II. TARPHOSTACHYS. — *Melasanthus Pohl. l. c.*

Spioæ imbricata vel patentiflora. Rhachis angulata, scrobiculis obsoletis aut capioæ multo brevioribus. Calyx elongatus. Corolla tubulosa vel tubuloso-infundibuliformis. Stylus saepissime exsertus. — Species omnes Americanæ.

#### § 1. *Longespicatae. — Spicæ elongatae, dodrantales et ultra.*

18. *S. RETICULATA* (Mart.! fl. bras. ined.) caule teretisculo scabro-pubescente, foliis crassiusculis duris ovatis basi integerrimâ postice brevissime coarctatâ subsessilibus acutis obtusisve margine revolutis serratis crenatis supra scabris subtus venoso-reticulatis foveolatis birtis subcanescensibusqne, spicis terminalibus singulis ternisve subcylindricis laxe imbricatis subcanescentsi-hirsutulis, bracteis rigidis lanceolato-subulatis acuminatis uninerviis calyce subdupo brevioribus, calyce plicato-nervoso leviter compresso breviter 5-dentato postice breviter fissio. ♂ In Brasiliæ prov. Minarum Generalium (Mart.! Clauss.! pl. bras. n. 1840 et 336.) Fruticulus 2-3-pedalis, ramis erectis, Folia inf. 2 poll. circ. longa. Spica 1½-6 poll. longa. Calyx 6 lin. longus. Cor. obscure cœruleo-subvirescens tubo calycem subæquante. (v. s. in h. Mart. et DC.)
19. *S. CHAMISSONIS* (Walp. repert. 4 p. 10), canescens-subvillosa, caulibus teretibus strictis tomentosis, foliis subrotundo - ovatis basi integerrimâ subito coarctatâ sessilibus acutiusculis subgrosse serrato-crenatis venoso-reticulatis rugosis supra nitidulis hirtis subtus canescens-tomentosis, spicâ terminali elongatâ strictâ, floribus sparsis patentibus, rhaci subtereti, bracteis lanceolatis subaristato-acuminatis patentibus plus duplo brevioribus calyce dense pubescente compresso sursum dilatato truncato brevissime et subæqualiter 4-dentato. ♂ Crescit in Brasiliæ prov. S. Pauli, Minarum et Goyasensi (Lund! Ried.! Pöhl!). *Melasanthus longespicatus* Pohl! pl. bras. 1 p. 77. t. 61. Caulis 1½-3-pedalis, simplex vel superne fastigiatus. Folia 1-1½ poll., saepius complicata. Spicæ ½-1-pedalis. Calyx semipollicaris. Cor. tubulosa, purpurea. (v. s. in h. Cæs. vjandob., petrop. et DC.)
20. *S. GESNERIOIDES* (Cham.! in Linnaeâ 7 p. 245), ramis argute vel alato-qua-

drangularibus subvillosis pubescentibusve, foliis firmis ellipticis basi coarctatâ vel truncatâ integerrimâ sessilibus obtusis acutisve grosse crenatis reticulato-rugosis utrinque hirtis tomentosissime supra demum calvesceribus et scabris subtus reticulato-venosis, spicâ terminali strictâ longissimâ tereti undique im-bricatâ, rhachi subæquali, bracteis firmis linear-lanceolatis aristato-cuspidatis pubescentibus ciliatis calyce erecto adpresso argute plicato pubescente angulis-que piloso brevioribus. ♂ In campis Brasiliae meridionalis et mediterraneæ (Sell.! Pohl! Ried! Lund!). Frutex robustus. Folia magnitud. et indumento varia, 3-6 poll. longa, 1½-2½ poll. lata. Spica 1-2½-pedalis. Calyx semipoll. Cor. tubuloso-infund., cœrulescens, tubo calycem triente superante. (v. s. in h. berol., vindob., petrop. et DC.)

21. *S. ALBIFLORA* (DC. mss.) fruticosa, ramis argute vel subulato-quadrangula-ribus pubesoentibus, foliis ovatis ellipticisve basi coarctatâ anguste cuneatâ sub-sessilibus acuminate grosse crenatis lineato-rugosis supra pube strigosâ adspersis scabridisque subtus tomento velutino canesceribus, spicâ terminali elongatâ strictâ cylindraceâ undique laxe imbricatâ hirtello-pubescente, rhachi subæquali, bracteis herbaceo-membranaceis lanceolatis cuspidato-acuminatis calyce patulo compresso plicato brevioribus vel eumdem subæquantibus. ♂ In Mexici ditione Oaxacana leg. cl. Andrieux (pl. exs. n. 141!). Proxima St. gesneriodi. Folia magna, penninervia, tenuiter neque ut in illâ prominenti-reticulato-venosa, crenis margine revoluto cartilagineis scabris plerumque rotundatis interdum apiculatis. Spica in nostra dodrantalis, ditissima, crassa tamen laxa. Calyx 5-7 lin. longus, bifidus, subulato-4-dentatus, dentibus anticus minoribus, fructifer antice fissus internâ paginâ tenuiter strigoso-puberulâ. Cor. alba, ca-lyce duplo longior. (v. s. in h. DC.)

22. *S. COCCINEA* (Schauer fl. bras. ined.), ramis quadrangularibus angulis argute marginatis pilis antrorsis pubescentibus, foliis ovatis ellipticisve basi in petiolum longisculum breviter acuminatis obtusis acutisve grosse serratis venoso-rugo-sis supra scaberrimis sparse pilosis subtus pube hirtâ subcanesceribus reti in-super pilis molibus villosiusculo, spicâ palmari-spithameâ terci imbricatâ, rhachi angulatâ, bracteis patulis firmis subulatis aristato-acuminatis pubes-centibus pilosisque calyce arrecto argute plicato pubescente angulisque piloso paulo longioribus aut brevioribus. ♂ In Brasiliæ prov. Bahiensi (Max. Princ. Neuwied! Blanch. n. 3885). Frutex 8-9-pedalis. Calyx 6 lin. long., bifidus, dent. inæqualibus acuminatis. Cor. coccinea, tubuloso-infundibularis, pollicaris et longior. Media quasi inter *S. gesneriodiem* et sequentem speciem, illi acce-dens bracteis calycibusque, huic corollâ similis, ceteris vero partibus aliena. (v. s. in h. Mart. et DC.)

23. *S. SCABERRIMA* (Cham. l. c. p. 244), subdichotoma, glabriuscula, ramis qua-drangularibus angulis alâ angustâ marginatis, foliis ovatis basi subinæqualiter cuneato-coarctatâ in petiolum decurrentibus acuminatis grosse apiculato-crena-tis subrugosis supra scabris subtus pallidis lævibus nervis utrinque pilis rarís strigosis, rhachi excavatâ, bracteis membranaceo-paleaceis oblongo-lanceolatis concavis tenuiter aristato-cuspidatis subtiliter ciliatis laxis calyci opprimitis ar-geute plicato vix piloso æqualibus vel brevioribus. ♂ In Brasiliæ prov. Bahiensi (Sell.! Max. Princ. Neuwied!) Frutex subgyralis. Folia 2-4½ poll. longa, 1-2 poll. lata. Calyx 9 lin. longus. Cor. speciosa, kermesina, tubuloso-infund., 1½ poll. longa. (v. s. in h. reg. berol. et Mart.)

24. *S. QUADRANGULA* (Nees et Mart. in nov. act. acad. nat. cur. 11 p. 69), subdichotoma, ramis quadrangulis argute marginatis subtiliter strigosis, foliis ovatis in petiolum brevem abrupte coarctatis acuminatis basi apiceque integrerimis ceteroque leviter acute serratis margine revolutis penninerviis subrugosis supra asperulis subtus discoloribus reti prominente strigilloso, spicis terminali-bus alaribusque gracillimis sparsifloris sub anthesi laxis subtilissime puberulis, rhachi angulatâ subscrubriculatâ, bracteis firmis subulatis acuminatis breviciliatis calyce plicato bifido demum adpresso subduplo brevioribus. ♂ In Brasiliæ prov.

Bahiensi (Max. Princ. Neuwied.! Blanck.! n. 2820). Fruticulus biped. Folia I-I $\frac{1}{2}$  pollicaria. Calyx 5 liu. longus. Cor. 9 liu. longa, infundib., cœrulea. (v. s. in h. Mart. et DC.).

§ 2. *Brevispicatae*. — *Spica breves*, *subdigitales*.

25. S. SPECIOSA (Pohl! in sched. herb.), dichotoma, ramis ramulisque teretiusculis, his hirto-tomentosis, foliis lanceolatis oblongisve basi cuneatâ in petiolum brevem decurrente acumineque producto integerrimis margine revoluto crenato-vel obsolete serratis supra nitidulis scarabrusculis subtus puberulis reti hirtello-pubescente, spicis digitalibus laxe imbricatis, rhachi excavatâ, bracteis rigidulis linearie-subulatis acuminatis calyceque triplo longiore herbaceo-costato antice breviter fisso subcanescenti-hirsutiœculis, corollâ infundibuliformi maximâ. ♂ In Brasiliæ medit. ad Solgado (Pohl!). Folia 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, 9-12 lin. lata. Calyx 8-9 lin. longus. Cor. spectabilis, violacea, duobus poll. longior. (v. s. in h. cas. vindob.).
26. S. POHLLIANA (Cham.! l. c. p. 248), caule teretiœculo superne fastigiato, ramis subtetragonis submarginatis ad nodos compressis hirtis subhirsutis, foliis pergamentaceis ellipticis basi integerrimâ in petiolum attenuatis acuminatis margine scabro grosse et argute serratis penninerviis planis adultis utrinque præter nervos hirsutulos glabris subtus pallidis, spicis terminalibus alaribusque palmaribus laxifloris subcanescenti-hirtellis, floribus patulis, rhachi angulatâ subfoveolatâ, bracteis membranaceis striatis lanceolatis acutissimis calyce triente brevioribus. ♂ In Brasiliæ prov. Minarum (Sell.!). Persimilis sequenti, a quâ vero præter hirsutiem etiam spicis longioribus laxifloris differt. (v. s. in h. reg. berol.).
27. S. GLABRA (Cham.! l. c. p. 250), glaberrima, caule superne dichotomo, ramis tetragonis marginatis, foliis subpergamentaceis ellipticis lanceolatis basi integerrimâ cuneato-attenuatâ in petiolum decurrentibus acuminatis acute serratis margine revolutis venosis planis supra nitidulis subtus pallidis opacis, spicis terminalibus brevipedunculatis brevibus cylindricis singulis ternisve, floribus approximatis patulis, rhachi angulatâ subfoveolatâ, bracteis membranaceis lanceolatis acutis patulis calyce subduplo brevioribus. ♂ Vulgaris uti videtur in montosis saxosis Brasiliæ, in prov. Minarum vicinique (Clauss.! in Mart. h. fl. bras. n. 1027, Blanch.! n. 3126, Sell.! Pohl! Ried.! Lund!). Frut. 4-8-pedalis. Folia 2-3 unc. longa, 9-12 lin. lata. Spicæ 1 $\frac{1}{2}$ -2 unciales. Calyx 5-6 lin. long. Cor. infund., cal. subduplo excedens, cœrulea. Siccando tota nigrescens. Variat :
- α. *latifolia*, forma vulgaris, foliis ellipticis postice cuneato attenuatis grosse serratis. S. glabra Cham.! l. c. et coll. citt. (v. s. in hh. ber., vindob., petr., DC.)
  - β. *angustifolia*, foliis lanceolatis remotius et brevius serratis. — Hanc in prov. Minarum leg. cl. de Mart. (v. s. in h. Mart.)
28. S. TRISPICATA (Nees et Mart.! l. c. p. 70), glabriuscula, ramis teretiœculis subverrucosis, foliis membranaceis oblongo-lanceolatis basi integerrimâ in petiolum longiusculum attenuatis acuminatis crenato-serratis penninerviis venosis subrugosis supra nitidulis glabris subtus pallidis opacis reti obsolete strigoso, spicis plerumque ternis brevibus dense imbricatis nitidis, rhachi angulatâ, bracteis linearie-lanceolatis aristato-cuspidatis firmis margine scariosis ciliatisque concavis laxis calyce argute plicato brevioribus. ♂ In sylvaticis prov. Bahiensis Brasiliæ (Max. Princ. Neuwied!). Species valde insignis. Frutex orgyalis. Folia 2 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$  pollicaria. Spicæ sesqui-biplicares, interdum semipedalics. Calyx 6 lin. longus. Cor. cœrulea, infundibularis, calycem triente excedens. (v. s. in h. Mart.)
29. S. MARTIANA (Schauer in Endl. et Mart. fl. bras. ined.), glabriuscula, ramis alternatim subcompressis tetragonis submarginatis tenuiter puberulis, foliis coriaceis oblongis positiæ cuneato-attenuatis sessilibus acuminatis a

medio inde dense acute serratibus penninerviis planis utrinque viridibus pilisque minutissimis raris adpressis conspersis, spicis sessilibus palmaribus subgracilis strictis nitidulis, floribus patulis laxe imbricatis, rhachi crassiusculâ angulatâ subfoveolatâ, bracteis brevissimis late ovatis subacute ciliosatis, calyce subcompresso angulato superne plicato truncato breviter 5-dentato. ♂ In campis editis prov. Minarum Brasiliæ (Mart.!). Perinsignis. Folia 2 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, 12-16 lin. lata. Spica 3-4-pollicaris. Cal. 5 lin. longus. Cor. infundibulif. 9 lin. æquans. (v. s. in h. Mart.)

30. S. RHOMBOIDALIS (Schauer l. c.), caulinis teretibus strictis simplicibus dense pubescentibus, foliis coriaceis oppositis ternis erecto-patulis obovato-vel subrhomboideo-ellipticis basi late cuneatâ integerrimâ sessilibus breviter acuminate in medio grosse serratis penninerviis et grosse venosis utrinque scabriusculis reti pubescente, spicâ terminali subspithamæ strictâ verticillatâ confertisculâ patentiflorâ tenuissime puberulâ, rachi teretiusculâ, bracteis subulatis aristato-acuminatis patentibus calyce plus duplo brevioribus, calyce ancipiti sursum dilatato truncato antice brevissime 4-dentato. ♂ In montosis altioribus aridis prov. Goyaz Brasiliæ (Pohl!). Melasanthus rhomboidalis Pohl! pl. bras. 1 p. 78 t. 62 et Melas triphyllus Pohl! ibid. p. 79 t. 63. S. rhomboidalis et triphylla Walpers repert. 4 p. 10. Caulis 1-1 $\frac{1}{2}$ -pedalis. Fol. 1-2 poll. longa, 9-12 lin. lata. Spica 3-6-pollicaris. Calyx 6-8 lin. longus. Cor. subcylindrico-tubulosa calycem dimidio fere excedens, limbo rotundato-5-lobo atro-purpureo, tubo pallidiore. (v. s. in h. cæs. vindob.)
31. S. GLAUCA (Schauer l. c.), glauco-pruinosa, caule tereti striato stricto apice subdichotome corymboso, foliis coriaceis subrhombeo-vel obovato-ellipticis oblongis basi late cuneatâ sessilibus acutis subcartilagineo-marginatis integrerimis vel antrovisor remote crenato-serratis penninerviis subvenosis, spicis terminalibus alaribus laxe imbricatis crassis oblongis acutis nutantibus, rhachi teretiusculâ, bracteis membranaceis ovatis acuminatis substriatis subtilissime ciliatis brevibus, calyce submembranaceo subclavato-tubuloso ancipiti superius utrinque tenuissime puberulo antice brevissime late 4-dentato postice exciso. ♂ In campis graminosis prov. Goyaz Brasiliæ (Pohl!). Caulis 3-4-pedalis, crassus, medullosus. Folia 2-4 poll. longa 1-2 poll. lata. Spica 2-3-poll., basi foliorum pari stipitata. Calyx 6-7 lin. longus, apice 2 lin. latus, superne coloratus. Cor. tubulosi-infund., calyce dimidio longior, atropurpurea. Variat :
- α. *serratifolia*, fol. caulinis antice manifeste crenato-serratis, crenis remotiusculis obtusiusculis. Melasanthus glaucus Pohl! pl. bras. 1 p. 81 t. 65. S. glauca Walp. rep. 4 p. 11.
  - β. *subintegrifolia*, foliis caulinis integrerimis vel obsolete crenatis. — Mel. integrifolius Pohl! l. c. t. 64. S. integrifolia Walp. l. c. (v. utramq. s. in h. cæs. vindob.)
32. S. PACHYSTACHYA (Mart.! fl. bras. ined.), ramis tetragonis lanato-villosis, foliis ovato-oblongis basi cuneatâ integerrimâ in petiolum decurrentibus acutis grossiusculæ serratis utrinque hirsutie substrigosa canescens, spicâ terminali sessili palmaris confertâ crassâ cylindricâ obtusa, rhachi incrassata subscrobiculatâ, bracteis rigidis spatulatis in cuspidem subulato-aristatam coaretatis striatis margine dorsoque inferiore villosis arcte imbricatis calycem appressum subcomplanatum piloso-subhirsutum æquantibus et obtengentibus. ♂ In Brasilia campis altis prov. Minarum (Mart.! Claussen! Ried.!), Piauhy et Goyaz (Gardn.! n. 3410). Fruticulus 1-3-pedalis, spicâ 2-3-pollicari imbricatâ digitique crassitiae inter omnes insignis. (v. s. in h. Mart. et cæs. petrop.)
33. S. HISPIDA (Necs et Mart.! act. acad. nat. cur. 11 p. 69), subdichotoma, undique villo lanato canescens, ramis teretiusculis, foliis ellipticis basi integrerimâ cuneato-attenuata sessilibus acutis antice grosse serratis subrugosis, spicis terminalibus palmaribus crassis densis patentifloris, rhachi scrobiculatâ, bracteis lanceolatis cuspidato-acuminatis laxis calyce postice fissum antice breviter 4-dentatum subæquantibus. ♂ In campis prov. Bahiensis Brasiliæ (Max. princ.).

Wied.!, Frut. 3-4-pedalis. Folia  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  uncias longa. Spica ex omni parte villo-sissima, floribus patentibus, digitū minimi fere crassitie, tamen laxa. Calyx 5 lin. circ. longus. Cor. calyce dimidio longior, azurea. (v. s. in h. ol. Mart.)

34. *S. ACUMINATA* (DC. mss.), dichotoma, pubē sparsā strigoso-hirtellā, ramis argute quadrangularibus subalato-marginatis, foliis ellipticis basi attenuatā integrerrimā sessilibus acuminatis dentato-serratis lineato-rugosis undulatis supra scabris subtus sparse hirtellis pallidiisque, spicis alaribus terminalibusque demum digitalibus cylindraceis undique laxe imbricatis, rhachi subæquali, bracteis linearī-lanceolatis sensim in cuspide extenuatis longe ciliatis calyce præter costas pilosas glabriuscule fere longioribus. ♂ In Mexico circa Oaxacam (Andrieux pl. mex. n. 140!). Species insignis. Folia 2-3-pollicaria. Calyx 4 lin. longus, brevidentatus, fructifer antice fissus. Cor. mediocris violacea, fane flavescente. Fructus calyce semibrevior, fuscus, coccis 5-jugis ad apicem reticulato-areolatis. (v. s. in h. DC.)

### § 3. *Subspicatae*. — *Spicæ brevissimæ*.

35. *S. VILLOSA* (Schauer in fl. bras. ined.), cano-villosa, caule tereti superne fastigato, foliis subrotundis basi cuneato-attenuatā integrerrimā sessilibus obtusissimis crenatis septuplinerviis lineato-rugosis supra villoso-hirsutis subtus sub-tomentoso-villosi, spicis terminalibus sessilibus oblongis laxe imbricatis, rhachi tereti villosū, bracteis membranaceis obovato-oblongis breviter acumi-natis striatis cum calyce coloratis et villosulis eoque duplo brevioribus, calyce compresso sursum dilatato plicato truncato subæqualiter 5-dentato, dentibus brevibus retusis mucronatis. ♂ in campis graminosis prov. Goyaz Brasiliae (Pohl!). Melasanthus villosus Pohl! plant. bras. 1 p. 76 t. 60. Caulis pedalis inferne nudus. Folia patentia 8-12 lin. longa, rotundato-crenata. Calyx 6 lin. longus, apice 2 lineas lato. Cor. calyce sesquilinea longior, subcylindrico-tubulosa, limbo brevi atropurpureo, tubo pallidiore. (v. s. in h. cæs. vindob.)

36. *S. COMMUTATA* (Schauer 1. c.), villoso-hirsuta, caule tereti dichotomo fastigato, foliis subrotundis basi cuneato-attenuatā sessilibus obtusissimis crenatis vel crenato-serratis subseptuplinerviis lineato-rugosis supra strigoso-hirtis hirsutisve subtus canescenti-tomentosis, spicis terminalibus sessilibus brevibus laxe imbricatis hirsutisculis, rhachi angulatā subfoveolatā, bracteis lanceolatis acutis cum calyce herbaceis eoque paulo brevioribus, calyce tubuloso plicato postice profunde fisco antice inæqualiter 4-dentato, dentibus brevibus acuminatis. ♂ In umbrosis saxosis montis Itacolumi et alibi in editis montosis prov. Minarum Brasiliæ (Sell.! Mart! Ried.! Lund!). St. villosa Cham.! in Linnæa 7 p. 247, nec vero Melasanthus villosus Pohl. Folia 1-2 poll., crenis nunc rotundatis nunc brevissime apiculatis. Calyx anguste tubulosus, 5 lin. longus. Cor. 7-8 lin. longa, lète cœrulea, anguste tubulosa sursum paulo dilatata. Præcedenti sane simillima, sed præter alia jam bractearum et calycis indole uberrime distincta. (v. s. in h. reg. ber., cæs. petrop., Mart. et DC.)

37. *S. VISCIDULA* (Schauer 1. c.), subviscidō-villosa, caule teretiusculo dichoto-mo, ramis submarginato-tetragonis, foliis oblongis postice cuncatis integrerimis sessilibus acutis margine revolutis a medio inde crenato-serratis multipli-nerviis lineato-rugosis supra villoso-hirsutis subtus tomento laxe canescentibus, spicis terminalibus brevipedunculatis brevibus cylindricis laxe imbricatis glan-duloso-hirsutisculis, rhachi angulatā subfoveolatā, bracteis anguste lanceolatis attenuato-acuminatis canaliculatis herbaceis margine scariosis calycem sub-æquantibus, calyce tubuloso plicato postice profunde fisco antico inæqualiter 4-dentato, dentibus brevibus subacuminatis. ♂ In montosis prov. Minarum Brasiliæ (Clauss.! in Mart. h. bras. n. 1044, Riedel!). Proxima præcedenti, sed pubē subviscidā, foliorum figurā, bracteis, calyce corollāque majoribus distincta. Frutex bipedalis. Folia 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longa. Calyx 6 lin. long. Cor. lète cœrulea, 8-9 lin. longa, subinfundibulif.-tubulosa. (v. s. in h. Mart. et cæs. petrop.)

38. *S. AJUGÆFOLIA* (Schauer 1. c.), subcanescenti-villosa, caule ramoso, ramis

- teretiusculis villosa-hirsutis, foliis oblongis postice cuneatis integerrimis sessilibus acutiæculis margine revolutis a medio inde crenato-serratis multiplinerviis venosis rugosis supra strigoso-hirsutiusculis subtus canescens-tomentosis, spicis terminalibus subsessilibus brevibus cylindricis laxe imbricatis canescens-hirsutis, rhachi angulatâ, bracteis linearibus ex apice truncato subulato-cuspidatis canaliculatis herbaceis margine scariosis calyce duplo brevioribus, calyce suboblongo-tubuloso subcompresso plicato utrinque bifido, lobis acuminatis dente minuto auctis. ♂ In campis editis prov. Minarum Brasiliæ (Ackermann! Riedel!). Habitu foliisque precedenti admodum propinquâ, sed aliena indole bractearum, florum majorum et indumenti e pilis quidem (ut in illâ) articulatis confecti neque vero viscidis neque glanduliferis. Spicæ bipollicares. Calyx 8 lin. longus. Cor. 9 lin. longa, tubo gracili, superne paulo ampliato. (v. s. in h. Mart. et cæs. petrop.)
39. *S. LANATA* (Schauer l. c.), dichotoma, tota lanâ patenti villosa atque canescens, ramis teretiusculis, foliis cordato-ovatis sessilibus acutis grosse et acute serratis penninerviis lineato-rugosis subtus subtomentosis candicantibus, spicis terminalibus sessilibus brevibus cylindricis arete imbricatis canis, bracteis lanceolatis attenuato-acuminatis calycem compressum 5-nervium bifidum acutilobum æquantibus. ♂ In campis prov. Minarum Brasiliæ (Mart.). Species distinctissima. Folia 9-12 lin. longa. Spicæ pollice brevior. Calyx 5 lin. long. Corolla infundib., semipoll. (v. s. in h. Mart.)
40. *S. LYCHNITIS* (Mart. l. c. ined.), fruticosa, prostrata, undique sericeolanata, ramis obsolete tetragonis, foliis approximatis ellipticis utrinque acutis brevissime petiolatis margine revolutis integrerrimis vel antice crenato-serratis penninerviis lineato-rugosis, spicis terminalibus ovoideo-oblongis confertis sessilibus vix e summis foliis emersis, bracteis membranaceis lanceolatis acuminatis concavis striatis sericeis calyce compresso binervi inæqualiter bifido acutilobo paulo brevioribus. ♂ In prov. Bahiensi Brasiliæ (Mart.). Folia crassiuscula 8-10 lin. longa. Spicæ semipoll., deinde pollicares. Bracteæ flavescentes, multistriatae. Cal. 5 lin. longus. Cor. coccinea, infundibularis, 7 lin. longa. (v. s. in h. Mart.)
- § 4. *Capitatae. — Spicæ conferte capitatae.*
41. *S. LACUNOSA* (Mart. l. c. ined.), superne dichotoma, ramis fastigiatis obsolete tetragonis lateribus alternis scabro-pubescentibus, foliis approximatis crassis duris subrotundis basi integrerrimâ cuneato-coarctatâ sessilibus a medio inde grosse et acute serratis supra scabris subtus reti valde prominente scrobiculato-reflexiatis hirtello-pubescentibus discoloribusque, spicis terminalibus ovoideo-capitatis sessilibus vix e summis foliis emersis confertis, bracteis firmis lanceolatis acutis hirtulis ciliatis striatis calyce quadrante brevioribus. ♂ In campis editis prov. Bahiensis interioris in Brasiliâ (Mart.). Folia erecto-patula, 10 lin. circ. long. et 6-8 lin. lat. metentia, margine subcartilagineo, areolis paginae inf. exiguis inter venas quasi exsculptis. Cal. 4 lin. fere longus. Cor. infundibuliformis. (v. s. in h. Mart.)
42. *S. SELLOWIANA* (Schauer l. c. ined.), fruticosa, pubi brevi densâ glandulâ commixta tomentosa, caule superne dichotomo, ramis obtuse tetragonis, foliis confertis ellipticis oblongis postice cuneatis et integrerrimis sessilibus acutis obtusisve medio inde crenato-serrulatis penninerviis venosis planis, spicis terminalibus subglobosis sessilibus erectis glanduloso-pubescentibus, bracteis linearis-subulatis acutissimis marginc scariosis calyce subduplici brevioribus. ♂ In Brasiliæ prov. S. Pauli, in saxis montosis alt. 4000 ped. (Riedl! Sell.!). Fol. 1-1½ poll. longa, 6-8 lin. lata. Spicæ nucis juglandis minoris mole. Calyx semipoll. Cor. saturate cœrulea, infundibularis. (v. s. in hh. reg. berol. et cæs. petrop.)
43. *S. DISCOLOR* (Cham.! in Linnaeâ 7 p. 251), fruticosa, glaberrima, caule tereti erecto superne dichotomo subcorymboso, foliis coriaceis ovatis oblongis sessilibus

basi subcordata semiamplexicaulibus acutiusculis margine scabro deflexo leviter crenato-serratis supra lucidis subtus pallidis opacis glanduloso-punctatis, spicis terminalibus sessilibus ovoideis laxe imbricatis nutantibus nitidis, bracteis membranaceis trinerviis linearis-subulatis tenuiter acuminatis patulis calyce subdupo brevioribus. ♂ In Brasiliâ olim legit Sellow! Folia 1½-2 poll. longa, crenis rotundatis subcartilaginco-apiculatis. Spicæ subcorymboso-congestæ, basi foliorum pari stipatæ, subpollicares. Calyx 5 lin. longus. Corolla fere hypocraterimorpha, tubo subcylindrico, 7 lin. æquante. (v. s. in h. reg. berol.)

### *Species exclusæ.*

- S. **BIFURCA** Benth. = Bouchea Ehrenbergiana.  
 S. **PRISMATICA** Vahl = Bouchea Ehrenbergiana.  
 S. **PSEUDO-CHASCANUM** Walp. = Bouchea lætevirens.  
 S. **SQUAMOSA** Vahl = Elytraria caulescens (vide Acanthaceas).

XII. **LIPPIA** Linn. gen. n. 781, L. C. Rich. in Michæl. fl. bor.-amer. 2 p. 15, Kunth in Humb. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 262, Juss. ann. mus. 7 p. 70 et 75, Cham. in Linnæâ 7 p. 213 sqq., Endl. gen. n. 3684, Meisn. gen. p. 290 et comment. p. 199, Gærtner. de fruct. 1 p. 266 t. 56, f. 2, Jacq. fl. eclog. 1 t. 85, Reichenb. hort. bot. t. 169. — Dipterocalyx Cham. in Linn. 7 p. 241 t. 7 f. D. — Zapania Scop. Juss. l. c. p. 71 et 75, R. Br. prodr. fl. nov.-holl. 1 p. 514. — Blairia Javanica et nodiflora Gærtner. l. c. p. 265 t. 56. — Bertolonia Raf. in Desv. journ. de bot. 4 p. 177 (non alior.). — Platonia Raf. in New-York med. repos. (non alior.) — Riedelia Cham. l. c. p. 241 t. 7 f. C. — Cryptocalyx Benth. in Hook. journ. bot. 2 p. 52. — Aloysia Ortega et Palau. miss. ex L'Herit. stirp. 1 p. 21. Cham. l. c. p. 234. — Verbenæ sp. Linn. L'Hér. stirp. 1 t. 11, 12.

Calyx parvus, membranaceus, tubulosus, bialatus bicarinatus aut exangulatus, bifidus lobis magis minusve evidenter bidentatis demumque saepè bivalvis et capsulae adhaerens, vel subæqualiter et herbaco-4-dentatus (plerumque hirsutus aut villosus). Corolla tubuloso-subinfundibuliformis; tubus sursum ampliatus; limbus obliquus, planus vel inclinatus, subbilabiatus, labio superiore integro vel bifido, inferiore trifido. Stamina 4, corollæ tubo inserta, inclusa, didynama. Antheræ biloculares, loculis adpositis rimâ biante dehiscentibus. Ovarium biloculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, brevis, filiformis, stigmate citra apicem styli laterali lineari declini. Capsula brevis, dicocca; coccis maturitate facile secedentibus vel cohaerentibus, calycis vix acuti et saepius subbivalvi-fatiscentis laciniis subiectis vel iisdem demum abolescentibus quasi nudis; pericarpio pergamentaceo vel duro subosseo dorso lœvi. Embryi cotyledones crassæ, applicite, radiculâ inferâ brevi. — Herbae et frutices Americana, fruticeta campestria aprica imprimis habitantia, unicâ (L. nodiflora) inter tropicos totius orbis ad littora crescente, saepissime glandulis sessilibus punctatae ideoque aromaticæ. Rami tetragoni. Folia simplicia opposita vel verticillata. Inflor. capitata vel spicata, floribus parvis singulisque bracteâ singulâ saepius magnâ et post anthesin incremente subtensis. Corolla alba, lutea, rubescens, tubo ad staminum insertionem ventricoso. Capsula parva, subrotunda. Genus Lantanæ proximum, fructu imprimis distinctum. Sectiones habitu peculiariter sunt insignes, floris autem et fructus in hoc ordine quam plurimi faciendi, indole omnino convenientiunt.

### *Sectio 1. ALOYSIA.* — Aloysia Ort. l. c.

Racemi vel spicæ subverticillati, laxi, graciles, terminales et axillares vel in paniculas aut axillares aut terminales collecti. Bracteæ exiguae, saepè caducæ. Calyx subæqualiter 4-fidus, costis dentibusque saepius subherbaceis.

1. *L. URTICOIDES* (Steud. nomencl. ed. 2), ramis strictis teretiusculis glabris, foliis membranaceis oppositis ovatis oblongis in petiolum attenuatis acutis crenatis serratis penninerviis venosis rugulosisque supra subcalloso-asperis subtus tomentoso-pubescentibus canescentibusque, racemis ad basin ramuli axillaris novelli racemosis vel paniculatis vix pedunculatis laxis elongatis flaccidis, calyce tubuloso inferne piloso-hirsuto semiquadrifido, dentibus subulato-cuspidatis hispido-scabridis. ♂ Frequens per omnem Brasiliam meridionalem (Sell.! Ried.! Clauss.! n. 368, Blanch.! n. 1850, 1548 et 329, Lund! n. 818) usque in Boliviām (d'Orb.!) et Peruviam (R. et P.!) *V. virgata* R. et Pav. fl. per. 1 p. 20 t. 32 f. 6 (fide sp. Ruiz. in h. reg. Ber.). *Zapania virgata* Poir. enc. 8 p. 845. *Aloysia virgata* Juss. ann. du mus. 7 p. 73 (nom.), Cham. l. c. *Priva virgata* Spreng. syst. veg. 2 p. 753. *Aloysia urticoides* Cham.! in linn. 7 p. 238. Arbuscula 15-20 ped, aut frutex suborgyalis, ramis lenticellatis, spicis copiosis. Folia annua, 3 poll. circ. longa, 1½ poll. lata. (v. s. in b. reg. ber., vindob. et petrop., Mart. et DC.)
2. *L. CHILENSIS*, ramulis junioribus tomentosis, foliis oppositis ovato-lanceolatis subsessilibus obtusis margine revolutis a medio inde crenato-serratis venosorugosis supra strigis callosis asperis nitidisque subtus pubescentibus et cum pedunculis hirtellis glanduloso-pulverulentis, spicis axillaris singulis elongatis laxis in apice ramorum subpaniculatis, calycibus ovatis hirsutie patente candicantibus semiquadrifidis, dentibus lanceolatis. ♂ In regno Chilensi, pr. Coquimbo (Lay et Collie, Gay!). *V. salviæfolia* Hook. et Arn. in Beech. voy. bot. p. 42. Folia sesquiplicaria, subtus glandulæ resinosis micantia, nervis prominentibus. Spicæ 3-5-pollicares, inter antbesin relaxandæ. Flores brevisime pedicellati. Bractæ lanceolatæ, utrinque extenuatæ, dorso marginaque birsutæ, facie glabrae, calyce 5-costatum excedentes. Cor. rosea, tubo superne ampliato calycem paulo excedeante, fauibus glabris. Fructus ignotus; ex habitu autem vix non certo hue pertinet. (v. s. in h. DC.)
3. *L. JUNCEA*, ramis diffusis elongatis junceis teretibus striatis glabris, foliis (parvis) carnoso-coriacéis remotis subspathulato-lanceolatis in petiolum brevem basi dilatatum et decurrentem attenuatis integerrimis vel serrato-dentatis glabriusculis, racemis brevibus terminalibus laxis, rhabci calyceque glabris aut pube hirtellâ (interdum subglandulosâ) subaneescensibus, calyce brevitubuloso brevissime dentato, corollâ calyce triplo longiore subrecurvâ. ♂ In convallibus ad radices Andium Chilenum (Gill., Poeppig! pl. chil. n. 4, Gay! n. 943, Bridges! n. 45, J. Style!). *Verbena juncea* Gill. et Hook. in Hook. bot. misc. 1 p. 162. Species babitu junceo perinsignis. Racemi oblongo-cylindrici, floribus patentissimis approximatis. Bractæ minimæ, caducæ. Cor. subinfundibulari-tubulosa. Stylus exsertus. Capsula generis! ovata, calyce induta. (v. s. in h. reg. ber. et DC.)
4. *L. SCORODONIOIDES* (Kunth! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 260), ramis subterragonis patentissimis junioribus pedunculisque tomento pulvereo canescentibus, foliis oppositis ternisque subtrotundo vel ovato-ellipticis in petiolum brevem acuminatis obtusis crenulatis reticulato-rugosis supra scabro-hirtis subtus tomento tonso candicantibus, pedunculis axillaris singulis patentibus folium subaequantibus spicis cylindricis confertis relaxandis, calyce ovato hirsuto, dentibus subulatis. ♂ Crescit in Andibus Quitenium (H. et B.! juxta pagum Pomosqui in agro Quiteni (Hartw.! pl. columb. n. 1349) in Andibus Peruvianorum (Dombey! n. 259, Meyen!). *Aloysia scorodonioides* Cham. l. c. p. 234. *Verbena alpigena* Walp. in nov. act. acad. C. L. nat. cur. 19 suppl. 1 p. 378 (fide spec. auth. h. Kth.). Folia subpollicaria. Spicæ 1-3-pollicares. Bractæ lincares, minute. Corolla calyce duplo longior, dilute rosea, hirtello-pubescentis, fauibus villosis. (v. s. in h. cl. Kunth, reg. ber. et DC.)
5. *L. CHAMÆDRIFOLIA* (Steud. l. c.), ramulis virgatis tetragonis pubescentibus, foliis oppositis brevissimi petiolatis ovatis acutis grosse subinciso-serratis margine revolutis supra impresso-lineatis nitidis scabris subtus nervosis venosisque

- ac tomento hrevi appresso canescentibus, racemis ad apices ramulorum axillaribus solitariis rectiusculis longe pedunculatis gracillimis interrupte verticillatis, calyce ovato subvilloso-hirsuto, dentibus brevibus ovatis acuminatis. ♂ In campis Brasiliæ meridionalis et reip. Argentinae (Sell.). *Aloysia chamaedrifolia* (Cham.! l. c. p. 234). Verb. dentata Visiani orto di Pad. p. 150, Annales de flore et de pom. 1838 p. 343 cum icone. Folia 6-12 lin. longa. Racemi 3-5-pollicares, rhachi pubescente. Cor. lilacina. (v. v. c. et s. in h. reg. berol.)
6. L. LYCIOIDES (Steud. l. c.), ramis brachiatis subtetragonis, ramulis pube pulvrenlentâ canis subspinescentibus, foliis oppositis elliptico-vel lanceolato-oblongis in petiolum attenuatis ohtus mucronatis acutisve margine subrevolutis integrerrimis vel a medio remote serratis uninerviis supra scabritie callosâ punctatis subtus glandulosâ-punctatis tomento que raso glaucis, racemis axillaribus solitariis ad apices ramulorum paniculatis subflaccidis interrupte subverticillatis, calyce campanulato 5-costato hirsute villoso, dentibus subulatis hirsuti. ♂ In campis editis reipub. Argentinae (Gill. « Cedrou » incol.) et Uruguay (Sell!) nec non in Brasil. merid. e. gr. in prov. Minarum (Mart!); in regno Mexicano (Karw.! Berland.! n. 2065, Galeotti). Verb. ligustrina Lag. nov. gen. et sp. p. 18. V. gratissima Gill. et Hook. in Hook. bot. misc. 1 p. 160. *Aloysia floribunda* Mart. et Gal.! bull. acad. brux. 11 p. 320 (fide sp. a cl. Martens comm.). Folia coriacea subpollicaria. Racemi confertiusculi, canescentes, 2-3-pollicares. Calyx subter pubes undique glandulosus. Corolla calyce dimidio longior, fauce laxe villosa. Specimina Mexicana a bonar. omnino non differunt, nisi quod folia minora habeant. (v. s. in h. reg. ber. et DC.)
7. L. POLYGALÆFOLIA (Steud. l. c.), ramulis subvirgatis striatis subhirtellis pubescentibus, foliis approximatis oppositis ternisve erecto-patulis subimbricatisve subcordato-ovatis sessilibus acuminatis uninerviis integrerrimis marginc reflexis supra lucidiâ scabris subtus nitidis et præter nervum scabrum glabis, racemis axillaribus solitariis ad apices ramulorum subcorymbosis longe pendunculatis subæqualibus rectis laxis, calyce subtubuloso-campânulato hirsuto, dentibus brevibus ellipticis acutis. ♂ In Brasiliâ merid. (?) legit Sellow! *Aloysia polygalæfolia* Cham.! l. c. p. 236. Folia 4-6 lin. longa. Corollæ masculæ, 2½ lin. longæ. (v. s. in h. reg. berol.)
8. L. CITRIODORA (Kunth! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 269), ramis lævibus ramulisque scabriusculis striatis, foliis verticillatis ternis-quaternis lanceolatis brevipetiolatis utrinque acutis integrerrimis interdum medio marginc serratis supra marginæque scabris subtus dense glandulosâ-punctatis, spicis verticillatis axillaribus vel in paniculam terminaliem nudam collectis, calyce tubuloso striato cum rhachi pubescente subtilabiatu, dentibus brevibus acutis. ♂ In fruticetis camporum reip. Uruguay (Commers.), Argent. et Chilens. (Ruiz! Dombe!) et in cultis Peruvia prope Limam et Guayaquil (H. et B.). Verbenæ triphylla L'Herit. stirp. nov. 1. 21 t. 11. *Aloysia citriodora* Ort. et Palav. diss. mss. ex L'Herit. l. c. *Zapania citriodora* Lam. illustr. 1 p. 59. (v. v. c. ct s. spont. in h. reg. berol.)

### Sectio II. GONIOSTACHYUM.

Capitula subspicata paulo elonganda, bracteis decussatis complicato-carinatis et quadrifariam imbricatis tetraquætra, pedunculata; axillaria, gemina-plurima, foliis summis diminutis saepius paniculam racemiformem interrupte verticillatam struentia. — Flores omnium perexigui.

9. L. RUBIGINOSA (Schauer in fl. bras. ined.), ramulis patentibus tetragonis tomentoso-scabris, foliis oppositis oblongis in petiolum productis crenato-serulatis penninerviis lineato-rugosis supra strigoso-puberulis subtus subferrugineo-canescensbit tomentosis, pedunculis axillaribus pluribus flaccidis folio brevioribus, capitulis tetraquætro-ovoideis, bracteis membranaceis lato-ovatis acutis laxe imbricatis tenuiter glandulosâ-pulverulentis puberulisque ciliatis tubo corollæ brevioribus. ♂ In Brasiliæ provincia Minarum (Sell.) Ackerm.!

Lund!). Foliorum lamina circ. pollicaris, supra viridis, subtus pilis brevissimis viridi-canescens glandulisque pubi subjectis denique rubiginosa. Pedunculi semipoll., nutantes vel deflexi. Bractæ stramineæ. Cor. siccando virescens, limbo undulato-crispo. Occurrit dupli forma :

a. *dives*, foliis majoribus magis planis obtusis subtus inter nervos secundarios prominentes venosis pube exili tomentosis magisque ferrugineis, pedunculis plerumque quaternis-octonis.

b. *pauper*, foliis minoribus plicato-rugosis acutis, nervis subtus approximatis cum areolis pube hirtellâ canescens, pedunculis plerumque geminis, (v. s. in h. reg. berol. cæs. vindob. et DC.)

10. L. *SINDOIDES* (Cham.! l. c. p. 224), innovationibus inflorescentiis que subsericeo-canescens, ramulis subtetragonis patulis glabrescentibus, foliis oppositis ternis oblongis ovatis obtusis acutis serrulatis margine revolutis basi cuneatâ integrerrimâ in petiolum brevem attenuatis lineato-subrugosis supra viridibus strigilloso-pubescentibus subtus pallidis hirsutisculis, pedunculis axillaribus geminis-senis flaccidis, capitulis tetraquetro-ovoideis, bracteis membranaceis laxe imbricatis ovatis acutis complicatis tubum corolle æquantibus pallidis totisque imprimis vero carinâ et margine pilosis. ♂ Vulgaris in campis desertis Bras. merid., in prov. Sebastianop. (Pohl! Sell!), S. Pauli (Ried!) et Minarum (Mart! Vauth! pl. bras. n. 411, Clauss. coll. 1838. n. 383). Folia 1-3 poll. longa, basi triplinervia, utrinque punctis glandulosis sub lente micantia. Spicæ 3-4 lin. longæ. Cor. alba fauibus flavis. (v. s. in h. reg. ber., Mart. et DC.)

11. L. *ORGANOIDES* (Kunth! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 267), ramulis subtetragonis strictis cum pedunculis hirto-tomentellis-pubescentibus, foliis oppositis oblongis obtusis vel acutiuseculis crenulatis basi acutâ iutegerrimâ in petiolum abeuntibus lineatis rugosis supra hirtis demumque scabris subtus incano-tomentosis, pedunculis axillaribus quaternis-senis flaccidis, spicis tetraquetro-ovoideis, bracteis membranaceis basi arcte imbricatis lato-ovatis acutis complicatis sericeo-hirsutisculis ciliatis tubo corolle paulo brevioribus. ♂ In campis prov. Minarum Brasiliae (Sell! Ried! Pohl! Clauss. in Mart. h. bras. n. 1037); vulgaris in montosis siccis Venezuelæ (H. et B.! E. Otto!). L. elegans Cham.! l. c. p. 225. Frutex aromaticus, præcedenti habitu et inflorescentiâ similis, sed foliorum figurâ et indumento bene distinctus. Folia basi tripliuvicia, nervo medio superne nervis secundariis imis autem extrorsum pinnatis. Cor. parva, alba. (v. s. in h. reg. berol., Mart. et DC.)

12. L. *GRAVEOLENS* (Kunth! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 266), ramulis terebratulculis strictis appresse pubescentibus, foliis ovato-oblongis obtusis acutisvc basi rotundatis vel obsolete cordatis petiolatis crenatis reticulato-rugosis supra hirto-pubescentibus subtus incano-tomentosis utrinque subter pube glandulosis, pedunculis axillaribus quaternis-senis patentibus petiolo paulo longioribus, spicis tetraquetro-ovoideis, bracteis membranaceis basi connatis imbricatisque lato-ovatis acutis carinatis glandulosis carinâ margineque villosa corolla triente brevioribus. ♂ In regno Mexicano (H. et B., C. Ehrenb.! Gal!). Lantana organoides Mart. et Galeotti! bull. acad. brux. 11 p. 327 (fid. spec. a cl. Mart. comm.). Proxima L. organoidi, a quâ differt foliorum figurâ capitulis floribusque majoribus, bracteis connatis odore graviori. Folia subtus pube glandulosa 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 8-15 lin. lata, petiolo semipollucari. Calyx lineam longus, subvillosus. Cor. tubo calyce duplo longior, siccando virescens, limbo majusculo. (v. s. in h. Kth. et reg. ber.)

13. L. *BERLANDIERI*, undique dense glanduloso-punctata, ramulis tenuibus tetragonis pubescenti-villosulis, foliis ovato-oblongis ellipticis in petiolum brevissime angustatis acutiuseculis obtusis lineato-rugosis supra strigoso-hirsutisculis subtus hirsutis subvillosâ vel tomento villoso canescens, pedunculis axillaribus subquaternis petiolum subæquantibus, capitulis paucifloris tetraquetro-ovoideis, bracteis ovatis acutis ad medium usque connatis laxe

imbricatis pallidis hirsuto-tomentosis glanduloso-punctatis tubum corollæ subæquantibus. ♂ In Mexico inter Santander et Vittoria (Berl. I. n. 2252), circa Oaxacam (Andr. I. n. 166) et in fuscibus montium pr. S. Bartolo (C. Ehrenb. I. n. 720). Fruticulos gratae aromaticus, parvifolius, glandularum copiâ in signis. Folia vix ultra 9 lin. longa, petiolo 2 lin. metiente. Calyx minutus, bifidus, 4-dentatus, puhescens. (v. s. in h. DC. et reg. berol.)

14. L. AFFINIS (Schauer I. c. ined.), ramulis teretiusculis tomentosis, foliis ovatis acutis basi rotundatis subcordatis petiolatis crenatis penninerviis rugosis supra holosericeo-suhtus incano-tomentosis, pedunculis axillaribus aggregatis flaccidis hracteisque pulvereo-glandulosis incano-villosis, capitulo tetracetro-ovoideis folia semiæquantibus, bracteis viridibus ovatis complicato-acuminatis acumine inflexis patulis tubum corollæ æquantibus. ♂ In Brasiliâ (Schuech! Ried. I.). Folia 1½ poll. longa, tomento utriusque paginæ splendente. L. microphylla accedit capitulis et fere indumento, foliorum figurâ et magn. diversa; L. origanoidi similis est, sed differt bracteis et foliis basi rotundatis. (v. s. in h. cæs. vindob. et petrop.)

15. L. SALVIAEFLORIA (Cham. I. c. p. 227), ramulis virgatis subtetragonis inflorescentiisque subpulvereo-glandulosis et hirtello-tomentosis, foliis petiolatis ovato-oblongis acutis apiculatis basi rotundatis crenulatis penninerviis rugosis supra pubescenti-birtellis subtus tomento hirtello denso canescensibus, floralibus superioribus diminutis, pedunculis axillaribus aggregatis flaccidis supremisque folium excedentibus, capitulo tetraquetro-subglobosis, bracteis membranaceis lato-ovatis acuminatis villoso-ciliatis patentibus apice complicato recurvo tubo corollæ brevioribus, imis connatis. ♂ In Brasiliâ prov. S. Pauli (Ried. I Lund!) et Matto-Grosso (Manso! in Mart. h. fl. bras. n. 1032). Folia ramca subbiplicaria. Capitula siccitate virescentia, pedunculis longis patulis rectaxisve. Cor. alba, siccando virescens. (v. s. in h. reg. ber., Mart. et DC.)

16. L. VELUTINA (Schauer I. c. ined.), ramulis subtetragonis inflorescentiisque subpulvenco-glandulosis adpresso tomentosis, foliis ovato-oblongis-lanceolatis acutis apiculatis crenulatis basi acutâ in petiolum contractis penninerviis sublævibus supra velutinis subtus tomento brevissimo denso canescensibus, pedunculis axillaribus aggregatis flaccidis petiolo longioribus, capitulo tetraquetro-subglobosis, bracteis subherbaceis lato-ovatis acuminatis villoso-ciliatis patentibus apice complicato recurvo tubo corollæ brevioribus, imis connatis. ♂ In Brasiliâ (Pobl. Manso! in Mart. herb. bras. n. 1024 fruct.). Præcidenti quam proxima, diversa statû robustiore, foliis figurâ alienis magis elongatis utrinque acutis neque rugosis, indumento brevissimo. Folia ramealia 2-3 poll. longa. (v. s. in h. cæs. vindob., et Mart. et DC.)

17. L. GRATA (Schauer I. c. ined.), ramulis crerbris gracilibus strictis patentibus pubescentibus, foliis petiolatis ovatis acutiusculis basi rotundatis subcordatis crenatis quintuplinerviis nervo medio pinnato rugulosis supra dense velutinis suhtus tomento adpresso incanis et punctato-glandulosis, pedunculis axillaribus aggregatis flaccidis foliis brevioribus, capitulo tetraquetro-ovoideis, bracteis herbaceis ovatis acutis imbricatis basi connatis incano-subvillosis tubo corollæ brevioribus. ♂ In pascuis et sepibus prov. Bahiensis Brasilie (Mart.!). Species indumento dense velutino glandulis copiosissimis interstincto et bracteis omnibus per paria connatis ab affinibus eximie distincta. (v. s. in h. cl. Mart.)

18. L. GRACILIS (Schauer I. c. ined.), ramulis gracilibus tetragonis sulcatis pubescenti-tomentosis, foliis (parvis) ovatis ovalibus oblongisve obtusis acutisve basi rotundatâ in petiolum contractis crenatis penninerviis venoso-reticulatis rugosisque supra viridibus subtiliter velutinis subtus pallidis punctato-glandulosis et tenuissime tomentosis, pedunculis axillaribus pluribus flaccidis folio brevioribus, capitulo tetraquetro-ovoideis-oblongisve, bracteis membranaceis ovatis acutiusculis imbricatis villisque connexis basi connatis subtiliter glandulosus carinâ margineque villosis tubo corollæ brevioribus. ♂ In Brasiliâ prov.

Bah. et Pernamb. (Mart.!). Folia majora 6-8 lin. longa, subtus demum rufescens. Odor fere thymi. (v. s. in h. cl. Mart.!)

19. *L. GLANDULOSA* (Schauer l. c. ined.), ramosissima, ramulis tetragonis pubescenti-hirtellis, junioribus cum foliorum tergo bracteis corollaque pulvulento-glandulosis, foliis ovatis oblongis in petiolum productis obtusis vel acutiusculis crenatis penninerviis valde rugosis supra pubescentia molli conspersis subtus canescenti-tomentosis reti hirsutiuseculo, pedunculis geminis ternis folium excedentibus, capitulis tetraquetro-ovoideis, bracteis pallidis ovatis acuminatis imbricatis acumine complicato subrecurvis margine carinâque villosis tubum corollæ æquantibus. ♂ In Brasiliæ prov. Minarum vicinisque (Pohl! Ried.!). Folia rameal. semipollice vix longiora. *L. microphylla* similis, sed fol. figurâ et indumento, glandulis copiosis resinosis, bracteis et corollâ flavescente nec siccando nigrescente distincta. (v. s. in hh. ces. vindob. et petrop.)
20. *L. SCHOMBURGKIANA*, ramis strictis breviramulosis, ramulis sericeo-hirsutiusculis, foliis ovato-oblongis obtusis brevipetiolatis crenulatis penninerviis plicato-rugosis supra holoserico-tomentosis subtus tomento hirtello canescens, pedunculis geminis folio duplo brevioribus, capitulis tetraquetro-ovoideis exsertis, hracteis pallidis ovatis acuminatis imbricatis acumine brevi complicato patulis totis imprimis vero margine carinâque albo-villosis tubo corollæ duplo hrevioribus. ♂ In Guianâ Anglicâ (R. Schomb.!). *L. microphylla* Benth. in Hook. journ. 2 p. 52, non Cham. Proxima et similima præcedenti, sed distineta. Folia et cor. parva, 1½ lin. longa. (v. s. in h. r. ber. et DC.)
21. *L. RIGIDA* (Schauer l. c. ined.), ramosissima, rigidula, hirtella, foliis oppositis ternisque ovalibus subrotundis brevissime petiolatis obtusis vel acutiusculis crenatis rugosissimis penninerviis supra pilis depressis rigidis strigosis subtus incano-hirsutis, pedunculis ad apices ramulorum axillaribus pluribus aggregatis flaccidis, capitulis tetraquetro-ovoideis exsertis, bracteis pallidis lato-ovatis breviacuminatis imbricatis farinoso-glandulosis carinâ marginaque hirsutis tubum corollæ æquantibus. ♂ In silvis Caatingas prov. Bahiens. Brasiliæ (Mart.!). Folia parva. Affinis *L. glandulosa* et *microphylla*, ab utrâque habitu rigido, ramulis ad apices tantum floriferis, foliorum bractearumque figurâ et indumento distincta. (v. s. in h. cl. Mart.)
22. *L. MICROPHYLLA* (Cham.! l. c. p. 226, non Benth.), ramosissima, ramulis terretiusculis canescenti-pubescentibus, foliis oppositis ovatis ellipticis suborbicularibus obtusis in petiolum longisculum productis crenatis penninerviis rugosis supra dense strigoso-holosericeis demumque scabris subtus incano-tomentosis, pedunculis axillaribus aggregatis flaccidis, capitulis tetraquetro-subglobosis ovoideis folium subequantibus, bracteis viridulis lanceolatis acumine subulato reflexis patulis laxe imbricatis cano-villosis tubum corollæ æquantibus. ♂ In Brasiliæ prov. Minarum (Sell.! Ried.! Clauss.! coll. 1840 n. 385) et Bahiensi (Blanch.! n. 3649). Frutex 4-6-pedalis. Folia supra atroviridia, 3-9 lin. longa. Capitula bracteis longis acuminatis et corollâ siccando semper viridescere insignia. (v. s. in h. r. berol., e. petr., Mart. et DC.)
23. *L. POHLIANA* (Schauer l. c. ined.), ramosissima, ramis ramulisque vagis elongatis tetragonis subhirsutis, foliis patentibus reflexis brevipetiolatis orbicularibus basi cordatis crenatis penninerviis valde rugosis utrinque villosotomentosis subtus magis canescens, pedunculis axillaribus geminis-ternis, capitulis tetraquetro-ovoideis exsertis, bracteis membranaceis pallidis lato-ovatis acuminatis patentibus acumine complicato-recurvo glandulosis totisque vel margine carinâque saltem villosis tubum corollæ subequantibus. ♂ In Brasiliæ prov. Goyaz et S. Pauli (Pohl! Ried.!). Frutex 2-3-pedalis, ramis verticillatis apice ramulis floriferis paniculatis. Folia majora 9 lin. circ. longa ac lata. Cor. rubescens limbus majusculeus. (v. s. in h. DC., vindob. et petr.)
24. *L. NEPETACEA* (Schauer l. c. ined.), ramulis elongatis patentibus subfas-

tigiatis subtetragonis tomentellis, foliis oppositis ternis patentibus brevipetiolatis lato- vel subrotundo-ovatis basi rotundatis mucronatis crenatis penninervii rugosis supra holosericeo-tomentosis subtus canescentibus glaudulosis totis vel tantum in reti pubescenti-tomentosis, peduculis axillaribus subsenis flaccidis folio brevioribus, capitulis tetraquetro-ovoideis, bracteis membranaceis pallidis subrotundo-ovatis acumiuatis imbricatis acumine patente glandulosis margiue carinâque sericeo-villosis tubo cor. brevioribus. ♂ In prov. Minarum Brasiliæ ( Pohl ! Vauth. ! herb. bras. n. 410 ). Caulis superne ramulis iuflorescentiâ subnudâ terminatis subpaniculatus. Folia rameala subpollicaria , superius insequenta sensim minora, summa minima. Capitula straminea, pedunc. plerumque reflexis nutantia. Cor. lutea. ( v. s. in h. c. vindob. et DC. )

25. L. MARTIANA ( Schauer l. c. ined. ), caule superne paniculato obsoletc tetragono hirsutusculo, foliis ternis ovatis vel ovato-ellipticis basi cordatis brevipetiolatis breviacuminatis creuatis penninervii rugosis supra sebro-tomentosis hirtisque subtus villoso-tomentosis incanis, floralibus diminutis, pedunculis subquaternis folium æquantibus, verticillis ad apices ramulorum congestis, capitulus subgloboso-tetraquetrus, bracteis herbaceis ovatis acutis imbricatis sericeo-villosis et glandulosis tubo corollæ duplo brevioribus, imis connatis. ♂ In campis prov. Minarum Bras. ( Claussen ! h. fl. bras. n. 1028, Regnelli pl. bras. ser. 1 n. 333 ). Folia patentia vel reflexa, inf. 2 poll. longa. Tomentum totius plantæ holosericeo-splendens. ( v. s. in h. Mart. DC. et Sonder ).

26. L. SERICEA ( Cham. ! l. c. p. 228 ), tota incano-sericea, caulis virgatis strictis simplicibus vel superne fastigiato-ramulosis, foliis oppositis ternis-quaternis brevissime petiolatis ellipticis utrinque acutis crenatis serrulatisve apice basique integerrimis, capitulis axillaribus geminis ternis brevipedunculatis nutantibus tetraquetro-ovoideis vel subprismaticis , bracteis ovatis acuminatis apice complicatis imbricatis sericeo-villosis tubum corollæ subæquantibus. ♀ Frequens in campis Brasilie, imprimis prov. Minarum ( Sell. ! Pohl ! Mart. ! herb. fl. bras. n. 1046, Vauth. ! herb. bras. n. 413, Ried. ! ). Folia infima 1½ poll., sursum decrecentia. Capitula majuscula, denique semipollucaria. Bracteæ subtilissime glandulosæ. Cor. flava. ( v. s. in hh. vindob. et petr., r. ber., Mart. et DC. )

27. L. STACHYOIDES ( Cham. ! l. c. p. 227 ), tota lanato-tomentosa, caulis strictis simplicibus paniculæ racemiformi interruptâ terminatis , foliis oppositis ternis brevipetiolatis subsessilibusque oblongis ellipticis ovatis obtusis acutis apiculatis crenatis penninervii rugosis supra holosericeis subtus incanis, capitulis axillaribus pluribus dense aggregatis brevipedunculatis tetraquetro-subglobosis-prismaticis, bracteis herbaceis ovatis subulato-acuminatis apice incurvis imbricatis canescenti-hirsutis tubum corollæ subæquantibus. ♀ In Brasilie prov. S. Pauli et Minarum ( Sell. ! Pohl ! Ried. ! Lund ! ). Planta 2-4-pedalis. Fol. caulina media 1½-3 poll. longa. Capitula crassiuscula, denique 6-8 lin. longa. Cor. rubescens fave lutea. ( v. s. in h. r. ber., cæs. petr. et vindob. et DC. )

### Secio III. DIPTEROCALYX. — Dipterocalyx Cham. l. c. — Lippia Linn. l. c. et Gærtner. l. c.

Capitula parva, plurisarium imbricata ( sèpius squarrosa ), axillaria singula-pluria , foliis summis diminutis sèpius paniculam racemiformem verticillatam struentia. Calyx compressus, utrinque margine alâve carinali longe ciliatâ angustus, breviter bifidus. — Capsula calyce integro neque adbârente tecta vel partim velata, coccis haud vel ægrius secedentibus.

28. L. ADOENSIS ( Hochst. ! in Schimp. herb. abyss. sect. 2 n. 1079 ), caulis strictis subhexagonis pedunculisque pilis callosis strigoso-hispidis asperisque , foliis ternis oppositisque oblongo-lanceolatis basi attenuatâ integrerrimâ subsessilibus acuminatis a medio inde serratis supra lineatis subrugosis hispidi-

scaberrimis nitidisque subtus setosis glanduloso-punctatis et pallidioribus, summis floralibus diminutis, pedunculis axillaribus singulis geminis brevibus immo brevissimis rigidis, capitulis globosis multifariam squarrosis, bracteis rigidis ovatis acuminatis corollam subæquantibus, calyce lanâ longâ bifariam villoso.  $\mathcal{L}$  In Abyssiniâ, ad latera moutium versus vallem profundam Ferrera (Schimper!). L. grandifolia Hochst.! l. c. n. 734. Lantana Abyssinica Otto et Dietr.! gartenzeit. 9 p. 379 (fide spec. auth.). Lippia Schimperi Walp.! repert. 4 p. 53, nec Hochst. Habitu sequenti non dissimilis. Folia inf. 3-4 poll. longa, pollicem lata, margine revoluta, sursum insequentes sensim decrescentia ut summa pedunc. subtendentia minima evadant. Capitula cerasi silvestr. magn., hirsutis bractearum corollarumque canescutia. Calyx  $\frac{3}{4}$  lin. long., totus albo-villosus, villo disci appresso, laterum vero pectinate patente. Cor. extus hirtella, calycem duplo superans. (v. s. in h. reg. berol.)

29. L. HIRTA, caulinis strictis teretiusculis hirsute-pilosis denique asperis, foliis ternis oppositisque ovato-ellipticis basi integerrimâ obtusa subsessilibus acutis serratis lineato-rugosis supra nitidis calloso-hirtis denique scaberrimis subtus glaucescentibus reti hirsutiuscule denique glabrescente, floralibus minutis, pedunculis axillaribus singulis-geminis semipollicaribus, capitulis oblongis demumque subcylindricis sexfariam squarrosis, bracteis duriusculis latovatis concavis obtusiusculis nitidis dorso scabris margine spinulosis, calycis alis viloso-ciliatis, villo bracteas utrinsecus excedente.  $\mathcal{L}$  In Brasiliâ (Sell!). Dipteroalyx hirtus Cham.! in Linnaeâ 7 p. 241 et D. glabrescens Cham.! ibid. Folia erecto-patentia, infer. 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa. Calyx tubulosus, in disco puberulus. Cor. exserta, 2 lin. longa. (v. s. in h. r. berol.)

30. L. AMERICANA (Linn. sp. pl. p. 833), glabriuscula, foliis oppositis ovato-vel oblongo-lanceolatis basi integerrimâ in petiolum attenuatis acuminatis supra medium crenato-serratis supra scabris subtus pallidis reti parce strigoso axillis pubescutibus, pedunculis axillaribus geminis singulis petiolum subæquantibus, capitulis 8-fariam imbricatis pyramidato-subglobosis, bracteis cuneato-ovo-vatis abrupte cuspidatis recurvis corollam subæquantibus, calyce lanâ longâ bifariam villoso.  $\mathcal{L}$  In Americâ æquinoctiali, in Vera-Cruce (Linn.), prope Carthagena de Columbia (Billberg!), in regno Novo-Granatensti (Mutis ex Bonpl.), in sylvis prope Guayaquil (Hartw. n. 686). Lippia floribunda Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 267.—Gærtu. ! de fruct. I p. 266 tab. 56 fig. 2. L. Hypoides Benth. pl. Hartw. p. 122. Rami adulti belvoli teretiusculi glabri, ramuli tetragonii, strigis rarissime punctisque glandulosis consiti. Folia patentissima vel reflexa, membranacea, latae viridia, inferiora 3 poll. circ. longa, sesquipoll. lata, superiora sensim minorata. Capitula pisi minoris mole, manifesto angulata, multiflora. Bracteæ infimæ paulo maiores, omnes plurinerviae, villo calycis paulo angustiores. Calyx  $\frac{3}{4}$  lin. longus, acute bifidus, præter villum carinalem album pubescens, corollæ perexiguæ tubum adæquans. Cor. limbus externe birtellus. (v. s. in h. r. berol.)

31. L. HEMISPHERICA (Jacq.! stirp. am. hist. p. 176 t. 179 f. 100), ramulis hispidulo-pilosis, foliis oppositis ternisque oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis integerrimis vel supra medium crenato-serratis supra scabris subtus glabris pallidis nitidulis reti parce strigoso, pedunculis axillaribus geminis ternis singulis petiolum subæquantibus, capitulis subæqualiter imbricatis hemisphæricis deinde ovatis, bracteis cuneato-ovo-vatis apice late obtusissimo vel brevissime apiculato recurvo corollam subæquantibus, calyce bifariam brevi-villoso.  $\mathcal{L}$  In Americâ æquinoctiali, in sylvaticis regni Novo-Granatensti pr. Carthagena (Jacq.), in Peruviâ ad Guayaquil (Ruiz!). Simum illima præcedenti, tamen distincta facilis capitulis obtuse-bracteatis haud angulatis, calyce minore brevius villoso. Calyx semilineam longus, acute bifidus, villo bracteas non excedente. Cor. calyce duplo longior, extus puberula. Fructus obcordatus, fusco-ater, lævis, inferne calyce indutus. (v. s. in herb. r. berol.)

32. *L. MYRIOCEPHALA* (Schlecht. et Cham.! in Linnaea 5 p. 98), ramis patentibus tetragonis pedunculisque tomento strigoso incanis, foliis oppositis elliptico-lanceolatis lanceolatisque basi integrerrimâ in petiolum brevem attenuatis acuminatis supra medium obsolete serratis supra pinnato-lincatis scabris nitidis subtus pallidis pubescentibus, pedunculis axillaribus quaternis-senis, capitulis globosis, bracteis membranaceis nervosis lato-ovatis acuminatis reclinatis corollam excedentibus, calyce bifariam brevi-villoso. ♂ In Mexici sylvis montanis, prope Xalapam et Papantla (Schiедe pl. mex. n. 133!), prope Pantoyuca (Berland. pl. mex. n. 2159!), Cuerta de Pinoleo (C. Ehrenb.! n. 1202). Habitu prioribus non dissimilis, sed validior et capitulorum granum piperris mole subæquantium, indole valde insignis. Folia membranacea, supra atrovirentia, inf. 6-pollicaria, lat. bipollicaria superiora sensim minorata. Pedunc. subpollicares. Bractea pallida, dorso strigoso-pubescente. Cal. semilinca paullo longior. Cor. calycem fauce ampliatâ duplo superans, extus hirtella. (v. s. in herb. r. berol. et DC.)
33. *L. HIRSUTA* (Mutis in Linn. fil. suppl. p. 288), ramis tetragonis cum pedunculis capitulisque canescens-hirsutis, foliis oppositis oblongo-lanceolatis utriue acuminatis brevipetiolatis serratis reticulato-rugosis supra piloso-hirtis subtus in reti hirsutis subaneantibusque, paniculis axillaribus folium subæquantibus terminalibusque, capitulis hemisphæricis brevipedunculatis geminatiis terminibus glomeratis, bracteis membranaceis lato-ovatis brevissime acuminatis obtusis imbricatis florae paullo brevioribus, calyce bifariam lanato. ♂ In prov. Bogotensi Novo-Granatæ (Hartweg n. 1355), prope pagum Pacho prov. Bogotensis (Hartw. n. 1354).—Kunth! in H. et B., nov. gen. et sp. 2 p. 268. *L. pallescens* Benth.! pl. Hartw. n. 1355! *L. sphacelifolia* Benth.! pl. Hartw. p. 245, n. 1354. Folia 3-5 poll. longa, pollicem circ. lata, in petiolum vix semuncialem attenuata. Paniculae axillares singulæ vel geminæ inæquales longius pedunculatae, bracteis membranaceis ovatis parvis stipatae. Pedicelli semipollicares. Capitula pisi majoris mole. Calyx bifidus compressus, lineam æquans, lanâ carinali bracteæ margines longe excedente utrinque ciliatus, disco antico glabro. Corolla perekrixua, tubo calycem vix excedente. Capsula lœvis calyce brevior, coccis cohærentibus. (v. s. sp. in h. r. berol.)

**Sectio IV. ZAPANIA.** — *Zapania Juss.* — *Blairia Gærtn.* — *Bertolonia Raf.* — *Riedelia Cham.* — *Cryptocalyx Benth.*

Capitula plurifariam æqualiter imbricata, interdum involucrata, rhachi per antebasins succrescente demum magis elongata et sæpius relaxata. Bracteæ concavæ vel planiusculæ, calycem obtegentes, neque vero magnæ neque post anthesin auctæ. Calyx brevitubulosus membranaceus, nonnullis compressus carinatus, nec vero alatus.

**§ 1. Axillifloræ.—*Capitula axillaria, singula vel pluria, longius vel brevius pedunculata.***

\* *Coccis capsulæ maturæ cohærentibus.*

34. *L. CHAMISSONIS* (D. Dietr.! synops. plant. 3 p. 598), caule herbaceo erecto patent-ramoso quadrangulari hirsuto, foliis cordato-ovatis c. sinu in petiolum productis acuminatis serratis penninerviis venoso-rugosis supra strigosis demumque scabris subtus tomentosis canescensibusque, pedunculis axillaribus singulis geminatis folie brevioribus, capitulis subglobosis, bracteis herbaceis ovatis breviacuminatis strigoso-hirtis squarrosis tubo corollæ brevioribus sub fructu reflexis. (1) ♂? In nemorosis umbrosis humidis prov. Sebastianop., S. Pauli et Minarum Brasiliæ (Sell! Beyrich! Pohl! Mart! Ried! Lund! Regnell!). *Riedelia lippoides* Cham.! in linn. 7 p. 240. *Lantana Lockhardtii* D. Don (fide spec. ex hort. kew. in h. DC.). Folia subtriplicaria, petiolo semipollicari, paginâ inferâ glanduloso-punctatâ. Pedunculi in apice ramorum congesti, in-

ternodio succrescente deinceps remoti. Calyx strigoso-pubescent. Cor. alba fauce flavescente. Capsula calyce denudata, spbæroideo-lentiformis, atrofusca, nitidissima. (v. s. in h. r. berol., monac., cæs. petr. et DC.).

35. *L. PURPUREA* (Jacq.! fil. eclog. 1 p. 126 t. 85), frnticosa, strigoso-hirta, ramis virgatis tetragonis, foliis ovato-oblongis ovatis in petiolum angustatis acuminatis impresso-penninerviis undulatis grosse argute serratis utrinque strigosis subtus canescentibus, pedunculis axillaribus singulis filiformibus folium seqnabitibus vel excedentibus, capitulis hemisphæricis elongandis demumque ovoideo-cylindricis, bracteis imbricatis lato-ovatis acuminatis hirtis tubo corollæ paullo brevioribus, extimis involucrantibus foliaceis reclinatis. ♂ Crescit in siccis apricis Mexici ( Alaman ! C. Ehrenb. ! n. 613 ) et Venezuela pr. Caracas etc. (Vargas ! Moritz ! n. 294, E. Otto ! n. 839 ), tum etiam in Java forte ex Amer. allata (Jungh.! Zollinger ! pl. jav. exs. n. 1839). Lantana achyranthifolia Desf.! cat. hort. par. ed. 3 p. 392 (fide spec. auth.). Frutex 3-4-ped. erectus. Capitula multiflora, cerasi demumque glandis quernæ mole. Calyx sericeus, ciliatus. Cor. purpureo-lilacina fauce flavescente, capsula calyce velata, laevis. (v. v. c. et s. silv. in h. r. ber. et DC.)

36. *L. ARISTATA* (Schauer in fl. bras. ined.), caule suffruticoso erecto tetragono cum pedunculis strigilloso, foliis oppositis ternisque patentibus ovatis vel ovato-lanceolatis acutis acuminatis in petiolum productis argute serratis postice integerrimis margine subrevolutis supra impresso-lineatis strigoso-sebarrimis subtus nervosis pallidis strigoso-hirtellis, pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus, capitulis exinvolutatis globosis demumque cylindricis, bracteis lanceolatis aristato-acuminatis utrinque strigoso-hispidulis apice subpenicillato-hispidis patentibus deinceps reflexis. ♂ In Brasiliæ prov. Goyaz, Piauhy et Minarum (Pohl ! G. Gardn.! n. 3403). Præcedenti habitu generali quadammodo similis. Caulis internodia media elongata. Folia media 2½ poll. longa. Calyx minutissimus, glaber, tenuiter ciliatus. Cor. lilacina. Capsula obcordiformi-subglobosa, subopaca, helvola. (v. s. in h. r. vindob. et Mart.)

37. *L. ARGYROPHYLLO*, fruticosa, ramis obtuse tetragonis pedunculis strigosis, foliis oppositis ternis oblongis utrinque acuminatis petiolatis grosse acuminato-serratis lineatis undulatis supra strigoso-scabris subtus argenteo-sericeo-strigosis, pedunculis axillaribus singulis folio duplo brevioribus, capitulis globosis oblongandis confertissime multifarisis exinvolutatis, bracteis obovato-oblongis tenuiter acuminatis hirtis reclinato-imbricatis, corolla longe exserta. ♂ Patria ign. *L. purpurea* quadammodo similis. Folia 2-4-pollicaria, supra lète viridia, subtus inter pubem glandulosso-punctata. Pedunculi sursum incrassati, sulcati. Capitula cerasi deinceps glandis quernæ mole, acuminibus bractearum prominentibus conspicue multifaria. Bractea membranaceo-herbacæ, 5-nerviæ, basi pellucidæ, apice virides, calyce duplo longiores. Cal. lineam fere longus, truncatus, sericeus, ciliatus. Cor. alba fauce flavescente, superne pubescens, glandulosso-punctata, tubo e basi angustâ adscendente sensim in fauces ampliato, labio inf. porrecto. (v. v. c.)

\* \* *Coccis capsulae matura subsponte secedentibus.*

38. *L. ASPERRIMA* (Cham.! in Linnaeâ 7 p. 215), rhizomate repente, caule erecto subtetragono fastigiato glandulosso-hirtello, foliis oblongo-lanceolatis subsessilibus acutis grosse crenato-serratis impresso-penninerviis superâ paginâ subtus que in nervis venisque strigosis, pedunculis filiformibus folio brevioribus, capitulis subglobosis, bracteis ovatis acuminatis strigosis tubum corolla subæquantibus, extimis involucrantibus capitulum semiæquantibus. ♂ In Bras. prov. Minarum in pascuis humidis (Sell.! Ried.!). Caules bipedales. Folia 1-3-pollicaria, internodiis subæqualia. Cor. lutea. (v. s. in h. r. berol. et c. petrop.)

39. *L. TURNERIFOLIA* (Cham.! l. c. p. 217), rhizomate repente, caulis erectis

- simplicibus teretiuseculis hirsutis, foliis oppositis lanceolatis oblongis obovatisivo acutis crenato-serratis basi cuneatâ integerrimâ in petiolum brevem abeuntibus impresso-penninerviis supra strigosis, pedunculis filiformibus hirsutis, capitulis subglobosis, bracteis ovatis acuminatis imbricatis tubum corollæ aequantibus, extimus involucrantibus capitulum semiæquantibus.  $\mathcal{U}$  In collibus siccis graminosis prov. S. Pauli Brasiliæ (Sell.! Ried.!). Præcedenti simillima, hirsutie caulis canescens eglandulosâ et foliorum basi cuneatâ integerrimâ discernenda (v. s. in h. r. berol. et cæs. petrop.)
40. L. PSEUDO-THEA (Schauer l. c. ined.), fruticosa, erecta, innovationibus cum pedunculis capitulisque pilis glandulosis viscidis, ramulis teretiuseculis, foliis oppositis ternisve approximatis erecto-patulis rigidulis lanceolatis oblongisve acutis basi rotundata vel subcuneatâ integerrimâ sessilibus medio serrulis péninerviis venosisque supra impresso-rugosis nitidis asperulis strigisque patulosis setosis subtus tomento brevi canescensibus reti prominentie sparse stri-goso vel hirsuto, pedunculis axillaribus solitariis folium aequantibus vel exce-dentibus, capitulis hemisphaericis, bracteis lanceolatis acutis tubum corollæ aequantibus.  $\mathfrak{f}$  In montos saxosis prov. Minarum Brasiliæ (Sell.! St. Ilil.). Lan-tana Pseudo Thea St. Hil.! pl. us. des Brésil. t. 70. Caules vel rami apice floriferi. Folia 1-2-poll., iis Salicis repente quadammodo similia, juniora viscidula, adulta eglandulosa, basibus pilorum residu scabra. Calyx brevissimus, mox in squamulas minimas bipartitus. Cor. tubus 2 lin. longus. (v. s. in h. r. berol.)
41. L. RIEDELIANA (Schauer l. c. ined.), tota pube subviscidâ strigoso-hirtella, caulibus dodrantalibus, foliis oppositis confertiusculis ovatis basi rotundata sessilibus acutiusculis crenatis margine revolutis venoso-rugosis, pedunculis in axillis superioribus solitarii filiformibus exsertis, capitulis hemisphaericis, bracteis lato-ovatis brevissime acuminatis tubo corollæ breviribus dorso inter pubem pulverulento-glandulosis.  $\mathcal{U}$  In locis arenosis et glareosis, prov. S. Pauli Brasiliæ (Riedel!). Habitus quadammodo sequentis, a quâ vero capitulis flori-busque majoribus bracteisque latis facile distinguitur. Folia parva. Calyx lineam longus. Cor. purpurea, exserta. (v. s. in h. r. berol.)
42. L. PUMILA (Cham.! l.c. p. 218), viscido-pubescentis pilisque mollioribus villosulo-hirtella, rhizomate repente, caulibus spithameis herbaceis teretiuseculis simplicibus erectis, foliis oppositis ternisve ovatis ellipticisve sessilibus a medio crenato-serratis nervosis venosisque, pedunculis in axillis superioribus solitarii filiformibus erectis folio duplo longioribus, capitulis hemisphaericis, bracteis lanceolatis acutis tubum corollæ aequantibus.  $\mathcal{U}$  In Brasiliâ meridionali (Sell!). Folia infima parva, superiore perfecta 9 lin. circ. longa. Calyx brevissimus. Cor. 2 lin. longa. (v. s. in h. r. berol.)
43. L. NANA (Schauer l. c. ined.), caulibus digitalibus herbaceis cum pedunculis bracteisque viscidè pubescentibus, foliis oppositis remotis lanceolatis acutis basi cuneatâ integerrimâ sessilibus antice crenato-serratis triplinerviis nervo medio pinnato paginis glabriusculis rei strigoso-puberulo, pedunculis filiformibus internodis aequantibus longioribus, capitulis globosis, bracteis oblongis acutiusculis tubum corollæ aequantibus.  $\mathcal{U}$  In Sierra Urubu Bras. merid. (Pohl!). Folia super. fere biplicaria. Bracteas exter. subinvolverantes ovatae. Calyx brevissimus. Cor. 2 lin. longa. (v. s. in h. c. vindob.)
44. L. GEMINATA (Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 215), fruticosa, ramis elongatiis adscendentibus obsolete tetragonis hirtello-pubescentibus, foliis oppositis ternisve ovatis vel ovato-oblongis basi cuneatâ vel coarctatâ in petiolum brevem ab-euntibus acutis serratis triplinerviis nero medio pinnato rugosis supra strigoso-hirtellis subtus molliter tomentosis canescensibusque, pedunculis axillaribus solitariis rarius geminis petiolo vix longioribus, capitulis subglobosis deinceps subcylindricis, bracteis ovatis cuspidato-acuminatis incano-villosis ciliatis dense imbricatis tubo corollæ paulo brevirioribus.  $\mathfrak{f}$  Crescit in ripis inundatis Americae tropicae, in Bonariâ (Bacle!), per omnem fere Brasiliam a Porto-Allegre usque ad flumen Amazonum (Sell.! Mart.! Pohl! Ried!.), in omni

Guianâ (Perrott.! Schomb.! Weigelt! pl. surin. exs.), Venezuelâ (H. et B.), Peruviâ (Dombe!), Mexico pr. Tampico et Matamoros (Berland.! n. 2306), Cubâ (Poepig!), Portorico (Bertero!). Lippia geminata Kunth! l. c. herb. Willd. n. 11124! (Verbena lantanoides). L. citrata Cham! l. c., p. 214 herb. Willd. n. 11611! L. asperifolia Poepg.! pl. cub. exs. Lantana odorata Weigelt! pl. surin. exs. Lant. mollissima Desf.! hort. par. ed. 3 p. 393 (fide spec. ex hort paris.). Lant. lippoides Hook. et Arn. Beech. voy. bot. p. 305. Lant. geminata Spr. syst. 2 p. 763. Rami saepe decumbentes et radicantes. Folia 2-4 poll. longa, odore citreo pollentia. Capitula semipoll., deinceps pollicaria subcylindrica. Cor. violacea. (v. v. c. et s. silv. in h. r. berol., DC. aliorq.)

45. *L. ASPERIFOLIA* (Rich.! cat. hort. med. paris. p. 67), fruticosa, erecta, tota birta, subter pubes glanduloso-punctata, ramulis suhteretibus pedunculisque strigoso-hirtis asperisque, foliis oppositis ternis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis basi integrimâ in petiolum brevissimum attenuatis acutiusculis obtusis serratis impresso-nervosis rugosisque supra strigoso-scabris subtus praesertim in nervis pubescentibus hirtellis canescensibus pedunculis axillaribus singulis filiformibus patentibus folio brevioribus, capitulis confertissimis globosis deinceps cylindrico-ovoideis, bracteis arcte imbricatis rhombeo-subrotundis abrupte acuminatis apiculatis strigoso-birsutis canescensibus tubum corollæ æquantibus. ☯ Crescit in Americæ meridionalis campis siccis apricis, in Venezuela pr. Cumânâ et Bordonis (H. et B.), in Guianâ gallicâ (Leblond! in h. DC.), in prov. Minarum Brasiliæ (Mart.!), frequens in planitiebus civit. Platemium circa Cordovam (Gillies), in Africâ, in Capite Bonæ-Spei in fruticetis inter Keiskamma et Buffel-Rivier, alt. 1000-2000 ped. (Drège! Eckl! pl. cap. n. 10 et 11), ad silvarum margines circa Natalbay (Kauss pl. cap. n. 247), tum et in campis nudis insulae Zanguebar (Bojer!). Verbena globiflora L'Herit! stirp. nov. p. 23 t. 12 (fide spec. auth. h. DC.). Zapania globiflora Poir. enc. 8 p. 840. Zap. lantanoides Lam. illustr. n. 246. Zap. odoratissima Scop. delic. 1 t. 15. Zap. odorata Pers. syn. 2 p. 140. Lantana lavandulacea Willd.! sp. pl. 3 p. 319 ejusd. h. n. 11512! Jacq. hort. schoenbr. 3 p. 59 t. 361. Verbena Capensis Thunb. fl. cap. p. 447. Lippia Capensis Spreng.! syst. veg. 2 p. 751. Lippia scabra Hochst. in Flora 28 p. 68. Frutex graviter aromaticus, orgyalis. Folia inter nervos bullata ceterum rugosa, indumento nunc asperimo nunc submolli. Pedunculi in apice ramorum saepius quasi paniculati. Capitula magn. pisi. Flores perexigui, lineam longi. Cor. alba. Discriumen inter plantam Americanam et Africanam detegere nequeo, nisi quod in Africâ bracteæ magis sunt acuminatae, flores paulo maiores (v. v. c. et s. spônt. in h. r. ber., Mart. et DC.)

46. *L. DULCIS* (Trevir.! in act. acad. nat. cur. 13, 1 p. 187), undique pulverulento-glandulosa, caule fruticoso diffuso, ramis procumbentibus immo radicantibus teretiuluscum pedunculis strigoso-puberulis, foliis oppositis membranaceis deltoideo-ovatis ovatisque in petiolum breviter angustatis acutis serratis supra impresso-lineatis strigoso-scabris subtus strigoso-pubescentibus, pedunculis axillaribus singulis folio brevioribus, capitulis arcte imbricatis globosis cylindraceo-elongandis, bracteis membranaceis cuneato-ovoideis obtusissimis abrupte acuminatis strigoso-hirtellis ciliatis corollam æquantibus. ☯ In republ. Novo-Granatenis ad Porto-Bello (Billberg!) et in Mexico ad S. Francisco-Tetela (C. Ebrenb!). L. asperifolia Reichenb.! hort. bot. t. 169, non Rich. Planta odore et sapore omnium partium dulci insignis. Folia 1-1½-pollinaria. Capitula parva, demum ad subpollicarem longitudinem provehenda, tamen semper confertissima. Calyx corollâ duplo brevior, bifidus, villosus. Corolla lineam paulo superans, alba, limbo perexiguo, labiis erectis. (v. v. c. et s. silv. in h. r. berol.)

47. *L. BETULEFOLIA* (Kunth! in H. B. uov. gen. et sp. 2 p. 264), tota pilis incumbentibus bicuspidatis strigillosa eglandulosa, caule herbaceo procumbente, ramis adscendentibus basi radicantibus tetragonis, foliis rhombeo-ovatis bas

cuneatā in petiolum longum attenuatis acutis grosse acuminate-serrato-dentatis impresso-penninerviis rugosique, pedunculis axillaribus singulis geminis ternis-abbreviatis, capitulis confertissimis ovatis demumque oblongis, bracteis membranaceis ciliatis cuneatis ex apice dilatato abrupte cuspidatis cuspide corollam paulo excedente. ① In silvis Orinocensis pr. Atures et in ripâ Apurensi juxta S. Fernando (H. et B.! h. Willd. n. 11121!), in Guiana brit. (Schomb.! n. 694), in ins. Trinitatis et in Brasiliâ ad Pernambuco (Gardn. n. 1049 teste cl. Benth.), in locis humidis ad ripas fl. Amazonum pr. Pauxin vel Obidos (Riedl!). Cryptocalyx nepetaefolia Benth.! in ann. nat. hist. 2 p. 446 et in Hook. bot. journ. 2 p. 52. Herba nunc induento crebriori subcancscens, nunc vero rariori viridis. Folia 1½-3 pollicaria, petiolo laminam semiæquante. Capitula parva, floribus minimis numerosissimis multifariam imbricatis, cuspidibus bractearum exsertis. Calyx ½ lineæ longus. Cor. pallide rosea, semilineam longa. Quoad char. gener. nullo modo a Lippiis hujus sectionis differt. (v. s. in h. r. berol.)

48. **L. STECHADIFOLIA** (Kunth! in H. et B. nov. gen. am. 2 p. 265), undique strigis appressis canescens, ramis tetragonis strictis, foliis oppositis lanceolato-linacribus basi attenuatis acutis pinnato-plicatis mucronato-serratis subtus canis glanduloso-punctatis, pedunculis axillaribus singulis folium superantibus, capitulis arcte imbricatis globosis elongandis, bracteis cuneato-obovatis abrupte acuminate calycem æquantibus. ♂ In Cubâ (Humb., La Sagra!), Jamaiçâ (P. Br, Sw.!), Guadeloupe (Bertero!) et in Americâ mer. littorali, a Caracas (Vargas!) ad Guianam (Linn.). Verbena stechadifolia Linn. sp. p. 27. Zapania stechadifolia Pers. enh. 2 p. 140, Poir. dict. 8 p. 840. Zap. reclinata Lam. ill. n. 247. Verbena suffruticosa Aubl. guian. 1 p. 16? P. Br. jam. p. 116 t. 3 f. 3. Plum. am. ed. Burm. tab. 162 f. 1. Calyx lineam longus, bifidus, compressus, carinis oreque breviter ciliatis. Cor. minima, rosea vel albida. (v. s. in h. r. berol. et DC.)

49. **L. LANCEOLATA** (Rich. in Michx. fl. bor. am. 2 p. 15), tota strigis appressis biacuminatis scabra, caulibus filiformibus adscendentibus inferne radicantibus, foliis lanceolatis utrinque attenuatis acutis a medio inde argute serratis penninerviis basi triplinervi, pedunculis axillaribus solitariis filiformibus exsertis, capitulis ovoideis taudem cylindricis, bracteis arcte imbricatis tubo corollæ paulo brevioribus obovato-cuneatis abrupte acuminate marginè superiore membranaceo subciliato (colorato), calyce bifido lacinias divergentibus argute carinatis carinis puberulis. ♀ In Americâ septentr. in ripis fl. Ohio (Rafin.! Frank! un. itin. ann. 1837), in Georgiâ et Carolinâ (Michx. Tuckerm.), ad fl. Missouri pr. S. Louis (Engelm.! Riehl! n. 104), in Kentucky (Short! Peter!); in Mexici dit. Queretarensi (H. et B.). L. Queretarenensis Kunth! in H. et B. 2 p. 264. Zapania lanceolata Beck bot. p. 284, Pers. enh. 140. Bertolonia scabra Raf. l. c. L. nodiflora sane proxima, sed foliorum figurâ et nervatione nec non calyce distincta. Variat magis viridis et magis canescens, foliis latior. et angustioribus. Cor. alba. (v. s. in h. DC. et r. berol.)

50. **L. REPTANS** (Kunth! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 263), tota strigis appressis biacuminatis scabra et canescens, caule suffruticoso humifuso sæpius radicante, foliis obovato-cuneatis postice integerrimis et in petiolum attenuatis antice argute serratis penninerviis et plicato-lineatis, pedunculis axillaribus solitariis filiformibus exsertis, capitulis ovoideis tandem subcylindricis, bracteis arcte imbricatis herbaceis obovato-cuneatis breviter acuminate marginè membranaceis ciliatisque tubum corollæ æquantibus, calyce bidentato bicarinato carinis villosulis. ♀ Crescit per omnem Americanam calidam locis humidis, in Mexico pr. Veram Crucem, Tampico et Matamoros alibiique (Berland.! n. 64, C. Ehrenb.! Schiede! n. 132, Galeotti), Peruviâ (H. et B., Gaudich! Meyen!), Chili (Meyen! Philippi!), Brasiliâ (Sell.! Riedl!), Venezuelâ (H. et B.), Guadeloupe (h. DC.), Dominicâ (C. Ehrenb.! n. 148). L. strigulosa Mart. et Gal. in bull. acad. brux. 11 p. 319. Proxima sequenti, sed major

et præter alia jam foliis penninervi-plicatis distinctissima. Flores recentes albi, dein rubescentes. (v. v. c. et s. silv. in h. r. berol. et DC.)

51. *L. CANESCENS* (Kunth! l. c. p. 263), tota pilis incumbentibus biacuminatis strigillosa, subviridis vel canescens, caule suffruticoso radicante, foliis spatulato-bovatis-oblongis-lanceolatis acutis postice integerrimis et in petiolum attenuatis antice argute serrato-dentatis subeveniis planis, pedunculis axillaribus solitariis filiformibus exsertis, capitulis ovoideis demumque subcylindricis, bracteis arte imbricatis herbaceis obovato-cuneatis acuminatis, margine anguste membranaceis villosisque tubo corollæ brevioribus, calyce bidentato bicarinato carinis villosul. 5 In Americâ australi locis siccis graminosis, in Peruviâ (H. et B.), Chili (Bert! J. Style! Bacle! Pœppig! pl. chil. 1 n. 160, Meyen!), Bonariâ (Bacle!), Montevideo (Ars. Isabelle!) et Bras. merid. (Sell!). *L. nodiflora* Cham.! in Linn. 7 p. 213 (excl. syn. pler.). *L. filiformis* Schrad.! ind. sem. hort. Gotting. ann. 1834 (fide spec. auth.). *L. uncinuligera* N. ab E.! in nov. act. acad. nat. cur. 16 suppl. 2 p. 377. *Zapania nodiflora* var. *rosea* D. Don brit. fl. gard. ser. 2t. 225. *Habitu* *L. nodifloræ* *L. reptanti* utique persimilis, tamen distinctissima caule, foliis, calyce et corollâ. Caulis suffrut. nunc filiformis radicans, nunc internodiis abbreviatis torulosus et subcaespitosus. Folia parva, apice dentibus truncato-incisis extrorsis, ceterum magis minusve prominentibus, serrata, dente terminali lato acuta. Bracteæ margine juxta acumen perangusto et villosa. Calyx brevissime bifidus, carinis herbaceis pilis brevibus uncinulatis villosus. Corolla quam in affinibus conspicue major, rosea, fauce luteâ. (v. s. in h. r. berol. et DC.)

52. *L. NODIFLORA* (Rich.! in Michx. flor. bor. am. 2 p. 15), tota pilis adpressis biacuminatis strigillosa, caulibus herbaceis filiformibus ramosis procumbentibus radicantibus adscendentibusque, foliis cuneato-spatulatis postice integerrimis antice rotundatis obtusis aut subacutis et æquilateri argute serratis obsolete venosis planis, pedunculis axillaribus solitariis filiformibus exsertis, capitulis ovoideis demumque cylindricis, bracteis arte imbricatis tubum corollæ subæquantibus obovato vel subrhombico-cuneatis mucronato-acuminatis muticisve margine superiore latiusculæ membranaceo glabro aut tenuissime ciliato, calyce bipartito leviter bicarinato carinis puberulis. ① Crescit in ripis et littoribus arenosis fere totius orbis in zonâ torridâ, calidâ et partim etiam temperatâ. Verbenona nodiflora Linn. sp. plant. p. 28. V. capitata Forsk. descr. p. 10. Blairia nodiflora Gærtn.! de fruct. 1 p. 266 t. 56. Zapania nodiflora Lam. ill. p. 248 t. 17 f. 3. R. Br. prodr. 1 p. 514. Caules longe lateque repentes, nunc omnino humifusi, nunc ramis adscendentí-erectis. Folia pinguicula, antice dentibus nunc acuminatis nunc peracutis serrata. Calyx hyalino-membranaceus, tubum cor. æquans, antice fere usque ad basin dorso vero ad medium tenus fissus, lacinias lanceolatis. Corolla totali lineâ paulo longior, limbo exiguo subtus parce strigillo. Capsula ovoidea, ½ lin. longa, calyce leviter adhærente subvelata ejusque lacinias perangustis conniventibusque paulo superata. Variat viridis et subcanescens, staturâ totius plantæ et magn. partium, foliis angust. et laticribus, grossius et argutus serratis, capitulis nunc brevius nunc longius pedunculatis. Formæ et modificationes certis limitibus circumscribi omnino nequeunt; attamen haec forte statuendæ :

*α. sarmentosa*, bracteis acumine herbaceo mucronatis. Crescit in Novâ Holl. tropicâ (R. Br.), Javâ ins. (Bl! Jungh! Zolling! pl. jav. exs. n. 1840), in ins. Nicobaricis (Ad. Deless!), Indiâ orient. (Wall! Edgew!), Ceylonâ ins. (Royen), in Syriâ (Aucher-Eloy! Bové), Iberiâ Caucas. in uliginosis ad lacum Murdof pr. Lankoran (Hohenack! un. itin. ann. 1836), in Arabiâ Felici ad rivulos (W. Schimp! un. itin. n. 834), in Ægypto (Wiest! un. itin. n. 586, Redouté! Auch.-El! Coqueb!), Abyssinâ pr. Aguar (W. Schimp! un. it. ser. 2, ann. 1842), in Senegambiâ (h. berol!), et in cap. B. Spei (Drège! Forbes!), in Americâ, Montevideo (Sell!), Peruviâ (Ruiz! Phil!), Columbiâ (Billb!), Mexico (Berland.! n. 316),

Ind. occid., Portorico (Wydl. n. 236), Cuba (R. de la Sagra!), Guadeloupe (Bertero!), Dominicâ (C. Ehrenb.!) et in civitt. austr. Amer. septentr., Louisianâ (Taint.!), Carolinâ austr. (Fras.! Beyrich!). L. sarmientosa Spr.! syst. veg. 2 p. 752. Verbena capitata Blanco fl. de filip. p. 19, Burm. fl. ind. t. 6 f. 1. Anacoluppa Rheedee! hort. mal. 10 p. 93.

*β. repens*, bracteis obtusissimis haud vel obsolete mucronatis, margine membranaceo tenniter eroso. Crescit in paludosis Europæ australis, in Italâ: ad littus Lunense (Bert.!), in palud. juxta Sebeti agri Neapolit. (Heldreich! Splitterg. Thomas! Ten.!), in marit. Siciliæ pr. Cataniam (Jan.! Philipp!), in Hispaniâ austr. (Lag.!), in Cretâ ins. (Sieber!), in littore Thraciæ ad portum propè Ineada (Griseb.). L. repens Spr.! l. c. Zapania repens Bertol.! rar. ital. pl. decad. 3 p. 27, amoen. p. 73. Verbena repens Savi! Tenore! Verb. nodiflora C. Bauh. prodr. p. 125 ic., Moris. oxon. 4 t. 35 f. 8, Sibth. fl. græc. t. 553. Stirps a L. nodiflorâ profecto non tanquam species, imo vix tanquam varietas distingueda; convenit enim cum plantis aliarum regionum cuvetis singulique notis præter bracteas mucrone saepè, minime tamen constanter, carentes. Quod autem ad staturam et foliorum figuram non minus variabilis existit. (v. v. c. et s. silv. in h. r. berol. et DC.)

53. *L. LINEARIS* (Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 226), caule suffruticoso erecto, ramis tetragonis glabris glaucescentibus, foliis oppositis angustissime linearibus postice angustatis sessilibus basi connatis acutis integerrimis crassiusculis utrinque adpresso-strigosis glaucescentibus uninerviis, pedunculis axillaribus solitariis sulcatis folio duplo brevioribus, capitulis ovatis, bracteis ovato-oblongis acutis dorso pilosis flore brevioribus, calyce compresso bifido laciniis acutis dorso pilosis. ♂ In arenosis Venezuelæ pr. Cumana (H. et B.). Suffrutex subsemipedalis, ramosus. Folia subpollicaria,  $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata. Capitula magn. pisi minoris. Flores minuti, densi. Cor. alba, tubo superne ampliato (Kth.)

54. *L. FILIFOLIA* (Mart. et Schauer in fl. bras. ined.). caule fruticoso gracilimo tetragono sulcato superne paucirameo cum foliis pedunculisque glabro vel glanduloso-aspero, foliis approximatis ternis subtetragono-filiformibus inclinatis obtusis basi attenuatâ sessilibus lateribus planis punctatis facie sulco exarata dorsoque linearibus angustissimis angulis muricibus raris scabris, pedunculis in axillis superioribus singulis filiformibus striatis folio pluries longioribus, capitulis hemisphæricis, bracteis imbricatis subherbaceis ovato subtundis obtuse subacuminatis utrinque glanduloso-pubescentibus tubo corollæ dimidio brevioribus, externis majoribus involucrantibus. ♂ In campis desertis prov. Minarum in Brasiliâ (Mart.! Ried.!). Frut. 3-4-pedalis, aromaticus. Folia  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{2}$  lin. lata, lâete viridia. Capitula  $\frac{1}{4}$  poll. lata. Cor. lutea vel aurantiaca. (v. s. in h. Mart. et cæs. petr.)

55. *L. SATURELÆFOLIA* (Mart. et Schauer l. c. ined.), fruticosa, undique pulvcre glanduloso lâete ferrugineo dense obducta, ramulis lateralibus depauperatis foliis parvis oppositis confertis lancolatis complicatis integerrimis basi attenuatis obtusis uninerviis, capitulis in axillis supremis solitariis subglobosis brevissime pedunculatis, bracteis concavis imbricatis obovato-ellipticis obtusis margine villosis tubo corollæ brevioribus. ♂ In campis siccis editis, Serro Frio dictis, prov. Minarum Brasiliæ (Mart.!). Species omni ratione perinsignis. (v. s. in h. cl. de Mart.)

56. *L. THYMOIDES* (Mart. et Schauer l. c. ined.), fruticosa, ramis virgatis hirtello-scabris ramulis axillaribus depauperatis consitis, foliis parvis oppositis oblongo-cuneatis acutiusculis obtusis integrerrimis revolutis uninerviis supra scabris subtus glanduloso-pulverulentis subcandicantibus, ramnorum sterilium fasciculato-confertis, capitulis in axillis superioribus solitariis brevissime pedunculatis subglobosis ovalibus compactis, bracteis subherbaceis imbricatis ovato-lanceolatis acutis trinerviis dorso pulverulento-glandulosis ciliatis tubum corollæ æquantibus. ♂ In campis et sylvis Catingas prov. Bahiensis Brasiliæ (Mart.!).

Frut. 3-4-ped. Folia 2-3 lin. longa. Calyx villosus. Cor. rosea. (v. s. in h. cl. de Mart.)

57. L. *MICROMERA*, fruticosa, undique subter pube glanduloso-punctata, ramis tetragonis virgatis villosulis, ramulis axillaribus fasciculato-foliosis consitis, foliis parvis oppositis obovato-ellipticis in petiolum angustatis acutiusculis margine revolutis antice crenatis integerrimis lineato-rugosis supra strigoso-pubescentibus subtus villoso-aut hirtello-pubescentibus et subcanescensibus, capitulis ad apices ramulorum paucis axillaribus singulis brevissime pedunculatis folium subæquantibus hemisphaericis, bracteis laxe imbricatis membranaceis ellipticis obtusis pubescentibus ciliatis tubo corolla brevioribus. ♂ In Venezuela ad fl. S. Rafaëlis juxta Angosturam ( Moritz ! n. 492 ), in ins. Trinitatis ( Sieber ! fl. trin. n. 86 ), Cubâ ( dc la Ossa ! ), Portorico ( Bertero ! ). Frut. foliosus, odore thymi. Folia 3-6 lin. longa, 1½-3 lin. circ. lata. Capitula magn. drupe pruni spinosæ. Bractæ 3-5-nerves, pellucidæ, exteriores paulo majores. Calyx lineam adæquans, bifidus, longe villosus, villis laterallibus sœpe compressis ut calyx Dipterocalycis specie fere induatur. Cor. alba, fauce flavescente, tubo glabriusculo punctato calyce duplo longiore. (v. s. in h. r. berol. et DC.)

58. L. *BICOLOR* ( Mart. et Schauer l. c. ined. ), suffruticosa, caule squarroso-ramoso, ramulis subtetragonis hirtis, foliis oppositis ternis ovatis subrotundis subreniformibusque sessilibus acutis crenatis impresso-penninerviis rugosisque supra margineque revoluto strigoso-hispidulis subtus hirto-tomentosis, capitulis axillaribus solitariis paucifloris subsessilibus exsertis paucis ad apices ramulorum congestis, bracteis herbaceis ovatis subacuminatis hispidulis laxe imbricatis tubo corollæ subdimidio brevioribus. ♂ In campis prov. Bahiensis Brasiliæ ( Mart. ! ). Frut. 2-3-pedalis. Folia 2-4 lin. longa, 1½-3 lin. lata. Cor. rosea fauce flavâ, limbo majuscule. (v. s. in h. cl. de Mart.)

59. L. *MICROCEPHALA* ( Chbam. ! in Linn. 7 p. 220 ), fruticosa, erecta, ramosissima, undique scabrido-hirta et subter pube glanduloso-punctata. ramis subtetragonis patentibus, foliis ellipticis obovato-basí cuneatâ in petiolum brevissimum attenuatis, superne acute dentatis margine reflexis impresso-penninerviis rugosisque supra scabridis nitidis subtus canescentibus reti strigoso-birtello, capitulis brevipedunculatis paucifloris laxis subcernuis folium vix æquantibus, bracteis membranaceis lanceolatis obtusiusculis 5-nervibus strigilosis reflexis laxe imbricatis, exterioribus involucrantibus, calyce campanulato tubum corollæ subsemianquante. ♂ Vulgaris in campis siccis saxosis prov. Minarum, S. Pauli et Rio de Janeiro ( Mart. ! Pohl ! Sell. ! Mart. ! b. fl. bras. n. 1038, forma magis hirsuta, Clauss. ! coll. ann. 1840 n. 381 et 381 b, Vauth. ! h. bras. n. 194, Ried. ! Lund ! ). L. triplinervis G. Gardn. in Hook. Lond. journ. of bot. 1845 p. 133 ? Frutex 4-6-ped., Hyssopus fere redolens, ramulis strictis fusciis. Folia subsemipollicaria, dente lato acuto terminali, primum subtus incana denique vero ferruginea. Capitula laxa, inter folia fere recondita, 3-5-flora, bracteis 3 lin. longis patulis obvallata. Cor. majuscula, albida, lutescens aut rubescens, fauce luteâ. Sequenti quam maxime similis, diversa potissimum calycc grandi, tum etiam foliis acute dentatis, indumento parciore rigidiore, bractearum figurâ. (v. s. in h. r. ber., cæs. vindob. et petr., Mart. et DC.)

60. L. *HERMANNIOIDES* ( Cham. ! l. c. p. 219 ), fruticosa, erecta, ramosissima, glanduloso-subhirsuta et subter pube glanduloso-punctata, ramis subtetragonis patentibus, foliis approximatis cuneato-bovatis-subrotundidisque brevipetiolatis truncatis retusivis superne crenatis margine revolutis impresso-penninerviis-rugosisque subtus canescentibus hirtellis, capitulis subspicatis pedunculatis paucifloris laxis subcernuis breviter exsertis, bracteis membranaceis ellipticis acutis 5-nervibus reflexis birsutinsculis laxe imbricatis tubum corollæ subæquantibus, calyce brevissimo. ♂ In campis prov. Minarum Brasiliæ ( Sell. ! Ried. ! ). Præcedenti valde proxima, quam conferas. Folia semipollicaria-polli-

caria. Spicæ sub-5-floræ, oblongæ. Bractæ reticulatæ. Calyx lineam circiter longus. Cor. alba, fauce luteâ. (v. s. in h. r. berol. et cæs. petrop.)

61. L. *IODOPHYLLA* (Schauer l. c. ined.), fruticosa, fastigiato-ramosa, ramulis pedunculisque strigoso-hirtis, foliis oppositis confertis patulis cuneato-oblongis acutiusculis antice crenato-serrulatis basi integrim attenuatâ sessilibus, triplinerviis nervo medio superne pinnato utrinque densissime glandulosopunctatis supra impresso-rugosis pubeque strigosâ conspersis subtus pallidis demumque subferruginea recti prominentie strigoso-pubescente, pedunculis axillaribus solitariis strictis folium æquantibus, capitulis hemisphericis subpancifloris, bracteis subuembranaceis ovatis et obovato-oblongis obtusiusculis inflexis strigoso-pubescentibus laxe imbricatis tubo corollæ fere duplo brevioribus. ♂ In Brasiliæ prov. Minarum (Sellow!). Folia 8-9 lin. longa, 3-4 lin. lata. Pedunculi superne paulo incrassati. Capitula sub-12-flora. Calyx tubulosus, arctus, tubum cor. fere semiequans. Cor. tubus 2½ lin. longus. L. *microcephala* quodammodo similis, sed preter alia jam foliorum figurâ et serraturâ minutâ distinctissima. (v. s. in h. r. berol.)
62. L. *FERRUGINEA* (Kunth! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 265), undique pulvere resinoso-glanduloso ferruginea, foliis oppositis obovatis basi cuneatâ integrim in petiolum brevissimum attenuatis obtusis margine reflexis antice crenulatis lineato-rugosis supra subtusque in reti scabris, capitulis axillaribus brevipedunculatis paucifloris folio brevioribus reflexis, bracteis arte imbricatis subrotundo-ovatis acutiusculis calyce duplo brevioribus. ♂ In Peruviâ, pr. Guancabamba alt. 1030 hex. (H. et B. ! h. Willd. n. 11510!). Rami gracie, tetragoni, sulcati, juniores scabriuscculo-puberuli. Folia parva, 6-9 lin. longa, basi triplinervia. Capitula subsexflora, floribus longe exsertis, pedunculo superne paulo incrassato. Calyx tubulosus, compressus, lineam longus, cum corollâ quam ipso duplo longiore puberulus et pulverulentoferrugineus. (v. s. in h. Willd.)
63. L. *ALNIFOLIA* (Schauer l. c. ined.), fruticosa, undique pulvereo-glandulosa, ramis teretiusculis strigoso-pubescentibus scabrisque, foliis oppositis ovato-vel subrotundo-ellipticis in petiolum coartatis obtusissimis grosse crenatis penninerviis venosis rugulosisque supra vernicosis strigisque sparsis scabris subtus villosiusculis superioribus sensim decrescentibus, pedunculis subpollicaribus axillaribus gemini-quaternis, capitulis subgloboso-ovoideis, bracteis membranaceis lato-ovatis breviacuminatis concavis plurinerviis pubescentibus ciliatis laxe imbricatis tubo quo corollæ brevioribus. ♂ In campis graminosis Brasiliæ, in prov. Minarum et Bahiensi (Mart.). Species foliis amplitudine et figurâ foliis Alni glutinosæ subsimilibus insignis, trita odore fortè subcamphorato-aromaticum spargens. (v. s. in h. cl. de Mart. !)
- § 2. *Paniculatæ. — Capitula densa, subglobosa, pedunculata, in inflorescentiam nudam terminalem vel simplicem racemoso-paniculatam vel compositam cymoso-paniculatam disposita.*
64. L. *ANGUSTIFOLIA* (Cham.! in Linn. 7 p. 377), caule suffruticoso gracili stricto virgato angulato superne strigilloso apice racemoso, foliis lanceolatis sessilibus acutis citra apicem dentibus paucis acutis patentibus serratis margine cartilagineis et subrevolutis supra lineatis utrinque setis brevibus basi saepè callosis tenuiter strigillosis, superioribus remotis sensimque diminutis, pedunculis solitariis folio florali longioribus, capitulis parvis globosis, bracteis ovatis cuspidato-acuminatis dorso strigoso-canescensibus arte imbricatis corolla brevioribus. ♂ In humidis et paludosis Brasiliæ merid., in prov. S. Pauli (Sell.! Ried.! Lund!). Caules 3-5-ped., basi lignescentes. Folia 2-4 poll. longa, 4-5 lin. lata, nervo medio valido, lateralibus tenuibus subobsoletis. Calyx minimus, villosus. Cor. infundibuliformis, lutescens. (v. s. in h. r. berol., cæs. petrop. et DC.)
65. L. *HIERACIIFOLIA* (Cham.! l. c. p. 375), caule suffruticoso gracili teretiusculo

inferne folioso hirsuto superne scapiformi subnudo apice racemoso strigoso-carnescente, foliis obovato-oblongis lanceolatis v. acutis sessilibus postice integerimis antice crenato-serratis utrinque strigoso-hirsutiusculis, floralibus depauperatis, pedunculis axillaribus solitariis folio florali longioribus, capitulis globosis paucis racemosis vel ad apicem congestis, bracteis ovatis acuminatis dorso strigoso-canescensibus arcte imbricatis corollam æquantibus. ♂ In Brasiliâ (Sellow). Caules 1½-3-pedales. Folia 1-5 poll. longa, ½-2 poll. lata, penninervia. Calyx villo denso patente lanatus, corollam semiæquans. Cor. minima. (v. s. in h. r. berol.)

66. L. INTERMEDIA (Cham. ! l. c. p. 378), caule suffruticoso teretiusculo eretto simplici virgato iuferne hirsuto apice racemoso et cum foliis superioribus pedunculis bracteisque glanduloso-pubescentibus et strigoso-hirto, foliis infimis ovatis, mediis oblongis, superis elongato-lanceolatis, omnibus sessilibus acutis antice obsolete serratis margine revolutis utrinque hirsutiusculis subtilis simul pubescentibus supra linearibus et scarbris, pedunculis solitariis folio florali longioribus, capitulis ovoideis, bracteis ovatis seminerviis acumine tenui recurvo laxe imbricatis corollam excedentibus. ♂ In Brasiliâ (Sellow!). Caules sesquipedales, undique foliosi. Folia inferiora majora; nervi subtus prominentes. Calyx villosum, ampliusculus. Cor. perexigua. (v. s. in h. r. berol.)

67. L. VERNONIOIDES (Cham. ! l. c. p. 232), suffruticosa, caule eretto tetragono cum petiolis hirsuto, foliis oppositis ternisque ovatis ellipticis oblongis que in petiolum brevem attenuatis acutis præter basin integerimam crenato-serratis penninerviis rugosis rigidis supra setis brevibus callosis strigoso-hispidis vel strigoso-hirsutis subtilis pallidioribus subtomentosis reti hirto, paniculâ terminali cymosâ ramis oppositis subdichotomis, capitulis squarrosis strobiliformibus globosis et ovoideis, alaribus sessilibus, bracteis squamiformibus obovatis antice subrhomboe-rotondati mucronatis dorsaque incano-holosericeis postice cuneato-unguiculatis glabris et arte imbricatis tubum corollæ æquantibus. ♂ In campis graminosis siccis et humidis Brasiliæ, in prov. S. Pauli (Ried! Lund! Sell!) et Matto-Grosso (Ried! Manso in Mart. h. bras. n. 224!). L. attenuata Mart. ! in Flora 21 v. 2 beißl. p. 59. Aloisia attenuata Walp. repert. 4 p. 42. Caules 1-2-pedales. Folia magn. et figurâ varia, 3-4 poll. longa, 1½ poll. lata. Panicula nunc laxa pyramidata, nunc contracta fastigiata. Calyx breviss., villosus, fructui adhaerens. Cor. sesquilinearis, alba fauce lutea. (v. s. in h. r. berol., cæs. petrop., Mart. et DC.)

68. L. OXYCNEMIS (Schauer l.c. ined.), suffruticosa, caule eretto tetragono cum petiolis hirsuto, foliis oppositis ternisque ellipticis oblongis in petiolum brevem attenuatis acutis præter basin integerimam crenato-serratis penninerviis rugosis rigidis supra pilis callosis strigoso-hirtis hirsutis subtilis pallidioribus tomentosis reti hirto aut villoso-hirsuto, paniculâ terminali cymosâ ramis oppositis verticillatis simplicibus dichotomis, capitulis squarrosis strobiliformibus globosis et ovoideis, alaribus sessilibus, bracteis squamæformibus e basi ovatâ in acumen cuspidatum attenuatis dorso sericeo-vel pubescenti-strigosis arte imbricatis tubum corollæ æquantibus. ♂ In campis editis prov. Minarum et Bahiensis Brasiliæ (Mart.! Pohl!). Præcedenti proxima, bractearum figurâ potissimum diversa. (v. s.)

69. L. HERBACEA (Mart. ! l. c. ined.), caulibus herbaceis erectis obtuse tetragonis hirtis hirsutis superne paniculatis, foliis oppositis sessilibus ovato-lanceolatis acutis crenato-serratis penninerviis valde rugosis supra setis brevibus callosis strigoso-hispidis subtilis strigoso-hirtis, paniculâ ampliâ centripetâ nudâ, ramis pedunculisque oppositis patentibus tetragono-filiformibus glandulosohirtellis, capitulis parvis tetraquetro-ovoideis, bracteis herbaceis ovatis utrinque acutis strigoso-hirtis imbricatis tubum corollæ æquantibus. ♂ In campis prov. Minarum Brasiliæ locis humidis (Mart.! Pohl!). Caules humane altitudinis. Folia plerumque deflexa, media 2-2½ poll. longa approximata, insequen-

tia sensim minora et magis remota. Panicula patens subpyramidata vel fastigata. Cal. brevissimus hirtus. Cor. minima. (v. s. in h. cæs. vindob. et Mart.)

**§ 3. *Corymbosæ*. — *Capitula adulta subspicata vel racemosa, laxa, corymboso-paniculata*.**

70. L. **CORYMBOSA** (Cham.!! l. c. p. 219), suffruticosa, corymboso-ramosa, dense foliosa, undique hirta, foliis ternis brevissime petiolatis ovatis acutis crenatis bullato-rugosis marginibus revolutis, capitulis ovoideis brevipedunculatis in axillâ solitariis folia æquantibus superantibus ad apices ramulorum congestis, bracteis membranaceis lanceolatis triuervibus laxe imbricatis tubum corollæ subæquantibus. ♂ In campis moutanis prov. Minarum Brasiliae (Sell.! Clausen! h. fl. bras. n. 1035, Ried.! Lund!). Fruticulus humilis. Folia rigidula, supra nitidula et strigoso-hirtella, subtus pubescentia et saepè glandulosa venis hirsutis. Capitula denique spiciformia, subcanescientia. Bractæ subcoloratae. Calyx brevissimus, cano-hirsutus. Cor. 4 lin. longa, rubescens. (v. s. in h. r. berol., Mart. et DC.)
71. L. **ROTUNDIFOLIA** (Cham.!! l. c. p. 230), fruticosa, caule superne ramulis floriferis fastigiatis corymboso-paniculato, foliis duris patulis oppositis subverticillatis v. ternis-quaternis subtrotundis basi in petiolum brevem productus obtusis vel brevissime acuminate serrato-crenatis concaviceulis supra lucidis scaberrimis subtus uervoso venoso-reticulatis scrobiculatisque tomento velutino canescensibus, capitulis subspicatis brevipedunculatis in axillâ solitariis geminisve exsertis multifloris ad apices ramulorum congestis, bracteis membranaceis coloratis lanceolatis longe acuminate 5-nerviis velutinis laxe imbricatis tubum corollæ æquantibus. ♂ Vulgaris in campis editis, deserti prov. Minarum Brasiliae (Sell.! Pohl! Mart.!! h. fl. bras. n. 1036, Clausen! coll. ann. 1840 n. 260, Ried.! Vauth.! h. bras. n. 200). Frutex 3-4-pedalis. Spicas primum subcapitatae semipollulares, denique pollice longiores et laxissimæ. Calyx brevissimus, hirsutissimus, bifidus. Cor. lilacina. (v. s. in h. r. berol., cæs. vindob. et petrop., Mart. et DC.)
72. L. **LACUNOSA** (Mart. et Schauer l. c. ined.), fruticosa, caule superne ramulis floriferis fastigiatis corymboso-paniculato, foliis rigidulis patentibus oppositis ternisve ovatis subsessilibus basi cordatis acutiusculis obtusis v. crenatis supra lucidis scaberrimis subtus nervosis venoso-reticulatis scrobiculatisque tomento tenuissimo canescensibus, capitulis subspicatis brevissime pedunculatis in axillâ solitariis exsertis multifloris ad apices ramulorum racemoso-congestis, bracteis subherbaceis ovatis breviacuminatis 5-nerviis subhirtello-pubescentibus laxe imbricatis tuboque corolla dimidio brevirioribus. ♂ In campis deserti prov. Minarum Brasiliæ (Sell.! Pohl! Mart.!! Ried.! Lund!). Proxima præcedenti, a quâ differt foliorum et bractearum figurâ atque magnitudine. (v. s. in h. r. berol., c. vindob. et petrop., Mart. et DC.)
73. L. **SCHAUERIANA** (Mart. herb.), fruticosa, ramosa, ramulis tetragonis petiolisque glanduloso-scabris, foliis oppositis approximatis patulis lato-ovatis petiolatis acutis serratis margine subrevolutis triplinerviis nervo medio pinnato-venosis supra nitidis asperis subtus pallidis tenuissime pubescentibus et glandulosopulverulentis, capitulis brevipedunculatis dein subspicatis in axillâ solitariis ad apices ramulorum corymbulosis, bracteis herbaceis ovato-ellipticis obtusis trinervibus glandulosopubescentibus. ♂ In pascuis prov. Pernambucanæ Brasilie (Mart.!!). Folia pollicaria, subtus punctis resinosis subferruginea. Calyx villosus. Cor. alba aut dilute rosea. (v. s. in h. cl. de Mart.)
74. L. **ACUTIDENS** (Mart. et Schauer l. c. ined.), fruticosa, caule ramulisque tetragonis, illo lœvi, his pubescentibus, foliis duriusculis oppositis ovatis subtrotundisque brevissime petiolatis basi integerrimis acute dentatis acumine dentibusque subpungentibus rigide ciliatis subtus nervosis venosisque adultis glabratibus et utrinque nitidis, capitulis brevipedunculatis deinceps subspicatis in axillâ solitariis ad apices ramulorum congestis, bracteis squarrosis subherbaceo-mac-

branaceis concavis lato-ovatis acumine declinato 3-nerviis subtomentoso-hirsutis. ♂ In campis prov. Minarum Brasiliæ in confinibus prov. Goyaz (Mart.!) Frut. humanae altitudinis. Folia semipollucaria. (v. s. in h. cl. de Mart.)

75. L. LASIOTALYCINA (Cham.!, c. p. 231), fruticosa, ramulis sulcatis scabriusculis, foliis firmis verticillatis ternis ovato-ellipticis brevissimi petiolatis acuminatis a medio grosse et acute serratis impresso-penninerviis supra nitidis aspermis subtus pallidis pulvrenulo-glandulosis nervis scabridis, racemis alternifloris pedunculatis multifloris laxis plerumque ad basin ramulorum novellorum axillaribus solitariis, pedunculis rhachibz scabris pilosisque, calycibus brevissime pedicellatis hirsutissimis, bracteis membranaceis lanceolatis attenuato-acuminatis extus puberulis tubum corollæ subæquantibus. ♂ In campis æstu crematis Bras. interioris, prov. Minarum, Goyaz (Sell.! Pohl! Ried.! Lund! Gardn.! pl. bras. n. 3405), et in Boliviæ prov. Chiquitos (Alc. d'Orbigny!). Species omni notâ per insignis, sect. Aloysiarium commonens. Folia annua, adulta subbipollucaria; florescentia et frondescientia plerumque coæstanea. Racemi demum elongati, copiosissimi. (v. s. in h. r. berol., cæs. vindob. et petrop., Mart. et DC.)

76. L. GRANDIFLORA (Mart. et Schauer l.c. ined.), suffruticosa, ramulis tetragonis hirtis, foliis oppositis lanceolato-oblongis brevissime petiolatis acutis antice crenato-serratis postice integerrimis triplinerviis nervo medio pinnato, novellis supra villosa-hirsutis subtus pubescens reti strigoso-hirsuta, capitulis axillaribus solitariis longe pedunculatis deinceps laxè racemosis, pedunculis rhachi bracteisque dorso villosis, calycibus brevissime pedicellatis villosissimis, bracteis alternis membranaceis ovatis acuminatis concavis tubo corollæ brevioribus. ♂ In campis prov. Minarum Brasiliæ (Mart.!). Radix s. caudex crassa tuberculosa. Calyx brevissimus. Corolla in genere maxima, rosea. (v. sp. turion. novellis in h. cl. Mart.)

#### Sectio v. RHODOLIPPIA.

Capitula ineunte anthesi hemisphærica vel subglobosa, æqualiter imbricata, bracteis extimis majoribus involucrata. Bractæ latæ, membranaceæ, pallidæ vel lilacinæ aut roseo coloratæ, sub antebi florem aquantes vel excedentes, post anthesin deinceps succrescentes demumque sâpe amplissimæ, plurinerves, venoso-reticulatæ.

\* *Pedunculis in axilla pluribus. — Species Mexicana.*

77. L. UMBELLATA (Cav. ic. 2 p. 75 t. 194), ramis tetragonis pedunculisque strigoso-tomentosis, foliis oppositis lanceolato-oblongis basi in petiolum brevem attenuatis acuminatis serrulatis reticulato-rugosis supra scabris subtus pallidis pubescens, pedunculis axillaribus subquaternis filiformibus folio triplo duplo brevioribus, capitulis laxè imbricatis squarrosis, bracteis membranaceis pallidis lato-cordatis acuminatis puberulis ciliatis flore longioribus, denique duplo fere majoribus. ♂ In montosis Mexici, pr. Guchilapa (Berland.! pl. mex. n. 1628). Folia majora nostris 3-pollicaria, latit. pollicari. Petioli basi margine prominulo subconjugati. Capitula demum cerasi magnitudine. Bractæ flavescentes tenuiter membranaceæ, nervosæ, venoso-reticulatae. Calyx bifidus, villo albo sericeus. Cor. 2 lin. circ. longa, superne puberula. (v. s. in h. DC. et berol.)

78. L. CALICARPÆFOLIA (Kunth in H. et B. nov. gen. 2 p. 268), ramis tetragonis pedunculisque strigoso-pubescentibus birtisve, foliis oppositis elliptico-ovatis acuminatis in petiolum brevem angustatis serratis rugosis supra hirto-strigosis hispidisve subtus tomento villoso canescens, pedunculis axillaribus filiformibus geminis-quaternis, capitulis laxè imbricatis squarrosis in apice ramorum corymboso-paniculatis, bracteis membranaceis reticulatis coloratis lato-ovatis acutis glandulosis ciliatis parce pubescentibusque flore paulo longioribus denique valde auctis. ♂ In montosis reg. calid. Mexici (Berland.! pl. mex. exs. n. 970, Alaman! C. Ehrenb.! Aschenborn! Galeotti! H. et B.). L. calocephala Zuccar. ind. semihort.

monac. 1846. Lautana bracteosa Mart. et Gal.! in bull. acad. brux. 11 p. 326 (fide spec. auth.). Lippia bicolor Kunth in ind. sem. hort. berol. a. 1845 (ex deser.). Planta quod ad habitum L. lupulinæ proxima, ceterum distinctissima. Capitula incipiente anthesi drupæ pruni spiosæ dein vero cerasi mole. Bracteæ magnæ, patentes, multinerves, pulcherrime lilacinae. Calyx sessquilinearis, bifidus, hirsute villosus. Cor. calyce duplo longior, tubo infundibulari glabriusculo superne glanduloso-punctato. (v. s. in h. r. berol. et DC. et v. flor. in h. ber.)

\*\* *Pedunculus in axilla singulis geminis. — Frutices Australi-Americanæ, capitulis denique magnis lilacino- vel roseo-coloratis spectabilis.*

79. L. LUPULINA (Cham.! l. c. p. 222), tota tomento aut villo pilis glanduliferis commixto mollis, ramulis obsolete tetragonis, foliis oppositis ovatis lato-ovatis subrotundisque brevipetiolatis sessilibusque basi cordatis rotundatis acutisve crenato-serratis serratis impresso-nervosis venoso-rugosis, pedunculis firmis aut axillaribus solitariis aut ad apices ramulorum congestis paniculatisve, bracteis lato-ovatis acuminatis plurinerviis reticulato-venosis pubescentibus ciliatis denique maxime auctis. ♂ Frequens in campis aridiusculis Brasiliæ merid., in prov. S. Pauli, Minarum, Goyaz, Matto-Grosso, etc. (Sell.! Mart.! Pohl! Ried.! Lund! Vauth.! h. bras. n. 195), et in Boliviâ (Alc. d'Orbigny!). Suffrutex pedalis-tripetalis, indumento, foliorum et capitulorum magnitudine eximie variabilis. Folia 1½-3 poll. longa. Capitula virginea Cerasi fere mole, denique vero nucis Juglandis magn. assequentia. Calyx hirsutissimus. Cor. roseo-lilacina, sauce lutea. (v. s. in h. r. berol., cæs. vindob. et petr., Mart. et DC.)

80. L. GARDNERIANA (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), undique piloso-hirsuta simulque pube breviore glandulosa, ramulis obsolete tetragonis, foliis oppositis cordato-ovatis acutis basi sessili semiamplexicaulinibus grosse dentato-serratis venoso-rugosis, pedunculis axillaribus singulis folium subæquantibus terminalibusque ad apices ramulorum subpaniculatis, bracteis oblongis acutiusculis plurinerviis reticulato-venosis denique florem excedentibus. ♂ In Brasiliæ prov. Piauhy et Goyaz (G. Gardn.! pl. bras. n. 3407). Proxima habitu que simillima precedent, sed foliis et bracteis aliena. Folia 12-15 lin. longa. Bracteæ tenuiter membranaceæ, subtiliter venosæ, utrinque piloso-hirsutæ et glanduliferae, tandem semipollinare. Calyx hirsutissimus. Cor. omuino praecedentis. (v. s. in h. cl. de Mart.)

81. L. FLORIDA (Cham.! in Linn. 7 p. 221), subglanduloso-tomentosa, ramis superne foliosis tetragonis, foliis oppositis ternisve subimbricatis sessilibus obovato-cuneatis obtusis vel acutiusculis crenulatis postice integerrimis penninerviis rugosis, pedunculis axillaribus solitariis ad apices congestis exsertis, bracteis lato-ovatis acutis 5-7-nerviis reticulato-venosis subglanduloso-pubescentibus ciliatis dein maxime auctis. ♂ In campis siccos prov. S. Pauli et Minarum Brasiliæ (Sell.! Clauss.! coll. a. 1840 n. 390, Ried!). Fruticulus 1-2-petalis. L. lupulinæ quoad inflorescentiam simillima, foliis autem distinctissima. (v. s. in h. r. berol., cæs. vindob. et petrop. et Mart.)

82. L. RHODOCNEMIS (Mart. et Sch. l. c. ined.), ramosa, tomento hirto pilis glanduliferis commixto vestita, foliis oppositis approximatis patentibus ovato-ellipticis lanceolatis brevipetiolatis acutiusculis obtusisve crenatis penninerviis venoso-rugosis subtus subcanescens, pedunculis axillaribus solitariis foliis brevioribus, bracteis ovatis subacuminatis plurinerviis reticulato-venosis glandulosis hirsutiæculis dein paulo auctis. ♂ In campis editis prov. Minarum Brasiliæ (Mart.! Pohl!). Frutex 3-4-petalis. Folia 1-2½-pollicaria, subtus glandulosa sub tomento sessilibus consita. Capitula cerasi magnitudine. (v. s. in h. cæs. vindob. et Mart.)

83. L. EUPATORIUM (Schauer l. c. ined.), pilis brevibus glanduliferis hirto-tomentosa, caulinibus subtetragonis erectis superne paniculatis, foliis oppositis ternis quaternis patentibus lanceolatis acuminatis penninerviis venoso-rugosis subtus subcanescens, paniculae foliosæ centripetæ ramis pedunculis-

que elongatis patentissimis, bracteis ellipticis subacuminatis obtusis glanduloso-pubescentibus pilisque longioribus immixtis eglandulosis conspersis ciliatis dein paulo auctis. ♂ In campis editis prov. Minarum et Goyaz Brasilæ (Pohl! Ried.! G. Gardn.! pl. bras. n. 3408). Fruticulus subpedalis. Folia 2-3-pollicaria. Capitula cerasi majoris mole. Bracteæ roseæ, denique fere semipollucem longæ. (v. s. in hh. cæs. vindob., petrop. et Mart.)

84. L. ELLIPTICA (Schauer l. c. ined.), caule erecto superne paniculato glanduloso-hirtello, foliis oppositis ternis quaternis approximatis patentibus ellipticis basi attenuatâ integrerrimâ sessilibus obtusis mucronatis crenato-serratis penninerviis venosis supra sublucidis scabris et glanduloso-pubescentibus subtus pallidis nitidulis reti glanduloso-pubescente, paniculâ patente foliosâ centripetâ, pedunculis elongatis, bracteis subrotundo-ovatis acuminatis glanduloso-pubescentibus simulque setis eglandulosis conspersis ciliatis dein paulo auctis. ♂ In Brasilæ prov. Rio-Grande (Pohl!). Caules pluripedales, suffruticosi, superne densifolii. Folia 3-3½ poll. longa. Capitula cerasi magnit. Bracteæ denique semipollucares, lilacinæ. (v. s. in h. cæs. vindob.)
85. L. HEDERAEFOLIA (Mart. et Schauer l. c. ined.), fruticosa, superne ramosa, ramulis tetragonis scabris angulis marginatis, foliis oppositis ovatis subtundisive basi integrerrimâ trianguli vel subcuneatâ in petiolum brevissimum abeuntibus acutis utrinsecus dentibus 2-4 acutis inciso-serratis supra stri-goso-scabris subtus pallidis punctatis, capitulis exsertis corymbosis, bracteis ovatis acutis 5-7-nerviis reticulato-venosis pubescentibus ciliatis denique paulo auctis apice recurvo. ♂ In campis deserti Serro-Frio dictis prov. Minarum Brasilæ (Mart.! Pohl! Vauth.! h. bras. n. 196). Species omni notâ maxime insignis. Folia 3-6 lin. longa, 2-5 lin. lata. Capitula demum nucis juglandis minoris mole; bracteis 4-6 lin. longis petaloideis corollâque magnâ amœne roseis speciosa. (v. s. h. Mart. et DC.)

#### † Species denuo recognoscenda.

86. L. JAVANICA (Spreng. syst. veg. 2 p. 752), caule fruticoso erecto, foliis oblongis subcrenulatis, pedunculis inferioribus oppositis superioribus verticillatis folia superantibus, capitulis cylindricis, bracteis acutis. ♂ In insulâ Javâ. Verbena Javanica N. L. Burm. fl. indic. 12. t. 6. f. 2. Zapania Javanica Lam. ill. 1. 59. t. 17. f. 2. Blaria Javanica Gartn. l. c. — Affinis ex icone L. asperifoliz.
87. L. BERTERII (Spreng. l. c.), caule erecto fruticoso, foliis ovatis crenatis subtus villosis, capitulis verticillatis numerosis cylindricis foliis brevioribus, bracteis incano-tomentosis acutis patulis. ♂ Crescit ad fl. Magdalena (Bertero).
88. L. MEGAPOTAMICA (Spreng. l. c. 4 p. 231), caule erecto herbaceo, foliis ovatis serratis subtus ad venas pilosiusculis, capitulis hemisphæricis terminalibus, bracteis late ovatis integrerrimis. ♀ In Brasilæ prov. Rio-Grande (Sell.)
89. L. LANATA (Walp. Repert. 4 p. 43), subacaule, densissime albo-lanata, foliis rosulatis oppositis cuneatis basi attenuatis apice obsolete tridentatis obtusis, pedunculis axillaribus foliorum longitudine solitariis monocephalis, spicis subpyramidal-globosis, bracteis densissime lanatis obcordatis, inferioribus involucrantibus flore longioribus, superioribus brevioribus, omnibus acuminulatis. ♀ In summis Andibus Mexicanis. Herba e rhizomate lignesciente multicipite cæspitosa, habitu plantagineo. Folia crassiuscula 1-1½ poll. longa, 5-6 lin. lata. Capitula 3-4 lin. longa.

#### Species exclusæ.

L. CYLINDRICA Scheele = Stachytarpha Cayennensis.

L. MACROPHYLLA Cham. = Lantana macrophylla.

L. MONTEVIDENSIS Spreng. = *Lantana Sellowia*.

L. PALLESCENS Bent. = *Lantana canescens*.

L. SCHIMPERI Hochst. = *Lantana viburnoides*.

*Plantæ generi et ordini hucusque falso inscriptæ.*

L. CYMOSA (Sw. prodr. p. 93 et fl. ind. occid. 2 p. 1066) ex speciminiibus authent. h. Willd. n. 11612! et h. DC. pertinet ad Rubiaceas.

L. ECHINUS (Spreng. syst. veg. 4 p. 231) = *Zapania Echinus* Nees et Mart. in nov. act. acad. nat. cur. 11. t. 5. est *Raphiodon Echinus* Schauer in Florâ 28 p. 345 (Walp. repert. 3. 524) et *Hyptis Sideritis* in miss. Benth. prodr. v. 12.

L. VALERIANOIDES (Walp. in nov. act. acad. nat. cur. 19. suppl. 1 p. 377) ex spec. auth. h. r. berol. est vera *Valeriana*!

Subtribus V. *LANTANEÆ*.

Flores capitati vel conferte spicati. Calyx breviter tubulosus membranaceus. Corolla tubuloso-subhypocrateriformis, limbo obliquo subbilabiato. Drupa dipyrena, pyrenis uilocularibus.

XIII. LANTANA Linn. gen. n. 765, Juss. gen. p. 109, Cham. in Linnæa 7 p. 121 t. 7 fig. A et B, Endl. gen. n. 3695, Meisn. gen. p. 291, et comment. p. 199. Gœrtz. de fruct. 1 p. 267 t. 56, Lam. ill. t. 540, Jacq. hort. schœnbr. t. 285, 473. — Camara Plum. icon. — Myrobatindum Vail.— Charachera Forsk. descr. 116.

Calyx membranaceus, perexiguus, brevissime tubulosus vel subcampanulatus, obsolete 4-dentatus, pubescens, ciliatus, fructum velans eoque succrescente valde extensus hyalinus demumque abolescens. Corolla tubuloso-infundibuliformis; tubus calycem longe excedens, sursum mediocre ampliatus; limbus obliquus, planus vel inclinatus, subbilabiatus, labio superiore integro vel bifido, inferiore trifido. Stamina 4, corollæ tubo inserta, inclusa, didynama; antheræ biloculares, loculis riñâ longitudinali dehiscentibus. Ovarium biloculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, brevis, filiformis; stigmate linearî declivi aut refracto vel citra apicem oblique capitato. Drupa carnosa vel succosa, dipyrena, pyrenis vel basi tantum discretis vel lacunâ interjectâ maturitate separatis, putamine duro rugoso et tuberculato rariusve lœvi. Cotyledones crassæ, applicatae. Radicula infera brevis. — Frutices vel suffrutescens, rarius herbeæ, locis campestribus apicis, silvis cœduis et dumetis zonæ tropicæ et subtropicæ familiares; species in Americâ copiosæ, in Africâ et Asiâ paucæ. Caules tetragoni et folia, imprimis vernantia, saepissime glandulæ sessilibus consita ideoque odore peculiari subdulci prædicta. Folia opposita vel verticillata, simplicia, peniunervia, rugosa. Pedunculi axillares, plerumque singuli. Capitula densa, inter anthesin saepius valde elonganda. Calyx pubescens, neque in ullâ specie villosus aut hirsutus, ut in Lippiis. Corolla alba, purpurascens, aurantiaca, miniata, saepè mutabilis. — Aculeorum præsentia aut defectus characterem præbent fallacem (1).

(1) « Lantanæ genus botanicos hucusque mirum in modum exercuit summusque auctorum dissensus in definitis speciebus animadvertisit. Ratio hujus dissensus in eo consistit, quod Lantanæ genus in illis partibus mire ludat quæ in aliis generibus sibi constant, in istis vero immutabilis sit quæ alias inconstantes reperiuntur. » « Florum color, aliis inconstans, hic firmis præceptis innititur; hinc ali colore florum characteres cujuscunque speciei imprimis petendos esse, mihi persuasum est. » (Med. in act. acad. Theod.-Palai.

Sectio 1. SARCOLIPPIA. — *Sarcolippia Cham. in Linnæa* 7 p. 243,  
subg. Lippiae.

Drupa carne tenui. Putamen dorso lœve. Pyrenæ maturitate lacunâ interjectâ intra carnem discretæ.

1. L. ? MAXIMILIANI ( Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined. ), ramis tetragonis inferne denudatis pedunculisque villosis, foliis membranaceis oppositis patentissimis lanceolato-oblongis basi integerrimâ in petiolum brevem cuneatō-attenuatis acutis crenato-serratis penninervi venosis utrinque mollibus supra pubescensibus subtus pallidis et pulvereo-glandulosis reti villosulæ , pedunculis brevibus vel brevissimis, capitulis subglobosis umbellaribus, bracteis e basi ovatâ tenuiter acuminatis strigoso-hirtis imbricatis corollæ tubo duplo brevioribus. ♂ In silvis ceduis prov. Bahiensis Brasiliæ ( Maxim. princeps Wiedensis ! ). Folia tenuia, 2-6 poll. longa. Pedunculi angulati, superne paulo incrassati, 2-12 lin. longi. Capitula mediocria, corollis lilacinis longe exsertis umbellaria. Calyx minimus, cyathiformis, glabriusculus. Fructu deficiente ex habitu, sequenti accedente, huc collocata. ( v. s. in h. cl. de Martius ).

2. L. MACROPHYLLA ( Schauer l. c. ined. ), ramis tetragonis vestitis calvescentibus inferne nudis, foliis oppositis ovatis ellipticis basi integerrimâ cuneatâ vel acuminatâ in petiolum brevem decurrentibus breviacuminatis crenato-serratis penninerviis subrugosis supra aut pubescensibus aut strigiloso-hirtis aut hirto-velutinis subtus pallidis pulvereo-glandulosis hirto-tomentosis vel in reti saltem hirtellis, pedunculis rigidis tetragonis foliis multo brevioribus, capitulis globosis deinceps oblongis, bracteis dense imbricatis ovato-acuminatis longe acutatis utrinque velutinis strigosis corollam subæquantibus. ♂ In silvis Catingas dictis prov. Bahiensis Brasiliæ ( Sell. ! Max. princ. Wied. ! Blanchet ! pl. bras. n. 3140 A : forma dense velutina ) et in monte Impossible prov. Cumanensis Venezuela ( Moritz ! n. 423 : forma pubescens minus vestita ). Lippia macrophylla Cham. in Linnæa 7 p. 213. Rami acutanguli, firmi. Folia 2-8 poll. longa, 1-3 poll. lata, margine nunc evidenter nunc fere obsolete serrato. Pedunculi 7-2½-unciales. Capitula nucis moschatæ mole et majora, floribus sub bracteis magnis imbricatis sæpius rubescens fere occultis. Cor. lutea deinceps purpurascens. Drupa matura magna, ellipsoideo-ovoidea, lœvissima, nitida. Indumentum maxime variabile. ( v. s. in h. r. berol., Mart. et DC. )

3. L. BRASILIENSIS ( Link ! enum. hort. berol. 2 p. 126 ), undique adpresso-strigillosa, ramulis anguste tetragonis, foliis coriaceis oppositis patentibus ovatis ellipticis lanceolatisve acuminatis basi cuneatâ in petiolum attenuatis antice posticeque integerrimis ceteroquin grosse et acute serratis penninerviis planis supra glabriusculis nitidisque aut scabro-strigilosis subtus pallidis reti strigoso-vel pubescenti-hirtello, pedunculis brevibus, capitulis hemisphaericis denique oblongis, bracteis membranaceis laxe imbricatis anguste lanceolatis acutatis tubum corollæ subæquantibus. ♂ Vulgaris in campis et juxta vias publicas totius Brasiliæ meridionalis ( Sell. ! Mart. ! Pohl ! Ried. ! Münso ! Lund. ! ). L. spicata Vellozo ! fl. flum. 6 t. 58 ( pess. ). L. cinerea hort. Ot. et Dietr. ! gartenzzeit. 9 p. 378 ( forma magis vestita subcanescens ). Frutex insignis, 5-10-pedalis, ramis ad nodos subtumidis. Folia figurâ et amplitudine eximie variantia, lœte viridia. Capitula unciam et quod excedit longa. Pedunculi rigidi, sursum incrassati. Bracteæ semipollicares. Corolla alba, fauce citrinâ. Drupa

vol. 3. phys. ( 1775 ) p. 232). — Species, imprimis sect. Canaræ , per se quidem difficilime, botanicorum quorundam hortentium hallucinationibus magis magisque senti tricatae et confusæ; quas igitur, qui in explicandis probe desudavi, ulteriori observationi in vivo maxime commendaverim.

matura magna, ellipsoidca, lœvissima, nitida. — Brasilienscs foliis loco Theæ utuntur. (v. s. in h. reg. berol., monac., cæs. petr. et vindob. et DC.)

4. L. SALICIFOLIA (Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 259), ramis subteretibus pedunculisque pube strigosa canescensibus et glanduloso-punctatis, foliis oppositis ternisque lanceolatis in petiolum breve attenuatis acuminati leviter crenatis rugosis supra scabris subtus incano-pubescentibus, pedunculis filiformibus folio brevioribus longioribus, capitulis hemisphæricis, bracteis imbricatis sericeis, interioribus ovatis acuminatis tubo corollæ duplo brevioribus, exterioribus involucrantibus lanceolatis flores æquantibus. ♂ In Americæ austr. reg. orinocensis ? (H. et B.! h. Willd. n. 11509!). Folia 2½ poll. longa, 8-9 lin. lata. Calyx albo-piloso-sericeus. Cor. tubus 4 lin. longus. Fruct. ignotus; propter similitudinem capitulorum cum præcedentis hoc collocata. (v. s. in h. Willd. et Kunth.).

5. L.? PROCURRENS (Schauer l. c. iued.), rhizomate repente, caulis simplicibus tereticulis pedunculisque hirtis, foliis oppositis obovato- vel subrotundo-ellipticis acutis obtusive basi integerrimâ cuneatâ vel breviter coarctatâ subsessilibus grosse crenato-serratis venoso-rugosis supra subtusque in reti strigoso-hirtellis hic glanduloso-pulverulentis discoloribusque, pedunculis folium aquantibus superantibus, capitulis hemisphæricis convexis densis, bracteis ovatis acutis dorso strigoso-hirtis internis tubo corollæ triente brevioribus externis subinvolutantibus. ♂ In campis editis graminosis prov. S. Pauli Brasiliæ (Sell.! Ried.! Lund! n. 827). Caules spithamæi. Corolla rosea, fauce lutea. Fructum perfectum non vidi. (v. s. in h. reg. berol., cæs. petrop. et DC.)

6. L. SPIRÆASTRUM (Mart. et Sch. l. c. ined.), glutinosa, ramis tetragonis sulcatis glabris, foliis oppositis rhombo-ovatis oblongis acutis obtusis basi triangulari-cuneatâ integerrimâ in petiolum acutatis crenulato-serratis subtus penninerviis venosis tomentoque brevi canescensibus, pedunculis folium subæquantibus, capitulis subglobosis confertis, bracteis firmis ovatis subacuminatis obtusis dorso scabris corollâ multo brevioribus. ♂ In campis desertis prov. Minarum Brasiliæ ( de Mart.! ). Frutex humanâ altitudine, ramis foliiorumque facie glabris glutinoso-nitentibus perinsignis. (v. s. in h. cl. de Martius).

### Sectio II. CAMARA Cham. l. c.

Drupa baccata. Putamen dorso rugosum juxta basim attenuatam utrinque exsculpto-lacunosum. Pyrenæ maturitate lacunâ interjectâ nisi omniwo basi saltem discretae. — Frutices plerumque aculeati.

#### § 1. Capitula haud conspicue elonganda.

\* *Corolla lactea, cærulescens.*

7. L. NIVEA (Vent! jard. de Malm. 1 t. 8), ramis tetragonis glabriusculis aculeis crebris latis reversis munitis, foliis oblongo-ovatis ellipticis acuminatis in petiolum manifestum coarctatis crenato-serratis penninerviis venosis supra late viridibus scabris subtus pallidis puberulis, pedunculis subcorymbosis axillaribus singulis geminis basi coalitis patentibus foliis haud multo brevioribus, capitulis hemisphæricis fastigiatis, bracteis linear-lanceolatis acutis dorso pubescentibus tubo corollæ triplo brevioribus. ♂ In collibus siccis inter frutices in Brasiliâ meridionali e. gr. circa Rio de Janeiro et in prov. Minarum (Sell.! Pohl! Mart.! Ried.! Lund! Gaudich.!). L. asperata h. par. fide Vis. h. patav. 1842 p. 142. (v. s.)

α. foliis floribusque majoribus, corollâ niveâ. L. nivea Vent. l. c.

β. foliis angustioribus, floribus minoribus, corollâ pallide lilacinâ deinceps cærulescente. L. nivea var. mutabilis Hook. bot. mag. t. 3110. L. ame-

thystina Otto et Dietr.! gartenzeit. 9 p. 370. (v. v. c. et s. sp. in h. reg. berol., cæs. vindob. et petrop.; Mart. et DC.)

\*\* *Corolla lilacina.*

8. L. **MULTIFLORA** (Otto et Dietr. allg. gartenzeit. 9 p. 370), ramis quadrangulis pedunculisque appresse pubescens ad nodos imprimis aculeis brevibus reversis munitis foliis oblongo-ellipticis lancolatis utrinque acutatis grosse crenatis scabris subglabris subtus pallidioribus, pedunculis folium subæquangularibus superantibus, capitulis hemisphaerico-umbellariis, bracteis subæqualibus subulato-lanceolatis strigosis tubo corollæ plus duplo brevioribus. ♂ In Indiâ occidentali? Folia subbipinnicaria, in petiolum brevem attenuata, subtus nitida. Cor. lilacina, tubo gracili supra medium ventricoso, 5 lin. longo, puberulo. (v. c. spec. incompl. in h. reg. berol.)
9. L. **PURPUREA** (Horn.! hort. havn. Spr. syst. veg. 2 p. 761), ramis divaricatis quadrangularibus hirtellis aculeis recurvis sparsis, foliis ovatis in petiolum productis acuminate serrato-crenatis rugosis supra hirtellis subtus hirtellivillosis pallidisque, pedunculis axillaris superne incrassatis hirtellis, capitulis hemisphaerico-umbellatis, bracteis subæqualibus lanceolato-subulatis acutis corollæ tubo plus quam duplo brevioribus. ♂ Habitat? Colitur in hortis bot. L. variegata Otto et Dietr. l. c. p. 314. L. albo-purpurea Desf. cat. hort. par. ed. 2 p. 392? Corolla quam in L. Camara paulo minor, tubo dorsoque limbi albido, limbi facie primum pallide rosea deinceps roseo-lilacinâ, fave pallide flavescente. (v. v. c. et s. c. a cl. Hornem. olim comm.)

\*\*\* *Corolla albida vel flava, deinceps in croceum vel purpureum vel miniatum vergens.*

10. L. **POLYACANTHA**, ramis patentibus quadrangularibus aculeatissimis cum pedunculis piloso-hirtis-hirsutisve, foliis brevipetiolatis subcordato-ovatis acuminate serrato-crenatis rugosis supra strigoso-seaberrimis subtus villosos-hirtellis suhcanescentibus, pedunculis rigidis folium subæquangularibus superantibus, capitulis hemisphaerico-umbellatis, bracteis subæqualibus subulato-lanceolatis strigoso-hirtis corollæ tubo bis terve brevioribus. ♂ In Mexico (Schiede!). L. aculeata hort. quor. Spr. syst. 2 p. 761 (excl. syn.) Med. act. palat. 3. phys. p. 231, et ex parte saltem Linn. syst. ed. 12 n. 5 « spicis hemisphaericis. » (L. aculeata Linn. species mixta est, itaque nomen ambiguum delendum videbatur). Ramuli validi, rigidi, aculeis crebris reversis horridi. Folia e basi cordatâ vix vel paulo tantum in petiolum producta, subtus glanduloso-punctata. Capitula multiflora. Corolla recens flava, deinceps per croceum in miniatum vergens, tubo pubescente 4 lin. longo, limbo majusculo. Differt a L. Camara foliorum figurâ et aculeis crebris, capitulis hemisphaericis; a L. mixta, cui formis quibusdam habitu accedit, bracteis brevibus et colore corollæ. (v. v. c. et s. sp. in h. reg. berol.)

11. L. **ARMATA**, ramis tetragonis pedunculisque hirsutis aculeis crebris validis armatis, foliis lato-ovatis attenuato-acuminatis e basi rotundata acuminata abrupto in petiolum subtus aculeatum productis grosse crenatis lineatis rugosissimis supra hirtis asperimis subtus pube hirtâ subcanescentibus, pedunculis folio brevioribus et longioribus sursum incrassatis, capitulis hemisphaericis, bracteis strigoso-hirtis externi-lanceolatis involucrantibus flores infimos æquantibus, internis subulato-lanceolatis corollâ duplo brevioribus. ♂ In Venezuela, ad Caracas (Moritz! n. 292). — Species ramis horridis, hirsutie asperâ et capitulis involucratâ distincta. Folia 2-4 poll. longa, 1½-2½ poll. lata, petiolo 6-9 lin. metiente. Cor. tubus 4 lin. longus. (v. s. sp. in h. reg. berol.)

12. L. **HORRIDA** (Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 211), ramis patentibus tetragonis, junioribus pedunculisque hispidulis hirtellisve aculeatis inermibus, foliis subrotundo-ovatis in petiolum breviter productis acuminate grosse serrato-crenatis reticulato-rugosis supra strigoso-scaberrimis subtus pallidis reti hispi-

dalo aut villoso-hirtello, pedunculis folio plerumque longioribus, capitulis hemisphaericis, bracteis subulato-lanceolatis, internis tubo cor. duplo brevioribus, externis interdum involucrantibus. ♂ In montosis regni Mexicani. Frutex suborygialis ramosissimus, ramis validis adultisque cinereis laevibus, ramulis nunc aculeis gracilibus redundis crebris horrentibus nunc paucis nullis munitis. Folia majora 3 poll. circ. longa, postice fere 2 poll. lata, minorá saepius pollicem longa 9 lin. lata. Bracteæ trinerviæ, dorso strigosæ. Calyx generis, bilobus, ciliatus. Corolla (ex H. et B.) aurantiaca, in miniaturam vergens (rubra ex Berland.) L. polyacanthæ sane proxima, staturâ folii bracteis indumento caute distingnenda. Occurrit dupli formâ:

*α. parviflora*, floribus minoribus (tubo cor. 3  $\frac{1}{2}$  lin. metiente), bracteis subaequalibus una alterâ saepius longiore. — In monte Chapultepec juxta urbem Mexici (H. et B.), ad Matamoros (Berland.) pl. mex. n. 2310. C. Ebremb. n. 612.). L. mixta hort. quer.!

*β. grandiflora*, floribus majoribus (tubo cor. 4-5 lin. longo), bracteis extimis involucrantibus lanceolatis tubum corollæ subæquantibus. In regno Mexicano leg. cl. Alaman! (v. v. c. et s. sp. in h. Kunth, reg. berol. et DC.)

13. L. ANTIDOTALIS (Thonning et Schum. in dansk. selsk. afhandl. 4 p. 50) ramis subhexagonis pedunculisque hispidulis glandulis immixtis intermis v. aequoleolatis, foliis ternis (oppositisique?) ovatis basi late triangulari in petiolum abeuntibus acuminatis grosse crenato-serratis rugosis supra scaberrimis subtus pallidioribus hirtellis glandulos-punctatis, pedunculis rigidis superne incrassatis folium subæquantibus, capitulis hemisphaericis, bracteis linearis-subulatis hirtis, externis tubum corollæ æquantibus. ♂ In Guineâ (Th. et Schum.) et Senegambiâ (Lelièvre!). Ex affinitate L. scabridæ. Calyx lineam fero longus, bifidus, minute dentatus, puberulus. Cor. lutea, tubo pubescente 3 lln. longo (v. sp. unicum in h. berol.)

14. L. CRENULATA (Otto et Dietr. Gartenzzeit. 9 p. 363), ramulis tetragonis scabris inermibus hinc inde muricibus conspersis, foliis opositis ovatis acuminatis in petiolum attenuatis crenulatis supra tenuissime reticulatis nitidis et scabritie brevi callosâ asperrimis subtus pallidis puhescenti-scabris, pedunculis folium subæquantibus, capitulis subfastigiato-hemisphaericis, bracteis lanceolatis tubo corollæ fere duplo brevioribus, extimis subsphathulatis flores infinos subæquantibus. ♂ In Indiâ orientali (specimina hortentia miserunt cl. Wallich! Leschenault! P. Ronx! Edgeworth!). L. splendens Med. act. acad. palat. vol. 3 phys. p. 226? (Dillenii vero icon ab auctore citata potius ad L. croceam spectat). Species L. Camara proxima, sed caule, aculeorum defecti, foliis minoribus supra vernicoso-nitidis crenulatis, bracteisque exterioribus distincta. Cor. flava deinde aurantiaca. (v. s. cult. in hort. berol. et s. spec. ind. in h. DC.).

15. L. CAMARA (Linn. sp. pl. p. 874), ramis patentibus tetragonis cum pedunculis pubescentibus vel hirto-pilosis aculeatis subinermibus scabris, foliis ovato-oblongis subcordatis in petiolum brevem cuneato-productis acuminatis serrato-crenatis reticulato-rugosis supra scaberrimis subtus pallidis paginâ vel reti saltet brevi-villosi subcanescensibus, pedunculis rigidis folium subæquantibus superantibus, capitulis fastigiato-umbellaribus, bracteis lanceolatis strigoso-pubescentibus æquilibus tubo corollæ duplo brevioribus. ♂ In collibus et campis, inter frutices; vulgaris in Brasiliâ meridionali, e. g. prov. Rio-Grande, S. Pauli, Rio de Janeiro et in primis Minarum (Mart. Pohl! Ackerman! Ried! Regnell! pl. bras. exs. n. 336), tum in insulis Dominicæ (Poit!), Jamaicae (Murray!), Portorici (Bertero!), S. Vincentii (Lamb.), Cuba (de la Ossa!), et in Venezuela (Moritz! n. 293 et 163). — Plum. icon. t. 71 f. 1. Dillen. elth. p. 65 t. 56 f. 65. L. aculeata Linn. spec. 1 p. 974 (forma caule magis aculeato; in hort. Cliff. plures species sub hoc titulo commiscuit. Conf. Richter cod. Linn. n. 4513). Vell. flor. hum. 6 t. 85. Bot. mag. t. 96 (pessima). L. scabrida Ait. hort. kew. ed 1, 2 p. 352. Lodd. bot. cab. t. 1171. Frutex

orgyalis et major, ramulis inermibus et aculeis nunc rarís nunc copiosis munitis maximopere varians, uti et indumento. Corolla recens aurea, dein in aurantiacum, denique in miniatum vergens. (v. s. in h. reg. berol., cæs. vindob. et petrop., Mart. et DC.)

16. L. CUJABENSIS (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), ramis patentibus tetragonis inermibus vel aculeolis muriciformibus rarisque munitis cum pedunculis subtiliter strigilosis, foliis ovatis vel ovato-oblongis basi breviter in petiolum productis acuminatis crenato-serratis lineatis et venoso-rugosis supra scabris subtus pallidis reti hirtello paginis glanduloso-punctata glabratâ vel pubescenti-tomentosâ, pedunculis rigidis folio subæqualibus, capitulis hemisphaericis, bracteis scabro-hirtis, externis lato-ovatis acuminatis capitulum virgineum involucratis, internis oblongo-lanceolatis acutis corollâ bis terve brevioribus. ♂ In Brasiliæ prov. Matto-Grosso (Manso! Mart. herb. bras. n. 1026!) et Rio-Negro (de Mart.!), nec non in Peruviâ Subandalinâ (Pœppig! n. 1405.) Species singularis, ramis longis subherbaceis obtusangulis, foliis et præcipue bracteis latis a præcedente, proxime affinis diversa. (v. s. in h. Mart. et DC.).
17. L. MORITZIANA (Otto et Dietr.! gartenzeit. 9 p. 369), ramis patentibus tetragonis inermibus vel aculeolis raris minutisque conspersis cum pedunculis hirtellō-pubescentibus, foliis oppositis ovatis acuminatis basi breviter in petiolum productis crenato-serratis lineatis et venoso-rugosis supra scaberrimis subtus pallidis scabro-pubescentibus, pedunculis rigidis folio brevioribus, capitulis fastigiato-umbellaribus, bracteis strigoso-scabris subulatis corollâ duplo brevioribus extimis lanceolatis capitula virginea involucrantibus flores infimos subæquantibus. ♂ Crescit in Venezuelâ, ad Caracas alibique frequens «Carquito colorado»; incol. (Moritz! n. 163). Proxima L. Camaræ, ut lubenter pro ejusdem stirpis variabilis formâ habuerim, nisi differret bracteis extimis foliaceis angustis involucrantibus. Calyx artus, lineam longus, scabro-puberulus. Corolla (ex O. et D.) recente flava deinceps aurantiaca, tubo 4 lin. longit., limbo 2 lin. latit. æquante; limbi labio utroque subquadrato integrerimo, lobis lateralibus minoribus truncatis. (v. v. c. et s. spont. in h. reg. berol.)
18. L. HIRSUTA (Mart. et Gal. bull. acad. brux. 11 p. 326), ramis tetragonis hirtis hirsutis inermibus aculeisve brevibus conspersis, foliis lato-ovatis acuminatis in petiolum brevem paullò productis crenatis membranaceis subrugosis supra strigoso-hispidis subtus piloso-hirsutis junioribus hirsutissimis pedunculis birtis folium subæquantibus excedentibusve, capitulis hemisphaericis laxis, bracteis subæqualibus lanceolato-linearibus hirsutis corollâ duplo brevioribus. ♂ In Mexico, in sylvis prope Xalapam, Mirador, Zacupan et alibi (Gal.), ad Flocolala (C. Ebrenb.!) inter Pueblo viejo et Real del Monte (Berland. n. 382!), in Venezuelâ ad Puerto-Cabellos (Karsten! n. 104). Proxima L. Camaræ, sed hirsutis et capitulis diversa. Folia 2-3 poll. longa, sesquipoll. et quod exedit lata, adulta pilis delapsis callosa-scabra, petiolo semipollucari. Corolla 4 lin. longa, ex. Gal. « rubra ». (v. s. sp. in h. DC. et reg. berol.)
19. L. FLAVA (Med. act. acad. palat. 3 phys. p. 225), ramis junioribus quadrangula-ribus pilosis inermibus, foliis oppositis ternis cordato-acuminatis breviter in petiolum productis profunde crenatis rugosis scabris subtus pallidioribus tomentoso-pilosis, pedunculis axillaris folio brevioribus, capitulis hemisphaericis, bracteis oblongis tomentoso-pilosis deciduis corollâ brevioribus. ♂ Hab.? Camara Melisse folio, flore flavo Dill. hort. elth. p. 66 t. 57 fig. 66. L. melissæ-folia Ait. hort. kew. ed. 2 p. 352. Humilior est ac L. Camara, altitudinem plerumque bipedalem obtinet. Flores quam in L. Camaræ et mixta minores, corollâ flavâ immutabili (Dillen., Med.)
20. L. CROCEA (Jacq! hort. schtēnbr. 4 t. 473), ramulis quadrangularibus ad

angulos aculeis raris reversis, turionibus pedunculisque hirsuto-pubescentibus pilis glanduliferis immixtis, foliis cordato-ovatis aut ovato-oblongo-acute-acuminatis in petiolum breviter productis grosse crenatis rugosissimis supra nitidis strigoso-scaberrimis subtus villo vel tomento brevi subcanscentibus, pedunculis axillaribus folio plerumque longioribus sursum paulo incrassatis, capitulis hemisphaericis, bracteis subaequalibus linearisubulatis tubo corollæ subtriplo brevioribus. ♂ In Indiâ occidentali, perfrquent in fruticetis S. Thomæ (Wydler! n. 48, C. Ehrenb.! n. 166), in Guadeloupe (Badier!) in insulis Bahamensis (Dillen.) L. scabrida Ait. hort. kew. 2 p. 352. L. snavoleens Desf. cat. hort. par. 3 p. 392. Dillen. hort. elth. p. 66 t. 57 fig. 67! Species per insignis habitu, foliis, indumento et corollæ colore. Folia in frutice denso plerumque oblonga versus apicem acutum vel obtusum sensim angustata, valde rugosa,  $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 9 lin. inferius lata (var.  $\alpha$  rugosa O. et D.! gartenzeit. 9 p. 362); in turionibus vegetis majora magisque cordato-ovata minusque rugosa (var.  $\beta$ . planifolia O. et D.! l. c.); utramque formam evidenter invicem trans-euntem observavi et in speciminibus cultis et in sylvestribus. Flores quam in L. Camara minores. Corolla recens efflora lutea, dein in croceum mutabilis, tubo fere 4 lineas longo. Bracteæ strigilloso-hirtæ. (v. v. c., spec. c. a Jacquino olim comm. et spec. sylv. in h. DC. et reg. berol.)

21. L. MIXTA (Linn. syst. p. 473), tota vel apice saltem piloso-hirsuta, ramis patentissimis quadrangularibus inermibus aculeis rectis reversisque ad angulos conspersis, foliis cordatis ovatis oblongis in petiolum productis acuminatis serrato-crenatis reticulato-rugosis supra villosa-vel strigoso-hirtis hispidive subtus pallidis et reti magis minusve villosa-hirsuto-canescens canescens, pedunculis folium plerumque excedentibus, capitulis fastigiatis, bracteis linearis-lanceolatis hirsutis, internis tubum corollæ semiæquantibus paulo longioribus, extimus tubum corollæ æquantibus subspatulato-lanceolatis. ♂ Vulgaris in silvis cæduis, ad sepes Brasiliæ meridionalis, imprimis circa Rio de Janeiro (Mart.! Pohl! Ried.! Lund! pl. bras. n. 245 et 268). Camara Lamii albi folio, flore mixto Dillen.! hort. elth. p. 64 t. 56. Viburnum amer. Urticæ foliis Comm. hort. amstel. 1 p. 151 t. 78. L. mutabilis Lippold! ex Otto et Dietr. gartenzeit. 10 p. 314 (hde spec. aut.). L. aculeata autt. et hort. quor.! Frutex 3-4-pedalis, foliorum figuræ quidem variabilis, sed hirsutus patente foliorum peduncularum et bractearum neque minus corollæ colore insignis. Cor. magna, recens albida, dein lutea, tandem aurantiaca, postremo rubra. (v. v. c. et s. spont. in h. cæs. vindob. et petrop. et DC.)

22. L. SANGUINEA (Med. act. acad. palat. 3 phys. p. 229), ramulis quadrangularibus aculeisque multis validisque reflexis armatis demumque vero aculeos deponentibus, foliis ovato-acuminatis rugosis atro-viridibus. ♂ Colitur in hortis. Species omnium pulcherrima. Cor. ante explicationem omnino saturate sanguineæ sunt, postea vero tubus huncce colorem solus conservat, limbus autem, præsertim ejus superficies superior crocea, dein miniata, tandem in tubi colorem mutatur. (Med.)

23. L. TILLÆFOLIA (Cham.! in Linnaeâ 7 p. 122. t. 7 f. A fructus), ramis patentibus tetragonis inermibus vel tenuiter aculeolatis cum pedunculis villosa-pubescentibus villosis, indumento nunc toto viscido nunc partim tantum glanduligero, foliis subrotundis ovatisve basi vel cordatâ vel truncatâ vel cuneatâ in petiolum breviter productis acuminatis serrato-crenatis reticulato-rugosis utrinque villosis aut supra strigoso-scabris subtus canescens breviter villosis aut molliter tomentosis, pedunculis folium æquantibus exsertisve, capitulis hemisphaericis, bracteis strigoso-hirtellis, internis oblongis corollæ tubo duplo subtriplo brevioribus, extimus lanceolatis vel subspatulatis duplo longioribus. ♂ Crescit in dumetis et sepiibus prov. Bahiensis Brasiliæ (Sieber! in h. Willd. n. 11502, Sell.! Mart.! Blanch.! n. 20 et n. 3136 A, Salzm! pl. bras. n. 426), in Guianâ Anglieâ (Schomb.! n. 196), Peruvia Subandinâ (Pœppig! n. 1375) et Chili (Cuming!). L. glutinosa Pœppig!

coll. cit. Otto et D. gartenzeit. 10 p. 315. Planta eximie variabilis, tum quoad foliorum figuram tum quoad indumentum conditionem, tamen illis plerumque cordatis, hoc molli glanduloso bractearumque figurâ ab affinibus certo distinguenda. Corolla aurantiaca denique miniatâ, tubo 4 lin. longo pubescente. (v. s. in h. reg. berol., Mart et DC.)

24. L. ROBUSTA (Schauer l. c. ined.), strigoso-hirta, subcanescens, ramis patentibus rigidis tetragonis inermibus, foliis ovatis ovato-oblongis subcordatis in petiolum brevissimum attenuatis acuminatis crenato-serratis reticulato-rugosis supra strigoso-scabris subtus breviter hirtâ-villosis canescensbusque, pedunculis folio plerumque brevioribus, capitulis hemisphaericis, bracteis subæqualibus oblongis acutiusculis obtusis, interioribus tubo corollæ plus quam duplo brevioribus. ♂ In Brasiliâ (Pohl! Raben! n. 509). Similis quodammodo L. Camaræ et L. tiliæfolia; diversa ab illâ caule inermi, bracteis, flore majore; ab hâc fol. figurâ, indumento et flore majore. Capitula conspicua. Calyx 1½ lin. longus, 5-nervius. Corolla aurantiaca?, tubo 5 lin. longo villoso-canescens, limbo ampliuscuso. (v. s. in h. cæs. vindob. et Mart.)

25. L. RIEDELIANA (Schauer l. c. ined.), ramis tetragonis pedunculis foliisque primâ ætate strigoso-hirsutis mox vero glabratris nitidisque parce hispidulis, foliis oblongo-lanceolatis acuminate in petiolum mediocrem attenuatis obtuse et exigue serratis subrugosis supra nitidis subitus pallidis et subopacis, pedunculis folium subæquantibus, capitulis hemisphaericis, bracteis oblongis lanceolatisque acutis, interioribus tubo corollæ duplo triplove brevioribus, extimus lanceolatis involucratis flores subæquantibus. ♂ In Brasiliâ (Riedel!). Frutex glabritie, foliis acutis, interioribus tubo corollæ duplo triplove brevioribus, extimus lanceolatis involucratis flores subæquantibus. ♂ In Brasiliâ (Riedel!). Frutex glabritie, foliis acutis, interioribus tubo corollæ duplo triplove brevioribus, extimus lanceolatis involucratis flores subæquantibus. ♂ In Brasiliâ (Pohl!). Species omnino insignis. (v. s. spec. unicum in h. cæs. petrop.)

### § 2. *Capitula elonganda*, denique *spicata*.

26. L. VISCOSEA (Pohl! in sched. herb. cæs. vindob.), ramis tetragonis aculeis crebris validis reversis horridis et cum foliorum facie pedunculis bracteisque pilis simplicibus glanduligerisque commixtis hirsutis viscidisque, foliis ovatis ellipticis basi integerrimâ in petiolum attenuatis attenuato-acuminatis acute serratis rugosis subtus tomento villoso canescensibus, pedunculis singulis geminis folio brevioribus longioribus patentissimis, capitulis hemisphaericis spicato-elongandis, bracteis ovatis acuminatis laxe imbricatis tubo corollæ triente brevioribus. ♂ In Brasiliâ (Pohl!). Species omnino insignis. (v. s. in h. cæs. vindob.)

27. L. POHLIANA (Schauer l. c. ined.), caule ramisque inermibus tetragonis pilis callosis hirsutis deinceps asperis superne glanduloso-viscidis apice paniculatis, foliis membranaceis sursum decrescentibus patentissimis ovatis oblongis acuminatis et basi subcordata in petiolum longiusculum hirsutum brevissime contractis acute serratis venosis vix rugosis supra substrigoso-hirtis, subtus pallidis hirsutiæculis, pedunculis singulis geminis patentibus, superioribus folio florali longioribus, capitulis hemisphaericis dein spicato-elongandis, bracteis subrotundato-ovatis breviter vel brevissime acuminulatis concavis dorso glandulosis hirtellisque patulis corollæ tubo ter brevioribus. ♂ In Brasiliâ (Pohl!). Caulis pluripedalis, simpliciusculus aut brachiatus, ramis internodio longo exsurgentibus. Fol. inf. lamina subtripollicaris. Cor. lilacina, tubo 4 lin. longo. Drupa ellipsoidea.

### Sectio III. CALLIOREAS Cham. in Linn. 7 p. 122.

Drupa baccata, rarius subcarnosa. Putamen ut in sect. Camaræ; pyrenæ connatae. — Frutices inermes.

### § 1. *Capitula squarrosa*, *exinvoluta*, *haud elonganda*.

28. L.? CHAMÆDRIFOLIA (Cham.! in Linnæa 7 p. 127), fruticulosa, ramosissima,

undique glanduloso-pulverulenta, ramulis tenuibus teretiusculis scabris, foliis ovatis suborbiculatis subsessilibus acutis acute inciso-serratis supra lineatis scabris subtus discoloribus margine pilis brevibus rigidulis ciliatis, pedunculis elongatis exsertis fastigiatis, capitulis hemisphaericis subinvolucratis, bracteis subovatis strigoso-puberulis patulis corollâ brevioribus. ♂ In Brasiliâ meridionali (Sell.! Meyen!). Fruticulus demissus. Folia pollicaria. Corolla majuscula, alba. (v. s. in h. reg. berol.)

29. L. SALZMANNI (Schauer I. c. ined.), ramulis tenuibus quadrangularibus pedunculisque strigoso-scabris et glanduloso-punctatis, foliis parvis obovato-oblongis in petiolum brevissimum ovoeato-attenuatis obtusis subacutis a medio crenatis margine revolutis inter nervos impressos bullatis glabriusculis supra lucidis subtus dense glanduloso-punctatis, pedunculis filiformibus exsertis, capitulis paucifloris hemisphaericis, bracteis subaequalibus squarrosis membranaceis ellipticis obtusis strigoso-ciliatis dorso glandulosis corolla tubo subdupo brevioribus. ♂ In sabulosis aridis circa Bahiam in Brasiliâ (Salzm.! pl. bras. n. 425, Blanchet! n. 99 et 1026). Fruticulus 2-3-pedalis. Folia coriacea  $\frac{1}{3}$ -1 poll. longa. Bracteæ pallidæ. Corolla rosea. (v. s. in h. DC.)

30. L. LUCIDA (Schauer I. c. ined.), ramis quadrangularibus nitidis pedunculisque scabris, foliis oblongis in petiolum attenuatis acuminatis margine revolutis serrulatis coriaceis rugosis supra scabriusculis lucidis subtus pallidis glabriusculis, pedunculis folio brevioribus, capitulis hemisphaericis, bracteis subaequalibus squarrosis ellipticis obtusis strigoso-ciliatis tubo corollæ duplo brevioribus. ♂ In sabulosis aridis prov. Bahiensis in Brasiliâ (Salzm.! pl. bras. n. 427, Blanchet! n. 1027 et 2170). Frutex circiter 4-pedalis. Folia 2-4-pollicaria, supra quasi acu punctata. Corolla alba. Præcedenti affinis, sed multo major. (v. s. in h. DC.)

## § 2. Capitula involucrata, haud conspicue elonganda.

31. L. RUGULOSA (Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 261), ramulis tetragonis cum petiolis pedunculisque piloso-hirsutis, foliis oppositis ovatis acuminatis in petiolum brevem coarctato-angustatis grosse mucronato-crenatis reticulato-rugosissimis supra hirtis subtus tomento lanato canescensibus, pedunculis solitariis folium æquantibus vel superantibus capitulis hemisphaericis involucratis, bracteis lanceolatis acuminatis strigoso-hirsutis, interioribus flore duplo brevioribus, exterioribus foliaceis 3-5-nerviis capitulum æquantibus. ♂ Crescit in alta planitie Quitensi juxta Hambato in radicebus montis ignivomi Cotopaxi alt. 1500-1600 hex. (H. et B., in Andibus Columbiæ (Hartweg! n. 1358!) et juxta Quito et in valle Chillo frequens (Hartw.). Frutex robustus, (ex Hartw.) 4-5-pedalis, ramulis pendulis. Folia 3-4 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, parte petiolaris 4-6 linea metiente. Capitula post anthesin vix elonganda et relaxanda. Calyx brevissimus, strigoso-hirsutus. Cor. rosea? cxtus villosula; tubus 4 lin. long. curvatus medioque inflatus; limbus majusculus. Drupa pisi minoris magnit. atroviolacea. (v. s. in h. reg. berol.)

32. L. SCABIOSÆFLORA (Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 261), ramis procumbentibus gracilibus subtetragonis pedunculisque pubescenti-pilosis, foliis oppositis subrhombico-ovatis basi integerrimâ in petiolum brevem attenuatis acutis grosse serrato-crenatis rugosis supra strigoso-scabris subtus pube molli pilosâ canescensibus, pedunculis filiformibus folio multo longioribus, capitulis hemisphaericis, bracteis herbaceis lanceolatis acutis utrinque hirto-strigosis ciliatisque, interioribus corollæ tubum subæquantibus, extimis longioribus involverantibus. ♂ In scopoliosis editis Andium Peruvianorum (H. et B., Dombe! pl. peruv. n. 258. Folia subpollicaria, basitriangulari-cuneata. Pedunculi  $1\frac{1}{2}$ -4 poll. longi erecti. Capitula parva. Bracteæ omnes lanceolatae, lineato-nervosæ. Calyx semilineâ paulo longior, bifidus, piloso-pubens, ciliatus. Corolla flava tenuiter sericea, tubo leviter incurvo medio oblongo-ventricosus. Drupa exsiccata grani cannabini fere magnit. (v. s. ex mns. paris. in h. DC.)

- .33. *L. HISPIDA* (Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 260), ramis virgatis tetragonis pedunculisque strigoso-hispidis tomentosisve, foliis oppositis rhomboideo-ovatis oblongis lanceolatis basi integerim cuneata in petiolum brevem attenuatis acuminatis grosse serrato-crenatis lineatis bullato-rugosis supra scaberrinis hirtisve subtus in reti solo strigosis vel canescenti-tomentosis dense glanduloso-punctatis, pedunculis filiformibus folium subæquantibus superantibusve, capitulis bemispæcicis paulo elongandis, bracteis latis membranaceis utrinque strigosis ciliatis punctatis, interioribus oblongis tubo corollæ brevioribus, extimus involucrantibus patentibus lato-ovatis flores non-nihil excedentibus. ♂ In montibus Mexici, regione temperatâ, juxta Xalapam, alt. 700. bex. (Humb., Schiede pl. mex. n. 86! et 131!), in ditione Oaxacanâ (Andrieux pl. mex. n. 137! C. Ehrenb.! 535, indumento ubiorense). *L. teucrifolia* Otto et Dietr. (allg. gartenzeit, 9, p. 372. *L. Geroldiana* O. et D.! l. c. *L. hirta* Grah. in Edinb. new phil. journ. 2 p. 186? Folia rigidula, plicato-lineata, inter nervos bullata et rugosa, 1-2 poll. longa, 6-15 lin. lata, nuno viridia indumento brevi raro scaberrimo, nunc uberiore molli canescens. Capitula minora. Bracteæ 5-9-nerviæ, extimus conspicue majores, interdum foliacea. Calyx  $\frac{1}{2}$  lin. longus, hirtellus, ciliatus. Cor. alba, fauce flavescente; tubus 2- $\frac{1}{2}$  lin. longus, a calyce inde oblongo-ventricosus, pubescens, glanduloso-punctatus. Drupa succosa. (v. s. c. a cl. Otto comm. et s. silv. in h. reg. berol. et DC.)
- .34. *L. INVOLUCRATA* (Linn. amœn. acad. 4 p. 319), incana, subter pube glanduloso-punctata, ramis rigidis patentibus tetragonis pedunculisque strigosis, foliis oppositis ternisque obovato-vel rhombeo-subrotundis oblongisve basi late cuneata in petiolum abeuntibus apice rotundatis crenulatis impresso-lineatis reticulato-rugosissimis supra scaberrimis subtus hirto-pubescentibus tomentosisve, pedunculis superne incrassatis folium subæquantibus, capitulis globosis densis, bracteis herbaceis squarroso utrinque sericeis, interioribus ovato-subrotundis acuminalatis reflexis tubo corollæ duplo brevioribus, extimus involucrantibus multo majoribus lato-ovatis acutis flores æquantiibus. ♂ In Indiâ occidentali, in ins. S. Dominici (Poiteau!), S. Thomæ (C. Ehrenb.!), Cubâ (H. et B., E. Otto! n. 45). — Med.! act. acad. palat. 3 phys. p. 223 t. 16. Pluk. alm. p. 386 t. 114 f. 5. L. lanuginosa Miller dict. L. incana Otto et Dietr. gartenzeit. 9 p. 371. Species foliorum et bractearum figurâ insignis, hortis Europæis familiaris. Folia parva, lamina subpollicari, nervis supra impressis subtus prominentibus. Bracteæ nervosæ. Calyx brevissimus, piloso-sericeus. Cor. lilacina, fauce luteâ. (v. v. c. et s. sp. in h. reg. berol. et DC.)
- .35. *L. ODORATA* (Linn. syst. p. 474), incana, subter pube glanduloso-punctata, ramis erectis subvirgatis tetragonis pedunculisque strigosis, foliis oppositis ternis ellipticis oblongis vel lanceolato-oblongis in petiolum attenuatis obtusis vel acutiusculis crenulatis vix lineatis tenuiter reticulato-rugosis supra scabris subtus cano-pubescentibus, pedunculis filiformibus superne paulo incrassatis folio brevioribus aut longioribus, capitulis globosis densis, bracteis herbaceis squarroso utrinque sericeis, interioribus obovato-oblongis reflexis acuminalatis tubo corollæ duplo brevioribus, exterioribus lanceolatis flores inferiores æquantiibus. ♂ In insulâ Trinitatis (Sieber! fl. trin. n. 117). — Plum. icon. t. 71. f. 2 (rudis). *L. recta* Ait. hort. kew. ed. 1, 2 p. 351 (forma major, vegetior, pedunculis exsertis) et Jacq.! hort. scbœnbr. 3 p. 59 t. 360 (fide sp. auth.). *L. odorata* Ait. l. c. (fide sp. auth. in h. DC.; forma minor, foliis minoribus magisque confertis, pedunculis folio brevioribus). Utraque forma ex una eademque stirpe prodit secundum nutritionis conditionem. *L.* involucrata sane proxima, sed habitu alieno et notis allatis distinguenda. Folia majora sunt, quam illius, lamina  $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, petiolo longiusculo, nervis secundariis tenuioribus minus impressis planiora, areolis bullatis perexquisitis minute rugosa. Calyx et corolla pallide lilacina illius simillima. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)
- .36. *L. RETICULATA* (Pers. syn. 2 p. 141), erecta, subter pube undique glandu-

loso-punctata, ramis patentibus tetragonis cum pedunculis piloso-hirsutiusculis, foliis oppositis cordato-ovatis acutis basi cuneatâ in petiolum brevem coarctatis crenatis reticulatis bullato-rugosis supra hirtello-scabris subtus pubescensibus canescensibus, pedunculis strictis longe exsertis, capitulis parvis hemisphaericis haud elongandis, bracteis imbricatis membranaceis lato-cordatis acutis corollam æquantibus extimis involucrantibus. ♂ In ins. Dominicæ (Turpin, Bertero!), in apriis siccis ins. Cubæ (de la Ossa! E. Otto! n. 127). Species imprimis pedunculis longis, capitulis semper hemisphaericis floribusque parvis, corollâ alba a confinibus distincta, habitu L. lilacinæ similis. Calyx peregrinus cum corollâ sesquilineam longâ hirsutiusculus. (v. s. iu h. DC. et reg. berol.)

**§ 3. Capitula virginea involucrata vel subinvolucrata, inter florescentiam spicato-elonganda.**

37. *L. SELLOWIANA* (Link et Otto! pl. sel. hort. berol. p. 107 t. 50), ramosissima, ramis virgatis deflexis decumbentibus teretiusculis strigosis hirtellis, foliis ovatis vel subrbombeo-oblongis basi cuneatâ vel acutâ in petiolum brevem abeuntibus acutis grosse serratis lineatis vel lineato-plicatis rugosisque utrinque scabro-pubescentibus vel piloso-hirsutis subtus pallidis reti strigoso-hirtello paginâ cum bracteis glandulos-punctatis, pedunculis filiformibus longe exsertis, capitulis hemisphaericis paulo elongandis, bracteis ovato-oblongis strigoso-hirtellis patentibus corollâ plus quam duplo brevioribus, extimus paulo majoribus subinvolucrantibus. ♂ In campis crematis Brasiliæ meridionalis et reipublice Montevidensis (Sell.! Mart.! Bacht!). — Cham. in Linn. 7 p. 126, Bot. mag. t. 2981, Mound et Henslow the botanist 3 t. 115! L. decumbens Sell. mss. Lippia Montevidensis Spr.! syst. veg. 2 p. 751. Frutex gracilimus, capitulis conspicuus, corollis kermesino-lilacinis ornatissimus. (v. v. c. et s. sp. in h. reg. berol., Mart. et DC.)
38. *L. STRICTA* (Swarz fl. ind. occid. 2 p. 1055), ramulis gracilibus teretiusculis strictis strigoso-scabris, foliis oppositis ternisque oblongo-lanceolatis brevipe-tiolatis acuminate crenulatis reticulato-rugosis pilis brevibus rigidis asperis supra viridibus subtus venosis et albido-villoso-tomentosis, pedunculis folium æquantibus excedentibusve, capitulis subglobosis multifloris paulo elongandis, bracteis c latâ basi ovatis acuminate nervosis squarrosis corollâ triente brevioribus pubescensibus. ♂ In fruticetis siccis Jamaicæ (Sw.). *L. angustifolia* Miller dict., Sloane! hist. jam. 2 p. 84 t. 195 f. 4 (rudis). Folia vix bipollicaria, rigidula. Flores pallide purpurei. *L. lilacina* habitu similis, sed foliis angustioribus areolis minutis rugosis, indumento aspero, capitulis bractearum que figurâ corollâ minoribus diversa. (v. v. c.)
39. *L. LILACINA* (Desf. cat. hort. par. ed. 3 p. 392), erecta, subter pube glandulos-punctata, ramis patentibus tetragonis cum pedunculis strigoso-hirtellis, foliis oppositis ex ovato vel oblongo vel lanceolato-triangulari-acutatis e basi rotundatâ vel leviter cordatâ in petiolum subcuneato-productis acutis obtusisve crenatis impresso-lineatis reticulato-rugosissimis supra hirtello-scabris viridibus subtus pubescensibus aut velutino-tomentosis canescensibus, pedunculus folio brevioribus longioribusve, capitulis hemisphaericis in spicam elongandis, bracteis squarrosis membranaceis pallidis ovatis oblongisve acuminatis strigoso-hirtellis ciliatisque, interioribus corollâ subdupo brevioribus, extimus duplo minoribus subcordato-ovatis, calyce arcto corollæ tubo 6-8-tuplo breviore. ♂ Vulgaris in collibus et campis siccis et arenosis totius Brasiliæ meridionalis (Sell.! Mart.! Pohl! Ried.! Mart.! h. bras. n. 1030, forma macra parvifolia, Salzm.! pl. bras. n. 428, Blanchet! pl. bras. n. 100, 149, 620 et 2650); in Venezuela ad Caracas (Moritz! n. 165). *L. salviæfolia* et *L. recta* Cham.! in Linn. 7 p. 125 (excl. syn.). *L. fucata* Lindl.! bot. reg. t. 798. *L. inconspecta* Tausch, in Flora 19 p. 391? Frutex staturâ et magnitudine partium ex loco mirabili modo varians. Calyx semilinea vix unquam longior. Cor. roseo-lilacina. *L. salviæ-*

foliæ Capensi quam maxime similis, ut non nisi caute distinguitur, diversa tanen indumento, bracteis, calyce. (v. v. c. et s. sp. in h. reg. berol., cæs. vindob. et petrop., Mart. et DC.)

40. L. VELUTINA (Martens et Galeotti! bull. acad. brnx. 1 p. 325), undique cano-tomentosa, foliis oppositis ovatis basi cuneatâ in petiolum brevem angustatis acutiusculis crenatis reticulato-rugosis supra velutinis subtus tomentosis magisque eanescitibus, pedunculis folium æquantibus vel excedentibus, capitulis hemisphaericis paulo elongandis, bracteis membranaceis imbricatis ovatis acutiusculis obtusive pubescenti-velutinis subæquantibus corollâ duplo brevioribus, calyce tubo corollæ 4-plo breviore. ♀ In Mexico, in silvis Ixtlan inter Guadalaxara et S. Blas (Galeotti!), in Columbiâ (Hartw. ! pl. col. n. 1357!). Proxima et habitu persimilis L. lilacinæ, sed indumento et bracteis diversa. Cor. pallide rosea fauce lutea, tubo gracili 3 lin. æquante. (v. s. a cl. Mart. comm. et in h. berol.)
41. L. SALVIÆFOLIA (Jacq.! hort. schœnbr. 3 p. 18. tab. 285), canescens, subter pube glanduloso-punctata, ramis tetragonis scabris, junioribus pedunculisque strigosis, foliis oppositis ternisque oblongo-ovatis e basi leviter cordatâ in petiolum brevem cuneato-productis acutis grosse crenatis lineatis reticulato-rugosissimis supra scaberrimis subtus tomento canescitibus, pedunculis filiformibus folium subæquantibus longioribusque, capitulis hemisphaericis in spicam elongandis, bracteis herbageis squarrosis ovato-oblongis acuminatis margine revolutis strigoso-pubescentibus interioribus corollâ fere duplo brevioribus, externis majoribus involucrantibus, calyce laxo tubo corollæ triplo breviore. ♂ Ad caput B. Spei, in siccis saxosisque graminosque montosis, alt. 1000-4000 ped. (Burchell n. 2055! Drège! Ecklon et Zeyher! Krebs!). L. violacea Desf. (ex ipso hort. par. ed. 3 p. 392). Planta tota indumento depresso insigne modo canescens. Folia 1-1½-pollinaria, nervis supra impressis reticule integro subtus valde prominente; tomentum paginæ inferioris densum breve tonsum, neque hirsutum. Capitula inter anthesin sensim elonganda denique sæpe longe spicata, bracteis auctis, in inferiori parte imbricatis. Bracteæ 5-nerviæ, herbaceæ, firmulae, neque membranaceæ citoque exarescentes. Calyx latus, lineam fere longus, leviter bifidus, pubescens, ciliatus. Corolla lilacina, tubo subcylindrico leviter incurvo pubescente 3 lin. metiente. Drupa pisiformis, violacea. (v. v. c. et s. sp. in h. DC. et berol.)
42. L. LUNDIANA (Schauer in fl. bras. ined.), ramulis tetragonis pedunculisque villosis, foliis oppositis ovatis acutatis basi coarctatâ anguste cuneatâ in petiolum decurrentibus crenulato-serratis lineatis rugosissimis supra villosa-hirtis subtus tomento sublanata canescitibus, pedunculis folio brevioribus, capitulis ovoideis mox in spicam cylindricam laxe imbricatam elongandis, bracteis membranaceis ovatis tenuiter acuminatis 5-nerviis pulvereo-glandulosis villosulis ciliatis coloratis tubo corollæ brevioribus. ♀ In Brasilie prov. S. Pauli et Minarum (Ackerm.! Riedel! Lund!). Frutex 2-4-pedalis, ramosus. Folia 6-8 lin. lata, pollicem circ. longa. Bracteæ rubro-fucatae, infimæ majores capitulum virginatum involucrantes. Cor. rubescens. Variat indumento crebriore et rario subitus canescente et candicante, bracteis floribusque majoribus et miuoribus. (v. s. h. cæs. petrop., Mart. et DC.)
43. L. VIBURNOIDES (Vahl symb. 1 p. 45), ramis subhexagonis pedunculisque hirtis, foliis oppositis elliptico-ovatis in petiolum brevem coarctatis acuminatis grosse serrato-crenatis rugosis supra hirta-scabris subtus canescenti-villosis glanduloso-punctatis, pedunculis axillaribus firmis superne incrassatis patentibus, capitulis hemisphaericis spicato-elongandis, bracteis oblongis acuminatis, interioribus corollæ tubum subæquantibus, extimus lanceolatis majoribus. ♀ In Abyssinia Adœnsi, ad radices montis Scholada (Schimp. herb. abyss. sect. 1 n. 257!), in Arabia Felicis monte Barah (Forsk.). Charachera viburnoides Forsk. descr. p. 116. Lippia Schimperi Hochst.! in herb. Schimp. l. c. L. albæ proxima, ut ægre distinxerim, sed bracteæ extimæ minores angustiores, corolla miuor, tubo 2 lin. longo, limbo per exiguo vix lineam diametro æquante. Calyx

brevissimus, sericeo-pubens. Corolla puberula. Drupa succosa, putamine osseo sulcato-exsculpto. (v. s. in h. DC.)

44. *L. ALBA* (Miller ex Link! eum. pl. hort. Berol. 2, p. 126), stricta, ramis virgatis cum pedunculis tetragonis hirtisque strigosis, foliis oppositis brevipetiolatis elliptico v. subrotundo-ovatis subcordatis utrinque acuminatis grosse serrato-crenatis valde rugosis supra hirto-scabris subtus canescens-villosis, pedunculis axillaribus firmis superne incrassatis patentibus, capitulis hemisphaericis spicato-elongandis, bracteis obovato-subrotundis vel elliptico-ovato-acuminatis, tubum corollæ semiæquantibus, extimis involucrataribus foliacies patentissimis. ♂ In India orientali, ad Mysore (Roxb.), in montibus Himalayensibus (Royle!), ad Djellalpour (Jacquem.) et in montibus Nilghirensibus ad Subatta, Knigerabad alt. 4000 ped. (Edgeworth!), copiose circa Kotirgberis in Nilghiris (Perrottet! Lescheaule!) — Desf. cat. h. par. ed. 3 p. 392. L. Indica Roxb! flor. ind. ed. 1832, 3 p. 89. Wall. cat. n. 1823! L. Wightiana Wall. cat. n. 2655! L. dubia Royle! ill. of Himal. pl. 300 t. 73, fig. 3. L. collina Decneis in Jacquem. voy. part. bot. p. 136 t. 141 (eiusdem ic. solum vidi). L. leucantha hort. L. latifolia Tausch in Florâ 19 p. 391. Frutex 3-6-pedalis, habitu virgato. Pedunculi jam foliis breviores jam longiores. Bracteæ dorso strigosæ ciliatae. Calyx bifidus hirtus ciliatus. Corolla extus hirtello-villosa, alba, fauce flava, tubo 3 lin. longo, limbo explanato 2 lin. diam. lato. Spicæ fructiferæ oblongæ, confertæ. Drupa atrovioletacea pisi magnitudine. (v. v. c. et s. sp. in herb. DC.)
45. *L. RADULA* (Sw. prodr. 92 et fl. Ind. occid. 2, p. 1057), ramis patentibus tetragonis sulcati pedunculisque hispidis, foliis oppositis ovatis aut subrhombeo vel subrotundo-ovatis in petiolum brevem coarctatis acuminatis grosse crenatis reticulato-rugosissimis supra scabro-bispidis hirsutis subtus hirsutis dense glanduloso-punctatis crescentibus, pedunculis axillaribus singulis geminis v. folium subæquantibus, capitulis squarrosis globosis deinceps oblongo-spicatis relaxatisque, bracteis ovatis cuspidato-acuminatis utrinque substrigoso-hispidulis laxis reclinatis undatis tubo corollæ brevioribus, extimis majoribus. ♂ In silvis et silvicis siccis prov. Bahiensis Brasiliæ (Siber! Mart. Lund! Blanchet! n. 116 et 2365); in ins. Trinitatis (Sicber! fl. trin. n. 168), S. Vincentii et Dominicæ (Sw.). Frutex humilis, inferne sæpius decumbens et radicans, foliis, indumento, inflorescentiâ laxâ insignis. Bracteæ submembranaceæ, flavescentes. Corolla alba vel dilute rosea. (v. s. in h. Mart. et DC.)
46. *L. UNDULATA* (Sebrank! Denkschr. bot. Ges. Regensb. 2 p. 56), suffruticosa caulinis strictis tetragonis sulcati cum pedunculis scabris hispidulis, foliis oppositis ternis ovatis vel ovato-oblongis in petiolum brevissimum coarctatis acuminatis crenatis membranaceis reticulato-rugosissimis supra nitidis scaberimis subtus pallidis paginâ dense resinoso-punctatâ reti parce striguloso, pedunculis axillaribus geminis singulise folium subæquantibus, spicis oblongis valde elongandis et relaxandis, bracteis squarrosis membranaceis pallidis reclinatis undulatis ciliatis, infimis majoribus subrotundo-ovatis, superis oblongis basi attenuatis cuspidatis inflexis, corollæ labio inferiore porrecto. ♀ ♂ Vulgaris uti videtur, in Brasiliâ, in primis in prov. Bahiensi (Salzm! exs. n. 429, Blanchet! exs. n. 218, 631, 2365 et 3137, Luschn! in Mart. herb. fl. bras. n. 1031! Sell! Khotzky!), tum in prov. Sebastianop. in Ilha-Princesa (Guillem. n. 600) et ad fretum S. Catharinæ (Cham.!). L. trifolia Cham. in Linn. 7 p. 124 (ex parte). Sequenti proxima et similissima, sed habitu quadam singulari præcipue et foliis tenuiter membranaceis nitidis subtus valde glandulosis, indumento parco, spicis laxis squarrosis bracteisque pallidis primo vultu insignis. Caules suborygales. Corolla alba. Variat rarius indumento uberiore, tum etiam corollâ minore tubo bracteam paullo, et majore tubo bracteam plus duplo excedente. (v. s. in h. r. berol., Mart. et DC. et folium siccum ex horto Monac. in h. Mart.)
47. *L. TRIFOLIA* (Linn. sp. pl. p. 873), suffruticosa, caulinis strictis hexagonis

pedunculisque quadrangularibus strigilosis hirtis hirsutisve, foliis oppositis ternis quaternisve ovatis oblongis utrinque attenuatis acuminatis crenato-serratis reticulato-rugosissimis supra scaberrimis vel strigoso-pubescentibus subtus pallidis resinoso-punctatis tomento que hirtello canescensibus, pedunculis axillaribus singulis folium subaequantibus, spicis oblongis valde elongandis, bracteis herbaceis ovatis cuspidato-acuminatis 5-nerviis strigosis laxe imbricatis, superioribus tubum corollæ cuspide subaequantibus, corolla labio inferiore brevi, lobo medio ad faucem sessili. ♂ In apricis siccis, silvis cauduīs etc., in insulis Caribea ex. gr. Cuba (H. et B., Ram. de la Sagra!), Jamaica (Murray!), Dominicā (C. Ehrenb.! Bertero!); frequens in Venezuelā (E. Otto! n. 840, Moritz! n. 247 et 164); in Peruvia (Poeppig! pl. per. n. 34, pube copiosā molli); in Guianā (R. Schomb.! n. 207); in Brasiliā prov. S. Pauli, Minarum etc. (Sell.! Ackerm! Pohl! Ried! Lund! exs. n. 825, Regnell! pl. bras. exs. ser. I n. 335); ex hortis Ind. orient. denique vidi specimina a. cl. Wall.! Edgeworth! Leschen.! allata, indumento hirsuto excellētia. L. trifolia Cham.! l. c. ex parte t. 7 f. B. (fructus) Bot. mag. t. 1449. L. annua Linn. sp. p. 874. Bot. mag. t. 1022 (planta primo anno, herbacea, foliis oppositis). L. pilosa Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2, p. 260, ex descr., planta Ind. occid. hirsuta. L. celtidifolia Kunth l. c. p. 259, herb. Willd.! n. 11503 (planta pubescens macra). Camara trifolia etc. Plum.! amer. p. 58 t. 70. Stirps miro indumento lusu præcellens, quod enim nunc breve strigosum, nunc pilis rigidis patentibus hirtum aut longioribus hispidum vel hirsutum, nunc inprimis in foliis, molle, pubescens aut depresso-tomentosum et canum. Corolla parva, lilacina fauce lutea. (v. v. c. et s. sp. in h. r. berol., cas. vindob. et petrop., Mart., Sonder et DC.)

48. L. CANESCENS (Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 259), canescens, subter pube glanduloso-punctata, ramis strictis gracilibus patentibus tetragonis sulcatis pedunculisque sericeo-strigosis, foliis oppositis ovato-oblongis vel oblongo lanceolatis basi integrerrimā in petiolum angustatis acuminatis crenato-serratis lineato-rugosis supra paginā subtusque in reti sericeo-strigosis denique hirtulis paginā inferā pubescente vel subtomentosā canescente, pedunculis folium subaequantibus brevioribusve, capitulis ovoideis, bracteis laxe imbricatis patulis ovato-oblongis lanceolatibus acuminatis strigosis, interioribus corollā duplo brevioribus, extimis majoribus involucrantibus patentibus. ♂ In Americā tropicā, in regno Mexicano (Berland.! n. 2232, C. Ehrenb.! n. 1134), Venezuclā (H. et B.! herb. Willd.! n. 11504, E. Otto! n. 368, Moritz! n. 166), in Novā Granatā prope pagum Tenda prov. Bogotensis, Hartweg, n. 1355!, in Guianā (Schomb.!), in Brasiliā prov. Bahiensi (Blanch.! n. 3732, Sell.! Mart.! Pohl! Ried!). L. lamiafolia Otto et Dietr.! gartenzeit. p. 9. p. 372. Lippia pallescens Benth.! pl. Hartw. n. 245. Frutex mediocris, aromaticus (« Roman-ceta » incolis Venezuclæ), indumento nunc magis holosericeo-strigoso et candide nunc magis strigoso-hirtello et scabrido. Capitula inaeunte anthesi hemispherica pisi majoris mole, deinceps ovoideo-oblonga, imbricata. Corolla alba fauce lutea. Fructus maturus fere exsuccus, vix grani sinapis mole, putamine osseo costato-rugoso, coccis concretis. (v. v. c. et s. sp. in h. r. berol., cas. vindob. et petr., Mart. et DC.)

† *Species adhuc recognoscendæ.*

49. L. LIPPIOIDES (Spr. syst. veg. 2, p. 763), foliis parvis oblongis utrinque attenuatis subdentatis venosis subtus ramisque pilosis, capitulis hemisphaericis, bracteis spathulatis tubum corollæ aequantibus. ♂ In Brasiliā (Sellow).
50. L. PARVIFOLIA (Desf. cat. hort. par. ed. 3, p. 392), fruticosa, erecta, foliis ovato-ellipticis obtusis crenatis pubescentibus cinereis, pedunculis axillaribus folio longioribus, floribus capitatis. ♂ Patria? Bracteæ ovatae obtusæ pubescentes.
51. L. PARVIFOLIA (Rafin. herb. p. 21), ramis virgatis obtuse angulatis apice puberulis, foliis oppositis petiolatis ovato-oblongis parvis crenatis subacutis

supra transversim rugosis subtus tomentosis, capitulis folio brevioribus paucifloris, bracteis imbricatis ovatis integris. ♂ In Texas maritimis.

52. *L. MOLLIS* (Grah. descr. new plants etc. jun. 1829 p. 7 in Edinb. new phil. journ. July 1829), inermis, foliis oppositis cordato-ovatis acuminatis crenato-serratis utrinque pubescentibus pedunculo longioribus, bracteis cordato-ovatis acutis. ♂ In Mexico. Folia 3 poll. longa, pollicem lata. Capitula plana, pedunculis pubescentibus 6 lin. longis. Bracteæ extus præsertim pubescentes. Calyx parvus, subbilabiatus, extus pubescens, labii integris. Corolla ubique pubescens facie sup. limbi exceptâ. Tubus 3 lin. longus, purpurascens, basi albidus. Limbus tubo brevior, roseus, fauce luteus, lobo externo longiore obcordato, interno latiore emarginato. Stylus calyce longior.
53. *L. MULTICOLOR* (Ch. Lemaire in fl. serr. et jard. juin 1847, misc. n. 7), sufrutex inermis elatus totus hirto-villosus basi inflato-tuberculatus, ramis tetragonis faciebus sulcatis, foliis distantibus amplis ovato-lanceolatis crenato-serratis mox scabris, pedunculis ternatis gracilibus rigidis tetragonis folia (sine petiolis) subæquantibus versus apicem bibracteatis, involucre 4-phyllo bracteolas æquante et concolore, bracteis maximis cordato-rotundatis apice subacutis coloratis intus basi villosis, floribus vix æqualibus pluri-versicoloribus, calyce villoso, cor. tubo subtetragono intus villoso, lobis subrotundatis. ♂ E semin. Mexicanis culta in h. Belgicis. Folia 6-8 poll. longa, 3-5 poll. lata. Bracteæ roseo-kermesinae. Flores bicolores, ter variantes. Stigma lateraliter insertum, rotundatum, verrucosum.

† † *Planta omnino dubia, e genere expellenda.*

54. *L. RACEMOSA* (Lour. fl. cochinch. ed. Willd. 2, p. 457), foliis oppositis subrotundis, caule arboreo inermi, racemis terminalibus. ♂ In silvis Cochinchinæ, ubi ejus lignum cæditur pro ædificiis (Lour.). Arbor magna, ramis patentibus. Folia subrotunda, acuminata, integerrima, plana, glabra, dura, obscure viridia, subtus albantia, petiolis longis basi glandulosis. Flos albus, magnus, racemis compositis, nudis, vastis, terminalibus. Calyx subtruncatus, denticulis 4-5 minimis. Corolla campanulata, 5-fida, subæqualis. Drupa carnosa, turbinata, compressa, apice retusa, nucleo biloculari. Stamina didynamica. — Gmelinæ videtur species.

*Species exclusæ.*

- L. ABYSSINICA* Otto et Dietr. = *Lippia Adoënsis*.  
*L. ACHYRANTHIFOLIA* Desf. = *Lippia purpurea*.  
*L. AFRICANA* Linn. = *Spielmannia Jasminum*.  
*L. BRACTEOSA* Martens et Gal. = *Lippia callicarpæfolia*.  
*L. CAPENSIS* Thunb. = *Spielmannia Jasminum*.  
*L. CRISPA* Thünb. = *Spielmannia Jasminum*.  
*L. GEMINATA* Spr. = *Lippia geminata*.  
*L. LAVANDULACEA* Willd. = *Lippia asperifolia*.  
*L. LIPPIOIDES* Hook. et Arn. = *Lippia geminata*.  
*L. LOCKHARDTI* D. Don. = *Lippia Chamissonis*.  
*L. MOLLISSIMA* Desf. = *Lippia geminata*.  
*L. ODORATA* Weig. = *Lippia geminata*.  
*L. ORIGANOIDES* Martens et Gal. = *Lippia graveolens*.  
*L. PSEUDO-THEA* S. Mill. = *Lippia Pseudo-Thea*.

Subtribus VI. *DURANTEÆ*.

Flores laxè racemosi. Calyx tubulosus vel cyathimorphus, fructiger valde

auctus. Corolla hypocraterimorpha aut campanulata. Drupa 2-4-pyrena, pyrenis bilocularibus.

XIV. CITHAREXYLUM Linn. gen. n. 760, Juss. gen. p. 108. Endl. gen. n. 3706.  
Meisn. gen. p. 291 et comm. p. 199. P. Browne jam. t. 28 f. 2. Gertn. de fruct. 1  
p. 270 t. 56. Lam. illustr. t. 545. Jacq. hort. schœnbr. t. 417. icones rar.  
t. 118, 501. Vent. hort. Cels. t. 47. Hook. et Arn. bot. Beech. p. 58 t. 11. —  
Rauwolfia R. et Pav. fl. peruv. 2 p. 26 t. 152, non Linn. — Poeppigia Bertero in  
bullet. sc. nat. oct. 1830 p. 109.

Calyx cyathimorphus, interdum subtubulosus, breviter 5-dentatus aut subtruncatus, persistens. Corolla obconico-campanulata vel hypocraterimorpha, limbo 5-partito subæquali, fauce sæpeque et limbi facie villosâ aut lanuginosâ. Stamina 5, filamentis brevibus infra fauces corollæ inserta, inclusa, subæqualia aut quintum reliquis ( interdum subdidynamis ) paulo inferius, seu omnia seu 4 tantum fertilia, quinto tunc rudimentario aut omnino abortivo. Antheræ sagittatæ, introrsæ, erectæ. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, calyce paulo longior aut brevior, apice interdum incrassatus, stigmate apicali emarginato. Drupa succosa, calyci aucto et indurato cupulæformi subtensa, dipyrena, pyrenis bilocularibus, putamine et dissepiamento osseo. Semen erectum. — Arbores aut frutices Americae tropicæ et subtropicæ, ramis tetragonis interdum spinosis, foliis oppositis verticillatis integris basi sæpius glandulosis, floribus parvis racemosis singulisque bracteolâ minutâ subtensis, rhachi filiformi.

\* *Racemis nutantibus.*

1. C. ILCIFOLIUM (Kunth ! in H. B. nov. g. et sp. 2, p. 256), ramulis quadrangularibus racemisque hirtello-pubescentibus, foliis elliptico-oblongis brevissimum acuminatis obtusis mucrone spiraceo terminatis integerrimis vel spinoso-dentatis coriaceis margine revolutis supra glaberrimis lucidis subtus punctatis, racemis terminalibus brevibus, calyce cyathimorpho 5-nervi subpentagono brevissime 5-dentato, corollâ tubo calycem paulo excedente. ♂ In regno Quitensis prope Quito, Chillo, Riobamba et Penipe alt. 1300-1500 hex., Zizas incol. (H. et B.! herb. Willd. n. 11669! Duranta ilicifolia). Frutex 2-3-orgyalis, ramosissimus, inermis. Folia subpollicaria, juniora subtus in nervis prominentibus pubescentia, adulta glabrata; dentes mucrone pungente spinosæ. Cor. alba, lacinias facie fauceque pilosis. Drupa pisi magnitudine, calyce suffulta. (v. s. in h. Willd.)
2. C. DENTATUM (D. Don.! in Edinb. phil. journ. 11, p. 237), ramulis marginato-quadrangularibus racemisque hirtello-pubescentibus, foliis obovato-oblongis ellipticis in petiolum brevem attenuatis apice acuto lato terminatis integerimis vel acute dentatis rigide coriaceis margine revolutis utrinque punctatis scabridisque subtus vernicoso-nitidis pallidis opacis, racemis terminalibus brevibus, calyce cyathimorpho 5-7-nervio acute 5-7-fido, corollâ tubo calycem dimidio excedente. ♂ In Peruvia ad Maccos (Ruiz!). Rauwolfia dentata Tafalla! mss. in h. Ruiz. Habitat simillima C. ilicifolia, tamen foliis rigidioribus scabridis acute quidem et rigide neque vero spinoso-dentatis, calyce profundius fisso distincta. Calyx brevipedicellatus, 2 lin. fere longus. Cor. externe glabra, facie circa fauces villosa. (v. s. in h. reg. berol.)
3. C. CYANOCARPUM (Hook. et Arn.! in Beech. voy. 58 t. 11), ramulis teretibus subangulatis hirtulo-pubescentibus, foliis coriaceis oppositis ternis ovatis subcordatilis brevissime petiolatis acutis mucronulatis integerrimis margine revoluto glabris nitidis subtus impresse punctulatis, spinis axillaribus simplicibus subulatis, pedunculis axillaribus brevissimis subtrifloris, floribus pedicellatis, calyce campanulato-sinuato 5-dentato, corollâ tubuloso-infundibulari calyce multo longiore. ♂ Ad sylvarum oras, secus rivulos, in collibus ad

*Quillota Chilensis* (Bert. l. n. 1258, Cuming! Dombev! n. 250), in insula Juan-Fernandez (Bert.! Gay!). *Peppigia cyanocarpa* Bert.! bull. sc. nat. 1830 p. 109. *Volkameria verticillata* R. et Pav.! herb. Nomen vern. « *Arrayan-macho* » *Frutex ramosissimus*, spinis nunc validis 1-1½ poll. longis, nunc brevibus immo obsoletis. Folla ½-1 poll. longa, 4-9 lin. lata, præter costam supra impressam subtus prominulam interdum pubescentem glabra, lœvia. Calyx 1-2 lin. longus, cum corollâ ipso subsexies longiore subtilissime striolloso-pubescentis. Stamina didynamia inclusa. Drupa calyce tecta, pisi magnitudine, cœrulea. (v. s. in h. DC. et r. Berol.)

4. *C. SPINOSUM* (Kunth! in H. B. n. gen. et sp. 2, p. 256), ramis tetragonis striatis junioribus pubescentibus, spinis axillaribus subulatis interdum foliatis, foliis oblongis subellipticis obtusis mucronulatis in petiolum brevem acuminatis integrerrimis venoso-reticulatis subrugosisque supra demum glabratris nitidis subtus pallidis et magis minusve pubescentibus, racemis axillaribus paucifloris brevibus laxis pubescentibus, calyce campauulato meunbranaceo 5-nervi obtuse 5-dentato, corollæ tubo calycem subæquante. 5 In Andibus Peruvianis, in convalli Caxamarcensi et in radicibus Parami de Yanaguanga alt. 1500 hex. (H. et B.!, h. Willd. n. 11667!) et in fruticetis ad Huancue cœt. (Ruiz!). Duranta buxifolia h. W.! *Rauwolfia flexuosa* Ruiz et P.!. fl. per. 2 p. 26. t. 152. f. a., fide spec. Ruiz. *C. flexuosum* D. Don new Edinb. phil. journ. 11. 273. *Rauwolfia macrophylla* R. et P.!. l. c. (fide spec. Ruiz fruct.). *C. retusum* D. Don l. o. formam exhibit majorem, spinis validioribus, foliis obovato-oblongis, floribus paullo majoribus. — Rami vegeti flexuosi, lateribus foliis subjectis striatis marginatis alternis leviter canaliculatis. Folia 1½-2 poll. longa, 6-9-12 lin. lata, pube paginae infrafæc nunc crebre subtomentosæ, nunc rarioe. Calyx duabus lineis paullo brevior. Cor. flavescens, tubo lato-eyatbimorpho, limbo 5-partito lobis rotundatis ciliatis, facie fauceque pilosis. Drupa nigra omnino generis. (v. s. silv. in herb. Willd. et r. Berol. et cult. ex hort. paris. in herb. DC.)

5. *C. BARBINERVÆ* (Cham.! in Linnaea 7, p. 116), ramulis tetragonis glabris spinis axillaribus munitis, foliis obovatis vel elliptico-lanceolatis acutis obtusis retusis in petiolum attenuatis subintegerrimis utrinque resinoso-punctatis supra glabris nitidisque subtus pallidis et juxta petiolum foveolatis nervis pilosis ètate glabratris, axillis nervorum barbatis, racemo terminali laxifloro nutante, rhachî calyceque subsessili irregulariter rotundato-lobato pubescentibus, corollæ tubo calycem subæquante, fauce oreque subvillosis. 5 In Brasilâ meridionali et republicâ Montevidensi (Sell.!). *Ehretia Montevidensis* Spreng.! syst. veg. 1, p. 647 (ex sched. autogr. in h. r. Berol.). Spinæ validæ ad summum pollicares. Folia pergamentacea, rarius superno dente uno altero acuto incisa, 2-3-pollicaria. Racemi 3-4-pollicares. Cor. alba, pentandra. (v. s. in h. r. Berol..)

6. *C. VILLOSUM* (Jacq.! icon. rar. 1 t. 118), ramulis subtetragonis striatis racemisque hirtello-pubescentibus, foliis lanceolatis ellipticis obovatissimis in petiolum ad laminam utroque latere glandulosam attenuatis acutiusculis obtusisve mucronatis emarginatis integrerrimis aut superne remote paucidentatis coriaceis reticulato-venosis supra demum glabratris scabridis nitidis subtus hirtello-subvillosis, racemis terminalibus axillaribusque laxifloris nuntantibus, floribus subsessilibus, calyce subtruncato obsolete repando-dentato, corollæ hypocraterimopha tubo calycem duplo excedente, fauce oreque villosis. 5 In Indiâ occidentali, Dominicâ (Jacq. Bertero!), Cubâ (Ram. de la Sagra!), S. Thomâ (Bert.! C. Ehrenb. l. n. 198). — Jacq. collect. 1. 72. Herb. Willd. n. 11477! fol. 3 ex h. Schœnbr. Foliorum figurâ et indumenti copiâ valde variabilis. Pube enim nunc fere totâ canescit, nunc vero in ramulis et foliorum facie fere glabrescit. Folia angusta hinc lanceolata illinc obovato-elliptica, subtus molliter villosa vel hirtello-scabrida. Calyx membranaceus, pubescens, 1½-2 lin. longus. Corolla externe glabra, tubo subcylindrico, limbo explanato.

Stamina 4, quintum antherum. Drupa ellipsoidea, calyce 5-lobo basi subtena. Habitu proxime ad *C. pentandrum* accedit. (v. s. c. et sp. h. DC.)

7. *C. MOLLE* (Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2, p. 257), ramis 4-angulis striatis verrucosis glabris, foliis obovatis in petiolum cuneato-attenuatis acutis obtusisive submucronatis integrerrimis membranaceis reticulato-venosis supra glabris subitus molliter pubescentibus subcanezentibus, racemis terminalibus solitariis nutantibus rhachis glabratâ, calyce puberulo obsolete et inæqualiter 5-dentata, corollâ hypocrateriomorphâ tubo calyce duplo longiore fauce villosâ. ♂ In locis humidis prope Quayaquil Quitensium (H. et B.). *C. Quitense* Spr. syst. 2, p. 763. Proxime *C. villosa* Jacq. Arbuscula 1-2-pollicaria. Folia 3 poll. circ. longa, 1½-2 poll. lata, petiolo 3-4 lin. longo puberulo. Flores brevisimè pedicellati, sparsi, approximati, magn. floris *Myosotidis* scorpoidis. Calyx urceolato-campanulatus, sub-5-nervius membranaceus, dentibus abbreviatis rotundatis. Corolla albo-flavescens. Stamina subdidyma.
8. *C. AFFINE* (D. Don in Edinb. new phil. journ. 11, p. 238), ramis quadrangularibus, foliis ovato-vel oblongo-lanceolatis utrinque acutis petiolatis integrerrimis membranaceis penninerviis lineatis utrinque glabratâs et opacis subitus pallidis tenuissime reticulatis, racemis terminalibus multifloris laxis nutantibus, calyce cyathimorpho membranaceo 5-nervoso-angulato ex ore truncato ciliato brevissime 5-dentato, corollâ tubo calycem paulo excedente. ♂ In regno Mexicano pr. Chalco in dit. Mexici (Andr.! pl. mex. n. 135). Species foliis opacis discoloribus pinnatim nervosis neque minus flore insignis. Folia 2-pollicaria. Spicæ 4-5-pollicares. Calyx sesquilineam longus, præter marginem pubescentem glabratus. Drupa obovoidea atropurpurea calyce cupuliformi sæpius subcolorato subtensa (v. s. in h. DC.)
9. *C. CINERETUM* (Linn. sp. plant. p. 872), ramlulis subtetragono-teretiusculis striatis, foliis suboppositis subverticillatis ternis lanceolato-oblongis acuminate basi attenuatis integrerrimis supra glabris nitidis subitus pallidis in nervis puberulis et ad eorum axillas hirtello-barbulatis, petiolo mediocri ad laminam grosse glanduloso, racemo terminali multifloro elongato pendulo plerumque simplici, floribus sessilibus pentandris, rhaci et calyce subtilissime puberulis, hoc breviter sæpeque inæqualiter rotundato dentato subciliato, corollæ tubo calyce duplo longiore; fauce oreque villosa. ♂ In Jamaicâ (P. Br.), Martinicâ (Jacq. *Bois côtelet* incol.), Brasiliâ (Mikan!). *C. teres* Jacq.! stirp. amer. 185 t. 118. — Pluken. alm. 108 t. 162 f. 1. Plum.! icon. t. 157 f. 1. Arbor subvigintipedalis, cerosa. Folia subchartaceo-membranacea 5-6-pollicaria. Racemus 6-9-pollicaris. Calyx cyathimorphus, 2 lin. longus, membranaceus, obsolete 5-nervis. Corolla alba, fragrans. Sequenti simillimum et caute distinguendum. (v. v. c. et s. sp. in h. cas. vindob. et DC.)
10. *C. QUADRANGULARE* (Jacq.! stirp. am. et hort. vindob. t. 22), ramis ramulisque acute quadrangularibus striatis, foliis suboppositis ellipticis utrinque acuminatis integrerrimis subrepandis adultis glabris supra nitidis subitus pallidioribus, petiolo ad laminam leviter glanduloso-foveolato, racemis terminalibus multifloris nutantibus simplicibus paniculatis, floribus brevipedicellatis tetrandris, rhachi et calyce obsolete dentato villoso-ciliato glabriusculis, corollâ brevitubulosâ, fauce oreque villosa. ♂ In sylvaticis et ambulacris Martinicæ, ubi incolis *Bois côtelet carré* (Jacq. Sieber! fl. mart. n. 156), et Guadeloupe (Perrottet!). *C. cinereum* β Lam. *C. coriaceum* Desf. cat. hort. par. ed. 3, p. 392? *C. caudatum* Sw. prodr. p. 234, non L. Sieber l. c. Arbor 20-pedalis. Folia 4-6-pollicaria, petiolo ¼-⅓-pollicari, juvenia subitus pubescentia, deinceps plerumque glabrescentia. Racemi 3-6 uncias longi. Calyx 1½ lin. longus, membranaceus, subnervosus. Corolla alba, tubo circ. 2 lin. longo, limbo ad fauces conspicue barbato. Drupa obovata, 4-5 lin. longa, atrorubens. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)

\*\* *Racemis erectis.*

11. *C. CAUDATUM* (L. spec. plant. p. 872), glabrum, ramis teretibus striatis, foliis ellipticis vel elliptico-oblongis in petiolum ad laminam utroque latere glandulosam angustatis obtusis subacuteis mucronulatis emarginatisve integrerrimis margine subrevolutis coriaceo-membranaceis supra lucidis subtus pallidis, racemis terminalibus axillaribusque erectis confertifloris, calyce subtruncato vel breviter et obtuse 5-dentatis, corolla cyathimorphâ puberulentâ tubo calycem paulo excedente. ♂ In Jamaicâ (Sloane, P. Br. Jacq., Tussac!), in silvis ad Xalapan Mexican. (Schiede! n. 128). *C. erectum* Jacq. ic. pl. rar. 3 t. 501. Sloane hist. jam. 99 t. 206. f. 3, 4. P. Brown jam. 265 t. 28. f. 2. *C. lucidum* Cham.! in Linnaeâ 5, p. 97 et vix in D. Don. in Edinb. phil. journ. 11, p. 238. *C. Chamissonis* Walp.! repert. 4, p. 75. Folii lamina 4-6 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. et quod excedit lata, petiolo semunciali. Racemi interdum compositi. Flores odoratissimi (Schiede). Calyx cyathimorpho-campanulatus, sesquilineam longus, membranaceus. Corolla utrinque pulvрerulento-tomentosa, limbi lacinii ellipticis obtusis. Stamina 4. (v. s. in h. DC.)
12. *C. MYRIANTHUM* (Cham.! in Linnaeâ 7, p. 117), ramulis subangulatis, foliis suboppositis subverticillatis ternis lanceolato-oblongis acutis basi attenuatâ in petiolum decurrentibus integerrimi supra subscabridis subtus pallidioribus et in reti tenuiter hirtellis opacis, petioli brevis glandulis pelviformibus, racemis subsecundis elongatis erectiusculis paniculatis, floribus pedicellatis nutantibus, rhachi et calyce 5-nervi breviter rotundato-dentato ciliato strigilloso-pubescentibus, corolla subhypocraterimorphâ tubo calyceter longiore, fauce puberulâ. ♂ In Brasilâ æquinoctiali prov. Sebastian. et Bahiensi (Sell.! Mart.! Ried.! Siber!). *C. scabrum* Willd. h. n. 11475! Folia 5-6-pollicaria, subcoriacea. Racemi 4-8-pollicares. Calyx subcylindrico-cyathimorphus membranaceus, herbaceo-vittatus,  $2\frac{1}{2}$  lin. longus. Cor. alba. (v. s. in h. r. ber., cæs. petrop., Mart. et DC.)
13. *C. PÆPPIGII* (Walpers! repert. 4, p. 76), ramis ramulisque obsolete tetragonis, his cum rhachibus panicula lanuginosis, foliis oppositis verticillatis ternis subovato-oblongis acuminatis abrupte in petiolum decurrentibus integerrimi grosses penninerviis supra nitidulis subtus pallidis opacis et imprimis juxta nervos lanuginoso-pubescentibus, petioli glandulis pelviformibus lateribus, spicis subæqualibus confertis elongatis paniculas patentes axillares et terminales struentibus, calyce sessili enervi brevissime et obtuse dentato subtilissime puberulo, corolla hypocraterimorphâ tubo calyce duplo excedente, fauce lanuginosa. ♂ In Brasilâ juxta flumen Solimoers pr. Egam (Pœppig.! exs. n. 2119 et 2910). Arbor uti videtur valida. Folia amplia, laminâ octopollicari, coriacea. Calyx obconicus,  $1\frac{1}{2}$  lin. longus. Precedenti sane proxima, sed magnitudine partium et pube farinaceo-afflatâ spicisque uberrime distincta; habitu etiam sequenti simile, quod vero jam pube stellata differt. (v. s. in h. r. berol. et DC.)
14. *C. RUGENDASII* (Cham.! in Linnaeâ 7 p. 120), tetrandrum, ramis tetragonis cum rhachi petiolis foliorumque tergo tomento molli stellaris canescensibus, foliis ovato-oblongis breviter angusteque acuminatis basi rotundata abrupte in petiolum decurrente supra preter nervum medium glabris nitentibus, petiolo ad laminam subtus glandulifero, racemis terminalibus paniculatis erectis laxis, calyce subsessili hirtello dentibus parvis late triangularibus acutis, corolla tubo obconico calvem superante limbo exiguo pubescente fauce barbatâ. ♂ In Mexico, ad Xalapam (Schiede! n. 84). Arbor mediocris. Folia magna, 4-8 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  poll. lata, reticulato-venosa, nervis supra impressis subtus prominulis. Panicula terminalis sessilis, e racemis 3 simplicibus aut semel iterumque trifidis. Flores parvi, alterni, confertiores. Calyx obconico-cyathiformis, membranaceus, 5-nervis,  $1\frac{1}{2}$  lin. longus. Corolla alba. Stamina subæqualia, profundius solito inserta. Stylus gracilis, stamina requans; stigma crassius emarginatum. (v. s. in h. r. berol.)

15. *C. TOMENTOSUM* (Kunth! in H. et B. n. gen. et sp. 2, p. 258), undique tomento ramoso floccoso mollis et incana, foliis ovato-oblongis utrinque acuminatis brevipetiolatis, petiolo eglanduloso, racemo terminali axillaribus erectis, calyx subsessili breviter obtuse dentato, corollæ tubo calycem vix æquante, fauce tomentoso-villosissimâ. ♂ In convalli fluminis Caucæ inter pagum Tuluam et ubem Bugam Popayanensis alt. 500 hex. Palo Blanco incol. (H. et B.! h. Willd.! n. 11476). Arbor 3-4-orgyalis, ligno albo. Folia subsemipedalia,  $2\frac{1}{2}$  poll. lata, supra pubescentia laxiori subtus vero dense tomentosâ canescens. Flores densi, suaveolentes. Calyx cyathimorphus, 2 lin. longus, utrinsecus dense vestitus. Cor. alba, limbo vix e calyce emergente. Stamina 4, antheris linearibus. Drupa pisi magnitudine (v. s. sp. orig. in h. Willd.)
16. *C. SOLANACEUM* (Cham.! c. p. 119), ramulis subteretibus cum inflorescentiâ dense villoso-tomentosis, foliis elliptico-vel oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis integerim aut superne dentibus paucis acutis truncato-incisis supra appresso-pubescentibus subtus villo subtomentoso canescens, petiolo ad laminam foveolato-glanduloso, racemo terminali erecto, calyx sub sessili mucronato-dentato, corollæ hypocraterimorphæ tubo calyce duplo longiore, fauce villosiusculâ. ♂ In Brasiliâ olim leg. Sellowius! Præcedenti simile, a quo vero eximie differt tomento simpli minus locupleti, calyce et corollâ. Folia subsemipedalia. Racemus palmaris-spithameus, plerumque simplex, interdum basi ramosus. Calyx subbulbosus-cyathimorphus, firmus, nervis exsertis, internâ pagina sericeus. Cor. tubus 5-6 lin. longus. (v. s. in h. reg. berol.)
17. *C. RETICULATUM* (Kunth in H. et B. nov. gen. et sp. 2, p. 257), ramis tetragonis striatis albidis glabris, foliis obovato-ellipticis-oblongis in petiolum brevem ad laminam utroque latere glandulosam attenuatis acutiusculis obtusis sub-acuminatis retusive integerim coriaceis reticulato-venosis præter nervos subtus tenuissime puberulos glabris supra nitidis, racemis terminalibus erectis hirtello-puberulis, calyce campanulato brevissime repando-dentato, corollæ utrinque pulverulentâ circa fauces tomentoso-villosâ tubo calycem æquante. ♂ In Andibus temperatis Peruviæ, in ripâ fl. Catamayo alt. 1080 hex. (H. et B.), in Mexico pr. Veram Crucem (Schiiede! n. 127) — Cham.! in Linnæâ 5, p. 97. *C. scariosum* Moç. et Sessé mss. ex D. Don in Edinb. phil. journ. 2, p. 238. *C. affine* Mart. et Galeotti bull. acad. brux. 11, p. 321 (ex diagn.). Folia majora in Mexicano specimine nostro  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, fere sesquipoll. lata, petiolo 3 lin. metiente; rite subtus prominulum. Racemi stricti, digitales-dodrantales, interdum compositi. Flores brevipedicellati. Calyx sessquilin. longus, 5-nervis, siccus striatus. Cor. limbus rite ad calycis orificium expansus, villo denso canescens, laciñiis rotundatis. Stamina 5, summo tubo inserta. Drupa atra, pisi mole. Planta Mexicana in deser. Kunthii omnino quadrat, si modo phrasim «venis nervo que subtus valde prominentibus» exceperis. (v. s. in h. reg. berol.)
18. *C. PENTANDRUM* (Vent.! hort. cels. p. et tab. 47), pentandrum, cinereo-pallens, ramis quadrangularibus sulcati, foliis ovato-oblongis utrinque acuminatis integerim aut grosse serratis nervosis supra nitidis scaridis subtus pubescentibus, petiolo brevi ad laminam utrinque glanduloso, racemis terminalibus solitariis erectis pubescentibus, calyx triangulari-5-dentato, corollæ tubo calycem æquante, limbo utrinque lanuginoso. ♂ In India occidentali, Portorico (Vent.), Dominicâ (C. Ehrenberg!) — Cham.! in Linnæâ 7 p. 116. *C. pulverulentum* Pers.! syn. 2 p. 142 (fide spec. ex h. Madrit.). *C. molle* Jacq. ex Spr. syst. 2, p. 764. *C. tomentosum* Poir.? Rami albido-cinerei. Folia novella supra pubescentia, adulta facie præter costam glabrata, dorso nervis prominentibus venisque reticulata,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, petiolo 3 lin. æquante utrinque maculâ glandulosâ notato. Racemus pedunculatus, bipaniculatus, æqualis. Calyx brevissime pedicellatus obconico-cyathiformis, dentibus latis acuminatis muticis. Corolla campanulata calycem limbo brevi rotundilobo excedens. Stamina 5, interdum 4, fauci inclusa. (v. v. c. et s. spont. in h. reg. berol. et DC.)

## + Species denuo recognoscenda.

19. *C. SUBSERRATUM* (Swartz fl. ind. occid. 2, p. 1043), ramis tetragonis glabris, foliis petiolatis ovatis ellipticis vel obovatis apicem versus remote subserratis rarius integerrimis supra lucidis utrinque glabris, racemis terminalibus folio longioribus simplicibus compositive, racemulis filiformibus nutantibus, floribus brevipedicellatis approximatis, calyce pubescente bilabiata 5-fido, corollæ tubo cylindrico calycem paulo excedente, fauce albo-villosâ. ♂ Crescit in campis sterilibus Cuba insulæ (Sw.). Frutex biorygalis glaber. Folia membranacea, rigida. Petoili semipollicares. Corollæ limbi subæqualis laciniaæ 2 superiores suberectæ, tribus inf. patentibus oblongis. Drupa bacata, maturata rubra.
20. *C. SESSEI* (D. Don in new Edinb. phil. journ. 11, p. 238), foliis ovatis acuminatis subtus pubescens, spicis elongatis nutantibus, ramis tetragonis. ♂ In Mexico. *C. quadrangulare* Moç. et Sessé mss. ex D. Don. Folia 1½-3-pollicaria; membranacea, pubescens, supra demum nudiuscula, pinnatim nervosa, basi obtusiuscula. Spicæ palmares. A *C. puberulenta* et quadrangulo omnino diversum (Don), sed *C. villosa* ut videtur proximum.
21. *C. MOÇINI* (D. Don 1. c.), foliis obovato-lanceolatis acuminatis subtus tomentosis basi rotundatis, spicis elongatis pendulis. ♂ In Mexico. Folia ampla ovo-lanceolata acumiata integrerrima coriacea, supra glabra nitida, subtus cum ramulis dense fulvescenti-tomentosa, dodrantlia. Spicæ tomentosæ pendulae pedales et ultra. Calyx pentagonus, denticulis prominentibus (Don). *C. Rugendasii* proximum, ut ex descr. non differat nisi spicis pendulis.
22. *C. INCANUM* (Sessé et Moç. mss. ex D. Don 1. c.), foliis ovatis acutiusculis basi attenuatis serratis rariusve subintegerrimis subtus ramulisque cinereo-pubescentibus, spicis erectis, calycibus inæqualiter 5-dentatis, dentibus recurvatis antico et postico majoribus. ♂ In Mexico. Spicæ 1½-3 pollicares. Petoili semiunciales.
23. *C. SCABRUM* (Moç. et Sessé mss. ex D. Don 1. c.), foliis ellipticis mucronulatis subtus dense cinereo-tomentosis supra scabris, spicis erectis secundis, calycibus inæqualiter 5-dentatis, dentibus recurvatis antico productione. ♂ In Mexico. Folia 2-3-uncialia, basi acuta, petiolo semiunciali. Spicæ erectæ, semipedales.
24. *C. ELLIPTICUM* (Moç. et Sessé mss. ex D. Don 1. c.), foliis subsessilibus obovatis oblongisque retusis mucronulatisque costatis scabris, spicis erectis multifloris, ramis tetragonis. ♂ In Mexico. Folia pollicaria. Spicæ triunciales.
25. *C. LYCIOIDES* (D. Don 1. c. p. 237), foliis linear-lanceolatis obtusis integrerrimis glabris, racemis paucifloris, calycibus integris. ♂ In Mexico. Frutex inermis virgatus. Ramuli cortice cinereo-albione tecti. Folia margine integrerrimo parum revoluta, vix uncialia. Drupa nigra.
26. *C. BERTERII* (Spreng. syst. veg. 2, p. 763), ramis teretiusculis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis glaberrimis, racemis erectis elongatis, calycibus truncatis. ♂ Crescit in Jamaicâ.

*Species exclusæ.*

- C. ALPINUM* Poepp. = *Verbena cinerascens*.  
*C. MELANOCARDIUM* Sw. = *Petitia Domingensis*.  
*C. PANICULATUM* Poir. = *Pramna integrifolia*.

XV. DURANTA Linn. gen. n. 186, Juss. gen. p. 109, Endl. gen. n. 3709, Meisn. gen. p. 200 et comment. p. 199. Jacq. stirp. amer. p. 186 t. 176 f. 76 et icon. rar. t. 502, Göttr. de fruct. 1p. 272 t. 57, Lam. illustr. t. 545, Bot. reg. t. 244, Bot. mag. t. 1759.—Ellisia P. Browne jam. t. 29 f. 1, non Linn. —Castorea Plum. icon. t. 79.

Calyx sub anthesi tubulosus, 5-costatus, subuplicatus, costis in dentes 5 subulatos super os subtruncatum exsertis, dente postico minore. Corolla subhypocrateriformpha, tubo calycem excedente superne leviter incurvo, limbo expanso 5-fido, lacinii rotundatis inaequalibus cum faucibus pubescens. Stamina 4, didynama, inclusa, filamentis brevissimis medio tubo corollæ inserta. Antheræ connectivo dorsali insertæ, sagittatae, erectæ. Ovarium 8-loculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, stamina inferiora subæquans, stigmate apicali subcapitato subobliquo. Drupa baccata, calyci aucto apiceque constricto membranaceo atque colorato omnino inclusa, tetrapyrena, pyrenis bilocularibus, putamine osseo. Seminis radicula infera brevis.—Frutices Americæ tropicæ, sepincolæ aut silvicolæ, inermes aut spinosi, foliis oppositis verticillatis integris subtus punctatis, floribus racemosis, racemis terminalibus et axillaribus sæpius paniculatis, corollâ majuscûla lilaçinâ.

1. D. PLUMIERI (Jacq.! stirp. amer. hist. p. 186 t. 176 p. 76), inermis aut spinosa, ramulis tetragonis inflorescentiæ foliisque saltem junioribus subtus strigilloso-sericeis, foliis obovatis ellipticis basi cuneatâ in petiolum brevem attenuatis acuminatis obtusisve integerrimis vel supra medium serratis glabratiss, racemis terminalibus axillaribusque multifloris laxis erectiusculis reclinatis, calycis dentibus et basi triangulari subulatis. 5 In Indiâ occidentali, S. Domingo (Jacq. Poiteau! C. Ehrenb!), Cubâ (R. de la Sagra!), Jamaicâ (Tussac! Sw.), S. Thomâ (E. Ehrenb! n. 112, Ledru!), Martinicâ (Sieb.! herb. mart. n. 155), in Mexico ad Xalapam (H. et B., Schiede! n. 126, foliis grossè acuminato-serratis) in Mimosetis ad Cumananam Venezuela (Moritz! n. 424), in Peruviâ (Ruiz!) et Brasiliâ (Riedel! )—Jacq. collect. suppl. p. 119 et icon. rar. 3 t. 502, Bot. cab. t. 280, Bot. reg. t. 244. D. spinosa Linn. sp. 1p. 637. D. inermis Linn. sp. 2p. 637. Castorea racemosa Plum. icon. p. 79. D. Ellisia Jacq.! amer. p. 187 t. 176 f. 77, Linn. sp. p. 888, Jacq.! hort. schœnbr. 3 t. 99, Sw.! obs. 247, Bot. mag. t. 1759. Ellisia acuta Linn. am. acad. 5 p. 400. Ellisia frutescens etc. P. Br. jam. p. 262 t. 29 f. 1. D. Xalapensis Kunth in H. B. nov. gen. 2p. 254 (Schiede pl. exs. 126!). D. microphylla Desf. cat. hort. paris. ed. 3 p. 392. forma spinosa parvifolia. D. dentata Rich. herb. ex Pers. syn. 2. 142 (Bové! pl. afr. n. 368, ex hortis Mehemet-Ali pr. Cahirum, foliis complur. serrato-dentatis). Frutex staturâ, figurâ, magnitudine et serraturâ foliorum, ramis nunc inermibus nunc spinis axillaribus subulatis armatis, indumento denique totius plantæ, imprimis vero racemi magnopere varians. Ramuli plantæ sítientis rigidí breves, interdum fasciculato-foliosi foliis minoribus et plerumque minus serratis integerrimis obsoiti; turiones autem plantæ vegetæ elongati, sæpius reclinati et repentes, foliis majoribus magis acuminatis nervosis sæpius grosse serratis sunt muniti. Racemi sæpe paniculati. Bractæ minutæ, interdum subfoliaceæ. Calyx tubulosus 1½-2 lin. longus. Cor. lilaçinâ tubus calyce dimidio longior. Drupa matura globosa, pisi majoris mole, flava, calyce membranaceo aucto ipsoque colorato clauso rostro supra germen grossulum contorto, supra drupâ matuente vero recto. D. Ellisia ideo ne tanquam varietas est separanda, quam in eadem arbore calyces ore recto et contorto juxta statum fructus observentur, quod l. c. jam optime aunotavit b. Swartzius. Varietas magis insignis, sed vario transitu connexa est.

*§. vestita*, ramulis tomentosis, racemis foliorumque dorso villosiusculis, 5

In Brasiliæ prov. Minarum (Scilicet Regnell! pl. bras. scr. I n. 384). D. vestita Cham.! in Linnæa 7 p. 115. (v. v. c. et s. in h. reg. berol. et DC.)

2. **D. MUTISII** (Linn. fil. suppl. p. 291., Kunth! in H. B nov. gen. et sp. 2 p. 254), ramis subangulatis inermibus spinis validis subfalcatis armatis, foliis coriaccis oppositis ternis obtusis vel oblongo-ellipticis in petiolum brevem attenuatis acuminatis acutis obtusis integerrimis vel a medio serratis grosse venoso-rugosis glabris supra lucidis subtus opacis pallidis, racemis terminalibus axillaribusque multifloris laxis pubescensibus erectiusculis reclinatis, calyce truncato subulato-5-mucronato. ♂ In planitiae subfrigidâ Novo-Granatensi (H. et B.! herb. Willd.! n. 11670, Hartw.! n. 1496) et in Venezuela ad Caracas (Moritz! n. 307). D. phytolaccae-folia Juss. herb. (auct. Kunth). D. Mutisiana Sm. intr. hot. p. 381 et Rees cycl. vol. 12. D. obtusifolia Kunth l. c. Species foliis coriaceis rugosis discoloribus supra lucidis insignis. Flores penduli, quam in D. Plumieri majores. Folia 2-4 poll. longa,  $\frac{1}{2}$ -2 poll. lata. Cal. tubus 3-4 lin. longus. Corolla violacea, tubo calycem dimidio superante, limbo utrinque pulverulento velutino. (v. s. in h. reg. berol. et Willd.).
3. **D. MACROCARPA** (Kunth l. c. p. 255), ramis angulatis subinermibus, foliis coriaceis ternis oppositis elliptico-oblongis basi attenuatis petiolatis obtusiusculis apicem versus obsolete serratis reticulato-venosis glaberrimis subnitidis, racemis terminalibus subsolitariis, calyce tubuloso-campanulato 5-dentato extus pubescente, fructifero 4-5-fido patulo. ♂ In Novâ-Hispaniâ. Rami glabri, albidi. Folia sesquipollucaria, 9 lin. lata, veinis subtus valde prominentibus, petiolo 1-1½ lin. longi. Flores secundi, brevissime pedicellati. Bracteæ lineares pubescentes pedicello duplo longiores. Drupa globosa magnitudine fructus pruni spinosæ.
4. **D. TRIACANTHA** (Juss.! ann. mus. 7, p. 77), foliis verticillatis ternis sparsis obovato-ellipticis oblongis in petiolum brevissimum attenuatis acutiusculis obtusis mucronulatis integerrimis vel superne obsolete argute serratis coriaceis adulitis glabratris supra lucidis, spinis axillaribus subulatis, racemis axillaribus terminalibusque paniculatis, calyce fructifero globoso ore connivente clauso. ♂ In regno Quitensi in collibus aridis pr. urbem Ibarra (H. et B.! herb. Willd.! n. 11666, fol. 8), in Peruviâ (Dombey n. 253, Ruiz!). D. buxifolia Poiret. Frutex ramosissimus, 4-6-pedalis, spinis pollucaribus validis horridus. Rami subhexagono-angulati, helvoli. Folia subpollucaria, margine saepius revoluta, subitus pallidiora glandulisque cutaneis punctata, novella in nervis pubescens, adulta axillis infra spinas ramulum fasciculato-foliosum pullulantia. Racemi nunc depauperati breves, nunc vero satis longi exserti. Calyx ex ore truncato apice vero plicato mucronato-5-dentatus. Cor. tubus calyce duplo longior, limbus utrinque pubescens. Variat indumento, imprimis ramulorum et racemorum, ut calyx saepius quidem sit puberulus solis plicis ad apices tomentosus, interdum autem totus racemus cum ramulo tomentoso-pubescat (v. s. in h. DC. et reg. berol.).

### *Species exclusæ.*

**D. BUXIFOLIA** Willd. herb. = Citharexylon spinosum.

**D. FISCHERI** Mart. = Casselia integrifolia.

### Subtribus VII. PETREEÆ.

Flores laxè racemosi. Calyx cyathimorphus 5-dentatus, epicalyce magno 5-phyllo colorato inferius adnato auctus et involucratus. Capsula coriacea indehiscentia.

XVI. **PETREA** Houst. reliq. t. 11, Linn. gen. ed. I n. 861, Juss. gen. p. 108, Endl. gen. n. 3710, Meisn. gen. p. 291 et comment. p. 199, Jacq. amer. p. 180 t. 114, Lam. illustr. t. 539, Gærtn. de fruct. 2 p. 471. t. 177, Bot. mag. t. 628.

Epicalyx pentaphyllus, post anthesin magis increscens et persistens,

cum calyce coloratus et cum ejus tubo concretus, phyllis magnis membranaceis subpenninerviis et reticulato-venosis. Calyx turbinato-tubulosus, costatus, apice incrassato pedicelli insidens, 5-dentatus, dentibus phyllis epicalycis alternis. Corolla decidua subinfundibuliformis-hypocraterimorpha, tubo recto cylindrico sursum paulo ampliato faucibusque barbato, limbo erecto patulo vel subrotato subinaequaliter semi-5-fido aut oblique subbilabiato, lobis rotundatis. Stamina 4, faucibus corollæ inserta, inclusa, æqualia vel subdynamata, stamine quinto postico rudimentario vel nullo. Antheræ erectæ, biloculares, loculis distinctis parallelis rimâ longitudinali dehiscentibus. Ovarium gynophoro carnoso subcylindrico insidens, bilocularis, loculis uniovulatis. Stylos terminalis, inclusus, stigmate juxta apicem cernuo subdisciformi. Capsula coriacea, indehisrens, calycis tubo dentibus conniventibus clauso immersa, bilocularis, dissepiamento semine unico tantum perfecto sæpiissime abolescente. Semen magnum, loculum vel capsulam implens, cotyledonibus crassis applicatis, radiculâ brevissimâ inferâ. — Frutices volubiles vel arbusculæ Americæ tropicæ, foliis oppositis coriaceis plerunque integerrimis venosis scabris, racemis laxis superbis, floribus magnis violaceis pedicellatis singulisque bracteâ caducâ subtensis, rhachi filiformi.

\* Racemo terminali singulo vel subsingulo.

1. P. CANDOLLEANA, volubilis, ramulis cum petiolis nervo foliorum medio supra foliorum dorso racemique rhachi pedicellis calycumque tubo hirto-lanuginosis, foliis amplis coriaccis obovato-oblongis postice paullo angustatis brevissime petiolatis breviacuminatis mucronatis supra rugosis scaberrimis nitidis subtus reticulato-venosis pallidis, racemo terminali singulo elongato nutante, pedicellis calycis tubo pluries longioribus, epicalycis phyllis linearibus acutis tubo quadruplo longioribus. ♂ (Patria ign. P. Martiane similis, ast foliis, racemo singulo floribusque uberrime distincta. Folia 5-7 poll. longa, 2-3½ poll. lata, petiolo 3 lin. æquante. Racemus pedalis multiflorus. Bractea oblongæ, acuminate, hirto-pubescentes. Phylla epicalycis demum 10-11 lin. circ. longa, 2½ lin. lata, utrinque strigilloso-scaberrima, violacea. Calyx 5-fidus, dentibus ovatis acutis strigoso-hispidis. Cor. hypocraterimorpha; tubus cylindricus inferne glabratu, superne sensim ampliatus et cum limbo velutinus; limbi laciniae undulato-crispæ, quinta reliquis major rotundata. Stamina brevia, antheris fauces villosas præcludentibus. (v. s. in h. DC.)
2. P. MACROSTACHYA (Benth. in Taylor journ. nat. hist. 2 p. 448), volubilis ramulis petiolisque scaberrimis, foliis coriaceis petiolatis lanceolatis oblongis vel ovali-ellipticis utrinque breviacuminatis mucronatis integerrimis undulatis utrinque scaberrimis nitidulis subtus pallidioribus venarumque areolis amplis reticulatis, racemo terminali elongato pendulo undique scabro, pedicellis tubo calycis brevioribus, phyllis epicalycis subspathulato-oblongis basi conspicue attenuatis apice subangustato acutiusculis tubo calycis subtriplo longioribus. ♂ (In Guiana Anglica (Schomb. n. 158) et Gallica (Mus. paris.) — Benth. in Hook. journ. 2 p. 53. P. (volubilis?) Guianensis Cham. in linn. 7 p. 367. P. Stapsiae Paxton mag. bot. 4 p. 99 cum icono.? Species a P. volubili distincta foliorum figura, petiolis scabris nec hirtis, floribus majoribus et figurâ phyllorum epicalycis. Folia jam 6-7-pollicaria, 1½-2½ poll. lata, nunc 4 poll. longa et 2½ poll. lata, petiolo 8-9 lin. longo. Racemus sesqui-bipedalis, bracteis subulato-lanceolatis hirtis epicalycis strigilloso-scabridi phylla 9-10 lin. longa, superne 3 lin. circ. lata. Calyx tubus 3 lin. longus, dentibus brevibus rotundatis scabrido-pubescentibus. Cor. epicalyce duplo brevior, tubo cylindrico inferne glabro superne cum limbo undulato velutino-tomentoso. (v. s. in h. DC. et reg. berol.)
3. P. BLANCHETIANA (Schauer in Endl. et Mart. fl. bras. ined.), volubilis ramis scabris, foliis brevipetiolatis ellipticis vel lato-oblongis basi acutis obtu-

sisve subacumiatis aut obtusis emarginatisve mucronatis mutioisque integrimis undatis utrinque scabriusculis supra nitidulis subtus pallidioribus, racemo terminali singulo elongato pendulo undique scabrido, pedicellis calyco tubo subduplo longioribus, epicalycis phyllis linearī-oblongis acutiusculis tubo calycis quadruplo longioribus. ♂ ( In Brasiliæ prov. Bahiensis convallibus silvaticis (Mart.! herb. flor. bras. n. 1029! Blanchet! exs. a. 1831. n. 91. Salzm! pl. bras. n. 433 ). Species racemis et floribus maximis iu secco colore amoenissime violaceum servantibus omnium longe speciosissima, prædenti sane proxima, tamen diversa. Folia 3-5-pollicaria long., 2-3 poll. lata. Epical. phylla sub florescentiâ 9 lin. metentia, demum ad pollicis longit. accrescentia. Cor. limbus subrotatus pube brevi densâ hirtellus, fauces villosæ. ( v. s. in h. Mart. et DC.)

4. P. VOLUBILIS (Jacq.! amer. p. 180 t. 114), volubilis, ramulis et racemis cum foliorum petiolo incrassato costâque mediâ scabro-hirtis, foliis coriaceis brevissime petiolatis ovatis ellipticis oblongis basi rotundatâ vel subangustatâ leviter cordatis acuminatis obtusisve mucronatis integerrimis undulatis utrinque nitidulis supra scaberrimis subtus pallidioribus scabridis et grosse venosis, racemo terminali singulo elongato nutante undique scabrido, pedicellis calyco tubo duplo longioribus, epicalycis phyllis linearī-oblongis obtusis tubo duplo et dimidio longioribus. ♂ ( In silvis Cubæ (de la Ossa!), Guadeloupe (Perrottet! Bertero!), Martinicæ (Sieber! fl. mart. n. 157) et in Brasiliâ (Sellow!) — Lam. ill. t. 539, Bot. mag. t. 826, Know. et Westc. flor. cab. 3, p. 69 t. 108. Ann. flor. pom. 1338 p. 254 cum ic. P. Kohautiana Presl bot. bemerk. p. 99. Folia 3-4-pollicaria. Racemi semipedales. Phylla epio. 6-7 lin. longa, scabrida, oerulea. Cor. limbus pube densâ subhirtellâ subcanescens. ( v. s. in h. reg. berol. et DC.)

\* \* Racemis in ramulo pluribus, aut solis axillaribus, aut uno terminali reliquis axillaribus.

5. P. DENTICULATA (Schrad. göetting. gel. anz. 1821 p. 712), subvolubilis, ramis hirto-scabris, foliis brevissime petiolatis ovato- aut oblongo-ellipticis basi obtusis aut leviter cordatis obtusiusculis mucronatis emarginatisve integrimis vel superne pauciserratis utrinque scabris subtus pallidioribus, racemis axillaribus brevibus rectis hirtello-velutinis, epicalycis phyllis linearibus tubo calycis duplo et dimidio longioribus. ♂ ( In silvis Brasiliæ, e. g. prov. Rio de Janeiro, Minarum et Bahiensis (Max. princeps Wied.! Mart.!). P. volubilis Gært. de fruct. 2 p. 471 t. 177? Species fol. figurâ et dummodo adsit serraturâ, racemis brevibus parvifloris et epicalycis phyllis perangustis distincta. Folia coriacea, 3-5-pollicaria. Racemi folia subæquantes. Calycis tubus 2 lin. longus; epicalycis phylla sub anthesi 5 lin. longa, 1½ lin. lata. Cor. dense hirtello-tomentosa. ( v. s. in h. cl. de Martius.)

6. P. RACEMOSA (Nees et Mart.! in nov. act. acad. nat. cur. 11 p. 72), volubilis, ramulis petiolis pubescenti-sobris, foliis brevissime petiolatis oblongis basi obtusis subacute acuminatis acutisve integrimis glabris supra nitidis læviusculis subtus pallidis subnitidulis scabriusculis, racemis axillaribus elongatis undique scabridis, pedicellis calycis tubo vix duplo longioribus, epicalycis phyllis subspathulato-linearī-oblongis acutis tubo duplo et dimidio longioribus. ♂ ( In silvis prov. Bahiensis Brasilie (Max. princeps Wied.!). Folia firmule membranacea, subtripollucaria. Racemi dodrantales. Calyois tubus 2 lin. longus; phylla epicalycis sub anthesi 5 lin. metentia demumque semipollucaria. Cor. hirtello-pubescentia. Differt a præcedente racemis elongatis et foliis, a sequente foliis et floribus minoribus a P. volubilli raoemis axillaribus aliisque notis. ( v. s. in h. cl. de Martius.)

7. P. SUBSERRATA (Cham.! in Linn. 7 p. 368), volubilis, ramulis velutinis, foliis brevissime petiolatis lanceolato- aut elliptico-oblongis basi obtusis acutisve ex apice obtuso vel acuto mucronatis integrimis aut magis minusve serrato-dentatis utrinque nitidulis scabridisque subtus pallidioribus , racemis

- axillaribus elongatis scabrido-pubescentibus, pedicellis calycis tubo sesquiduplo longioribus, epicalycis phyllis oblongo- vel lanceolato-linearibus tubo triplo et dimidio longioribus. ♂ In silvis Brasiliæ, in prov. Rio de Janeiro (Sell.! Pohl! Lund! Ried!) et Minarum generalium (Mart.! herb. bras. n. 118, Clausen! coll. a. 1840 n. 382, Regnall! pl. bras. n. 385). P. volubilis Vell.! fl. flum. 5 t. 59. P. serrata Presl bot. bemerk. p. 99 et P. retusa Presl ibid. Folia 2½-5 poll. longa, nunc integerrima, nunc subserrata, nuno regulariter grosse serrata, sœpius subouspidato-mucronata. Racemi denique subpedales, floribus conspicuis amœne ceruleis. Cal. tubus 2 lin. longus; epicalycis phylla acuminate, sub anthesi 7 lin. longit. 2 lineas latit. circiter æquantia, denique ad 9-10 lin. longitudinem proiecta. Cor. hirtello-velutina. (v. s. in h. reg. berol., œs. vindob. et petrop., Mart. et DC.)
8. P. ARBOREA (Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 282), arborea, ramulis petiolisque hirtellis, foliis coriaceo-membranaceis oblongo-lanceolatis vel obovato-oblongis ellipticis basi angustatâ subcordatâ brevissime petiolatis apice obtuso vel retuso mucronatis integerrimis undulatis utrinque marginique scabris, racemis axillaribus solitariis pendulis laxis, pedicellis calycis tubo hirtello-velutino pluries longioribus, epicalycis phyllis linearibus obtusis tubo quadruplo longioribus. ♂ In Americâ æquinoctiali, in Peruviae Andibus editioribus ad lacum de Titicaca (Meyen!), in convalli temperata Araguensi Columbiæ (H. et B.! herb. Willd. n. 11488, fol. 1.), in fauibus montium ad Caracas in Venezuelâ (Bredemayer! in herb. Willd. n. 11489, E. Otto! u. 570, Moritz! n. 191), in Mexico in silvis reg. calidæ ad Tampico (Berland. n. 136 et 182), Actopan (Schiede! n. 1172), inter Acapulco et Mexico (H. et B.! et pr. Vera-Cruz et Oaxaca (Galeotti). P. (volubilis?) Mexicana Schiede! in Linnæa 6. 373 et Cham.! ibid. 7 p. 367. P. Mexicana Willd.! herb. n. 11490. P. erecta Lodd.! bot. cab. t. 1604. P. volubilis Walp.! in act. acad. nat. cur. 19 suppl. 1 p. 381. P. ovata Mart. et Gal. in bull. acad. brux. 11, p. 329. Arbor vigintipedalis (Bredem.) vel frutex biorgyalis (Otto) opposite ramosus, racemis copiosissimis ornatissimus. Folia alia 6-7 poll. longa, 1½-2 poll. lata, alia 4 poll. longa 2½ poll. lata, nitidula, nervis subtus sparsa-hirtellis. Racemi infra apices ramulorum axillares, supremi gemmæ terminali abortivâ interdum quasi terminales, semipedales, rhachi pedicellis tuboque calycis pubes densa velutinâ subcanescibus. Phylla epicalycis 7½ lin. longa, 2 lin. lata, strigilloso-scabra, violacea. Calycis dentes ovati, villoso-hispidi. Cor. epicalyce duplo brevior, rotata, saturate violacea. Caulis juniore ætate forte volubilis. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)
9. P. RUGOSA (Kunth! in H. B. I. c. p. 282), arborea, ramis hirto-scabris, foliis coriaceis rigidis brevissime petiolatis ellipticis basi subcordatis ex apice subrotundo vel retuso mucronatis integerrimis margine reflexis reticulato-rugosis supra scaberrimis nitidisque subtus hirtis, racemis axillaribus terminalibusque solitariis erectis laxis hirto-scabris pubescentibus, phyllis epicalycis linearibus obtusis tubo sesquialongioribus. ♂ In Americâ æquinoctiali, e. gr. in Venezuelâ ad Caracas (H. et B.! herb. Willd! n. 11491), in Columbiae valle fluminis Magdalena prope urbem Purificacion (Hartw.! pl. columb. n. 1359) et in Guiana Gallicâ (herb. DC!). P. obtusifolia Benth.! pl. Hartw. p. 246. Frutex (ex Hartw.) 6-8-pedalis. Folia approximata, 2-2½ poll. longa, 1½-1' poll. lata, reti subtus prominenti. Flores brevipedicellati. Cal. tubus 2½ lin. longus; epicalycis phylla amœne violacea, unam lineam lata. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)
10. P. SCHOMBURGIANA, volubilis?. undique scaberrima, foliis rigide coriaceis petiolatis ovatis basi rotundatis ex acumine brevi obtuso mucronatis integrerrimis reticulato-rugosis supra nitidis subtus pallidis venoso-reticulatis utrinque scaberrimis, racemis pluribus quasi terminalibus, elongatis pulverulento-scabris, pedicellis tubo calycis fructiferi plicati paullo longioribus, epicalycis phyllis obovato-spathulatis acutiusculis obtusisve tubo vix duplo longioribus. ♂ In Guiana Anglica (Rich. Schomb. ! n. 108.). Species se-

quenti quoad flores similis, ceterum vero distinctissima. A *P. macrostachya* omnino recedit foliorum figurâ venarumque reti exigue areolato, racemis pluribus, epicalycis conditione. Folia in nostro specimine 3 $\frac{1}{2}$ -5 poll. longa, 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, petiolo semipollucari supra canaliculato ibidemque hirtello. Epicalycis phylla sub fructu semipollucem longa, citra apicem dilatatum 4 lin. lata. (v. s. in h. reg. berol.)

11. *P. MARTIANA* (Schauer in Mart. et Endl. flor. bras. ined.), volubilis, ramis hirto-scabris, foliis petiolatis elliptico-oblongis vel subrotundo-ellipticis basi acutis coarctato-acuminatis mucronatis saepius obtusissimis emarginatis integerrimis rugosissimis reticulato-venosis supra nitidis scabris subtus hirtis, racemis terminali-axillaris longis hirto-scabris, epicalycis phyllis obovato-oblongis tubo quadruplo longioribus. ♂ ♀ In silvis Brasiliæ juxta flumen Amazonum ejusque confluentes (Mart.). Species amplitudine partium inter omnes excellens. Folia 4-9 poll. longa, 3-5 poll. lata, petiolo  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  lineæ æquante. Calycis tubus 2 lin. longus. Epicalycis phylla obtusa aut acuminulo obtuso terminata, sub anthesi 8 lin. longa et superius 4 lin. lata et puberula, tandem ultra pollicis long. et semipoll. latit. accrescentia et scabra. Cor. tubulosa, hirtello-velutina. (v. s. iu h. cl. de Martius.)
12. *P. INSIGNIS* (Schauer l. c. ined.), volubilis, ramis hirto-scabris, foliis brevissimis petiolatis oblongis vel obovato-oblongis basi levissime cordatis acutis muticis integerimis undulatis supra lucidis subtus nitidis et pallidioribus utrinque scabris, racemis subelongatis scabris, epicalycis phyllis obovato-subrotundis corollâ rotatâ brevioribus. ♂ ♀ In sepiibus et virgultis circa urbem Para Brasiliæ (Mart.). Folia coriacea, subtripollucaria. Racemi subdodrantales. Cal. tubus 3 lin. longus, dentibus suborbicularibus. Epicalycis phylla peltaoidea 5 lin. longa et superius 3 $\frac{1}{2}$  lin. lata. Cor. limbus magnus, 5 lin. radio metiens, lobis subæqualibus tenuibus venosis, fauibus villosis. (v. s. in h. cl. de Martius.)

#### † *Species dubia.*

13. *P. BRACTEATA* (Steud. in florâ 1843. p. 764), fruticosa, erecta?, foliis ovatis coriaceis supra nitidis subtus pallidioribus utrinque reticulatis scabermiss, adultis (amplis 6-7-pollucibus) obtusis, junioribus acuminatis, petiolo dense villoso-setoso, racemis elongatis laxis, bracteis lanceolatis subscariosis ciliatis reflexis. ♂ ♀ In Guianâ Batavâ (Hostm. et Kappler pl. surin. ess. n. 39).

#### *Species e genere et ordine excludendæ.*

*P. DENTATA* Spreng. = *Patagonula Americana* glabra.

*P. MULTIFLORA* Sm. = *Funis quadrifidus* Rumph. amb. 5 p. 4 t. 3, ordine alieno est.

*P. OBLONGA* Spreng. = *Banisteria* species. — Conf. infra annot. ad calcem ordinis.

#### Tribus II. VITICEÆ.

Inflorescentia definita, di-trichotomo-cymosa, cymis axillaris vel in paniculam compositam collectis. Ovula supra basin loculi ad angulum centralem inserta, pendula, amphitropa vel subanatropa. — Arbores et frutices, rarissime herbæ, foliis simplicibus aut digitatis.

Subtribus I. *SYMPHOREMEÆ* Meisn. gen. pl. p. 292.

Cymæ contractæ vel glomeratæ, paucifloræ, involucratæ. Corolla regularis vel bilabiata. Stamina 4-5 vel indefinita. Capsula coriacea, indehisca, abortu monosperma. — Frutices volubiles Indiæ orientalis, foliis simplicibus.

CONSPECTUS GENERUM.

XVII. *Symplochoma*. — Involucrum 6-8-phylum. Calyx cyathimorphus 6-8-dentatus. Cor. tubulosa , limbo 6-12-fido reflexa. Stamina 6-18 , summo tubo corollæ inserta , longe exserta.

XVIII. *Sphenodesma*. — Involucrum 6-phylum. Calyx cyathimorphus 5-fidus. Corolla hypocrateriformis aut infundibularis subregularis , limbo 5-fido. Stamina 5. Stylus brevissimus.

XIX. *Congea*. — Involucrum 3-phylum. Calyx tubulosus , sursum ampliatus , 5-fidus. Corolla bilabiata , labio superiore elongato erecto. Stamina 4 didynama. Stylus capillaris cum staminibus exsertus.

XVII. SYMPHOREMA Roxb. plant. corom. 2, p. 46 tab. 186, fl. ind. 2, p. 262, Wight illustr. ind. bot. 2 p. 66 , et icon. t. 362 et 363, Endl. gen. n. 3716, Meisn. gen. p. 292 et comment. p. 200. — Analectis Juss. in Journ. expos. fam. 2 p. 362, Vahl in dansk vidensk. selsk. skrift. 6 p. 90.

Involucrum 6-8-phylum , patens , cymam contractam subtendens. Calyx cyathimorpho-canipanulatus , 6-8-dentatus , persistens. Corolla tubulosa ; limbus 6-8-fidus , lacinias linearibus reflexis. Stamina numero loborum corollæ , sunimo tubo corollæ inserta , æqualia , longe exserta ; filamenta capillaria , post anthesin subgyroso-contracta ; antheræ dorso insertæ , bilocularis , loculis adpositis rimâ hiante dehiscentibus. Ovarium bilocularis , loculis binovulatis , ovulis collateralibus. Stylus filiformis , ultra statima exsertus ; stigma bifidum. Capsula coriacea , indehiscens , calyci inclusa , abortu monosperma. Seimen erectum , cotyledonibus crassis oleosis , radiculâ inferâ brevi. — Frutices Indici , scandentes.

1. S. INVOLCRATUM (Roxb. 1. c. ), corollâ pauci-(6-8)-fidâ , foliis ovalibus breviter acuminatis obtusis superne pilosis subtus dense tomentosis. ♂ ( In Indiæ orient. orâ Coromandel (Roxb., Wall. cat. n. 1740 ! ex h. bot. calcutt.). — Wight icon. t. 362. Caulis lignosus , scandens. Ramuli cum omni parte inflorescentia et foliorum dorso tomento molli incani. Pili saepius stellati. Folia opposita , brevipetiolata , ovalia vel subrotundo-elliptica , basi rotundatâ vel saltem obtusâ triplinervi , acumine brevi obtuso , margine subintegerrimo vel irregulariter repando-dentato vel serrato. Inflorescentia in ramulis vernantibus , foliis annotinis destitutis , terminalis paniculata , constituta e cymis longe pedunculatis bifidis : ramulis trifloris , pedunculis brevissimis , flore septimo intermedio terminali. Involucrum conficitur et bracteis 2 extimis majoribus ramulos cymæ subtendentibus , bracteolisque binis in utroque cymæ ramulo pedunculis florum lateralium basi accretis et quam bracteis nonnihil minoribus ; phylla involucri omnia obovato-elliptica basi valde attenuata , obtusissima , superne serrata , membranacea , pallida , venoso-reticulata , extima pollicem circ. longa , 9 lin. lata. Calyx 5 lin. altus , acute 6-8-dentatus , nervoso-striatus , extus tomentosus , intus obsolete strigoso-pubesces. Cor. albæ tubus calycem æquans , limbi laciniae perangustæ undulatae reflexæ. Describemam plantam a cl. Wallichio distributam , quæ pluribus notis a descriptione Roxburghii recedit. (v. s. in h. DC.)

2. S. POLYANDRUM (Wight icon. t. 363) , corollâ multi-(14-18) fidâ , foliis late ovatis subacuminatis supra stellato-pilosis subtus dense tomentosis. ♂ ( Prope Madras. Præcedenti major. Folia nunc suborbicularia , ex ic. serrata.

*Species exclusa.*

S. PANICULATUM h. Heyn. = *Sphenodesma unguiculata*.

XVIII. SPHENODESMA Jock mal. misc. 1 n. 1, Hook. bot. misc. 1 p. 285.—  
Viticastrum Presl bot. bemerk. p. 147.

Involucrum hexaphyllum, patens, glomerulum 6-7-florum sessilem ve-lans. Calyx cyathimorphus, 5-fidus, persistens. Corolla hypocraterimorpha vel infundibularis, subregularis; tubus calycem æquans; faux magis mi-nusve pubens; limbus 5-fidus. Stamina 5, fauci corollæ inserta, subin-clusa aut exserta, æqualia; antheræ dorso insertæ, biloculares. Ovarium biloculare, loculis uni (?) ovulatis. Stylus brevissimus; stigma bifidum. Capsula matura coriacea indehiscens, semine singulo omnino farcta; cotyledones crassæ oleosæ sibimet arce applicitæ, radiculâ brevissimâ inferâ. — Frutices Indiæ orientalis, volubiles. Folia simplicia, opposita, integerrima. Paniculæ axillares et terminales, rarius solitariae, plerum-que paniculam compositam amplam struentes. Glomeruli e cymis duabus trifloris constituti, floribus sessilibus coarctatis, accedente interdum septi-mo axem primarium terminante. Involucri phylla plerumque inæqualia, membranacea, basi trinervia nervis lateralibus marginem longe sectanti-bus, ceterum venoso-reticulata, sæpius colorata. Genus a Congeâ, cui species plerasque adnumeravit cl. Wallich, omnino diversum: corollâ, staminibus et stylo; congruens vero habitu, inflorescentiâ, involucro, fructu.

1. S. WALLICHIANA, ramulis pubescenti-tomentosis, foliis coriaceis brevipetio-latis ovato-oblongis basi obtusis in acumen angustatis quintupli-septuplinerviis glaberrimis supra lucidis subtus nervorum axillis barbatis, paniculâ amplis-simâ brachiatâ inferne foliosâ, bracteis ovatis, pedunculis filiformibus involuero subæqualibus et cum eo floribusque glabriusculis, involucri phyllis senis lineari-oblongis sessilibus obtusissimis, calyce cyathiformi 5-nervi brevissime 5-fido truncato ciliato. ♂ Crescit in Indiâ orientali, in Pundâ (Wall.). Roscoea pentandra Roxb. fl. ind. 3 p. 54. Congea pentandra Wall. cat. n. 1734. Folia 2 $\frac{1}{2}$ -6-pollicaria long., 1 $\frac{1}{2}$ -2-poll. lat., nervis lateralibus utrinque binis ternis validis subtus prominentibus secundum marginem versum apicem pro-ductis, reliquis venis tenuibus. Ramuli floriferi in axillis superioribus singuli vel gemini floribundi. Bracteæ folia diminuta exhibentia utrinque strigoso-hirsutiusculæ. Pedunculi 6-9 lin. longi. Involucri phylla inæqualia, extima majora nonnulli 4 lin. lata, membranacea omnia supra nitida subtus in nervo parce pubentia. Capitula subsexflora. Calyx 2 lin. longus, 5-nervis, extus glaber, intus circa germinis villosi apicem hirsutus. Cor. tubus calyce æqualis, limbus subæqualis, laciniis orbiculatis undulatis conniventibus, faucibus vil-losis. Stamina 5 subexserta. (v. s. in h. DC.)

2. S. JACKIANA, ramulis pubescenti-tomentosis, foliis coriaceis brevipetiolatis oblongis basi obtusis attenuato-acuminatis quintupli-septuplinerviis supra gla-berrimis lucidis subtus pubescens demumque vero glabrescentibus solis nervorum axillis subtus barbatis, paniculâ amplâ brachiatâ inferne foliosâ, bracteis oblongis, pedunculis filiformibus involucro subæqualibus brevioribusve et cum eo pube rara conspersis, involucri phyllis senis lanceolato-linearibus sessilibus obtusis vix mucronulatis, calyce glabro tubuloso-campanalato 10-nervio limbo 10-dentato, dentibus 5 lanceolatis reflexis, 5 lato-triangularibus acutis erectis. ♂ In India orient. Sillet, Penang (Wall.), Malacca (Griff.). Sphe-nodesma pentandra Jack l. c. et in Hook. bot. misc. 1 p. 285. Congea Jackiana Wall. cat n. 1735. S. Wallichianæ sane proxima sed calyce imprimis distinctissima. Involucri phylla reticulata, extima pollicem fer longa, 3 lin. lata. Capitula sexflora. Cal. 4 lin. longus, venoso-reticulatus, nervis 5 panlo validioribus in dentes angustos reflexos excurrentibus, interne circa germen sericeo-villosum sericeus ceterum vero glabriusculis. Cor. purpureæ tubus calycem æquans, fauces lanâ albâ hirtissimæ, laciniæ oblongæ expansæ. Stam. 5 subexserta. (v. s. h. DC. et Mart.)

3. *S. UNGUICULATA*, ramulis totâque paniculâ folisque novellis tomento stellato flavescentibus, foliis coriaceis brevipetiolatis lanceolatis aut oblongis basi obtusis acuminitatis multiplinerviis adultis demum utrinque glabrescentibus, paniculâ ampliâ foliis interstinctâ, pedunculis filiformibus elongatis patentissimis, involucri phyllis senis spathulatis acutiusculis basi longe attenuatis, calyce cyathimorpho 4-5-fido, lobis triangularibus acutis. ♂ (In Indiæ orient. prov. Pundâ (Wall!) et Moalme Martabanie (Helfer!). *Congea unguiculata* Wall. cat. n. 1736. *Congea ferruginea* Wall. cat. n. 1737. *C. paniculata* Wall. cat. n. 1739. *Symporema paniculatum* h. Heyn. Vites involucratus Presl bot. bemerk. p. 148. Species indumento flavescenti-rufescente in foliis atque phyllis involucri floccoso subdetersibili nec non figurâ phyllorum valde insignis. Pedunculi 15 lin. circ. longi, subfasciculati. Phylla involucri subinæqualia, laminâ oblongâ vel obovata, pollice longiora, 4 lin. lata. Calyx 2½-3 lin. longus, extus rufo-tomentosus, intus sericeo-splendens. Cor. infundibularis limbo exserto, laciniis obovatis truncato-obtusis, faucibus pubescentibus. Stamina brevissima ad fauces inserta. Germen resinoso-punctatum, stigmate sessili bifido terminatum. (v. s. in h. DC.)
4. *S. BARBATA*, ramulis foliisque nervis inflorescentiâque undique rufo-villoso-hirsutis, foliis subcoriaceis brevipetiolatis oblongis basi saepius paulo angustatâ obtusis attenuato-acuminatis ex apice obtuso submucronatis septupli-multipli-nerviis, junioribus utrinque hirsutis, adultis supra demum glabratris lucidisque subtus glandulos-punctatis, paniculis simplicibus racemosis terminalibus singulis ternis pedunculisque filiformibus solitariis axillaribus involucro longioribus, involucri phyllis senis oblongis obtusis basi attenuatâ, calyce cyathiformi 5-fido lobis retusis dorso mucronato apiculatis. ♂ (In India orient. Penang (Wall!), Malacca (Griff.). *Congea barbata* Wall. cat. n. 1738. *Viticastrum ramosum* Presl bot. bemerk. p. 148? Stirps indumento et inflorescentiâ simplici insignis. Folia 3-4 poll. longa, 1½-2 poll. lata. Pedunculi semipollicares. Involucra phylla valde inæqualia, extima maxima semi-pollicem longa antice 3 lin. lata. Calyx 12 lin. altus, extus rufo-hirsutissimus, intus parce pubescens. Cor. vix limbo exserta, laciniis oblongis extus sericeo-pubescentibus, faucibus subvillosis. Stamina 5 longe exserta. Germen apice villosum. (v. s. in h. DC. et Mart.)

XIX. *CONGEA* Roxb. corom. 3 p. 90 tab. 293, *Endl. gen. n. 3715*, *Meisn. gen. p. 292 et comment. p. 200.* — *Roscoea* Roxb. cat. hort. bengal. p. 64 et fl. ind. (ed 1832) 3 p. 54 (*ex parte*), non Sm. — *Calochlamys* Presl bot. bemerk. p. 148.

Involucrum triphyllum, patens, glomerulum 6-9-florum sessilem velans. Calyx tubulosus sursum ampliatus, 5-fidus, persistens. Corolla bilabiata, tubo calycem æquante; limbus valde inæqualis labio superiore elongato erecto bifido, inferiore patente breviter trilobo. Stamina corollæ fauci inserta, 4 didynama, longe exserta; filamenta capillaria gyrosa; antheræ dorso insertæ, biloculares. Ovarium biloculare, loculis binovulatis, ovulis (sive Roxb.) collateralibus septo secundario utrinque adnatis. Stylus capillaris, stamna subæquans; stigma bifidum. Capsula matura coriacea, indehiscente, semine singulo (an semper?) omnino repleta. Cotyledones crassæ, oleosæ, sibimet arcte applicitæ, radiculâ brevissimâ inferâ. — Genus *Sphænodesmæ*, quod conferas, proximum, sed distinctissimum.

*C. TOMENTOSA* Roxb. l. c. ♂ (Crescit in Indiæ orient. orâ Coromandel (Roxb), Prome, Martabanâ (Wall!) Helfer). *Calochlamys capitata* Presl l. c. *Frutex scandens*, ramulis quum foliiferis tum floriferis cano-aut subferrugineo-tomentosis. Folia brevissime petiolata, oblonga vel elliptica, basi leviter cordata, acuminata, 5-9-nervia, supra hirto-scabra nervis impressis, subtus hirto-pubescentia pallidiora nervis venis transversis prominulis connexis. Panicula

terminalis, ampla, brachiata, undique cano-tomentosa, composita e paniculis flaccidis opposite racemosis axillaribus terminaliisque. Bractæ parvae cordato-ovatae aut ellipticæ, obtusæ. Pedunculi involucro breviores. Involucrum triphyllum; foliola subpollicaria, sessilia, linearis-oblonga, obtusissima, basi trinervia nervo medio ramoso ceteroquin venoso-reticulata, intense roseo vel lilacino colorata, utrinque albido-tomentella, citra basin vero in facie cum calyce villosa. Capitula seu glomeruli 6-7-flori. Calyx sessilis, clavato-campanulatus, 5-fidus dentibus ovatis acuminatis, in utrâque paginâ villo antrorsum converso albicante. Capsula pisi magnitudine, vertice depressa, calyci paulo aucto inclusa. Variat :

$\alpha.$ . *latifolia*, foliis subtundo-ellipticis (3-4 uncias longis, 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. latis) subabrupte acuminatis, involucri phyllis calycibusque paulo majoribus.

*C. tomentosa* Roxb. l. c. *Roscoea tomentosa* Roxb. cat. hort. bengal. p. 64. *C. azurea* Wall.! cat. n. 1733. 6.

$\beta.$  *oblongifolia*, foliis oblongis (4-6 poll. long., 2 poll. latis) coarctato-acuminatis, involucri phyllis calycibusque paulo minoribus. *C. azurea* Wall.! cat. n. 1733. a. *Rocoea villosa* Roxb. fl. ind. 3 p. 56.

### *Species exclusæ.*

*C. BARBATA* Wall. = *Sphænodesma barbata*.

*C. FERRUGINEA* Wall. = *Sphænodesma unguiculata*.

*C. JACKIANA* Wall. = *Sphænodesma Jackiana*.

*C. PANICULATA* Wall. = *Sphænodesma unguiculata*.

*C. PENTANDRA* Wall. = *Sphænodesma Wallichiana*.

*C. UNGUILATUM* Wall. = *Sphænodesma unguiculata*.

### Subtribus II. CARYOPTERIDEÆ.

Cymæ simplices vel paniculatæ, exinvolutatae. Ovarium integrum, e carpidiis duobus confiatum, biloculare, loculis spermophoro dissepsito adnato bilamellari lamellis revolutis quasi in locellos 2 divisum. Ovulum in qualibet lamella spermophori singulum, pendulum. Capsula matura in carpidia duo septicide secedens, carpidiisque tum ipsis loculicidis et una cum spermophoro bipartilibus 4-partilibus, eoque modo ut singulæ valvulae adhæreat lamella spermophori revoluta semen erectum in plicâ recludens. — Subtribus hinc de Borragineis, illine de Scrophularineis quodam modo commonens. — Frutices vel arbores ex Indiâ et Chinâ.

### CONSPECTUS GENERUM.

XX. *Caryopteris*. — Cor. subbilabiata. Caps. calyci inclusa, matritate in coccus 4 argute marginatos secedens.

XXI. *Glossocarya*. — Cor. hypocraterimorpha. Capsula e calyce semiexserta, denique in carpidia 4 basi singulato-alata secedens.

XXII. *Hymenopyramis*. — Cor. subinfundibularis. Capsula calyci valde aucto, vesiculoso, 4-alato inclusa, matura 4-valvis.

XXIII. *Peronema*. — Genus recognoscendum.

XX. CARYOPTERIS Bunge plant. mong.-chin. 1. Casan. 1835. Endl. gen. n. 3692. Meisn. gen. 1. 290 et comment. 198. — *Barbula* Lour. fl. cochin. ed. Wild. 2 p. 444. — *Mastacanthus* Endl. gen. n. 3720. Lindl. Bot. Reg. 1846 t. 2.

Calyx campanulatus 5-fidus, demum magis minusve increscens, corolla infundibularis; tubus superne ampliatus fauclibus villosis; limbus subbilabiatus, labio superiore bifido, inferiore trifido: lobis 4 superioribus sub-

erectis oblongis, lobo infimo porrecto dilatato cucullato interdum fimbriato. Stamina 4, didynama, corollæ tubo inserta, exserta; antheræ ovatae, dorso insertæ, biloculares, loculis rimâ hiante longitudinali dehiscentibus. Ovarium biloculare, loculis bilocellatis, locellis uniovulatis. Stylus terminalis, filiformis, exsertus, deciduus; stigma bifidum, cruribus æqualibus subulatis. Capsula gynophoro brevi insidens, calyci ampliato immersa vel inclusa, basi perforata, maturitate in coccus 4 secedens eoque quidem modo ut carpida 2 septicide secedant iterumque loculicide cum spermophoro dividantur; cocci monospermi, marginati, clausi. Semen erectum; radicula brevis infera; cotyledones ellipticæ sibimet applicitæ. — Folia opposita, simplicia, integra.

1. C. MONGOLICA (Bunge! l. c.), undique tomento tenuissimo incana, foliis linear-lanceolatis brevissime petiolatis sensim acutatis subintegerrimis, cymis paucifloris laxis, labio fimbriato. ♂ In apriis montosis rupestribus Mongolia Chinensis (Bunge! Turczan.). Suffrutex leviter fragrans, habitu Boragineis aliquibus e. gr. Lithospermis nonnullis haud omnino dissimilis. Folia obscure venosa,  $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 1-3 lin. lata. Cymæ subscorpioidæ, subsexfloræ, pedunculatæ, infimæ axillares, superiores folio diminuto bracteatae paniculam struentes. Flores pedicellati. Calyx 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus, fere semibifidus. Cor. amœne cyanæ, calyce triplo longior, labii inf. laciniæ mediæ fimbriato-multifidæ. Calyx fructiger conspicue ampliatus, membranaceus, subinflatovatus, ore hiante, 4 lin. longus, capsulam levem compressam laxe ambiens. Pericarpium tenue telâ spongiosâ, cocci alâ angustâ marginati, commissuris planis, alterâ (placentari) marginali, alterâ (disseptimali) faciali et latiore. (v. s. in h. DC. a. cl. auct. comm.)
2. C. MASTACANTHUS, ramis adscendentibus subtetragonis foliisque tomentosis, foliis ovato-oblongis obtusis basi integerimis ceteraque margine grosse serratis lineatis brevipetiolatis, cymis brevipedunculatis confertis in paniculam terminalem densam interrupte spicatum struentibus inferioribus axillaribus, labio fimbriato. ♂ In Chinâ ad Cantonem (Lour., Vachell.), pr. Koo-lung-soo et in insulâ Tchusan (Fortune). Barbula Sincensis Lour. coch. 2 p. 444. Mastacanthus Sinensis Endl. Walp. repert. 4 p. 3, Lindl.! bot. reg. 1846 tab. 2. Planta grati odoris. Folia triplicaria. Calyx campanulatus, semi-5-fidus, laciniis oblongis acutis. Cor. violacea, tubo calycem subæquante, limbi laciniis 4 superioribus oblongis erectis, infimâ multo majore porrectâ incurvâ tenuiter fimbriata. Stam. exserta. Stylus staminibus brevior, apice bifidus.
3. C. WALLICHIANA, ramulis tetragonis foliisque novellis cymisque pulvuleto-tomentosis, foliis sublanceolatis oblongis subovatis longe acuminatis a medio grosse serratis adulitis puberulis demumque subglabratis subtus glanduloso-punctatis, cymis singulis geminis brevipedunculatis confertis paniculam terminalem densam interrupte spicatum struentibus infer. axillaribus, labio integro. ♂ In Nepaliâ (Wall! pl. exs. n. 1812; Edgew.). Clerodendron odoratum D. Don prodr. fl. nep. p. 102, Wall! cat. n. cit. Volkameria odorata Hamilt. in Roxb. hort. bengh. p. 46. Planta grata aromatica, habitu persimilis præcedenti. Folia sesqui-triplicaria, in petiolum brevem acuminata, venosa. Paniculæ iis Labiatarum omnino similes, bracteis bracteolatis lanceolatis interstinctæ. Calyx campanulatus, 2 $\frac{1}{2}$  lin. longus, semi-5-fidus, laciniis subulato-lanceolatis trinerviis. Cor. rubra, tubus calycem adæquans; limbi laciniæ 4 superiores subæquales oblongæ patentæ, ima major porrecta. Stamina exserta flexuosa; antheræ loculi divaricati. Stylus staminibus duplo longior, arcuato-deflexus, stigmata bifido terminatus. Capsula calyce paulo aucto hiante insidens eoque brevior, pubescens, cum calyce glanduloso-punctata. (v. s. in h. DC.)

XXI. GLOSSOCARYA Wall. cat. n. 1741, Griffith in McClelland's Calcutta journ. of nat. hist. 3 p. 366.

Calyx cyathimorpho-campanulatus, 4-5-dentatus, 8-10-nervis. Corolla

hypocraterimorpho - infundibuliformis, tubo cylindraceo gracili, limbi 4-5-partiti laciniis subæqualibus patentibus. Stamina 4-5, corollæ tubo inserta, exserta. Ovarium biloculare; spermophorum parieti internæ affixum, bilamellare, lamellis contiguis parallelis margine recurvatis singulisque superne ovulum pendulum gerentibus. Stylus filiformis, exsertus, stigmate bifido. Capsula calyce paulo aucto coriaceo insidens, semiexserta, maturitate in carpidia duo septicide secedens ipsisque carpidiis cum superâ spermophori parte loculicide bipartibilibus denique 4-valvis; valvulis deciduis singulisque superne spermophori fragmentum altero latere accretum et semen retinens gerentibus, inferne autem liberis alamque seminis membranaceam ligulæformem mentientibus; spermophori basis integra columnaris in fundo calycis residua. Semen maturum non vidi. — Frutex Indicus. G. MOLLIS (Wall. l. c., Griff. l. c.) ♂ In India or. rupibus calcareis ad speluncas Demitharot editas, ad fl. Attrah prov. Maulmain iu regno Birmanico. Frutex undique pube subtomentosâ molli canescens. Folia subcoriacea, opposita, subcordato-ovata, acutiuscula, integrerrima, brevissime petiolata, integriflora, supra puberula viridia et nitida, subtus incana, 3-4-pollicaria. Panicula terminalis, brachiata, inferne foliosa, cymis multifloria. Calyx floriger vix sessuilineam longus, dentibus brevibus latis rotundatis abrupte acuminalatis; fructiger 2 lin. longus. Capsula superne piloso-villosa, subter villo punctata. (v. s. in h. DC. ab ill. cœtu merc. Ind. or. comm.)

XXII. HYMENOPYRAMIS Wallich cat. n. 774, Griffith in McClelland's Calcutta Journ. of nat. hist. 3 p. 365.

Calyx minimus, 4-dentatus, statim post anthesin increscens. Corolla subinfundibuliformis, tubo brevi calycem æquante, limbo 4-partito laciniis subæqualibus. Stamina corollæ fanci inserta, exserta, subæqualia. Antheræ ovatæ, erectæ, biloculares, loculis parallelis rimâ longitudinali dehiscentibus. Ovarium fundo calycis insidens, 4-loculare, loculis uniovulatis, ovlis pendulis. Stylus capillaris, exsertus, stigmate bifido. Capsula calyce valde ampliato reticuloso membranaceo quadriplato ore connivente inclusa, maturitate 4-valvi-partibilis. Semen spermophoro replicato valvulae adnexo amplexum, radiculâ inferâ. — Frutex Indicus.

H. BRACHIATA (Wall. cat. n. 774, Griff. l. c.) ♂ In India orientali centrali, e. g. ad fl. Irawaddy et in monte Tong-dong Avæ (Wall!). Frutex subscandens, ramis elongatis, ramulis brachiatis cum paniculâ tomento stri-goso candicans. Folia membranacea, opposita, ovata vel ovato-oblonga, acuminata, brevipetiolata, integrerrima, supra glabra, nitida, subtus pube brevi tomentosâ incana. Panicula terminalis, inferne foliosa, ramulis brachiatis, cymis multifloris dichotomis minutissime bracteolatis, floribus minimis. Calyx sub anthesi 4 lineæ longus, demum vero sub fructus maturiscentiâ 4 lin. longus aliquis 4 latus auctus, subpyramidalis, emarginatus. Capsula obovoidea, breviter stipitata, obtusa, piloso-lanata, dense resinoso-punctata. (v. s. in h. DC. ab ill. cœtu mereat. Ind. or. comm.)

XXIII. PERONEMA Jack in mal. misc. 7 p. 46 et in Hook. comp. bot. mag. 1 p. 153, Endl. gen. n. 3693.

Calyx 5-partitus, laciniis erectis acutis. Corolla tubo brevi, limbo expanso irregulari 5-lobo, laciniis secundis: superioribus duobus divergentibus, infimâ reliquis conspicue longiore. Stamina 2 fertilia exserta, ad laciniis corollæ superiores reflexa; 2 inferiora rudimentaria inclusa. Ovarium 4-loculare, ovlis erectis. Stylus terminalis, ultra stamina exsertus; stigma simplex refractum. Capsula calyce insidens, sicca, in carpidia 4 monosperma separabilis.

**P. CANESCENS** (Jack 1. c.), § in Sumatrâ. Arbor magna, ligno duto atque tenaci, trunco stricto, comâ exili. Folia opposita, pinnata, fere 2 pedes longa, foliolis utrinque 7-9 alternis suboppositis lanceolatis utrinque attenuatis acutis subrecurvis integrerrimis supra glabris subtus canescensibus et reticulato-venosis 8-9 poll. longis, petiolis alatis subtiliter tomentosis alis a foliorum insertione decurrentibus. Panicula terminalis ampla e cymis oppositis constituta, tenuiter tomentosa, cymis trichotomis. Bractæ angustæ, aoutæ. Flores inconspicui, albidi. Cor. tubus calyce haud multo longior. — Genus Vitici conjunctum, sed abunde distinctum. (Jack.)

### Subtribus III. VITICEÆ.

Cymæ di-trichotomæ, simplices vel paniculatæ, exinvolutratæ. Corolla regularis vel bilabiata. Drupa succosa, carnosa vel spongioso-tuberosa, rarissime carne destituta nucamentacea, calyci aucto insidens vel valde ampliato inclusa. — Arbores aut frutices, rarissime herbæ vel suffrutices, partim Asiaticæ, partim Australasicæ et Americanæ, pauca Africanæ et Mascarenhenses; unica species Europæa. Folia simplicia vel (in Vitice) etiam digitata.

### CONSPECTUS GENERUM.

**XXIV. Pityrodia.** — Cor. calycem æquans subregularis sub-5-fida. Drupa semibaccata, 2-pyrena, pyrenis bilocularibus. — Nova-Hollandia.

**XXV. Tectona.** — Cor. infundibularis, tubo calycem æquante, limbo 5-fido subæquali. Stigma bifidum. Drupa nucamentacea exsucca, calyci aucto vel vesiculoso inclusa, 4-locularis. Cymæ dichotomæ axillares vel paniculatæ. — Arbores Indicæ.

**XXVI. Prema.** — Cor. tubulosa brevis, limbo nunc subregulari 4-fido reflexo nunc bilabiato 4-fido patente. Stylus filiformis, stamina subæquans, stigmate bicruri. Drupa pisiformis, baccata, monopyrena, 4-locularis.

**XXVII. Petitia.** — Cor. infundibularis cal. æquans, 5-fida. Drupa baccata, monopyrena?, pyrenâ 4-loculari. — America.

**XXVIII. Callicarpa.** — Cor. campanulato-tubulosa, brevis, limbo æqualis 4-5-fido. Stylus filiformis, stigmate capitato. Drupa baccata, 4-pyrena, pyrenis unilocularibus. Cymæ dichotomæ, axillares. — Species permulta in Asiâ, paucæ in Australasiâ et Americâ.

**XXIX. Ægiphila.** — Cor. infundibularis aut hypocraterimorpha, æqualis 4-fida. Stylus capillaris, exsertus, stigmate bifido. Drupa carnosa 4-pyrena, pyrenis unilocularibus. Cymæ trichotomæ axillares aut terminali-paniculatæ. Flores saepius abortu diclini. — America.

**XXX. Volkameria.** — Cor. hypocraterimorpha, limbo subinæquali 5-fido. Drupa carnosa vel tuberosa, dipyrena, pyrenis bilocularibus. — Species una Americana, altera Africana.

**XXXI. Clerodendrum.** — Cor. hypocr., limbo subæquali vel inæq. subsecundo 5-fido. Drupa baccata 4-pyrena, pyrenis unilocularibus. — Species complures, Indicæ et Australasicæ, paucæ Africanæ et Americanæ.

**XXXII. Cyclonema.** — Cor. irregularis, tubo inclinato, limbo

5-partito, lacinia posticâ cucullatâ, reliquis secundis adscendentibus. Drupa vix carnosa, 4-pyrena, pyrenis unilocularibus. — Africa.

**XXXIII. Oxera.** — Cor. infundibularis, ventricosa, curviuscula, limbi 4-fidi, lobo super. subminore integerrimo, insinuо porrecto paulo majore. Stam. 2 ananthera. Germen profunde 4-lobum. — Nova-Caledonia.

**XXXIV. Amazonia.** — Cor. tubuloso-infundibularis, limbo 5-fido reflexo, lacinia infimâ reliquis breviore. Drupa succosa 4-pyrena, pyrenis unilocularibus. Flores trichotomo-cymosi, cymis in paniculam racemiformem bracteis coloratis interstictam secundam collectis. — America.

**XXXV. Gmelina.** — Cor. basi tubulosa faucibus valde ampliatis ventricoso-campanulata, limbo bilabiato-4-fido, lobo supremo fornicate, insimo maximo. Drupa baccata monopyrena, 4-loc. — India.

**XXXVI. Cornutia.** — Cor. bilabiato-4-loba, lobis 3 super. subæqualibus, imo paulo majore porrecto. Stam. 2 fertilia, 2 ananthera. Drupa pisiformis, succosa, monopyrena, 4-locularis. — America.

**XXXVII. Vitex.** — Cor. bilabiata, labio super. 2- inf. 3-fido. Stam. didynama. Drupa succosa, monopyrena, 4-locularis. Folia digitata, rarissime simplicia. — Arbores et frutes inter tropicos et totius orbis maximâ copiâ, minori in temperatis.

*Genera denuo recognoscenda.*

**XXXVIII. Holmskioldia.**

**XXXIX. Quoya.**

**XL. Hemigymnia.**

**XLI. Scleroon.**

**XXIV. PITYRODIA** R. Br. *prodr. fl. nov. holl. ed. N. ab E. p. 369, Endl. gen. n. 3702, Meisn. gen. p. 291.*

Calyx campanulatus, 5-fidus, æqualis. Corolla calycem æquans, breviter infundibuliformis, subregularis, labio superiore semibilobo, inferiore subæqualiter tripartito, fauce villis ad staminum insertionem fasciculatis clausa. Stamina 4, fauci corollæ inserta, subdidynama, inclusa; filamenta brevia; antheræ citra basin bifidam insertæ, erectæ, biloculares, loculis e connectivo dorsali incrassato basi divergentibus. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus inclusus, filiformis, rectus. Stigma breviter bilamellare, lamellis patentissimis. Drupa semibaccata (apice fertili exsucco) dipyrena, pyrenis bilocularibus, loculis dissepimento communi contiguis monospermis, putamine duro. — Frutex Novæ Hollandiæ.

**P. SALVIAEFOLIA** R. Br. l. c.  $\beta$  In Novæ-Hollandiæ orient. intratropicâ, ad Cape-Cleveland (Allan-Cunningham!). *Prema salvifolia* Spreng. syst. 2 p. 755. Frutex undique pubescenti stellaris subsquamulosâ, in ramulis dorsoque foliorum rubente, furfuraceus. Folia opposita, anguste lanceolata, utrinque attenuata, integerrima, reticulato-rugosa, graveolenta. Flores in corymbulos axillares subsessiles collecti, singuli bracteolâ subulata subtensi. Calyx turbinato-campanulatus,  $2\frac{1}{2}$  lin. longus, nervo laciniarum medio valido decurrente 5-costatus, lacinia acutis marginè revolutis uninerviis, tubo

interne lævi. Cor. calycem adæquans, non exserta, laciniis brevibus ovatis dorso villosis, cæterum cum tubo lævibus. Barba ad staminum basin filamenta adæquans. (v. s. in h. DC.)

XXV. TECTONA Linn. fil. suppl. p. 151, Endl. gen. n. 3703, Meisn. gen. p. 291 et comment. p. 200. Gærtn. de fruct. 1 p. 274 t. 57, Roxb. pl. corom. 1 p. 10 t. 6, Wall. pl. as. rar. 3 t. 294. — Theka Rheedea malab. 4 p. 57 t. 27, Juss. gen. p. 108. — Iatus Rumph. amb. 3 p. 34 t. 18.

Calyx campanulatus, 5-fidus. Corolla infundibuliformis, tubo brevi cælycem subrequare, limbo 5-fido subæquali patente, fauce pilosâ. Stamina 5-6, corollæ tubo inserta, exserta, subæqualia; antheræ cordatae, biloculares, loculis parallelis rimâ longitudinali dehiscentes. Ovarium minutum in fundo corollæ, quadriloculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, teres, longitudine staminum; stigma acute bifidum. Drupa monopyrena sarcocarpio spongioso-suberoso, vel nucamentacea carne omnino carens, calyci aucto vel vesiculoso-inflato amplio vel minus aucto arcto que ore coarctato omnino inclusa, pyrenâ quadriloculari, putamine dissepimentisque osseis. Semen crassum, oleosum, radiculâ brevi inferâ. — Arbores Indicæ, excelsæ, pubes stellaris canescentes, ramulis angulatis, foliis coriaceis oppositis verticillatis amplis integerrimis subter pubescentibus et glanduloso-punctatis, cymis dichotomis axillaris vel in paniculam terminalem collectis, floribus parvis albidis vel cœruleoscentibus.

1. T. GRANDIS (Linn. fil. l. c.), ramis quadrangularibus, foliis oppositis supra scabris subtus tomento stellari tonso candicantibus, calyce fructifero ampio vesiculoso globoso. ♂ In omni fere Indiâ orientali, vastissimas silvas constituens (Wall. cat. n. 772) et in Archipelago Indico e. g. Amboinâ (Rumph.), Javâ (Bl. Jungh.), Timor (Mus. paris.). — Sieber! h. fl. trinit. n. 27 cult., Roxb. pl. corom. 1 p. 10 t. 6, Gærtn. de fruct. 1 p. 275 t. 57. Theka Rheed. hort. mal. 4 p. 57 t. 27. Iatus Rumph. amb. 3 p. 34 t. 18. Iattie sive Djatje mal. Arbor elata, ligno durabilis ad ædes imprimitis autem naves struendas usitatissimo. Ramuli cum paniculâ tomento farinaceo candicantes. Folia amplissima, ovata vel subelliptica, acuminata, brevipetiolata, supra nitida. Panicula terminalis amplissima, pyramidalis, cymis pedunculatis oppositis dichotomis patentibus minute bracteolatis. Flores parvi copiosi, pauci tamen fertiles. Calyx patellaris brevis; fructifer maxime auctus, membranaceus, Physalidum ad modum inflatus, clausus, nucus Juglandis mole, globosus, drupam globosam cerasi magnit. floccoso-lanatum spongiosam velans. (v. s. in h. DC.)

2. T. HAMILTONIANA (Wall. pl. as. rar. 3 p. 68 t. 294), ramis 6-8-angularibus, foliis ternis quaternis verticillatis supra asperrimis subtus tomento stellari floccoso incanis, calyce fructifero oblongo arcto. ♂ In Indiâ orientali ad ripas fluminis Irawadi et in montosis Ava (Wall. n. 773) et in Philippinis (Cuming ! pl. exs. n. 1432). Theka ternifolia Hamilt. in trans. Linn. soc. 17 p. 185. Arbor elata, præcedenti habitu non dissimilis, sed facilis distinctu. Ramuli cum cymis tomento stellari densissimo incani. Folia elliptica, acuta, brevissime petiolata, supra setulis callo magno insidentibus scaberima, subtus penninervia et grosse reticulata. Cymæ axillares, folium excedentes, dichotomæ, ramis patentibus. Flores parvi, cœrulei; alares sessiles, reliqui pedicellati. Calyx superne ampliatus, 5-fidus, laciniis reflexis brevibus. Nux quadrilocularis sarcocarpio nullo putamine osseo, oblonga, matura 3 lin. circ. longa, calyce arcto tecta ejusque laciniis auctis coronata. (v. s. in h. DC. et h. reg. berol.)

**XXVI. PREMNA** Linn. gen. n. 1316, Juss. gen. p. 107, Endl. gen. n. 3701, Meisn. gen. p. 291 et comment. p. 199, Gærtn. fr. 1 p. 269 t. 56, Lam. ill. t. 543. — *Cornutia* Burm. fl. ind. tab. 41, non *Plum.* nec *Gærtn.* — *Gumira littorea* et *Folium hircinum* Rumph. amboin. 3 p. 208 t. 133 et 134. — *Gumira Hasskari* in *Florâ 25* (1842). v. 2 beibl. p. 26 et hort. bogor. (1844) p. 135. — *Holochiloma Hochst.*! in *Florâ 1841* p. 371.

*Calyx* cupuliformis, cyathimorphus vel subcampanulatus, subbilabiato-4-5-fidus vel dentatus aut bilabiatus labio utroque vel altero saltem integro, persistsens demumque auctus. *Corolla* tubulosa, tubo subinfundibulari brevi; limbus nunc bilabiato-quadrifidus, patens, labio superiore semibifido emarginatove, inferiore trifido tripartitove lobis subæqualibus vel medio nonnihil producto, nunc subregularis reflexus; fauces villosæ, sæpius longe barbatæ. *Stamina* 4, didynamia vel subæqualia, corollam subæquantia vel exserta, aequidistantia; antheræ subrotundæ dorso insertæ loculi basi divergentes. *Ovarium* 4-loculare, loculis uniovulatis. *Stylus* filiformis, *stamina* subæquans. *Stigma* bifidum, cruribus divaricatis. *Drupa* pisiformis, carnosa, monopyrena, putamine axi perforato duro rugoso vel verrucoso-tuberculato 4-loculari vel abortu bi-triloculari. *Semen* radiculâ inferâ erectum. — Frutices vel suffrutescens aut arbores præsertim in Asiâ, tum etiam in Africâ et insulis Mascarenis, Novâ Hollandiâ et Australiâ tropicâ crescentes, glabri aut pube simplici stellatâve induiti, rarius glanduloso-punctati, odore herbæ et florum plerumque gravi sambucino vel hircino pollentes. *Folia* opposita, simplicia, integerima aut dentata, penninervia, citra basin sæpius multiplinervia. *Flores* parvi, in paniculas terminales trichotomo-cymosas, corymbiformes, brachiato-pyramidalatas aut anthuroideas collocati, sæpius polygami solis alaribus primaris fertilibus. — Genus hinc Vitici illinc Callicarpæ affine, ab illo foliis simplicibus et corollâ, ab hoc inflorescentiâ terminali fructu calyce et corollâ distinctum.

### Sec. I. GUMIRA. — *Gumira Hassk. l. c.*

*Calyx* 4-fidus vel 4-dentatus aut bilabiatus, labio utroque vel altero saltem integro. *Corolla* lacinii subæqualibus plerumque subhypocraterimorpha.

#### § 1. *Panicula corymbiformis.*

\* *Calyx* 4-dentatus.

1. **P. FÆTIDA** (Reinw. ex Blume bijdr. p. 816), ramulis paniculâque tenuiter lanuginosis, foliis petiolatis ovalibus coarctato-acuminatis postice interdum paulo angustatis basi obtusâ integrerrimus vel superne repandis utrinque glabris nitidisque axillis nervorum infra pubescens, paniculis terminalibus divaricato-corymbosis multifloris, calyce (perexiguo) subbilabiato obsolete 4-dentato, corollæ infundibularis tubo calyce subduplo longiore. ↳ In silvis montanis Java (Bl., Zolling. pl. jav. n. 725!). *Gumira* fotida Hassk. in *Florâ 25* beibl. p. 26, et hort. bogor. p. 135. *Gumira* domestica mas et femina Rumph. amb. 3 p. 208, ex Hassk.: foliis repandis et integrerrimis. *Folia* 6-pollicaria, petiolo sexunciali, membranacea, venosa. *Flores* minutti. *Calyx* cyathimorphus, membranaceus, vix semilineam longus. *Cor.* *limbus* subæqualiter 4-fidus, lacinii reflexis, faucibus villosis. *Genitalia* longe exserta. (v. s. in h. DC.)

2. **P. ADENOSTICATA**, ramulis paniculâ petiolis foliorumque nervis pube stellatâ farinaceo-tomentosis, foliis longe petiolatis ovatis in acumen longum attenuatis integrerrimis adultis in utrâque paginâ glabratris supra nitidis subtus glandulosopunctatis, paniculâ patente-corymbosâ multiflorâ laxâ, calyce cyathimorpho acute 4-lobo, corollæ subbilabiatae tubo calycem æquante. ↳ Crescit in insulis Philippinis (Cuming! n. 1230.). Similis quodammodo **P. tomentosæ**, sed foliis

- et flore distincta. Tomentum flavescentia. Folia membranacea, levia, tenuiter venoso-reticulata, 4-6-pollicaria, petiolo sesqui-bipollucari. Panicula ampliuscula convexa, ramis imis patentissimis. Flores polygami, subter pubes glandulosopunctati, primarii uniuscujusque cymæ fertiles. Calyx lineam oiroiter longus, lobis brevibus triangularibus, sinibus acutis. Cor. limbus facie villo raro conspersus, fauces brevibarbatæ. Genitalia corollam long. subæquantes. (v. s. in h. reg. berol.)
3. *P. VESTITA*, tota pubes simplici vestita, foliis petiolatis subcordatis acuminatis integerrimis supra pubesoentibus subtus villo subtomentoso canescensibus et glandulosopunctatis, paniculâ exigua compacte corymbosâ, calyces cupuliformi 4-fido. ♂ In insulis Philippinis (Cuming! n. 599.). Species insignis. Folia grandia, nostro 4-6 poll. longa, 3-4 $\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo subbipollucari. Calyx lineam longus, lobis ovatis obtusiusculis æqualibus. (v. s. oum alabastris in h. reg. berol.)
4. *P. TIMORIANA* (Decaisne! in nouv. ann. du Mus. 3 p. 402), ramulis glabris, foliis ovatis basi rotundatis acuminatis obtusisve integerrimis vel superne grosse dentatis glabris nitidis, petiolis brevibus supra pubescentibus, cymis terminalibus corymbosis pubescentibus, calycibus cyathimorphis breviter 4-fidis lobis rotundatis, corolla tubo calyce subduplo longiore. ♂ In insula Timor (Mus. paris!). Folia 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, subtus vel omnino glabrata vel in axillis nervorum inferiorum barbata. Calyx lineâ nonnihil brevior, subglabratu, pedicello brevi fultus. Corollæ limbus æqualis patens, stamina excedens; fauces breviter barbatæ. (v. s. in h. DC. ex Mus. paris.)
5. *P. SAMBUINA* (Wall.! cat. n. 1775), ramulis ad nodos petiolis nervorumque foliis axillis subtus lanuginosis, foliis brevipetiolatis ovatis vel subrotundo-ovatis breviacuminatis basi rotundatis levitorve cordatis integerrimis nervis pubescentibus paginis demum glabratris superaque nitida inferâ opacâ pallidâ, paniculâ terminali divaricato-corymbosâ multiflorâ, oalyce cupuliformi bilabiato 4-dentato dentibus labii alterius saepius obsoletis, corollæ subæqualiter 4-fidæ barbatæ tubo calyce semilongiore. ♂ Crescit in Ind. orient. ad Moalmyne (Wall.!). Folia 3-4-pollicaria. Flores sicci madefacti adhuc pollent odore gravi sambucino-hircino. Calyx lineam longus, dentibus labii inf. ovatis obtusiusculis. Genitalia paulo exserta. (v. s. sp. mancum in h. DC.)
6. *P. GAUDICHAUDII*, ramulis panioulâque puberulis, foliis longe petiolatis latovatis brevi-acuminatis integerrimis in pagina utrâque glabratris nervis juniorum supra puberulis axillis nervorum subtus lanuginosis, paniculâ terminali corymbosâ multiflorâ calyce brevi cupuliformi subbilabiato labio superiore obsoleto bidentato vel integrerimo inferiore vero acute bidentato, corollæ subæqualiter 4-fidæ tubo calyce æquali. ♂ In archipelago Marianæ (Gaud.!) Folia, in nostro plerumque imperfecta, 5-pollicaria, petiolo sesquipollucari. Flores parvi, calyce lineam æquante. Cor. laciniae reflexæ, Genitalia breviter exserta. (v. s. spec. imperf. in h. DC.)
- \* \* *Calyx bilabiatus*, lobis altero bidentato altero integro.
7. *P. DIVARICATA* (Wall! cat. n. 1781), ramulis paniculâque pubescentibus mox glabrescentibus, foliis coriaceis petiolatis elliptico-oblongis obtusis integerrimis utrinque glabris supra nitidulis subtus pallidis venarum axillis infra interdum pubescentibus, paniculâ terminali divaricato-corymbosâ multiflora, calyce cupuliformi leviter bilabiato labio inferiore acute bidentato superiore integro, corollæ tubo cylindrico calycem duplo excede. ♂ Crescit in Indiâ orient., ad caput Rochado freti Malayani (Wall.!), in insulis Mascarenis (Mus. paris!), in insula Madagascar (Bojer!). *P. integrifolia* Willd. in Nov. act. nat. cur. 4 p. 187? Stirps insignis, ex annotatione cl. Bojer in planitiibus aridis submaritimis fruticem exilem exhibens, in fertilibus silvaticis autem caule volubili super altissimas arbores scandens. Folia 6-9-pollicaria

petiolo pollicari, adulta rigidule coriacea, recentia trita (ex Bojero) odorem Sambuci nostratis similem spargentia. Calyx  $\frac{3}{4}$  lin. longus. Cor. subinfundibulari-hypocraterimorpba, limbo reflexo, lacinii ovatis obtusis, supremâ retusa, infinâ paulo longiore. Genitalia exserta. (v. s. in h. DC. sp. Wall. imperf.; descripti spec. Bojer.)

8. P. SERRATIFOLIA (Linn. mant. 2 p. 253), arborea, trunko ramisque adultis opposite spinosis, ramulis inermibus paniculis petiolisque pubescentibus, foliis brevipetiolatis ovatis ovalibus breviter et obtuse acuminatis postice rotundatis integerimis vel superne crenato-dentatis adultis utrinque glabratiss supra nitidis subtus opacis pallidis, paniculis terminalibus laxe corymbosis, calyce bilabiato labio supero acute bidentato infero saepius integro, corolla tubo cylindrico calyce duplo longiore. 5 In Indiâ orientali littorali, in Ceylonâ (Leschen.), prope Calcuttam (Roxb.) in penins. Malaccensi (Ad. Delessert!). Cornutiooides Linn. fl. zeyl. n. 416 (ex deser., stipulis nostræ deficientibus tamen exceptis). Cornutia corymbosum Burn. ind. p. 133 t. 41 f. 1. Gumira littoralis Rumpb. amb. 3 p. 289 t. 134? P. integrifolia Linn. l. c. vix dubie. P. corymbosa Rottl. et Willd. in nov. act. nat. cur. 4 p. 167. P. serratifolia Wall. herb. n. 1767! P. spinosa Roxb. fl. ind. 3 p. 77 (ex Wall. herb. n. 1782!). Gumira integrifolia Hassk. hort. bogor. p. 135. Folia opposita, interdum verticillata, terna-quaterna, coriacea, 2-3-pollicaria, petiolo semipollucari. Flores graveolentes. Calyx cupuliformis 2 lin. longus. Cor. virescenti-lutea, limbo brevi, labio super. retuso, inferioris lacinia mediâ rotundatâ lateralibus vero ovatis obtusis, omnibus fere æquilongis; fauces barbatæ. (v. s. in h. DC.)

\* \* \* *Calyx bilabiatus, labio utroque integro.*

9. P. CORDIFOLIA (Roxb. fl. ind. 3 p. 78) ramulis cymis petiolisque foliorum juniorum villosis, foliis brevipetiolatis cordatis vel cordato-ovatis acuminatis integerimis bullatis denique utrinque glabratiss supra nitidis subtus opacis pallidis, paniculâ terminali parvâ coarctato-corymbosâ, calyce cyathimorpho bilabiato labio utroque rotundato integerim, corolla bilabiata tubo calycem æquante. 3 In Indiâ orient., Prince of Wales-Island (Roxb.), copiose circa Pondichery (Perrottet!). Frutex ex Perrott. dumosus, 3-6-pedalis, erectus, floribus flavescens-albidis. Rami virgati, simplices vel ramulosi. Folia 3-6-pollicaria, inter nervos bullata, tenuiter venosa. Calyx glabriuscus, sesquilineam longus, labii latis, inferiore paulo magis producto. Corolla labium superius rotundatum, integerimum, concaviusculum, inferius æquilongum rotundato-trilobum, lobo medio concavo; fauces tenuiter villosæ. Stamina inclusa; stylus exsertus. Drupa pisiformis, putamine verrucosæ. (v. s. in h. DC.)

10. P. MARIANNARUM, ramulis paniculâ foliorum petiolis nervis que utrinque pube brevi appressâ subcanescensibus, foliis brevipetiolatis ovalibus subrotundisque obtuse brevissime que acuminatis vel obtusissimis immo truncatis basi rotundatis vel leviter cordatis integerimis paginis tandem utrinque glabratiss axillis nervorum inferis lanuginosis, paniculâ terminali parvâ corymbosâ, calyce cupuliformi bilabiato, labio superiori brevissimo truncato, inferiore producto rotundato integerim, corolla subæqualiter 5-fidae barbatæ tubo calycem æquante. 5 In archipelago insularum Mariannæ (Gaud.). Folia bipollucaria, petiolo semipollucari. Calyx lineam longus. Corolla tubus latocylindricus; fauces insigniter barbatæ. Genitalia exserta. (v. sp. imperf. in h. DC.)

11. P. SCANDENS (Roxb. fl. ind. 3 p. 82), ramulis cymisque pubescentibus subvillosis, foliis petiolatis ovato-oblongis subcordatis cuspidato-acuminatis basi rotundatis obiter cordatis integerimis glabris supra nitidis subtus pallidis, paniculâ terminali corymbosâ, calyce cupuliformi emarginato bilobo glabro, corolla lacinias oblongis obtusis, fauce villosâ. 5 In sylvis Indiâ orient., Silhet (Roxb., Wall., n. 1774! ex parte). Rami verrucoso-lenticellati. Folia 4-6 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$  4 poll. lata, petiolo pollicari. Paniculæ majusculæ ramis

patentibus. Flores minimi virescenti-flavi, ex toto lineâ haud multo longiores. Genitalia exserta. Drupa rotundata, pisiformis, nigra, glabra. (v. s. in h. DC.).

12. P. PARASITICA (Blume! bijdr. p. 816), volubilis, ramulis cymisque foliorumque reti marginibusque pube caducâ afflati, foliis brevipetiolatis ovalibus oblongisve acutis obtusis basi interdum subcordatâ subpeltatis integerrimis denique glabratris supra nitidis subtus pallidis grosse venosis, paniculâ terminali amplâ corymbosâ, calyce bilabiato labiis integris, corollæ fauce valde barbatâ. ♂ In silvis montanis Javæ ins. (Blume!). Gumira parasitica Hassk. in florâ 28 p. 2 heibl. p. 26. Folia chartacea perampla, in nostro specimine 6-12 poll. longa, 4-6 poll. lata, nervis 3-5 infimis citra basin confluentibus postice quasi breviter peltata. Paniculæ rami patentes bracteâ parvâ lanceolatâ sustensi; bracteolæ subnullæ. Calyx subsessilis, membranaceus, lineam longus, labiis obtusis vix emarginatis. Cor. tubus sesquilineam longus; limbus æqualis reflexus; fauces villis exseritis albis barbatæ. Stamina exserta antheris subdidymis, stylo breviter bifido nonnihil superata. (v. s. exempl. auth. in h. cl. Nees ab Eesen.).

13. P. QUADRIFOLIA (Schum. et Thonning! dansk vidensk. selsk. afh., 4 p. 49), ramulis cymis foliorumque petiolo dorsoque pubescenti-tomentosis, foliis quaternis verticillatis longe petiolatis subcordato-ovatis cuspidato-acuminatis integerrimis vel superne obsolete dentatis supra pubescenti-scabridis nitidisque, paniculâ terminali verticillatâ thyrsoidâ, calyce truncato obsolete bilobo, corollæ tubo calycem duplo excedente. ♂ In Guinéa (Thonnn.). Folia 2-triplicaria, petiolo pollicari, subtus grosse reticulata. Flores brevipedicellati, ebracteolati. Calyx cyathiformis, lineam longus, puberulus. Cor. tubus in fauces villosas ampliatus; limbus inæqualiter 4-fidus, obsolete bilabiatus. Genitalia breviter exserta. Stylus declinatus; stigma divaricato-bifidum. (v. sp. auth. in h. DC.).

### § 2. *Panicula anthuroidea*.

14. P. RACEMOSA (Wall.! cat. n. 1777) ramulis cum rhachi cymarum foliorumque novellorum reti pubescentibus, foliis petiolatis ovato-ellipticis oblongisve utrinque acuminatis superne leviter remote crenatis adultis denique in utraque paginâ glabratris subtus pallidis, cymis terminalibus racemiformibus interrupte glomerosis, floribus brevipedicellatis, calyce subretuse bilobo, corollæ tubo calycem subduplo excedente. ♂ In Nepaliâ (Wall.!). Folia circiter triplicaria, petiolo 4 lin. subæquante. Cymæ (anthur.) 3-4-pollicares, angustæ; glomeruli brevipedicellati, bracteâ exigua suffulti. Calyx membranaceus, lineam longus. Cor. conspicue bilabiata, labio superiore oblongo subreverso, inferioris laciini lateralibus ovatis reflexis, intermediâ oblongâ porrectâ; fauces subvillose. Genitalia longe exserta; stigma bifidum (v. s. in h. DC.).

15. P. INTERRUPTA (Wall.! cat. n. 1778), ramulis cymarumque rhaci foliorumque novellorum reti et dorso lanuginosum, foliis subsessilibus elliptico-oblongis utrinque acuminatis vel postice angustatis integerrimis denique in utraque paginâ glabratris nitidisque subtus vero pallidioribus, cymis terminalibus racemiformibus interrupte glomerosis, floribus sessilibus, calyce obtuse bilobo, corollæ tubo calycem æquante. ♂ In Nepaliâ (Wall.!). Folia chartacea, 6-8 poll. longa, 2-3½ poll. lata. Flores sessiles in glomerulos sessiles vel brevissime pedunculatos multifloros subnudos congesti. Calyx lineam fere longus, superne subglabratius. Cor. fauce vix villosâ. Genitalia exserta. Stigma bifidum, cruribus horizontaliter patentibus. Proxima P. racemosæ. (v. s. in h. DC.).

### Sectio II. PREMNO. — Premnos Hassk. l. c.

Calyx 5-fidus aut 5-dentatus. Corolla (plerumque conspicue) bilabiata.

\* Asiatica.

16. P. PYRAMIDATA (Wall.! cat. n. 1779), ramulis paniculâ foliorum nervis dorsoque pube stellatâ tomentosis, foliis petiolatis oblongis ovalibus subcordato-

rotundatis in acumen temne angustatis integerrimis postice brevissime acuminatis rotundatis subtruncatis in facie denique glabratris nitidulisque, panicula terminali ampliuscula pyramidalata patente, calyce campanulato brevissime et subæqualiter 5-dentato, corollæ bilabiatae tubo calycem subæquante. ♂ In India ulterioris prov. Tavoy (Wall.). Folia papyracea, grandiuscula, 6 poll. longa, 2½-4 poll. lata, petiolo 1-1½-unciali. Panicula pedunculata semipedalis, ramis patentibus. Calyx vix sesquilineum longus, subbilabiatus, dentibus brevissime exsertis acutis sinibus leviter arcuatis distinctis. Cor. extus pulverulenta; labium superius majus rotundatum, subconcavum, reclinatum, inferius trifidum, porrectum, lobo intermedio uniformi-rotundato retuso concavo, lateralibus ovatis obtusis; fauces villosæ. Stam. didynama, orollæ breviora. Stigma emarginatum. Drupa pisiformis putamine rugoso (v. s. in h. DC.).

17. *P. CUMINGIANA*, ramulis pauciculâ foliorum nervis dorsoque pubescentiastellatâ floccoso-tomentosis, foliis petiolatis cordatis ovalibus ovatis in basi leviter cordata acuminatis integerrimis in facie denique glabratris nitidulisque, pauciculâ terminali ampliuscula subpyramidalata patente, calyce campanulato subæqualiter acuteque 5-fido, corollæ bilabiatae tubo calycem paulo excedente. ♂ In insulis Philippinis (Cuming! n. 778 et et 1280). Proxima *P. pyramidatae*, calyce in primis, tum etiam foliis magis cordatis floribusque nonnihil majoribus recessens. Indumentum canescens, sepius rufescens. Folia magna, 9 poll. longa, 5 poll. lata, petiolo bipollicari. Calyx sesquilinearis, subbilabiatus, dentibus ovatis acutiuseulis sinibus acutis interstinctis. Cor. extus pulverulenta et glandulosa; labium superius majus lato-ovatum subascendens, inferius trifidum, lobo medio rotundato concavo porrecto, lateralibus ovatis obtusis reversis. Genitalia inclusa. Drupa pisiformis putamine rugoso (v. s. in h. reg. berol.).
18. *P. LONGIOPOLIA* (Roxb. fl. ind. 3 p. 79), ramulis paniculâ petiolis retique foliorum pubescentiastellatâ farinaceo-tomentosis, foliis petiolatis ovato-oblongis oblongis brevi-acuminatis integerrimis denique in utrâque paginâ glabratris supra nitidis subtus pallidis, paniculis terminalibus patenti-cymbosis multifloris, calyce campanulato bilabiato 5-dentato, corollæ tubo calycem dimidio excedente. ♂ Crescit in silvis Bergalensis (Roxb., Wall. cat. n. 1771!). Folia figurâ varia, nunc longiora, nunc latiora, 4-10-pollicaria, basi nunc brevissime producta nunc levissime cordata, petiolo pollicari canaliculato; paginâ inferâ fol. novell. farinaceo-tomentosa. Flores ex Roxb. odorati. Calyx lineam longus, dentibus inferis acutis, superis brevioribus obtusis. Cor. alba, limbo bilabiatis 4-partito, lacinia infimâ emarginata (v. s. in h. DC.).

19. *P. PUBESCENS* (Blume bijdr. p. 816), ramulis paniculâque rufo-pubescenti-tomentosis, foliis longe petiolatis ovatis oblongis cuspidato-acuminatis superne repando-dentatis ceteroquin integerrimis utrinque pubescentibus nitidulisque, paniculis terminalibus cymbosis multifloris, calyce cupuliformi subbilabiato rotundato-5-lobo, corollæ tubo subcampanulato calycem duplo excedente. ♂ In sylvis montanis Javae (Bl., Zollinger pl. jav. n. 645!). Folia membranacea, ampliuscula, 6-pollicaria et majora, subtus pallide viridia. Flores pro genere majusculi. Calyx pubescentia vestitus, lineam longus. Corollæ limbus supra puberulus; labium superius quam inferius brevius, subquadratum, retusum, inferioris labii lobi ovati obtusi deflexi, intermedio lobo lateralibus paulo longiore; fauces barbatæ. Genitalia longe exserta; stamina didynama; stylus breviter bifidus. (v. s. in h. DC.)

20. *P. TOMENTOSA* (Willd. spec. 3 p. 314), ramulis foliisque novellis cymisque totis tomentosis, foliis petiolatis ovatis ovato-oblongis sensim et longe acuminatis integerrimis venoso-rugosus supra denique præter nervos glabratris subtus vero floccoso-tomentosis et glanduloso punctatis, cymis terminalibus multifloris ovatis densis. ♂ In India orient. (Wall. cat. n. 1769!), circa Pondichery (Perrottet!), ad radices montium Nileghiricorum (Leschenault!). Cornutia cymbosa Lam. encycl. I p. 54. *P. flavescens* Juss. ann. mus. 7 p. 77? Arbuscula. Folia adulta 5-6 poll. longa, basi 2½-3 poll. lata, multiplinervia, venoso-sub-

- rugosa. Bracteolæ minutæ. Calyx sub sessilis, lineâ paulo longior, corollæ limbo brevi superatus, lobis 5 subæqualibus rotundato-obtusis. Corolla parva, albida, extus glanduloso-punctata, fauce loboque labii inf. intermedio paulo producta acuta villosa, lobis lateralibus obtusis, supremo retuso. Drupa pisi magnitudine, putamine osseo rugoso. (v. s. in h. DC.)
21. *P. MICRANTHA*, ramulis paniculâque pubescentibus, foliis petiolatis ovatis vel ovato-oblongis brevissime acuminatis obtusis integerrimis junioribus puberulis, paniculis terminalibus brachiato-corymbosis laxis multifloris, calyce subbilabiato obtuse 5-fido, corollæ tubo infundibulari calycem duplo superante. ♂ (?) In Ind. orient. (Wall. n. 1774! ex parte.). Habitu *P.* scandenti; quacum commisicuit cl. Wallich, haud omnino dissimilis, ait foliis et calyce toto cœlo diversa. Folia (non vidi nisi novella)  $2\frac{1}{2}$ -pollioaria, petiolo semiuncialis. Flores perexiguæ. Calyx  $\frac{1}{2}$  lin. longus. Cor. bilabiata laciniæ subæqualongæ, obtusa; fauces conspicue barbatæ. Genitalia longe exserta. Stylus bifidus. (v. s. in h. DC.)
22. *P. LATIFOLIA* (Roxb. fl. ind. 3 p. 76), ramulis paniculâque ramis puberulis, foliis petiolatis rotundato-cordatis ovalibus coarctato-acuminatis obtusis integerrimis vel superne obsolete repandis adultis præter nervos puberulos glabratris supra nitidis subtus pallidis, paniculis corymbosis terminalibus axillariibusque, calyce campanulato inæqualiter 5-dentato, corollæ tubo cylindrico calyce semilongiore. ♂ In Indiâ orient., per totam fere oram Coromandel (Roxb.), frequens circa Pondichery (Perottet!). Proxima *P. serratifolia*. Arbuscula vel frutex ramosus. Folia subcoriacea,  $2\frac{1}{2}$  poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, petiolo semipollicari-pollicari. Paniculæ pedunculatae multifloræ bracteolis minutis ovatis acutis. Calyx semilineâ paulo major, dentibus superis acutis sinuque lato interstinctis, inferis tribus brevibus approximatis rotundatis. Corollæ sordide albidæ limbus brevis, laciniis subæqualibus tamen bilabiati patentibus. Stamina vix exserta, stylo breviter bifido superata. (v. s. in h. DC.)
23. *P. VIBURNOIDES* (Wall! cat. n. 2646), ramulis cymis foliisque novellis pubescentibus, foliis petiolatis ellipticis utrinque coarctato-acuminatis integerrimis denique glabratris nitidis subtus pallidioribus, cymis terminalibus corymbiformibus densifloris, calyce cupuliformi subbilabiato obtuse 5-lobo, corollæ tubo calyce duplo longiore. ♂ (?) In Indiâ orientali (Wall!). Folia coriacea bipollucaria, petiolo semipollicari. Calyx brevis. Corollæ lab. superiorius truncatum, inferioris lobo medio subconcavo lateralibus brevioribus truncatis patens. Genitalia breviter exserta. Stigma emarginato-bifidum. Drupa pisiformis, putamine tuberculato-verrucoso. (v. s. in h. DC.)
24. *P. MUCRONATA* (Roxb. fl. ind. 3 p. 80), ramulis paniculâ petiolis foliorumque nervis birtello-pubescentibus, foliis petiolatis lato-ovatis in acumen mucronatum attenuatis postice acuminatis attenuatis integerrimis utrinque pubescentibus subtus mollibus, paniculâ divaricato-corymbosâ laxâ multiflorâ, calyce subæqualiter 5-fido, corollæ infundibularis subæqualiter 4-fida labio inferiore cum fauce villoso-barbatis. ♂ Crescit in Indiâ orient., Silbet (Roxb.), in silvis Jungle dictis ad Khin et Khizerabad (Edgeworth!), in Philippinis insulis (Cuming! n. 1367). Arbor, cuius lignum ex Roxb. durissimum usui est incolis ad ædificandum. Folia siccando æruginoso-virescentia, 3-4-pollicaria, petiolo  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  lin. metiente. Calyx  $\frac{1}{2}$  lin. longus, lobis lato-ovatis obtusiusculis. Corolla calyce subduplo longior, limbo reflexo, labio superiore retuso, inferioris lobis subtortuosis cum fauce lanâ albâ conspicue barbatis. Genit. exserta. (v. s. in h. DC. et reg. berol.)
25. *P. WIGHTIANA*, ramulis cymis petiolisque puberulis, foliis petiolatis ovatis coarctato-acuminatis basi rotundatis paulo productis integerrimis vel superne brevidentatis subbullatis utrinque glabratris nitidulis, paniculis terminalibus parvis subtortuosis, calyce subbilabiato inæqualiter 5-fido, tubo corollæ bilabiata calycem duplo superante. ♂ In Indiâ orientali, pr. Sorator et Dindyugul

(Wight ex Wall. n. 1770 B!). Folia triplicaria, membranacea, inter nervos secundarios subbulbata. Panicula sub fructificatione thyrsideo elongata. Calyx cupuliformis, lineam fere adæquans. Corollæ parvæ fauces villis albis clausæ. Drupæ putamen subpyriforme, verrucoso-tuberculatum. (v. s. in h. DC.)

26. *P. PROCUMBENS* (Wall.! cat. n. 1780), ramulis petiolis cymisque strigulosopubescentibus, foliis coriacetis petiolatis ovato-oblongis acuminatis apice obtuso mucronato basi cordatis rotundatisve grosse repando-dentatis subglabratris supra nitidis subtus pallidis, cymâ terminali parvâ coarctatâ, calyce inæqualiter 5-lobo, corollæ tubo calycem subæquante. ♂ In Ceylona (Wall.!). Species insignis. Ramuli obsolete tetragoni. Folia 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. longa, 1 poll. circiter lata, petiolo 4-8 lin. longo. Phyllopedia post foliorum casum cicatricem prominentem semilunarem marginatam exhibentia. Calyx lineam longus, lobis rotundatis subruncinatus. Corolla laciniis oblonga, superior brevior subretusa, inferior paulo longior, laterales angustiores reflexæ; fauæ villis rarís obsita. Stamina subæqualia exserta. (v. s. in h. DC.)
27. *P. BARBATA* (Wall.! cat. n. 1768), ramulis paniculâ foliorumque dorso pubescentibus, foliis membranaceis petiolatis ellipticis ovatisve tenuiter acuminatis basi acutis subcordatisque integerrimis vel superne brevidentatis supra demum glabratris, paniculis terminalibus pedunculatis corymbosis laxis multifloris, calyce cyathimorpho subæqualiter 4-fido, corollæ tubo infundibulari ad fauces eximie barbato calyce sesquiloniore. ♂ In Indiâ orientali (Wall.), in mont. Himalayens. alt. 3-4000 ped. in convalle Jikoli alibique (Edgeworth!). Folia tenuiter membranacea, subtus reticulata, siccando pallescentia, 3-4-pollicaria, petiolo subpollicari. Flores mediocres. Calyx lineam longus, laciniis oblongis obtusiusculis. Cor. tubus in fauces villo albo exerto barbatas subcampanulato-ampliatus; labium superius brevius retusum, infer. lobo medio oblongo paulo producto, reliquis ovato-rotundatis. Genit. exserta; stylus bifidus. (v. s. in h. DC.)
28. *P. MACROPHYLLA* (Wall.! cat. n. 1765), ramulis cymisque hirtellis, foliis brevissime petiolatis oblongis acuminatis postice cuneato-angustatis integrerimisque in reliquo vero margine acute dentatis supra subtusque in nervo primario pube scabriæ conspersis denique vero glabratris subtus pallidis, cymis terminalibus axillaribusque parvis coarctatis, calyce obconico bipartito 5-fido, laciniis linear-oblängis obtusis, corollâ. . . ♂ In Indiâ orient., ad Prome regni Birmanici (Wall.!). Folia 9-12 poll. longa, 3-4 poll. lata. Calyx fere sesquilineam longus, basi acutus. (v. s. corollâ destit. in h. DC.)
29. *P. ANGUSTATA* (Wall.! cat. n. 1763), ramulis cymisque tenuiter farinaceo-puberulis, foliis subsessilibus oblongis acuminatis postice valde angustatis integrerimisque in reliquo vero margine grosse acuteque dentatis glabris subtus glaucescentibus, cymâ terminali parvâ contractâ, calyce bilabiato obtuse 5-lobo, corollæ tubo calycem subæquante. ♂ In Indiâ orientali, ad ripas fl. Attran (Wall.!). P. esculenta quama maxime affinis, tamen foliorum figurâ, calyce et corollâ distincta videtur. Petiolus lineâ vix longior. Calyx  $\frac{3}{4}$  lin. longus, lobis ovatis obtusis. (v. s. spec. imperf. in h. DC.)
30. *P. ESCULENTA* (Roxb.! flor. ind. 3 p. 80), ramulis cymisque tenuiter farinaceo-puberulis, foliis brevissime petiolatis oblongis acuminatis basi subangustata rotundatis superne grosse acuteque dentatis glabris subtus glaucescentibus, cymâ terminali parvâ contractâ, calyce bilabiato inæqualiter 5-dentato, corollæ tubo calycem duplo longiore. ♂ In Indiâ orientali e. g. ad Chittagong (Wall. n. 1761!). Frutex ramosus. Folia majuscula, petiolo 3 lin. circ. longo. Calycis labium superius minute 3-dentatum, inferius rotundato-bilobum, Cor. virescenti-luteæ tubus sesquilineam longus; limbus dorso puberulus, labio superiore subquadrate-rotundato, inferioris laciniis oblongis subæqualibus, intermedia porrectâ, lateralibus vero reflexis; fauces albo-villosæ. Drupa parva, rotundata purpurea. (v. s. in h. DC.)
31. *P. AMPLECTENS* (Wall.! cat. n. 1762), ramulis cymisque tenuiter farinaceo-

puberulis, foliis subsessilibus oblongis acuminatis postice cuneato-angustatis basi levissime cordatâ subamplectentibus in omni margine inæqualiter grosse dentato-serratis glabris subtus glaucis, cymâ terminali parvâ contractâ, calyce bilabiato inæqualiter 5-lobo, corollâ tubo calyce semilongiore. ♂ In Indiæ orient. regno Pegu (Wall.). Proxima P. esculenta, sed foliorum figurâ petioloque brevissimo neque non flore egregie distincta. Calyx semilineâ paulo longior, lobis rotundatis superisque leviter emarginatis. Corollâ lacinia ro-tundatae, supremo reliquis majore; faux villis albis clausa. (v. s. in h. DC.)

32. *P. HERBACEA* (Roxb. flor. ind. 3 p. 80), suffruticosa, depressa vel herbacea acaulis, ramulis cymisque foliorumque reti hirtello-pubescentibus, foliis bre-vissime petiolatis obovatâ subtrotundis subacuminatis postice lato-cuneatis superne serrato-dentatis villosâ-ciliatis paginis puberulis superâ demum glabratâ inferâ subcanescente dense glandulosâ-punctatâ, cymis terminalibus axillari-busque exilibus folioque brevioribus, calyce 5-fido rotundilobo ciliato, corollâ bilabiata tubo calycem æquante. ♂ 2 In reg. editoribus Indiæ orient., in Dinagepore in Bengalo interiori (Roxb.), Barandunga et Gorukpur (Hamilt.), Khin-Jungle (Edgeworth!). *P. acalis* Wall. cat. n. 1776! Species cum statûrâ tum omni notâ insignis. Folia 1-2 poll. longa. Calyx bipartitus, subæqualiter 5-fidus, lineâ nonnihil brevior, pedicellatus. Corollâ labium superius rotun-datum, inferioris lacinia media productâ truncatâ, laterales breves reflexæ; faux villosa, antheris praeclusa; stylus calyce brevior, stigmate emarginato. Drupa pisi minoris mole. (v. s. in h. DC.)

\*\* Africana.

33. *P. RESINOSA*, undique punctis resinosis conspersa, ramulis novellis pani-culisque subcanescenti-tomentellis, foliis oppositis subalternisve ovatis vel subrbombœo-ellipticis obtusis in petiolum acuminatis integerrimis subrepandisve membranaceis glabris supra nitidulus subtus pallidis, paniculâ terminali exigua corymbosâ, calyce cyathimorphâ acute 5-dentato, corollâ bilabiata barbatâ tubo calycem æquante. ♂ In rupium fissuris montis Cordofani Arasch-Cool (Kotschy!) iter nub. un. itin. n. 198). Holochiloma resinosum Hochst.! in florâ 1841 p. 372. Genuina est Premna! Ramuli teretiusculi, graciles. Folia pollicaria. Calyx vix sessilislineam longus. Corolla parva. Drupa seminis viciae mole, putamine tenuiter rugoso-sulcato. (v. s. in h. DC.)

† Species denuo recognoscendæ.

34. *P. OBTUSIFOLIA* (R. Br. prodr. p. 512), foliis ovalibus obovatâs ob-tusissimis integris glaberrimis basi cordatis. ♂ In Novâ Hollandiâ tropicâ.
35. *P. ATTENUATA* (R. Br. l. c.), foliis oblongo-obovatis obtusis integerrimis glabris basi acutis. ♂ In Novâ Hollandiâ tropicâ.
36. *P. MEDIA* (R. Br. l. c.), foliis late ovatis acutis integerrimis subtus costatis ramulisque glabriusculis. ♂ In Novâ Hollandiâ tropicâ.
37. *P. OVATA* (R. Br. l. c.), foliis ovatis acutis integerrimis petiolo 4-5-plo longioribus subtus ramulisque tenuissime tomentosis, paniculis supra decom-positis. ♂ In Novâ Hollandiâ tropicâ.
38. *P. ACUMINATA* (R. Br. l. c.), foliis rhombeo-ovatis acuminatis integerrimis petiolo duplo longioribus subtus ramulisque tomeutosis mollibus, cymis laxis. ♂ In Novâ Hollandiâ tropicâ.
39. *P. CORDATA* (R. Br. l. c.), foliis reniformi-cordatis acuminatis adultis integerrimis utrinque tomentosis subtus mollissimis. ♂ In Novâ Hollandiâ tropicâ.

Species non satis notæ vel dubiae.

40. *P. PUNDUANA* (Wall. cat. n. 2651), ramis cymis foliorumque adulorum reti pube stellatâ farinaceo-tomentosis, foliis oblongis cuspidato-acuminatis

in petiolum cuneato-attenuatis integerrimis vel superne remote et argute denticulatis supra demum glabratibus subtus pallidis minute glanduloso-punctatis, cymâ terminali subpaniculatâ bracteolatâ, calyce inaequaliter 5-dentato, corollæ tubo calycem haud excedente. ♂ In Indiâ orient., in agro Panduano (Wall.). Tomentum rufescens. Folia 3-4 poll. longa, sesquipoll. lata, petiolo 8-9 lin. longo. Bracteolas lanceolatæ, pedicellos duplo et ultra superantes. Calyx stellato-pubescent, cyathimorphus, obsolete bilabiatus. Corolla brevis, lobo supremo bifido, infimo concavo, lateralibus quam reliquis brevioribus reflexis. (v. s. imperf. in h. DC.)

41. *P. TAITENSIS*, ramulis glabriusculis, foliis petiolatis ovatis breviacuminatis basi rotundatis subcordatis integerrimis margine reflexis bullato-rugulosis utrinque glabris supra nitidis subtus pallidis, petiolo canaliculato supra pilis brevibus rarissime consperso, paniculâ terminali corymbosâ multiflorâ ramis pubescente sparsâ hirtellis, calyce brevi cupuliformi subbilabiato obsolete 4-dentato. ♂ In insulis Societatis, O-Taiti (Morrenhout). Folia 3-pollicaria, minute bullata, petiolo 1-1½-pollicari. Calyx perexiguus. (v. s. sp. in h. DC. flor. delapsis, calyce unico residuo; de genere tamen non dubito.)
42. *P. ? GROSSA* (Wall. cat. n. 1764), ramulis foliorumque reti stellato-farinosis, foliis brevipetiolatis obovato-ellipticis coarctato-acuminatis basi lato-cuneatâ in petiolum abeuntibus integerrimis subtus tenuissime stellato-pubescentibus pallidisque denique utrinque glabratibus, cymis.... ♂ In Indiâ orient., ad fl. Iravaddi (Wall.). Folia 4 poll. circiter longa, superne 2-2½ poll. lata, petiolo semunciali. Flores omnino desunt. (v. s. in h. DC.)
43. *P. MOLLISSIMA* (Roth nov. pl. spec. p. 287), foliis ovatis subcordatis obtusis villosis mollissimis integerrimis. ♂ In Indiâ orientali. Rami cinerei glabri ad ramifications compressi, annotini rufescentes et pubescentes. Folia petiolata, basi vel subcordata vel obtusissima integra et inaequalia latere altero parum in petiolum producto, acumine brevi obtuso terminata, 1½-2-uncialia et totidem lata, obscure viridula, venosa, utrinque villo tenuissimo et densissimo obducta, tactu molliissima. Petioli folio paulo breviores. Cyma terminalis, densa, ferrugineo-tomentosa, repetitio-dichotoma. Bracteolas linear-oblongæ, obtusæ, patentes, lineam circiter longæ. Calyx parvulus, trunoatus, tomentosus. Corolla tomentosa, parva, albida, 4-fida. Drupa atra, glaberrima, nitida, subglobosa, magnitudine seminis Raphani sativi, bilocularis, loculis dispermis, putamine duro. Affinis videtur *P. tomentosa*.
44. *P. ODORATA* (Blanco fl. de Filip. p. 488. Walp. rep. 4 p. 96), foliis oppositis subcordatis acuminatis villosis fragrantibus, floribus in umbellâ magnâ terminali dispositis, calyce bilabiatis 5-partito, florifer cylindrico, fructifero campanulato, corollæ fauce pilosa, limbo 4-fido. ♂ In insulis Philippinis. Arbuscula 12-15-pedalis. Corollæ lacinia superior lateralibus paula major, labium inferius minus leviter emarginatum crectum. Drupa parva globosa, nuce osseâ oblongâ verrucosâ 4-loculari 4-spermâ.
45. *P. NAUSEOSA* (Blanco l. c. p. 489), foliis vix cordatis oblongis elongatis integris glabris, calyce 5-dentato. ♂ In insulis Philippinis. Arbuscula 12-pedalis, foliis et floribus odorem gravem spargentibus tritis vero odoratis.
46. *P. CARDIOPHYLLA*, foliis cordatis integris supra glabris subtus tomentosis; paniculis magnis umbelliformibus bracteolis duobus foliaceis subulatis ad basin pedunculorum pedicellorumque, calyce 5-dentato, drupâ monopyrenâ, pyrenâ uniloculari monospermâ. ♂ In insulis Philippinis. *P. cordata* Blanco fl. Filip. p. 489.

### ††† Exclusæ.

*P. ARBOREA* Roth. = *Gmelina arborea*.

*P. PARVIFOLIA* Roth = *Gmelina parvifolia*.

*P. RETICULATA* Juss. = *Petitia Domingensis*.

*P. SALVIFOLIA* Spreng. = *Pityrodia salviaefolia*.

**XXVII. PETITIA** *Jacq. hist. stirp. amer. p. 14 t. 182, fig. 6, Endl. gen. n. 3705,  
Meisn. gen. p. 291, et comm. p. 199 non H. B. Kth.*

*Calyx cyathimorphus, æqualiter 4-fidus vel 4-dentatus. Corolla infundibularis, tubo calycem æquante paulo superante, limbo regulariter 5-fido, lobis oppositis æqualibus. Stamina 4, corollæ tubo inserta, æqualia, breviter e barbatis faucibus exserta. Antheræ introrsæ, erectæ, loculis in connectivo dorsali parallelis, rimâ longitudinali dehiscentes. Germen 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis, staminibus brevior. Stigma breviter et inæqualiter bifidum. Drupa baccata, monopyrena?, pyrenâ 4- vel abortu 2-loculari?, putamine duro. — Frutices vel arbusculæ Indiæ occidentalis loca scopolosa arida habitantes. Rami tetragoni sulcati. Folia opposita, simplicia, sed ad basin laminæ cum petiolo subarticulata. Paniculæ cymosæ brachiatæ, parvæ, in axillis superioribus oppositæ, foliis breviores. Flores parvi. — Genus inter Premnam et Callicarpam ambiguum, ab illâ recedens inflorescentiâ axillari, calyce corollâque regularibus et stigmate ab hac, cui flore maxime affine, inflorescentiâ brachiato-paniculatâ staminibus brevibus, ab utrâque foliis articulatione præeditis et forsitan fructu, quem equidem non examinavi.*

1. **P. DOMINGENSIS** (*Jacq. l. c.*), ramulis paniculis petiolis foliorumque juniorum dorso tomento pulverulento-farinaceo cinerascentibus, foliis subcoriaceis ovatis vel oblongo-ovatis postice rotundatis paulo ve angustatis sensim acuminatis integrermis margine revoluto supra glabratissimis nitidulis penninervi-lineatis subtus venoso-reticulatis reti pubescente paginâ ferrugineo-cinereâ dense et minute glanduloso-punctatâ, petiolo longo apice articulato, longe pedunculatus paniculatis basi subfoliaceo-bracteatis folio brevioribus, calyce 4-lobo. ♂ In sylvaticis et in saxosis submaritimis Jamaicæ (*Sw!*), Portorici et S. Domingi (*Jacq.!* *Bredemeyer!* *Bertero!*), *Citharexylon melanocardium* *Swartz!* fl. ind. occid. 2 p. 1046 (*h. Willd. n. 11481!*). *Cith. paniculatum* *Gærtn.* fract. 1 p. 270 t. 56. *Premna reticulata* *Juss.* ann. *Mus. d'hist. nat.* 2 p. 68. Folia adulta 6 poll. circiter longa, 2-3 poll. lata, petiolo subbipaniculati. Panicula subterminali-axillares. Calyx lineam adæquans, glanduloso-farinaceus, lobis brevibus ovatis. Cor. tubus calyce æqualis, limbus 4-fidus patens. Stamina breviter e faucibus exserta. Drupa baccata atropurpurea. (v. s. in *h. Willd.* et *DC.*)

2. **P. PÆPPIGII**, ramulis paniculis petiolis nervoque foliorum medio subtus tomento pulverulento incanis, foliis coriaceis ovatis oblongisve postice rotundatis paulo ve angustatis acuminatis integrermis margine revoluto supra glabratissimis nitidis reticulato-rugulosis subtus venoso-reticulatis retique prominenti villosolanuginose incanis, petiolo longiluscule apice articulato, paniculis pedunculatis basi subfoliaceo-bracteatis folio brevioribus, calyce brevissime 4-dentato. ♂ In rupibus aridissimis ins. Cub. (*Pæppig!*). *Callicarpa reticulata* *Pæppig!* fl. cubens exs., nec *Swartz.* *Petitia Domingensis* *Walpers!* repert. 4 p. 71, non *Jacq.* Folia 3-6 poll. longa, 1½-2 poll. lata, petiolo pollicari. Paniculae subterminali-axillares, ovatae, cymulis trifloris minute bracteolatis. Calyx cyathimorphus, lineam longus, dense glanduloso-punctatus, repando-4-dentatus. Cor. infundibularis, tubo calyce semilongiore, limbi erecto-patentis lobis duobus reliquis longioribus. Stamina e faucibus breviter exserta, limbo breviora. Germen 4-loculare. Stylus calycem æquans; stigma breviter et inæqualiter bifidum. Fructum non vidi. (v. s. in *h. cl. Lucæ berol.*)

† *Species exclusa.*

**P. QUINDUENSIS** *Kunth* = *Ægiphila Humboldtii.*

**XXVIII. CALLICARPA** Linn. gen. n. 135, Juss. gen. 107, Endl. gen. n. 3712, Meisn. gen. p. 292 et comm. p. 200, Gærtn. fr. 2 p. 80 tab. 94, Lam. illustr. tab. 69, Bot. reg. t. 846 et 883, Bot. mag. t. 2107, Hook exot. fl. t. 133. — *Burchardia Duham. arb. I. 3 tab. 44.* — *Johnsonia Catesb. carol. 2 p. 47. tab. 47.* — *Sphon-dylococcum Mitchel in ephem. nat. cur. 8 p. 218.* — *Porphyra Lour. fl. cochin. ed. Willd. 1 p. 87.* — *Geunsia Blume! cat. hort. bogor. in Flord 1825, p. 107, et bjdr. p. 819.*

*Calyx* cupuliformis, cyathimorphus vel rarius tubulosus, 4-5-costatus sæpe angulatus aut plicatus, 4-5-dentatus vel rarius 4-fidus, persistens. Corolla subcampanulato-tubulosa, tubo brevi, limbo 4-5-fido æquali. Stamina 4, vel rarius 5, corollæ tubo inserta æqualia exserta. Antheræ supra basin dorso insertæ, facie et in primis dorso glanduloso-punctatae, biloculares, loculis parallelis rimâ laterali superne latius hiante vel poro oblongo tantummodo apicali dehiscentibus. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis, stamina subæquans vel iisdem longior, apicem versus clavato-incrassatus. Stigma capitatum, brevissime bilobum. Drupa calyxæ cupulæformi paulo aucto insidens, baccata, tetrapyrena, pyrenis maturitate distinctis unilocularibus, putamine duro. Semen radiculâ inferâ erectum. — Frutices vel suffrutescences, rarius arbores, in Asia et Novâ Hollandiâ tropicâ, rarius in Americâ callidiore cis æquatorem crescentes, tomento ramuloso vel stellari sæpius farinoso vel furfuraceo magis minusve canescentes aut subferruginei, sæpius glandulis oleigeris copiosis consiti. Folia opposita, simplicia, basi integerrima. Cymæ axillares dichotomæ. Flores parvi, interdum polygamii. Genus Ägiphilæ valde proximum, sed habitu, inflorescentiâ di- nec trichotomâ neque unquam terminali, floribus parvis, corollâ brevi et potissimum stigmate diversum.

### § 1. *Calyx tubulosus quadrifidus, longidentatus.*

1. C. ROXBURGHII (Wall. cat. n. 1833), ramulis pedunculisque cum inflorescentiæ ramis petiolisque tomento denso ferrugineo villoso-hirsutis, foliis lanceolato-oblongis brevipetiolatis basi obtusiusculis apice longe attenuatis serrato-dentatis adultis supra subtilissimâ pube pulverulentis subtus tomento laxo floccosis canescensibus simulque glanduloso-punctatis, cymis brevipedunculatis confertis glomerulosis, calyce tomentoso-villoso tubuloso 4-angulato 4-partito laciniis setaceis. ♂ In Indiâ orientali ( Wall. ). C. incana Roxb. ex Wall. Species distinctissima, inflorescentiâ et calyc. Folia subpedalia long., tripllicaria latit., petiolo 9 lin. æquante. Pedunculi petiolatum subæquantes; flores in apicibus ramulorum inflorescentiâ dense glomerati. Calyx sesquilineam longus tenuiter membranaceus, pilis ramulosis albo-villosus. Cor. tube angusto glabro calycem æquans, limbo exerto dorso cano-villoso. Stamina longe exserta; anthere dorso subglandulosæ ( v. s. in h. DC. ).
2. C. ZOLLINGERIANA, ramulis cum inflorescentiâ foliorumque paginâ inferâ tomento laxo floccoso cinereis, foliis ellipticis vel ovato-ellipticis brevipetiolatis basi rotundatis obtusis attenuato-acuminatis mucronato-crenatis adultis supra subscabrido-pubescentibus utrinque subter pube glanduloso-punctatis, cymis paucifloris laxe corymbosis pedunculata quam petiolo subduplo longiore, calyce tubuloso 4-fido laciniis linearis-lanceolatis. ♂ In Japoniâ ( Zollinger pl. japon. h. n. 350 ! ). Rami patentissimi, tenues, teretiusculi, adultiores glabrat. Folia 2-3 poll. long., pollicaria lat., petiolo 5 lin. æquante, apice mucronato. Cymæ bis terve bifidæ; bracteolæ lincares pedicellos æquantes. Calyx sesquilineam longus, totus floccosus. Cor. tubus breviter exsertus strigoso-hirtulus, limbi laciniæ ovales obtusæ reflexæ. Antheræ exsertæ dorso glandulosoæ. ( v. s. in h. DC. ).

§ 2. *Calyx cyathimorphus brevidentatus.*

## a. Flores tetrameri.

\* *Folia subtus tomento æquali denso farinaceo vel furfurareo candicantia, punctis glandulosis nullis vel sub tomento absconditis.*

3. *C. WALLICHIANA* (Walp. repert. 4 p. 125), ramulis cum cymis petiolisque dense ferrugineo-tomentosis, foliis coriaceo-membranaceis lato-ovatis basi vel rotundatis vel angustatis obtusis quin immo acuminatis longe petiolatis attenuato-acuminatis integrerrimis vel leviter repandis et minute denticulatis reticulato-rugosis adultis supra preter nervos glabratris subtus dense et molliter lanato-tomentosis canescensibus, cymis multifloris bipartitis divaricato-dichotomis corymbosis pedunculo quam petiolis duplo breviore, calyx truncato vix 4-mucronulato. ♂ In Indiâ orientali, in Travancore (Wallich!), in Ceylan ins. (Leschenault!). C. lanata Wall. cat. u. 1831! Foliorum lamina 6-7 poll. longa, circa basin 3½-4 poll. lata, petiolo sesquipolllicari; pagina infera non nisi pube derasâ glandulîs dense obsita appetet. Calyx inferne tomento tonso canescens superne subglabratius et cum corollâ antherisque glanduloso-punctatus, lineam longus. Corolla calycce duplo longior staminibus duplo superata. C. arborea, quâcum habitus quamdam similitudinem exhibet, differt indumento molli nec farinaceo, cymis brevpedicellatis, floribus majoribus, etc. (v. s. in h. DC.)
4. *C. MAGNA*, ramulis cum cymarum ramificatione et petiolis tomento denso floccoso rufescentibus, foliis coriaceo-membranaceis elliptico- vel oblongo-ovatis e basi rotundatâ brevissime in petiolum longum productis breviter adultis supra glabratris subtus venoso-reticulatis tomento que stellaris-farinaceo canescensibus, cymis multifloris divaricato-dichotomis laxè corymbosis pedunculo petiolum semiæquante, calycce exiguo membranaceo glabro 4-costato vix 4-dentato. ♂ In insulis Philippinis (Cuming. pl. exs., n. 1266!). Arbor elata. Folia magna, lamina 6-9 poll. longa, 3-5 poll. lata, petiolo canaliculato 2 uncias subæquante. Calyx semilineatum, glaberrimus vel flocco uno altero adspersus, cum corollâ eglandulosus. Corolla campanulata, calycem duplo excedens, limbo supra velutino. Genitalia longe exserta. Habitu proxima *C. Wallichianæ*, a quâ differt tomenti foliorum specie calyceque duplo minore glabro. (v. s. in h. reg. berol.).
5. *C. ARBOREA* (Roxb. fl. ind. or. ed. 1832 v. 1 p. 390), ramis tetragonis cum cymis petiolisque tomento denso pulverulento aut subfloccoso incanis foliis coriaceis ellipticis obovato- vel oblongo-ellipticis basi cuneatâ in petiolum longum angustatis coarctato-acuminatis integrerrimis vel acute repando-dentatis penninerviis adultis supra præter nervos glabratris nitidis subtus reticulatis tomento que stellato farinaceo candicantibus, cymis solitariis geminis corymbosis pedunculo angulato petiolum subæquante, calyce pulverulento exiguo brevissime 4 acuminulato. ♂ In Indiâ orient., ad Chittagong (Roxb.) et in Kamaon Nepaliæ (Wallich cat. n. 1826! et 1827!). Rami robusti, cum petiolis pedunculatis ramisque cymæ quadrangulati. Folia magna, sepius ampla pedalia, petiolo sesqui-bipolllicari, subtus tomento glanduloso-punctata. Cymæ multifloræ ramis divaricatis diffuse dichotomæ. Calyx semilineatus paulo altior. Cor. purpurascens tubus calyce duplo longior. Stamina longe exserta, connectivo antherarum glanduloso-punctata. Flores ex Roxb. graveolentes. (v. s. in h. DC.)
6. *C. REEVESII* (Wallich! cat. n. 1830), ramis novellis cum inflorescentiæ ramis foliorumque nervis supra et paginâ inferâ tomento floccoso incanis, foliis coriaceis oblongis petiolatis acutissimis postice obtusis vel integrerrimis vel acuminato-dentato-serratis penninervi-lineatis adultis præter nervos supra glabratris, cymis longe pedunculatis folium semiæquantibus diffuse dichotomis corymbosis, calyce brevissimo glabro glanduloso-punctato leviter 4-costato et brevissime 4 acuminato. ♂ In Cchinâ, ad Canton (Reeves! G. Staunton! Gaudich.! Vachell n. 263), in capite Syng-maan (Meyen!). C. nudiflora Hook. et Arn. bot. Beech. p. 206 t. 46! Folia 6-9 pollices longa, 2-3

poll. lata, petiolo pollieari, juniora et adulta superne tomento stellato evanescente induita. Tomentum densum, breve, ætate rufescens. Cymæ dichotomæ rami patentes, bracteolis subulatis subtensi. Calyx semilineam longus. Cor. calycem duplo superans. Stam. longe exserta, connectivo antherarum deuse glandulosopunctato. (v. s. in h. DC.)

7. C. **AMPLA**, ramulis cum cymis petiolis foliorumque tergo tomento denso farinaceo candicantibus, foliis coriaceis oblongis utrinque acuminatis petiolatis subobsolete repando-denticulatis supra subpulverulentis viridibus subnitidis subtus penninerviis venoso-reticulatis, cymis multifloris amplis corymbosis floribus in singulis ramulis capitato-conferunt pedunculo firmo petiolum exceedinge folio brevioribus, calyce pulverulento brevi 4-costato subtruncato vix 4-denticulato. ♂ In Indiâ occid. ins. Portorico (Wydler!). Rami validi, teretes, ad nodos compressi. Folia 7-9 poll. longa, 3 poll. lata, petiolo canaliculato semunciali-sesquiflciali. Cymæ pedunculus sesqui-bipollicularis, ad ramos primarios bracteis foliaceis lanceolatis longe petiolatis stipatus; rami patentes pollicares, fastigiati, bracteolis liueari-lanceolatis basi valde attenuatis subtensi. Calyx  $\frac{2}{3}$  lin. longus. Cor. tubus calycem subæquans; limbi lobi ovato-subrotundi dorso glaudulosi. Stamina longe exserta, antheris dorso glandulosis. Flores polygami videntur, in nostro saltem specimine germen abortivum. (v. s. in h. DC.)
8. C. **RETICULATA** (Swartz prodr. fl. ind. occid. p. 31), ramulis cum cymis foliorumque pagina infera tomentostellato alphitoideo candicantibus, foliis subcoriacis ovato-ellipticis ellipticisque brevipetiolatis basi rotundatis obtusis acutiusculis integrerrinis vel obsoleti dentatis reticulato-rugosis supra viridibus pulverulentis subtus reticulato-venosis, cymis pedunculatis folio subdupo brevioribus multifloris corymbosis, calyce 4-costato brevissime 4-dentato. ♂ In Indiâ occidentali, Jamaicâ (Sw.), Cubâ (Ramón de la Sagra!). — Sw. fl. ind. occid. 1 p. 252. Folia subipollicularia long., subpollicaria latit., petiolo 4 lin. longo, glandulis conspicuis orhata. Calyx cyathiformis lineam fere longus. Cor. tubo breviter exerto glabro glandulos, limbi lacinii ovalibus dorso incanis. Stam. exerta; antheræ utrinque glandulosæ. Stylus capillaris corollam subæquans. Formam ♀ affert Swartz staminibus corollâ brevioribus, stylo exerto, stigmatibus crassiusculis. Drupa baccata, calyce cupuliformi subtensa, sericea. (v. s. in h. DC.)
9. C. **ACULEOLATA**, ramulis tenuibus aculeis minutis conspersis cum cymis tomento furfuraceo subferrugineis, foliis anguste lanceolatis brevipetiolatis basi obtusis superne angustatis acutis obtusis integrerrimis aut crenatis reticulato-rugosis supra viridibus glabris glanduloso-punctatis subtus reticulato-veosoris tomento que furfuraceo-floecoso candicantibus, cymis paucifloris semel vel bis bifidis pedunculo quam petiolus subdupo longiore, calyce glabriusculo punctato subtruncato. ♂ In ins. Dominicas (Bertero!). C. reticulata syntypica, sed uberrime distincta. Ramuli patentes, aculeis facile prætervidendis sparsis obsiti. Folia sesqui-bipoll. longit., 4-6 lin. lat., petiolo 3 lin. subæquante. Calyx  $\frac{2}{3}$  lin. longus, anguste tubulosus. Drupa baccata, grani piperis mole. (v. s. defor. in h. DC.)
10. C. **ANGUSTA**, ramulis cum cymis foliorumque paginâ inferâ tomento stellarí alphitoideo rufescente candicantibus, foliis brevipetiolatis lanceolatis utrinque attenuatis minute serrato-denticulatis supra viridibus pulverulentis subtus reticulato-venosis, cymis divaricato-dichotomis laxis haud multifloris pedunculo petiolum subæquante calyce brevissime 4-mucronulato. In insulis Philippinis (Cuming n. 1425!). Species sol. figurâ et indumento perinsignis. Fol. 3-4 poll. longa, 8 lin. lata, petiolo 3-4 lin. metiente. Calyx cyathimorphus,  $\frac{2}{3}$  lin. longus. Corolla calyce duplo longior, tomentosa. Stamina longe exserta. (v. s. in h. cl. Lucæ berol.)
11. C. **BICOLOR** (Juss. ! ann. mus. 7 p. 77), ramulis cum cymis petiolisque tomento furfuraceo subferrugineis, foliis ellipticis vel elliptico-lanceolatis basi

cuneato-angustatis brevipetiolatis acuminatis mucronato-crenatis supra præter nervum medium glaberrimis nitidis subtus penninerviis tenuiter venoso-reticulatis tomento stellari-farinaceo denso caudicantibus, cymis submultifloris divaricato-dichotomis dimidiatis corymbosis pedunculo petiolum subæquante, calyce brevi subtruncato. ♂ Ad Port-Pralin (Commerson ex Juss. h. DC.!) Novæ Britanniæ (ex Juss.), ins. Sechelles (ex dict. geogr.); et in insulis Philippinis (Cuming pl. exs. n. 1283!). Folia subquadrangularia, supra atro-virentia, eglan-dulosa. Cymæ brevissimæ. Calyx cupuliformis,  $\frac{1}{4}$  linea longus. Cor. pube laxa afflata, vel glabriuscula rari-punctata. Drupa grani Sinapis magnitudine. Proxi-ma C. canæ, sed diversa pube aliena præcipue in foliorum dorso junctâ ut puncta glandulosa neutiquam appareant, et cymis longius pedunculatis bipartitis. ( v. s. ex Mus. par. in h. DC. et in h. reg. berol.)

12. C. ERIOCLONA, ramulis tetragonis cum pedunculis petiolisque pube ramulosâ rufâ lanatis subterque pube farinosâ albâ tomentosis, foliis coriaceo-membranaceis elliptico- vel obovato-oblongis basi sensim cuneatâ in petiolum brevem abeuntibus acuminatis breviter et inæqualiter dentatis reticulato-rugulosis supra glabris subtus tomento brevissimo stellari-farinaceo candicantibus veno-so-reticulatis, cymis conferte multifloris hemisphærico-corymbosis pedunculo petiolum subæquante vel breviore, calyce exiguo cum pedicello stellato-to-mentoso brevissime 4-dentato. ♂ In insulis Philippinis (Cuming pl. exs. n. 911!) et in Novâ-Guineâ (Lesson !). Tomentum singulare, duplex, superum floccoso-lanatum postea sensim abolescens rufum, subiectum farinaceum den-sum subpersistens candidum. Folia subsexpollicariâ long.,  $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. latit., petiolo  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  poll. longo canaliculato. Flores parvi numerosi. Calyx se-milineam altus. Cor. brevis. Genitalia longe exserta. (v. s. in h. reg. berol., Kunth et Lucæ.)

\*\* *Folia subtus glabra vel tomento laxe aut floccoso induita simulque punctis glandulosis copiosis et conspicuis consita.*

13. C. CANA (Linn. ! mant. 2 p. 198), ramis cum cymis nervisque foliorum dense albo-tomentosis, foliis ellipticis elliptico-ovatis ovatis subrotundatisque utrinque attenuatis seu coarctatis brevipetiolatis acuminatis inæqualiter acuminato-dentato serratis adultis supra glabratris nitidis subtus tomento molli villosulo cinereis et glandulosu-punctatis, cymis multifloris brevissime pedunculatis globoso-confertis petiolis aquatibus, calyx exiguus breviter acute dentato. ♂ In Timor h. Mus. paris.!, Javâ (El. Zollinger! pl. jav. n. 35 et 157), Malaccâ (Ad. Deless. ! Griff.!), Pulo-Pinang (Wall. ! cat. n. 1834), ad Calcutta (Wah. ! anno 1819 in h. DC.), et insulâ Bourbon (Perrott. !) — Bot. mag. t. 2107. C. tomentosa Lam. enc. 1 p. 562. C. Heynei Roth nov. pl. spec. p. 82. Folia membranaceæ, primâ ètate etiam supra tomentosa, 4-6 poll. longa, 2-3 poll. lata, basi attenuata et acuminæ apice tenui integrerrimis, margine nunc breviter denticulato nunc grosse dentato. Cymæ pilis ramosis lanato-tomentosæ. Flores omnino lilacini. Calyx semilin. longus. Cor. calyce vix duplo longior. Drupa globosa, nigra, calycem duplo superans. (v. v. c. et s. in h. DC. etc.).

14. C. AMERICANA (Linn. ! mant. 2 p. 198), ramulis cum cymis foliorum nervo medio utrinque paginâque inferâ fleccis stellaribus laxe tomentosis, foliis membranaceis ovato-ellipticis basi late cuneatâ in petiolum longiusculum atten-natis acuminatis grosse mucronato-crenatis vel dentato-serratis supra pube bre-vi rarâ substigosis subtus pallidis dense glandulosu-punctatis cymis supra axilaribus multifloris laxis corymbosis petiolo breviribis, calyx glabriusculo punctato 4-costato repando 4-denticulato. ♂ In Virginiam, Carolinam (Fraser!), Louisianam (Tainturier!), Arkansas (Engelm. ! n. 340). Spondylococcus Mitch. ephem-erid. nat. cur. 8 p. 218. Burchardia Duham. arb. ed. 1 p. 111 tab. 44. Johnsonia Americana Mill. dict. n. 1. Pluk. alm. p. 33 t. 136 fig. 3. Catesb. carol. 2 p. 47 t. 47. Indumentum laxum, sèpissime sparsum, ut transparant puncta

glandulosa ramulorum et pedicellorum. Folia 3-6 uncias longa, petiolo polluci,  $1\frac{1}{2}$   $2\frac{1}{2}$  uncias lata, supra rari punctata. Calyx membranaceus, campanulatus, lineam fere adæquans. Cor. lævis, calyce duplo longior, rotundiloba. Stamina longe exserta, antheris dorso et facie glandulosia. Drupa violacea. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)

15. *C. ACUMINATA* (Kunth! in H. B. nov. gen. et spec. 2 p. 252), ramulis cum cymis petiolis foliorumque tergo tomento stellari floccoso canescensibus, foliis membranaceis petiolatis ovato-oblongis postice breviter acutis in acumen longum attenuatis superne mucronato-denticulatis vel subintegerrimis superè paginâ denum glabratâ nitidâ inferâ subter pube dense glanduloso-punctatâ, cymis axillaribus longe pedunculatis laxe corymbosis multifloris folio plus duplo brevioribus, calyce subtruncato vix 4-denticulato. ♂ In Americâ æquinoctiali: in calidis regni Novo-Granatensis pr. Honda, alt. 140 hex. alibi (H. et B.! h. Willd. n. 285!) spec. fructif., circa Papantla Mexici (Schiene pl. mex. n. 1166). C. subintegerrima H. B. Kunth! ibid. C. mollis h. Willd. n. 2856! foliis superne paucidentatis subintegerrimis brevius acuminatis, cymis juvenilibus. C. Americanæ sane affinis, sed multo major. Folia 7-9 poll. longa, 3 poll. lata, petiolo 8 lin. explete. Cymæ pedunculus subbipollicularis. Calyx minimus. Stam. exserta. (v. s. in h. Willd. et reg. berol.)
16. *C. MACROPHYLLA* (Vahl symb. 3 p. 13 t. 53), ramulis pedunculis cum ramificatione inflorescentia petiolisque tomento lanato candicantibus, foliis lanceolato-elliptico quin ovato-oblongis brevipetiolatis basi obtusis rotundatis in acumen attenuatis grosse mucronato-crenatis venoso-rugosis adultis supra subtiliter scabridis subtus molliter cinereo-tomentosis, cymis multifloris dichotome ramosissimis divaricato-corymbosis pedunculo quam petiolus breviore, calyce subviloso exiguo 4-costato mucronato-4-dentato. ♂ In Indiâ orientali, in Nepaliâ et Silet (Wallich cat. n. 1832!) et in insulis M ascarenis (h. DC.! Sieber fl. maurit. 2 n. 320!). Species solitis amplis, cymis admodum multifloris brevibus, floribus parvis valde insignis. Folia semipedalia-pedalia long.,  $2\frac{1}{2}$ -4 poll. lat., petiolo vix pollicari, paginâ inferâ subter pube glanduloso-punctatâ. Calyx semilineam longus, cum pedicello et corollâ glabrâ antherisque glandulosus. Cor. limbus rotundilobus. Stamina corollâ duplo longiora. (v. s. in h. DC.)
17. *C. LANATA* (Vahl symb. 3 p. 13), ramis cum inflorescentia foliorumque nervis tomento denso floccoso incanis, foliis ovatis vel ovato-oblongis basi obtusâ vel rotundatâ brevipetiolatis cuspidato-acuminatis dentato-serratis adultis supra pube stellari obsoleti scabridi eglandulosi paginâ inferâ tomento laxo floccoso canescente et glanduloso-punctatâ, cymis laxis dimidiatis corymbosis pedunculo quam petiolus subduplo longiore, calyce brevi 4-costato acute 4-dentato. ♂ In Novæ Hollandiæ tropicis (R. Br.) et in Moluccis (Roxb. h. DC.! a Lambert comm.). C. pedunculata R. Br. prodr. fl. nov. loll. p. 512 (ex descr.). C. dentata Roth nov. pl. spec. p. 81. C. cuspidata Roxb. fl. ind. ed. 1832 1 p. 394. Proxime affinis C. longifolia sed foliorum figurâ et serraturâ cymisque longius pedunculatis pubeque longe uberiore distincta. Folia subquadripollicularia long.,  $2\frac{1}{2}$  poll. latitudine, acumin angusto unciali. Stam. longe exserta, antheræ glandulosæ. (v. s. in h. DC.)
18. *C. CUMINGIANA*, ramulis cum cymis petiolisque tomento denso floccoso villis longioribus commixto ferrugineis, foliis ovatis basi rotundatâ brevissime in petiolum angustatis attenuato-acuminatis integerrimis vel minutissimis et remote denticulatis supra pube simplici ferrugineo-hirtellis subtus pube stellari laxe tomentosis canis glanduloso-punctatis, cymis multifloris amplis diffuse-dichotomis laxe corymbosis pedunculo petiolum duplo superante folio duplo brevioribus, calyce cano brevissime 4-dentato. ♂ In insulis Philippinis (Cuming pl. exs. n. 1707!). Folia (quæ tautummodo video apicalia juniora) 6 poll. longa, 3 poll. lata, petiolo unciali, subtus venis transversis nervos secundarios necentibus grosse areolata. Calyx cyathiformis,  $\frac{1}{2}$  lineæ

- altus, minus rufescens ac reliquæ partes. Cor. tubulosa, glabra, glandulosopunctata, tubo calyce triplo longiore, limbo brevi rotundilobo. Genitalia longe exserta. (v. s. in h. r. berol.)
19. *C. RUEBELLA* (Lindl. bot. reg. t. 883), undique subter tomento glandulosopunctata, ramis cum inflorescentiâ tomento denso floccoso incanis, foliis lanceolatis brevissime petiolatis basi cordatis acuminate serrato-denticulatis supra pubescentibus subtus cano-tomentosis, cymis multifloris bipartitis divaricato-dichotomis laxis corymbosis pedunculo petiolo ter longiore folio multoties brevioribus, calyce minimo 4-costato truncato 4-mucronulato. ♂ In Indiâ orientali ad Pundua (Wall.). *C. sessilifolia* Wall. ! cat. n. 1837. Folia interdum terna, 3-5 pollices longa, 12-15 lin. lata, ætate supra magis minusve glabrescentia. Cymæ pedunculus vix semipaniculatus. Calyx semilinea etiam brevior, glabrior. Ex affinitate *C. longifoliae*. (v. s. in h. DC.)
20. *C. ACUTIDENS* (Schauer mss.), ramulis foliorumque nervis tomento dense floccoso incanis, foliis lanceolato-oblongis basi obtusis brevipetiolatis tenuiter acuminatis inæquilateri acutissime dentatis supra glabratris nitidis subtus pallidis floccis adspersis et glandulosopunctatis, cymis laxis corymbosis pedunculatis folio multo brevioribus. ♂ In Cochinchinâ (Gaudichaud!). Folia 3 poll. circ. longa, vix sesquipoll. lata, margine dentibus tenuibus acutissimis rectis lineam longis obsoito maxime insignia. (v. s. sp. imperf. in h. Kunth et DC.)
21. *C. LONGIFOLIA* (Lam. dict. 1 p. 562), undique glandulosopunctata ceterumque vero pubescentia stellata magis minusve farinoso-tomentosa aut subglabrata, foliis membranaceis lanceolato-oblongis lanceolatis utrinque attenuatis brevipetiolatis longe acuminatis serrato-denticulatis, cymis multifloris divaricato-dichotomis confertiusculis convexis pedunculo petiolum subæquante folio multoties brevioribus, calyce brevi 4-costato ore truncato brevissime 4-mucronulato. ♂ In Indiâ orientali usque in Japoniam. Folia 6 poll. circ. longa, 2 poll. lata, penninervia, venosa, plana, supra viridia vix nitidula, subtus pallidiora, utrinque subtus vero magis punctis resinosis flavis dense consita. Calyx semilineam longus. Cor. calyce jam duplo jam vero non nisi dimidio longior. Stam. exserta, antherarum connectivo et sulco faciali dense glandulosopunctatis. (v. s. in h. DC., Nees, Lucæ aliorq.)
- α. *subglabrata*, ramulis cum inflorescentiâ ramulis foliorumque reti utrinque pubescentia farinosis interdum subglabratris, calyce foliorumque adultorum paginis glabris. — In Indiâ orient. e. gr. prov. Silhet (Wall. ! cat. n. 1829), in Javâ (Bl. ! Jungh. ! Zolling. ! pl. jav. n. 156 ! et 223 !), in Philippinis (Cuming. ! n. 1330), in Japoniâ (Zolling. ! pl. jap. n. 349). *C. longifolia* Lam. l. c. et ill. t. 69 f. 2, Bot. reg. t. 864 ! Hook. exot. fl. 1 p. 132 ! *C. Japonica* Thunb. fl. jap. p. 60. *C. lanceolaria* Roxb. ! fl. ind. 1 p. 395.
- β. *floccosa*, ramulis cum inflorescentiâ ramis calyce foliorumque reti floccosotomentosis, foliis adultis superâ pagina glabratris inferâ vero floccis stellaribus sparsis nunc rarioribus nunc crebrioribus indutis quin subcinerco-tomentosis. — In Indiâ orientali, in insulâ Prince of Wales (Roxb. Wall. !), ad Singapoor (Gaud. !), in Javâ (Thunb. ! Blume ! Jungh. !), in Manillâ (Gaudich. !), in N. Hollandiâ tropicâ (R. Br.) *C. longifolia* Roxb. ! flor. iud. 1 p. 394, et *C. acuminata* Roxb. ibid. ex descr. C. Roxburghiana Roem. et S. syst. mant. p. 54. *C. attenuata* Wall. cat. 1835 ! *C. adenantha* R. Br. prodr. fl. nov. holl. 1 p. 369 (ex diagnosis). *C. oblongifolia* Hassk. hort. bogor. p. 136. *C. albida* Blume ! bijdr. p. 818 (forma fol. lanceolatis angustioribus). Hæc forma, priori continuâ serie varietatum indumenti connexa, ceterum ab illâ nec habitu nec characteribus differt.
22. *C. PURPUREA* (Juss. ! ann. mus. 7 p. 69), undique punctis resinosis glandulosa, ramulis cum inflorescentiâ foliisque juvenilibus pubescentiâ farinosis, foliis coriaceo-membranaceis elliptico-lanceolatis utrinque attenuatis brevipetiolatis acumine obtusiusculo mucronato mucronato-crenulatis vel argute serratis adultis præter costam glabratris subtus pallidioribus, cymis pedunculo inferne

adnato supraaxillaribus subsessilibus dichotomis laxe corymbosis foliis multoties brevioribus, calyce brevissimo subquadragulo brevissime 4-dentato. ♂ In Chinâ (Colebr., Wall. cat. n. 1828!), Cobinebinâ (Lour.) et Japoniâ (Zollinger pl. japon. n. 348!). Porphyra dichotoma Lour. fl. coch. I p. 87. Rami tenues teretes. Folia sesqui-tripollicaria, latit. pollicari, utrinque imprimis vero subtus punctis resinosis etate purpurascens consita. Cymæ hanc ita multifloræ quin paucifloræ. Cor. calycem duplo superans; antheræ exsertæ dense glandulosæ. (v. s. sp. et in hort. bot. calc. cult. in h. DC.)

23. C. FERRUGINEA (Swartz! prodr. fl. Ind. occid. p. 31), ramulis cum cymis tomento surfuraceo ferrugineis, foliis membranaceis lanceolatis utrinque attenuatis brevipetiolatis acute dentato-serratis utrinque præter nervum medium glabris supra penuinervi-lineatis nitidis englandulosis subtus glandulosi creberri-mis aurco-nicantibus, cymis supra-axillaribus corymbosis submultifloris pedunculo petiolam bis terve superante folio triplo brevioribus, calyce glabro puicato tetragono brevissime 4-dentato. ♂ In sylvis montium altissimorum Jamæcæ ins. (Swartz! herb. Willd. n. 2860, juxta vilam Trafulgar in montibus Port-Royal (Hartw.! pl. exs. n. 1561) — Sw. fl. ind. occid. I p. 250. Frutex (ex Hartw.) 4-6-pedalis. Folia 3 uncias circ. longa, 8-9 lin. lata, petiolo trilineari. Flores ex Sw. polygami. Cal.  $\frac{3}{4}$  lin. altus. Cor. glabra punctata. Drupa semiadulta et antheræ in dorso glandulosæ. (v. s. sp. orig. deflор. in h. DC. et Willd.)

24. C. PARVIFOLIA (Hook. et Arn. bot. Beech. voy. p. 305), ramis pedunculis foliisque subtus tomento stellato denso incanis obovatis obtusissimis coriaceis brevipetiolatis leviter serratis supra glabris, cymis capitatis pedunculis petiolum æquantibus. ♂ In Mexico. Folia sesquipollicaria, juniora subtus subferruginea.

25. C. SUBPUBESCENS (Hook. et Arn. I. c. p. 305), ramis foliisque adultis subtus sparse stellato-pubescentibus petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis serratis supra glabris, pedunculis axillaribus petiolum æquantibus cymoso-dichotomis. ♂ In Mexico. Folia subspithamea, ad summum 2 poll. lata.

#### b. Flores pentameri.

26. C. PENTANDRA (Roxb. flor. ind. I p. 395), undique glanduloso-punctata, ramis cum cymis petiolis foliorumque reti tomento stellari-farinaceorubiginosis, foliis ovato-oblongis e basi rotundata vel subacuta breviter in petiolam longiusculum productis acumine tenuissimo cuspidatis integerimis adultis supra glabratia subtus venoso-reticulatis pallidis et dense glanduloso-punctatis, cymis multifloris dimidiatis laxe corymbosis pedunculo petiolum superante folio duplo brevioribus, calyce cupuliformi truncato 5-mucronulato. ♂ In Archipelago Indico, in sylvis altioribus Javae (Blume!, Kollmann!), in Philippinis ins. (Cuming n. 1773!), in Moluccis Roxb. (herb. DC. a Lamb. comm.). Geunisia farinosa Blume! bijdr. p. 819. Arbor elata. Folia opposita petiolis margine transverso conjugatis, inferiora interdum alterna; lamina subsexpollicaris supra obsolete floccosa et rari punctata in acumen tenue extenuata; petioli pollicaris-sesquipollicaris. Calyx  $\frac{3}{4}$  lin. longus, etate subglabratus et cum corollâ ipso triplo longiore punctatus. Antheræ exsertæ, dorso glandulosæ, loculis apice poro oblongo obliquo hiantibus. Callicarpis habitu arctissime conjuncta, nec ullâ notâ nisi staminibus 5 et loculis anthracrum rimâ paulo breviore dehiscentibus a cæteris recedens. (v. s. sp. Blum. in b. Necs et alia in b. DC.)

#### + Species recognoscenda.

27. C. VILLOSA (Vahl symb. 3 p. 14), ramis obsolete tetragonis pedunculis foliisque subtus villosa-incanis, foliis oblongo-ovatis acuminatis integerrimis subtus venoso-reticulatis supra glabris, pedunculis folium æquatus, cymis multifloris. ♂ In Indiâ orientali. Folia 3-4 poll. longa, 2 poll. et ultra lata.

Flores brevissime pedicellati, bracteâ linearî stipati. Calyx parvus 4-dentatus, cum corollâ extus villosus (Vahl).

28. *C. TOMENTOSA* (Willd. enum. hort. berol. p. 158. Hook. et Arn. Beech., voy. bot. p. 305), ramis foliisque subtus dense fulvo-tomentosis, his ovatis acuminate inaequaliter crenatis basi rotundato-attenuatis et integerrimis supra sparse pilosis, oymis densifloris calycibusque villosis, pedunculis petiolum æquantibus. ♂ In Chinâ ad Cantonem alibique. Folia 3-4-pollicaria. Conf. *C. macrophylla* et *C. lanata*.

† † *Species excludenda, sed generis incerti.*

29. *C. UMBELLATA* (Lour. fl. cochinch. ed. Willd. 1 p. 88), a follis alternis turbinato-ovatis integerrimis glabris margine reflexis, umbellis sessilibus 5-floris subterminalibus, calyce obtuse 4-fido. ♂ In sylvis Cochinchinæ. Arbor mediocris, ramis adsoendentibus. Flos albo-viridis parvus. Cor. campanulata, tubo brevi. Stamina et stigma sessilia. Bacca carnosæ, subrotunda, parva, 4-sperma. » An *Premnæ* species?

*Species exclusæ.*

- C. *CORDIFOLIA* Ruiz et P. = *Ægiphila Mutisii*.
- C. *DISCOLOR* Willd. = *Ægiphila arborescens*.
- C. *GLOBIFLORA* Ruiz et P. = *Ægiphila arborescens*.
- C. *INTEGRIFOLIA* Jacq. = *Ægiphila arborescens*.
- C. *RETICULATA* Poepp. = *Petitia Poeppigii*.
- C. *TRILOBA* Lour. = ign. div. ordinis.
- C. *VELUTINA* Presl bot. Bem. p. 93 = *Urticaceæ*.

XXIX. *ÆGIPHILA* Jacq. hist. stirp. am. ed. pict. t. 16, observ. 3 t. 29, Endl. gen. n. 3713, Meisn. gen. p. 292 et comment. p. 200, H. B. Kunth nov. gen. et sp. 2 p. 294 t. 130 et 131. — *Manabea Aubl. guian.* 1 p. 62. t. 23 et 25. — *Omphalococca Willd.* in Schult. mant. 3 p. 132. — *Callicarpæ* sp. R. et Pav. et alior.

Flores saepissime abortu dielini. Calyx eyathimorphus, campanulatus aut turbinato-tubulosus, 4-fidus, 4-dentatus aut truncatus. Corolla infundibularis aut hypoeraterimorpha, tubo calycem nunc longe excedente nunc subæquante, limbo 4-partito æquali. Stamina 4, æqualia, eorollæ tubo infra sinus limbi inserta; in typo ♂ filamenta exserta, antheris juxta basin bifidam insertis loculis parallelis; in typo ♀ filamenta brevia, eum antheris tabescientibus fauci corollæ inclusa. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, capillaris, bifidus, in typo ♀ exsertus, in ♂ tubo eorollæ inclusus; stigmatis crura aeuta. Drupa calyci eupulæformi aucto et indurato insidens, suœcosa vel carnosæ epicarpi lœvi saepius firmo, 4-pyrena vel saepissime abortu 4-2-pyrena, pyrenis distinctis unilocularibus, putamine sive osseo sive coriaceo lœvi basi perforato. Semen erectum, eotyledonibus applicatis crassis oleosis, radiculâ inferâ brevi. — Arbores aut frutices, interdum volubiles, inter tropicos Americæ obvias, plerumque vestitæ, saepissime glandulis punctiformibus oleo æthereo farctis consitæ. Rami plerumque 4-goni. Folia opposita vel verticillata simpleia ut plurimum integririma. Cymæ trichotomæ, aut mere axillares aut superiores in paniculam brachiatam collectæ, in typo ♂ plerumque laxiores in ♀ autem magis compactæ. Cor. alba, viridula, rubra, flavescens.

§ 1. *Cymosæ. — Cymæ axillares.*

\* *Calyx (subherbaceus) obconico-cyathimorphus aut obconico-tubulosus*, ore (interdum quidem brevissime) 2-4-fido.

1. *Æ. TRIFIDA* (Swartz! prodr. fl. ind. occid. p. 32), ramulis junioribus pedunculis calycibusque tenuiter strigosis, reliquis partibus glabris, foliis coriaceis ellipticis oblongis in petiolum brevem paulo attenuatis obtuse acuminatis utrinque nitidis, cymis axillaribus brevibus vel trifloris bis trifidis, calyce coriaceo clavato-tubuloso 4-lobo lobis ovatis acuminatis reflexis. ♂ In montos Jamaicæ (Sw.! Willd. h. n. 2836!) — Sw. fl. ind. occid. 1 p. 260. Frutex et arbustula. Folia 2-3 poll. long., 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. latit., atrovirentia. Cymæ pedunculus petiolo subduplo longior; flores brevipedicellati, bracteolis subulatis reflexis subtensi. Calyx carnosulus, subangulatus, 5 lin. circ. longus, lacinias margine inflexis acumine carinato recurvo. Cor. carnosa, alba, glabra, infundibularis, tubo calycem paulo excedente, limbo reflexo lacinias lanceolatis. Stamina (formæ ♀) ad fauces subsessiles. Stylus bifidus cruribus e fauce exsertis. (v. s. sp. orig. in h. DC. et berol.)

2. *Æ. KHOTSKYANA* (Cbam.! in Linnæâ 7 p. 112), fruticosa, ramis brachiatis, ramulis obsolete tetragonis tomentosis, foliis oblongis ellipticis subsessilibus utrinque acutis supra adpresso lanuginosis glabrescentibus venosis subtus subtus iucano-lanuginosino-tomentosis integerrimis vel antice obsolete repando-dentatis, cymis cano-tomentosis multifloris densis brevipedunculatis folio ter brevioribus, calyce obconico, dentibus ♂ truncatis mucronulatis ♀ brevissimis acutis. ♂ In campus virgultosis prov. Minarum et Bahiensis, Brasiliæ (Sell.! Khotsky! Mart.! Pohl! Claussen! coll. 1840. n. 352, Salzm.! Blanchet! Lund!). Sequenti proxima, habitu tamen e tomento brevi neutiquam scriceo laxo, e ramis crebris et foliis sub anthesi miuoribus oriente recognitu facilis. (v. s. in h. reg. berol., viudob., Mart. et DC.)

3. *Æ. TOMENTOSA* (Cham.! l. c. p. 110), suffruticosa, subsericeo-villoso-tomentosa, caulinis erectis subsimplicibus, foliis oppositis alternis ternisque subverticillatis subsessilibus ellipticis vel ovato-ellipticis breviter acuminatis basi acutis integerrimis venosis supra pubescentibus demumque glabrescentibus et viridescentibus subtus lanuginoso, aut subsericeo-tomentosis, cymis multifloris densis brevipedunculatis folio quater brevioribus, calycis obconici vel campanulati dentibus brevibus lato-ellipticis abrupte acuminulatis. ♂ In campus prov. S. Pauli et Minarum Brasiliæ (Sell.! Pohl! Mart.! Riedel! Lund! Regnelli! pl. bras. exs. ser. 1 n. 310). *Æ. verticillata* Vellozo! fl. flum. t. 91. Fol. 3-4-pollicaria. ♂ : Cymæ floribus pedicellatis longius pedunculatæ laxiusculæ. Cal. obconicus, 2 lin. longus. Filamenta cor. duplo longiora. ♀ : Cymæ floribus sessilibus densæ. Cal. campanulatus 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus. Stamina sterilia. Stylus longe exsertus. (v. s. in h. reg. berol., cæs. vindob. et petro., Mart., Sonder et DC.)

4. *Æ. SPLENDENS* (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), suffruticosa, tota lanâ densâ niveâ sericeâ splendens, caulinis strictis simplicibus, foliis oppositis alternis subternisque approximatim oblongis ellipticis subtrotundis breviter acuminatis basi rotundatis sessilibus integerrimis supra setate calvescentibus, cymis multifloris densis brevipedunculatis folio duplo brevioribus, calycis tubuloso-obconici dentibus lati brevibus truncato-obtusissimis ♂ brevissime apiculatis ♀ plerumque muticis. ♂ In Brasiliâ meridionali (Pohl!). Proxima praecedenti, diversa: indumento, foliis basi rotundatis subcordatis, calyce ♂ fere duplo longiore, staminibus inferius insertis etiam in ♀ fertilibus. (v. s. in h. cæs. vindob.)

5. *Æ. SELLOWIANA* (Cham.! l. c. p. 111), ramis quadrangularibus marginatis, ramulis tetragonis pubescenti-tomentosis, foliis oppositis obovato-oblongis-ellipticis breviter acuminatis in petiolum attenuatis integerrimis conspicue pennis-

nerviis supra pubescentibus estate glabrescentibus subtus lanuginoso-pubescentibus, cymis cano-tomentosis multifloris laxiusculis pedunculo petiolum subaequante, calycis obconici dentibus latis obtusis truncatis apiculatis.  
♂ In Brasiliâ meridionali, e. gr. circa Rio de Janeiro, usque in prov. Minarum (Sel!. Mart!. Gaudich!. Pohl! Riedel!). Arbor 25-pedalis, vel frutex elatior. Folia 3-6 poll. Cal. 2 lin. longus. Cor. albo-viridula, tubo calyce nonnihil longiore. (v. s. in h. reg. berol., cæs. petrop. et vindob., Mart. et DC.)

6. *Æ. ARBORESCENS* (Vahl eclog. 1 p. 15. t. 10), ramis acute quadrangularibus, cymis foliorumque nervis dense strigoso-sericeis et incanis, foliis membranaceis obovato-oblongis acuminatis postice longe valdeque attenuatis brevipetiolatis integerrimis aut medio margine denticulatis utrinque subtilissime pubescentibus et opacis subtus pallidis glandulisque cutaneis punctatis, costa validâ penninervi, cymis multifloris axillaribus (superior. nonnquam subpaniculatis) brevipedunculatis conglobatisque aut longius pedunculatis corymbosis, calyce clavato-infundibulari aut subturbinato-tubuloso subangulato ore acute 4-lobo. ♂ In Peruviâ ad Panataluas et Chinchao (Ruiz!), ad flumen Amazonum (Poeppig! exs. n. 1615, Mart.!), in silvis Orinocensis (H. et B.!) et pr. Carthagena (Jacq.), in Guianâ (Aubl., Schomb.! n. 404), et in ins. Trinitatis (h. reg. berol.!) — Kunth! in H. B. nov. gen. 2 p. 251. *Manabea arborescens* Aublet! hist. pl. guian. 1 p. 64 t. 24. *Callicarpa integrifolia* Jacq. hist. stirp. am. 15 t. 173 fig. 7. *Call. globiflora* Ruiz et Pav. fl. per. 1 p. 49 t. 57 f. 6 (fide spcc. Ruiz.). *Call. discolor* Willd. h. n. 2857! (spec. Humb.). Folia majora ampla, pede saepe longiora, in medio usque ad 4 poll. lata, interdum lanuginoso-pubescentia. Calyx firmule membranaceus, externe dense, interne tenuiter sericeus. Flores diciui, magnitudine ac figurâ duplice formâ obvii :

*α. longiflora*, ♂ : Cal. 4 fere lin. longus. Cor. tubo gracili 5-6 lin. metiente lacinias lanceolatis lineâ paulo longioribus reflexis. Stam. limbum duplo excedentia. Stylus inclusus bifidus. ♀ : Cal. et cor. maris. Antheræ abortivæ, breviter stipitatae, fauci cor. inclusæ. Stylus capillaris cruribus exsertus.

*β. breviflora*, ♂ : Cal. 3 lin. longus. Cor. infuudibularis, tubo calycem vix æquante vel paulo excedente, limbi lacinias lanceolatis 2 lin. longis reflexis. Stamina limbo sesquiloniora. ♀ : Cal. turbinato-campan. 2½ lin. long. Cor. calycem limbo exiguo superans, antheras tabescentes brevistipitatas infra fauces gerens. Stylus longe exsertus. (v. s. in h. reg. berol., Mart. et DC.)

7. *Æ. RIEDELIANA* (Shauer l. c. ined.), ramis tetragonis innovationibus et inflorescentiâ pube sericeâ canescentibus, foliis membranaceis oblongis utrinque attenuatis brevipetiolatis aut medio margine breviter dentatis utrinque subtilissimis subtus subcanescenti-pallidis, cymis axillaribus plurifloris brevipedunculatis vel subsessilibus compactis, calyce membranaceo campanulato-cyathiforme subangulato, dentibus 4 latis brevissimis mucronulatis. ♂ In Brasiliâ prov. Babiensi (Pohl! Riedel!). Frutex 10-15-pedalis. Folia 6-8-pollucaria. ♀ : Cal. 1½ lin. longus. Cor. exigua tubo haud exerto, limbi lacinias reflexis calycis longitudine. ♂ Cal. 2 lin. long., magis nervosus. Cor. tubo calycem tertiam parte excedente, lacinias patentibus ellipticis obtusis. (v. s. in h. cæs. vindob. et petrop.)

8. *Æ. VILLOSA* (Vahl eclog. am. 1 p. 16), ramis acute quadrangularibus cum inflorescentiâ et foliorum paginâ inferâ lanâ densâ sericeâ candicantibus, foliis amplis membranaceis obovato-oblongis acuminatis postice longe valdeque attenuatis brevipetiolatis integerrimis aut medio margine denticulatis, supra strigoso-hirtis denique glabratris, costa validâ penninervi, cymis axillaribus multifloris brevipedunculatis conglobatis, calyce cyathiformi-campanulato, ore acute 4-lobo. ♂ In Guianæ Gallicæ campis aridis (Aublet, Poiteau!). *Manabea villosa* Aubl. hist. pl. guian. 1 p. 62 tab. 23! Planta Vahlii diversa

videtur ob « folia utrinque obtusa ». Nomen Cayennense vulgare : Bois-Tabac. Simillima Æ. arborescenti, sed indumento albo denso splendente et calyce facillime discernenda. Folia « opposita inæqualia uno majoro altero minore ! (Anbl.), 6-8 poll. longa, 2-3½ poll. lata. Calyces 3 lin. longi. Cor. (in nostro deficiens) ex Aubl. subviridis tubo calycem hand multo excedente. Stamina fl. masc. styloque fem. longe exserta. (v. s. sp. in h. DC. et Kunth.)

9. *Æ. CORDATA* (Pœppig ! pl. exs.), undique ferrugineo-hirsutissima, foliis ovatis vel ovato-oblongis acuminatis basi subcordata subsessilibus integerrimis penninerviis venosis utrinque laxe strigoso-hirsutis, cymis axillaribus subsessilibus multifloris in glomerulum compactis, bracteis filiformibus calycem excedentibus, calyce pedicellato obconico-campanulato bifido, corollæ tubo gracili calyce subtriplo longiore. ♂ In Americæ merid. civitate Äquator, prov. Maynas (Pœppig!). Ramuli elongati villoso-hirsutissimi. Folia 4-6-pollicaria, membranacea, supra nitidula. Calyx 2 lin. longus, subventricosus, profunde bifidus lobis concavis. Cor. (stirpis ♂) hypocraterimorpha, lacinias ovatis. Stamina exserta. (v. s. in h. cl. Lucas berol.).
10. *Æ. MULTIFLORA* (R. et Pav.! fl. peruv. 1 p. 50 t. 76 f. 6), ramis tetragonis cum inflorescentiâ foliisque subtus in reti sublanato-villosis, foliis oblongis acuminatis in petiolum brevem attenuatis supra denique glabratiss., cymis multifloris subsessilibus compactis, calyce cyathimorpho ore repando minute 4-dentato, corollæ subclavato-infundibulari calyce ter longiore. ♂ In Pernviâ ad fluviorum margines prov. Chailla alibile (Ruiz! herb. Willd.! n. 2835). Frutex 15-18-pedalis. Calyx subsessilis 2½ lin. longus. Cor. rubra, extus glanduloso-punctata, virginea clavata, tubo amplio semipollucari, limbi lacinias subtrundo-ellipticis. Stamina breviter exserta; stylus tubo cor. brevior, apice bifidus. (v. s. auth. spec. ♂ in h. reg. berol.).

11. *Æ. VERRUCOSA*, ramulis cum foliorum costâ mediâ petiolo et cymis pubescentibus, foliis oblongis subellipticis acutis subacumiatisve in petiolum angustatis integrerrimis coriaceis lævibus demumque præter nervum medium glabratiss supra nitidis subtus pallidis et punctatis, cymis axillaribus brevissime pedunculatis petiolum vix excedentibus paucifloris, calyce pedicellato obconico-campanulato rotundato 2-4-lobo, corollæ tubo calycem æquante. ♂ In Venezuela (Moritz! n. 897). Arbor excelsa, ad struenda ædificia adhibita, colouis « Tavar », ramis cinereis verrucosis. Folia 3-5-pollicaria, petiolo 1-2 poll. metiente. Cymæ ramuli brevissimi, pedicelli autem calycem magnum 4 fere lineas longum et verrucis conspersum subæquantes. Corolla pallida, hypocraterimorpha, tubo cylindrico angusto, limbi lacinias linearibus obtusissimis. Stamina exserta; stylus inclusus. (v. s. in h. reg. berol.).

\* \* *Calyx (membranaceus) cyathimorphus, ore vel subrepando obsolete aut minute dentato vel subtruncato et 4-cuspidato-mucronato.*

12. *Æ. FLUMINENSIS* (Velozzo! fl. flum. t. 95), ramis obtuse tetragonis cum inflorescentiâ pube tenui adpressa subcanescensibus, foliis oblongis cuspidato-acuminatis in petiolum brevem angustatis cuneatis undulatis utrinque glabris supra nitidis subtus pallidioribus, cymis axillaribus longe et firmi pedunculatis subcorymboso-paniculatis multifloris laxis bracteisque foliaceis oblongis lanceolatibus interstinctis, calyce obconico-cyathimorpho truncato vel brevissime repando-dentato. ♂ In Brasilâ meridionali, e. g. in silvis et fruticetis circa Rio de Janeiro (Sell.! Pohl! Ried.! Mart.! fl. bras. exs. n. 1039). *Æ. oleifera* Casareto nov. stirp. decad. p. 47. Frutex 3-4-pedalis. Folia 3-8 poll. longa, 1½-2½ poll. lata. Cymæ corymbosæ, pedunculo 2-3 poll. stipitata, bracteolis primariis obvallatæ. Calyx 2 lin. longus, ampliusculus. Cor. albida, tubo gracili sub limbo ampliato, ♂ calyce triplo, ♀ vero eundem duplo excedente, limbi erecto-patentis lacinias oblongis obtusis. (v. s. in h. cæs. vindob., petrop. et Mart.).

13. *Æ. TRIANTHA* (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), ramulis cum

inflorescentia foliisque novellis adpresso-pubescentibus, foliis oblongis utrinque acuminatis brevipetiolatis in medio sepius dentatis venosis, cymis axillaribus trifloris brevipedunculatis folio multo brevioribus, calyce obconico-cyathimorpho truncato abrupte 4-denticulato.  $\delta$  In Brasiliâ (Sellow!). *A. brachiata* Vell.! fl. flum. t. 93 (inflor. pessime exhibita), non Cham. et Schl. Calyx 2 lin. longus. Cor. alba, glabra, infundibularis, tubo calycem triente superante, limbo patente. (v. s. in h. reg. berol.)

14. *A. FESTIDA* (Swartz! prodr. fl. ind. occid. p. 32<sup>1</sup>), ramis junioribus teretibus foliorumque costâ utrinque pubescenti-hirsutiusculis oblongo-lanceolatis obtusis basi rotundatis brevipetiolatis præter costam utrinque subglabris nitidisque subtus pallidioribus, cymis axillaribus brevibus trifloris pubescentibus, bracteis exiguis setaceis villosis, calyce campanulato subtruncato.  $\delta$  Crescit in lapidosis Jamaicæ septentrionalis (Sw. ! herb. Willd. n. 2837!). Fruticulus 1-2 pedalis, foliis 3-4 poll. longis pollicem latis, apice angustato obtusis, tactu foetidis. Flores pedunculis longiores flavescentes. Cor. cylindracea apice ampliata. Stamina subincusa. Stylus longit. tubi oorollini, stigmata incrasata. Drupa majuscula, rubra, subrotunda. (v. s. sp. orig. sine flor. in herb. DC. et berol.)

15. *A. GRAVEOLENS* (Mart. et Schauer l. c. ined.), glabra, undique punotis resinosis conspicue glandulosa, ramis argute quadrangularibus canaliculatis, foliis lanceolatis oblongis utrinque attenuatis apice acutis subciliis pleurumque integerrimis supra nitidis subtus pallidis punctis immersis crebris, cymis trifloris aut bis trifidis brevipedunculatis folio multo brevioribus, calyce pedicellata campanulato-cyathimorpho subtruncato 4-mucronulato.  $\delta\delta$  In fruticetis Brasiliæ meridionalis (Mart. ! Riedl! Lund! pl. br. exs. n. 796). *A. serervata* Vell. fl. flum. t. 92? (icon. pess.). Arbuscula vel frutex 4-8-pedalis, odore ingratu. Folia chartacea, 4-5-pollicaria. Calyx 1 $\frac{1}{2}$  lin. longus, nervis 4 herbaceis in mucrones exsertis. Cor. virescens, tubo limbum et calycem aequante, lacinia lanceolatis obtusis patentibus.

16. *A. CASSELLEFORMIS* (Schauer l. c. ined.), ramulis tetragonis sulcatis cum inflorescentia pube laxisculâ glandulâ sessilibus commixta subcanescensibus, foliis oblongis utrinque attenuatis apice acutis subsessilibus in medio repando-dentatis integerrimis opacis præter costam pubescentem glabris subtus pallidis et subtiliter resinoso-punctatis, cymis trifloris aut bis trifidis brevipedunculatis folio multo brevioribus diffusis, pedicellis filiformibus elongatis, calyce strigilloso obconico-cyathimorpho subtruncato 4-mucronulato.  $\delta$  In Brasiliâ meridionali (Raben! n. 842). Præcedentia quam maxime similis, sed pube, glandulâ resinosis longe rarioribus, pedicellis bis terve longioribus, calyce denique basi acutiore paulo majori diversa. (v. s. in h. Mart.)

17. *A. MEDITERRANEA* (Vellozo! fl. flum. t. 94), ramis tetragonis tomentosovillosis, foliis oppositis alternisque oblongo-lanceolatis utrinque acutis brevipetiolatis in utrâque paginâ strigoso-subvilloso viridibusque, cymis pedunculatis corymbosis multifloris laxis flaccidisque, calyce subadpresso villosa obconico ore subtruncata setaceo-4-cuspidato.  $\delta$  In Brasiliâ meridionali, circa Rio de Janeiro alibiique (Sell. ! Mart. ! Riedel ! G. Gardner !). *A. cestrifolia* G. Gardn.! in Hook. Lond. Journ. of Bot. I p. 184. *A. hirta* Casar. nov. stirp. dec. p. 47. Arbor vel frutex elatior. Folia membranacea 4-6-pollicaria. Calyx tubo 2 lin. aequante, dentibus sinibus latis distinctis e basi brevi triangulari in cuspidem longum abeuntibus. Cor. albido-virescens, glabra, tubo calycem limbo tubum aequante. (v. s. in h. reg. berol., cæs. vindob., petrop. et Mart.)

18. *A. LUSCHNATHI* (Schauer l. c.), ramulis inflorescentiae ramulis innovationibusque pube villosulâ arrectâ canescensibus, foliis oppositis oblongis ellipticis breviter acuminatis in petiolum brevem attenuatis membranaceis pube subtili appressâ conspersis denique glabratris opacis subtus pallidioribus, cymis multifloris laxis flaccidisque pedunculatis folio multo brevioribus, calyce brevi cyathimorpho appresse pubescente ore truncato minute 4-mucronulato.  $\delta$  In silvis

et fruticetis circa Rio de Janeiro Brasiliæ (Luschn. in Mart. fl. bras. exs. n. 1040 ♂ et ♀, Riedel! Blanchet!). Frutex arborosens ramis brachiatis. Folia sub-4-polioria. Calyx 1 lineâ paulo major in ♂, in ♀ ½ lin. sequante. Cor. infund., albida, tubo calyce duplo longiore, lacinij oblongis obtusis. (v. s. in h. cæs. vindob., Mart. et DC.)

§ 2. *Paniculatæ*. — *Cymæ supremæ in paniculam terminalem nudam collectæ, accendentibus sapius cymis paniculivise axillaribus.*

19. *Æ. HUMBOLDTII*, grabriuscula, foliis tenuiter membranaceis oblongo-lanceolatis attenuato-acuminatis basi acutis brevipetiolatis adultis glabratâs utrinquo nitidulis, paniculâ terminali thyrsoidâe inferne foliosâ, cymis paucifloris laxis, calyce pedicellato-turbinato-campânulato obsolete 4-lobo, corolla tube calyco subduplicite longiore. ♂ Crescit in seculosis temperatis Andium Quindnensis juxta El Moral, alt. 1065 hex. (Humb.), in Venezuela ad Porto-Cabollo (Karsten!). Petitia Quinduenensis Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 248. *P. tenuifolia* L. Willd. n. 2818! *Proxima* *Æ.* lœvi. Arbor biorgyalis, ramis infer. pendulis. Folia 3-6-pollicaria et majora, impunctata, nervo medio subtus prominentes, lateralibus tenuibus, venarum reti vix conspicuo. Cymæ inferiores axillares folio breviores, pedunculo pedicellisque tenuibus. Calyx 2 lin. fere longus, corolla tube conspicue amplior, glaber, superne glandulosopunctatus. Cor. infundibularis, albida, tubo cylindrico, limbi laciñiis oblongis. Stamina in ♂ et stylus capillaris in ♀ exserta. (v. s. in h. reg. berol., Willd. et Kunth).
20. *Æ. LEVIS* (Willd. sp. pl. 1 p. 617), grabriuscula, foliis membranaceis oblongo-ellipticis utrinque acuminatis brevipetiolatis integerrimis supra nitidulus subtus pallidis opacis conferte glandulosopunctatis, cymis terminalibus vel axillaribus folio brevioribus bis terve trifidis laxis corymbosis supremis paniculatis, calyco cupulaeformi 4-fido lobis rotundatis. ♂ In silvis Cayennæ interioris (Aubl.), in Columbiâ locis calidissimis ad fl. Magdalena pr. Buena Vista (H. et B. h. Willd. n. 2829!), in Venezuela (E. Otto! n. 1092), in Guianâ angl. (Aubl. Schomb. pl. guian. n. 772 et 592?), in Jamaicâ ins. (Sw.). Manabæa lœvis Aubl. hist. pl. guian. 1 p. 66 tab. 25. *Æ. Manabæa* Sw. flor. ind. occid. 1 p. 256. *Æ. lutea* Lam. illustr. t. 70f. 3. *Æ. lœta* Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 249. *Æ. laxiflora* Benth. ann. nat. hist. 2 p. 449 (ex deser.). Rami brachiati, glabri, juveniles cum inflorescentiâ subtilissime puberuli. Folia bi-tripollicularia lœte viridia, penninervia, tenuiter venosa. Cymæ axillares, interdum in ramulis axillaribus spirales, ad apices ramorum in paniculam collectæ. Calyx basi acutus in limbum cupuliformem subito ampliatus. Cor. infundibularis, flava, glabra, tubo cylindrico calycem paulo excedente, limbi laciñiis ovatis obtusiusculis. Proxime accedit ad *Æ. Martinicensem*, foliorum figurâ autem, cymis et calyce uberrime diversa. (v. s. sp. in h. berol.)
21. *Æ. FILIPES* (Mart. et Schauer l. c.), ramulis obtuse tetragonis ad nodos compressis cum inflorescentiâ pulverulento-puberulis, foliis membranaceis elliptico-oblongis utrinque attenuatis iu utrinque pagina pube subtilli tactu velutinis supra opacis subtus pallidis, cymis laxis bis trifidis axillaribus terminalibus paniculam pauperem struentibus foliis triplo brevioribus, pedunculo pedicellisque filiformibus, calyce membranaceo brevi cyathimorpho ore obsolete 4-lobo lobis rotundatis mucronulatis, corolla infundib. limbo tubum sequante. ♂ In silvis umbrosis humidis juxta fl. Amazonum in Brasiliâ (Mart.! Riedel!). Folia 4-6 pollicaria. Calyx basi acutâ in pedicellum 2½-3 lin. longum abiens, 2 lin. longus. Affinis hinc *Æ. lœvi* illinc et quidem proxime *Æ. Martinicensi*; ab utraque foliis, inflor. et calyce neque non pube distincta. (v. s. in h. cæs. petrop. et Mart.)
22. *Æ. MARTINICENSESIS* (Linn. mant. p. 178, Jacq.! obs. 2 p. 3 t. 27), ramis obtuse tetragonis bracteatis, hornotinis cum inflor. retique foliorum tenuiter puberulis, foliis chartaceis elliptico-oblongis oblongis coarctato-acuminatis

basi rotundatis subacutis brevipetiolatis supra nitidulis subtus pallidis utrinque paginâ glabrá subtiliter glanduloso-punctatâ, paniculis axillaribus terminalibusque brachiatis thyrsoides, cymis multifloris corymbosis, calyce membranaceo brevi cupuliformi ore truncato integerrimo, corollæ hypocrat. tubo gracili calycem duplo triplo excedente. ♂ In insulis Cubâ (de la Ossa!), Martinicâ (Sieb.! fl. mart. n. 78), Guadeloupe (Badier!), Montserrat et S. Luciæ (h. DC.), Trinitatis (Sieb.! fl. trin. n. 85). *Æ.* glabra Lam. ill. t. 70 f. 1. Frutex orgyalis. Folia 3-5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  poll. lata. Calyx pedicellatus,  $1\frac{1}{2}$  lin. altus, e basi hemisphaericâ in limbum cupuliformem ampliatus, tubo cor. conspicue latior, ore vel prorsus integerrimo vel obsolete 4-mucronulato. Cor. alba, limbi lacinii obtusis. Stamina corollam duplo excedentia. (v. s. in b. DC.)

23. *Æ. ELATA* (Swartz! fl. ind. occid. 1 p. 254), ramis obtuse tetragonis inflorescentiâ retique foliorum pube tenui adpressâ vestitis, foliis coriaceis ovato-oblongis oblongis angustato-acuminatis basi rotundatis acutis brevipetiolatis in paginâ ultraque glabris lucidisque subtus tenuiter glanduloso-punctatis, paniculâ terminali corymbosâ vel thyrsoidâ, cymis multifloris fastigiatis, bracteis subulato-linearibus, calyce herbaceo firmo brevi c. basi subglobosa campanulato-pateriformi, ore brevissime 4-lobo lobis retusis mucronatis, corollâ hypococraterimorphâ tube gracili calyce triplo longiore. ♂ In Americâ æquinoctiali, in Jamaicâ (Sw.! h. Willd.! n. 2832), Dominicâ ins. (Bertero!), tum in Guianâ Gallicâ (h. DC.) et in Brasilijâ æquinoctiali (Sieber! Riedl! ♀ et Sell.! ♂). *Æ. cornifolia* Kunth! abhdg. berl. acad. 1831 p. 215. *Omphalococca cornifolia* Willd.! in Schult. mant. 3 p. 132 (fide spec. h. Willd. n. 2861!). *Knoxia scandens* etc. P. Browne jam. p. 140 t. 3 f. 3. *Intermedia* quasi inter præcedentem et sequentem, huic valde affinis et quoad folia simillima, sed diversa potissimum calyce et corollâ, tum etiam pube nec adeo perceptibili nec strigosâ. (v. s. in h. reg. berol., cæs. petrop. et DC.)

24. *Æ. CUSPIDATA* (Mart.! h. fl. bras. n. 1041), ramis cum inflorescentiâ retique foliorum strigoso-hirtis, foliis coriaceis oblongis in acumen angustatis basi rotundata brevipetiolatis supra lucidis subtus parce strigillosis pallidis viridibus nitidisque aut strigoso-pubescentibus, paniculâ terminali brachiatis thyrsoidâ basi que foliosâ, cymis multifloris, bracteis linearibus, calyce membranaceo obconico-cyathimorpho brevi 4-lobo lobis lato-ovatis acutis, corollâ infundibuliformi calyca duplo longiore. ♂ In Brasilijâ, circa Rio de Janeiro (Gaudich.! Schott! Riedel!), in paludosis prov. Bahiensis (Luschn.! in Mart.! h. fl. bras. n. 1041, Blanchet! pl. bras. exs. n. 3269, Mart.!), in prov. Paraënsi et Flum. nigri (Mart.! in Guianâ (Rich. Schomb.! n. 146). — Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. cum icono). *Æ. racemosa* Vell. flor. flm. t. 88? *Æ. vitelliniflora* Klotzsch! in Walp. repert. 4 p. 123. Frutex orgyalis. Folia 4-5 poll. longa, 1-2 poll. lata. Typus ♂: Paniculæ cymæ laxiusculæ corybosæ. Calyx e basi anguste tubulosa brevique in limbum campanulatum ampliatus, 2 lin. longus, ore manifesto-4-lobo. Cor. flavescens infund., tubo calycem triente superante. Stamina limbo cor. duplo longiora. Typus ♀: masculo congruens præter calycis lobos brevissime acuminatos, stamna tabescencia et stylum longissime exsertum. Hic vero occurrit etiam forma *parviflora*: paniculæ cymis compactis subcapitatis, calyce sessili,  $1\frac{1}{2}$  lin. longo, corollâ minore totâ  $2\frac{1}{2}$  lin. longâ tubo gracili calycem conspicue superante (Blanchet! pl. bras. exs. n. 3269). (v. s. in h. cæs. vindob. et petrop., Mart. et DC.)

25. *Æ. MACROPHYLLA* (Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 251) ramis junioribus cum inflorescentiâ strigoso-pubescentibus, foliis coriaceis elliptico-ovatis angustato-acuminatis basi rotundatis brevipetiolatis utrinque glaberrimi supra nitidis subtus pallidis opacis, paniculâ terminali foliosâ apice corymbosâ, cymis multifloris, bracteis infimis foliaceis lanceolato-attenuatis reliquis linearibus calyce brevi membranaceo obconico-cyathiformi 4-lobo, lobis late ovatis acutis, corollâ subhypocraterimorphâ tubo calyce vix longiore. ♂ Crescit rarissime in regione temperatâ, prope Cumanacoam civit. Venezuelæ, alt. 100 hex. (H. et

- B. h. Willd. n. 2831!) Proxima et simillima habitu *E. cuspidata* in primis ejus formæ grandifloræ; diversa tamen videtur folijs et corollâ. Arbor trior-galis et altior. Folia in unico quod videbamus specimen ampla, 6 poll. longa, 4 poll. lata, penninervia, venarum reti grosse areolato, haud rugosa, undata. Paniculæ rami inferiores folio duplo breviores. Cor. *« alba »*, laciniis oblongis acutis. (v. s. sp. orig. in h. berol.)
26. *Æ. BERTERIANA*, ramis inflorescentiâ foliorumque paginâ inferâ cano-lanuginosis, foliis coriaceis elliptico-oblongis basi obtusâ brevipetiolatis breviter acuminatis integerrimis supra demum præter nervum medium glabratâs nitidis, paniculâ terminali apice nudâ thyrsoidâ, cymis multifloris densis, calyce membranaceo cyathiformi brevissime 4-fido lobis latis rotundatis. *h* In prov. S. Marthæ legit Bertero! *E. cuspidata* affinis, ceterum characteribus aitatis insignis. Folia 4-pollicaria. Calyx sesquilineâ haud multo longior. Cor. infundibularis, glabra, tubo dimidio calycem excedente. Indumentum æstate rufescens. (v. s. sp. unic. in h. DC.)
27. *Æ. MOLLIS* (Kunth ! in H. et B. nov. gen. et sp. 2 p. 250 tab. 130) un-dique birto-lanata et incana, foliis obovato-oblongis in petiolum brevissimum angustatis breviter attenuato-acuminatis apicem versus subdentatis venosis, paniculæ terminali apice nudâ thyrsoidâ, cymis multifloris, calyce membranaceo brevi scyphiformi truncato 4-mucronulato villoso. *♂* In sylvis Orinocensisbus ? (H. et B.), in Guianâ Anglicâ (Rich. Schomb.). Folia 3-6-pollicaria longit., 1½-2 poll. latitudine, petiolo 3 lin. circ. longo. Panicula conica, cymis inferioribus axillaribus, superioribus nudis. Calyx brevpedicellatus, lineam altus, basi acutus, subquadragulus angulis in mucroneum brevem herbaceum exsertis. Cor. hypocraterimorpha, tubo cylindrico calycem duplo excedente, limbo explanato majusculo, laciniis ellipticis acutiseulis. Stamina (formæ ♂) breviter exserta. Habitu et indumento *Æ. Mutisii* similis. (v. s. in h. Willd. n. 2838! et in h. Kunth )
28. *Æ. MUTISII* (Kunth in H. et B. l. c. p. 250 t. 131), hirsuta incana, ramis paniculisque tomentosis, foliis ovato-oblongis in acumen longum attenuatis basi rotundatis aut brevissime acuminatis brevipetiolatis integerrimis venosis supra hirtis subtus pallidioribus lanâque tomentosâ canescentibus, paniculis axillaribus terminaliæ brachiatis thyrsoides, cymis multifloris densis, calyce obconico-cyathiforme herbaceo acute 4-lobo. *♂* In Peruviæ prov. Panatihuaram (Ruiz et P.!), in regno Novo-Granatensi (Mutis), ad Hacienda del Chocho, prope pagum Fusagasuga prov. Bogota (Hartw.), in Brasiliâ æquinoctiali (Riedel!). Callicarpa cordifolia Ruiz et Pav. fl. per. 1 p. 50 t. 57 f. a (fide spec. Ruiz. h. reg. berol.). Frutescens, ramis patentibus. Folia 5-6 poll. longa, 2-2½ poll. lata. Bractæ lineares, calyces superantes aut æquantes. Flores diciuntur. Cor. lutea. Ludit formâ grandiflorâ et parviflorâ. (v. s. in h. cas. petrop. et reg. berol.)
29. *Æ. SALUTARIS* (Kunth in H. et B. l. c. p. 249), ramis cum inflorescentiâ molliter birto-tomentosis, foliis membranaceis ovato-ellipticis in petiolum brevem attenuatis in acumen breve coarctatis integerrimis supra hirtis subtus pube molli canescentibus, paniculâ terminali thyrsoidâ inferne foliosâ, cymis multifloris, calyce campanulato brevissime et acute 4-dentato, corollâ infundibuliformi tubo calycem triplo excedente. *♂* In Venezuelâ, ad ripam fl. Orinoci s. flum. Nigri in confinibus Guianæ et Brasilie (H. et B. b. Willd. ! n. 2834) et in apricis burridis pr. Palmar de S. Mateo (E. Otto! n. 856); in Guianâ (Schomb.!). *Contracolevra* incol., quibus decoctum foliorum ad serpentium morsum medendum adhibetur. Tota odorem nauseosum fundens. Folia 3-4-pollicaria, penninervia. Panicula 3-4-pollicaris, trichotoma. Cor. glabra, flavo-viridula, laciniis limbi ovatis acutiseulis. Stamina ♂ et stylus ♀ capillaris longissime exserta. (v. s. in h. reg. berol.)
30. *Æ. BRACHIATA* (Cham. et Schlecht. ! in Linnæa 6 p. 371), ramis brachiatis cum inflorescentiâ tomento lanuginoso iucanis, foliis chartaceis ovatis sursum

Paulo attenuatis basi angulo obtusissimo latissime cuneatâ in petiolum abeuntibus in acumen breve cuspidatum coarctatis supra glabris nervis pubescentibus subtus pube molli canescens, paniculis ramulos superiores terminantibus brachiatis nudis, cynis multifloris, calyce obconico-campanulato 4-lobo lobis ovatis obtusis mucronulatis, corollæ infundibularis tubo gracili calyce bis terve longiore. ♂ In regno Mexicano, prope Esterio (Schiede pl. mex. n. 1165!). *Æ.* Deppeana Steud. nomencl. ed. 2. Folia penninervia, grosse venoso-reticulata, plana, ampliuscula, supra viridia nitidula. Ramuli paniculati bracteati ad apices ramorum una paniculam amplam brachiatam foliisque interstinctam strobiles. Cor. alba, glabra, lacinias ellipticas obtusis. Stamina ( $\sigma^3$ ) longissime exserta. (v. s. sp. orig. in h. berol.)

31. *Æ. OBDUCTA* (Vellozo! fl. flum. t. 97), ramis obtuse tetragonis cum inflorescentiâ foliorumque dorso lanugine canâ vel ferruginea tomentosis, foliis coriacieis oppositis lanceolatis oblongis subcuspidato-acuminatis in petiolum breven attenuatis grosse penninerviis venosisque sepe rugosis supra nitidis pubescentibus denique glabratris, cymis pedunculatis corymbosis multifloris ad apices ramorum axillaribus paniculamque simplicem aut compositam foliosam strucentibus, calyx subturbinate-tubuloso lobis irregularibus ovatis obtusis. ♂ In Brasiliâ merid., Serra dos Orgãos (Ried.! Guillemin! Houillet! Sellow! Gardn.! et in mont. Miuarum gen. (Ried.! Lhotsk.!). *Æ.* lanuginosa G. Gardn. in Hook. lond. journ. 1845 p. 134. Frutex arborescens, magnitudine partium eximie variabilis, ceterum per insignis. Folia nunc oblonga, 4-8 poll. longa et 1½-3 poll. lata, nunc lanceolata 4-5 poll. longa et 9-12 lin. lata. Bracteolæ subulatae. Calyx e hasi angustiore subventricoso-ampliatus, 5-7 lin. longus. Cor. alba, infundib., tubo calycem non omnino æquante, limbi lacinias oblongis obtusis 3½-4 lin. long. reflexis. Stamina ♂ exserta limbum long. æquanta; in ♀ anteræ tabesc. subsessiles. Stylus in flore ♂ calycem æquans, in ♀ exsertus. Drupa magna glandi queruæ similis sed paullo minor. (v. s. in h. cæs. petrop., Mart. et DC.)

† *Species dubia.*

32. *Æ. LÆVIGATA* (Juss. ann. mus. 7 p. 76), ramis subverrucosis, foliis brevipetiolatis ovato-lanceolatis integerrimis glabris apice obtusis, floribus axillaribus opposite paniculatis, paniculâ multiflorâ, corollis brevibus. ♂ In Indiâ. « Fructus ignotus. Habitus Ægiphilæ, unde hoc revocata ». An Premnae species?

33. *Æ. VIBURNIFOLIA* (Juss. 1. e.), foliis (Viburni) petiolatis subcordiacis ovatis integris, (floribus ignotis), fructibus opposite corymbosis axillaribus et terminalibus, bacca siccâ parvâ acuminatâ basi attenuatâ fœtâ nuce biloculari dispermâ, seminibus aliis forsitan abortivis. ♂ Crescit in insulis Philippinis. « Habitus Ægiphilæ, unde hoc revocata, an affinior Petitiæ. » An Premnae species?

34. *Æ. MAGNIFOLIA* (Steud. nomencl. ed. 2), arborea, foliis ellipticis obtusis glabris integerrimis petiolatis. ♂ Patria? *Æ.* macrophylla Desf. cat. hort. paris. ed. 3 p. 391. Folia 6-8 poll. long., 3-4 unc. lat. met., petiolo unciali.

*Species exclusæ.*

*Æ. INFLEXA* fl. flum. t. 96.

*Æ. STIPULATA* fl. flum. t. 90.

*Æ. UMBELLATA* fl. flum. t. 89.

*Æ. MACROPHYLLA* Sieber fl. trinit. exs. n. 37.

*Æ. NUXIA* W. = *Nuxia verticillata* ( Prodr. X. p. 434.)

*Æ. GRANDIFLORA* Hook. = *Clerodendron graudiflorum*.

} Pertinent ad Rublacearum ordinem.

XXX. VOLKAMERIA Linn. gen. n. 788 (excl. V. inermis), Endl. gen. n. 3707, Meisn. gen. p. 291 et comment. p. 200, Jacq. amer. t. 117, Gärtn. fruct. 1 p. 267 t. 56. — Duglassia Houst. reliq. p. 13, Ammann herb. 579, non Lindl.

Calyx campanulatus, 5-fidus. Corolla hypocratermiphora, tubo cylindraceo gracili, limbo 5-fido, laciniis obtusis subaequalibus, duobus superioribus magis ab invicem divergentibus. Stamina 4-5-6, summo tubo corollæ inserta, inaequalia; filamenta adscendentia, longe exserta; antherae oblongæ, supra basin insertæ, biloculares. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, filiformis, stamina adaequans; stigma bifidum, altero crure sæpius obsoleto. Drupa calyce aucto membranaceo subtensa, carnosa, exsuccta 4-sulcata vel tuberculata et suberosa, maturitate demum bipartibilis, dipyrena, pyrenis oscis bilocularibus, dorso carni adcretis. Semen solitarium in loculo, erectum. — Frutices inter tropicos Americæ, Asiae et Africæ nascentes, foliis oppositis simplicibus, floribus trichotomo-cymosis bracteolatis. Genus Clerodendro valde proximum, ita ut consideratæ summâ similitudine specierum complurium utriusque generis, e. g. Volk. aculeatæ et Clcr. incrismis, genera non nisi invitâ naturâ separata videantur.

1. V. ACULEATA (Linn. sp. plant. p. 889), ramis post foliorum lapsum phyllopo-diis residuis aculeiformibus armatis, foliis oppositis verticillatis ternis ovatis acuminatis brevipetiolatis integerim glabris puberulis supra nitidis, cymis axillaribus trifloris vel bis trifidis longe pedunculatis. ♂ in Americâ æquinoctiali; in sepius et fruticet Brasil. æquin. (Sieber!), in Guianâ (Rich. Schomb.! n. 222, Parker!), in Indiâ occid., Cubâ (de la Ossa!), Guadeloupe (Perrottet!), Martinicâ (Sieber! fl. mart. n. 159), in ins. S. Thomæ (Moritz! Wydl. pl. exs. n. 10). — Jacq. hist. stirp. am. p. 185 t. 117, Plum. icones t. 164, f. 1. P. Br. hist. jam. p. 262 t. 30 f. 2. Sloane hist. jam. 2 p. 137 t. 165 f. 2, 3. Folia subbipinnaria. Pedunculi folium æquantes paulo breviores. Pedicelli subsemipinnulares. Cor. alba, tubo  $\frac{1}{2}$  poll. longo. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)
2. V. ACERBIANA (Visiani! pl. æg.-arab. n. 95 t. 4 f. 1), ramis inermibus cum petiolis cymisque tomentosis candicantibususc, foliis oppositis ternisve cordato-ovatis-subrotundisvc breviacuminatis petiolatis integerimis undatis supra puberulis demumque glabratris nitidisq; subtus opacis et subtomentello-pubescentibus, cymis axillaribus multifloris subcapitato-corymbosis, longe pedunculatis folio subæqualibus brevioribusvc. ♂ In Nubiæ prov. Berber-Mograd (Kotschy! iter nubic. un. itin. n. 359). Rami, petioli et pedunculi pubescenti-tomentosi. Folia 2-3-pollicaria, basi magis minusve cordata. Cymæ sublanato-tomentosæ. Bractæ lineares, inferiores elongatæ. Calyx campanulatus, profunde 5-fidus laciniis linearibus perangustis acutis. Corolla albæ tubus gracilis, subpollicaris, glanduloso-pubescentis; limbi mediocris laciniæ ovalis. Genitalia longe exserta. Drupa calyce cupuliformi subtensa, cerasi minoris mole, spongiosa, tuberculato-rugosissima, fructum rubi fere mentiens, putamine rugoso. (v. s. in h. DC.)
3. V. ? JAPONICA (Thunb. fl. jap. p. 255), tota glabra, ramis compressis apice paniculatis, foliis longe petiolatis alternis petiolatis valde cordatis acuminatis venosis subtus pallidioribus glabris floribus in racemos terminales collectis, bracteolis subulatis pedunculo brevioribus, calyce 5-partito laciniatis basi divaricatis concavis lanceolatis aristatis, corollæ ringente tubo cylindraceo calyce duplo longiore. ♂ In Japoniâ. Goo-Too Kämpf. amœn. p. 861. Arbor vasta excelsa, ramosa. Folia inferiora spithamam late pedalia, superiorsa sensim minoria et obtusiora. Petiolas in majoribus foliis longior spithamæus, in minoribus unguicularis. Pedunculi simplices secundi, uniflori, erecti, unguicularis. Calyx rufescens. Cor. tubus purpureus: limbus 5-partitus subæqualis tubo brevior. Capsula ovata, 4-sulcata, magnitudine pruni, 4-valvis, bilocularis transversim dehiscentis. A Clerodendro fragrante, quo cum nonnulli auctores cou sociave- runt, ex descr. omo no est aliena.

† *Species dubia.*

4. *V. CORDIFOLIA* (Hochst. nov. pl. gen. afr. p. 19 adn.), suffruticosa, foliis petiolatis ovato-cordatis glabris, caule petiolisque minute pubescentibus. ♂ Crescent in Abyssiniâ.
5. *V. SCANDENS* (Linn. fil. suppl. p. 292), foliis cordato-ovatis obtusis integerrimis glaberrimis, paniculâ corymbosâ terminali, calycibus obtusis tomentosis. ♂ In Ceylonâ.
6. *V. GRANDIFLORA* (Blanco fl. de Filip. p. 512 Walp. repert. 4 p. 100), caule erecto, ramis pallidis glabris, foliis oppositis oblongis acuminatis integris glabris rugosis brevipetiolatis, petiolis basi cum glandulâ, floribus paniculato-umbellatis, bracteis subulatis, calycis erecto cylindraceo profunde 5-fido, lacinias lanceolatis, corollâ calycem duplo excedente bilabiato-5-partitâ laciuiis ovalibus concavis revolutis, staminibus 4 didynamis, drupa baccatâ obsolete tetragonalâ nuce 4-loculari 4-spermâ, loculis 1-2 sèpe abortivis. ♂ In insulis Philippinis. An Clerodendri species?

*Species exclusæ.*

- V. ALTERNIFOLIA* Burm. = Clerodendrum calamitosum.
- V. ANGULATA* Lour. = Clerodendron paniculatum.
- V. ANGUSTIFOLIA* Andr. = Clerodendron heterophyllum.
- V. BUCHANANII* Roxb. = Clerodendron Buchananii.
- V. BUXIFOLIA* Willd. h. = Clerodendron inerme.
- V. CAPITATA* Willd. = Clerodendron capitatum.
- V. COCCINEA* herb. de l'am. = Clerodendron squamatum.
- V. COMMERSONII* Poir. = Clerodendron Commersonii.
- V. DENTATA* Roxb. = Clerodendron dentatum.
- V. FARINOSA* Roxb. = Clerodendron serratum.
- V. FETIDA* Hamilt. = Clerodendron Buchananii.
- V. HERBACEA* Roxb. = Clerodendron herbaceum.
- V. HETEROPHYLLA* Poir. = Clerodendron heterophyllum.
- V. JAPONICA* Thunb. = Clerodendron fragrans.
- V. INERMIS* Linn. fil. = Clerodendron inerme.
- V. INERMIS* β Ait. = Clerodendron ligustrinum.
- V. INFORTUNATA* Roxb. = Clerodendron infortuatum.
- V. KÄMPFERI* Jacq. = Clerodendron squamatum.
- V. LIGISTRINA* Jacq. = Clerodendron ligustrinum.
- V. MULTIFLORA* Burm. = Clerodendron phlomoides.
- V. NERIIFOLIA* Roxb. = Clerodendron neriifolium.
- V. OBOVATA* Roxb. = Clerodendron obovatum.
- V. ODORATA* Hamilt. = Caryopteris Wallichiana.
- V. PETASITES* Lour. = Clerodendron infortunatum.
- V. PUMILA* Lour. = Clerodendron pumilum.
- V. SERRATA* Linn. = Clerodendron serratum.
- V. TOMENTOSA* Vent. = Clerodendron tomentosum.
- V. URTICIFOLIA* Roxb. = Clerodendron urticifolium.
- V. VERTICILLATA* Ruiz et Pav. = Citharexylum cyanocarpum.

XXXI. CLERODENDRON Linn. gen. n. 798 ad emendationem, R. Broton prodr. fl. nov.-holl. p. 510, Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 244, Endl. gen. n. 3708, Meisn. gen. p. 291 et comm. p. 200, Gärtn. de fruct. 1 p. 271 t. 57, Lam. ill. t. 511, Vent. jard. de malm. t. 70, Wall. pl. asiat. rar. t. 215, Reichenb. fl. exot. t. 208 et 209. — Volkameriæ spec. Linn. et auct., Jacq. collect. suppl. t. 4 et 5, ejusd. ic. rar. t. 590. — Volkmannia Jacq. hort. schœnbr. t. 338. — Agricolæa Schrank in regensb. denkschr. 1808 p. 98. — Siphonanthus Linn. gen. n. 129, Lam. ill. t. 79. — Ovidea Linn. gen. n. 787, Gärtn. de fruct. 1 p. 272 t. 57, Burm. fl. ind. t. 43. — Valdia Plum. gen. 14. icon. t. 256. — Torreya Spreng. neue endt. 2 p. 121, ex W.-Arnott in Jard. journ. of nat. sc. 1 p. 130. — Cornacchinia Savi in mem. sc. ital. mod. 21 p. 187 cum iconæ (auct. Endl. et Meisn.)

Calyx campanulatus, rarius tubulosus, interdum pentagonus et subinflatus, 5-fidus vel 5-dentatus, rarissime trunecatus. Corolla infundibularis vel subhypocraterimorpha, tubo sæpissime calycem conspicue excedente interdum longissimo, limbo 5-partito lacinii superioribus paulo magis approximatis subinæquali vellaciniis inferioribus magis minusve adscendentibus obliquo immo subsecundo. Stamina 4, corollæ tubo inserta, longe exserta subdidynama; antheræ supra basin insertæ, basi fissæ, biloculares, loculis parallelis rimâ longitudinali dehiscentibus. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis, ovulo in spermophoro angulo centrali adnato pendulo. Stylus filiformis, exsertus, stigmate bifido acuto. Drupa calyci ampliato insidens vel inelusa, baccata vel carnosa, quadri- vel sæpius abortu monodi-tripryrena, sæpius 2-4-loba, pyrenis maturitate distinctis unilocularibus, putamine lignoso lœvi. Semen solitarium erectum. Cotyledones oleosæ appliteæ, radicula brevis infera. — Genus Volkameriæ proximum et non nisi fructu diversum, ut vix jure distinguatur; tum *Ægiphilæ* valde affine, sed flore pentamero nunquam polygamо subirregulari distinctum, deinde et Amazoniæ propinquum. — Frutices vel arbores inter tropicos veteris orbis, imprimis vero Asiæ, copiose, in Americâ vero parce eresentes. Folia opposita vel terna, simplicia, integra vel rarius lobata, phyllopedio interdum prominenti persistenti incidentia. Cymæ trichotomæ vel axillares vel in panieulam terminalem colleetæ.

#### Sectio I. EULEODENDRON.

Corolla hypocraterimorpha, tubo calycem subæquante vel magis minusve excedente (pollice vix unquam longiore), limbo patente vel subsecundo.

§ 1. *Axilliflora*. — *Cymæ triflora* vel trichotomæ, axillares, folium subæquantes vel breviores; supremæ sæpius nude paniculatæ. *Folia oblonga*, lanceolata vel subrhombæa. *Corolla subhypocraterimorpha* vel *tubulosa*. *Calyx fructiger cupuliformis* paulo auctus.

1. C. CUBENSE, ramulis compressis cum petiolis verrucoso-asperis, novellis cum pedunculis parce strigillosis, foliis coriacies oppositis brevipetiolatis obovatæ vel obovato-ellipticis postice subangustatis obtusissimis integrerrimis utrinque glaberrimis et opacis subtus pallidis nervis venisque valde prominentibus reticulatis, cymis axillaribus pedunculatis folio brevioribus trichotomis nudis paucifloris, pedicellis strictis, calyce brevi campanulato truncato ore reflexo, corollæ tubo subcylindrico calyce sextuplo longiore. In insulâ Cubâ (Ramon de la Sagra!). Proxima C. Sagræi, diversa fol. figurâ et potissimum reti grosso, cymis et corollâ longiore. Folia adulta dura. Calyx sesquilineam longus, Corollæ tubus vix puberulus, 9 lin. longus; limbus 2 lin. æquans, lacinii subæquilibus oblongis obtusis. Genitalia longissime exserta. (v. s. in h. DC.)

2. *C. SAGRÆI*, ramulis compressis subverrucosis, novellis cum pedunculo substrigoso-hirtellis, foliis coriaceis oppositis brevipetioliatis obovato-oblongis ellipticis sub lanceolatis postice angustatis acuminatis integrerrimis margine subrevolutis supra nitidis subtus penninervosis utrinque glaberrimis, cymis axillaribus terminalibus longe pedunculatis folia æquantibus brevioribusve laxis nudis multifloris, floribus pedicellatis, calyce brevi cupuliformi truncato ore undulato brevissime 5-dentato, corollâ infundibulari-tubulosâ calyce quintuplo longiore. ♂ In insulâ Cubâ (Ramon de la Sagra!). Habitus potius *Ægiphila* quam *Clerodendri*, sed calyx et corolla pentameri. Ramuli helvoli. Folia 3-4-pollicaria, nervis subtus prominentibus, venis autem tenuibus immersis. Cymæ trichotomæ, ramis pedicellatis tenuibus flaccidis. Flores in specim. siccis nutantes. Calyx membranaceus ampliusculus sesquilineum altus, dentibus minimis reflexis. Corolla pubescens; limbus brevis 5-fidus, lacinias subæqualibus ovatis patulis. Stamina longe exserta. Pedicelli fructiferi erecti. Drupa obovoidea baccata tetra- vel abortu 3-1-pyrena, calyce pelviformi paulo aucto sustensa. (v. s. in h. DC.)
3. *C. GRANDIFLORUM*, glabrum, ramulis teretibus, foliis verticillatis oblongo-subobovatis brevissime petiolatis integrerrimis basi obtusis subcordatis apice acutis, cymis terminalibus longe pedunculatis folia æquantibus brevioribusve, laxis nudis multifloris, floribus pedicellatis, calyce brevi cupuliformi truncato ore undulato-brevissime 5-dentato, corollâ infundibuliformi-tubulosâ calyce sextuplo longiore. ♂ Patria ignota. Colitur in cald. Belgorum et Anglorum. *Ægiphila grandiflora* Hook. bot. mag. t. 4230. Folia quaternata, quinatare, 3-4-pollicaria, coriacea. Bracteolæ opposite. Flores erecti aut obliqui, flavi, pentameri. Corolla pubescens, limbo brevi 5-fido, lobis ovatis acutis patulis. Stamina longe exserta. Drupa obovoidea, apice compressa, cyanea, pyrenis 2 elongatis semicylindricis. Videtur a *C. Sagræi* differre tantum foliis basi subcordatis, corollâ paululum majore, et floribus erectis, si ex vivo ut ex secco erecti in *C. Sagræi*.
4. *C. TERNIFOLIUM* (Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 244), ramulis cymisque cum petiolis foliorumque costâ subtus puberulento-pubescentibus, foliis oppositis ternisque membranaceis brevipetioliatis oblongo-ellipticis acuminatis integrerrimis supra glaucedio subtili lenticidis subtus pallidis nitidis punctisque immersis conspersis, paniculâ terminali subfastigiatiæ, cymis axillaribus folio paulo longioribus his terve trifidis laxis, calyce tubuloso-subcampanulato semi-5-fido lacinias erecto-patulis, subulato-lanceolatis acutissimis, corollæ tubo calycem duplo excedente. ♂ Crescit in calidis juxta Novam Barcelonam et Angostarum Orinocensis (H. et B.) et in Antillis (h. DC!). Proximum *C. ligustrinum*, sed majus, foliis et calyce imprimis diversum. Rami phyllopodiis persistentibus valde prominentibus quasi aculeati. Folia novella interdum undique puberula; adulta 4-6 poll. longa, 1½-3 poll. lata, postice obtusa vel angustata. Bracteolæ minute. Calyx 3; lin. longus, glabriusculus, dense punctatus. Cor. tubus gracilis, glaber, resinoso-punctatus; limbus subæqualis, lacinias obovato-oblongis obtusis 2 liu. longis. Genitalia longissime exserta, ascendentia. (v. s. in h. DC.)
5. *C. MOLLE* (Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 244), ramis glabris verrucosis phyllopodiis residuis quasi aculeatis, foliis ternis ovato-ellipticis obtusiusculis basi angustatis integrerrimis reticulato-venosis supra glabris viridibus subtus molliter canescenti-pubescentibus, cymis pedunculatis folium excedentibus 7-9-floris pubescentibus axillaribus terminalibusque, calyce campanulato pubescente 5-fido lacinias ovatis acutis patentibus, corollæ tubo subpollicari. ♂ In inundatis pr. Quayaquil Quitensis. Arbuscula orgyalis et altior. Folia 1½-2-pollicaria, petiolis 4 lin. longis. Flores suaveolentes. Bracteæ linearces pubescentes. Corolla rubescens, tubo cylindraceo, limbo 5-fido lacinias oblongis. Stamina longissime exserta, secunda. Drupa baccata, globosa, sulcata, 4-pyrena.

6. *C. LIGISTRINUM* (R. Br.! in Ait. hort. kew. ed. 2 v. 4 p. 61), ramulis novellis cum cymis hirtello-pubescentibus, adultis foliisque glabris, foliis oppositis brevipetiolatis lanceolatis utrinque acutis integrerrimis supra nitidis subtus opacis et dense punctatis, panieula terminali eorymbosâ, cymis axillaribus folium subæquantibus multifloris laxis, calyce campanulato semi-5-fido lacinias patentissimis ovatis cuspidatis, corollæ tubo calycem duplo excedente. ♂ In Mexico c. gr. ad Tampico de Tamaulipas (Berland.! n. 181). Volkameria ligustrina Jacq. coll. suppl. p. 118 t. 5 f. 1. V. inermis β. Ait. hort. kew. ed. 1 vol. 2 p. 364. Frutex ramosissimus. Folia phyllopedio prominulo post folii lapsum dentiformi inserta, 1-4-pollicaria. Bracteolæ minute linearisubulate. Tubus corollæ albæ glabré dense resinoso-punctatæ 5 lineas longus sursum paulatim ampliatus; limbi laciniae obovatae obtuse. Geuitalia longe exserta. (v. v. c. et s. spout. in h. DC.)
7. *C. INERME* (R. Br.! in Ait. hort. kew. ed. 2 v. 4 p. 65), ramulis virgatis, novellis cum cymis adpresso pubescentibus, adultis foliisque glabris, foliis ovalibus vel ellipticis in petiolum brevem attenuatis brevissime acuminatis apico obtuso integrerrimis opacis subtus pallidis, cymis axillaribus folium æquantibus trifloris in paniculam eorymbosam terminalem collectis, calyce campanulato 5-dentato dentibus lato-triangularibus acutis, tubo corollæ glabro filiformi elongato. ♂ In Indiâ orientali (Wall.! cat. n. 1788) ejusque insulis c. g. Javâ (Jungg.), Timor (Mus. par.!), ins. Mariannis (Gaud.!) et Philippinis (Cham.). Volkameria inermis Linn. fl. zeyl. p. 231, Jacq. coll. suppl. p. 117 t. 4 f. 1. Rumph. herb. amb. 5 p. 86 t. 46. Rheed. hort. mal. 5 p. 97 t. 49. Pluk. alm. p. 287 t. 211 f. 4. C. buxifolium Spreng. syst. veg. 2 p. 758, Walp. repert. 4 p. 112, Volkam. buxifolia h. Willd. n. 11681. Frutex elatus ramis elongatis, cortice helvolo. Folia subbipanicaria. Flores suaveolentes. Calyx 2 lin. longus. Corolla albæ tubus 1-1<sup>1</sup>/2 poll. longus, limbi laciniae obovatae. Genit. longissime exserta. Drupa calyci nervoso cupuliformi insidens, obovata, majuscula, carne spongiosa. (v. s. c. et s. sp. in h. DC.)
8. *C. NERIIFOLIUM* (Wall.! cat. n. 1789), ramulis novellis cymisque strigoso-puberulis adultis foliisque glabris, foliis coriacis oppositis ternisque brevipetiolatis lanceolatis oblongis vel subellipticis utrinque acuminatis et acutis integrerrimis margine revolutis supra lucidis subtus pallidis opacis, cymis axillaribus trifloris folio duplo brevioribus, calyce obconico campanulato limbo patulo breviter et acute 5-dentato, corollæ tubo elongato filiformi. ♂ In Indiâ orientali, e. g. pr. Tavoy et Tenasserim (Wall.!). Volkameria nerifolia Roxb. fl. ind. cd. 1832 v. 3 p. 64. Affine *C. heterophyllum* et *inermi*, ab utroque vero foliis et flore faciliis distincta. Pbylopodia prominentia. Folia subtripanicaria, 6-12 lin. lata. Cor. tubus pollicaris, limbi laciniae obovatae obtusæ. Genit. longe exserta. Drupa calyci cupuliformi duro insidens magna, nucis moschata immo Juglandis fere mole, 4-sulcata, lœvis, carne spongiosa. (v. s. in h. DC. ab. ill. ectu mercat. Ind. orient. comm.)
9. *C. HETEROPHYLLUM* (R. Br.! in Ait. hort. kew. ed. 2 v. 4 p. 64), ramulis novellis cymisque puberulis, adultis foliisque glabris, foliis oppositis ternisque brevipetiolatis subellipticis lanceolatis immo lineari-lanceolatis utrinque acuminatis apice obtusiusculo integrerrimis opacis subtus pallidis, cymis axillaribus bis trifloris patentibus folium subæquantibus in paniculam eorymbosam terminalem collectis, calyce cyathimorpho 5-denticulato subtrunato, corollæ infundibulari calycem subtriplo excedente. ♂ In ins. Borbonie et Mauritii (Martin ! Lahaye ! Mus. par. ! Sieb. ! fl. maurit. 2 n. 158 fol. latior. et n. 311 fol. angust.) — Wall. cat. n. 1790. Volkam. heterophylla Poir. enc. meth. 8 p. 687. V. angustifolia Andr. bot. rep. t. 554. *C. angustifolium* Spreng. syst. veg. 2 p. 758. Habitu *C. ligustrina* non dissimile sed omni notâ distinctissimum. Folia 2-3-pollicaria, sœpius angustissima, interdum vero pollicem ferc lata. Cor. alba, tubo 4 poll. longo, limbi lacinias ovalibus tubum longit. subæquantibus. Genit. longe exserta. Drupa bacea, cerasi minoris fere mole, calyce cupuliformi subscarioso subtensa. (v. v. c. et s. silv. in h. DC.)

10. *C. EMIRNENSE* (Bojer! in Hook. bot. mag. 1829 t. 2925), ramulis novellis pedunculisque hirsutis cule pubescentibus, foliis subcoriaceis oppositis ternisque ovato- vel obovato-ellipticis in petiolum brevem subacuminatis vel attenuatis obtusis acutis vel abrupte acuminatis integerimis vel antice paucidentatis adultis glabris opacis subtus pallidis, cymis multifloris in paniculam terminalem dense corymbosam collectis inferioribus axillaribus folioque brevioribus, calyce vix puberulo brevi campanulato acuminato 5-dentato cum tubo corollæ infundibularis ipso quater longiore glanduloso-punctato. ♂ In ins. Madagascar prov. Emirnensi circa urbem Tananarivou, locis montosis (Bojer!). *C. floribundum* hort. angl.! fide spec. (1), non Brown. Habitu *C. inermi* non dissimilis, ab eo et proximi præter foliorum figuram calyce et cor. glandulosâ facilis distinctu. Frutex ramosissimus, 10-20-pedalis. Folia  $\frac{5}{4}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa. Corolla carnea mox alba, tubo semipollucari, limbi laciniis ovatis. Genitalia longe exserta. Drupa baccata, calyce paullo dilatato insidens, globosa, lutescens. (v. s. sp. et c. in h. DC.)
11. *C. GLABRUM* (E. Meyer! comment. pl. afr. austr. 1 p. 273), ramulis glabriusculis et cum cymis punctis resinosis conspersis, foliis subcoriaceis oppositis ternis ovatis in petiolum brevem attenuatis obtuse acuminatis integerimis glaberrimis nitidis junioribus subtus dense glanduloso-punctatis, cymis multifloris contractis in paniculam angustum collectis inferioribus axillaribus folioque brevioribus, calyce campanulato 5-fido dentibus acuminatis subrevolutis, corollæ tubo glabro calyce duplo triplo longiore. ♂ In Capite Bonæ-Spei ad fl. Basche in dumetis infra alt. 1000 ped. et ad fl. Key infra alt. 500 ped. (Drège!). C. Capense Eckl. et Zeyh.! herb. fl. cap. Folia  $1\frac{1}{2}$ -3-pollicaria, subtus pallidiora. Bracteolæ linearis-subulatae, cum calyce pube sparsâ afflate. Corollæ tubus 3 lin. longus; limbi laciniæ obovatæ acuminatæ. Genitalia longe exserta. Drupa abortu sæpius monopyrena, calyce ampliato sustensa. (v. s. in h. DC.)
12. *C. PUTRE*, volubile, raminis pedunculisque lanuginosis, ramis phyllopodiis residuis quasi aculeatis, foliis oppositis ternis chartaceis ovatis basi rotundatis subacuminatis petiolatis breviter et abrupte acuminatis integerimis subrepandis supra nitidis demumque glabratris subtus pallidis reti pubescente, cymis multifloris patentibus paniculam elongatam anguste pyramidatam struentibus infer. axillaribus folioque brevioribus, calyce campanulato glabriusculo 5-fido dentibus ovatis acutis, corollæ tubo glabro calycem subæquante. ♂ In lateribus montium editorum Madagascarie prov. Emirnensis (Bojer!) « Planta foetidissima ». Folia 2-3-pollicaria, petiolo subpollicari. Calyx 2 lin. longus, flavo-vires, glandulis crebris subcutaneis. Corolla albido-virescens. Stylus longius stamina vero brevissime exserta. Drupa (fide Boj.) sæpissime dipyrena. (v. s. in h. DC.)
13. *C. HIRCINUM*, volubile, ramulis cymisque hirtello-lanuginosis, ramis phyllopodiis residuis quasi aculeatis, foliis oppositis chartaceis ovatis brevissime petiolatis obtuse acuminatis integerimis supra subtusque in reti sparse hirtellis line pallidis nitidis reticulato-venosis, cymis laxifloris patentibus paniculam subpyramidatam struentibus inferioribus axillaribus folium paulo excedentibus, calyce subhypocraterimorpho-campanulato limbo patente 5-fido lobis ovatis acutis, corollæ glanduloso-pubescentis tubo calycem dimidio excedente. ♂ In apricis montosis et ad versuras agrorum prov. Emirnensis Madagascar (Bojer!). Affinis et similis *C. putri*, sed pube, calyce et corollæ valde distincta. « Planta odore gravissimo præpollens. » Folia in nostro bipollicaria, complicata. Calyx in limbum conspicue dilatatus, 2 lin. longus. Cor. infundibularis, 4 lin. longa. Genitalia exserta. (v. s. in h. DC.)
14. *C. VOLUBLE*, (Pal.-Beauv.! flor. Ow. et Ben. 1 p. 52 t. 32), caule volubili, ramulis pedunculisque pubescentibus, foliis membranaceis, oblongis

(1) Verisimiliter *C. floribundum* Lindl. bot. reg. in adnot. ad t. 1035. Phrasis non quadrat, sed nomeu et origo similia. (Alph. DC.)

in petiolum longiusculum attenuatis abrupte acuminatis integerrimis vel superne angulato-paucidentatis glabris, cymis pedunculis pedicellisque filiformibus laxis paniculam terminalem corymbosam laxam struentibus, calyce glabriusculo campanulato-acetabuliformi 5-lobo lobis rotundatis acumiulatis, tubo corollæ infundibularis glabro calyoem duplo superante, limbo brevi. ♂ In Africæ occid. regno Owariensi (P. B.). Folia 3-6-pollicaria, petiolo pollicari-sesquipollioari. Calyois limbus patens. Cor. rosea, 4 lin. longa, limbo parvo reflexo. Genitalia longissime exserta. (v. s. sp. unio. idque auth. in h. DC.)

15. *C. SCANDENS* (P. Beauv. l. c. 2 p. 6 t. 62), caule volubili quadrangulari glaberrimo striato, foliis coriacis petiolatis glaberrimis ovalibus integerrimis acutis basi ovatis supra utridis subtus lutescentibus, paniculâ terminali pauciflorâ, calyois pubescens lacinii subulatis. ♂ In Africæ occid. regno Owariensi. *C. umbellatum* Poir. dict. 5 p. 166. Caulis ramique purpurascentes. Folia tripollicaria, pollicem lata. Cor. albida, ad faucem rubens, tubo pollice longiore graqoil, lacinii limbi majusculis ellipticis acutis. Staminæ corollæ duplo longiora.
16. *C. SPLENDENS* (G. Don in James. Edinb. phil. journ p. 11. 349), glabrum, ramis subteretibus, foliis brevipetiolatis oblongis acuminatis basi subcordatis margine repando-undulatis, paniculâ terminali corymbosâ, calyce parvo acute 5-dentato, corollâ subinfundibulari-hypocrateriformâ tubo 9 lin. æquante. ♂ In Africæ occid. mont. Sierra-Leone. — Lindl. bot. reg. new ser. v. 15 t. 7, Paxton mag. of bot. 9 p. 103. cum ic. Lemaire hortic. univ. 5 p. 159 et troisième année p. 325 cum ic. Frutex scandens. Folia 3 poll. et ultra longa, 2 poll. lata, petiolo semipolliculari. Bractæ parvæ linearisubulatae. Corolla pulcherrime coccinea, lacinii limbi subæqualibus lato-ovalibus obtusoullis. Filamenta virienta longe exserta.
17. *C. ACUMINATUM* (Wall.! cat. n. 1792), ramulis novellis pedunculisque subtiliter puberulis, adultis foliisque glabratibus, foliis membranaceis longiusculæ petiolatis ovato-ellipticis oblongis basi rotundatis acuminatis in acumen longum tenue attenuatis integerrimis supra nitidulis subtus pallidis opacis, cymis ramis pedioellisque longis tenuibusque laxis paniculam amplissimam laxissimam struentibus infer. axillaribus folium sequantibus excedentibusve, calyce glabro patentissimo acutissime 5-partito, corollæ tubo glabro filiformi calyce triplo longiore. ♂ In Indie or. penisula Malaccensi, circa Sincapoe (Wall.! Ad. Delessert! Griff.). Species habitu ex foliis membranaceis paniculâque ampliæ pedunculis pedicellisque filiformibus, tum calyce singularis. Folia 3-4-pollicaria, petiolo pollicari. Cal. lacinia lanceolato-subulata peracutæ. Cor. tubus semipollicularis. Drupa baccata, globosa, cerasi, fere magn., calyce paulo aucto reflexo sustensa. (v. s. in h. DC.)
18. *C. ERIOSIPHON*, -ramulis obtuse tetragonis cum paniculâ petiolisque subtiliter hirtellis, foliis membranaceis petiolatis oblongis vel oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis integerrimis supra nitidulis scabriusculis subtus pallidis opacis et glabratibus nervis pubescens, cymis ramis pedicellisque longis tenuibusque laxis paniculam amplam laxissimam struentibus inferioribus axillaribus folium excedentibus, calyce patentissimo 5-partito lacinii subulato-lanceolatis peracutis, corollæ tube villosa filiformi calyce triplo longiore. ♂ In insulâ Javâ (Zollinger! pl. jav. exs. n. 1968). Proximum *C. acuminato*, induimento, calyce et corollâ majoribus, tubo cor. villosa diversum. Folia 3-4-pollicaria, petiolo pollicari. Panicula colorata, bracteis superioribus parvis bracteolisque minimis caducis nuda. Calyx 3½ lin. longus. Corollæ limbus trientem tubi adæquans, subinæqualis patentissimus, lacinii oblongis obtusis (v. s. in h. DC.)
19. *C. TOMENTOSUM* (R. Br. prodr. fl. nov.-holl. p. 510), ramulis cum cymis foliorumque dorso pube appressâ canescens, foliis subcoriacis petiolatis ovato-ellipticis utriusque breviter acuminatis acutis integerrimis supra

nitidulis puberulis glabrescentibus, cymis multifloris in panicula terminali eorymbosam congestis inferioribus axillaribus folioque brevioribus, calyce ampliusculo obconico-cyathimorpho acute 5-fido, tubo corollæ gracili superne infundibulari calyce triplo-quadruplo longiore. ♂ In Novâ-Hollandiâ orientali, circa Port-Jackson et in tropicis (R. Br., Sieber! fl. nov.-holl. n. 267, Fraser!). Volkameria tomentosa Vent. jard. de malm, 84. Folia 3-6-pollicaria, petiolo 6-12 lin. longo. Bracteolæ linearis-subulatae, caducæ. Calyx 3 lin. longus. Cor. limbus dorso pubescens, lacinii ovalibus acutis; tubus glaber. Genit. longe exserta. (v. s. in b. DC.)

20. C. PHLOMOIDES (Linn. suppl. p. 292), ramulis teretiusculis petiolis pedunculis que incano-tomentellis, foliis membranaceis oppositis petiolatis ovatis vel ovato-rhombeis acuminatis obtusiusculis utrinque integerrimiis in medio irregulariter obtuse serratis supra glabriusculis opacis subtus puberulis, paniculâ terminali ampliâ subfastigiata inferne foliosa, cymis trichotomis laxis, bracteolis oblongis, calyce glabriusculo campanulato amplio patente semi-5-fido lacinii subovatis acutissimis, tubo cor. subglandulosu calycem subtriplo excedente. ♂ In Indiâ orientali (Wall. cat. n. 1787, Leschen.! Perott.! Edgew.!). Volkameria multiflora Burm. fl. ind. p. 157 t. 45 f. 1. Rami graciles, patentissimi. Folia 1-3-pollicaria, petiolo laminam semiequante. Calyx membranaceus, 4-5 lineas longus. Cor. albae tubus subinfundibularis, gracilis, subpollicaris; limbi laciniae obtusæ, subsecundæ, staminibus exsertis duplo breviores. (v. v. o. et s. sp. in b. DC.)

21. C. CALAMITOSUM (Linn. mant. 1 p. 90), ramulis obsolete tetragonis petiolis pedunculisque pube hirtellâ subcanescensibus, foliis membranaceis oppositis ellipticis in petiolum acuminatis vel attenuatis obtusis acuminatisve a medio grosse et inæqualiter serrato-dentatis adultis utrinque præter nervos glabriusculis opacis, paniculâ terminali subfastigiata brachiatâ inferne foliosâ, cymis semel bisve trifidis folium subæquantibus brevioribus, calyce puberulo 5-partite patente lacinias linearibus acutis, corollæ tubo puberulo calycem quadruplo excedente. ♂ In Javâ (Blume! Jungh.! Lahaye! Ad. Deless.! Zoll.! pl. jav. cxs. n. 731). Volkameria alternifolia Burm. fl. ind. p. 137 t. 44. Affine C. phlomoidi, sed foliis et calyce insigne. Rami stricti, dense foliosi. Folia 2-3-pollicaria, interdum subalterna, dentibus nunc obtusis nunc vero acutis. Bracteolæ infima parvæ, lanceolatae seu oblongæ, petiolatae, superiores minuta subulatae. Calyx 3 lin. longus. Cor. albae tubus pollicaris, subinfundibularis; limbi laciniae subsecundæ, oblongæ, obtusæ, staminibus exsertis subduplo brevioribus. Calyx fructiger auctus, stellato-patentissimus. (v. v. o. et s. sp. in h. DC. et Nees.)

§ 2. Penduliflora. — *Panicula terminalis, nuda, laxa, racemiformis, nutans. Folia oblonga vel lanceolata. Corollæ limbus secundus. Calyx fructiger valde auctus.*

22. C. NUTANS (Wall. cat. n. 1793), glabrum, ramulis acute quadrangularibus, foliis oppositis ternis membranaceis oblongo-lanceolatis basi longo attenuatis subsecundibus longa acuminatis integerrimiis supra nitidis subtus pallidioribus, paniculâ terminali nudâ laxissimâ oblongo-subracemiformi nutante, cymis brevipedunculatis subtrifloris, calyce ventricoso 5-angulari semi-5-fido lacinii ovalibus acutiusculis patentissimis, corollæ tubo infundibulari calycem dimidio excedente. ♂ In Indiâ orientali, e. g. Bengalâ, Silbet (Wall.! Leschen.!) — Wall. in bot. mag. t. 3049! Raini elongati. Folia 3-7-pollicaria, penninervosa. Bracteolæ minutæ, caducæ. Flores albi, majusculi. Calyx purpureo-fucatus, 4 lin. longus; fructifer auctus, stellato-patentissimus drupam baccatam atram longitudine subæquans. Cor. extus subtilissime farinacea, tubo cylindrico superne ampliato, lacinii limbi obovatis subsecundis reflexis tubum subæquantibus. Stamina longe exserta ascendentia. (v. s. in h. DC.)

23. *C. JACKIANUM* (Wall. cat. n. 1794), ramulis cum foliis novellis ramisque paniculæ puberulis, foliis oppositis membranaccis lanceolatis in petiolum longum acutatis attenuato-acuminatis integerrimis utrinque glaucescentibus subbus pallidioribus, paniculâ terminali laxissimâ brachiata nudâ subuuante cymis pedunculatis pedunculis ramisque gracillimis, calyce subpatellari semi-5-fido laciniis ovatis obtusis, corollæ tubo gracili calycem quadruplo excedente. ♂ In Indiâ orientali, Penang (Wall.) — Hook. bot. misc. 1 p. 284. C. nutans Jack in mal. misc. 1 p. 17. Affine C. nutans magisque etiam C. penduliflora, ab utrâque calyce et foliis nec non paniculâ (in nostro saltu) vix nutante, in illis pendulâ, diversam. (v. s. spec. imperf. in h. DC.)
24. *C. PENDULIFLORUM* (Wall. cat. n. 1795), ramulis acute quadrangularibus farinaceo-puberulis, foliis oppositis ternisve membranaceis oblongo-lanceolatis in petiolum longum longe attenuatis longe acuminatis crenulato-subrepandis vel integerrimis glaberrimis supra nitidulis subtus glaucescentibus, paniculâ terminali nudâ laxissimâ oblongo-subracemiformi nutante, cymis brevipedunculatis subtrifloris, calyce subpatellari semi-5-fido laciniis lanceolatis acutis patentissimis deinceps reflexis, corollæ tubo gracili calycem duplo excedente. ♂ In Indiâ orient., ad Tavoy (Wall.). Proximum C. nutanti, sed foliis calyceque distinctissimum. Petioli subbiplicares. Calyx 2½ lin. longus. Cor. subtilissime glanduloso-pulverulenta, tubo 5 lin. longo, limbi laciniis obovatis secundis tubum subæquantibus. (v. s. in h. DC.)

§ 3. *Racemiflora*. — *Panicula terminalis racemiformis, erecta, bracteis bracteolisque foliacies interstincta. Folia oblonga serrata. Corolla limbus secundus, tubus brevis. Calyx fructiger cupuliformis, paulo auctus.*

25. *C. SERRATUM* (Spreng. syst. veg. 2 p. 758), ramulis quadrangularibus sulcatis folisque glabris, foliis oppositis ternisve chartaceis brevissime petiolatis obovato-oblongis immo lanceolatis basi cuncato-attenuatis et integerrimis acuminatis remote mucronato-serrato-dentatis supra nitidulis subtus pallidioribus, paniculâ terminali racemiformi omnino pube farinacea canescens, bracteis bracteolisque inferioribus foliacies membranaceis pallidis acuminatis, illis ovatis subrotundisve his lanceolatis, cymis bis-terve trifidis laxis, calyce cyathimorpho subtruncato brevissime 5-dentato, corolla tubo cylindrico calycem duplo excedente. ♂ In Indiâ orientali, Silhet (Wall. cat. n. 1810), Nepaliâ (Wall. I. c. Edgew.!), Assam (Griff.!), in mont. Nilgiricis (Leschen.!), in Javâ (Blume!, Jungh.! Ad. Deless.! Zoll. pl. jav. exs. n. 80) — Wall. cat. n. 1809. Hamilt. in trans. linn. soc. 17 p. 187. Volkam. serrata Linn. maut. 1 p. 90. Volk. farinosa Roxb. fl. ind. 3 p. 64. C. farinosum Wall. cat. n. 1810. C. ternifolium D. Don, prodr. fl. nep. 103 (cx descr.). C. Javanicum Walp. repert. 4 p. 113 (fide sp. autb. h. Lucæ). C. macrophyllum hort. quor.! C. farinosum Wall. I. c. et C. serratum Wall. I. c. omnino non differrunt nisi calyce in illo truncato minute denticulato, in hoc paulo magis inciso dentibus latè-ovatis acuminatis tamen brevissimis: notâ levissimâ! Specimina javanica, quæ copiosa videbam, cæterum ad C. farinosum pertinerent, Nepalenses ad C. serratum. Ramuli subberbacci. Folia 6-12 poll. longa, 2-5 poll. lata, petiolo brevissimo quiu subnullo. Bracteæ nunc majores, nunc minoros. Panicula angusta, nunc cymis brevius pedunculatis angustior, nunc patentibus laxior, subinterrupte racemiformis. Calyx 2 lin. longus, pubescens vel subglabrus, membranaceus. Cor. laciniæ obovataæ, e tubo brevi adscendentis-cundæ, inæquales, supremæ tubo paulo longiores. Stamina longe exserta, adscendentia. Drupa calyce paulo aucto subtensa, baccata, bis didyma, 4-vel abortu 3-2-1-pyrena. (v. v. c. et s. silv. in h. DC., Lucæ et Nees).

§ 4. *Densiflora*. — *Panicula terminalis compacta. Folia plurimque cordata, cum ramulis vestita. Corolla subinfundibulari-*

*hypocraterimorpha, limbo inæquali sæpius subsecundo. Calyx  
fructiger auctus.*

26. C. DEFLEXUM (Wall.! pl. as. rar. 3 p. 10 t. 215), ramulis obtuse tetragonis cum paniculâ petiolis nervisque foliorum dense pubescenti-hirtellis, foliis membranaceis oppositis oblongis longe petiolatis cuspidatis basi rotundatis vel acuminatis integrerrimis supra glabris nitidis subbus pallidis et pubescensibus, paniculâ terminali compactâ minute bracteolatâ multiflorâ, calyce puberulo profunde 5-fido patulo laciniis lanceolatis acutissimis, tubo corolle tenui calycem subtriplu longiore. ♂ In Indiâ orientali, Pulo-Pinang (Wall.! cat. n. 1808), Malacca (Griff.). Folia 8-9 poll. longa, petiole 2-3-pollicari, laminâ penninervia grosse venosâ. Panicula colorata, bracteis lanceolatis pedunculos cymarum infer. æquantibus, bracteolis subulatis. Calyx 2½ lin. longus. Cor. farinaceo-subglandulosa, limbi laciniis linearis-oblongis subinæqualibus tubo dimidio brevioribus. Stam. longe exserta, deflexa. Calyx fructiger auctus, stellato-patentissimus. (v. s. in h. DC. et Mart.)
27. C. BRACTEATUM (Wall.! cat. n. 1800), ramulis obsolete tetragonis cum paniculæ ramis petiolisque tomento lanuginoso incanis, foliis longe petiolatis ovato-oblongis utrinque acuminatis integrerrimis supra strigoso-hirtellis subbus villo molli canescensibus et glanduloso-punctatis, paniculâ terminali subfastigiata compactâ, cymis axillaribus folio brevioribus capitatis, bracteis foliaceis calyces subæquantibus lanceolatis, calyce membranaceo pubescente et glanduloso-punctato amplissimo 5-angulari semi-5-fido laciniis patentibus ovatis tenuiter acuminatis, corollæ tubo gracili calycem duplo excedente. ♂ In Indiâ orientali, ad Pundua (Wall.!). Proximum C. canescens, foliorum figurâ, induimento, punctis glandulosis crebris, calyce majore distinctum. Folia majora semipedalia. Calyx brevissime pedicellatus, laciniis inferne subreplicato-continguis, corolliger semipollicaris. Cor. pubescenti-pilosa simulque punctata, limbo subæquali patente tubo quater breve, laciniis linearis-oblongis obtusis. (v. s. in h. DC. spec. pess.)
28. C. CANESCENS (Wall.! cat. n. 1804), ramulis obsolete tetragonis cum paniculæ ramis petiolisque tomento subvilloso canescensibus, foliis longe petiolatis sinu levî ovato-subcordatis acuminatis integrerrimis vel mucronato-paucidentatis supra puberulis et in paginâ glabrescentibus nitidulisque subtus in reti præcipue villosis impunctatis, paniculâ terminali subfastigiata coarctatâ, bracteolis foliaceis calyces subæquantibus oblongis acutis, calyce membranaceo pubescente amplio superne 5-angulari 5-fido laciniis patentibus contiguis ovatis tenuiter acuminatis, corollæ tubo gracili calycem duplo excedente. ♂ In Chinâ (Reeves, Wall.! l. c.). Species habitu et paniculâ compactâ C. fragrantii similis, sed foliis, imprimis vero bracteis calyce et corollâ diversa. A C. viscosa scilicet C. infortunato, cui adducunt cl. Hook. et Arn. (Beechey voy. bot. p. 205) jam differt paniculâ densâ, ceteroquin toto cœlo. Folia membr. 3-6 poll. long., petiolo laminæ subæquali. Cymæ axillares, folium subæquantes. Calyx latus, laciniis latius replicato-contiguis superne angulatis, brevipedicellatus, 4 lin. longus, impunctatus. Corolla glanduloso-pubescentia, limbi laciniis obovato-oblongis 2½ lin. longis. Drupa baccata, calyce aucto duplo longiore velata. (v. s. in h. DC.)
29. C. SINUATUM (Hook. bot. mag. t. 4255), undique pubescens, ramis obtuse tetragonis copiosis gracilibus, foliis petiolatis ovatis vel ovato-oblongis basi subcordata acuminatis sinuatis angustatissive, paniculâ terminali compactâ, calyce basi bibracteolato pubescente anguste cylindrico semi-5-fido laciniis subulatis patentibus, corollæ hypocraterimorphæ tubo gracili calycem triplo excedente. ♂ In Africâ occid. Sierra Leone. Folia haud serrata sed leviter sinuata vel angulata, penninervia. Panicula capitata ampla; flores breviter pedicellati; corolla pure alba, laciniis ovalibus. Stamina longissime exserta. Stylus stamina æquans; stigma bifidum. Proximum certo C. capitato (n. 66), sin modo diversum.

30. *C. FRAGRANS* (Vent.! jard. de malm. t. 70), ramulis obtuse tetragonis sub-tomentoso-pubescentibus, foliis longe petiolatis subcordato late ovatis-subrotundis breviacuminatis irregulariter repando-dentatis supra hirtellis subtus in reti præcipue pubescentibus et glandulis raris citra petioli insertionem vero crebrioribus conspersis, paniculâ terminali subsessili compactâ multiflorâ, bracteolis lanceolatis calyces excedentibus et oum iis dorso glandulis pelviformibus raris consitis, calyce tenuiter puberulo angusto 5-fido lacinii subulato-lanceolatis reflexis, corollæ tubo glabro calyce duplo longiore. ♂ In Chinâ, unde forma primitiva simpliciflora nupcr in hortos nostros introducta est. Bracteolæ subpollicares angustæ utrinque attenuatae pubescentes, marginibus reflexis, dorso glandulis conspicuis nectariferis (in calycis superiori parte etiam obviis) prædicto. Caiyx obconico-tubulosus basi attenuatus, fere semi-5-fidns, semipollicularis, laciiniis perangustis. Cor. vivide rosea, fragrans, limbi tubum fere semiæquantis reflexi lobis subæqualibus obovatis. Staruinâ limbum paulo superantia. Stylus longissime exsertus. (v. v. c.)

*β. pleniflora*, floribus plenis.—Vent.! l. c., Bot. mag. t. 1834, Bot. reg. nov. ser. 2 t. 41. Volkmannia Japonica Jacq.! hort. schoenbr. t. 338. Agricolæ fragrans Schrank regensb. denkschr. 1808 p. 98. Colitur in hortis ornamentariis Chinæ (Staunton! Wall.! cat. n. 1805) et nunc fere totius orbis; radice pullulante facile propagatur et (vix dubie hortorum aufuga) nunc in Americâ æquinoctiali varis locis obvenit, e. g. in Guianâ (Rob. Schomb.!) et in Brasiliâ circa Bahiam (Salzm.! pl. bras. exs.); e Martinicâ horto attulit Sieber! h. Mart. n. 160. (v. v. c. et s. in h. DC.)

31. *C. CUMINGIANUM*, ramulis tetragonis cum paniculâ petiolis reticulatis foliorum strigoso-villosis, foliis membranaceis petiolatis subcordato-ovatis acuminatis integerrimis vel irregulariter dentatis supra strigoso-hirtellis subtus molliter villosus subter pube glanduloso-punctatis, paniculâ terminali subfastigiata multiflorâ compactâ minute bracteolatâ, calyce oblongo-tubuloso 5-fido laci-niis acutissimis, corollæ infundibularis tubo piloso-subvillosa calyccem duplo excedente. ♂ In insulis Philippinis (Cuming! pl. exs. n. 1761). Ex affinitateo *C. infortunati*. Panicula compactâ, calyce longo, corollâ valde insignis. Folia (superiora), 4-6 poll. longa, basi 3-4 poll. lata, petiolo 1-1½-polliculari. Calyx sperno coloratus, 5 lin. longus. Cor. limbus tubo quadruplo, staminibus duplo brevior. (v. s. in h. reg. berol. et cl. Lucæ.)

32. *C. MACROSTEGIUM*, ramulis tetragonis cum paniculæ ramis petiolisque reticulatis foliorum strigoso-tomentosis, foliis petiolatis lato-ovatis basi subcordata vel truncata vel rotundata acuminatis integerrimis supra strigoso-puberulnis nitidulis subtus pallidis pubescentibus subtiliter et dense glanduloso-punctatis, paniculâ terminali compactâ bracteolis bracteolatisque magnis longe acuminatis coloratis corollas subæquantibus obvallata, calyce sericeo tubuloso semi-5-fido laciiniis subulato-lanceolatis cuspidatis, corollæ sericeo-subvillosa tubo gracili calyccem duplo excedente. ♂ In insulis Philippinis (Cuming! pl. pbil. exs. n. 1541). Species omni notâ per insignis. Folia membranacea ampla, in nostris laminâ 9 poll. circ. longâ 6 poll. basi latâ, petiolo 2-2½-polliculari. Bracteæ et bracteolæ extima maximæ lato-ovatae subsessiles, superiores oblongæ vel lanceolatae. Calyx 8 lin. longus, superne patulus, 5-nervius. Cor. limbus subæqualiter patens, laciiniis oblongis obtusis 3 lineas metentibus. (v. s. in h. reg. berol. et cl. Lucæ.)

§ 5. *Paniculata*. — *Panicula terminalis brachiata*, patens, ampla, cymis trichotomis laxis. Folia plerumque cordata cum ramulis vestita. Corolla hypocraterimorpha, limbo inæquali subsecundo. Calyx fructiger auctus.

33. *C. FALLAX* (Lindl. in bot. reg. nov. scr. 1844 t. 19), ramulis tetragonis cum cymis petiolisque pube brevi subtomentosâ subcanescensibus, foliis longe petiolatis subrotundo-cordatis breviacuminatis obtuse repando-dentatis vel sub-

integerrimis supra strigoso-hirtellis subtus pubescentibus; paniculæ terminali pateuti amplâ, cymis corymbosis bracteolis parvis caducis, calyce campanulato patulo esquamato 5-fido laciñiis lanceolatis tenuiter acuminatis, corollâ extus glanduloso-pulverulentâ tubo cylindrico calycem quadruplo excedente. ♂ In montosis Javae (Junghuhn!). C. speciosissimum Paxton mag. of bot. 3 p. 217 et 271 (cum ic., fide Walp.). C. infortunato affinis, sed foliis calyco et corolla distinctissima. Folia ampla, subtus squamulâ unâ alterâ eonspersa. Calyx cum pedioello purpure coloratus. Corolla magna, speciosa, punicea, tubo pollicari; limbi laciñiis obovatis planis; tubi longitudine æquantibus. Genitalia longissime exserta. (v. s. sp. in h. Nees et s. c. in h. Lucas berol.)

34. C. INFORTUNATUM (Linn. fl. zeyl. p. 232), ramulis tetragonis ramisque paniculæ cum petiolis nervis foliorum villo strigoso tomentosis et canescensibus, foliis longe petiolatis subrotundo- vel ovato-cordatis aut superioribus ovatis vix cordatis immo basi subacutis acuminatis integerrimis aut breviter acuminato-dentatis in utrâque paginâ strigoso-hirtellis, paniculæ terminali pateuti amplâ subnudâ, cymis laxifloris bracteolis caducis, calyce strigoso-pubescente 5-nervi amplo patente squamato-glanduloso 5-partito laciñiis lanceolatis tenuiter acuminatis, corollâ strigoso-villosâ et glanduloso-punctatâ tubo calycem triente excedente limbi laciñiis subunguiculatis subsecundis tubo triente brevioribus. ♂ In Indiâ orientali e. gr. in prov. Madras, Courtallam, Penang, Audih, etc. (Wall. cat. n. 1796, Edgew. cat. n. 276), in Ceylonâ (Burm., in h. DC! ex h. Royen, Leschen.)—Lindl. bot. reg. 1844 t. 19° Burm. fl. zeyl. p. 66 t. 29. Volkameria infortunata Roxb. fl. ind. ed. 1832 v. 3 p. 59. C. viscosum Vent.! jard. de malm. t. 25. Petasites agrestis Kumpf amb. 4 p. 180 t. 49. Planta nostra in descr. Linnaei l. o. exacte quadrat, ceterum fol. figurâ et margine nec non paniculâ totâ vel coloratâ vel non coloratâ varians. Folia ampla, subtus squamis parciis, ad nervorum infimorum confluentiam paulo crebrioribus, consita. Calyx sub florescentiâ semipollucaris, dorso glandulî, minus tamen quam in C. villosa conspersus. Cor. alba. Stam. longissime exserta, descendenter. Drupa baccata, saepius monopyrena, calyce valde aucto ipsam duplo superante inclusa. (v. v. c. et s. spont. in h. DC.)

35. C. PHILIPPINUM ramulis obtuse tetragonon petiolisque villo strigoso tomentosis et canescensibus, foliis petiolatis subrotundo- vel ovato-cordatis acuminatis integerrimis aut remote serratis supra strigoso-hirtis subtus molliter subtomentoso-villosis incanis paginâ dense glanduloso-punctatâ, paniculæ terminali patente amplâ ramis calycibusque lanuginoso-tomentosis, cymis laxifloris bracteolis parvis caducis, calyce campanulato patente esquamato 5-fido laciñiis ovatis tenuiter acuminatis, corollâ extus laxe villosâ et glanduloso-punctatâ tubo calycem vix duplo excedente. ♂ In Philippinis (Cuming! pl. phil. exs. n. 1096). Proximum C. infortunato, diversum imprimis indumento fol. paniculae et corolla, calyce vix semi-5-fido esquamato et corolla tubo longiore. Panicula colorata, nuda. Calyx 4 lin. longus. Corolla limbis exsertam tubi partem longit. subæquans, laciñiis oblongis obtusis. Genitalia longe exserta. Drupa baccata, calyce ampliato connivente inclusa. (v. s. in h. reg. berol. et cl. Lucas.)

36. C. VILLOSUM (Blume! bjdr. p. 811), ramulis tetragonon cynisque totis petiolis foliorumque nervis tomento dense subscirpeo eglanduloso incanis, foliis longe petiolatis profunde cordatis vel superioribus ovatis vix cordatis in acumen attenuatis integerrimis supra appresso pubescentibus subtus in pagina villo brevi mollibus, paniculæ terminali obtuse pyramidatâ amplâ patente, cymis laxifloris bracteolis parvis caducis, calyce 5-nervi amplo patente squamato-glanduloso 5-fido laciñiis lanceolatis acutissimis, corollâ extus tomento sericeo canâ tubo calycem æquante limbo exiguo. ♂ In Javae (Bl. Jungh. Zolling! pl. jav. n. 122), Sumatrâ (Jack), in penins. Malaccensi (Ad. Deless. Gaud.), in Philippinis (Cuming! n. 2415). C. velutinum Wall. cat. n. 1797. C. molle Jack in mal. misc. I. p. 15, non H. B. Ktb.; Rheed. hort. mal. 2 p. 41. t. 25. Habitus quodammodo C. infortunati, sed ab omnibus affinibus distinctissima

paniculâ cum calyce sericeo-canâ nec coloratâ calyceque glandulis crebris et grossis consito, imprimis vero corollâ parvâ canâ, laciiniis limbi secundi oblongis quam stamina unilateraliter deflexa quater-quiuiques brevioribus. (v. s. in h. DC., reg. berol. et N. ab Eseb.)

37. C. BRACHYANTHUM, ramulis tetragonis sulcatis cum paniculâ petiolis foliorumque reti tomento strigoso incanis, foliis petiolatis cordato-ovatis subtrotundis acuminatis integerrimis supra subtusque in paginâ hirtis hinc pallidis, panicula terminali subfastigiata patente laxâ, bracteis bracteolatis lanceolatis foliaceis parvis, cymis inferioribus axillaribus, calyce campanulato 5-fido laciiniis ovatis acutis, corolle tubo calycem subæquante. ♂ In Philippinis (Cuming! pl. phl. exs. n. 816.) Folia per ampla, 9 poll. longa, basi 6 poll. lata, petiole subtriplicari. Folia cymas inferiores subtendentia parva, reliqua sursum sensim magis diminuta, omnia subfloralia subcolorata. Calyx pedicellatus, ampliusculus, 4 lin. longus, laciiniis seu dentibus magis glabratris coloratis. Cor. tubus cylindraceus pilosus, limbus brevis subæqualis laciiniis supra argenteo-micantibus staminibus subdupo brevioribus. Stylus stamina duplo superans. (v. s. in h. reg. berol. et cl. Lucæ.)

38. C. TRICHOTOMUM (Thunb. fl. jap. p. 256), glabrum, foliis oppositis longe petiolatis membranaceis integerrimis opacis subtus pallidis glanduloso-punctatis et secus nervos obsolete lanuginosis, inferioribus maximis trilobis, superioribus ovatis in acumen longum attenuatis, paniculâ terminali amplissimâ obovata, cymis trichotomis patentissime corymbosis multifloris bracteolis parvis caducis, calyce longe pedicellato inflato 5-angulato acute 5-fido, corolle tubo gracili calycem duplo excedente. ♂ In Japoniâ (Thunb., Zollinger! pl. jap. exs. n. 346, Goering!) — Kämpf. amoen. p. 827 ic. 22. Folia penninervia basi triplinervia venosa, sursum decrescentia. Calyx membranaceus, basi attenuatus, semipollicaris. Corolla hypocrateriformis glabra. Stamina longissime exserta. Drupa baccata calyci aucto eaque longiore patente insidens. (v. s. in h. DC. et Lucæ.)

§ 6. *Squamata*. — *Panicula terminalis, ampla, pyramidalis vel subfastigiata, subnuda, cymis trichotomis vel semel aut bis trifidis ramulis ultimis racemulosis. Folia subtus glandulis peltatis squamata, petiolis linea lanuginosâ conjugatis.*

39. C. PANICULATUM (Lin. mant. 1 p. 90), ramulis quadrangularibus canaliculatis cum paniculâ glabriusculis vel puberulis, foliis longe petiolatis oppositis membranaceis cordato-hastatis 5-7-lobatis lobis acutis integerrimis vel minute denticulatis supra nitidulis subtus pallidis glandulisque peltatis dense squamatis, paniculâ terminali amplâ pyramidali subnuda minute bracteolata, cymis penduculatis patentibus semel-bis trifidis ramis ultimis racemosis calyce pedicellato parvo patulo acute 5-fido, corolle tubo gracili calyce quadruplici longiore. ♂ In India orientali, Penang, Tavoy (Wall! cat. u. 1802). Cochinchinâ (Lour.) et in Archipelago ind., c. gr. Java (Zoll! pl. jav. n. 1453) — Vahl symb. 2 p. 74, Reichb. fl. exot. t. 208. C. pyramidale Andr.! rep. t. 628. Wall.! l. c. C. splendidum Wall.! cat. n. 1803. Volkam. angulata Lour. coch. ed. Willd. 2 p. 473 (ex deser. hue pertinet, nec ad C. squamatum, uti volunt cl. Hook. et Arn. in Beech. voy. bot. p. 205). Folia ampla nervosa, cymis axillar. lineâ transversâ lanuginosâ conjugatis. Panicula saepius colorata. Calyx sesquilineam altus, campanulatus. Cor. coccinea, extus puberula tubo, semipollicari, limbo brevi lobis rotundatis subæqualibus secunde patentibus. (v. s. in h. DC.)

40. C. DIVERSIFOLIUM (Vahl symb. bot. 2 p. 75), ramis tetragonis sursum pubescentibus, foliis petiolatis integris ovalibus et inferioribus 5-lobis, superioribus trilobis lobo medio longiore acuminatis, omnibus supra glabris subtus squamellatis, paniculâ terminali amplâ subdichotoma, calyce pubescente 5-partito laciiniis oblongis acutis, corolle tubo pollicari puberulo. ♂ In India orientali.

- Folia 7-8 poll. long., 5-6 poll. lat.; floralia parva sessilia lanceolata integra. Panicula 7-8-pollicaris. Stam. corollam duplo superantia.
41. *C. SQUAMATUM* (Vahl symb. bot. 2 p. 74), glabriuscum vel pubescens, ramis subtetragonis, foliis chartaceis petiolatis oppositis subrotundis profunde remiformi-cordatis lobis incumbentibus acuminatis repando-denticulatis opacis supra strigillis conspersis glabrescentibus subtus pallidis glandulisque peltatis dense squamatibus, paniculâ terminali pyramidatâ laxâ subnudâ minute bracteolatâ, cymis pedunculatis patentibus semel-bis trifidis ramis extremis quasi racemosis, calyce ampliusculo patenti 5-partito lacinias lanceolatis acutis, corollæ tubo calyce quam duplo paulo longiore. ♂ In Indiâ orientali (Wall.! cat. n. 1798), et in Japoniâ (Goering!) — Bot. reg. t. 619, Mound et Hensl. the botan. I t. 13, Morren ann. Gand 1845 t. 3. Volkameria Kämpferi Jacq.! ic. pl. rar. 3 t. 500. Banks ieu. Kämpf. t. 58. V. coccinea herb. de l'amat. t. 519. C. coccineum D. Dietr. syn. pl. 3 p. 616. Folia ampla, ad basin petiolorum linea transversâ lanuginosâ conjugata. Panicula omnino colorata. Rami cymarum ultimi ad modum cymarum scorpioidearum Borraginearum constituti, sed non circinati. Calyx pedicellatus 3-4 lin. longus. Cor. limbus tertiam tubi subæquans, revolutus. Stam. longissime exserta. Drupa (ex Willd.) Ribesii magn., calycque brevior. (v. s. in h. DC. et Lucae.)
42. *C. INTERMEDIUM* (Cham. in Linneâ 7 p. 150), ramis acute quadrangularibus canaliculatis cum paniculâ glabris, foliis membranaceis oppositis petiolatis sinu hiante cordato-ovatis basi subangulatis acuminatis mucronato-denticulatis opacis supra strigillis conspersis subtus pallidis glandulisque peltatis dense squamatibus, paniculâ terminali pyramidatâ laxâ patente subnudâ minute bracteolatâ, cymis pedunculatis bis trifidis ramis ultimis quasi racemosis, calyce parvo patulo semi-5-fido lacinias oblongis acutis, corollæ tubo calyce subquadruplo longiore. ♂ In Philippinis (Cham., Cuning! pl. exs. n. 481). Proximum *C. squamato*, sed diversum foliorum figurâ et imprimis calyce duplo minore et minus profunde diviso, corollæ limbo majore. Folia ut in affinibus linea lanuginosâ conjugata; inferiora non vidi. Panicula amplissima. Calyx sesquilineam longus. Cor. glabriguela, tubo superne insuudibulari semipollicari, limbo lacinii tubum fere semiæquantibus ovalibus unguiculatis patentibus. Genitalia longissime exserta. Calyx sub fructu auctus. (v. s. in h. reg. berol. et cl. Lucae).
43. *C. URTICIFOLIUM* (Wall.! cat. n. 1801), ramulis cum paniculâ petiolis nérvisque foliorum pubescentibus, foliis amplissimis membranaceis longe petiolatis oppositis sinu lato hiante subrotundo-cordatis acuminatis grosse et inæqualiter acute dentatis supra strigillis conspersis et nitidis subtus pallidis glabris glandulisque peltatis squamatibus, paniculâ terminali amplissimâ laxâ subnudâ minute bracteolatâ, cymis pedunculatis patentibus semel-bis trifidis ramulis extremis quasi racemosis, calyx campanulato patente semi-5-fido lacinias lanceolatis acutis, corollæ tubo calyce subtriplo longiore. ♂ vel ♂ (ex annot. Leschen.). In Indiâ orientali, e. gr. in Penang (Wall.! Leschen!). Volkameria urticifolia Roxb. fl. ind. 3 p. 61. Affine *C. squamato*, a quo vero uti a proximis differt foliis supra nitidis grosse dentatis tum etiam calyce. Folia  $\frac{3}{4}$  pedis longa itidemque citra basin lata, petiolo laminam æquante stipitata. Panicula pubescenti elegans colorata. Calyx 2 lin. longus. Cor. subinfundibularis, coccinea? farinacea-puberula, tubo semipollicari, limbo tubo dimidio paulo longiore. Genitalia longe exserta. (v. s. in h. DC.)
44. *C. BLUMEANUM*, ramulis obtuse quadrangularibus canaliculatis cum paniculâ petiolis foliorumque dorso pulverulento-pubescentibus, foliis membranaceis oppositis longe petiolatis sinu hiante cordato-ovatis acutis vel breviacuminiatis repando-acute dentatis opacis supra subtiliter pulverulentis glabrescentibus subtus subcanescentibus glandulisque peltatis rarissimis conspersis, paniculâ terminali fastigiato-pyramidalâ subnudâ minute bracteolatâ, cymis pedunculatis patevitibus trichotomis, calyce parvo campanulato acute 5-dentato dentibus

recurvis, corollæ tubo calycem sextuplo excedento. ♂ In Javâ (Blume! Zoll.! pl. jav. exs. n. 747). Ex affinitate C. squamati, a quo uti a C. urticifolio et intermedio differt pube, fol. figurâ et squamis rarîs, calyce parvo et corollæ tubo longo. Folia semipedalia long., itidemque fere latitudine, petiole laminam æquante. Panicula colorata. Corolla subtiliter farinaceo-glandulosa, tubo 10 lin. longo, limbi laciniis obovato-oblongis seoundis, staminibus duplo brevioribus. (v. s. in h. Nees et DC.)

Sectio II. SIPHONANTHUS. — *Siphonanthus Linn. l. c.*

Corolla infundibularis, tubo longissimo (pluripolloari), limbo subinæquali.

45. C. SIPHONANTHUS (R. Br.! in Ait. hort. kew. cd. 2, 4 p. 65), glabrum, caulinibus ramisque obtuse angulatis sulcatis, foliis verticillatis quaternis ternis elongato-vel rarius oblongo-lanceolatis utrinque attenuato-acuminatis subsessilibus integerrimis subrepandis margine subrevolutis, cymis semel-ter trifidis patentibus paniculam pyramidatam strucentibus inferioribus axillaribus folio brevioribus, calyce colorato amplio 5-partito laciniis lanceolatis ovatis acutiusculis, corollæ tubo filiformi longissimo superne infundibulari. ♂ In Indiâ orientali, e. gr. Bengalîa, Sillet, Ambale, Awa, Promc, etc. (Wall.! cat. n. 1784, Leschen.! Edgew.!), in mont. sylvaticis Jave (Jungh.!), in hortis Indiae culta. — Lam. ill. t. 318. *Siphonanthus Indica* Willd. spec. 1 p. 606. S. angustifolia Willd. 1. c. Ovieda mitis Burm. fl. ind. t. 43 f. 1, Linn. sp. pl. p. 889. Folia pedalia, 9-12 lin. lata, ad insertionem lineâ pubescente conjugata, internum superne angulato-paucidentata. Calyx purpure tinctus. Corolla alba, tubo subquadriplicari subtiliter glanduloso, limbi laciniis semipollicaribus, ovatis obtusis emarginatis. Genitalia longe exserta. Drupa baccata, perfecta 4-pyrena et 4-loba, sæpius vero abortu 3-2-1-pyrena, calyce aucto cupuliformi laciniis reflexis sustensa. (v. s. in h. DC.)
46. C. LONGICOLLE (F. W. Meyer! prim. fl. esseq. p. 217), glabrum, caulinibus ramisque obtuse angulatis canaliculatis, foliis verticillatis quaternis ternis oblongis utrinque attenuato-acuminatis subsessilibus integerrimis, cymis subtriangulari patentibus axillaribus folio brevioribus paniculam unâ foliosam struentibus, calyce amplio 5-partito laciniis lato-subtriangulari-ovatis acutis postice imbricatis, corollæ tubo filiformi longissimo superne infundibulari. ♂ In fruticetis Guianæ brit. ad fl. Essequibo (Meyer, Rich. Schomb.! h. n. 118). Species C. *Siphonantho* tantopere similis, ut non differat nisi foliis et calycis laciniis latioribus, quam fere pro illius stirpe Americæ illatâ ibidemque uti C. fragrans efferatâ habuerim. Folia super. 3-4 pollices longa, 15 lin. lata. Cor. alba, tubo quadriplicari pube brevi glandulosâ adsperso. (v. s. in h. reg. berol.)
47. C. LONGIFLORUM (Decaisne! nouv. ann. mus. 3 p. 400), ramulis cum cymis foliisque junioribus puberulis, foliis coriacieis ovatis vel ovato-ellipticis petiolatis utrinque acuminatis integrerrimis aut medio subrepandis supra nitidis subtus opacis adultis glaberrimis, cymis in paniculam terminalem corymbosam multifloram congestis inferioribus axillaribus folium subæquantibus, calyce campanulato 5-partito lobis ovatis acutis, corollæ tubo glabro gracili triplicari. ♂ In ins. Timor (mus. par.!) et Luçon pr. Manillam (Perrottet! Gaud.!). Frutex videtur robustus vel arbor. Folia 3-6-pollicaria. Cymæ pedunculi et rami rigidi; bracteolæ minutæ caduceæ. Calyx 3 lin. longus, amplius. Cor. limbus patens denique reflexus, laciniis ovatis acutis dorso puberulis. Genit. longe exserta. Drupa baccata, tubo calycis aucti patentis colorati insidens. (v. s. in h. DC.)
48. C. SPINOSUM (Spr. syst. veg. 2 p. 760), ramulis compressis cum ramis panicula petiolis reticule foliorum strigoso-hirsutis, foliis coriacieis breviter vel brevissime petiolatis ellipticis vel elliptico-oblongis acuminatis integrerrimis vel spinoso-dentatis nitidulis in utrâque paginâ glabratâ subtus pallidis reti grosso prominente, paniculâ terminali subsessili capitato-compactâ, bracteis bracteo-

lisquic parvis, calyce glabriusculo amplissimo inflato 5-angulari 5-fido laciniis lato-ovatis subpungenti-acuminatis, tubo corollæ triplicari. ♂ In insulâ Dominicanâ (Bertero!). Ovieda spinosa Linn. sp. pl. p. 888. Plum.! icons p. 254 t. 256. Rami tortuosi, cortice cinereo rimoso. Folia 4-6-pollicaria, reti supra impresso. Calyx membranaceus 8 lin. circ. longus, patens. Cor. tubus fore glaber, superne sensim paulòque ampliatus et in limbum patentem abiens; limbi laciniæ lato-ovatæ, obtusæ, 3 lin. longæ. Genitalia longissime exserta. (v. s. in h. DC. a Balbis comm.)

49. C. HASTATUM (Wall. cat. n. 1786), ramulis obsolete tetragonis foliis pedunculis villosis, foliis oppositis petiolatis subhastato-cordatis lobis acutis integerrimis vel subrepandis inferioribus divaricatis terminali maximo oblongo, paniculâ terminali trichotomo-corymbosâ pauciflorâ, calyce glabriusculo amplo campanulato patente semi-5-fido laciniis lanceolatis acutis, corollæ tubo glandulosovallo-villoso filiformi longissimo. ♂ In Indiâ orientali (Wall.!) — Bot. reg. t. 1307 Bot. mag. t. 3398. C. sagittatum Wall. cat. n. 1786 (sphalmate). Folia ampliuscula. Panicula e cymis paucis decussatis paucifloris confecta, bracteis foliaceis subcoloratis lanceolatis postice longe attenuatis interstincta. Calyx glandulîs subcutaneis punctatus, semipollicaris, immo in culto pollicaris. Corollæ alba tubus 4-pollicaris, limbi pollicem latitud. fere æquatis laciniis lincari-oblongis, superioribus paulo majoribus. Genitalia limbum dimidio excedentia. Drupa calyci aucto immersa baccata. (v. v. c. et s. spont. in h. DC.)

† *Species denuo recognoscenda.*

50. C. MEDIUM (R. Br. prodr. fl. nov.-holl. p. 510), foliis ellipticis breve acuminatis subtus tomentosis, calycibus adultis corollisque glabriusculis, corymbis axillaribus terminalibusque laxiusculis. ♂ In Novâ - Hollandiâ tropicâ.

51. C. ATTENUATUM (R. Br. prodr. p. 511), foliis ellipticis subundulatis acutis basi attenuatis utrinque glabris, calycibus puberulis laciniis acutissimis tubum resequantibus, corollis glabris. ♂ In N. Hollandiâ orient. circa portum Jacksonis.

52. C. FLORIBUNDUM (R. Br. I. c.), foliis elliptico-lanceolatis glabris, calycis laciniis acutiusculis tubo brevioribus corollisque glabris. ♂ In N. Hollandiâ æquinoctiali.

53. C. OVATUM (R. Br. I. c.), foliis ovatis acutis, adultis glabris petiolo vix duplo longioribus, pedunculis axillaribus terminalibusque. ♂ In N. Hollandiâ æquinoctiali.

α. Folia calycesque glabra.

β. Folia calycesque pubescentia.

54. C. CORIACEUM (R. Br. I. c.), foliis ovatis acutis subcordatis subtus reticulato-venosis subrugosis petiolisque tomentosis pedunc. axillaribus terminalibusque trichotomis. — In Novâ-Hollandiâ æquinoctiali.

55. C. COSTATUM (R. Br. I. c.), foliis ovatis obtusiusculis subtus tomentosis costatis rugosis, corymbis terminalibus axillaribusque trichotomis. — In Novâ-Hollandiâ æquinoctiali. — Calyx in n. 50-55 quinquefidus, fructifer ampliatus, coloratus, carnosus.

56. C. FORTUNATUM (Linn. sp. pl. 889), incanum, foliis oppositis lanceolatis nudis integerrimis petiolatis per petiolas parum decurrentibus, pedunculis axillaribus paucifloris dichotomis folio brevioribus, calycis laciniis ovalibus acutis, corollæ tubo calycem subæquante laciniis limbi ovalibus obtusis. ♂ In Indiâ orient. — Osbeck it. p. 228 tab. 11. Folia 3 poll. longa, pollicem circ. lata.

57. C. VERTICILLATUM (D. Don prodr. fl. nep. p. 102), foliis quaternis lanceolatis acutis integerrimis glabris, pedunculis quaternis axillaribus, calycibus

- 5-partitis, corollæ tubo filiformi longissimo lavi. ♂ In Nepaliæ. Ovieda verticillata Roxb. mss. Planta speciosa. Corollæ tubus triplicaris, apice incurvus. Sipbonanthus?
58. C. CASTANEIFOLIUM (Hook. et Arn. Beech. voy. bot. p. 205), ramis minute strigilloso-pubescentibus, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis basi cuneatis iutegerrimis apicem versus irregulariter dentatis supra minute sparseque puberulis subtus glabris venosis, corymbis axillaribus folio triplo brevioribus, bracteis bracteolatis subulatis deciduis, calycis 5-partiti segmentis ovatis acuminatiis demum acutis. ♀ In Chinâ ad Canton (Millet). Folia castaneæ simillima, sed membranacea.
59. C. TRIFLORUM (Vis. ill. plant. nov. ort. pad. p. 19), canescens, ramis subtetragonis, foliis longe petiolatis late ovalibus medio grosse dentatis subtus nervosis, pedunculis axillaribus subtrifloris nutantibus, pedicellis lateralibus bracteolatis apice incrassatis, calycibus campanulato-coniventibus pentagonis 5-fidis dentibus lanceolatis, corollâ calyce triplo longiore tubo filiformi gracili lobis ellipticis reflexis. ♂ In Nubiæ.
60. C. FOETIDUM (Bunge in pl. mong. chin. n. 296. et in mém. sav. étr. Pétersb. 2 p. 126), suffruticosum, foliis petiolatis late cordatis acutis scarubriscus repando-acute-dentatis subtus ad nervorum axillas glandulosis, corymbis dense capitatis terminalibus, tubo corollæ longissimo calycem quintuplo excedente, limbo 4-partito. ♂ In Chinâ boreali. C. Bungei Steud. nomencl. ed. 2.
61. C. BUCHANANII (Walp. repert. 4 p. 108), caule cresto, ramis junioribus pubescentibus quadrangularibus, foliis petiolatis cordatis circinatis et integris utrinque pubescentibus, corymbis terminalibus, pedunculis pedicellis bracteisque parvis villosis coloratis, calyce 5-fido parvo glabro, corollæ tubo gracili calycem quinques sexiesque superante, limbo æqualiter 5-partito. — In Moluccis insulis. C. foetidum D. Don prodr. fl. nep. p. 103, non Bge. Volkameria foetida Hamilt. mss. Volkameria Buchananii Roxb. fl. ind. 3 p. 60. Folia 4-6-pollicaria, 3-4 poll. lata. Pedicelli cum bracteis et floribus coccinei. Drupa baccata coralescenti-rubra, calyci rubro reflexo insidens.
62. C. GLANDULOSUM (Lindl. bot. reg. 1844 adn. ad tab. 19), foliis subrotundo-ovatis basi truncatis vel parum cordatis pilosusculis esquamatiis subdentatis, paniculâ densâ capitata, bracteis linear-lanceolatis calyce longioribus dorso glandulâ unâ alterâ pellucidâ immersâ notatis, calycis 5-fidi lacinias acuminatiis, corollæ lacinias oblongis reflexis staminibus brevioribus, stylo longissimo. ♂ Colitur in hortis angl. C. speciosissimum hort. angl. Quoad folia simile C. trichotoma, ecteroquin diversissimum inflorescentiâ et calyce.
63. C. DISPARIFOLIUM (Blume bijdr. p. 809), foliis oppositis longius petiolatis oblongis acuminatiis a medio ad apicem repando-dentatis altero minore, panicula terminali brachiatâ laxâ, caule tetragono, calycis lacinias lanceolatis acuminatis. ♂ In montibus Javae. Corollæ pallide flavescentes. Variat foliis obsolete denticulatis integerrimis glaberrimisque vel utrâque paginâ puberulis.
64. C. LANUGINOSUM (Blume l. c. p. 810), foliis ovatis acuminatiis basi interdum subcordatis remote denticulatis utrinque mollibus, junioribus subintegerrimis cum ramulis calycibusque extus lanuginosis, pedunculis dichotomis, calycibus campanulatis 5-fidis lacinias acuminatiis. ♂ In montosis insularum Moluccanarum.
65. C. COLEBROOKIANUM (Walp. repert. 4 p. 114), ramis tetragonis glaberrimis, foliis longe petiolatis late ovatis vel subrotundo-ovatis subacuminatis supra glaberrimis subtus vix in nervo puberulis, paniculis axillaribus terminalibus dichotomis fastigiatis, pedunculis pedicellis calycibusque minutissime puberulis, calycibus parvis acute 5-dentatis sâpe ad basin laciniarum glandula callosâ instructis, corollæ glaberrimæ tubo elongato lacinias limbi

- elliptico-ovatis tubo quadruplo brevioribus. ♂ In Indiâ orient. e. gr. prov. Punduana (Wall.). C. glandulosum Colebr. mss. ex Wall. cat. n. 1806 fide Walp. Folia semipedalia forteque longiora, 4-5 poll. lata, membranacea vix repanda integerrima; petioli bipollicares. Pedunculi axillares 2-2½-policares. Corollæ purpureæ? tubus pollicaris. Stamina longissime exserta. Drupa pyriformis 4-sulcata glaberrima reticulato-rugosa, calyce vix mutato suffulta. Ex affinitate C. infortunati?
66. C. CAPITATUM (Schum. et Thonning in kongl. Dansk. vidensk. selsk. Afh. 4 p. 61), foliis ovato-oblongis repando-dentatis basi subcordatis pubescentibus, floribus in capitulum terminale hemisphaericum multiflorum collectis. ♂ In Guineâ (Thonning). Volkameria capitata Willd. spec. 3 p. 384? Ramuli teretiusculi, cinerei, juniores dense ferrugineo-pilos. Folia sparsa, rugosa, superne pilosula, 3-pollicaria, brevipetiolata. Bracteæ membranaceæ, anguste lanceolatae, pilose, calyces fere longitudine. Calyx tubuloso-campanulatus, membran., profunde 5-fidus, lacinias ovato-lanceolatis purpurascensibus. Cor. bipollicaris alba, tubo calyce quadruplo longiore glanduloso-puberulo, limbo subæquali lacinias oblongo-rotundatis. Filamenta 4 tubo triplo longiora, demum revoluta. Fructus desideratur.
67. C. SIMPLEX (G. Don in Edinb. phil. journ. 11 oct. 1824 p. 349), erectum, pilosum, foliis oppositis oblongis acuminatis integris longe petiolatis, paniculâ dichotomâ patulâ terminali. ♂ In Africæ occid. mont. Sierra-Leone. Flores albi, filam. purpureis, antheris luteis.
68. C. AURANTIUM (G. Don l. c.), scandens, glabrum, foliis oppositis oblongis acuminatis mucronatis integris brevipetiolatis, paniculâ dichotomâ confertiflora terminali laterale. ♂ In montibus Sierra-Leone Africæ occid. Fores aurantiaci, filamentis luteis, antheris subœruleis.
69. C. HIRSUTUM (G. Don l. c.), scandens, pilosum, foliis oppositis oblongis acutis integris saepè subcordatis utrinque hirsutis longe petiolatis, paniculâ dichotomâ patente terminali. ♂ In montibus Sierra-Leone Africæ occid. Flores albi, filam. purpureis, antheris luteis.
70. C. MULTIFLORUM (G. Don l. c. p. 350), assurgens, glabrum, foliis oppositis ovato-lanceolatis acuminatis inferne rugosis longe petiolatis, paniculâ confertiflora terminali. ♂ In jugi Sierra-Leone dicti Africæ occid. monte Leicester. — Flores parvi, albi. Frutex biorgyalis.
71. C. LIVIDUM (Lindl. in bot. reg. t. 945), foliis oblongis dentatis utrinque acuminatis lividis, petiolo costâque tomentosis, calyce inflato pentagono, cymis tomentosis axillaribus folio brevioribus. ♀ In Chinâ.
72. C. PUBESCENS (Lindl. in bot. reg. t. 1035), foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ramisque pubescensibus, pedunculis axillaribus trifidis, tubo corollæ abbreviato staminibus corollæ longitudine calyce campanulato 5-dentato immutato. ♂ In insulâ Sancti Vincentii aut forsitan proximâ terrâ continentali. — Rami puberuli. Flores albi, hinc inde flavescentes. Stylus tubo duplo longior.

† † Species dubiae.

73. C. COMMERSONII (Spreng. syst. veg. 2 p. 758), foliis ovatis utrinque attenuatis integerrimis glabris, corymbis axillaribus trichotomis pubescentibus, tubo corollæ elongato. ♂ In Philippinis. Volkameria Commersonii (Poir. in Willd. herb.)
74. C. COROMANDELLANUM (Spreng. l. c.), foliis ovatis acutis integerrimis glaberrimis, paniculâ terminali corymbosâ. ♂ In Indiæ orâ Coromandel. C. ovatum Poir. enc. suppl. 4 p. 352.
75. C. JAVANICUM (Spreng. l. c.), foliis ovato-oblongis acutis integerrimis coriaceis glaberrimis, paniculâ terminali thyrsoidâ, calycis lacinias ovalibus acuminulatis. ♂ In insulâ Javâ. C. coriaceum Poir. enc. suppl. 4 p. 353, non R. Br.

76. *C. PUMILUM* (Spreng, l. c. p. 759), foliis lanceolatis subintegerrimis tomentosis petiolatis, pedunculis axillaribus subsexfloris, calyce magno inflato acute 5-fido. ♂ Hab. prope Cantonem Sinarum. Volkameria pumila Lour. fl. cochl. ed. Willd. 2 p. 472. Caulis 1-pedalis, erectus, teres, simplex, ramosus. Folia opposita, magna. Flos ruber. Cor. longa, subæqualis. Stamina didynamia, exserta. Baccæ subrotunda, 4-sulca, exsucca, bilocularis, monosperma, seminibus bilocularibus.
77. *C. LÆVIFOLIUM* (Blume bijdr. p. 808), caule tetraedro, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis integerrimis glaberrimis, paniculâ terminali brachiatâ, calyce campanulato profunde 5-fido purpurascente, corollâ albida. ♂ In Javâ. Affine videtur *C. acuminato*.
78. *C. PHYLLOMEGA* (Steud. nomencl. ed. 2), foliis magnis ovalibus utrinque acutiusculis integerrimis coriaccis glabris, paniculâ terminali brachiatâ, calyce 5-fido, corollâ albida. ♂ In insulâ Javâ. *C. macrophyllum* Blume bijdr. p. 808, non Sims.
79. *C. CORDATUM* (D. Don prodr. fl. nepal. p. 103), ramis tetragonis hirsutissimis, foliis cordatis acutis dentato-serratis lanosis petiolatis, paniculâ terminali brachiatâ, laciinis calycis foliaceis ellipticis mucronatis tomentosis, corollæ tubo calycem parum superante. ♂ Hab. in Nepaliâ inter Katmandu et Gossain-Tban. Proximum videtur *C. infortunato*, sin modo diversum.
80. *C. DIVARICATUM* (Jack in mal. misc. 1 n. 2, Hook. bot. misc. 2 p. 89), ramis ad nodos incrassatis, foliis brevipetiolatis obovato-lanceolatis acuminatis glabris integris vel subdenticulatis, paniculâ terminali erectâ elongata ramis diyaricatis subdichotomis multifloris, bracteis magnis ovatis acuminatis foliaceis, calyce cupuliformi subintegro, corollæ tubulosæ laciinis secundis. ♂ In orâ occidentali insulæ Sumatra ad Laye. Frutex bipedalis. Corollæ laciinæ inferiores cœruleæ longiores. Stamina longe exserta. Drupa baccata intense purpurea, calyxi vix aucto insidens, 4-loba, 4-pyrena, pyrenis 1-3 interdum abortientibus. — Species *C. serrato certe proxima*.
81. *C. MACROPHYLLUM* (Sims bot. mag. t. 2536), foliis late ovatis acuminatis serratis subsessilibus subtus tomentosis, floribus paniculatis, calycibus 5-dentatis, corollis labiatis. ♂ In insulis Mascarenensibus. — Reichenb. fl. exot. t. 209. Quæ in hortis nostris sub hoc nomine colitur pertinet ad *C. serratum*; num etiam species istuc pertineat Simsianâ ex iconе pessimâ non omnino liquet, descriptio vero non obstat.
82. *C. OBOVATUM* (Walp. repert. 4, p. 112), foliis obovatis integris coriaceis subtus pubescensibus, paniculâ terminali deoussatâ pubescente ramificationibus ultimis elongatis secundifloris, calyce obsolete 5-dentato. ♂ Crescit in insulis Moluccanis. Volkameria obovata Roxb. fl. ind. ed. 1832, 3, p. 62.
83. *C. GRATUM* (Wall. cat. n. 1813. Walp. rep. 4, p. 113), ramis teretiusculis, foliis brevitri petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis supra vix puberulis infra ad nervos puberulis serrato-denticulatis summisque integerrimis, paniculis axillaribus terminalibusque paucifloris, rhachi pedicellisque tomentellis, bracteolis subulatis, calycibus parvis acute 5-dentatis. ♂ In Indiâ orientali ad Dheyra-Doon. Affine *C. odorato*, sed ex specimine pessimo deflorato vix describendum. Folia triplicaria, policem lata, petiolo 3 lin. longo; suprema lanceolata, minora, subintegra integerrimaque (Walpers).
84. *C. DENTATUM* (Wall. cat. 1799, Walp. rep. p. 114), foliis rotundato-cordatis acutis acuteque dentatis lobis baseos rotundatis incumbentibus, paniculâ terminali brachiatâ coloratâ. ♂ In Indiâ orient. prov. Sillet. Volkameria dentata Roxb. fl. ind. 3, p. 61.
85. *C. CAPSULARE* (Blanco fl. de Filipinas p. 509. Walp. rep. p. 114), ramis 4-angularibus, foliis oppositis lanceolatis integerrimis glabris, petiolis brevibus, pedunculis axillaribus umbellatim trifloris, calyce parvo campanulato 5-dentato

subbilabiato, corolla longissimâ albâ tubo filiformi subinecurvo limbi laciniis 5 obtusis subbilabiatis. ♂ In insulis Philippinis.

86. *C. HERBACEUM* (Wall.! cat. n. 1815). Volkam. herbacea Roxb. (ex Wall. l. c.). Specimen vidi unicum idque pessimum, ex quo tamen plantam a formis lanceolatifoliis *C. serrati* non distinxerim.

87. *C. ORNATUM* (Wall.! cat. n. 1811). ♂ Hab. in Indiæ citerioris regno Pegu. Specimen quod habebam pessimum describere non ausim. *C. serrato certe proximum*, sin modo diversum.

† † † *Species indescriptæ, nobis ignotæ.*

*C. CERNUUM* Wall. cat.

*C. GLAUCUM* Wall.

*C. HELIANTHEMIFOLIUM* Wall.

*C. SEMISERRATUM* Wall.

*C. VENOSUM* Wall.

*Species exclusæ.*

*C. LEUCOSCEPTRUM* Don = *Teucrium macrostachyum*.

*C. MYRICOIDES* R. Br. = *Cyclonema myricoides*.

*C. ODORATUM* Don = *Caryopteris Wallichiana*.

*C. SERICEUM* (Wall.! cat. n. 1814). Planta minime ad Verbenaceas sed potius ad Capparideas pertinens, quam vero ex specimine valde incompleto rite determinare nequeo.

XXXII. CYCLONEMA Hochst. in Flora 1842 p. 225. Endt. gen. suppl. 3 p. 77. Meisn. gen. 2, p. 367. — *Spironema* Hochst. in schedula ad Schimp. plant. abyss. un. itin. sect. 1. n. 330.

Calyx brevis, campanulatus, 5-fidus. Corolla irregularis, tubo reclinato, limbo inæqualiter 5-partito subbilabiati patente, laciniæ posticæ resupinatae cucullato-galeatæ, reliquis laciniis planis secundis adscendentibus. Stamina 4, subdidyma, corollæ tubo inserta, longe exserta; filamenta adscendentia, basi subpaleaceo-hirsuta, aestivatione intra galeam circinato-convoluta: antheræ sagittato-ovatae bilocularis, loculis introrsis parallelis rimâ hianti dehiscentibus. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis, stamina superans; stigmate bifido. Drupa vix carnosa, tetrapyrena vel abortu mono-di-tripyrena, apice lobata, pyrenis distinctis unilocularibus, putamine pergamentaceo lœvi. Semen crassum oleosum, radiculâ inferâ brevi. — Frutices Africani, foliis oppositis simplicibus, corymbis axillaribus paucifloris trichotomis. — Genus Clerodendro affine, corolla perinsigne.

1. *C. MYRICOIDES* (Hochst.! l. c.), ramulis angulatis cum pedunculis petiolis nervoquo foliorum medio subtus puberulis, foliis oppositis lanceolato-vel ob-ovato-oblongis acuminatis in petiolum brevissimum attenuatis superne grosse serratis vel integerrimis supra scabris subnitidis subfus opacis reti puberulo pagina glabra, cymis pedunculatis folium subæquantibus exsertisve paucifloris, calycibus longe pedicellatis rotundato-5-lobis. ♂ In Abyssinia montibus inter 5200 et 7000 pedes, e. g. in monte Scholada (Schimp.! pl. abyss. un. itin. sect. 1, 330 et sect. 3. n. 1839) et in valle Schoata (Schimper! ibid. sect. 2. n. 1140); tum in silvis primitivis ad portum Natal juxta fl. Umleas (Krauss!). *Spironema myricoides* Hochst. in Schimp. pl. exs. sect. 1. n. 330. *Clerodendron Spironema myricoides* R. Br.? in append. ad Salt voy. Abyss. p. 64. sp. in

descri. Nomen abyss. *Surbattri*. Ramii albidi. Folia membranacea subtriplicaria et majora, indumento ut tota planta paulo variantia. Calyx coloratus campanulatus, jam glaberrimus, jam pubescens. Corolla magna, subpollicaris, cyaneo-violacea, fætida. Drupa perfecta vix succosa, 4-loba, putamine co-riaceo lœvi, abortu saepius simplex vel 2-3-loba. (v. s. spec. abyss. in h. DC.)

*β. sylvaticum*, foliis obovatis hirtis præsertim ad venas, calycibus hirto-pubescentibus, floribus minoribus. C. sylvaticum Hochst. l. c. (Krauss. pl. cap. et natal. n. 333) et C. serratum Hochst. ibid. (Krauss. n. 335). Formæ magis pubescentes, in hac familiâ vix tanquam veræ varietates notandæ.

2. C.? *HIRSUTUM* (Hochst. l. c.), fruticulosum vel suffruticosum, ramis foliis que oblongis integerrimis hirsutis, calycis 5-fidi hirti segmentis angustis acutis. ♂ In capite Bonæ Spei, in graminosis planitie inter fl. Umlaas et Natalbay (Krauss. pl. cap. exs. n. 106. c.). Calyce potius ad Volkameriam pertinet, sed corollâ omnino Cyclonematis (Hochst.)

XXXIII. OXERA Labill. sert. Nov. Caled. 1 p. 83 tab. 28. Endl. gen. n. 4133. Fenzl. in Denkschr. d. Regensb. bot. Ges. 3 p. 251 (1841) et Ueber die Stellung der Gattg. Oxera, Vortrag bei der Vers. d. Naturf. zu Grätz (1843) cum tab. 2. — Oncomia Spreng. syst. cur. post. 18.

Calyx 4-partitus, subcoriaceus, laciiniis (æstivatione valvatis) æqualibus. Corolla infundibuliformis, ventricosa, curviuscula, limbi 4-fidi lobo superiore subminore integerrimo, inferiore porrecto paulo majore. Stamina 4, corollæ tubo inserta, didynamia, declinata, duo postica profundius inserta, fertilia antica sterilia; filamenta filiformia, basi incrassata, fertilia longe exserta incurva, sterilia inclusa recta. Antheræ biloculares, loculis parallelis liberis infra apicem coadunatis, staminum steriliū linearibus subunilocularibus. Ovarium disco carnosō sublobato impositum, 4-loculare, profunde 4-lobum, lobis parallelis a basi liberis ovatis obtusissimis. Ovula in loculis solitaria, apice spermophori crassi laminæformis retroflexi funiculo papillæformi supra medium inserta, amphitropa, clavata, micropyle basim loculi spectante. Stylus inter ovarii lobos transiens, filiformis, declinatus, exsertus; stigma bifidum, laciiniis æqualibus acutis. Fructus... — Genus ex inflorescentiâ mere viticium, corollâ, staminibus et ovario 4-lobo perinsigne. Quæ vero ovarii divisio, sane minus perfecta, in multis Clerodendri speciebus reperitur, cui generi etiam habitu, foliis, inflorescentiâ et omni germinis conditione proxime convenit. Clerodendra § 3 racemiflora corollæ irregularitate incipient et staminum situ transitum ad Oxeram et Cyclonema indigitant, magisque vero Oxeræ corollæ illi Amazoniæ conformis.

O. PULCHELLA (Labill. l. c.) ♂ In Novâ-Caledoniâ. Oncomia pulchellum Spreng. l. c. Frutex (glaber) ramis teretiusculis ad nodos paulo incrassis et compressis verrucosis. Folia opposita, brevipetiolata, ovali-oblonga integrerrima obtusa. Cymæ citra basin ramulorum axillares, solitariæ, pedunculo petiolum subæquante, bis-ter- trichotomæ. Bracteolæ subfoliaceæ sursum decrescentes, lanceolate. Flores magni, longe pedicellati, nutantes. Calyx semipollicaris, fere usque ad basin 4-partitus, laciiniis oblongis acutiusculis. Corolla bipollicaris, magnit. et formâ fere ea Digitalium purpureæ seu ambiguae similis, ventre convexo, labio superiore interne pubescente, lobis subrotundo-ovatis obtusis. Stamina ventri corollæ incumbentia, adscendentia, longe exserta, stylum subæquantia.

XXXIV. AMAZONIA Linn. fl. suppl. p. 294. Endl. gen. n. 3711. Meisn. gen. p. 292 et comment. p. 200. Schauer in Mart. et Endl. flor. bras. c. icon. — Taligalea Aubl. guian. 2. p. 625 t. 252.

Calyx campanulatus, patens, semiquinquefidus, laciinis subæqualibus. Corolla tubulosa, tubo elongato sursum sensim ampliato leviterque curvato, limbo brevi reflexo laciñā quintā infimā reliquis majore. Stamina 4 didyma, in inferiori tubo corollæ inserta; filamenta longissima, exserta; antheræ oblongæ, supra basin semibifidam connectivo dorsali adnatæ, biloculares, loculis rimā longitudinali dehiscentibus. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, filiformis, exsertus; stigma bifidum. Drupa calyce aucto membranaceo semivelata, succosa, epicarpio firme, 4- vel abortu 4-3-pyrena, pyrenis distinctis unilocularibus, putamine coriaceo. Semen erectum, cotyledonibus crassis oleosis applicitis, radiculâ brevissimâ inferâ. — Arbusculæ, frutices et suffrutices, caulinis ramisque inferius nudis superius foliis approximatis coronatis paniculâque pedunculatâ terminatis, foliis alternis suboppositivis, paniculâ racemiformi erectâ subsecundâ e cymis trichotomis confertâ et bracteis plerumque foliaceis coloratis dorsoque glandulis pellucidis grossiusculis consitis interstictâ, corollâ flavescente. — Genus Clerodendro maxime affine, a quo præter habitum peculiarem vix differt nisi corollæ conditione.

1. A. ERECTA (Linn. fil. 1. c.), suffruticosa, caulinis simplicibus cum inflorescentiâ pubescentibus hirtellisive, foliis lanceolato-oblongis obovatovirae acutis basi cuneatâ in petiolum brevissimum attenuatis inæqualiter acuminato-dentatis scabris aut strigoso-pubescentibus-hirtisive, bracteis ellipticis subintegerimis cymâ brevioribus, cymis subtrifloris, calycis laciinis basi contiguis.  $\Sigma$  In campus sterilibus Guiana brit. (Rob. Schomb.! n. 228, Rich. Schomb.! n. 1169) et Gallica (Aubl., Leprieur!) et Venezuela (Moritz! n. 623) — Vahl, eclog. 2 p. 51. Taligalea campestris Aubl. Guian. 2 p. 625 t. 252. Plantæ quam reliquæ species minor. Caules 2-3-pedales, pennæ columbinæ crassitiae, inferne nudi, foliis congestis superne coronati, pedunculo foliis aliquot minutis consito terminatis. Folia 3-4-pollicaria, (ut in reliquis) membranacea, costâ validâ subtus prominentia. Bracteæ flores minime celantes, interdum perexiguae, ex rubro et luteo eleganter variegatae. Pedunculi nunc uniflori, nunc 3-5-flori. Corolla  $\frac{1}{2}$  poll. longa, tubo puberulo, limbo exiguo subæquali. Genitalia longe exserta. Drupa mole pisi, atra, lævis. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)
2. A. PUMICEA (Vahl eclog. plant. 2 p. 51), caule fruticoso cum inflorescentiâ pubescente, foliis oblongo- vel elliptico-lanceolatis breve acuminatis basi cuneatâ in petiolum attenuatis irregulariter angulisque grossis obtusis mucronulatis repando-dentatis supra pube exili conspersis demumque glabratris reti subtus vel totâ paginâ pubescente, bracteis foliaceis coloratis ovalis vel ovato-oblongis cymam æquantibus superantibus denticulatis, cymis subtrifloris, calycis laciinis basi contiguis.  $\Sigma$  In America æquinoctiali: in silvis Orinocensis prov. Javitam (H. et B!), in Brasiliâ locis humosis ad flumina prov. Para, Piauhy et Rio-Negro (Mart.). — A. arborea H. B. Kunth! nov. gen. et sp. 2 p. 253 (ex specimine auth. herb. Willd. n. 115151). Folia tenuiter membranacea, 3-12 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -3 poll. lata. Panicula elongata bracteis punciceis floribusque flavis spectabilis. Calyx campanulatus, 4 lin. longus, laciiniis basi contiguis subimbricatis neque replicatis oblongo-lanceolatis tenuiter acuminatis. Proxima praecedenti et vix diversa nisi magnitudine foliorum et bractearum. (v. s. in h. Willd. et Mart.)
3. A. VELUTINA (Schauer in fl. bras. ined.), ramulis, inflorescentiâ foliorum que costâ velutinis, foliis lanceolato-oblongis subacuminatis basi cuneatâ in petiolum brevem attenuatis inæqualiter angulisque obtusis grossisque mucro-

nulatis dentatis utrinque puberulis, bracteis ellipticis cuspidato-serratis iutergerimisve cymâ brevioribus, cymis subtrifloris, calycis lacinii basi continens. ♂ In Brasiliæ prov. Soteropolitanâ (Blanchet! pl. bras. exs. n. 3156). Distincta a reliquis pube velutinâ, imprimis inflorescentiæ, et bracteis floribus que minoribus. Folia tenera, 8 poll. circ. longa, 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo semipollucari. Bracteæ coloratæ, utrinque velutino-pubescentes. Calyx 3 lin. longus, lacinii triangularibus acutissimis ciliatis. Corolla glanduloso-pubescentes, tubo semipollucis nonnihil longiore, limbo brevissimo reflexo. (v. s. in h. DC.)

4. A. LASIOCAULOS (Mart. et Sch. iu fl. bras. ined. cum ic.), caule suffruticoso subsimplici cum inflorescentiâ villosa, foliis oblongo-lanceolatis breviter acuminatis hasi cuneatâ in petiolum attenuatis irregulariter dentato-serratis utrinque scabridis reti suhtus puhecente, bracteis ellipticis in petiolum brevem acuminatis inferioribus cymas suhæquantibus, cymis multifloris, calycis lacinii basi productis coherentibusque ad sinus in angulum acutum replicatis. ♂ In silvis juxta flumen Amazonum in prov. Paraënsi Brasiliæ (Mart.). Habitu præcedentibus admodum similis, distincta villo caulis et paniculæ uberiore, calycis indole, floribus paulo majoribus. (v. s. in h. Mart.)
5. A. HIRTA (Benth. in Ann. of nat. hist. 2 p. 451), tota villoso-hirsuta, caule suffruticoso erecto subsimplici, foliis lanceolato-vel obovato-ohlongis vix acuminatis basi longe cuneatâ in petiolum attenuatis, bracteis ellipticis, cymis subtrifloris, calycis lacinii marginibus ad basin reflexis. ♂ In Gulanâ brit. (Schomb.) et in Brasiliâ æquinoctiali (Mart.! herb. fl. bras. n. 583, Pohl!). Planta 2-3-pedalis. Folia 4-6-pollicaria long., 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lat., magis minusve dentibus grossis triangularibus incisis. Bracteæ pollicares, coloratæ, cymâ breviores aut longiores. Calyx 4-5 lin. longus, amplius, lacinii triang. acutissimis. Corolla subglanduloso-puhescens, tubo subpollicari. (v. s. in h. Mart., cæs. vindob. et DC.)
6. A. ANGUSTIFOLIA (Mart. et Sch. l. c., ined.), tota hirto-villosa, caule herbaeо erecto subsimplici, foliis lanceolatis aoutis hasi valde attenuatâ sessilibus irregulariter denticulatis complicatis, bracteis lancolatis cymâ brevioribus, cymis subtrifloris, calycis lacinii sinu acuto distinctis. ♀ In campus Brasiliæ mediterraneæ, e. g. prov. Goyaz et Piauhy (G. Gardn.! coll. 1837 n. 3411). Præcedenti non dissimilis, cæterum vero insignis foliis, bracteis, floribus, indumento. Folia 4-pollicaria. Calyx 4 lin. longus. Cor. calyce duplo longior. (v. s. in h. Mart.)

#### *Species excludenda.*

- A. INTEGRERRIMA (Spreng. syst. 2 p. 765). — Bravaisia florihunda (DC. prodr. 9 p. 240). Planta ob habitum et ovarii conditionem certe non inter Verbenaceas, sed etiam nostro judicio inter Bignoniacæas duhias collocanda, donec fructus innotuerit (Cfr. adn. Alph. DC. l. c.)

- XXXV. GMELINA Linn. gen. n. 763. Juss. gen. p. 108. Endl. gen. n. 3704. Meisn. gen. p. 291. et comm. p. 200. Gartn./fruct. 1. 268. t. 56. Lam. illust. t. 542. Roxb. plant. corom. t. 32. Michelia Ammann in act. petrop. 8. 218. t. 18, non L.

Calyx cyathimorphus, 4-5-dentatus, persistens, sub fructu paulo auctus in anticâ parte saepius glandulas nonnullas sessiles verruciformes gerens. Corolla basi tubulosa, faucibus valde ampliatis ventricoso-campanulata, obliqua; limbus patens bilabiato-quadrifidus, lobis tribus superioribus subæqualibus supremo fornicato lateralibus planis, quarto infimo maximo interdum bilobo. Stamina 4, didynama, ascendentia, vix exserta. Antheræ biloculares, loculis linearibus connectivo dorsali apice insertis postice (imprimis staminum longiorum) distinctis, rimâ longitudinali dehiscentibus. Ovarium 2-4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis; stigma in-

æqualiter bifidum. Drupa baccata, monopyrena, 2-4-locularis, putamine osco basi perforato lævi. Semen erectum.—Frutices vel arbores interduni magnæ, ex Indiæ orientali ejusque Archipelago, ramis sæpius spinosis, foliis simplicibus oppositis integerrimis lobatis. Inflorescentia cymoso-paniculata; panicula racemiformis, aut composita e cymulis brevibus decussatis paucifloris aut cymulis ad unum florem pedicello bibracteolato fultum reductis racemum simplicem mentiens. Bractæ sæpius caducae. Corolla conspicua. Drupa magna oblonga. —Genus Vitici affine sed distinc-tissimum.

1. G. PARVIFOLIA (Roxb. pl. corom. 2. p. 32. t. 162), spinosa, foliis petiolatis subrombeo-ovobovatis obtusis emarginatis postice cuneatis integerrimis vel 3-5-lobis lobis triangularibus obtusiusculis glabratibus supra nitidulis subtus glaucis, paniculis racemiformibus terminalibus farinaceo-tomentosis paucifloris bracteis caducis, calyce pedicellato brevissime 4-dentato antice pluriglanduloso. ♂ Hab. in Indiâ orientali, vulgaris in omni orâ Coromand. (Roxb., Wall.! Edgew.!), copiose circa Pondichery (Perrottet!). G. Coromandeliana Burm. fl. ind. 132. G. lobata Gartn. fr. 1. 268. t. 56.? —Pluk. alm. t. 14. fig. 4. Prema parvifolia Roth nov. spec. plant. 288, ex descript. Frutex dumosus suberectus, 5-10-pedalis (Perrott.). Ramuli stricti, novelli farinaceo-tomentosi, mox glabri, spinae subulatæ, subpollicares, sæpe foliiferae. Folia 4-12 lin. longa, lobata, figurâ illis Hederæ helicis non dissimilia. Paniculæ cymulæ sæ-pissime unifloræ (ut inflorescentia vero racemo similes evadat) rarius trifloræ. Calyx cyathiformi-campanulatus  $2\frac{1}{2}$  lin. longus. Corolla lutea speciosa, sescun-diam æquans neque non superans, extus puberula, et tubi basi angustâ in fauces amplissimas ventricoso-dilatata, linibi lobis magnis patentibus ovato-rotunda-tis, infimâ maximâ. Drupa succosa nucis Avellanae magnitudine. Aff. G. asia-ticæ, sed foliorum figurâ tomentoque paniculæ corollâque uberrime diversa. (v. s. in h. DC.)
2. G. ASIATICA (Linn. spec. p. 873), spinosa vel inermis, foliis petiolatis ovalibus vel subrhombœo-ovalibus triangulari-acutis integerrimis vel utrinque lobolaterali novellis subtus tomentellis adultis glabratibus supra nitidis subtus glaucis, racenis terminalibus axillaribusque pubes appressâ tomentosis, bracteis foliacies cuspidatis calyce duplo triplo longioribus, calyce pedicellato brevissime 4-dentato antice glanduloso pluribus discoideis prædicto. ♂ In tofâ fere Indiâ orientali (Roxb., Wall. n. 1818!). G. (Asiatica?) Philippensis Cham. in Linnæa 7 p. 109. Gmelina inermis Blanco fl. de Filippin. p. 493? Michella spinosa A.M. act. petrop. 8. p. 218. t. 18. Ramuli stricti primâ ètate villosuli; spinae axillares, breves, sæpius foliiferae. Folia pollicaria-sesquipollucaria, petiolo semunciali. Calyx sesquilineam longus. Corolla speciosa, lutea, extus rufo-pubescent, intus glabra, sesquipollucaris, tubo inferne semipollucari longitudine angusto curvato in fauces ventricosas ampliato, labio inferiore maximo. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)
3. G. VILLOSA (Roxb. fl. ind. ed. 1832 3. p. 86), spinosa, ramulis villosis, foliis petiolatis subrhombœo-ovalibus acutiusculis integerrimis supra glabratibus nitidu-lis subtus canescens-tomentosis, paniculis terminalibus racemiformibus pauci-floris tomentosis, bracteis foliacies cuspidatis, calyce pedicellato obsolete 4-den-tato antice pluriglanduloso. ♂ Crescit in Indiâ orientali, in ins. Pulo-Pinang (Boxb.!), in Javâ ins. (Zolling. pl. jav. n. 555). G. elliptica Sm. in Rees cycl. vol. 16. Radix deipara Rumph. amb. 2. p. 124. t. 39. Arbuscula ex Roxb. hu-manæ altitudinis, ramis numerosis pendulis. Folia 1-4-pollicaria, 1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, interdum sublobata, petiolo  $\frac{1}{2}$ -1 unciam æquante. Flores nutantes, iis Gmel. Asiaticæ omnino similes, nonnihil minores, obscure lutescentes, ferrugineo-puberuli. Drupa carnosa, cerasi mole, lutea. Proxima certe G. Asiaticæ, sin modo foliis subtus tomentosis, ramis pedulis diversa. (v. s. sp. unic. auth. in h. DC. a. cl. Lambert. comm.)
4. G. OBLONGIFOLIA (Roxb. fl. ind. ed. 1832 v. 3. p. 83), arborea, foliis oblongis

- ovalibusve integris subrugosis obtusiusculis utrinque ad nervorum basin glanduloso-impressis, paniculis terminalibus solitariis decussatis, bracteis parvis caducis, calyce cyathimorpho integro. 5 In Bengaliâ orient. (Roxb.), coriace cinereo rugoso. Ramuli subquadrangulares. Petioli biplicares, canaliculati. Folia 6-12 poll. longa, 3-8 poll. lata. Paniculæ magnæ ramifications ferrugineo-pulverulentæ. Flores numerosi, magni, rosei, fragrantes. Calyx extus pulverulentus parceque glandulosus. Drupa oblonga, obtusa, subtetragona, glabra, pyrenæ tetrangonæ clavatæ quadriloculæ.
5. G. ARBOREA (Roxb.! fl. ind. ed. 1832 v. 3. p. 84), arborea, inermis, ramulis foliisque novellis tomento fñrinaceo cinerascentibus, foliis longe petiolatis cordatis basi paulo productâ acutâque acuminatis integerrimis adultis supra glabris subtus tomento raso cinereis basi 2-4-glandulosis, paniculis tomentosis terminalibus axillaribusque racemiformibus, cymulis decussatis trichotomis paucifloris, bracteis lanceolatis deciduis, calyce acute 5-dentato eglanduloso. 5 In Indiæ orient. regionibus montosis (Roxb.! Wall. cat. n. 1817! Edgeworth! Perrottet!). Premna arborea Roth nov. plant. spec. p. 287, ex descr. Cum bula Rheed. hort. malab. 1. t. 41. Folia 4-10-poll. longa, 2-7 poll. lata, petiolo 2-3-pollicari. Paniculæ semipedales et breviores angustæ cymulis brevipedicellatis paucifloris immo ad unum florem reductis. Flores magni, nutantes. Calyx campanulatus 2 lin. longus. Cor. lutea, subpollicaris (in specim. a cl. Perrot. in Nilghiricis mont. lectis autem fere biplicariis) extus tomentosa, tubo calyce paulo longiore exinde in fauces lato-infundibulares ampliato, limbi lobis 3 superioribus ovato-rotundatis, inferiore majore bifido. Filamenta 2 longiora incurvata antheris bifidis labium-superius æquantia. Drupa nucis Avellanæ matoris mole succosa, ovalis, matura flava. (v. s. in h. DC.)
6. G. MACROPHYLLA (Wall.! cat. n. 1819), foliis (amplis) coriaceis petiolatis elliptico- vel obovato-subrotundis brevissime acuminatis obtusisve integerrimis adultis supra præter nervos tomentoso-glabratis nitidulisque subtus in reti lanuginoso-pubescentibus, paniculâ.... 5 Hab. in Amboinâ (Wall.! ex hort. Calcutt.). Folia majora pedem longa, 9 poll. lata, petiolo triplicari, subtus prominenti-nervosa et venoso-reticulata, pube ferruginea. Corolla extus pube appressâ dense ferrugineo-vestita, pollicaris, 5-fida, lacinis 3 super. subæqualibus oblongis, infimâ maximâ bifidâ laciñis divergentibus (v. spec. incompl. in h. DC.)
7. G. SPECIOSISSIMA (D. Don, prodr. fl. nepal. p. 104), arborea inermis, foliis ellipticis acutis subtus tomentosis, paniculâ terminali maximâ, calycibus 4-lobis obtusis. 5 In Nepaliâ. G. Tacabuska Hamilt. mss. Truncus crassitie corporis humani. Folia palmaria. Paniculæ a foliis sâpe remotæ 2-3-pedales.

+ Species non nisi nomine cognitæ.

G. FINLAYSONIANA Wall.

G. SINUATA Link.

G. VESTITA Wall.

XXXVI. CORNUTIA Plum.! gen. 32. icon. 96. 106. fig. 1 (1). Linn. hort. Cliff. 319. Lam. illustr. t. 541. Gartn. fl. fruct. 3. 172. tab. 213. Bot. mag. t. 2611. Endl. gen. n. 3714. Meisn. gen. 292 et comm. 200. nec N. L. Burm. Hösta Jacq.! hort. Schoenbr. 1. 60. tab. 114. Bot. Reg. 1204. Rchb. fl. exot. t. 284. Endl. gen. n. 3697. Meisn. gen. 200 et comm. 199. Hostana Pers. en-chir. 1. p. 143.

Calyx cupuliformis vel cyathimorphus, 4-5-fidus-dentatusve, dentibus

(1) Icon Plumieri Cornutiæ pyramidatam evidenter exhibet et habitum stirpium hujuscæ generis optime exprimit. Fructus autem Plumierum fefellit, qui pyrenæ pro semine habità in ea quoque erravit quod filamenta antheræ exscita pro stylo bipartito sumeret. Quamobrem Jacquinus (ut recte jam conjectit Willd. sp. pl. 3 p. 322) pyrenæ conditione in aliâ specie rite exploratâ idem genus novo nomine denuo proposuit. Brownius itaque in errore versabatur, quium Hostam a Cornutiâ toto celo distare asseveraret (Prodr. fl. Nov. Jfll. p. 511 adnot. ad Vitaceen.)

imprimis superioribus saepius obsoletis. Corollæ tubus subinfundibularis leniter curvatus, limbus patens, subhypocraterimorpho-bilabiatus, 4-lobus, lobis 3 superioribus subæqualibus, infimo paulo majore porrecto. Stamina 4, corollæ tubo inserta, didynama; 2 fertilia longiora interdum exserta; 2 ananthera inclusa. Antheræ (peractâ anthesi saepius deciduae) reniformes, subdividymo-biloculares, loculis rotundatis basi divergentibus rimâ longitudinali hiant dehiscentibus. Germen 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis, staminibus nunc longior nunc brevior. Stigma brevissimum et inæqualiter bifidum, crure altero obsoleto altero reverso brevi-rostellatum. Drupa pisiformis, succosa, monopyrena, pyrena 4-vel abortu 3-4-loculari, putamine basi perforato osseo rugoso. — Frutescæ Americae tropicæ, pube simplici et saepius glandulis punctiformibus consiti, odoriferi. Rami crassiusculi tetragonoi. Folia simplicia integrifolia vel dentata. Panícula terminalis pyramidato-thyrsoidæ, ramis decussatis trichotomo-cymosis multifloris, inferioribus interdum folio subtensis, superioribus subnudis. Corolla violacea. — Genus Vitici proximum, specierum habitu insigniter consimili.

1. C. PYRAMIDATA (Linn. sp. p. 875), foliis late elliptico- vel subrotundovalvis utrinque breviter acuminatis usque ad basin petioli brevis decurrentibus integerrimis adultis supra præter nervos tomentellos obsolete puberulis subtiliter glanduloso-punctatis subtus venoso-reticulatis pubeque molli torsâ tomentosis canescitibusque, panícula terminali elongato-pyramidalata cano-tomentosa, calyce enupuliformi truncata obsoleta 4-dentatula, corollæ tubo infundibulari. ♂ In Antillis (Plum. Sieber! fl. mart. n. 158. Bertero!), in littore Campechensi Mexicanorum (Linn. H. et B., Hartw.). Cornutia Plum.! ic. tab. 106. fig. 1. Hosta pyramidata A. Dietr. sp. pl. 1, p. 253. Hosta cerulea Walp.! repert. 4, p. 80, fide specim. excl. syn. Hosta latifolia H. B. Kuntz nov. gen. et sp. 2, p. 248 (ex descr.). — Benth. pl. Hartw. n. 610. Ramuli acute quadrangulares subpulverulento-tomentosi. Folia subcoriaceo-membranacea 3-4 poll. longa, 2-3 poll. lata, petiolo semiuncialis, venarum reti supra vix impresso, subtus prominulo. Calyx unam lineam longus. Cor. tubus calyce subter fere longior, sursum sensim in fauces ampliatus. Stam. fertilia exserta, sterilia iuclusa. Stylus fauces paulo excedens; stigma vix apice subcurvo emarginato-bilobum. (v. s. in h. cl. Luca berol.)
2. C. ODORATA (Poeppig! pl. exs.), foliis lato- vel subrhombœo-ellipticis utrinque acuminatis in petiolum longum margine perangusto decurrentibus integerrimis supra demum glabriusculis nitidulis subtus pallidis subtiliter glandulosopunctatis puberulisque, panícula terminali elongato-pyramidalata cano-tomentosa basi foliosâ, calyce campanulato postice breviter trilobo antice bidentata, corollæ tubo cylindrico. ♂ Hab. in Americâ æquinoctiali, in Columb. prov. Maynas ad Yurimaguas (Poeppig!). Hosta odorata Poepp. et Endl. nov. gen. et sp. 3, p. 63 t. 269. Folia membranacea ampla, laminâ majorum 9-12 poll. longa, 5-6 poll. latâ, petiolo subtriplicari. Calyx sesquilineam longus, latiuncule campanulatus, subtruncatus, lobis latâ rotundatis dentibus acutis approximatis, utrinque saepius obsoletis. Cor. violacea, tubo 3 lin. longo, limbo resupinato, lacinias labii super. trilobi ellipticis, labio inf. emarginato. Drupa ex Poepp. vix pisi magnit. putamine ad verticem obsolete 4-verrucoso. Folia et flores odore suavi, Salvia officinalis simili prægnantia. (v. s. in h. DC.)
3. C. CAYENNENSIS, foliis ellipticis in acumen attenuatis basi cuneato-angustatâ in petiolum decurrentibus integerrimis utrinque subtiliter glanduloso-punctatis adultis supra obsolete pubescentibus subtus tenuiter puberulis glaucescentibus, panícula terminali elongato-pyramidalata pulvlerulento-tomentosa, calyce cyathimorpho subæqualiter 4-fido, corollæ tubo gracili. ♂ In Guianâ Gallicâ (Leprieur! Perrottet!). Ramuli tetragonoi, subulato-marginati, appresse pu-

beruli. Folia membranacea, 6-12 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$ -4 poll. lata, petiolo basi usque ad pollicis longitudinem anguste marginato. Calyx sesquilineum longus, subbilabiatus, lobis manifestis ovatis obtusiusculis. Cor. tubus 4 lin. adæquans, graciliter cylindricus leviter curvatus; limbi lobi 3 super. subtundido-elliptici, infimus major subunguiculatus orbioulatus coocavus. Stamina fertilia brevisime e faucibus exserta. Stylus longe exsertus, apice inclinatus, stigmate obliquo brevissime inæqualiter bilobo rostellato terminatus. Drupa pisiformis succosa, putamine rugosus. (v. s. in h. DC.)

4. C. PUNCTATA (Wild. sp. 3, p. 322), foliis ovatis vel ovato-ellipticis utrinque attenuato-acuminatis in petiolum decurrentibus integerrimis dentatisve adultis utrinque glabriusculis et subtiliter glanduloso-punctatis supra nitidulis subtus pallidis, paniculâ terminali pyramidatâ pube appressâ canescente basi folioœ, calyce cupuliformi subbilabiato-4-dentato, corollæ tubo cylindrico brevi. ♂ Hab. in Antillis, Jamaiœ (Tussac). — Bot. mag. t. 2611. Cornutia pyramidata Ait. hort. kew. 2, p. 353, non L. Hosta cœrulea Jacq. hort. Schœnbr. 1, p. 60 t. 114. Bot. reg. t. 1204. Hostana cœrulea Pers. ench. 2, p. 143. Folia membranacea, majora semipedem longa, 3 poll. lata, petiolo pollicari tenuissime puberulo. Paniculæ cymæ inferiores folio bracteante breviores. Calyx lineam longus, dentibus acutis sinibus latis arcuatis interstictis, cum corollâ subter pube punctatis. Cor. cœrulea, tubo calyce paulo quam duplo longiore. (v. v. c. et s. sp. in h. DC.)
5. C. GRANDIFOLIA, foliis late ovatis sinuato-dentatis integerrimisque in petiolum decurrentibus supra hirto-pilosis subtus tomentosis, corollis pubescensibus. ♂ In silvis Mexicanis prope Xalapam. Hosta grandifolia Cham. et Schlecht. in Linnaeâ 5, p. 97. Hosta grandiflora A. Dietr. sp. pl. 1, 252. Rami obsolete tetragoni. Folia 6-7-pollicaria long., 4-poll. lat., petiolo circiter pollicari. Flores cœrulei.
6. C. LONGIFOLIA (Spr. syst. 1, p. 39), foliis ovato-oblongis postice in petiolum decurrentibus angustato-acuminatis coriaceis reticulato-venosis supra pubescenti-birtis subtus incano-tomentosis, paniculâ terminali (4-pollicari) tomentoso-pubescente, calyce campanulato obsolete dentato, corollâ glabra tubo cylindraceo. ♂ Crescit in regno Mexicano? Hosta longifolia Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 247. Ramuli tomentoso-pubescentes. Folia 4-5-pollicaria,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, petiolo 8 lin. longo. (ex Kunth)

### *Species exclusæ.*

C. CORYMBOSA Burm. = *Premna serratifolia*.

C. CORYMBOSA Lam. = *Premna tomentosa*.

XXXVII. VITEX Linn. gen. n. 790. Endl. gen. 3700. Meisn. gen. p. 201 et comment. p. 199. Cham. in Linnaeâ 7 p. 107. Schkuhr Handb. t. 177. Fr. Nees ab E. gen. pl. fl. germ. fusc. 23. — Wallrothia Roth nov. pl. spec. p. 317. — Limia Vandelli in Rœmer script. hisp. p. 126 t. 7 f. 21. — Nephrandra Cothen dispos. 8. — Psilogyne DC. rev. bign. p. 16. — Cbrysomallum Thouars gen. madag. n. 25. — Pyrostoma F. W. Meyer l' prim. fl. essequib. 119. — Casarettoa Walp, repert. 4 p. 91.

Calyx cyathimorphus, campanulatus aut tubuloso-infundibuliformis, 5-dentatus aut 5-fidus, dentibus laciniisve paulo inæqualibus. Corolla bilabiata, labio superiore bifido, inferioris trifidi laciniis lateralibus quam superiores paulo majoribus, laciniâ intermediâ vero reliquis amphore atque porrectâ; fauibus saepius campanulato-inflatis. Stamina 4, didynamica, corollæ tubo inserta adscendentia, exserta; antheræ obcordalæ, loculis basi discretis, rimâ longitudinali dehiscentibus. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, filiformis, apice bifidus cruri-

bus acutis. Drupa calyci aucto et plerumque dirupto insidens, succosa, monopyrena, 4-locularis, putamine lignoso. Seminis erecti cotyledones applicitæ, radicula brevis infusa. — Arbores aut frutices partim gerontogea, partim Americana, zonam torridam et calidam utriusque hemisphaerii, imprimis vero australis habitantia, ramulis foliisque novellis cum inflorescentia pubescentia evanescente indutis. Folia opposita, plerumque digitata, rarissime abortu foliolorum lateralium simplicia. Cymæ trichotomæ vel simplices, axillares vel paniculatæ. Drupa complurium Americanarum mucilaginosa, edulis.

#### Sectio 1. EUAGNUS.

Calyx cyathimorphus, campanulatus vel patellaris, ore brevi truncato aut 5-dentato. Corollæ labium superius erectum vel resupinatum, bifidum.

§ 1. *Paniculatæ*. — *Cymæ in paniculas collectæ*. — Agnus-castus,  
Sect. Viticis, Endl. l. c.

\* *Paniculae compositæ terminales*. — Species fere omnes gerontogæ.

1. V. *TRIFOLIA* (Linn. suppl. 293), ramulis foliorumque facie pube pulveraceæ exili subevanescente canescutibus, foliorum dorso paniculâque tomento albitoideo raro candicantibus, foliis petiolatis trifoliolatis simplicibusve, foliolis obovato-oblongis obovatissime acutis obtusisque basi plerumque longe attenuatâ sessilibus integerrimis supra demum subglabratibus, paniculâ terminali cymis pedunculatis erectis angustâ, calyce cyathimorpho breviter et acute repandendato. ♂ In littoribus ac ripis in Sechellensis ins., Indiâ orientali ejusque Archipelago, in Chinâ austr. Japoniâ et Novâ Hollandiâ intra tropicos. Flores magnitudine nonnihil variabilis. Cor. extus pulverulenta, tubo infundibulari calyce 5-nervi duplo fere longiore, labio inf. porrecto in ungue villoso. Genitalia exserta. Drupa pisi magn., atra. Variat et quidem in uno eodemque ramo, foliis trifoliolatis bifoliolatis et simplicibus.

$\alpha$ . *trifoliolata*, foliis plerumque trifoliolatis rarius simplicibus supra viridibus subglabratibus, foliolis foliisque simplicibus, plerumque acuminatis acutisve, his plerumque subellipticis basique subrotundata abrupte petiolatis, paniculâ longiore nudâ. V. *trifolia* Linn. l.c. V. *integerrima* Miller dict. n. 3. *Lagonium vulgare* Rumph. h. amb, 4, 48 t. 18. *Caranosi Rheede* hort. mal. 2, 13 t. 10. *Vitex trifolia*, etc. Pluken. alm. 390 t. 206 f. 5. — Hab. in ins. Mauritii (Sieber! fl. maur. exs. 2. n. 283), in Indiâ or. ad ripas fl. Irawaddi (Wall.! cat. n. 1743) et in Archipelago Indico e. g. in Javâ (Jungh.!), Sumatrâ (h. DC!), Timor (mus. paris.), Luconia (Cham.! Meyen! Cuming! exs. n. 1493) et in Novâ Hollandiâ (R. Br.). (v. s. in h. DC. et reg. berol.)

$\beta$ . *unifoliolata*, caule decumbente radicante, foliis omnibus simplicibus ob-ovatis basi cuneatâ in petiolam brevem abeuntibus plerumque obtusis rotundatisve supra magis canescutibus, paniculâ plerumque rariore basique foliosâ. — Crescit in insula Mauritii (Sieber!) et in littoribus arenosis Luconiae ad Cavite (Cham!) utroque loco unâ cum formâ  $\alpha$ , in Chinâ ad promont. Syng-moon (Meyen!) et circa Cantonem (Millet, Vachell n. 174), in Japoniâ (Thunb., Gœring!). in oris marit. Nov. Holl. trop. (R. Br.), in ins. Oweehe (Macrae!). V. ovata Thunb. fl. jap. 257. Hook. et Arn. in Beech. voy. bot. 206 t. 47, V. repens Blanco fl. de Philipp. 513. Haec per se quidem satis insignis videtur, qua specie distinguatur, sed flore non differt a primitivâ formâ, cuius contubernio sepiissime gaudent, et foliorum figurâ quoque vario transitu cum illius varietatibus nec titur. Formam stirpis uti videtur exhibet arenariam, locis inundatis nascentem. (v. v. c. et s. sily. in h. r. berol!, Luce et DC.)

2. V. *BICOLOR* (Willd. enum. hort. ber. p. 606), ramulis paniculâ foliorumque pagina inferiore tomento denso albitoideo raso candicantibus, foliis petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis longe acuminatis basi acutis medioque mediisve longe petiolatis integerrimis rariusve grosse crenato-

incisus, paniculæ terminali pyramidata, cymis pedunculatis patulis corymbosis ebracteolatis, calyce cyathimorpho breviter repando-dentato, corollæ calyce duplo longiore fauce subinflatâ labio inferiore prorecto basi lanuginoso. ♂ In Indiâ orientali (Wallich! cat. n. 1744 : V. Negundo), ad Bombay (P. Roux!), ad Ambale (Edgew! fol. integerr. et crenatis. h. Willd! n. 11709). Differt insigne modo a V. Negundo, indumento, paniculâ, calyce. Foliola tenuiter penninervia, intermedia subtriplicaria, exteriora sensim minora et brevius petiolata. Paniculæ singulæ sursim attenuatae. Bracteolæ minutæ, præ anthesi deciduae. Calyx brevissime pedicellatus, lineam fere longus. Cor. extus puberula; limbi lobi rotundati; labio inf. convexo basi maculâ conspicuâ barbatâ. Genit. longe exserta. Drupa pisi magn., atra. (v. s. in b. Willd. et DC.)

3. V. AGNUS-CASTUS (Linn! sp. 890), undique pube alphitoideâ rasâ vestita, foliorum dorso paniculâque candicantibus, foliis longe petiolatis plerumque 5-foliolatis, foliolis lanceolatis acuminatis basi attenuatâ subpetiolatis integerrimis vel interdum inciso-serratis, paniculis terminalibus axillaribusque antibrachio interruptis, cymis subsessilibus in verticillastra glomeratis subebracteolatis, calyce campanulato breviter et acute sinuato-dentato, corollæ calyce triplo longiore fauce inflatâ ore glabratâ. ♂ Circa mare Mediterraneum, in bumidis, ad littora, rivulos et torrentes, fossas et vias, sæpius vasta fruticeta constituens; in Galliâ aust. (DC!), Corsicâ et Sardinâ (Thomas!), Hispaniâ in Alpujarras (Boiss!), Siciliâ (Parl!), regno Neap. (Ten.), in littore Adriatico ad Fiume (Noe, Reichb. fl. germ. exs. n. 329) et in Dalmatiâ (Petter!), in reg. calidâ Albaniâ, Macedonia et Thracia alt. 0-12000 p. (Griseb!), in omni Græciâ (Fraas!), in Cretâ (Sieber!) et in littore Asiatico pr. Smyrnam (Fleisch! un. it. 1827), in Ægypto (Bové, Auch.-Eloy!) et Kurdistaniâ (h. DC.); culta in ins. S. Thomæ (C. Ebrenb!), Guadeloupe (Bert!) et Trinitatis (Sieber! fl. trin. n. 320)—Scbk! Handb. t. 177. Sibtb. et Sm. fl. gr. 7 t. 541. Fr. Nees ab Es. gen. pl. fl. germ. fasc. 23. Ludw. ectyp. pl. t. 28. Blackw. h. t. 139. Kniph. cent. 2 p. 99. V. verticillata Lam. fl. fr. V. latifolia Miller dict. n. 2 : forma foliis latioribus.—Αὐγύς Homer, ἡγύος Diosc. 1, 134, ἡγος, αὔγος et ἡγύς Theophr. 3, 17, λαγχρά Neogr. auct. Fraas, syn. pl. flor. class. p. 183. Fratex subborgyalis dilatatus. Foliola interdum sequentia-novena, extimus tum semper minimis sessilibus. Paniculæ anthrum nudum elongatum exhibentes in apice ramorum paniculam compositam patentem struentes. Cymæ bracteolis minutissimis vix conspicuis interstinctæ, compactæ. Corolla pallide lilacina, limbo oblique bilabiata glabra, lacinii ovalibus acutis, superioribus subæqualibus, infimâ majore productâ. Genitalia longe exserta. (v. v. c. et s. silv. in h. DC. alior. que.)
4. V. INCISA (Lam! dict. 2, p. 605), undique pube alphitoideâ rasâ vestitâ, foliorum dorso paniculâque incanis, foliis longe petiolatis 5-7-foliolatis, foliolis lanceolatis acuminatis basi attenuatâ petiolatis profunde pinnatifido-incisis-laciñiativæ ètate utriusque subglabrescentibus, paniculis terminalibus axillaribusque racemiformibus interrruptis, cymis brevipedunculatis corymbosis bracteolis linearibus interstinctis, calyce obconico-cyathimorpho 5-nervi acete 5-dentato, corollæ calyce subduplo longiore tubo infundibulari labio inferiore ad basin lanuginoso. ♂ In montosis lapidosis Mongoliæ Chinensis (Bunge!). — Miller icon. t. 275. f. 1 et 2. h. Willd! n. 11714. V. laciniata Bort! Discriminatur facile a V. agno-casto, cuius formis incisifoliis habita similis, cymis haud glomeratis bracteolatis, floribus minoribus, calycis dentibus longioribus, corollæ barbatâ, propriis his motis accedit ad V. Negundo, quæ vero differt foliorum figurâ pube aliisque. Foliola fol. superiorum interdum integerrima; extima minima. Paniculæ nunc solitariæ nunc in paniculam compositam pyramidatam collectæ. Calyx pedicellatus, basi bracteolâ ipso breviore fultus, lineam fere longus. Corolla pallide lilacina, labio infer. producto concavo. Genitalia exserta. (v. v. c. et s. silv. in h. DC.)
5. V. NEGUNDO (Linn. spec. p. 890), ramulis petiolis rhachiqne paniculæ pu-

bescenti-tomentosis, foliis longe petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis oblongis attenuato-acuminatis basi acutis mediisque petiolatis integerrimis vel grosse vel inciso-serratis penninerviis supra puberulis subtus subcanescentibus et omni pagina vel nervis imprimis pubescentibus utrâque pagina demum subglabrescente, paniculâ terminali compositâ patente, cymis brevissime pedunculatis divaricato-dichotomis bracteolatis tomento velutino candicantibus, calyx obconico-cyathimorpho 5-nervi acute sinuato-5-dentato, corolla tubo infundibulari calyx vix duplo longiore labio inferiore basi sublanuginoso. 5 In ins. Mauritii (Sicber fl. maur. 2. n. 161), Indiâ orientali, Nepaliâ (Wall! cat. n. 1746 V., incisa), Amboinâ (Rumph.), Manillâ et ins. Marianis (Gaudich.), in insulis pr. Macao (Vachell n. 279) et in Japoniâ (Goering!). V. arborea Desf. cat. hort. paris. ed. 3, p. 391. V. paniculata Lam. diet. 2, p. 606. Negundo arbor mas Bauh. hist. 1, p. 189. Benmosi Rheede hort. malab. 2, 15 t. 11. Lagodium littoreum Rumph. h. amb. 4, p. 50 t. 19. Foliolorum nervi paralleli supra leviter impressi; foliola media 2-4-pollicaria long.,  $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{4}$  poll. lata, petiolulo  $\frac{1}{2}$ -1 poll. metiente; lateralia basi attenuatâ subsessilia vel brevins petiolata. Bracteolas subulate. Calyx vix lineam longus, dentibus super. ovatis, infer. lanceolatis, omnibus patulis acutis interdum subcuspidiatis. Corolla extus pulverulenta, labio inferiore prerecto obovato undulato, reliquis lobis brevibus subæqualibus obtusis. Genitalia brviter exserta. (v. s. in h. DC. et Lucæ).

6. V. ALTISSIMA (Linn. fil. suppl. 294), ramulis compresso-tetragonis canaliculatis cum petiolis et foliorum dorso pube brevi lanuginosâ canescentibus foliis longe petiolatis trifoliolatis, foliolis ellipticis vel elliptico-oblongis utrinque attenuato-acuminatis subsessilibus integerrimis coriaceo-membranaceis penninerviis supra tenuiter pubescentibus demumque glabrescentibus, paniculâ terminali compositâ patentí-pyramidalâ tomento denso incanâ, cymis subsessilibus compactis minute bracteolatis interrupte verticillatis, calyce sub-5-fido lobis obtusis patentibus, corollâ parvâ labio inferiore prerecto sublanuginoso. 5 In Indiâ orientali (Klein! herb. Willd. n. 11703, Wall! cat. n. 1755), in Manillâ (Meyen!). V. pubescens herb. Heyn. auct. Wall. l. c., nec Vahl. — Foliola acuminata attenuata nunc breviora nunc elongata; intermedium 4-6-pollicare. Paniculæ partiales elongatae angustæ interruptæ, infimæ axillares. Calyx sessilis sesquilineam fere longus. Corolla tubo calycem paulo excedente. (v. s. in h. Willd., reg. berol. et DC.)
7. V. ALATA (Heyne mss. in Roth nov. pl. spec. 316, ex descr.), ramulis obtusangulis dense subviloso-tomentosis, foliis trifoliolatis petiolo. Itissime alato, foliolis ovatis vel elliptico-oblongis utrinque angustatis acuminatis sessilibus articulatis integerrimis subcoriaceis penninerviis venosisque supra denique glabratris nitidis subtus pubescentibus tomentellis subcanescentibus et dense glandulosopunctatis, paniculâ terminali compositâ patentí-pyramidalâ tomento appresso fulvescente ramis articulatis elongatis, cymis interrupte subverticillatis semel furcatis sessilibus ramis conferte racemulosis bracteolis foliaceis calycem superantibus subimbricatis, calyce suburceolari ore patente 5-dentato. 5 In Indiâ orient. prov. Prome (Wall!). V. limonifolia Wall! cat. n. 1754. Petioli subtripollicares alâ latâ venosa inferne attenuata. Foliola lateralia særissime basi inæqualia extrorsum latiora; intermedium 5-6 poll. et ultra longum,  $2\frac{1}{2}$  poll. latum. Paniculæ rami brachiati in articulo fragiles; cyma pedunculus brevissimus, rami semipollicares floribus sessilibus subsecundis extrorsum bractcolatis consiti. Bracteolas oblongæ acutæ calycem æquantes vel superantes. Calyx lineam longus. Corolla deest. (v. s. in h. DC.)
8. V. PUBESCENTIS (Vahl symb. bot. 3 p. 85), ramulis tetragonis lateribus canaliculato-exaratis petiolis foliisque novellis pubescentibus tomentellis, foliis longe petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis elliptico-vel ovato-oblongis attenuato-acuminatis basi rotundata vel subangustata subsessilibus coriaceis penninerviis venosisque supra demum glabratris nitidis subtus pallidis reti subtiliter puberulo, paniculâ tomento pulveraceo candicante terminali compositâ

ovato-pyramidalē confertā, cymis bracteolis foliaceis calyce longioribus interstinctis, calyce cyathimorpho grosse sinuato-5-dentato corollæ tubo calyce duplo longiore iufato, labio inferiore porrecto basi villosō. ♂ In Indiā orientali, Silhet, Martaban, Tavoy, in littoribus ad Penang et Singapore, in Sumatrá (Roxb., Wall.). in Javā (Blume, Zolling! pl. jav. n. 229). V. arborea Roxb.! hort. bengh. 46. Wall.! cat. n. 1747. Hook. bot. misc. 285. Wallrothia articulata Roth, nov. pl. spec. 317, ex descr. Arbor grandis, ejus ligno durissimo incole utuntur ad aedificia struenda. Foliola raro quinata, magna, 4-6 poll. longa, 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, rigidula. Paniculae partiales sèpius folio bracteate; cymæ racemuliformes multifloræ. Bracteolæ oblongæ acuminatæ. Calyx subsessilis 2 $\frac{1}{2}$  lin. longus. Cor. sub pube glanduloso-punctatæ cœrulæ vel albida, tubo ad staminum insertionem intus lanato, lacinia labii superioris oblongis obtusis divaricatis, inferioris lobis lateralibus reflexis, medio majore subtrotundo concava reliquis obscurius coruleo. Genitalia longissime exserta. Drupa pisi magnitudine, globosa. (v. s. in h. DC.)

9. V. HETEROPHYLLA (Roxb.! hort. beng. 46), ramulis quadrangularibus cum petiolis foliisque glabris subpruinosis, foliis petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis elliptico-oblongis attenuato vel subcuspido-acuminatis in petiolum angustatis integerimis coriaceo-membranaceis undulatis nitidis supra scabriusculis subtus vix pallidioribus dense glanduloso-punctatis, panicula terminali composita multiflorâ pyramidata tomento denso pulveraceo tonso incanâ, cymis corymbosis patulis minute bracteolatis, calyce subpatellari breviter repandodenticulato, corolla calyce subdupo longiore candicantitomentosâ imberbi labiis subequalibus patulis. ♂ In Ind. orient. regno Birman. prov. Rangoon (Wall.) et in insulis Archipelagi Indici, Javâ (Zollinger! pl. jav. n. 603), Manillâ (Meyen!) — Wall.! pl. us. rar. 3. 15. t. 226. et cat. n. 1745! (foliolis quinis, cymis subsessilibus). V. undulata Wall.! cat. n. 1756 (foliolis ternis, cymis longius pedunculatis). Foliola interm. 5 poll. longa, 2 poll. lata, petiole partiali 1 $\frac{1}{2}$ -pollicari. Cymæ brevipedunculata vel subsessiles, dichotomæ ramis patulis divaricative. Calyx pedicellatus lineam altius. Cor. tubus cylindraceus, limbi lacinia imâ rotundato-obtusa reliquis subovatis duplo majore sed vix conspicue longiore inberbi. Stamina labia superæquantia. Stylus exsertus. (v. s. in h. reg. berol. et DC.)

10. V. TIMORENSIS (Walp.! repert. 4 p. 84), glabra, ramis compresso-tetragonis, foliis trifoliolatis longe petiolatis, foliolis petiolulatis ellipticis vel ovato-ellipticis acuminatis basi sèpius inæquali breviter acutis integrerrimis coriaceis penninerviis reticulato-venosis utrinque nitidis subtus pallidioribus subtiliter glanduloso-punctatis, paniculis terminalibus axillaribusque subpyramidalis multifloris puberulis, calyce subsessili cyathimorpho truncato minutissime 5-dentato, corollæ tube campanulato. ♂ In insulâ Timor (Mus. Paris.! et in Philippinis (Cuming! n. 1365 et 1830). V. littoralis Decaisne! in nouv. ann. du Mus. 3. 401, nec A. Cunngh. — Petiolus fol. communis 1 $\frac{1}{2}$ -3 poll. longus. Foliolum intermedium lateralibus nonnihil majus pauloque longius petiolatum; laminâ 1 $\frac{1}{2}$ -3 poll. longâ, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. latâ; petiolulo 4-6 lin. Panicula dorantalis. Calyx lineâ paulo longior. Cor. extus glanduloso-punctata tubus calyce subtroplo longior; limbus rotundiflobus, imo lobo duplo majore; fauces villosæ. Genitalia exserta. (v. s. in h. DC. ex mus. paris. coimm. et herb. cl. Lucæ berol.)

11. V. LOUREIRII (Hook. et Arn. hot. ad Beech. voy. 206. t. 48), ramis foliisque ternis-quinis utrinque glabris, his oblongo- vel obovato-lanceolatis obtuse acuminatis basi cuneatis venosis nitidis integrerrimis, paniculis terminalibus vel ex axillis superioribus pubescentibus erectis decompositis strictiusculis. ♂ Crescit in Chinâ ad Canton (Lour., Millet). Cornutia quinata Lour. flos cochin. 2 p. 470 (Hook. et Arn.). Arbor mediocris, ramis patentibus teretibus. Flos luteo-viridis (Lour.). Ex icono proxima videtur V. Timorensi.

12. V. PUNCTATA, ramulis compresso-tetragonis paniculâque puberulis, foliis simplicibus in petiolo longo articulatis oblongo-vel ovato-ellipticis utrinque acuminatis integrerrimis coriaceis penninerviis glabris supra nitidis subtus opacis subtiliter glanduloso-punctatis paniculâ terminali patente multiflorâ, calyce sessili cyathimorpho truncato aut vix denticulato punctato-glanduloso. ♀ In Moluccis (h. DC.! a cl. Lambert comm.). — Folia 4-6 poll. longa, 2-3 poll. lata, petiolo sesqui-bipaniculati. Flores parvi. Calyx unam lineam longus. Corolla utrinque pubescens. (v. s. in h. DC.)

13. V. BAHIENSIS (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), ramulis cum paniculâ foliorumque dorso tomento brevissimo incanis, foliis longe petiolatis trifoliolatis, foliolis omnibus intermedio autem longius petiolatis ovatis coarctato-acuminatis basi brevissime acutis integrerrimis venosis supra viridibus pubescens, paniculâ terminali patente pyramidata, cymis bis terve dichotomis paucifloris ramis patulis, bracteolis linearibus, calyce campanulato subpedicellato obsolete 5-dentato, corollâ magnâ. ♀ In Brasiliæ prov. Soteropolitanâ (Blanchet! exs. n. 3274). Foliola magna, intern. 5-6 poll. long., 3 $\frac{1}{2}$ -4 poll. latum. Calyx 2 $\frac{1}{2}$  lin. longus. Cor. calyce ter longior, alba, labio inf. imberbi. (v. s. in h. DC.)

\*\* Paniculæ simplices axillares.

14. V. PEDUNCULARIS (Wall.! cat. n. 1753), ramulis glauco-pruinosis, petiolis paniculisque pulvuleento-tomentellis, foliis longe petiolatis (petiolo interdum alato) trifoliolatis, foliolis lanceolato-oblongis attenuato-acuminatis basi in petiolum angustatis integrerrimis membranaceis tenuiter venosis utrinque glabratibus subtus glanduloso-punctatis, paniculis axillaribus patentibus pedunculatis racemiformibus laxis ebracteolatis, cymis pedunculatis patentissimis paucifloris divaricato-dichotomis, calyce brevi sessili minute repando-denticulato cum corollâ dense glanduloso-punctato. ♀ In India orientali, Silhet, Palmyre (Roxb.! in h. Willd. n. 11702, Wall.!). V. alata Roxb. ex Wall.! cat. n. 1752, non Heyne. Rottl. et Willd! in nov. act. nat. enr. 4. 1803. Foliola 4-6 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{3}{4}$  poll. lata, petiolo communis triplicari semireti facie plano margine acuto interdum alâ latâ praedito. Panicula spithamea; pedunculus petiolum subæquans; cymæ ter bifidæ cum flore alari, pedunculus et ramulis semipaniculatis divaricatis. Bracteola nulla vel inconspicua deciduæ. Calyx  $\frac{3}{4}$  lin. longus, 5-nervis. Cor. parva; tubus brevis; limbus obliquus, lobis superioribus brevibus rotundatis reflexis, labio inf. declivi basi lanuginosus. Genitalia labium superius tantum subæquantia. Drupa pisi magn. leviter 4-sulcata apiculata, pruinâ densâ cæsiâ. (v. s. in h. DC. et Willd.)

15. V. UMBROSA (Sw. prodr. fl. Ind. occid. p. 93), ramulis compresso-tetragonis petiolis cymisque pube pulveracea subcanescens, foliis petiolatis 5-foliolatis, foliolis ellipticis vel oblongo-ellipticis utrinque acutis subacuminatis brevi-petiolatis integrerrimis subcoriaceis penninerviis utrinque glabris nitidis subtus pallidioreibus, paniculis axillaribus pyramidatis longe pedunculatis, cymis pedunculatis ter dichotomis divaricatis, calyce subpatellari acute 5-dentato, corollâ tubo calycem duplo excedente labio inf. unguiculato porrecto pulvuleento basi sublanuginosus. ♀ In montosis Jamaiçæ (Sw.), in Guianæ agro Essequiboensi et montibus Canuku (Rich. Schomb.! n. 119 et 1256) — Sw. fl. Ind. occid. 2 p. 1076. Nephrandra Cothen dispos. 8. Petioli digitales. Foliola 4-8 poll. longa, nervis subtus prominentibus puberulis. Paniculæ drostantes, bracteolis linearibus. Calyx brevipedicellatus, lineam altus, dentibus angustis acutis recurvis. Cor. extus tomento tonso incana, labii inf. lobo medio maximo rotundato-bilobato undulato. Drupa flava, cerasi magn., ovato-oblonga. (v. s. in h. r. ber. et DC.)

§ 2. Cymæ simplices axillares. — Limia Vand.

a. Americanæ.

16. V. GARDNERIANA (Schauer in Mart. et Endl. fl. bras. ined.), pube communi to-

mentosâ candicante, foliis simplicibus brevipetiolatis lanceolatis vel obovato-lanceolatis acutis basi attenuatâ obtusis integrerrimis aut obsolete serratis coriaceis penninerviis reticulato-venosis supra demum glabratris nitidisque subtus villo tenui canescens, cymis brevibus paucifloris densis, calyce campanulato dentibus patentibus ovatis acutiusculis, corollâ lanatâ imberbi.  $\S$  In Brasilâ meridionali e. g. circa Rio de Janeiro (G. Gardn.! Houllet!). Folia 2 $\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, 9-12 lin. lata. (v. s. in h. Mart. et DC.)

17. V. GIGANTEA (Kunth in H. B. nov. gen. et sp. 2 p. 245), ramulis teretibus sub-compressis molliter tomentoso-hirtis, foliis petiolatis 3-5-foliolis oblongis utrinque acutis brevissime petiolatis integrerrimis reticulato-venosis supra glabris subtus pallidioribus pubescensbusque, cymis axillaribus subtrifloris aut sex-floris, calyce campanulato 5-dentato dentibus obtusiusculis tribusque inferioribus approximatis, corollæ tubo brevi fauce dilatatâ labio inferiore patente basi maculâ pilosâ.  $\S$  In locis calidis prope Guayaquil (H. et B.). Arbor procerrima, comâ globosâ, ligno durissimo. Foliolum intermed. maximum 4 $\frac{1}{2}$  poll. long. 2 poll. lat., exterioribus multo minoribus. Petiolus communis bipinnicaris et longior, canaliculatus pubescens. Cymæ pedunculus subpollicaris pubescens. Cor. violacea, tubo cylindraceo lacinia labii inf. mediâ reliquis triplo longiore. Drupa calyce persistente cincta, edulis, *Pechiche* ab incolis dicta.
18. V. CYMOSA (Bertero! ex Spr. syst. 2 p. 757), indumento communi cano-tomentoso, foliis longe petiolatis quinatis-septenatis, foliolis coriaceis inaequalibus oblongis ellipticis utrinque acuminate brevipetiolatis conspicue penninerviis, adultis supra glabratris nitidis subtus cum petiolo canescens-pubescentibus, cymis ebracteolatis bis terete trifidis corymbosis ramis patentibus cum pedunculis calycibusque cano-tomentellis, calyce pedicellato patellæ-formi dentibus patentibus lato-ovatis, corollæ tubo cylindrico labio inf. in ungue barbato.  $\S$  In silvis Catingás dictis Brasilâ mediterraneæ e. g. in prov. Minarum, Bahiensi (Mart.!), Matto-Grosso (Riedel! Manso! in Mart. fl. bras. exs. n. 1097), et Paraénsi (Siber!), in Boliviâ pr. Chiquitos (Alc. d'Orbigny!), in prov. S. Martha (Bertero!). Arbor 15-20 immo et 50-60 pedes alta, comâ densâ transverse oblongâ. Foliola interm. adulta 4-5 poll. longa, 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata. Calyx 1 $\frac{1}{2}$  lin. altus. Cor. corulea. Drupa edulis, Brasil. *Taruma* dicta. (v. s. h. in Mart. cæs. petr., r. berol. et DC.)
19. V. ORINOCENSIS (Kunth! in H. B. nov. gen. 2 p. 247), ramulis petiolis cymisque pube pulvareæ tenui subcanescensibus, foliis petiolatis 5-foliolatis, foliolis obovato-oblongis obtuse acuminate basi angustatâ petiolatis integrerrimis subcoriaceis reticulato-venosis glaberrimis nitidis, cymis axillaribus longe pedunculatis subter dichotomis corymbosis ebracteolatis, calyce pedicellato brevi patellari truncato obsolete dentato, corollæ tubo sursum ampliato calycem triplo superante labio inf. magno porrecto basi barbato.  $\S$  In frondosis Venezuelæ juxta confluentem Metam et Orinocum amnem (H. et B.! h. Willd. n. 11704). Arbor 4-5-orgyalis. Foliolum interm. triplicare et longius, 18-20 lin. latum, reliqua minora. Petoli communes bipoll., pedunc. æquantes. Calyx  $\frac{3}{4}$  lin. altus. Cor. majuscule, corulea, labii inf. lobo medio maximo subcordato margine uudulato-crenato. (v. s. in h. Willd.)
20. V. MULTINERVIS (Schauer l. c.), indumento communi cano-tomentoso, foliis quinatis, foliolis coriaceis lanceolatis ellipticis in petiolum brevem attenuatis acutis acuminate penninerviis nervis secundariis numerosis, adultis supra nitidis subtus præter nervos pubescentes glabratris et pallidioribus, cymis semel-ter trifidis ramis patentibus, calyce campanulato dentibus patulis ovatis obtusis, corollæ tubo supra calycem sensim pauloque ampliato labio inferiore in ungue imberbi.  $\S$  In Brasilâ meridionalis locis frutetosis humidis, in pr. S. Pauli (Riedl!), S. Catharinæ (Gaudich.!) et Minarum (Sell! Regnell! pl. bras. exs. ser. 1. n. 38 B.). V. Montevideensis? multinervis Cham.! in Linnæa 7 p. 374. Psilogyne viticifolia DC.! rev. Bign. p. 16. Arbor 10-25-pedalis. Sequenti sane proxima, sed constanter diversa: pube uberiore pilisque longioribus

mixta, foliolorum, nervis secundariis crebris utrinsecus plerumque ultra 20, floribus minoribus, corollâ denique multo minus in fauces ampliatâ labioque imberbi. — Cor. cœrulescens. (v. s. in h. r. ber., cæs. petr., Mart., Sonder, et DC.)

21. *V. MONTEVIDENSIS* (Cham.! in Linnaeâ 7, p. 373), indumento communi canopubescente, foliis quinatis, foliolis coriaceis lanceolatis ellipticis in petiolum brevem attenuatis breve acuminatis remote penninerviis, adultis subglabratâ supra nitidulis subtus pallidis, cymis bis terve trifidis ramis patentibus, calyce campanulato ampliusculo dentibus patentibus rotundatis abrupte apiculatis, corollâ tubo supra calycem valde ampliato, labio inferiore in ungue villoso-barbato. ♂ In republicâ Uruguay et in Brasiliæ provinciis meridionalibus (Sell.! Mart.! Pohl! Riedel!). *V. Taruma* Mart.! syst. mat. med. Brasil. p. 55. Arbuscula 15-20-pedalis. Foliola conspicue inæqualia, medio 2-3-uncialia. Calyx fere 2 lin. longus. Cor. violacea, tubo calyce duplo longiore campanulato-inflato. Drupa edulis, succosa, obovoidea, axi  $\frac{3}{4}$  poll. longo. (v. s.)  
*β. parviflora*, floribus triente minoribus. Hæc dupli formâ occurrit: 1° pedunculus ramisque cymæ multifloræ elongatis, his bracteatis (Riedel!); 2° cymis paucifloris coarctatis, foliis subcomplicatis (Blanchet! pl. exs. n. 2782). *V. biguonicoides* Kunth in H. B. nov. gen.? (v. s. in h. r. berol. c. vindob. et petr.)

22. *V. BIGNONIOIDES* (Kunth! in H. B. nov. gen. 2, p. 246), ramulis petiolis cymisque tenuiter hirtello-pubescentibus, foliis petiolatis 5-foliolatis, foliolis oblongis acuminato-cuspidatis basi angustatâ petiolatis integrerrimis reticulato-venosis complicato-reflexis glabris subæqualibus, cymis longe pedunculatis subcapituliformibus, calyce pedicellato campanulato obsolete 5-dentato, corollâ tubo cylindrico calycem multo excedente labio inferiore maximo basi hirsuto. ♂ In convalli Araguensi et propter Villa de Cura Venezuelæ alt. 220-270 hex. (H. et B.). Arbor. Foliola bipinnicaria et longiora, petiolis part.  $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longis, petiolo communis  $1\frac{1}{2}$  poll. et longiore. Pedunculi 2-3-poll. Cor. cœrulea, lobo interm. labii inf. ovato margine undulato. V. capitata proxima, diversa foliis complicato-reflexis floribusque majoribus (Kunth; habitu maxime similis *V. Montevidensi*, quacum conferatur. (v. at non exam. in h. cl. Kunth).

23. *V. CAPITATA* (Vahl! eclog. pl. amer. 2, 50 t. 18), ramulis petiolis cymisque tenuiter vel subpulverulento-puberulis, foliis longe petiolatis 5-foliolatis, foliolis oblongo-lanceolatis in acumen longum obtusiusculum attenuatis basi attenuatâ vix petiolatis integrerrimis membranaceis glabris subtus pallidis, cymis axillaris longe pedunculatis subcapitatis, calyce breviter repandento, corollâ calyce duplo longiore labio inf. porrecto basi lanato. ♂ In insula Trinitatis (Ryan! h. Willd! n. 11712 a Vahl comm.). Foliola subtus penninervia et tenuiter venoso-reticulata, interm. 4-5 poll. longa,  $1\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, acumine longo angusto. Pedunculus petiolo æqualis vel longior. Calyx brevipedicellatus, minute bracteolatus, lineam altus. Cor. extus et facie pulverulenta. (v. s. in h. Willd. et DC.)

24. *V. FLAVENS* (Kunth! in H. B. nov. gen. et sp. 2, p. 246), ramulis petiolis cymisque flavescens-tomentosis, foliis longe petiolatis 5-foliolatis, foliolis obovato-oblongis breviter acuminatis basi attenuatâ sessilibus integrerrimis supra adpresso-pubescentibus demumque glabratâ infra subter pube molli canescente dense glanduloso-punctatis, cymis axillaris pedunculatis confertis, calyce grossiusculo 5-dentato. ♂ In Peruviâ? (H. et B.! h. Willd.! n. 11710). Foliola bipinnicaria. Pedunculus petiolo æqualis vel brevior. Corolla deest. (v. s. in h. Willd.)

25. *V. SELLOWIANA* (Cham.! in Linnaeâ 7 p. 108), indumento communi tomentoso-lanuginoso, foliis quinatis, foliolis brevipetiolatis oblongo-lanceolatis ellipticis levatis acutis in acumen mucronatum attenuatis penninerviis venosisque paginâ basi acutis in acumen mucronatum attenuatis penninerviis venosisque paginâ superâ glabratâ. inferâ subtiliter glanduloso-punctatâ aut totâ pubescente aut

præter nervos glabratā , cymis ter-quater trifidis confertiusculis , calyce brevi cyathimorpho dentibns exiguis acutis, corollæ fauce paulo ampliata , labio ad unguem barbato. ♂ In silvis Catingas Brasiliæ merid., imprimis prov. Minarum (Sell.! Riedel! Claussen! coll. a 1840. n. 379). Frutex vel arbor 6-18-pedalis. Petioli 2-3-pollicares. Foliola iuequalia , medio maximo 4-5-pollicari. Cymæ pedunculatæ petiolum subæquantes. Calyx lineâ paulo altior. Corolla pallide coerulea , calyce duplo longior. Drupa cerasi minoris molc.

*β. parviflora* , foliis supra pubescentibus denique tandem glabratis , corollâ duplo minorc. ♂ In montosis apricis prov. Sebastianopolis et Minarum Brasiliæ (Mart!). V. Brasiliensis Mart. mss. Arbor 25-pedalis. ( v. s. in h. r. berol., cæs. petr., Mart. et DC.)

26. V. SCHOMBURGKIANA , ramulis compresso-teretiusculis petiolis cymisque sub-pulverulento-pubescentibus , foliis 3-5-foliolatis , foliolis lanceolato-oblongis oblongis attenuato-acuminatis basi acutâ sessilibus integerrimis subcoriacis supra glabratis subtus pallidis et pube laxâ in paginâ demum evanescente in reti vero residuâ mollibus et subtilissime glanduloso-punctatis , cymis axillaris longe pedunculatis subcapitatis, calyce pedicellato truncato vix denticulato, corollæ fauce ampliata tubi calyceum duplo excedente labio inferiore magno unguiculato subimberbi. ♂ In campis Guianæ Angl. (Rich. Schomb.! n. 421). V. capitata Vahl var. Benth. in Hook. journ. 2 p. 53. Proxima V. Sellowianæ, diversa foliis sessilibus , calyce minore vix denticulato , corollæ barbâ inconspicuâ. Affinis etiam V. capitata et flaventi. Ab illâ differt pube communi, foliis utrinque minus attenuatis et corollâ multo majore subimberbi , ab hac recedit pube minus überâ , punctis vix conspicuis, calyce vix denticulato. Foliola media 3-4-pollicaria. Pedunculi petiolos excedentes. Calyx lineam altus. Cor. magna utrinque pulverulentæ; labio inf. rotundato-bilobo, undulato, cum faucibus glabro. Stamina exserta. Drupa ovalis, calyce triplo longior. ( v. s. in h. reg. berol.)

27. V. MULTIFLORA (Miquel in Linnæa 18, p. 739), ramulis petiolis cymisque strigilloso-puberulis , foliis petiolatis trifoliolatis, foliolis brevipetiolatis supra subglabris subtus in nervis strigilloso-puberulis lateralibus ellipticis acutis vel brevieri et obtuse acuminateis terminali ter-quaterve majore obovato-cuncato abrupte acuminate, cymis axillaris longe pedunculatis dichotomis corymbosis, bracteolis linearibus parvis , calyce brevi campanulato subbilabiatum obsolete 5-denticalato, corollæ tube extus submuciculato calycem ter superante. ♂ Hab. in silvis Surinamensis (Hostm. et Kappl. n. 1366). Affinis est V. divaricata, sed ab hac pube et inflorescentiâ jam distinguitur. Petioli 1½-3 poll. longi. Foliolum terminale 2½-3½ poll. longum, ut reliqua supra saturate viride subtus fuscescens-pallidum. Pedunculi petiolum subæquantes vel excedentes. Cymæ ter-quaterve dichotomæ, pilis ad dichotomias confertioribus. Calyx ½ lin. long., dentibus brevissimis. Labii inf. corollæ lobo medio reliquis multo major , fauce barbatâ.

28. V. HYPOLEUCA (Schauer in Endl. et Mart. flor. bras. ined.), pube communi brevi cano-tomentosâ, foliis ternatis quinatis, foliolis obovato-oblongis brevacuminateis basi attenuatâ subsessilibus coriaceis penninerviis eveniis supra demum glabratis subtus tomento denso appresso candidantibus, cymis brevipedunculatis multifloris confertis , calyce campanulato dentibus brevibus lato-ovatis acuminatis, corollæ tubo in fauces modice ampliato , labio in basi barbato. ♂ In Brasiliæ prov. Bahiensi (Blanchet! n. 1907). Rami validi, grosse cicatricosi. Folia petiolo 2-3-pollicari stipitata; foliolis med. 2½-3 poli. longis. Calyx 2 lin. longus. Cor. tubo calyce duplo longiore, sericeo-pubescente. ( v. s. in h. DC.)

29. V. VAUTHIERI (DC. mss.), innovationibus cum inflorescentiâ et foliorum pagina inferâ villo brevi incanis , foliis ternatis-quinatis, foliolis coriaceis obovato-cuneatis abrupte acuminateis obtusis basi attenuatâ subsessilibus penninerviis conspicue reticulato-venosis supra nitidis , cymis ter-quater tri-

fidis multifloris ramis divaricatis, calyce campanulato dentibus brevibus patulis ovatis obtusis, corollæ tubo paulo ampliato, labio circa fauces barbulato. ♂ In Brasiliæ prov. Rio de Janeiro (Vauth! pl. exa. n. 193). Species foliolis subtus conspicue reticulatis cymisque multifloris distincta. Calyx  $1\frac{1}{2}$  lin. longus. Carolla majuscula. (v. s. in h. DC.)

30. V. MOLLIS (Kunth! in H.B. nov. gen. et sp. 2 p. 245), ramulis petiolis cymis foliorumque dorso molliter tomentoso-pubescentibus villosisve canescentibus, foliis petiolatis trifoliolatis, foliolis oblongis obtusis basi vix attenuata sessilibus integerrimis subcoriacieis, adultis supra glabratris nitidis, cymis axillaribus pedunculatis paucifloris bis-terve bifidis divaricatis, calyce pedicel lato repando-5-dentato. ♂ In locis temperatis pr. Chilpuncingo Mexicanorum, alt. 708 hex. (H. et B.! h. Willd. n. 11705-11707). Foliolum intermed. 3-5-pollicare. Corolla dcest. (v. s. in h. Willd.)

31. V. DIVARICATA (Sw.! prodr. fl. Ind. occid. p. 93), ramulis petiolisque subtiliter puberulis, foliis longe petiolatis trifoliolatis, foliolis elliptico-oblongis utrinque acuminatis petiolatis integerrimis subcoriaceo-membranaceis glabris nitidulis subtus pallidis, cymis axillaribus longe pedunculatis bis terve dichotomis divaricatis nudis, floribus paucis longe pedicellatis, calyce patellari breviter repando-dentato, corollæ tubo calyce triplo longiore campanulato labio inferiore porrecto basi barbato. ♂ In insulis S. Luciæ, S. Crucis, Martinicæ (Swartz), in Cuba juxta Havannah (R. de la Sagra!). — Sw. fl. Ind. occid. 2 p. 1078. Foliola penninervia tenuiter reticulata; intermedium 2-4 poll. long., sesquipoll. fere latum. Pedunculus petiolum subæquans, gracilis; rami cymæ subpollicares; flores alares longius pedicellati. Calyx liobeam fere altus. Corolla magna, labio superiore reflexo, inferiore Iobo medio maximo dependente. Genitalia exserta. Drupa ovalis semuncialis. (v. s. in h. DC.)

b. *Australasicæ.*

32. V. LITTORALIS (A. Cunngh.! in ann. of nat. hist. I p. 461), arborea, ramulis compresso-tetragonis petiolis foliorum dorso cymisque glanduloso-punctatis; foliis petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis obovato-ellipticis ex apice obtuso abrupte acuminatis basi acuminatis petiolatis coriaceis penninervis venosis supra nitidis subtus pallidis, cymis axillaribus pedunculatis petiolum subæquantibus brevioribus divaricato-dichotomis paucifloris, floribus longe pedunculatis, calyce cupuliformi truncato edentulo. ♂ In Novæ-Zealandiæ littoribus lapidosis (A. Cunngh.! —) Hook. icon. plant. t. 419, 420. Ephialis pentaphylla Banks et Sol. mss. Arbor excelsa, trunco 12-20 pedes circuitu tenente, ad primos ramos usque 15-30 ped. alto. Foliola intermedia 3 poll. circiter longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, extime quinatarum minima sessilia; petiolo communis semitereti sequi-bipollicari. Pedunculi pollicares. Calyx 2 lin. longus. Corollæ labium superius porrectum integrum ovato-obtusum, inferioris ample trilobi laciniâ mediâ maximâ subtricrenatâ. Stamina exserta basi villosa. Drupa obovata, fruct. pruni spinosæ mole, putamine circa verticem depresso tuberculata. (v. s. in h. DC.)

33. V. CUNNINGHAMI, ramulis cymis foliisque novellis pube evanescente afflatis, foliis longe pedunculatis trifoliolatis, foliolis longe petiolatis ovato-ellipticis utrinque breviter acuminatis membranaceis penninerviis tenuiter venoso-reticulatis adultis glabratis subtus pallidis, cymis axillaribus divaricato-dichotomis paucifloris pedunculo petiolum subæquante, calyce cyathimorpho brevitor 5-dentato. ♂ In Novâ-Hollandiâ septentr.-occid. ad littora sinus Careening-Bay (A. Cunngh.). Foliola bipollicaria, petiolis partialibus pollicaribus petioloque communis bipollicaria gracilibus. Cymæ bis-terve dichotomæ; bracteolæ minutæ. Calyx subsessilis lineam circ. longus. Corollæ tubus calyce dimidio longior, labio inferiore rotundato subunguiculato concavo porrecto barbato, reliquis lobis limbi ovatis obsusis. Genitalia labium superius æquantia. (v. s. in h. DC.)

34. V.? *Lignum-vitæ* (A. Cungh.! mss.), ramulis compresso tetragonis petiolis paniculisque tomento velutino ferrugineis, foliis simplicibus petiolatis oblongis in acumen obtusum attenuatis integerrimis coriaceis penninerviis reticulato-venosis præter nervum medium glabris utrinque nitidis subtus pallidis et glanduloso-punctatis, cymis axillaribus folio duplo brevioribus divaricato-dichotomis calyce pedicellato cyathimorpho truncato. 5 In sylvaticis juxta flumen Brisbane-River in sinu Moreton-Bay Novæ-Hollandiæ orient. (A. Cungh.!)  
« *Lignum-vitæ* colonis. Arbor 70 ped. alta, valde insignis. Folia 3-1 poll. longa, 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  poll. circ. lata, petiolo semipollucari. Calyx lineam adæquans. Corolla pube cymæ communi induita; evolutam autem in fructum non vidi. (v. s. in h. DC.)

## c. Indice.

35. V. *SALIGNA* (Roxb.! herb. ex Wall. cat. n. 1748), ramulis cum petiolis pulverulento-pubescentibus, simulque cum cymis foliisque junioribus cæsio-pruinosis, foliis longe petiolatis trifoliolatis, foliolis lanceolatis utrinque acuminati apice obtusis basi valde inæquali petiolatis integerrimis subcoriaceis venosis subtus pallidis secus costam lanuginosis adultis cæterum glabratibus, cymis axillaribus longe pedunculatis corymbosis divaricato-dichotomis multifloris, calyce cyathimorpho inciso-5-dentato, corolla tubo calyce duplo longiore, labio inferiore porrecto basi dense lanato. 5 In Indiâ orientali (Wall.). V. *Leucoxylon* Wall.! herb. n. cit. Foliola rarius quinata, 4-6 poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata, magis minusve glancescentia, pedunculo ad articulationem rufo tomentoso. Cymæ nunc magis glabratæ et conspicue pruinosaæ, nunc magis pubescentes, quinques-sexies furcatæ, alis inferioribus flore carentibus, pedunculo petiolum subæquante, ramis inf. pollucariibus, superioribus semipollucariibus. Bracteolæ minutæ, caduceæ. Calyx brevipedicellatus, 1 $\frac{1}{4}$  lin. longus, dentibus ovatis acuminalutis. Corolla majuscula, extus fulvo-tomentosa; labii super. bifidi lobis resupinatis obtusis, inferioris trilobi basi laxâ densâ in fauces decurrente obsiti lobis later. reflexis intermedio rotundato concavo undulato. Genitalia exserta. Drupa magna obovata, abortu sæpius monopyrena. Proxima V. *Leucoxylon*, sed foliorum figurâ eorumque paginæ inferioris indumento facilis distinctu. (v. s. in h. DC.)
36. V. *LEUCOXYLON* (Linn. fil. suppl. 293), ramulis cum petiolis, pulverulento-puberulis simulque cum cymis foliisque junioribus subpruinosis, foliis longe petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis ellipticis vel ovato-oblongo-ellipticis breviter et obtuse acuminati in petiolum longum attenuatis integerrimis subcoriaceis penninerviis supra glabris nitidis subtus pallidis et imprimis in nervis subtilissime strigoso-puberulis, cymis axillaribus longe pedunculatis corymbosis divaricato-dichotomis multifloris, calyce patellæformi inciso-5-dentato, corollæ tubo calyce duplo longiore labio inferiore porrecto facie dense lanatâ. 5 In Indiâ orientali (Roxb. Wall.! Helfer!) et in silvis vastis Ceylonæ (Kœnig.). V. *Leucoxylon* Roxb.! hort. bergh. 46. V. *bombacifolia* Wall.! cat. n. 1749 et V. *pallida* Wall.! cat. n. 1751. *Wallrothia Leucoxylon* Roth nov. pl. sp. 317. Arbor (ex Helf.) crassa, medioeris tamen altitudinis. Foliola sæpissime ternata vel quinata extimus multo minoribus; intermed. 4-6 poll. longum 2-2 $\frac{1}{2}$  poll. latum, immo et 7 poll. long. 4 $\frac{1}{2}$  poll. latum; omnia petiolata petiolo intermeedi pollicari; petiolo communis ad articulationem rufo-tomentello. Cymæ iis V. *salignæ* proorsus similes. Calyx brevipedicellatus 1 $\frac{1}{4}$  lin. altus dentibus late ovatis acuminalutis. Cor. majuscula fulvo-tomentosa, lobis superioribus ad fauces usque partitis oblongis obtusis reflexis, lobo infimo porrecto unguiculato orbiculari concavo crispato-undulato. Genit. exserta. Drupa magna obovata, abortu sæpius monopyrena. (v. s. in h. DC.)
37. V. *VESTITA* (Wall.! cat. n. 1750) undique pube hirtellâ vel subvillosâ tomentosa subcanescens, foliis longissime petiolatis trifoliolatis, foliolis ellipticis vel elliptico-oblongis acuminati basi subrotundâ vel acuminatâ petiolatis integerrimis membranaceis penninerviis venosis adultis suprâ scabridis subtus mollibus et dense glanduloso-punctatis, intermedio foliolo longius petiolato,

cymis axillaribus brevibus paucifloris divaricato-dichotomis singulis pluribusve fasciculatis, calyce cyathimorpho repando-5-dentato. ♂ In Indiâ orientali, Toong-Dong Avæ (Wall.). Rami obtusanguli, lateribus alternis canaliculati, vel teretiusculi. Petioli 3-5 poll. longi; foliola basi sæpius inæqualia, lateralia paulo minora brevipetiolarata media 4-6 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  poll. lata, petiolo 1- $1\frac{1}{2}$ -pollicari. Cymæ pedunculus subpollicaris. Calyx brevipedicellatus lineam longus. Cor. non vidi. (v. s. in h. DC. )

## d. Africanae.

38. V. OBOVATA (E. Meyer comm. pl. afr. austr. 1 p. 273), ramulis petiolis cymisque brevissime pubescenti-tomentellis, foliis petiolatis 5-foliolatis, foliolis obovatis vel elliptico-obovatis brevissime apiculatis basi cuneatâ subpetiolatis integerrimis coriaceis glabris junioribus subtus in nervo medio marginaque pubescenti-tomentellis, cymis axillaribus pedunculatis folio brevioribus dichotomis, calyce campanulato 10-costato dentibus rotundatis. ♂ In Capite-Bonæ-Spei inter Komga et Key (Drège). Petioli pollicares. Foliolum interm. maximum, 1- $1\frac{1}{2}$  poll. longum, 10-12 lin. latum. Pedunculus pollicaris. Corolla extus tomentosa, limbo subbilabiata. Stam. inclusa villosa-pilosa.
39. V. ZEHYERI (Sonder mss.), undique tomento brevi candicans, foliis petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis lanceolatis utrinque acutis sessilibus integerrimis penninerviis, cymis axillaribus pedunculatis ter-quater trifidis corymbosis bracteolatis, calyce sessili campanulato limbo patente 5-lobo, lobis ovatis acuminalatis. ♂ In ripis flum. Crocodillorum in inter. Afric. austr. (Zeyher! pl. cap. n. 73). Petioli pollicares. Foliola 2-3 poll. longa, 8 lin. lata. Cymæ pedunculus petiolum æquans vel nonnihil excedens. Bracteolas linearis-subulatae. Calyx florens duabus lineis paulo longior, obsolete 5-nervius, post anthesin increscens ut limbus deum conspicue dilatetur. Corolla extus pulverulenta, calyce duplo longior, limbo oblique bilabiata, lobis super. reflexis, labii inf. lobo interm. complicato deflexo. Stamina inclusa. Drupa tomentosa. (v. s. a. cl. Sonder comm.)

Sectio II. PYROSTOMA. — Pyrostoma E. W. Meyer! l. c.  
Casarettœ Walp.! l. c.

Calyx infundibulari-hypocraterimorphus, limbo foliaceo profunde 5-fido. Corollæ labium superius erectum vel resupinatum bifidum. — Cymæ axillares. — Species Americanæ.

40. V. POLYGAMA (Cham.! in Linnæa 7 p. 371) indumento communis rufescente subvelutino-tomentoso aut villoso-hirsuto, foliis quinatis ternatisve foliolis obovato-oblongis-ellipticis breviacuminatis obtusis in petiolum brevem acuminatis penninerviis venoso-reticulatis supra viridibus holosericeis ætate glabrescentibus subtus subsericeo aut viloso-lanatis canescentibusque, cymis bis-quater trifidis confertifloris subcapitatis pedunculo quam petiolus breviore, floribus polygamis, calyx subsessili cyathimorpho amplio semi-quinquefido laciniis acute triangularibus. ♂ Vulgaris in Brasiliâ meridionali e. g. in silvis mont. prov. S. Pauli (Houillet! Riedel!), Minaram (Sell.! Pohl! Mart.! Claussen! coll. a. 1840. n. 396, Regnelli!) et Soteropolitanâ (Blanchet! n. 3434). V. rufescens Juss. Ann. du Mus. 7 p. 77? Casarettœ mollissima Walp.! repert. 4 p. 91. Arbor 20-25-pedalis. Flores plerumque hermaphroditi, interdum foeminei. Calyx 3-4 $\frac{1}{2}$  lin. longus, laciniis limbi tubi longitudinem æquantibus. Cor. pallide violacea fauce lutea. Drupa globosa nigra. (v. s. in h. r. berol. cæs. Vindob. et Petrop., Mart. et DC. )
41. V. TRIFLORA (Vahl! eclog. 2, p. 49), ramulis gemmis pedunculisque ferrugineo-tomentosis subhirsutis, foliis petiolatis trifoliolatis, foliolis obovato-oblongis-ellipticis in acumen obtusum coarctatis cuspidatis basi cuneatâ vel acuminatâ subsessilibus integerrimis membranaceis penninerviis glabris vel pubescentibus denique glabrescentibus subtus subpallidioribus reti strigiloso-pubescente, cymis axillaribus semel bisve bifidis pedunculo petiolum

aquante, calyce tubuloso-infundibulari profunde 5-fido lacinii foliaceis lanceolatis patentibus, corollâ tube cylindrico calycem sublupo excidente. In ndis sylvaticis in omni Guianâ (Meyer! h. DC.! Schomb.! et in ditione fl. Amazonum in Brasiliâ (Poeppig! Martius! Riedel!) —herb. Willd.! n. 11701 a Vahl. comm. Pyrostoma ternata F. W Meyer! prim. fl. esseq. 220. Casarettos diversifolia Walp.! repert. 4, p. 92. Foliola 3-5 poll. longa, lète viridia. Calyx  $\frac{1}{2}$  poll. longus, post anthesin statim increscens, limbo foliaceo bilabiato. Cor. violacea; tubus crassus, exsertâ parte tomento fulvo sericeâ; limbus facie glaber, lacinii super. erectis, labii inf. lobo medio rotundato basi barbulato. Drupa magna succosa tomentosa edulis (*Taruma* Bras.) omnino Vitios. (v. s. in h. Mart., Willd. et DC.)

### Sectio III. CHRYSOMALLUM. — *Chrysomallum Pet.-Thouars* l. c.

Calyx cyathimorphus, 5-dentatus. Corolla tubulosa, labio superiore subfornicato breviter bifido. — Cymæ axillares. — Africanæ.

42. V. BOJERI, ramulis, foliorum dorso et inflorescentiâ lanâ ferrugineâ tomentosis, foliis simplicibus petiolatis ellipticis obtusis integerrimis coriaceis grosse venosis supra glabris nitidis infra subter tomento dense glandulosis, panicula terminali pauciflorâ compactâ, calyce campanulato acute 5-fido, corollâ tubulosâ ringenti-bilabiata. In sylvis vastis prov. Bé-zongzong inter. ins. Madagascar (Bojer!). V. ferruginea et Chrysomallum integrifolium Boj.! in h. DC. Arbor 20-pedalis. Folia subpollicaria rigida. Calyx sessilis, bracteæ breviter ovata suffultus, 3 lin. longus, purpure tintetus. Corolla purpurea, 9 lin. fere longa, labio utroque emarginato supero subfornicato lobis lateribus brevissimis acutis. Genitalia exserta. Fructus ignotus. (v. s. in h. DC.)
43. V. CHRYSOCALADA (Bojer, ann. sc. nat. 2. ser. 4, p. 268), ramis superne octogonisstellato-pubescentibus aureis, foliis simplicibus ovatis acuminatis interdum rhombieis apicem versus serratis pubescentibus, paniculis subcorymbosis terminalibus ramosis floribusque albidis. Crescit locis depressis inter frutices in insulâ Mombasa ad oram orient. Africæ (Boj.). Frutex 4-6-pedalis. Folia brevipetiolata utrinque acuminata quadriplicaria undique stellato-pilosâ aurea. Bracteæ filiformes, pedicello fere longiores. Calyx hemisphaericus obsoletus et obtuse 5-dentatus. Cor. tubus interne purpureus, limbus albus. Drupa nigra, calyce semi-inclusa.
44. V. CHRYSOMALLUM (Steud. nomencl. ed. 2), ramulis petiolis cymisque pube ferrugineâ strigoso-tomentosis, foliis petiolatis 3-5-foliolatis, foliolis oblongo-cuncatis retusis basi attenuatâ sessilibus integerrimis coriaceis marginè reflexis supra glabris nervo medio impresso subtus pallidis penninerviis venosis reti pube tenui appressâ strigilloso, cymis axillaribus brevipedunculatis ter diebotomis divaricatis bracteolatis, calyce subtruncato minute denticulato, corollâ aureo-lanata. Hab. in silvis obscuris circa pagum Takasouha in prov. Bo-tanimenta ins. Madagascar (Bojer!). Chrysomallum Madagascariense Petit-Th. gen. nov. mad. n. 25. Folium intermedium 2-4-poll. longum, lateralia minorâ, extima sâpse minima. Bracteolæ subulatae, pedicello breviores. Calyx cyathimorphus, 2 lin. altus. Corolla magna, calyce quater longior. Fructus omnino Vitios. (v. s. in h. DC. et reg. berol.)
45. V. CUNEATA (Schum. et Thonn. in kongl.-dansk. vidensk. selsk. afh. 4. 63), ramulis tetragonis glabris, foliis petiolatis 5-foliolatis, foliolis obovato-cuneatis vix acuminatis petiolatis integerrimis coriaceis glabris supra nitidis rhachi costisque albidis, cymis axillaribus dichotomis longe pedunculatis, calyce subsessili campanulato brevi 5-dentato pubescente. In Guineâ (Thonning). Arbor excelsa, ramulis fuscis. Foliola 3-7-pollicaria, lateralibus minoribus. Petiolus communis longitudine folioli intermedii; petioli partiales vix pollicares. Bracteolæ subulatae deciduae. Corolla incarnata; tubus intus barbatus; labium super. subrotundum breviter bifidum subfornicatum; laciniae laterales ovatae

sequales, infima' basi coarctata reliquis longior violacea ad faucom flavescentia. Stamina exserta. Drupa magn. pruni, ovata, nitida, pulpâ eduli subatrâ, incolis *Tjong*.

46. V. FERRUGINEA (Schum. et Thonn. l. c. 62), ramulis cymisque ferrugineo-tomentosis, foliis petiolatis 5-7-foliolatis, foliolis oblongis acuminatis basi attenuatâ brevissime petiolatis supra nitidis junioribus conduplicatis ferrugineo-tomentosis, cymis axillaribus pedunculatis dichotomis corymbosis bracteolatis, calyce 5-fido, corollæ tubo calycem æquante labio inf. basi barbato. ♂ In Guinéa (Thonn.). Foliola petioli longitudine. Pedunculi vix pollicares. Bracteolas lanceolatæ, supra nitidæ, infra tomentosæ. Cor. labium super. parvum breviter bifidum, lacinia later. reflexæ, labii inf. lobus medium concavus. Stamina breviter exserta.

47. V. LANIGERA, undique lanâ densâ fulvâ tomentosa, foliis longe petiolatis 5-foliolatis, foliolis petiolatis ovatis obtuse acuminatis integerrimis rugosis supra virentibus, cymis axillaribus petiolo duplo brevioribus pedunculatis ter divaricato-bifidis, calyce sessili 5-fido lobis ovatis acutis patentibus, corollæ tubo calyce duplo longiore inferius glabro. ♂ In ins. Madagascar prov. Emirna (Bojer !). Chrysomallum lanuginosum Bojer ! in sched. h. DC. Arbor 15-pedalis. Petioli digitales. Foliola bipollicularia, petiolis  $\frac{1}{2}$ -1 poll. longis. (v. s. in h. DC.)

† *Species non satis nota.*

48. V. MOLUCCANA (Blume bijdr. p. 813), foliis simplicibus subrotundo-ovatis aut ovalibus acutiusculis subintegerrimis coriacéis infra puberulis basique glandulosis, paniculâ terminali divaricata. ♂ In insulis Moluccanis. Tittius Rumph. herb. amb. 3. t. 20.

49. V.? MACROPHYLLA (R. Br. prodr. fl. N. Holl. p. 512), canile arborescente, foliis simplicibus integerrimis ovato-oblongis glabris costatis basi biglandulosis. ♂ In N. Hollandiâ tropicâ.

50. V.? GLABRATA (R. Br. l. c.), foliis ternatis quinatisque, foliolis ovatis integerrimis glabris, pedunculis dichotomis axillaribus terminalibusque, calyce edentulo. ♂ In N. Hollandiâ tropicâ.

51. V. ACUMINATA (R. Br. l. c.), foliis ternatis quinatisque, foliolis ovato-oblongis acuminatis glabris integerrimis, paniculae rhachi strictâ ramis dichotomis, calyce subedentulo, staminibus inclusis. ♂ In Novâ-Hollandiâ tropicâ.

52. V. HEPTAPHYLLA (Juss. ann. du Mus. 7, p. 77), foliis petiolatis 5-7-folio-latis, foliolis ovato-lanceolatis petiolatis integerrimis coriacéis glabris, cymis axillaribus trichotomis multifloris pedunculo petiolum duplo superante; calyce 5-dentato corollâ duplo superato. ♂ In insulâ Dominicâ, ubi appellatur *Bois de Savanne* (Juss.). Arbuscula, floribus parvis. Petiolus comm. sesquipollic., partiales semipollulares.

53. V. PARVIFLORA (Juss. l. c. 76), fruticosa, foliis longe petiolatis ternatis, foliolis breviter petiolulatis ovato-lanceolatis integris subpubescentibus, paucilulis axillaribus oppositis, floribus parvis, drupâ ovatâ nucem 4-spermam gerente. ♂ Crescit in Philippinis.

54. V. BALBISII (Spr. syst. 2, p. 756), foliis ternatis, foliolis obovato-ellipticis obtusis utrinque glaberrimis subcoriacéis subtus discoloribus, racemis axilla-ribus subecompositis. ♂ In Hispaniolâ. V. umbrose forma ?

55. V.? SCADRA (Wall! cat. n. 1758), ramulis tetragonis sulcatis, novellis petiolis dorsoque foliolorum pubescentibus, foliis petiolatis trifoliolatis, folioliis ovatis vel elliptico-ovatis breviacuminatis paulo in petiolum angustatis integerrimis subcoriacéis supra papuloso-scabris nitidulis subtus pallidis nervis que imprimis pubescentibus paginaque juniorum dense glanduloso-punctata, inflorescentia . . . ♂ In Indiâ orientali, ad Seguen (Wall!). — Petiolus sesquipollicularis. Foliola penninervia, venarum reti grosse-areolato; intermedium

tripollicare petiolo semiunciali. Flores desunt, de genere autem vix dubitav-  
rim. (v. s. iu h. DC.)

56. V.? SEXDENTATA (Wall.! cat. n. 1759), undique tomento denso brevi ca-  
nescens glandulisque creberrimis punctiformibus micans, ramulis obtuse tetr-  
gouis, foliis simplicibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis brevipetiolatis  
remote serratis subtus pallidioribus, cymis axillaribus subsessilibus brevissimis  
compactis, calyce pedicellato cyathimorpho acute 5-fido. ♂ Hab. in Nepaliā  
(Wall.!). Ramuli cum cymis roseo-fucati. Folia bipollicularia penninervia.  
Cymæ petiolum subæquantes. Calyx subbilabiatus, 5-nervis. Corollam et fruc-  
tum perfectum non vidi. Premae forsan adnumeranda. (v. s. in h. DC.)
57. V. CALIFORNICA (Benth. voy. of the Sulphur, bot. 10), foliis subrotundis  
acutiusculis grosse dentatis integris vel 3-5-lobis basi profunde cordatis supra  
glabris subtus ramulisque floccoso-tomentosis. ♂ In Californiâ ad Rio Sacra-  
mento. V. Caribæa Hook. et Arn. Beech. voy. bot. 327.
58. V. GENICULATA (Blanco fl. de Filip. 514. Walp. repert. 4, p. 91),  
foliis quinatis ternatisque, petiolo in medio geniculato, foliolis lanceolatis  
marginé et nervo medio villosissimis breviter petiolulatis, paniculâ verticillatâ,  
calyce parvo campanulato 3-4-dentato, corollâ campanulatâ bilabiata tubo in-  
curvato sursum ampliato lobo infimo ad fauces lanato. ♂ In insulis Philippinis.  
Arbor 50-pedalis. Drupa parva globosa. — An Vitex?

59. V. SPICATA (Lour. fl. coch. ed. W. 2 p. 475), fruticosa, foliis quinatis  
rariusve ternatis, foliolis longe petiolatis lanceolatis crenatis integerrimisve lète  
virentibus tomentosis rugosis, spicis longis linearibus saepè congestis terminalibus  
involucellis partialibus subulatis, calyce minimo 5-fido acuto, corolla  
tubo brevi globoso limbo patente 5-fido. ♂ Habit. inculta cultaque in Cochinchinâ  
et Chinâ. Flos albo-violaceus. Baccia subrotunda, fusca, pipere minor,  
4-sperma. — An Vitex?

### *Species exclusæ.*

V. INVOLUCRATA Presl. = Sphenodesma unguiculata.

V. PINNATA Lour. = Aglaia odorata.

### *Genera probabilititer Viticea, sed non satis nota.*

XXXVIII. HOLMSKIOLDIA Retz. obs. 6, p. 31 et in Hoffm. phytogr. Blatt. p. 35  
t. 3. Benth. Lab. 642. Endl. gen. n. 3670. Meisn. gen. 289 et comment. 197.  
Decnsne in voy. Jacquem. part. bot. p. 136 t. 140 (ic. solum vidi) — Hastingsia  
Sm.\* exot. bot. v. 2 t. 80. — Platunium Juss. Ann. du Mus. v. 7 p. 76.

Calyx membranaceus coloratus, e tubo brevissimo in limbum amplissi-  
mum patentem subrotato-campanulatum subintegerrimum dilatatus. Co-  
rolla bilabiata, tubo elongato leviter incurvato interne glabro, faucibus  
subdilatatis, limbi labio superiore bifido laciniis erecto-potentibus, inferiore  
trifido laciniis lateralibus parvis reflexis mediâ ovatâ patente. Stamina 4,  
exserta, adscendentia, inferiora longiora; filamenta superiora dilatata.  
Antheræ biloculares, loculis parallelis connectivitate dorso adnatis. Stylus  
staminibus subæqualis, stigmate crure altero brevissimo subsimplici  
acutiusculo. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis; ovulum in angulo  
interno superius affixum subpendulum. Drupa (?) fundo calycis insidens,  
subcarnosa, 4-loba, dipyrrena, pyrenis bilocularibus. — Genus a cl.  
Bentham Labiatis insertum, nunc vero ipso annuente in litteris propter  
habitum et ovulorum situm ad Verbenaceas reductum. fructu tamen non  
satis noto adhuc inter genera dubia collocandum. Vitici proxime affine  
videtur.

H. SANGUINEA (Retz. l. c.). ♂ In Indiâ orientali, e. g. Hindostaniâ et Silhet (Wall.!).

cat. n. 2087). — Deensne in voy. Jaquem. t. 140, ic. opt. *H. rubra* Pers. syn. 2, p. 144. *Hastingia coccinea* Sm. l. c. *Platnum rubrum* Juss. l. c. Frutex ramis elongatis brachiato-divaricatis tetragonis glabris, sèpius verrucoso-lenticellatis. Folia opposita, ovata, acuminata, e basi rotundata brevissime in petiolum subpollicarem acuminata, subintegerrima vel leviter crenato-serrata dentibus brevissime apiculata, membranacea, viridia, supra glabrata, subtus in nervis pubescentia paginâ sub vitro squamellato-glandulosâ. Paniculae axillares, petiolum subæquantes, laxæ, e cymulis oppositis 2-6 confertis; cymulæ trifloræ, sed flore plerumque non nisi intermedio longe pedicellato perfecto bracteolique laterali sterilibus ad unum florem redutæ, quo fit ut panicula quasi racemos evadat. Bracteolæ minutissimæ. Calyx quam corolla triente-quadrante tantum brevior et cum ea coccineus, venoso-reticulatus venarum primar. apicibus in mucronulos minutissimos exsertis, sub fructu exarescens. Cor. fere pollicaris, limbo brevi. (v. v. c. et s. sp. in h. r. berol.)

XXXIX. QUOYA Gaudich. in Freycinet voy. bot. p. 453. tab. 66. Endl. gen. 3719. Meisn. gen. p. 290.

Calyx subturbanatus, profunde bilabiatus, labio superiore trilobo, inferiore bipartito. Corolla turbinato-campanulata; tubo infra staminum insertio nem annulo villoso predicto; limbo bilabiato-quinquelobo, lobis lateralibus minoribus, infimo maximo subrotundo concavo. Stamina 4, medio tubo corollæ inserta, exserta didynama; antheræ biloculares, loculis appositis parallelis basi calcaratis, calcaribus inferne connatis. Ovarium obovatum, emarginatum, 4-loculare. bipartibile, loculis uniovulatis. Stylus terminalis, filiformis, erectus. Stigma incrassatum, apice bilobum. Fructus....

Q. CUNEATA (Gaudich. l. c.). ♂ Hab. in Novâ-Hollandiâ occidentali, ad Simum gallis Baie des Chiens-marins dict. (Gaudichaud!). Frutex pube ramulosa undique candicans. Rami pennæ gallinaceæ crassitie, teretes, dense floccoso-tomentosi. Folia opposita, sessilia, obovato-cuneata, apice rotundato-paucidentata, rugulosa, laxe tomentosa, semipollice paulo longiora. Panicula ad apicem ramulorum, facta e ramulis brevibus decussatim oppositis, umbellâ pauciflora bracteatâ terminatis. Pedunculi tenuiter filiformes, breves, cum calyce villo longo ramoso laxe intricato hirsutissimi. Calyx  $2\frac{1}{2}$  lin. longus, membranaceus, lobis oblongis obtusis, trinerviis. Corolla-calyx duplo longior, corulescens, (v. s. sp. unic. idque imperf. in h. DC.)

XL. HEMIGYMNIA Griff. in McClelland's *Calcutta journ. of nat. hist.* (1843) 3. p. 363. Wâlp. repert. bot. syst. 4. p. 99.

Calyx infundibuliformis, striatus, 5-dentatus. Corollæ tubus infundibuliformis, lacinias 5 angustis tubo duplo longioribus. Stamina 5, æqualia, inclusa. Ovarium 4-loculare, 4-ovulatum; ovula solitaria ascendentia. Stylus bifidus, ramis profunde bipartitis facie interiori stigmatosis. Fructus (immaturus) drupaceus, rostrato-cuspidatus, calyce cupuliformi semicinctus.

H. MACLEODII (Griff. l. c.). ♂ In Indiâ orientali centrali, in silvis Jubbulpore vicinis. — Arbor mediocris, partibus novellis pube ramosâ tomentosis, foliis oppositis cordatis vel cordato-roundatis, inflorescentiâ terminali cymoso-co-rymbosâ, floribus congestis in apicibus pedicellorum brevium articulatis, albis?. Habitus quodammodo Rottleræ, adspectus florum Lythrariearum, si mavis Pemphidis.

XLI. SCLEROON Benth. in Lindl. bot. reg. new. ser. 15. misc. 65.

Calyx campanulatus, breviter 4-dentatus. Corolla infundibuliformis, limbo 4-fido. Stamina 4. Ovarium 4-loculare, loculis uniovulatis, ovulis

lateraliter affixis. Stylus brevis; stigmata distincta obtusa. Drupa indehiscens, calvæ immutato suffulta, putamine osseo, loculis 4 (quorum 2 saepe abortivi) monospermis. Semina oblonga, lateraliter affixa. Embryonis recti radicula ad basin fructus spectans brevissima; cotyledones crassæ carnosæ; plumula inconspicua.

S. OLEINUM (Benth. I. o. n. 98). ♂ Hab. in Mexico. Frutex foliis oppositis integris vel integerrimis, inflorescentiæ axillari oymosâ pauciflorâ.

### Tribus III. AVICENNIEÆ Meisn. gen. p. 292.

Inflorescentia capitata vel spicata, centripeta. Flores sessiles, oppositi; singuli bracteâ et bracteolis geminis illæ alternis itemque squamæformibus imbricatis suffulti. Ovarium biloculare, ovulis in loculo geminis ex apice anguli centralis pendulis amphitropis. Capsula coriacea indehiscens, embryone intra pericarpium germiuante demum effracta. — Arbores inter tropicos totius orbis alluvium maritimum habitantes ibideinque cum Rhizophoreis et Ægicereis silvas densissimas constituentes.

XLII. AVICENNIA Linn. gen. n. 1737 (*Cod. Linn. ed. Richt. p. 619*), Juss. gen. 108, *Endl. gen. n. 3722*, *Meisn. gen. 292* et *comment. p. 200*, *R. Br. prodr. 518*, *gen. rem. p. 34* et *obs. in Wall. pl. as. rar. 3. p. 44* (*R. Br. verm. bot. schr. ed. N. ab E. 3 p. 374 et 5 p. 401*), *Jacq. hist. amer. p. 177. t. 112*, *Lam. illustr. t. 540*, *Wall. pl. as. rar. 3. t. 271*, *Schauer in Endl. et Mart. fl. bras., ined.* — *Donatia Loefl. iter 133, non Forst.* — *Oepata Rheed malab. 4. p. 59. t. 45.* — *Upata Adans. fam. 3 p. 201.* — *Secura Forsk. aegypt. 37.* — *Halodendron Pet.-Thouars gen. nov. madag. n. 26.*

Calyx profunde 5-partitus fere 5-phyllo, æqualis, phyllis concavis obtusis imbricatis. Corollæ tubus brevis campanulatus, limbus 5-fidus lobo postico plerumque latiore breviore pauloque dissimili. Stamina 4, corollæ tubo superne inserta, glabra, breviter exserta, subinæqualia, corollæ lobis alterna. Antheræ biloculares, loculis distinctis collateralibus connectivo filamento continuo dorso adnatis rimâque longitudinali in antico margine dehiscentibus. Ovarium sessile, ovatum astylum vel conoidem in stylum attenuatum, sericeum, biloculare. Ovula integumentis destituta (funiculi St-Hil.) in quolibet loculo gemina, collateralia, ex apice axeos centralis compresso-tetragoni amphitrope pendula, microptyle inferâ; quorum ovulorum tamen non nisi unicum fœundatur et ad semen perficitur, dum reliqua tabescunt et in spermophoro residua cum eo perexiguo in pericarpio maturo ad latus vel ad basin pressa reperiuntur. Stylus, ubi adest, inclusus, post anthesin paulo elongandus; stigmata duo brevia, per anthesin sibimet applicita, deinceps divergentia. Fructus oblique ovatus, compressus, styli rûdimento apiculatus, basi rotundata calyce et bracteis emarcidis suffultus; pericarpium coriaceum, intus lævissimum, embryonem nudum arcte obtegens. Albumen fere nullum. Embryo maximus, coriaceo-carnosus, saturate viridis, erectus, testâ omnino destitutus; cotyledones latissimæ, reniformi-cordatae, crassissimæ, læves, conduplicate, subinæquales; radicula longa et crassa, lanugine longâ et molli densissime barbata, oblique inter cotyledones adscendens easque apice affigens, basi nuda papillosa; caulinulus primum nullus, sed mox semine intra pericarpium germinante elongatus, cylindricus, attenuatus, lævis; plumula diphylla. — Arbores sempervirentes, habitu mire consimili, radicibus longe lateque repentibus ubicum-

que pulullantibus. Folia opposita coriacea, margineque interpetiolari conjuncta, integerrima, supra glabrescentia, subitus indumento denso raso candidantia etate sæpius glabrata. Pedunculi singuli axillares, ad apices ramulorum terni, medio sæpius tricipiti. Bractæ et bracteolæ consimiles, calyce quartâ tertiatâ parte breviores et cum eo dorsoque corollæ sericeæ margine scarioso villoso-ciliato. Corolla parva, subcoriacea, præfloratione imbricativa. — De evolutione ovuli et seminis vide St-Hil. in mem. Mus. 4 p. 387 et Griffith in trans. soc. linn. lond. 20 p. l. cum ic. In A. officinali embryo nobis obvius, rite invenimus quod a cl. Wallich l. c., annuente ill. Brown, est descriptum. — Inflorescentia Viticearum nec Myoporacearum.

### Sectio I. DONATIA.

Stylus manifestus, post corollæ lapsum e calyce exsertus. — Corollæ limbus utrinque tomentosus. — Donatia *Læffing* l. c.

1. A. NITIDA (Jacq.! amer. p. 177, t. 112, f. 1), foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis apice acento supra lucidis subtus candidantibus (demumque vero sæpius glabratissimis nitidis), corollæ lobis reflexis antice rotundatis in unguem latum linearem levissime coarctatis subtus sericeis supra velutino-tomentosis, staminibus exsertis lobum corollæ posticum æquibus, stylo stamina æquante. ♂ In æstuariorum Americae tropicæ; in Brasiliæ prov. Soteropolitanâ (Sell.! Salzm.! pl. bras. exs. n. 431), in Guianâ (Parker! Weigelt!), in insulis Cubâ (de la Ossa!), S.-Thomæ (Wydl! exs. n. 14), Guadeloupe (Bertero! L'Hermin.! et Martinicâ (Jacq.!). A. tomentosa Meyer prim. flor. esseq. (excl. syn.) Weigelt! pl. Surin. exs. A. Meyeri Miquel in Linnæa 18. p. 262. Bontia, etc. P. Br. jam. 263. Mangle Lauroccras foliis, etc. Sloane jam. 156. Gnapira Aubl. guiana. 1 p. 309, t. 119. ideoque Gyrastrum Necker elem. n. 371? Nomina vulgaria: *Paletuvier rouge*, gall. *antill.*, *Karnaboom* Surinam., *Mangue amarello* vel *branco* Brasil. — Folie 3-6 poll. longa, nunc angusta 8-10 lin. lata, nunc magis oblonga usque ad sesquipollieæ lata, acutissima vel acuta, supra siccando nigrescentia, subtus saltem juventute niveo-candidantia. Cor. alba, major quam reliquarum specierum. (v. s. in h. DC. )
2. A. AFRICANA (P. de Beauv.! fl. d'Oware et de Benin 1. p. 79 t. 47), foliis lanceolatis oblongis ellipticis obtusis in petiolum coarctatis supra glabris lâte virentibus demumque nitidis subtus glaucis, corollæ lobis reflexis quadratis obtusangulis exunguiculatis subtus sericeis supra glanduloso-velutinis, antheris et fancibus corollæ exsertis, stylo stamina æquante. ♂ in æstuariorum marit. Africæ occidentalis, in Guinæa (Beauv.! Thoning!) et Senegambiâ (Perrottet!). Folia 3-4 poll. longa, 9-15 lin. lata, pagina super. glaberrimæ quasi acu punctatâ primum leviter glaucescente demumque lavigatâ nitidâque, inferiore indumento alphitoideo denso glaucescente obductâ. Corolla tubo calycem æquante, limbi lobis æquilateris truncatis 2 lin. longis vis. 1½ lin. latis, postice breviore pauloque latiore emarginato. — Proxima precedenti, sed diversa foliis obtusis supra minus nitidis neque siccitate nigrescentibus subtus neque niveis neque (quantum equidem novi) calvescentibus. Quod ad floris conditionem cum illâ fere convevit, (v. s. in h. DC. )

### Sectio II. UPATA.

Stylus subnulus; stigmata in vertice ovarii fere sessilia. — Corollæ limbus supra glaber. — Oepata *Rheed*. l. c. — Upata *Adans*, l. c.

3. A. TOMENTOSA (Jacq. amer. p. 178, t. 112, f. 2), foliis obovato-ellipticis obtusissimis in petiolum attenuatis supra demum subnitidis subtus candidantibus etate interdum glabrescentibus, spicis brevibus basi plerumque interruptis, corollæ lobis patentissimis subquadrate-linearibus truncatis, postico breviore latiore retuso, omnibus subtus sericeis supra glabris, ovario inclusu conoideo

sericeo stigmatibus sessilibus. 5 In littoribus paludosis Americæ tropicæ e. g. in Brasiliâ a Rio de Janeiro (Ried.! Pohl! Gaudich.!), usque in prov. Soteropolit. (Salzm. pl. bras. exs. n. 430, Blanchet! pl. bras. n. 1427, Mart.! herb. fl. bras. n. 108), in litt. maris Cumanensis (H. et B.), in ins. Caribœis (Jacq.) et Antillis e. g. Guadeloupe (Perrrottet!), in littore Mexicano ad Campeche (H. et B.) et ad ripas fl. Alvaradi (Moçuno) et in Floridâ (Nutt.), tum etiam in litt. Oceani Pacifici ad Guayaquil Quitenium (H. et B. Gaudich.). A. elliptica Thub. pl. bras. dec. 3, p. 37, n. 39. Folia 3 poll. longa, 15-18 lin. lata, facie demum glabrata neque adnudum nitida, subtus indumento demum abolescente induita, siccando decolorescens neque vero nigrescentia. Cor. alba, lacinias 1½ lin. longis, lineam latis, anticis 3 patentissimis aut reflexis, posticâ patente. (v. s. in h. DC. et Mart.)

4. A. OFFICINALIS (Liun. sp. pl. ed. 1, p. 110, ex loco), foliis oblongo-lanceolatis subellipticis obovatis acuminatis acutis obtusisvc in petiolum attenuatis supra demum lucidis subtus niveis, capitulis globosis densis, corollæ lobis c calyce semiexsertis subaequalibus erecto-patulis apice recurvis ovatis acutis obtusisve emarginatis subtus sericeis supra nitidis, ovario inclusu obovato immâ basi glabro apice villoso, stigmatibus sessilibus. 5 Crescit in æstuariis orbis antiqui : in Indiâ (Wall! cat. n. 1742) et exinde orientem versus in archipelago Indico e. g. Javâ (Bl. Jungh.), Luconiâ (Perrrottet!), Timor (Decaisne!), Chinâ australi (Meyen!), usque in Novæ Holland. oras orientales (R. Br., Sieber! fl. N. H. exs. n. 268, d'Urv.! Gaudich.) et austro-occidentales (Labill.! Preiss.! exs. n. 1298) et Nov.-Zeelandiam (Mérat!); — occidentem versus in littoribus maris Rubri (Bové!) exs. 1834, n. 229, Acerbi! Schimper! un. itin. 1837, n. 736, in litt. Africæ orientalis usque ad Portum Natal (Drège! exs., Krauss.! n. 241. « Witte Mengerhout » colon.), necnon in ins. Madagascar ad ripas fl. Maru-Voai et ad sinum S. Augustini (Bojer!) — Av. resinifera Forster! pl. csc. p. 72, prodr. n. 246. A. Rich.! bot. astrol. p. 195. Decaisnel herb. timor p. 74. A. tomentosa R. Br. prodr. 518. Miq.! in Lchm. pl. Preiss. 1. p. 353. Roxb. fl. ind. 3. 88. Wall.! pl. as. rar. 3 p. 44. t. 271. Bl. bijdr. 821. A. alba Bl.! bijdr. p. 821. Seeura Forsk. aeg. 37 (Arabis « Schora » ex Bové et Schimp.) Halodendron Pet. Th. gen. nov. mad. n. 26 ideoque Halod. Thouarsii R. et Schult. syst. 3. p. 34. — Oepata Rheede l. c. Upata Adans. l. c. Mangium album Rumph. herb. amb. 3. 115. t. 76. Rack Bruce abyss. 5. p. 44 cum tab. bonâ (ex R. Br. l. c.). Ramuli novelli iudumento communi raso induti, adolescentes consimil glabrescentes. Folia figurâ variabilia, attamen in aliis magis lanceolata, in aliis magis oblonga v. elliptica, in aliis ferme obovato-elliptica, juvenia supra pressertim basi leviter pulverulenta cito calvescentia, adulta supra nitida imo lucida et siccando plerumque nigrescentia. Bractæ dorso sericeæ interdum magis glabratæ et punctis resinosis conspersæ. Corollæ haud omnino e calyce exsertæ lobifere æquales, figurâ ovata in genere insignes. Fructus ovato-compressus, pollicem fere longus, indumento alphitoideo raso candicans. (v. s. in h. DC.)

*Species dubia, nomine solum nota.*

5. A. INTERMEDIA (Griffith in trans. linn. soc. Lond. 20, p. 6 siue phrasi aut desc.). — In Malacca. Media ex auctore inter A. officinalem et tomentosam.

Ordo CXLVIII. MYOPORACEÆ (1). — Myoporinæ *Brown prodr. fl. nov.-holl.* p. 514 (*excl. Avicenniâ, ex ejusd. gen. rem.* p. 34). — Myoporinées *Juss. dict. sc. nat.* 34 p. 26. — Polygaleæ b, Myoporineæ *Reich. consp.* p. 120 (*excl. Krameriâ*). — Myoporinæ *Bartl. ord.* p. 176. — Myoporaceæ *Lindl. nat. syst. ed. 2* p. 279 (*excl. Avicenniâ*). — Myoporineæ *Endl. gen.* p. 642, *ic. t.* 65, 66, 92. — Myoporaceæ *Lindl. veg. kingd.* p. 665 (*excl. Avicenniâ*).

Calyx persistens, 5-partitus vel rarius 5-fidus, lobis interdum basi imbricatis, aestivatione 5-unciali. Corolla gamopetala, 5-loba, subregularis vel varie bilabiata, lobo uno semper antico id est erga axim inflorescentiæ exteriore, in aestivatione intimo. Stamina 4. saepius exserta, basi corollæ inserta, ejus lobis inferioribus alterna, absque vestigio quinti superioris; 2 inferioribus in didynamia majoribus. Antheræ lunulatæ apice filamenti oscillantes, loculis 2 in unum rimâ unicâ introrsum dehiscentem confluentibus. Pollen (ex *Myoporis parviflora* et *apiculata*) ellipsoideum, sulcatum lave, tubis (ex *Hassal ann. nat. hist.* 9 p. 550) tribus. Ovarium toro pingui sine nectario annulari aut glandulâ insidens, liberum, bi- (*in Polycælio multi-*) loculare loculis antice et postice sitis, frequenter carpidiorum marginibus e centro introflexis incomplete vel complete in locellos subdivisis. Ovula e superiore parte, rarius e mediâ, loculorum pendentia anatropa, micropyle superâ; *in Polycælio* 5-8: *in omnibus fere aliis aut 4, nempe 1 in quâque sudivisione loculorum, aut 2 nempe 1 in utroque loculo; in Bontia 8, nempe 2 in locellis superposita.* Stylus terminalis, apice simplex vel rarius bifidus. Drupa parva baccata vel fere exsucca, putamine (*Polycælio excepto*) biloculari, saepè replis carpidiorum incrassatis aut extensis incomplete vel complete 4-locularis, pro numero ovulorum 8-4-2-sperma. Semina inversa, oblonga; albumine carnosæ, parco. Embryo *in axi albuminis, ejusdem fere longitudinis, terés; radiculâ superâ; cotyledonibus plano-convexis, oblongis, radiculam subæquantibus.* — Suffrutices, frutices, rarissime arbusculæ, e Novâ Hollandiâ pleraque indigena, etiam ex aliis insulis Oceani Pacifici, unico genere (*Bontia*) ex insulis Americanis Caribæis! Folia alterna, rarius opposita, simplicia, integra vel dentata, plerumque glandulis resisa, nosis conspersa. Stipulæ nullæ. Flores axillares, albi, flavi vel rubri, nunquam vero cœrulei, pedicellis solitariis, binis plurirubri, busve ex eâdem axillâ saepè uno altero in axillâ superposito,

(1) Auctore Alph. de Candolle, manuscriptis paternis quoad spec. *Myopori* et genus *Eremodendron* adhibuit.

non bracteatis (*Dasymallâ* excepto). — Ordo arcte Verbenaceis adhærens, nec nisi radiculâ superâ distinctus, et ideo *Avicennia* rectius in Verbenaceis collocanda. Loculorum structura ubi sæpissime membrana introflexa plus minus locellos gignit, eadem est quæ in *Labiatis* et *Borragineis* constans et perfecta: apparet etiam in Verbenaceis, ubi præterea numerus ovulorum 2 vel 1 in utroque loculo ut in præsenti ordine variat (1). Myoporaceæ *Selagineis* quoque connexæ propter antheras uniloculares, ovula pendentia, semen albuminosum et radiculam superam, sed minus quam in Verbenaceis. Habitus enim in *Selagineis* differt; calyx sæpe abnormis, numero partium ab exteriore reducتو (2); corolla quando irregularis (*Hebenstreitia*, *Gymnandra*) labio superiore accrescit, lobo inferiore breviore aut nullo, cum in Myoporaceis ut in plerisque ordinibus lobus inferior præpoltet. Æstivatio corollæ, situs florum erga axim et staminum erga corollam similia in Myoporaceis, Verbenaceis et Selagineis (3). Accedunt Myoporaceæ quodammodo fructu ad Sesameas, fructu et interdum habitu ad Oleaceas.

#### CONSPECTUS GENERUM.

1º *Ovula in ovario 2-loculari duo, nempe solitaria in utroque loculo.*

A. Corolla subregularis, campanulata.

Calyx fructifer non auctus I. Disoon.

Calyx fructifer auctus II. Nesogenes.

B. Corolla irregularis, major, tubo infundib. subcurvato. III. Pseudopholidia.

2º *Ovula in ovario 4 (excepto Polycælio ubi 5-8), loculis 2 sape subdivisis, et ideo ovula aut gemina in loculis aut solitaria in locellis.*

A. Stylus apice bifidus.

Corolla bilabiata, lobis  $\frac{2}{3}$ . Loculi incomplete divisi. IV. *Dasymalla*.

Corolla subregularis. Loculi complete divisi V. *Spartothamnus*.

B. Stylus apice simplex.

a. Lobi calycis basi non imbricati.

(1) Conf. ad Casseliam, supra p. 527, ubi loculi 2 uniovulati. Diversissima meo sensu est structura aliarum Verbenacearum ubi loculi subdivisi cum locellis uniovulatis.

(2) Calyx *Selaginearum* vel 5-lobus, e 5 sepalis uninerviis connatis, ut vidi in *Selagine corymbosâ*, *Agathelpide*, et *Microdon cylindrico*; vel triphyllus, sepalis 2 inferioribus deficiens, ut in *Selag. decipienti*, *ciliata*, aliisque; vel diphyllus, e sepalis uninerviis laterilibus distinctis, ut in *Dischisma ovato*; vel monophyllus binervius bracteansi interiore simulans, e sepalis 2 lateralibus superiori propriioribus connatis constans, lobo superiore seu axi opposito tunc deficiente, ut in *Hebenstreitia* et *Gymnandrâ*. Numeri et situs nervorum structuram probant.

(3) Situs staminum erga corollam in hisce plantis, præcipue in *Myoporo* et *Agathelpi* (*Selaginea*) sæpe sub oculo fallax, filamentis per longitudinem tubi corollæ connatis et simul deflexis vel arcuatis, basi cum nervo centrali lobi corollæ alternantibus et apice cum eodem nervo junctis (*in Agathelpi*) aut ad hunc approximatiss (*Myoporum*).

- \* Corolla subregularis.
  - Ovarium 5-8-loculare . . . . . VI. Polycœlium.
  - Ovarium 2-locul. loculis plus minus divisis. VII. Myoporum.
  - \* \* Corolla irregularis, major, tubo sursum inflato.
  - Calyx fructifer auctus . . . . . VIII. Eremophila.
  - Calyx fructifer non mutatus. Ovula e medio locul. pendentia . . . . . IX. Eremodendrou.
  - Calyx fructifer non mutatus. Ovula ex apice loculi pendentia. X. Pholidia.
  - b. Lobi calycis basi imbricati.
  - Corolla irregularis, major, lobis  $\frac{4}{1}$  . . . . XI. Stenochilus.
- 3º *Ovula in ovario 8, nempe 2 in quæque subdivisione locularum superposita.*

Lobi calycis basi imbricati. Corolla major, bilabiata, lobis  $\frac{2}{3}$ . Genus Americanum.

XII. Bontia.

#### I. DISOON.

Calyx 5-partitus, fructifer non auctus. Corolla campanulata, 5-loba, subregularis. Stamina 4, exserta, subæqualia. Ovarium obovato-oblongum, compressum, glabrum, biloculare. Ovula in utroque loculo solitaria, ex angulo superiore funiculo brevi pendentia, anatropa. Drupa compressa calyce longior. — Frutex Novæ Hollandiæ, habitu proprio, foliis alternis linearibus angustis elongatis, pedicellis in axillis foliorum aggregatis, floribus numerosissimis albis. — Nomen ex numero ovulorum in ovario toto.

D. FLORIBUNDUS. ♂ In Novæ Hollandiæ orient. interioribus, in insulis arenosis fluvii Lachlan (Cunn.). Myoporum floribundum A. Cunn.! in lit. Benth. in Hugel en. p. 78. Kami teretes erecti, glandulosi, glabri. Folia elongato-linearia, 3- $\frac{1}{2}$  poll. longa, vix ultra lineam lata, patentia, minute et remote denticulata glabra. Pedicelli 5-9 in axillâ eadem, 1- $\frac{1}{2}$  lin. solum longi. Calyx lobi lanceolato-lineares, acuminati, lineam fere longi. Corolla calyx duplo longior, semi-5-fida, superne patens, lobis ovato-acutis interne subbarbatis. Filamenta glabra. Antheræ hemisphæricaæ, uniloculares. Stylus glaber. Drupa ex cl. Benth. supra descr. (v. s. a cl. Cunn. comm.).

#### II. NESOGENES.

Calyx subcampanulatus, 5-fidus, lobis ovato-acutis demum ampliatis. Corolla subcampanulata, 5-loba, lobis fere æqualibus. Stamina 4, didynamia, antherarum lobis 2 basi divaricatis mucronatis. Ovarium... Stigma dilatum, obtusum. Drupa ovali-globosa, pubescens, bilocularis, loculis monospermis. — Frutex habitu Euphrasie vel Bartsiae, pubescens, foliis oppositis ovato-acutis, pedicellis axillaribus geminis. — Ovarium non aperierunt cl. auct. sed ex semine in utroque loculo solitario, ovula verisimiliter duo tantum adsunt, nec tamen praecedenti gen. affinis planta propter calycom ampliatum, folia opposita etc. — Nomen ex origine insulari.

N. EUPHRAXIOIDES. ♂ In insulâ Whitsunday, id est Pentacostes, non procul a Novâ Caledoniâ. Myoporum? euphrasioides Hook. et Arn. bot. Beech., p. 67. Rami oppositi pubescentes. Folia opposita, vix semiunciam longa, ovata, acutiuscula, integra vel crenato-dentata, imo quandoque incisa, in petiolum brevem attenuata, pubescens, siccitate nigrescentia. Pedicelli breves. Calyx pubescens, tubo lineis 5 elevatis. Ovarium ovoidem, in stylum filiformem attenuatum. Drupa stylo mucronata, calyce cincta. Semina loculos implentia.

## III. PSEUDOPHOLIDIA.

Calyx 5-partitus, fructifer non mutatus. Corolla subincurva, basi anguste cylindrica, supra lobos calycis infundibuliformi-ventricosa, apice 5-loba, lobis 2 superioribus minoribus. Stamina 4, inclusa, didynama. Ovarium oblongum, compressum, glabrum, biloculare, replacarpidiorum longitudinali nerviformi ad 4-locularia paululum accedens, biovulatum, ovulis ex longitudinibus suis loculi funiculo brevi pendentibus. Stigma indivisum. Drupa ign. — Frutex Novae Hollandiae, foliis crebris alternis ovatis obtusis sinuodentatis glabris, pedicellis axillaribus brevibus plerumque solitariis nunc binis, lobis calycinis linearibus, corollâ albâ calyce triplo longioro extus glabra intus hasi pubescente apice lanuginosâ. — Differt a Pholidiâ ovulis in ovario toto 2, loculis duobus non subdivisis. — Habitus a Myoporis diversus.

P BREVIFOLIA. ♂ In Novâ Hollandiâ austro-occid. ad Swan River, locis depressis humoso-arenosis umbrosis (Drummond, n. 445! in h. Boiss., Preiss, n. 2335 et 2382). Myoporum brevifolium Bartl. in Lehm. pl. preiss 1, p. 350. — Frutex 8-10-ped. Rami teretes, graciles, glabri, sparse tuberculato-punctati. Folia sessilia, coriacea, 3-5 lin. longa, 2-3 lin. lata, hinc inde tuberculato-punctata. Pedicelli folio duplo breviores. Lobi calycinis erecti, 1½-2 lin. longi, æquales, angusti. Corolla 4 lin. longa, lobis ovatis, supremis rectis? inferioribus patentibus. Stylus faucem corollæ paulo superans, glaber (v. in h. DC., Boiss. et berol.).

β. ovalifolia, foliis late ovalibus vix punctatis (v. spec. a Drummond sine num. in h. nostro).

## IV. DASYMALLA Endl. gen. suppl. 1, n. 3733, nov. st. dec. 2, n. 12.

Calyx 5-partitus, fructifer vix auctus. Corolla infundibuliformis tubo calycem superante, fauce æquali, limbi bilabiati labio superiore bilobo, inferiore trifido subæquilongo. Stamina 4, inclusa, subdidynama. Ovarium incomplete 4-loculare, septis incompletis, loculis uni-ovulatis (1). Ovula pendula, anatropa. Stigma acutum, bifidum. Drupa baccata, putamine 4-loculari, 4-spermo. — Fruticuli Novae Hollandiae dense lanati, foliis oppositis oblongo-ovatis integerrimis, pedicellis bracteolatis axillaribus fasciculatis, vel in cymas oppositas in racemum terminali dispositas collectis, floribus purpurascensibus, corollæ tubo basi barbato, fauce nudâ. — Plantas non vidi, sed ex copiâ tomenti, stylo apice bifido et pedicellis bracteolatis (in Myopaceis unicum exemplum) abnorme genus videtur quamvis characteres fere Myopori, et forsitan Chloanthi Verbenacearum affinitas quædam.

1. D. AXILLARIS (Endl. nov. st. dec. 2, n. 12), floccoso-lanata, pedicellis axillaribus fasciculatis folio brevioribus. ♂ In Novâ Hollandiæ austro-occid. interioribus (Roë.. Fruticulus pedalis, multicaulis, a basi opposite ramosus. Rami tetragoni, lanâ albâ dense vestiti. Folia inferiora remota, sup. approximata, 1-1½ poll. longa, 4-5 lin. lata, obtusa, densissime albo-lanata, lanâ ad margines longiore subfloccosâ. Pedicelli in axillis 3-4 congesti, 4 lin. longi, antice et postice lanâ patente plumosi, margine utroque glabriuscili, basi utrinque bracteolâ linear-setaceâ dense lanatâ mox oblitterata stipati. Lobi ealycis subcampanulato-convientes, lineares, obtusi, 4 lin. longi, ¾ lin. latit. vix superantes, extus densissime lanati, lanâ ad marginem longiore patente subplumosi, intus nudi, trinervii. Corollæ tubus 5½ lin. longus, intus ½ lin. supra basim annulo staminigero densissime piloso cinctus, sursum ad medium ampliatus, lobis labi inf. 3 lin. circiter longis, medio paulo longiore. Antheræ obtusæ, basi bifidæ.

(1) Ex affinibus verisimiliter ovarium 2-loculare, loculis incomplete subdivisis, sed plantas non vidi et ideo verba cl. auctoris scripsi.

Ovarium compresso-conicum, dense pilosum, carpidorum marginibus bilamellatis ad axim haud pertingentibus primâ juventute uniloculare, mox ad axim connatis et 4 locularc.

2. D. TERMINALIS (Endl. l. c. n. 13), tomentoso-lanata, cymis oppositis in racemum terminalem dispositis. ♂ In Novæ Hollandiæ austro-occid. interioribus (Rœ). Rami teretiusculi, tomento albo denso. Folia obovato-oblonga, 10 lin. longa, 4 lin. lata, dense tomentosa, apice ramorum conferta, floralia paulo minora minus lanata, paribus 3-5, internodiis 1-2-pollicaribus minus dense lanatis sejunctis. Cymæ in axillis foliorum floralium oppositæ, iis breviores, simplices. Flores quam in preced. paulo minores, calycis parcius lanati lobis lanceolatis.

- V. SPARTOTHAMNUS *All. Cunn.* in *Loud. hort. brit. suppl. p. 600 sine descr.*  
*Walp. rep. 6, p. 694.*

Calyx 5-partitus, lobis ovato-lanceolatis acuminatis, fructiferis non auctis. Corolla infundibuliformi-campanulata, calyce vix duplo longior, 5-loba, lobis tubo subbrevioribus, 4 superioribus æqualibus ovato-oblongis acutiusculis, infimo paululum latiore et longiore rhomboeovato, fauce parce barbellatâ. Stamina 4, subæqualia, lobis corollæ parum breviora, filamentis basi barbatis, antheris glabris, bilocularibus (1). Ovarium globosum, glaberrimum, 4-sulcatum, 4-loculare, loculis uniovulatis. Ovula pendentia, anatropa. Stylus longitudine staminum glaberrimus vel basi parce pilosulus apice in 2 ramos filiformes revolutos minutissime intus papilloso-glandulosos divisus. Baccæ rotunda, exsucca, 4-locularis, 4-sperma. Semina trigona, ovata, testâ coriacæ rugoso-sulcata. Embryo in axi albuminis, radiculâ superâ. — Frutex Novæ Hollandiæ, pluripedalis, ramosissimus, habitu Spartiorum nonnullorum. Rami tetragoni, oppositi, virentes, rigidi, sæpiissime 2 ex eâdem axillâ et tunc superpositi superiore majore. Folia opposita, rara, minima, decidua, in ramulis ultimis videnda, linearî vel elliptico-lanceolata, glabra, vix acuta. Flores in axillis superioribus hinc inde solitarii, brevissime pedicellati, albi. Calycis lobi 3-nervii, subpatentes, Fructus magnit. grani piperis, nitidi, glaberrimi, coccinei vel denum aurantiaci. Semina opaca, fusca.

S. JUNCEUS (Cunn. l. c. Walp. l. c.). ♂ In Novâ Hollandiâ orient. interiori (Cunn.!), anno 1844 in horto berol. cult. Folia in specim. vix lineam longa. Flores 2 lin. longi. (v. s. in h. berol. et in nostro, sed specim. absque fl. et fr.).

- VI. POLYCOELIUM — Pentacœlium Sieb. et Zucc. fl. jap. fam. nat. sect. alt. p. 27. t. 3. f. 2.

Calyx 5-partitus, regularis, fructifer haud mutatus. Corolla infundibuliformis vel subcampanulata, semi-5-fida, lobis ovatis subæqualibus, duobus paulo angustioribus approximatis. Stamina 4, didynama, tubo corollæ adnata, eo vix longiora, antheris reniformibus. Ovarium 5-8-loculare, globoso-angulatum. Ovula ex apice cujusvis loculi pendentia. Stigma obtusum, subemarginatum. Drupa subcostata, putamine 5-8-loculari. Semina 5-8. — Frutices glabri, ex insulis oceani Pacifici in hemisphærio boreali et Chinâ, foliis alternis integris oblongo-lanceolatis, pedicellis axillaribus, habitu et floribus omnino Myopori, sed numero loculorum et ovulorum distinctum genus. — Nomen mutavi propter species 6-8-loculares hic adjunctas.

1. P. BONTIOIDES, pedicellis in axillis 1-3, tubo corollæ calyce triplo fere longiore, lobis corollinis tubo duplo brevioribus, drupâ pentagono-conicâ 5 loculari. ♂ In Japoniâ. Pentacœlium Bontioides Sieb. et Zucc. l. c. Frutex ramis

(1) Ex Walp. l. c., sed ex specim. herb. berol. loculi discoidei potius confluentes videntur. Quum specim. unicum et pauciflorum sit florem non aperii. (Alph. DC.)

teretibus. Folia oblongo-lanceolata, utrinque longe attenuata, coriacea, integririma, præter nervum medium enervia,  $2\frac{1}{2}$ -4 poll. longa, 10-15 lin. lata. Pedicelli florem longit. æquantes, solitarii vel 2-3 sibi superpositi. Lobi calycis deltoideo-acuminatis. Corolla glabra, pollicaris, tubo infundibuliformi-cylindraceo, lobis obtusiusculis. Ovarium glabrum, nunc 4-loculare.

2. P. CHINENSE, pedicellis in axillis 2, tubo corollæ calyce triplo longiore, lobis corollii tube duplo brevioribus, drupâ . 5-6-loculari. ♂ In Chinâ (Fortune! n. 12). Rami crassiusculi, læves. Folia oblongo-lanceolata, acuta, basi longe attenuata, integririma subpellucide punctata, nervis lateralibus fere nullis, 2-3 poll. longa, 3-7 lin. lata, petiolo 4-6 lin. longo. Pedicelli 9-12-lin. patenti-recurvi. Calycis lobi basi imbricati, ovato-acuminati, fere 2 lin. longi. Corolla 8-9 lin. longa, tubo cylindraceo superne ampliore. Ovarium ovoidaco-acuminatum. Numerus loculorum ultra 5, sed iterum ex div. flor. inquirendus. (v. s.)
3. P. SANDWICENSE, pedicellis in axillis 3-5, tubo corollæ calyce vix duplo longiore, lobis corollinis tube subæqualibus, drupâ depresso-globosa 6-8-loculari. ♂ In ins. Sandwich (Gaudich.! n. 35, Beechey!). Myoporum tenuifolium Hook. et Aru. bot. Beech. p. 93. Ramuli apice subangulosi. Folia extremitate ramorum approximata, oblongo-lanceolata, utrinque longe attenuata, integririma, præter nervum medium enervia,  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, 4 lin. lata. Pedicelli 3-4 lin. longi, florem nempe æquantes. Lobi calycis ut in sp. 1. Corolla multo minor, 3 lin. solum longa, infundibuliformis et fere 5-fida, lobis ovatis acutiusculis. Ovarium glabrum. Drupa junior ovoidea, stylo terminata, matura globosa, obtuse et inæqualiter subquinquangularis, depressa, 2-3 lin. lata, putamine duro 6-7-8-loculari. Specimina Hookeriana, ins. Sandwich, variant foliis acuminatis, minime acuminatis et mediis. Ex cel. auct. lignum odorem Santali spirat et in Chinam exportatur. An cadem spec. quam Myoporum tenuifolium Forst. et Br.? Ex Hook. et Arn. specimina Novæ Hollandiæ et ins. Sandwich similia, sed loculos non viderunt, ct cel. Brown plantam Forsteri in Myoporo collocavit ubi drupam 4-2-locularem ex char. gen. affirmat. Confer ad Myopori sp. dub. (v. s. in h. DC. et Deless.)

VII. MYOPORUM Banks et Sol. in Forst. prodr. (1786) p. 44, Br. prodr. p. 515, Endl. gen. n. 3733, ic. t. 65.—Pogonia Andr. bot. rep. 3 (1801) n. et t. 212, non Juss.—Andreasia Vent. h. matm. (1807) f. 108 non Spreng.—Bertolonia Spin cat. hort. 1809 p. 24, non alior.

Calyx 5-partitus, fructifer haud mutatus vel parum auctus. Corolla campanulata vel fere hypocraterimorpha, tubo brevi, limbo 5-lobo subæquali, lobis 2 superioribus paulo magis approximatis nunc subminoribus. Stamina 4, vix didynamia. Ovarium bilocularia vel sæpius reduplicatis carpidorum marginibus 4-loculare. Stigma obtusum. Drupa baccata aut subexsucca 2-5-locularis, sæpe abortu 3-locularis, loculis 4-spermis. — Frutices plerique Australasici. Ramuli foliaque novella sæpe fucati viscidii. Folia alterna rarissime opposita, integririma aut serrata sæpius tuberculato-glandulosa, glandulis hiuc inde pellucidis. Pedicelli axillares, foliis breviores, solitarii, gemini aut fasciculati, in M. parvisolio geminatim superpositi. Corolle albæ raro purpurascentes, fauce fere in omnibus barbatâ lobis superne sæpius barbatis. Stamina exserta aut inclusa.

### § 1. Drupa ovoidea vel globosa.

\* Foliis alternis integrerrimis.

1. M. MUCRONULATUM (DC mss.), erectum, ramosum, foliis ovato-oblongis basi attenuatis apice breviter mucronatis integrerrimis subuninerviis ramulisque lævibus, pedicellis in axillis 2-3 erectis, calycis lobis ovatis brevibus vix acutis, corollâ calyce quadruplo longiore, limbo superne parce barbato, drupâ ellipsoideâ subcompressâ. ♂ In Nova Hollandiæ orâ orientali legerunt botanici exp. Baudinianæ. Folia  $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, circ. 4 lin. lata, minutissime punctu-

- lata. Pedicelli 3 lin. longi. Calyx vix lin. longus. Drupa 2 lin. longa, ex 2 apertis bilocularis sed 4-sperma; secus septum lamella longitudinalis minima subdivisione vestigium. (v. s. comm. a Mus. reg. par.)
2. *M. APICULATUM* (DC. mss.), erectum, ramosissimum, foliis oblongis basi cuneatis apice obtusis et distinete mucronatis integerrimis vix uninerviis, pedicellis in axillis solitariis subuncinatis, calycis lobis lanceolatis acutis, corollæ calycy triplo longioris limbo glabriusculo. ♂ In Novâ Hollandiâ orâ orientali leger. Botanici exp. Baud. Folia apice ramorum approximata, 18-24 lin. longa. 2-4 lin. lata, minutissime punctulata. Pedicelli 2-5 lin. longi. Corolla 5 lin. longa. Ovarium ovoideum, 4-loculare, septis 2 tenuioribus. Ovula 4. Fructus ign. (v. s. comm. a mus. reg. par.)
3. *M. ELLIPTICUM* (Br. l. c.), erectum lâve, foliis elliptico aut oblongo-lanceolatis subobtusis mucronatis basi attenuatis pellucido-punctatis integerrimis, pedicellis 2-5 incurvis 1-floris, calycis lobis acutissimis, corollâ campanulatâ calycy duplo longiore fauce villosiusculâ limbo imberbi. ♂ In Novâ Hollandiâ, ad Port Jackson (Sieb.!), in parte tropicâ (Br.) — Sieb.! fl. exs. nov.-holl.! n. 223. *Pogonia glabra* Audr. bot. rep. t. 283. *Andrenisia glabra* Vent.; Malm. t. 108. *Pogonia integririma* Lag. cat. h. madr. 1815 p. 10. Folia sèpius 2 poll. longa, 6-8 lin. lata. Corolla alba, 3 lin. longa, drupa 2 lin. longa ovoidea. Pedicelli 4-lin. (v. v. c. et s. sp.)
4. *M. ACUMINATUM* (Brown l. c.), foliis lanceolatis integerrimis acuminatissimis basi attenuatis ramisque lâvibus, pedicellis 5-9 axillaribus, calycis lobis ovato-lanceolatis, corollâ calycy quadruplo majore fauce mediaque loborum patentium supra barbatâ. ♂ In Novâ Hollandiâ orientali (Sieb.! pl. exs. n. 222). Folia 3-4 poll. longa, 9-18 lin. lata. Pedicelli 4-5 lin. longi, rigidi. Cor. 4 lin. longa, lobis obtusis. Ovarium 4-loculare, nunc casu 5-locul. Stylus exsertus demum barbatus. Fructus ovoideus, 2-3 lin. longus, 3-locularis. (v. s.)
5. *M. OBSCURUM* (Endl. prodr. fl. norf. p. 54, ic. gen. t. 65), canle erecto ramulis foliisque novellis viscosis, foliis late lanceolatis ellipticis acuminatis, basi attenuatis integerrimis lâvibus, pedicellis in axillis 1-3 crectis, calycis lobis linearis-lanceolatis elongatis acutissimis, corollâ calycy duplo majore limbo intus barbato patente. ♂ ♂ In insula Norfolk. Folia approximata, 1½-3 poll. longa, 9-18 lin. lata. Pedicelli florentes 2-3 lin. longi, fructiferi 6 lin. Lobi calycis 3 lin. longi. Corolla alba purpureo superne punctata. Ovarium (ex ic.) basi incrassatum aut toro pingui insidens. Stylus pilosus. Stigma (ex ic.) denticulatum. Drupa ovoideo-globosa, 4 lin. longa, stylo apice uncinate terminata, sèpius 4-locularis. In spec. nostro folia minora quam in ic. Endl. (v. s. comm. a cl. A. Cunningham).
6. *M. DESERTI* (A. Cunn.! in litt. Benth. in Hug. enum. p. 78), ramis subviscosis minute glandulosis, foliis crebris suboblongo-linaribus acutiusculis basi angulatis integerrimis minutissime punctatis, pedicellis solitariis reflexis, calycis lobis lanceolatis acutis, corollâ calycy triplo majore limbo imberbi. ♂ In Novâ Cambriæ australis interioris locis sterilibus copiosissimum. Folia erecta, 18-20 lin. longa, 3 lin. lata levigata, rigidula, 1-nervia, nervis later. excisicationes apparentibus. Pedicelli 3-4 lin. longi. Corolla 5 lin. longa, campanulata, semi-5-fida. Ovarium juniùs oblongum, compressum, biloculare, cum rudimento divisionis loculorum. Ovula 4. (v. s. a cl. detect. comm.)
7. *M. CUNNINGHAMII* (Benth. in Hug. enum. p. 78), foliis linearis-lanceolatis utrinque acuminatis integerrimis uninerviis minutissime punctatis pedicellis 1-3 axillaribus subuncinatis, calycis lobis lanceolatis acuminatissimis, corollâ calycy duplo majore limbo intus barbato. ♂ In Novâ Hollandiâ orâ intratropicali ad Morcton-Bay (All. Cunningham!). Affine *M. tenuifolio* sed limbus corollæ barbatus. Rami apice resinoso-punctulati. Folia approximata, 2-2½ poll. longa, 3 lin. lata uninervia. Pedicelli 3-4 lin. longi. Corolla 3 lin. longa, ex sicco alba, lobis obtusis. Stamina corollæ tubo subæqualia. Ovarium oblongum, basi incrassatum, 4-loculare, 4-spermum. (v. s. comm. sine nom. a cl. inv.)
8. *M. CAPRARIOIDES* (Benth. in Hug. enum. p. 77), ramis lâvibus, foliis angustis lanceolatis acuminatis basi angustatis integerrimis uninerviis, pedicellis

- subbinatis filiformibus suberosis, calycis lobis subulatis corollæ tubum et drupam depresso-globosam exsuccam subequantibus, corollæ limbo basi barbato. ♂ In Novâ Holl. ad Swan-River (Hug.). Habitus M. tenuifolii et montani, sed fructu facile differt. Pedicelli 6-9 lin. longi. Drupa parva, dura, 4-locularis.
9. M. CYANANTHERUM (A. Cunn.! in litt. 1836), caule erecto, ramis teretiusculis, foliis linear-lanceolatis acuminate basi attenuatis integerrimis lăvibus, pedicellis ex axillis 2-3, calycis lobis lauceolatis acuminate, corollæ calyce quadruplo longiore limbo superne barbato obtuso. ♂ In paludosis Novæ Cambriæ australis interioris. Folia approxinata, erecta, fere 2 poll. longa, 3 lin. lata, uninervia, minutissime punctulata. Pedicelli 4 liu. longi, in specim. sicco erecti et reflexi. Calyx lineam longus. Corolla tubus 3 lin., lobi lineam longi. Antheræ ad fæciam valde cœruleæ ex sched. cl. detect. (v. s. a cl. Cunn. comm.)
10. M. MONTANUM (Br. prodr. p. 515), foliis linear-lanceolatis acutissimis basi attenuatis ramisque lăvibus, lobis calycinis linearibus acutis. ♂ In Novâ Hollandiâ prope Port Jackson. Florem non vidit cl. auct. Specimen nondum floriferum misit cl. Cunningham, e montibus prope Hunter's river, sub nom. M. montani. Folia in eo 2 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  lin. lata, nunc verrucis globosis fructus mentientibus onusta; pedicelli juniores gemini. Plurasis cel. auctoris supra cit. cum aliis speciebus simili modo convenit. (v. s. spec. non certum.)
11. M. DAMPIERI (A. Cunn.! in litt. 1836), caule erecto, ramis lăvibus, foliis linearibus basi longe attenuatis apice acuminatis integerrimis eveniis, pedicellis ex axillis 3-5 erectis, calycis lobis lanceolatis acutis corollâ triplo brevioribus, corollæ lobis superne barbatis. ♂ In insulis archipelagi Dampieri ad oram boreali-occid. Novæ Hollandiæ intratropicæ (A. Cunningham!). Folia erecta, 2 poll. longa, 2 lin. lata, minutissime punctulata. Pedicelli 4-lin. Corolla campanulata, 3 lin. longa, lobis obtusis. Drupa ovata, 2 lin. longa, stylis basi apiculata, exsucca, 3-locul., loculo uno interdum abortiente. (v. s. a cl. inv.)
12. M. STRICTUM (A. Cunn.! in litt. 1836), caule cresto, ramis subtuberculosis, foliis lato-linearibus basi attenuatis apice vix acutis integerrimis crassiuseculis eveniis, pedicellis ad axillas solitariis patenti-recurvis, calycis lobis lanceolato-linearibus acutis, corollâ imberbi. ♂ In interioribus Novæ Cambriæ australis ad Lachlan river (Cunningham!). Folia erecta, 15-18 lin. longa, sesquilineam lata, minutissime punctulata. Pedicelli 4 lin. longi. Corolla (junior) 2 lin. longa, tunc calyce duplo longior. (v. s. comm. a cl. Cunn.)
13. M. PATENS (A. Cunn.! in litt. 1836), caule erecto, ramis divaricatis tuberculatis, foliis semipatentibus linearibus vix basi attenuatis apice callos-acutis integerrimis crassiuseculis eveniis, pedicellis ad axillas solitariis incurvis, calycis lobis lanceolatis acuminatis. ♂ In partibus interioribus Novæ Cambriæ austr. ad flumen Lachlan (Cunningham!). Folia 15-18 lin. longa, vix ultra lineam lata rigida, minutissime punctulata. Pedicelli 4 lin. longi. Calyx lineam longus, alabastro cor. dimidio brevior. (v. s. comm. a cl. Cunn.)
- \* \* *Foliis alternis serratis, nunc in eodem ramo integris.*
14. M. INSULARE (Brown prodr. p. 516), caule erecto, foliis lanceolatis basi attenuatis apice serratis ramisque lăvibus, novellis viscidis. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ meridionali (Br.). Specimen e Swan river sub num. 13521 cl. Preiss ad præsens specimen cum dubio refert cl. Bartling in plant. preiss. 1 p. 349, nec magis affirmare audeo ex phrasí breviss. cel. Brown. Planta preissiana frutex est orgyalis, ramis angulosis, foliis oblongis basi attenuatis apice obtusis et mucronatis in eodem ramo integris aut apicem versus varie serratis miuitissime punctulatis 18-22 lin. longis 5 lin. saepius latis, pedicellis ex axillis 1-4 saepius 2-3 angulatis 3-4 lin. longis, lobis calycinis lanceolatis acutis linea brevioribus, drupâ globosâ 2 lin. latâ 3-loculari 3-spermâ. (v. s. specim. Preiss.)
15. M. GRACILE (Bartl. in Lehm. plant. preiss 1 p. 350), ramis lăvibus, foliis subsessilibus oblongis acutissimis per totam longitudinem serrulatis, pedicellis axillaribus geminis ternisve gracillimis, lobis calycinis e basi lanceolata sub-

- latis, corollâ calyce duplo longiore, lobis ovatis intus villosis, fructu globoso sicco. ♂ In humidis umbrosis Novæ Hollandiæ austro-occidentalibus ad Perth et Swan River (Drummond! Preiss n. 1850! et 2386). Frutex 4-6-ped. Rami erecti, inferne teretes, superne subangulosi. Folia alterna, sparsa, 10-18 lin. longa, 3-5 lin. lata, minutissime subpellucide punctata, uninervia. Pedicelli 5 lin. longi. Calyx lineam longus. Corolla alba aut viridi-alba, 2 lin. longa. Stamina inclusa. Fructus sæpius globosus vix carnosulus? lineam latitudinis, ex uno aperto 3-locularis, verisim. 3-4-locularis. Ex spec. preiss. 2386 in h. berol. fructus in eodem ramo globosi vel ovoidei et tunc majores. (v. s.)
16. *M. SERRATUM* (Brown prodr. p. 516), caule ramisque erectis lævibus subangulosis foliis lanceolatis acutissimis serratis, pedicellis ex axillis 3-5, calycis lobis lanceolatis acutis, corollâ calyce triplo majore, lobis subrotundatis basi intus barbatis, staminibus exsertis, stylo glabro, baccâ globosâ exsuccâ 4-3-loculari. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ meridionali (Br.), ad terram van Leuwin (Labill.) et ad Cape-Riche (Preiss! n. 1349).—Bartl. in Lehm. plant. preiss. 1 p. 359. *Pogonia tetrandra* Labill. nov. holl. 1 p. 59 t. 83. Folia erecta, 1-2 poll. longa, 2-4 lin. lata, nunc parce serrata. Pedicelli 3 lin. longi, erecti. Corolla 3 lin. longa, limbo patente. Ovarium certe 4-loc. ex ic. et specim. Labill. Drupa 2 lin. lata. (v. s.)
- ♂ *subserpens*, ramis magis angulosis nunc compressis, foliis acutis. ♂ In Swan River, Novæ Hollandiæ occid. merid. (Preiss! n. 1247). M. subserpens Nees ex Bartl. in Lehm. plant. preiss. 1 p. 350. Folia in specimenibus paulo minora, mintis acute terminata, non minus serrata (sed ex cl. Bartling superiora interdum integerrima), nunc obovato-oblonga sed interdum lanceolata. (v. s. in h. DC. et berol.)
17. *M. TASMANICUM*, caule erecto, ramis erectis et patentibus, foliis obovato-oblongis obtusiusculis a medio serratis, pedicellis ex axillis 1-3, calycis lobis oblongis acutis, corollâ calyce triplo longiore lobis rotundatis basi intus barbatis, staminibus faucent vix superantibus, stylo piloso, ovario 2-3-loculari. ♂ In sabulosis maritimis insulæ Van Diemen (h. mus. par. n. 154 in h. Boiss., Gunn h. n. 427, teste cl. Lindl.). M. serratum Gunn h. Lindl. bot. reg. 1845 t. 15 (non Br.). Rami subangulosi. Folia 12-18 lin. longa, 4-7 lin. lata, approximata, pellucide punctulata. Pedicelli 3 lin. longi. Flores 4-5 lin. longi. Corolla alba, maculis ad basim loborum violaceis. Stigma capitatum. Differt a *M. serrato*, formâ foliorum, punctis pellucidis, floribus majoribus, antheris subinclusis, stylo piloso et ovario 3-loculari (ex 3 flor. apertis in h. Boiss.) aut 2-loculari (ex Lindl. l. c.). Frequenter in hoc genere loculi (locelli potius vocandi, conf. ad char. gen.) e 4 ad 3 reducti, non vero ad 2. Ovula solitaria in 3 loculis vidi. An satis a *M. lœto* differt? Puncta foliorum in sicco magis depresso. (v. s. in h. Boiss.)
18. *M. LŒTUM* (Forst. prodr. n. 238), ramis apice angulatis, foliis oblongis acutis versus apicem subserratis basi angustatis pullucido-punctatis, pedicellis in axillis 3-6 erectis, lobis calycinis lanceolatis acuminatis, corollâ calyce triplo longiore lobis interne barbatis, staminibus faucent superantibus, stylo piloso. ♂ In Novæ Zealandiæ ins. sept. et centr. (Cunn. in ann. of nat. hist. 1 p. 461, Stephenson in h. Boiss. n. 24, 34 et 58, Raoul! comm. a Mus. par. sub n. 48). *Citharexylon perforatum* Forst. (ex se ipso). Congruunt cum phrasim Forst. specimina omnia Raoul et Stephenson. Folia 2-3 poll. longa, nuno pollicem lata, nunc (specim. 24 et 58 Steph.) 5 lin. lata ideoque abrupte vel longe acuminata, semper grosse et manifeste pellucido-punctata et inde a *M. serrato* differt. Pedicelli 2-5 lin. longi. Lobi calycinis lineam longi. Corolla 3-4 lin. longa, patens. Ovarium (ex unico aperto) 3-loc. Fructus ign. (v. s.)
19. *M. GLANDULOSUM* (DC. mss.), ramis tuberculato-glandulosis, foliis lanceolatis acuminatis basi attenuatis pellucido-glandulosis a medio ad apicem serratis, pedicellis axillaribus 1-3 erectis, calycinis lobis lanceolatis acutis, corollâ calyce triplo fere longiore lobis ad basin parce barbatis. ♂ ♂ In Novâ Hol-

landiæ. Bertolonia glandulosa Spin cat. hort. taurin. sebast. 1809 p. 25 t. 2. Folia crebra erecta 2½ poll. longa, 4 lin. lata. Pedicelli 3-4 lin. longæ. Cor. albae, violaceo intus punctatæ, 3-4 lin. longæ, lobis rotundatis. Stamina brevissima. Drupa globosa, 3-locularis, succulenta. An satis a M. lœto differt? (v. s. c. ex h. Monspr.)

20. M. VISCOsum (Brown prodr. p. 516), foliis ellipticis acutis serratis reflexis ramisque viscidis glandulosis. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ merid. Cæt. indescr.

21. M. TUBERCULATUM (Br. prodr. p. 516), foliis lanceolatis acutis serratis ramisque glanduloso-tuberculatis. ♂ In orâ merid. Nove Hollandiæ (Br.). Ad hanc speciem phrasim brevissimam solum notâ refert cl. Bartling, in Lechin. pl. preiss. I p. 349, specimen Preissii n. 1351 e Swan River. Ex hisce: frutex 8-10-pedalis. Folia apice ramorum conferta, 1-2 poll. longa, 3-4 lin. lata, oblongo-obovata, basi longe attenuata, apice mucronata saepius integra, nunc ad apicem (ex Bartl.) parce serrata, crebre tuberculata, tuberculis in herb. saepè albidis ut in quibusdam Borragineis. Pedicelli in axillis 1-3, tuberculati, 2 lin. longi. Lobi calycinis lanceolati, acuti, vix lineam longi. Corolla calyce duplo circiter longior, lobis (ex Bartl.) versus medium villosulis. (v. s. spec. Preiss. in h. DC. et berol.)

22. M. ADSCENDENS (Br. p. 516), caule diffuso, foliis obovato-oblongis obtusiusculis extra medium obtuse serratis ramisque levibus adscendentibus. ♂ In orâ merid. Novæ Hollandiæ (Br.), et occid. merid. ad Swan River (Hügel en. 1 p. 78 sol. nomen). Specimen e fredo Bass a. mus. par. anno 1821 sine nomine communicatum hoc verisimiliter referendum. Ex eo fruticulus ramicus adscendentibus, foliis crebris patentibus 6-9 lin. longis 1½-2 lin. latis obtusis apicem versus subdentalis, pedicellis in axillis 1-3 folio paulo brevioribus nempe 6 lin. longis, lobis calycinis ovatis obtusiusculis lineam longis, fructu globose lineâ paulo latior ex unico aperto 3-loculari. Convenit cum phrasim brevissimam cel. auct. sed forsitan diversa sp.

23. M. PARVIFOLIUM (Br. prodr. p. 516), diffusum, foliis linearibus basi attenuatis subobtusis carnosis apice saepius parce dentatis utrinque ramulisque glanduloso-tuberculatis, pedicellis saepius bipartitis dimidio folii longioribus eglandulosis, lobis calycinis lanceolatis acuminatis, corollâ calyce duplo longiore lobis acutiusculis intus lanuginosis. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ meridionali. — Reichenb. mag. t. 2 f. 2 bona, Sims bot. mag. t. 1693, Lodd. bot. cab. t. 837, Planches dict. sc. nat. (ubi errore stam. 4 et stigmata 3). Pogonia tuberculata, aspera et scabra hortul. div. Andrewsia scabra Dum. Cours. 3 p. 319. Pogonia verrucosa Desv. journ. bot. 4 p. 141 t. 35. Folia 9-12 lin. longa, 1-2 lin. lata. Pedicelli 2 quasi basi connati, quorum unus superior præcocior, alter nunc sterilis. Corolla 3 lin. longa, alba, paucò robore suffusa, intus cœruleo-punctata. Antherae inclusæ. Ovarium 4-3-loculare. Stigma punctiforme. Bacca pisi parvi magnitudine et formâ, 4-3-sperma. (v. v.)

24. M. HUMILE (Br. prodr. p. 516), procumbens, foliis spathulato-linearibus obtusiusculis eveniis. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ meridionali. Nimis affine M. parvifolio dicitur.

\*\*\* *Foliis oppositis, serratis.*

25. M. OPPOSITIFOLIUM (Br. l. c.), ramis adscendentibus tuberculatis, foliis oppositis sessilibus subcordato-lanceolatis serratis subtus tuberculato-punctatis, pedicellis 1-3 axillaribus, lobis calycinis lanceolato-subulatis, corollâ calyce duplo longiore, lobis patentibus subrotundis, drupâ globoso-depressâ. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ meridionali. — Reichenb. mag. t. 2 f. 1. Folia 9-12 lin. longa, 4 lin. lata, patentia. Pedicelli 4-5 lin. longi. Cor. 2 lin. longa, alba superne cœruleo punctata. Drupa vix lineâ latior, 4-locularis. (v. s. ex hort. Cels et Nois.)

§ 2. *Drupa compressa oblonga.* — *Folia alterna, dentata, nunc in eodem ramo integra.*

26. M. PLATYCARPUM (Brown prodr. p. 516), caule erecto, foliis linear-lanceolatis apice dentatis ramisque lævibus, drupis compressis bilocularibus calyce quadruplo longioribus. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ meridionali. Huc verisimiliter referendum specimen ex internâ parte austro-orient. Novæ Hollandiæ a Mitchell lectum, in herb. berol. repositum, nbi folia 2-3 poll. longa, 3-4 lin. lata, obtusiuscula et mucronata, minutissime punctata, erecta, approximata, a medio remote denticulata; pedicellata in axillis 2-3, lineas 3 longi; calycis lobi acuti  $\frac{1}{2}$  lin. longi, corolla (imperf.) 3 lin. longa, fructus oblongi compressi 3 lin. longi styloque terminati ex nervis extus perspicuis verisimiliter biloculares. (v. s. in h. berol.)
27. M. DEBILIS (Brown l. c.), ramis prostatis tuberculosis, foliis lanceolatis apice dentatis aut integerimis, pedicellis axillaribus solitariis erectis, calycis lobis elliptico-oblongis acutis corollæ tubo paulo longioribus, lobis ovatis subacute ad fauces barbatis, staminibus inclusis, drupis compressiusculis. ♂ In Novâ Hollandiâ ad Port Jackson (Br.) et in interioribus austro-orient. Novæ Holl. (Mitchell in herb. berol!) — Walp. rep. 4 p. 137. Pogonia debilis Andr. bot. rep. t. 212. Myoporum debile Sims bot. mag. t. 1830. Andreussia debilis Vent. malm. n. 108 in adn. Folia 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, 3-7 lin. lata. Pedicelli 2-2 $\frac{1}{2}$  lin. longi. Calyx 3 lin. longus. Cor. albido-lilacea ex Sims, cœruleo-violacea ex Andr., tubo albo. Drupa bilocularis, compressa, ovalis, bisulca, calyce brevior, ex spec. Mitchell 3-4 lin. longa. (v. s. in h. berol.)
28. M. DIFFUSUM (Brown l. c.), caulibus diffusis glandulosis, foliis lanceolatis basi dentatis dentibus subrecurvis apice integris dentatisve, pedicellis in axillis solitariis, drupis compressiusculis calyce brevioribus. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ intratropicali.

+ *Species dubiae.*

29. M. TENUIFOLIUM (Forst. prodr. p. 44, Br. l. c.), foliis lanceolatis acutissimis integerimis ramulisque lævibus, calycis lobis lanceolatis acutis, limbo corollæ imberbis. ♂ In Novâ Caledoniâ (Forst.), et Novæ Hollandiæ parte tropicâ (Br.). Citharexylon tenuifolium Forst. ex se ipso. Numerus loculorum drupæ non indicatur. Confer ad Polycelium Sandwicense.
30. M. PUBESCENS (Forst. prodr. n. 239), foliis oblongo-ellipticis serratis pubescens. ♂ In Novâ Zealandiâ. — Ex pubescentiâ vix hujus generis.
31. M. CRASSIFOLIUM (Forst. prodr. n. 240), foliis oblongis subserratis carnosis. ♂ In Botanices insulâ.
32. M.? MAURITANUM, glabrum, ramis tuberculato-punctatis, foliis lanceolatis utrinque acuminatis integris vel a medio remote serratis pellucide punctatis, pedicellis in axillis 1-3 erectis flore longioribus, lobis calycinis lanceolatis acuminatis, corollâ calyce duplo et ultra longiore, stigmate 3-4-lobo. ♂ In Mauritio (Sieb.). Bontia daphnoides Sieb. herb. maur. n. 260! non Willd. Habitus, folia punctata, pedicelli ebractati et quando 2 vel 3 superpositi, ut in Myoporis, sed patria anomala et stigma lobatum! An pignus generis novi? Specimina quæ vidi in h. nostro et in berol. manca. Folia apice ramorum approximata, alterna, 2 poll. longa, 4-6 lin. lata, acuta, in petiolum brevissimum angustata. Pedicelli 3-5 lin. longi. Lobi calycis linea vix longiores. Corolla (ex unicâ in h. ber. quam non aperii) omnino Myopori, campanulata, subregularis, 2 $\frac{1}{2}$  lin. longa, lobis 4 obtusis interne glabris. Antheræ Myopori, inclusus. Ovarium ovoideo-conicum, glabrum, 4-loculare, 4-ovulatum. Stylus sulcatus, glaber,  $\frac{1}{2}$  lin. longus. Rami stigmatis manifesti, lineares, stylo breviores. Ex ovario pingui fructus verisimiliter baccatus. (v. s. in h. DC. et berol.)

*Species exclusæ.*

M. *BREVIFOLIUM* Bartl. = *Pseudopholidia brevifolia*.

M.? *EUPHRASIOIDES* Hook. et Arn. = *Nesogenes euphrasioïdes*.

M. *FLORIBUNDUM* A. Cunn. = *Disoon floribundus*.

M. *OPHIOGLOSSOIDES* Steud. = *Pogonia ophioglossoides* Ker (Orchidea).

M. *TENUIFOLIUM* Hook. et Arn. = *Polycelium Saudwicense*.

VIII. *EREMOPHILA* Brown prôdr. p. 518, Endl. gen. n. 3735, ann. mus. vindob. 2 p. 203.

Calyx 5-partitus, fructifer alienus, scariosus. Corolla (ex E. *viscidâ*) tubo ampio, limbi bilabiati labio superiore subfornicato emarginato. inferioris subæquilongi trilobi lobis obtusis. Stamina 4, didynama, corollæ tubo exserta. Ovarium 4-loculare, loculis 4-ovulatis. Ovula pendula, anatropa. Stigma indivisum. Drupa exsucca, 4-locularis, 4-sperma. — Frutices Novæ Hollandiæ sœpe spartei. Folia semi-teretia aut plana. Pedicelli axillares solitarii vel conferti.

**§ 1. *Folia opposita.***

1. E. *OPPOSITIFOLIA* (Br. 1. c.), foliis oppositis calycibusque glandulosis unguiculatis. ♂ in Novæ Hollandiæ orâ merid. Habitus Pholidiæ.

**§ 2. *Folia alterna.***

2. E. *ALTERNIFOLIA* (Br. 1. c.), foliis sparsis, calycibusque glandulosis, laciniis sessilibus. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ merid. Ex glandulis ad Myoporum accedit.

3. E. *VISCIDA* (Endl. in ann. mus. vindob. 2 p. 203, nov. stirp. dec. 6 n. 59), foliis alternis planis elliptico-lanceolatis integerrimis, pedicellis solitariis geminis ternisve, lobis calycinis obovatis obtusis. — In Novæ Hollandiæ austro-occid. interioribus (Roë). Ramuli pedales, teretes, cortice rubro-fusco viscidō nitente. Fol. 4 lin. dissipata, 1½-2 poll. longa, 4-5 lin. lata, in petiolum brevissimum angustata, uninervia, utrinque nitida, viscida. Pedicelli 4-5 lin. longi. Calyx 4 lin. longus lobis 5 subæqualibus, fructiferis auctis scariosis reticulato-venosus 5 lin. longis 4 lin. latis, duabus interioribus paulo angustioribus. Corollæ tubus amplius, 5 lin. longus, 4 lin. latus, limbus 3-linearis. Antheræ glaberrimæ. Ovarium ovatum, compressuscum, villosum. Stylus glaberimus. Drupa subcompressa, pubescens, 2½ lin. longa, 1½ lin. lata.

*Species exclusæ.*

E. ? *ARBORESCENS*. All. Cunn. ined. = *Eremodendron Cunninghamii*.

IX. *EREMODENDRON DC.* in Meisn. gen. p. 292 et comm. p. 201, Deless. ic. sel. 5 p. 43 f. 100 (ubi error in ovulis).

Calyx 5-partitus, post anthesin non mutatus, lobis coloratis amplis oblongo-ovoatis basi attenuatis. Corolla tubulosa, tubo incurvo, 5-loba, subbilabiata, extus glaberrima, intus sparse pubera. Stam. 4, didynama, vix exserta. Stylus filiformis, pilosiusculus. Stigma indivisum. Ovarium ovoideo - oblongum compressum biloculare, loculis repleo bifido carpidiorum ab axi versus centrum imperfecte subdivisis. Ovula 4, nempe 2 in utroque loculo, versus mediam longit. partem pendentia. (1) Fructus junior ovali-oblongus, compressus, dense setis adpressis villosus. — Arbor Nova-Hollandica. Ramuli angulati, juniores subcanescentes. Folia alterna, novella pube minimâ subcanescens, adulta glabrescentia, linearia, integririma, mucronata. Pedicelli axillares, soli-

(1) Ovula nimis numerosa et male fig. in iconè citatâ. Ovarium enim rursus aperii et ovula in utroque loculo duo, unum utroque latere marginis inflexi carpelli inveni. Specimen a pictore partim destructum observationibus iteratis non facet. Videant qui meliora possident.

tarii. Calyx pedicello sublongior. Corolla albo-rubicunda, persistens (ex sched. Cunn.) sed in specimine demum caduca, tubo imâ basi inferne paullum gibboso.— Genus forsan a Pholidiâ non distinguendum, sed formâ peculiari loborum calycis et situ ovulorum, non in summâ parte ovarii sed in mediâ, et fructu adhuc ignoto servandum.

E. CUNNINGHAMI 5. In sterilibus Novæ Hollandiæ interioris ad Lachlan flumen detexit All. Cunningham, floret Junio. Eremophila? arborescens A. Cunn.! in litt. 1836. Arbor pulcherrima, rariissima, 20-30-pedalis. Folia 2 poll. longa, sesquilineam lata. Calyx semipollucaris, tenuissime pubescens, lobis obtusis,  $1\frac{1}{2}$ -2 lin. latis, basi  $\frac{1}{2}$  lin. solum latis. Cor. pollucaris lobis ovatis erectis. (v. s. a cl. inv.)

X. PHOLIDIA Brown prodr. p. 517, Endl. gen. n. 3734, ic. gen. t. 66, Lindl. veg. kingd. p. 665 c. ic.

Calyx profunde 5-fidus, fructifer non mutatus. Corolla infundibuliformis tubo calyce longiore, apice ampliato et sursum gibboso, limbo brevi 5-lobo patente subbilabiato, lobis obtusis, 2 superioribus paulo minoribus minus patentibus. Stamina 4, didynama inclusa. Antheræ lunatæ, dorso barbare. Ovarium oblongum, 4-loculare. Stigma capitatum, subcristato-lobatum. Drupa exsuccha, putamine 4-loculari 4-spermo. Albumen tenue. — Frutices Novo-Hollandici. Folia integerrima. Pedicelli axillares, solitarii, brevissimi. Corolla modo Sesameæ, calyce multo longior, interne subpubescens.

### § 1. *Folia opposita.*

1. P. SCOPARIA (Br.! prodr. p. 517), frutex sparteus squamulis adpressis minimis stellatis tectus, foliis oppositis linearibus acutissimis, floribus axillaris solitariis, calycis profunde 5-fidi lobis lanceolato-acutis, corollâ calyce quadruplo longiore. 3 In orâ merid. Novæ Hollandiæ ad Spencer's gulph (Br.! v. — Endl. ic. gen. t. 66, Lindl. veg. kingd. p. 665 ic. Rami erecti, angulosi. Folia 5-8 lin. longa,  $\frac{1}{2}$  lin. lata, suberecta, crassiuscula, rigida; acuminè sæpius uncinato duro. Pedicelli lineam longi. Calyx vix 2 lin. longus. Corolla 7 lin. longa, cœrulca, extus squamułosa (ex Br., non vero ex ic.), tubo sursum superne ventricoso, lobis patentibus obtusis ciliatis. Antheræ extus barbatæ. Ovarium glabrum. Drupa immatura ovoideo-acuta, 4-locularis. (v. s. sine fl. et fr.)

### § 2. *Folia alterna.*

2. P. RESINOSA (Endl. in ann. mus. vindob. 2 p. 203, nov. stirp. dec. 6 n. 58), ramulis furfure stellato albido densissime obtectis tuberculis resinosis subglobosis crebris, foliis alternis approximatis obovatis obtusis vel brevissime acuminatis glaudulis immersis pilis stellatis utrinque canescensibus, floribus axillaribus solitariis, calyce profunde 5-fido lobis lineari-lanceolatis acutis squamułis furfuraceis minutissimis obtectis. 3 In Novâ Hollandiâ inter austro-occidentali inter Swan River et King George Sound (Roë). Ramuli obsolete tetragonoi. Folia 4 lin. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, crassiuscula, plana. Pedicelli vix  $\frac{1}{2}$  lin. longi. Calyx 3 lin. longus. Corolla 6 $\frac{1}{2}$  lin. longa extus basi exceptâ purpuraceo-pilosa, tubo cylindrico calycem vix superante, fauce ampliata hinc gibbâ apice subcontractâ limbo vix  $\frac{1}{2}$  lin. superante, labio sup. bilobo recurvo, inf. 4-lobo patulo. Ovarium tomentosum.

XI. STENOCHILUS Br. prodr. p. 517, Endl. gen. n. 3736, ic. gen. t. 92.

Calyx 5-partitus, fructifer vix auctus, lobis basi imbricatis, e basi ovatâ plus minus acutis, sæpe inæqualibus, 2 interioribus tunc minoribus. Corolla tubuloso-infundibuliformis, sursum inflata et inde quasi incurva,

calyce multo longior, ore obliquo 5-lobo, lobis tubo brevioribus inter se aequalibus vel saepius lobo inferiore ab aliis alte connatis distincto, unde labium sup. e 4 partibus inferioris ex una tantum. Stamina 4, didynama, exserta, filamentis basi planis dilatatis, antheris lunatis. Ovarium glabrum, biloculare, loculis replo carpellorum introflexo primo nerviformi dein incrassato imperfecte subdivisis. Ovula 4, in utroque loculo 2 ex apice pendentia. Stigma indivisum. Drupa extus baccata, putamine dura, 4-sperma, loculis 2 fere in 4 ex angulo interno lignoso prominente divisus. — Frutices Novo-Hollandiae glabriuscui vel tomento tenuissimo stellulato cinerascentes. Folia alterna integerrima aut rarius serrata, evenia, saepius oblongo-lanceolata. Pedicelli solitarii vel rarissime bini, axillares, ebracteati. Flores purpurei, coccinei aut flavi, in ordine majores, habitu fere Siphocampyli, sed labio infero unilobo! Pars inferior tubi paulo ventricosa ubi staminum insertio, imâ basi constricta; lobeus inferior semper reflexus. — Stamina quoad situm et longitudinem relativam ut in Myoporo.

### Sectio I. AMPHICHLUS.

Lobus corollæ inferior magis reflexus sed non fissurâ profundâ ab aliis distinctus. — Nomen ex corollâ vix labiatâ.

1. **S. LONGIFOLIUS** (Br. prodr. p. 517), caule erecto, ramulis tomentosis, foliis linearibus elongatis acuminatis puberulis adultis glabris, pedicellis folio multoties brevioribus, calyce pedicello subbreviori lobis ovato-acuminatis margine praesertim pubescentibus. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ merid. (Br.), orientali (Gandich.) et in orient. inter. (All. Cunn.! Mitchell). — A. Cunn.! herb. Lindl. bot. reg. 1839 misc. n. 115. Rami teretes. Folia alterna 3-4 poll. longa, 2 lin. lata, basi attenuata, acumine terminali sâpe uncinato. Pedicelli 2-3 lin. longi, solitarii vel raro gemini, ut rami minutissime pubescentes. Calyx 2 lin. longus, lobis æqualibus e basi latâ satis abrupte acuminatis, basi ut in congen. imbricatis, intus glabris. Corolla pollicaris Pentstemonis amula, extus tomentosa, intus glabriuscula, ore obliquo 5-lobo, lobis ovatis obtusis inferiore magis revoluto. Stamina subexserta. Drupa ellipsoidea, 5 lin. longa, nitida, glabra, odore citri (Lindl.), putamine duro, loculis 2 incomplete subdivisis, seminibus 4. (v. s. a cl. Cunn.)

### Sectio II. Euchilus.

Lobus inferior corollæ reflexus et distinctus, labium a superioribus magis connatis manifeste præbens.

2. **S. GLABER** (Brown, l. c.), caule divaricato ramulis pedicellis foliisque novellis pube minimâ canescensibus, foliis lanceolatis ellipticis vel obovato-ellipticis in petiolum fere attenuatis integerrimis aut apice dentatis, adultis glabris. ♂ In Novæ Hollandiæ orâ meridionali. — Ker bot. reg. t. 572, Endl. ic. gen. t. 92. Folia 1-1½ poll. longa, 3 lin. saepius lata. Pedicelli 3 lin. longi. Lobi calycis lanceolato-acuminati, extus puberuli, 3 exterioribus majoribus quorum unus maximus fere 3 lin. longus. Corolla pollicaris, purpurea. Stamina et stylus pilosiusculus corollam lineis 2-4 superantia. Ovarium (ex ic. Endl.) ovoidicum, glabrum, biloculare, 4-ovulatum. Drupa junior ovoidea. (v. s. c.)

β corollâ flavo-aurantiacâ. — Sims bot. mag. t. 1942.

3. **S. MACULATUS** (Ker bot. reg. t. 647), caule ramisque erectis sericeis, foliis lignato vel oblongo-lanceolatis basi attenuatis integris glabriusculis flore brevioribus, pedicellis elongatis flexuoso-declinatis. ♂ In Novâ Cambriâ australi. Folia 8-12 lin. longa, 1-3 lin. lata, vix acuta, juniora (ex anc.) puberula. Pedicelli 6-10 lin. longi. Lobi calycis subæquales, e basi ovata longe acuminati, 3-4 lin. longi nunc basi undulato-dentati. Corolla 1-1½ poll. longa, rubicunda, intus flavo-pallescens purpureo maculata et præcipue ad fauem pilosiuscula

lobo reflexo 2 lin. lato. Stamina exserta, manifeste didynama. (v. s. ex h. angl.)

$\beta.$  *ochroleucus*, corollâ ochroleucâ (ex sched. cl. inv.). — In Novâ Cambriâ inter. ad Lachlan fluv. S. *ochroleucus* Cunn.! in litt. 1836, DC. mss. Lobi calycis paulo magis apice attenuati. Cæterum S. maculato simill. (v. s. a cl. Cunn. comm.)

4. S. *viscosus* (Grah. in Edinb. phil. journ. 1829, p. 385), glaber, ramis erectis, foliis oblongo-lanceolatis subserratis nitidis ramulisque viscosis, pedicellis calyce fere brevioribus.  $\delta$  In Novâ Hollandiâ — Hook. bot. mag. f. 2930, Lodd. bot. cab. t. 805. Folia 1- $\frac{1}{2}$  poll. longa, 3-5 lin. lata subacuta. Pedicelli 3-4 lin. longi. Lobi calycis 3-4 lin. longi, lanceolato-acuminati, uno exteriore subtaliore. Corolla flava, extus puberulo-glutinosa, pollicaris, labio sup. cymbiformi. Stamina manifeste didynama exserta. (v. s. c.)

5. S. *serrulatus* (A. Cunn.! in litt. 1836), caule erecto, ramulis parce puberulo-scabridis, foliis lanceolatis aut ovali-oblongis basi attenuatis crenato-serratis ramulisque glutinosis, pedicellis folio fere longioribus patentibus.  $\delta$  In Novâ Cambriæ interioris desertis ad flumen Lachlan (Cunningham!). Rami juniores puberuli. Folia 9-10 lin. longa, 2-4 lin. lata, petiolo 2-3 lin. longo. Pedicelli 6-9 lin. longi. Alabastrum calyce clauso 3-4 lin. longum, ovoidem, obtusum, lobis calycinis ellipticis obtusis uno aliis in præfloratione superposito. Cæt. ign. nam specimen nostrum flores paucos juniores præbet. (v. s. comm. a cl. inv.)

6. S. *RACEMOSUS* (Endl. in ann. Wien. mus. 2 p. 202, nov. st. dec. 6 n. 57), glaberrimus, foliis oblongo-lanceolatis basi angustatis integerrimis, pedicellis folia superantibus flexuosis.  $\delta$  In Novâ Hollandiâ inter. austro-occid. (Roë). Ramuli teretes, glaberrimi, cortice rufo nitido. Folia poll. longa, 2 lin. lata. Flores in axillis sup. Pedicelli folio sextante vel quadrante longiores, flexuoso-declinati. Calycis lobi ovato-acuminati, æquales, 2 lin. longi, 1 $\frac{1}{2}$  lin. lati, margine obsolete membranacei. Corolla 8 lin. longa, ex sicco aurantiaca, labio sup. recto dorso convexo, laciniis sesquilinearibus, 2 centralibus paulo altius connatis, explanato 4 lin. lato intus venoso pilis raris; inferiore superius æquante, lineari, acuto, 1 $\frac{1}{2}$  lin. longo, subreflexo. Stamina breviter exserta. Ovarium glaberrimum, ovatum, 4-loculare, 4-ovulatum. — Ex descr. cl. auct. a S. maculato non diversa videtur. Calyx major et corolla brevior.

7. S. *ALBICANS* (Bartl. in Lehm. plant. preiss. 1, p. 351), pilis minimis fasciculatis incanus, foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis basi longe angustatis integerrimis, pedicellis calyce subbrevioribus folio multo brevioribus.  $\delta$  In parte austro-occid. Novæ Hollandiæ (Drum.! 441, in h. Boiss., Preiss n. 2303 et 2304). Fruticulus 2-3-ped. Ramuli teretes. Folia conferta  $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$  poll. longa, 2-4 lin. lata impunctata, demum calvescentia. Pedicelli 2-3 lin. longi. Calycis lobi lanceolato-acuminati, 3-4 lin. longi, 2 interiores paulo minores. Corolla 8-10 lin. longa, extus tenuissime puberula, vitellina; labium sup. tubo brevius, breviter 4-fidum, lobis cuspidatis; inferior alterius subæquans, lineare, obtusum, lineâ latius, reflexum. Stamina longe exserta. Ovarium glabrum, ex Bartl. 4-loc. Drupa ovoidea, 3-4 lin. longa, putamine durissimo, 4-locul., dissepimentis primariis crassis lignosis, secundariis tenuibus. (v. s. in h. nostr. et berol.)

8. S. *SUBCANESCENS* (Bartl. 1. c.), pilis minimis fasciculatis subcanescens demum glabrescens, foliis lanceolatis basi angustatis subintegerrimis punctatis, pedicellis folio multipli brevioribus.  $\delta$  In parte austro-occid. Novæ Hollandiæ (Preiss n. 2318). Difert a S. albicante, ex cel. Bartling, omnibus partibus minor, minus incanus, foliis ad lente densim impresso-punctatis, prope apicem haud raro 1-2-dentatis (denthibus obtusis) et addit corollâ haud glabra pilis erectis glanduligeris extus aëspersâ, cum in alt. sp. glanduloso-punctata, sed corollam S. albicantis dicrem pilosiusculam.

9. S. *INCANUS* (Lindl. bot. reg. 1839 misc. n. 116), pilis minimisstellatis ineano-

tomentosus, foliis ovali-lanceolatis obtusis in petiolum angustatis, pedicellis...  
 ♂ In interior. Novæ Hollandiæ orientalis (Mitchell). Frutex habitu Olæ vol  
 Acaciæ aphyllæ. Folia non punctata. Corolla obscuræ viridis, extus pilis glan-  
 duligeris minimis tecta, pollice sublongior, labio sup. oymbiformi longioro.  
 Stamina exserta. Ovarium biloculare.

XII. BONTIA Plum. nov. gen. p. 32 t. 23, Linn. gen. ed. 2 n. 607, Juss. gen.  
 p. 127, Lam. ill. t. 546, Gærtn. f. carp. 3 p. 168 t. 212 f. 3, Endl. gen.  
 n. 3737.

Calyx 5-partitus, lobis imbricatis, 2 exterioribus, fructifer vix auctus. Corolla tubulosa, bilabiata; labio superiore semibifido, inferiore revoluto fere trifido. Stamina 4, corollæ subbreviora, didynama, 2 superiora breviora. Ovarium ovoideum, biloculare; loculis septo secundario incompleto semibipartitis, 4-ovulatis, ovulis nempe 2 in loculo superpositis, 8 in toto ovario. Stylus diu persistens, basi tamen constrictus et supra partem angustam inflatus. Stigma obtusum, subbilobum? Drupa baccata, putamine 8-spermo, ex septis circa semina incrassatis 8-locularis, loculis 4 aliis superpositis. Semina subincurva, oblonga. — Arbuscula (Jacq.) Caribæa, semperfiriens, habitu lauri vel oleæ et ideo frequenter Olea sylvestris dicta, foliis alternis lanceolatis subintegris glabris punctatis, pedicellis axillaribus solitariis interdum geminis et tunc (ut in aliis Myoporaceis) superpositis, lobis calycinis ciliatis, e basi late ovatâ acuminatis, corollæ calyce multo longiore rectiusculâ luteâ punctatâ intus pubescente, drupâ ovoideâ matre resinosâ sparsâ fragrante. — Ex calyce et habitu quodam floris Stenochilo affine genus, sed labio inferiore corollæ 3-lobo et ovulis abunde diversum. Stamina inferiora in figuris videntur breviora, sed ex autopsia longiora sunt. Situs staminum erga corollam primo adspectu anomalus, et difficile probandus, quia stamna propter lobos inferiores corollæ angustos et connexos geminatim approximantur. Lobi 2 superiores corollæ et labium inferius a basi nervum centralem lateraliter subdivisum præbent, ut in corollâ e tribus petalis connatis constante, sed labium inferius quoad aestivationem et erga lobos calycis certe trimerum.

B. DAPHNOIDES (Linn. sp. p. 890) ♂ In S. Domingo (Plum. Poit. ex Gærtn.), Martinicâ (Jacq. Sieb. n. 163! in h. berol.), S. Thomâ (Ehrenb. h. berol.), et S. Cruce (Vest fl. p. 295), Barbados (Hughes, Maycock fl. p. 253). — B. arborescens etc. Plum. l. c. Olea sylvestris etc. Pluk. alm. t. 209 f. 2. B. Laureolæ facie Dill. h. elth. 57 t. 49, Wild olive etc. Hughes fl. barb. p. 177 t. 12 (rudis). B. daphnoides L. Jacq. am. t. 173 f. 46 (sol. flos et fr.), stirp. am. p. 227. Lam. l. c. Gærtn. l. c. Dum. Cours. bot. cult. 3 p. 181. Walp. rep. 4 p. 141. Folia sepius 2 poll. longa, 4-8 lin. lata, acuta, in petiolum brevem angustata. Pedicelli semipollicares. Flores fere pollicares. Calyx  $\frac{1}{2}$  et dein 2 lin. longus. Corollæ labium sup. convexum, lobis demum subreflexis glabris, inf. revolutum subbrevius interne pubescens lineâ centrali purpurascente valde pilosâ. Stamina saepè 3, sed ubi 4 ut in aliis Myoporaceis erga nervos cor. sita. Drupa 4-5 lin. longa, flavescens (Jacq.) in herb. nigra. Semina interdum per matur. numero reducta. (v. s. in h. DC. et berol.)

*B. minor*. fructu paulo minore -- *B. minor* Gærtn. f. fr. 3 p. 169 t. 212 f. 3.

### Species exclusæ.

B. DAPHNOIDES Sieb. fl. maur. = Myoporum Mauritianum.

B. GERMINANS L. = Avicennia resinifera.

## ADDENDA ET CORRIGENDA

### VOLUMINIS UNDECIMI.

#### OROBANCHACEÆ ( AUCTOR REUTER ).

- P. 5. *PHELIPPEA CÆRULEA*, *adde*: in monte Pentelico Græciæ, ad Anthemidem austriacam (Heldr.!), in Italî et Tyroli australi (Bertol. fl. it. 6).
- P. 7. *P. STRICTA*, *adde*: *O. stricta* Bertol. fl. it. 6 p. 450. *O. cœrulea* Moris el. fasc. I p. 35 non vill. ex Bertol.
- P. 7. *P. LAVANDULACEA*, *adde*: in Palestinæ monte Thabor, in Syriæ tractu montis Cassius (Boiss.!) *O. Lavandulacea* Bertol. fl. it. 6 p. 451.
- P. 8. *P. RAMOSA*, *adde*: Brot. phyt. Lus. t. 145 ic. mala.
- P. 9. *P. ÆGYPTIACA*, *adde*:
- y Amalicitorum*, floribus majoribus hirsutioribus, corollæ lobis dense ciliatis, antheris hirsutis — in Palæstinæ planitie Amalecitorum (Boissier!). Tota planta viscoso-hirsuta. An sp. propria? (v. s. a cl. Boiss. comm.)
- P. 12. *P. TUBULOSA*, *adde*: in Arabiâ Petræ Wadi Useit (Boissier!) — Scapus sesquipedalis fere a basi florifer. Squamæ lanceolatæ erectæ. Corolla subpollicaris tubo insigniter curvato. Flores in sicco fusco-violacei (v. s. in h. Boiss.)
- P. 13. *P. LUTEA*, *adde*: in Arabiæ Petræ arenosis deserti Tih copiose (Boissier!) In speciminiis quibusdam scapi inferne squamis numerosissimis anguste linearibus imbricatis obtecti sunt.
- P. 17. *O. VARIEGATA*, *adde*: *O. superba* De Notar. prospett. fl. ligust. p. 35.
- Id. *Post OROBANCHE VARIEGATA*, *adde*:
- O. *SATYRUS* (De Notar. prospett. fl. ligust. p. 35), superne villo longo cris-pulo cinerascente glanduligeru dense hirsuta, bracteis ovato-longe-acuminatis corollâ fere duplo longioribus supremis comantibus, sepalis bitidis segmentis subulatis corollam subæquantibus, corollæ intus glabra tubo ventricoso-campanulato subglabro, limbi hirsutissimi labio superiore curvato breviter bilobo denticulato, inferiore trilobo subadpresso superiore longitudine æquante, lobis lateralibus ovato-acutis utrinque dente acutis subcomplicatis undulatis-que, medio majore basi constricto complicatoque undulato ovato-acuto, statim filamenti basi corollæ insertis inferne glabris antice sulco exaratis, antheris vix apice glanduliferis superne ovario basi glandulâ 3-strumosâ vitellinâ cincto styloque areato glanduloso-pubescentibus, stigmate bilobo luteo subexerto, lobis hemisphæricis divaricatis. — In Liguriæ monte sylvatico vallis di Polcevera.
- P. 18. *O. CONDENSATA*, *adde*: *O. speciosa* Moris stirp. sard. el. fasc. I, p. 35 non DC. ex Bertol. fl. it. 6 p. 433.
- P. 18. *O. FŒTIDA*, *adde*: prope Olyssiponem. *O. fœtida* Lusitanica Brot. phyt. Lus. 2, p. 149, t. 145. Link et Hoffmanns. fl. port. 1, p. 316, t. 62, ex Brot.
- P. 18. *O. CRINITA*, *adde*: in insulis Stæchadibus et peninsula de Gien ex Jord. obs. fragm. p. 226.
- P. 19. *O. PRUINOSA*, *adde*: in Cretâ (Heldr.!), in Palæstinâ circa Hierosolym. (Boiss. !)
- P. 19. *O. DENSIFLORA*, *adde*: in Sardinâ septentrionali ad Castel Sardo (Viv. ex Bertol. fl. it. 6, p. 444).

718 ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR REUTER.).

P. 20. O. GALLII, adde: O. caryophyllacea Bertol. fl. it. 6, p. 425.

P. 23. O. FULIGINOSA, adde: Jord. obs. fragm., p. 225, t. 9. B.

P. 23. O. BARBATA, adde: Brot. phyt. lus. 2, p. 146.

P. 25. Post Orob. RUBENTEM, adde:

O. FRAGRANTISSIMA (Bertol. fl. it. 6, p. 436), puberula, squamis angustae lanceolatis, superioribus remotis, spiculis densifloris, corolla elongata tubulosâ superne dilatata, staminibus a fundo tubi quidquam recessis, filamentis inferne hirsutis, parte media glabris apice subglandulosis, stylo piloso-glanduloso, stigmatis lobis erectis luteis. — In collibus Italie prope Bononiam, supra Medicaginem fulecatam, in agro Veronensi supra Trifolium pratense, ad Tergestum supra Medicaginem falcataem et sativam et Loto corniculatum. Caulis fistulosus angustatus sulcatus interdum flexuosus 7-12-pollic. Flores fragrantissimi odore caryophyllaceo diu persistente. Sepala inaequaliter bifida vel bipartita. Corolla superne recurva pallide purpurascens extus pubescenti-glandulosa, labium superius bilobum obtusissimum, inferius trilobum, lobis parvis ovatis obtusis, medio paulo majore et productiore. Stamina ad distantiam lineas aut sesquilineas a basi tubi inserta. Planta viscidula ex pubescentia apice glandulifera.

P. 25. O. LASERPITII-SILERIS, adde: Jord. obs. fragm. p. 223. t. 9. f. A.

P. 25. prope. O. ELATIOREM, adde:

O. CENTAURINA (Bertol. fl. it. 6, p. 430), caule subhirsuto, squamis crebris ovato-lanceolatis, sepalis calycinis bifidis integris, corolla grandiuscula tubo crasso lobis rotundatis obtusis crispo-crenulatis, filamentis inferne hirsutis apice styloque piloso-glandulosis, stigmatis lobis divaricatis purpureis. — In Italie littore Massae ducalis S. Giuseppe copiose supra radices Centaurea paniculatae. Caulis crassus sulcatus fistulosus, spicula longa, inferne laxa, superne densiflora. Stamina ad sesquilineam aut duas lineas supra basin tubi inserta. Ad O. elatiorem referenda?

P. 25. O. ELATIOR, adde: O. STIGMATODES Wimm. fl. Schles. p. 280 Koch syn. ed. 2. p. 616, exclus. loco Gratz. O. confusa Fr. Schultz in Rhein. fl. ex Fr. Schultz Florar 1847, n° 5 t. 2. f. 2.

P. 26. loco O. STIGMATOIDES lege:

O. KOCHII F. Schultz in Florar 1847, n° 5, t. 2 f. 1. — In radice Antherici ramosi aliarumque plantarum ad montem arcis prope Gratz Styrie. O. stigmatodes Koch syn. ed. 2 p. 616, quod locum Gratz, non Wimmer. O. amethystea Maly herb. koch, non Thuill.

P. 27. O. PUBESCENS, adde: in Cretâ ad radices Tordylia Apuli (Heldr.!), iu Palæstinâ prope Banias et in monte Thabor (Boiss. !)

O. CRITHMI (Bertol. fl. it. 6, p. 424), caule erecto subpiloso, squamis ovato-lanceolatis abbreviatissimis remotis, spicula laxiflorâ, sepalis bifidis, corolla tubulosâ labio superiore integro, staminibus supra basin tubi insertis, filamentis inferne longo tractu hirsutis, anthers exquisite aristulatis, stylo subglanduloso, stigmatis lobis rubescensibus. — In Liguriâ occidua inter Savonam et Niceam. Orob. du Chritime maritime Vauch. mem. p. 59. Caulis angulosus striatus pedalis vel sesquipedalis. Sepala inaequaliter bifida, laciniis lanceolato-linearibus acuminatis pubescentibus. Corolla parva leviter recurva extus adpersa pilis brevissimis apice glanduliferis luteola (in siccâ), labio super. integro, inferiore trilobo, lobis rotundatis obtusis medio paulo majore. Affinis videtur O. pubescens. An eadem species?

P. 28, post O. GRISEBACHII, adde:

O. PALÆSTINA, sepalis paucinerviis late oblongis antice contignis integris vel bifidis, laciniis linearis-subulatis tubo corollino longioribus, corolla glabriuscula tubulosâ subrectâ, labiis parvis subæqualibus, superiore emarginato vel subintegro, inferioris trilobi lobo intermedio submajore, staminibus ad ter-

tiam partem inferiorem tubi insertis, filamentis inferne dilatatis ciliatis cæterum glabris, stylo stigmate bilobo cernuo. — In Palæstina prope Naplouse et circa Banias (Boissier!). Scapus sesquipedalis vel bipedalis in secco augulosus subhirsutus basi in bulbum mediocrem incrassatus, squamæ sparsæ laxæ oblongo-lanceolatæ bracteæque flores longe superantes furfuraceous hirsutæ. Flores longissime spicati majorem partem caulis vestientes, iis O. minoris paulo majores, in secco pallide fuscescentes. O. Grisebachii facie similis differt altitudine majori, sepalis oblongis minus profunde divisis, corollâ glabriuscâ et staminibus basi tantum ciliatis. (v. s. ab amiciss. Boissier comm.)

P. 28 post Orobanche HEDERÆ, adde:

- O. YUCCÆ (Savi fil. pl. exs. Bertol. fl. it. 6 p. 423), pilosiuscula, caule elato, squamis inferioribus late ovatis, superioribus lanceolatis, spicâ laxâ elongata, bracteis sepalisque ovatis superne angustato-acuminatis, corollâ tubulosa glabra lineâ dorsali subpilosâ, labio superiore emarginato, inferiore æquirilobo, filamentis supra basin tubi insertis inferne intus puberulis superne glabris, sigmatis lobis purpureis. — In Italiâ prope Pisam, et in horto botanico Pisano supra radices Yuccæ aloifoliae parasitica. Scapus sulcatus, potius gracilis, a dodrante ad sedecim pollices longus. Sepala integra raro breviter unidentata, nervo medio evidenter, lateralibus obsoletis. Stylus glaber, vel lineâ longitudinali inferiore glandulis exiguis brevissime stipitatis raris adspersus. Species ex cl., Bertol. media inter O. minorem et laurinam, sed ab utraque diversa.
- O. LAURINA (Bertol. fl. it. 6 p. 424), caule elato gracili subpiloso remote squamato, spicâ laxiflorâ, sepalis bifido-attenuatis, corollâ glabra filamentis inferne pilosiusculis, superne styloque glaberrimis, sigmatis lobis divaricatis purpureis. — In Italiâ circa Romam ad radices Lauri nobilis. Caulis erectus sulcatus fistulosus uni-bipedalis. Sepala multinervia, lacinii parum inæqualibus ciliatis. Corolla tubulosa tubo superne paulum constricto leviter recurva, labio superiore emarginato. Inferiore trilobo, lobis rotundatis, medio paulo majore. Stamina paulo supra basin tubi inserta. Statura et glabritie partium facile distinguitur ab O. minore, cui affinis. (Bert. l. c.)
- O. GLABERRIMA (Guss.! ined.), undique glaberrima, lutescens, sepalis plurinerviis inæqualiter bifidis vel rarius integris lacinii linearis-acuminatis tubo corollæ sublongioribus nervo medio prominulo percursis margine bracteæque glandulis raris sessilibus subciliatis, corollâ glaberrimâ tubuloso-campanulata dorso curvatâ, labio superiore bilobo, inferiore trilobo lobis rotundatis denticulato-crispis, staminibus styloque glaberrimis supra basin tubi insertis, antheris parvis minutissime apiculatis, stigmate bilobo lutescente — Prope Neapolim ad radices Dianthi plumarii Guss.! Scapus gracilis subpedalis fistulosus superne nudus inferne squamis paucis remotis ovato-acuminatis prædictus. Flores laxè spicati, inodori, magnitudine O. minoris. Filamenta candida, antheræ lateritiae (Guss.). Affinis videtur O. laurinae Bertol. sed differt staminibus sepalisque glaberrimis, stigmate lutescente nec purpureo. (v. s. in h. Boiss. a cl. Guss. comm.)
- O. DENUDATA (Moris append. ad stirp. sard. el. p. 1 et stirp. sard. el. fasc. 3 p. 10 ex Bertol. fl. it. 6 p. 439), caule elato crassiusculo piloso, squamis lanceolatis remotis, spicâ abbreviatâ densâ, sepalis integris, corollæ labiis subæqualiter lobatis, staminibus a basi tubi recessis, filamentis toto latere interno styloque lobatis, staminibus superne nudus. Sepala lanceolato-linearia longe elatus subsesquipedalis superne fere nudus. Sepala lanceolato-linearia longe acuminato-attenuata bracteæ subæqualia. Corolla lutea, brevis, tubo crasso, erecta et vix apice recurvula, labium superius bilobum, inferius trilobum lobis omnibus brevibus rotundatis obtusis subæqualibus. Stamina a basi tubi corol-

## 720 ADDENDA ET CORRIGENDA ( AUCTOR REUTER ).

lini sesquilineâ aut duabus lineis recessa ; filamenta inferne insigniter dilatata. Tota planta lutescens parce piloso-glandulosa.

P. 29 post O. AUSTRALEM , adde :

O. VITALBÆ ( Bertol. fl. it. 6 p. 441 ), caule hirsuto remote squamato bulbo fibris numerosissimis radicato, squamis bulbii late ovatis caulinis lanceolatis , spicæ elongatâ densiusculâ , sepalis bifidis laciniis longe acuminato-attenuatis, corollâ extus hirsutâ , staminibus a basi tubi paulo recessis, filamentis inferne longo tractu intus hirsutis superne glabris, stylo piloso-glandulosâ, stigmatis lobis dilatatis purpureis papillosois.  $\mathcal{L}$  In herbidis *di Campiglia* Etruriæ reperit parasiticam supra Clematidem vitalbam cl. prof. Petr. Savi. Bractæ longe acuminoato-attenuatæ hirsutæ flore vix breviorcs. Corolla longiuscula tubulosa alba superne recurva margine criso-crenulata. Labium superius latum explanatum emarginatum obtusilobum , inferius trilobum lobis grandiusculis subrotundis obtusis, medio majore et productiore. Stamina corollâ, multo breviora sesquilineâ supra basin tubi inserta. Hirsuties plantæ canescens, longiuscula, artioulata , apice glandulifera.

P. 32. O. CERNUA , adde : in Arabiâ Petræa inter Sinai et Nuckl , in deserto ad limitem Palestinæ , in Palestine monte St. Saba ! copiose legit cl. Boissier ! Spica interdum dense multiflora compacta. Planta arabis edulis.

P. 37, post O. PLATYSTIGMA :

O. ULCICIS ( Willk. in bot. zeit. 1846 p. 813 ), caule squamoso simplici, corollâ ringente quadrifidâ crenulatâ laciniis rotundatis. — In Hispaniâ australi ad radices Ulicis australis.

P. 43, post EGINETIAM INDICAM , adde :

Æ. JAPONICA ( Sieb. et Zucc. fl. jap. sect. 1. p. 17 ). — E. Indicæ Roxb. proxima , diversa videtur flore majore et magis inflato calycem duplo ferre superante nec non stigmate peltato duplo latiore. — In Japoniâ.

P. 44 , post EGINETIAM , adde :

IX<sup>bis</sup> PHACELLANTHUS Sieb. et Zucc. fl. jap. sect. 1 p. 17.

Calyx diphyllos foliolis distinctis , exteriore spathaceo florem amplectente, interiore multo minore lanceolato acuminato. Corolla longe tubulosa cylindrica, limbo breviter quinquefido ( subregulari ?). Stamina 4, antheris suberectis oblongis bilocularibus muticis. Ovarium uniloculare, placentis parietalibus quatuor æquidistantibus multiiovulatis. Stylus simplex, stigmate dilatato carnoso oblique decurrente medio canaliculato. Capsula. ... Herba Japonica non satis nota.

1. P. TUBIFLORUS ( Sieb. et Zucc. I. c. ) — In Japoniâ. Scapus simplex vix tri-pollucaris caraosus squamis multis oblongis obtusis laxe imbricatis munitus. Flores terminalis fasciculati 2-6, brevissime pedicellati. Corolla tubulosa anguste cylindrica basi circa ovarium parum ampla , pollucaris.

P. 44. OBOLARIA VIRGINICA , adde : Asa Gray Chlor. bor. amer. dec. 1. p. 21, t. 4. opt.

## ACANTHACEÆ ( AUCTOR NEES AB ES. )

P. 48 et 49.

Characteribus familiæ addas p. 49 adnotationem : « Ovarium et fructus Mendonciæ et Engeliæ, observantibus cl. Karsten et Klotzsch, ab origine *unilocularia* sunt et biovulata. »

P. 49. In conspectu generum Thunbergiearum hæc corrigas :

## ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.). 721

1. *Mendoncia*. — Fructus drupaceus, unilocularis. Corollæ tubus æqualis, limbus subregularis 5-lobus. — America calidior.

1 bis. *Engelia*. — Fructus drupaceus, unilocularis. Corollæ tubus antice in medio calcaratus, limbus 5-partitus antice fissus. — America calidior, Columbia.

P. 50 lin. 12 ponas in charactere generis Mendonciæ loco : « ovarium biloculare, bi-4-ovulatum » — ovarium uniloculare, biovulatum, altero ovulo abortivo.

Tum lin. 13 deleatur « abortu ».

P. 54 inseras ante Thunbergiam :

I bis. *ENGELIA Karsten in schedis.* (1)

Calyx brevissimus, annuliformis, truncatus, postice fissus, persistens, bracteatus; bracteis magnis connatis apice apertis. Corolla tubo curvato, antice medio calcare brevi instructo; limbo 5-partito antice fiso, lobis rotundatis æstivatione imbricativâ convolutis. Stamina 4, didynama, fertilia, cum rudimento quinti calcari oppositi; filamenta filiformia, tubo inserta, inclusa; antheræ sagittatae, basi barbatae, dorso affixæ, rimis duabus longitudinaliter dehiscentes. Ovarium uniloculare, biovulatum, annulo glandulosu basi cinctum, ovulis hemicanpylotropis, primum pendulis dein adscendentibus; stylus filiformis; stigma bifidum. Drupa carnosâ, putamine osseo obovato a latere compresso lenticulari, unilocularis, abortu monosperma. Retinacula nulla. Seminis testa chartacea. Embryo exalbuminosus, magnus; cotyledonibus foliaceis, conduplicato-corrugatis; radiculâ superâ. — Frutices Américæ subtropicæ, scandentes (Karsten), pedunculis axillaribus unifloris.

1. E. TOVARENSIS (Kl. et Karst. in Karst. ind. pl. viv. e Columb. adlat.), caule tereti subglabro, foliis late ovalibus basi attenuatis anguste acuminatis membranaceis in sicco rigidis, supra saturate viridibus glabris in venis hirsutis, subtus pallidioribus pubescentibus, corollâ calyceque puberulis. ♂ In coloniâ Tovar Columbiæ (Karsten). Folia 2-3 poll. longa,  $1\frac{1}{4}$  poll. lata. Petioli pollicem longi. Pedunculi uniflori, axillares, basi attenuati, pubescentes (Kl. et Karst.).

2. E. VILLOSA (Kl. et Karst. l. c.) villosa, foliis membranaceis ovato-acuminatis ab basin brevattenuatis, supra sparsim hirtis, subtus petiolisque villosis, corollâ calyceque glabris. ♂ In coloniâ Tovar Columbiæ (Karsten). Folia 2-4 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$  poll. lata. Petioli pollicem longi. Pedunculi bracteæque villosi (Kl. et Karsten).

P. 62. *CLISTAX SPECIOSUS*. Synon. *adde* : *Justicia megaphylla* Pohl in h. vindob.

P. 67. *NELSONIA CANESCENS* var.  $\beta$ . *adde* : *Origanum lanatum* Bojer! in h. Hooker. Prope Masou-voai insulæ Madagascar (Bojer).

P. 75 post *EBERMAYERAM AXILLAREM* inseras: 16 bis. E. *ELONGATA* (*Erythranthus elongatus* h. l. infr. p. 79).

16 ter. E. *LASIOBOTRYS*, fruticosa? caule strigoso incano, foliis oblongis utrinque attenuatis repandis glabris, racemis axillaribus terminalique simplicibus compositis elongatis recurvis laxis secundifloris pedunculoque communi patentia-hirsutissimis glandulosisque, bracteis et bracteolis setaceis parvis, calycis

(1) Engelio, dum vivebat Theatro Berolinensi praeposito, dicatum.

722 ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.).

laciiniis subconformibus linearis-subulatis angustis hirsutissimis. ♂? Chappedong (Wallich! in h. Bentham). Proxima E. elongatae, differt in primis inflorescentia patenti-hirsutâ, nec tantum minute puberula, et bracteâ angustissinâ, fere filiformi, pedicellum vix æquante. Calyx 4 lin. longus. Capsula 2 lin. longa. Corolla 7 lin. longa, infundibuliformis, tubo nonnihil incurvo, limbo brevi laciiniis duabus superioribus minoribus minus profunde discretis. Folia 5 poll. (cum petiolo) longa, 1½ poll. fere lata. Petioli strigillosi.

P. 84, pro *NOMAPHILA STRICTA* ponas: *N. CORYMBOSA* (Bl. bijdr. p. 804 etc.)  
Synon. adde: Zollinger pl. jav. n. 1190 et 1324 in h. DC! *Justicia Roxburghiana* h. hort. berol. *Justicia canescens* Lam.

*NOMAPHILA CORYMBOSA* tamquam distincta species deleatur.

P. 89, *HYGROPHILA OVATA*. Nomen mutandum in *H. hirsuta*, Necs in Mart. et Endl. fl. bras. fasc. 7 p. 24.

P. 94. *CRYPTOPHRAGMIUM VENUSTUM*. Synon. adde: Bot. mag. t. 3208, *Justicia venusta* Lodd. bot cab. t. 1791. Bot. reg. t. 1380.

P. 95. *CRYPTOPHRAGMIUM CANESCENS* del. synon. *Justicia canescens* Lam.  
quod ad *NOMAPHILAM STRICTAM* spectat.

P. 97. *LEUCORHAPHIS*. Characteri generis addas:

Capsula longa, depresso-quadrangularis, polysperma.

Ibid. *LEUCORHAPHI LAMIE* addas: Capsula 1½ poll. longa, 26-30-sperma. — Vidi in h. Hooker spec. Ansell. fructiferum.

P. 100 et 143 inseratur:

XXXII bis. *HEMIGRAPHIS N. ab E.* — *Ruelliae sp. Roxb. Roth, Wall.*

Calyx quinquepartitus, laciiniis subæqualibus, superiore paulo majore et latiore, basi plerumque per paria altius conjunctis, scil. 2 inferis, et superâ cum alterâ minore alterius lateris, quinta utrinque liberâ. Corolla infundibuliformis, resupinata, limbo quinquelobato lobis oblique subretusis, duobus superioribus (jam inferioribus) paulo minoribus. Stamina 4, didynama, tubi apici inserta, basi confluentia; antheræ uniloculares, loculo connectivo angusto carinato adnato; superiorum staminum altero loculo in barbam loculo subjectam converso; inferiorum staminum altero loculo omnino deficiente loculo perfecto, basi cymbiformi mucronato. Stigma ad basin dorsalem dente obtuso instructum, pubescens, simplex. Capsula infra medium 6-8-sperma, basi elocularis. Semina retinaculis sussulta, echinulata. — Herbae Indiæ orientalis perennes, ramosæ, flexuose, moliter villosæ, viscidulæ; foliis oblongis utrinque attenuatis, serratis, floralibus (bracteis) integerimis. Flores axillares, vel solitarii subsessiles bibracteolati, vel glomerati terminales capitati bracteati.

1. *H. ELEGANS*, foliis oblongis vel ovali-oblongis petiolatis serratis cauleque tetragono procumbente ramoso hirsutis, ramis divaricatis geniculatis, spicis axillaris brevipedunculatis capituliformibus, bracteis lanceolatis foliaccis calyce longioribus. ♂ In montibus ad ripas Irawaddi fluminis, contra Prome et in Taong dong (Wall!), in Hurdwar (Wallich!), in Chunâr (Hamilt.). — *Ruellia elegans* Bot. mag. t. 3389 (herb. DC. ex hort. soc. hortic. lond.). *Ruellia diffusa* h. Hamilt. Wall. cat. n. 2383. *N. ab E.* in Wall. pl. as. rar. 3 p. 83. *Crossandra diffusa* h. Hamilt. Wall. cat. n. 2383 a bis. *Ruellia Crossandra* Steud. nomencl. ed. 2. Caulis brachiatus, ramis, præsertim circa basin ad genicula infractis, ut omnes partes reliqua setis varia rigiditatis, pilis minoribus glanduliferis immixtis vestiti. Folia caulina inferiora cum petiolo sesquipollicari 4 poll. longa, superiore et ramea circiter pollicaria. Flores re-

## ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.) 723

vera spicata in pedunculis axillaribus capitula fere formant pauciflora. Pedicelli breves. Bracteolæ lanceolatae longitudine calycis, terminalibus floribus nullæ. Corolla calyce (4 lin. longo) vix duplo longior, tenera, tubo in fauces angustas transente lutescente, limbi laciniis subrotundis cœruleis, duabus inferioribus lineis 3 purpureis puncto quoque incisuræ albo notatis, tribus superioribus basi rubicundis puncto albo distinctiori. Capsula longitudine calycis. (v. c. v. et sicc. in h. DC. et s. sp. in h. Wallich.).

2. H. LATEBROSA (Roxb. fl. ind. ed. 1832 v. 3 p. 46), foliis ovatis grosse serratis, bracteis ovato-lanceolatis calycem æquantibus.  $\mathcal{L}$  In Indiâ orientali (Heyne! Roth!), inter Calcuttam et Dehly (Jacquemont! in h. mus. paris. et Nees n. 178, 179, 180), ad Islamaghur et Giriak (Hamilt.!), in Hurdwar (Wallich!), in umbrosis Sivalensibus et Himalensibus ad 3000 p. alt. ( Edgeworth! n. 208 ). Ruellia latebrosa Roth nov. pl. sp. p. 307. N. ab E. in Wall. pl. as. rar. 3 p. 83. Spr. syst. v. 2 p. 825. Wight h. prorp. n. 1942. Ruellia diffusa Wall. cat. n. 2383, b. Ruellia fasciculata Wall. cat. n. 2391, b. Ruellia erecta h. Hamilt.! Wall. cat. n. 2395, a. Crossandra? radicans b. Hamilt.! Wall. cat. n. 2395, a. (sub Ruellia erecta). Ruellia species latebrosa Roxb. sched. h. Wallich. Capitula, seu spicæ, ad capitolorum formam reducta, basi foliis duobus parvis argute serratis, petiolo longo linearie marginato instructis, stipantur. Bracteæ parvis inferioris paulo latiores reliquis. Bracteolæ nulla omnino. Calyx laciniæ lineares, ciliatae, ut bracteæ uninerves; superior paulo major. Antheræ basi uniaristatae. Capsula 2 $\frac{1}{4}$  lin. longa, tenera, tetragona, a basi hexasperma, calyce multo brevior. (v. in h. Wallich, Hamilt., Edgeworth).

P. 104. ENDOPOGON ARGUTUS, adde: Garduer! n. 689 in h. Mart.

Ibid. post E. VISOSUM inseratur :

6 bis. E. GARDNERIANUS, hirsutus, bracteis ovalibus obtusis, foliis ovatis sessilibus obtusis grosse crenato-serratis.  $\mathcal{L}$  Ceylon (Gardner! n. 1217 in h. Mart.). Hirsutio foliorum ceterisque satis distincta species. Caulis inferius glabrescit. Rami costales foliorum 3 5. Corolla fere pollicaris, pubescens, ad originem fauicum hinc albicanti-pellucida.

P. 105 adde ad calcem generis ENDOPOGONIS.

### *Species dubia.*

10. E. VITELLINUS, foliis late lanceolatis utrinque attenuatis reflexis glabris, racemis subcylindricis, floribus subfasciculatis, labio corollæ superiore recto bifido, fauce ampliatâ.  $\mathcal{L}$  In collibus Chittagong (Roxb.). Justicia vitellina Roxb. fl. ind. ed. Wallich. 1 p. 117, ed. 1832 1 p. 115, Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 370. Frutex 3-pedalis, glaber; rami tetaquatri angulis scabris. Folia 2-4 poll. longa, 1-2 poll. lata. Racemus 3-6-pollicaris. Flores medii terni, superiores solitarii. Corolla parva, flavo-rufescens; tubus calyce brevior. Labium superius horizontaliter protensus. Filamenta incurva. Fructus linearis, 8-spermus.

P. 113, HOMOTROPIUM ERYTHRORHIZUM. Ad cit. fl. bras. adde: t. 2.

P. 116. DIPTERACANTHUS RUBICAULIS rectius ad genus Stemonacanthus refertur p. 206 post n. 4.

P. 128 adde : 41 bis. DIPTERACANTHUS SUBCAPITATUS, caule herbaceo ramoso nodoso juvenili pubescente adulto glabro obsolete angulato, foliis ovalibus obtusisusculis in petiolum brevissimum acute desinentibus integerim pubescens, floribus in angulis foliorum superiorum confertis oppositis sessilibus, bracteolis obovato-cuneatis pubescentibus calyx lanceolato acuminato longioribus, corollæ tubo amplio fauces obconicas æquante.  $\mathcal{L}$  Realego (Sinclair! in h. Hooker). Distinctus floribus veluti in spicam brevem foliis bracteolisque interstinctam congestis. Corolla 8 lin. longa, violacea. (v. in h. Hooker.)

724 ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.)

P. 134. DIPTERACANTHUS GRANDIFLORUS, *adde* : Gardner! n. 4344? in h. Hooker.

P. 135, DIPTERACANTHUS BAHIENSIS. *Adde* : Moric. pl. nouv. Am. p. 154. t. 91.  
*Ibid.* DIPTERACANTHUS BLANCHETIANUS : *adde* : Moric. pl. nouv. Am. p. 163. t. 95.

P. 141. DIPTERACANTHUS (APHRAGMIA) HÆNKEI. Synon. *adde* : Ruellia albicans Berter. in hort. bot. berol.

P. 143, Dipteracantho bracteato *adde* : Endlicher iconographia.

*Ibidem post* Dipteracanthum? bracteatum (n. 90) inseras :

91. DIPTERACANTHUS PURDIEANUS, fruticosus glabriusculus, ramis subteretibus, foliis ovato-acuminatis subundulatis sublonge petiolatis integerrimis, floribus binis terminalibus bracteis biuis flores subæquantibus foliiformibus suffultis, calyce profunde 5-fido laciinis subulatis, corollæ tubo valde elongato curvato 5-angulato infundibuliformi, limbo 5-lobo patente, lobis rotundatis undulatis subæqualibus, antheris ultra tubum exsertis. ♂ Patria? Ruellia Purdieana Bot. Mag. May 1847. t. 4298. — Quod ad habitum et flores similis Ruelliae (Dipteracantho) bracteatae R. Br. Caulis 1-1½ ped. altus. Bractæ 2 sub singulo flore, foliis carinatis angustiores et longitudine flores æquantes. Corolla pulchre et intense kermesino-lilacina. Antheræ sagittatae, nonnihil prominentes.

P. 152, RUELLIA OCHROLEUCA. Ad cit. fl. bras. *adde* : t. 5.

P. 154 *post* 1. 19 *adde* : speciebus noui nisi nomine nobis cognitis : Ruellia achyranthifolia Desf. cat. cd. 3 p. 391.

P. 160, *adde* : Ruellia Purdieana Bot. mag. = Diptoracanthus Purdieanus, supra in præs. pag.

P. 163. ASYSTASIAE generi *addas* synon. : Hensfrey Lindl. in bot. reg. 1847. t. 31 (23?).

P. 166. ASYSTASIA QUATERNA *adde* loco natali : Senegambia, seens fluvium Gambia (Leprieur! in h. mus. paris. et Nces n. 23). Synon. *adde* : Henfrey scandens Lindl. in bot. reg. 1847 t. 31. (23?).

P. 179. STROBILANTHES ARNOTTIANUS *adde* : Gardner! in h. Mart. n. 691.

*Ibid. post* STROBILANTHEM ARNOTTIANUM inseras :

9 bis. STROBILANTHES CERINTHOIDES, caule herbaceo quadrangulo inferne glabro, ramis novellis patentii-hirsutulis, foliis ovato-oblongis basi obtusâ subsessilibus apice modice attenuatis obtusisque integerrimis glabris utrinque lineolato-asperis, pedunculis axillaribus folio longioribus foliolis simplicibus terminali tripartito, spicis primo ovalibus densis cernuis, demum elongatis flexuosis erectis secundifloris floribus distantibus, bracteis herbaceis ovalibus obtusis glanduloso-ciliatis sparsim pilosis, calycis laciiniæ linearibus obtusis ciliatis subhirsutis alterâ latiore. ♀ In Ceylon (h. Hooker!). S. Arnottiano propinquus, minus hirsutus, foliis angustioribus glabris, petiolo vix ullo, calycis laciiniæ latioribus, capsulâ basi tetraspermâ. Folia lineari-oblonga.

P. 181. STROBILANTHES WALKERI *adde* : Gardner! l. c. n. 685? Caule laxe hirsuto.

P. 183. STROBILANTHES GLABRATUS. Locis natalibus *adde* : Ceylon (Gardner! n. 1218 in h. Mart.)

P. 187. STROBILANTHES SEXENNIS. Character specificus ab initio sic emendandus est: caule fruticoso tetragono articulis inferioribus cingulato-rugosis glabris, foliis oblongis utrinque attenuatis serratis, inferioribus in petiolum anguste dcurrentibus, superioribus basi cuneiformi subdilatata sessilibus, pedunculis, etc. Loco natali *addas* : Gardner! n. 687 in h. Mart.

P. 180. STROBILANTHES ANCERS *adde* : Gardner! l. c. n. 692.

ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.) 725

- P. 196, post BUTERÆAM ULMIFOLIAM inseratur :
2. *B. RHAMNIFOLIA*, ramis novellis spicisque albo-hirsutis mollibus, bracteis rhombeo-oblongis, petiolis glabris. ♂ In Ceylon (Gardner! n. 1219 in h. Mart.). Caulis inferne glaber, dissipite tuberculatus, infra spicam lanato-hirsutus. Folia cum petiolo ultra semipolicari 2½-3 poll. longa, vix 1 poll. lata, crenato-serrata, supra setulis raris hispida, subtus glabra et pallide lutescenti-viridia, ramis costalibus utrinque sex. Bracteæ basi subcuneatae, apice vel obtusæ vel in acumen breve obtusumque productæ.

Diagnosi *B. ulmifoliæ addas* : petiolis hirsutis. — In charactere generico delean-  
tur verba : Frutex « rufo-hirsutus. »

- P. 198. *CRYPTACANTHUS AUSTRALIS*. Locis natalibus *adde* : New S. Wales (h. Hooker!)

- P. 200, *SIPHONACANTHUS VILLOSUS*. Ad cit. fl. bras. *adde* : t. 1.

- P. 206, *HEMONACANTHUS SALVIAE FOLIUS*. Ad cit. fl. bras. *adde* : t. 4.

- P. 208, *EURYCHANES VERBASCIFOLIUS*. Ad cit. fl. bras. *adde* : t. 3.

- P. 210. *ARRHOSTOXYLUM GLABRUM*. Cit. fl. bras. *adde* : t. 6.

- P. 221, *ANCYLOGYNE MUNITA*. Cit. fl. bras. *adde* : t. 7.

- P. 222. Ad calcem Subtribus IV Ruellicæ *adde* :

?LVIII bis. ANDROCENTRUM *Lemaire in Fl. des serres, juin 1847 misc. n. 12.*

Calycis inæqualis laciniæ 5, triseriatæ, superiore majore, 2 inferiori-  
bus angustioribus. Corolla campanulata, calyce 4-plo longior, limbi dilatati lobis 5 patulis subæqualibus oblongo-rotundatis. Stamina 4 subdidyma,  
inclusa, filamentis basi dilatatis barbatis annulo crasso insertis;  
antheris oblongis, loculis parallelis æqualibus basi calcare setiformi muni-  
tis. Ovarium bilocularis, disco 5-lobo insertum, loculis biovulatis. Stylus  
simplex, stigmate incurvo bifido. Capsula....

1. A. *MULTIFLORUM* (Lemaire l. c.) — Planta Mexicana, quam Galeotti in hort.  
belg. introduxit. ♂? Rami tetragoni, articulati, verruculosi, grisei. Folia  
elliptica, utrinque acuta limbo decurrente, supra pilis adpressis brevibus  
operta, subtus glabra, reticulatum venosa; petioli circa caulem in involucrum  
quoddam connati. Panícula amplissima, repetito-trichotoma, foliata; ramis  
furfuraceis, striis parvulis sub lente pilis brevissimis densissime conglutinatis  
numerossissimis fere confluentibus testis. Flores numerosissimi (in angulis divisionum nullis), in ramulis oppositi, bracteolati, breviter pedicellati. Involu-  
crum diphylum sub unoquoque flore, minimum. Calycis segmenta crasso-  
coriacea, furfuraceo-puberula, carinata (foliolis involueri forma vestitaque  
conformia, sed carinata), ciliata. Corolla cætus grosse venosa, glabra, intus ad  
ventrem barbata. Filamenta subarcuata. Genus *Aphragmiæ proximum*, sed  
sat distinctum (Lem.). Cl. Lemaire ex sicco descripsit.

- P. 225 post Barleriam polytricham inseratur :

8. b. *BARLERIA ARABICA* (Belanger in h. DC.), fruticosa, caule adpresso-  
strigoso, foliis ellipticis acuminatis in petiolum alatum decurrentibus supra  
sparsim subtus in costis dense strigosis, spicis axillaribus et terminalibus sessi-  
libus, bracteis oblongo-parabolicis obtusis, calycis laciniis majoribus ovatis  
venoso-nervosis reticulatis ad venas strigosis denticulatis et setuloso-ciliatis?  
inferiore acutiusculâ, superiore paulo breviore emarginato-bidentatâ. ♂ In Ara-  
biâ (L. Bouton in h. DC. l. c.). A B. polytrichâ differt in primis foliis latioribus et  
calycis laciniis majoribus longioribus apicem versus distinctius attenuatis neque  
tamen valde acutis (marginé undulatis, pallidis valideque nervoso-venosis, venis  
principalibus in laciniâ inferiori 11 in superiori 15). Corollæ bipollucaris infun-  
dibuliformis cœruleo-tubus brevis.

726 ADDENDA ET CORRIGENDA (AETOR NFES AB ES.)

P. 237. BARLERIA PRIONITIS *adde* synon. : Zolling. pl. jav. n. 626 h. DC. n. 843.

P. 237. BARLERIA LUPULINA synon. *adde* : Dicliptera spinosa hort. angl. in hort. bot. berol.

P. 242. BARLERIA SOLANIFOLIA syn. *adde* : Eranthemum Cubense Spr. in h. Poeppig (h. Hooker !)

P. 243 post var.  $\beta$  inseratur var.

$\gamma$  (B. solanifolia) nana, caule digitali et paulo longiore ramosissimo, articulis brevibus ideoque spinis foliisque confertis, foliis vix 1-1 $\frac{1}{2}$  lin. longis ovalibus integerrimis spinis brevioribus. — In Cuba (Linden! n. 1830) (v. in h. Hooker.)

P. 243 *adde* inter species Barlieræ incertæ sedis :

67. BARLEIA ACANTHOPHORA, foliis ovatis oppositis, stipulis spinosis. floribus lateraliibus solitariis.  $\Sigma$  Ad Mozambique (Loureiro.) Eranthemum acanthophorum Rœm. et Schl. syst. veg. mant. 1 p. 154. Willd. sp. pl. ed. Dictr. 1 p. 410. Eranthemum spinosum Lour. Cochinch. ed. Willd. 1 p. 21. Vahl en. 1 p. 304. Caulis pedalis, erectus. Folia parva, integerrima, pilosa. Flores dilute violacei, pendunculati. Calyx diphyllos! foliolis erectis. Corollæ tubus filiformis, basi curvatus.

P. 217. ASTERACANTHA.

Inter synonyma generis ponas : Tenoria Denh. et Giordano in hort. Camald. ed. 2. 1829. p. 24. (*non alior.*)

*Ibid.* ASTERACANTHA LONGIFOLIA, synon. *adde* : Tenoria undulata Denh. et Giord. in hort. Camald. ed. 2 p. 24.

P. 261. Synonimiæ generis AETHEILEMATIS *addas* : Phyllopsis hort. kew. in h. DC.!

P. 261. AETHEILEMA RENIFORME. Loco natali *adda*; : Sierra Leone (h. DC.) Synon. *adde* : Ruellia cucullata Bojer! in h. DC. e Madagascar, in arenosis insulae Pembac (Bojer!)

P. 262. AETHEILEMA IMBRICATUM. Synon., *adde* : Ruellia biflora? Bojer! in h. DC. Ruellia brachyopoda Bojer! in h. DC. Synon. Ruellia petiolata Bojer, *addas* : et h. DC.

*Post var.*  $\beta$  minorem, *addas* :

$\gamma$ . *verticillaris*, floribus verticillato-spicatis terminalibus, verticillis distinctis. In insulâ Johannâ Commores Madagascariæ (Bojer!) in h. DC.). Spicæ breves, paucifloræ verticillorū bractæ inferiori veluti involucratorum speciem referunt, quo spica terminalis elongata verticillata ortitur.

P. 262. AETHEILEMA RUPESTRE. Character sequenti modo mutandas est :

$\alpha$ . caule flexuoso basi repente ramis adscendentibus foliisque ovatis obtusis repando-subrenatis pubescentibus, altero folio minore, racemis axillaribus, bracteis ovali-suborbiculatis obliquis calyce brevioribus, calycis hirti laciniis superiore ohlongâ submembranacea ciliatâ.  $\Sigma$  In Madagascar.

$\alpha$ . *gracile*, caule subsimplici, racemo altero subterminali paucifloro, axillaribus brevissimis sessilibus 1-3-floris. —  $\alpha$ . rupestre l. c.

$\beta$ . caule repente ramisque rigidioribus firmioribus, spicis omnibus axillaribus plurifloris densis sessilibus. — In insulâ Mohillo et in insulâ Madagascar (h. mus. paris. et Nees n. 56).

Ad calcem descriptionis, *adde* : in eo autem differt, quod latera capsulæ cum dissepsimento sœpe dissoluta reflectantur et Diclipteræ seu Blechi potius fructum simulentur.

P. 263, TELIOTASTHYA CATARACTÆ. Cit. fl. bras. *adde* : t. 8.

## ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.) 727

- P. 263. *TELIOSTACHYA ALOPECUROIDEA*, *adde* : Peruvia? Poeppig. n. 2262. B. in h. DC.
- P. 280. *CROSSANDRA INFUNDIBULIFORMIS*. Synon. *C. undulæfolia*, *addas* : Salisb. ic. 6 t. 224.
- Ibid.* *CROSSANDRA INFUNDIBULIFORMIS*, var.  $\beta$  auctoribus et collectoribus floræ Javanice, *addas* : Zollinger pl. jav. n. 1247 in h. DC. Loco natali, *adde* : Mons Majammarra in Arabiæ Felici (Botta! in h. mus. paris. et Nees n. 211. Beida Kebira Arab.)
- Ibid.* In charactere Stenandrii (**LXXVI**) lin. 2. verbis, Stamina inclusa, *adde* : filamentis basi liberis.
- P. 281. *CROSSANDRÆ OPPOSITIFOLIÆ*, *adde* : locum natalem : peninsula Indiæ australis nom. ind. Sennulli Leschenault! in h. DC. et in h. Nees ex h. Mus. paris.
- Ibid.* *CROSSANDRA AXILLARIS*, *adde* : Variat bracteis minoribus ovalibus (nec oblongis) (Jacquemont! in h. mus. paris. et Nees n. 161).
- P. 282. *STENANDRIUM DIPHYLLUM*,  $\beta$  *exscapum*, Loco natali, *addas* : République orientale de l'Uruguay (Montevideo) (Arsene Isabelle! n. 8. in h. Hooker).
- P. 283. *STENANDRIUM POHLII*. Cit. fl. bras. *adde* : t. 9.
- P. 284. *STENANDRIUM MANDIOCCANUM*, *adde* : "  
β. *emarginatum*, foliis apice emarginatis. — In Brasiliâ (Tweedie! in h. Hooker).
- P. 285. *Adde post STENANDRIUM VILLOSUM* (n. 16).
17. *STENANDRIUM CORYMBOSUM*, caulescens, herbaceum, glabrum, foliis oblongis cuspidatis in petiolum acute desinentibus, spicis brevibus in corymbo terminali trichotomo dispositis, bracteis calyce multo longioribus ovalibus obtusis membranaceis sessilibus patulus.  $\mathcal{Z}$  In Columbiâ (Lobb! n. 171 in h. Hooker). Habitus Valerianæ. Caulis videtur succulentus, pédalis, simplex. Folia cum petiolo  $\frac{1}{2}$  pollicum 4-5 poll. longa, 12-14 lin. lata, integerima, longe cuspidata cuspide obtusiusculo. Corymbus patulus. Bracteolæ calyce breviores. Calyx parvus. Corolla 6 lin. longa.
- Ibidem.* Insere ante genus *POLYTHRIX* :
- LXXVI bis. HOLTZENDORFFIA Kl. et Karsten (1).**
- Calyx quinquepartitus, laciñis subulatis inæquilongis remote ciliatis tubum corollæ subæquantibus. Corolla infundibuliformis, limbo subregulari quinquelobo, lobis rotundatis, margine denticulatis. Stamina 4, di-dynama, inclusa. Antheræ uniloculares, longitudinaliter dehiscentes, albidæ; filamenta filiformia inferne in laminam tubo corollæ adnatam connata. Ovarium sessile, pyramidale, bilocular, loculis 42-ovulatis, ovulis erectis. Stylus filiformis, lilacinus, deinde deciduus. Stigma lanceolatum, obliquum, apice truncatum, post anthesin uncinatum. Capsula oblonga, bilocularis, loculis 6-8-spermis. Semina compressa, orbicularia, brevissimæ acutata, margine leniter fimbriata. — Suffrutex Caracasanus, radice fasciculata, caule ramisque teretibus hirtis; foliis obovatis obtusis aut breve acutis in petiolum attenuatis; floribus pallide lilaciniis in apice ramorum paniculatim axillaribus. — Specimen virum, jam in hortum Vratislaviensem absque flore, at vero pedunculis fructiferis illatum, ut ovum ovo simile est Cryptiacantho macrosiphoni p. 498. Antheræ si revera essent uniloculares, generis proprii esse hanc plantam equidem neuti-

(1) Memoriae Ottonis de Holtzendorff, viri de re herbaria strenue merentis dedicatum (Kl.)

quam dubitarem, sed ad tempus incertus sum, an errore calami a scriptore, an errore observatoris ejusmodi antherarum structura ei sit tributa.

H. CARACASANA (Kl. et Karsten), foliis late viridibus utrinque sparsim minutissimeque albido-pubescentibus margine brevi-ciliatis, costis hirsutis, corollis puberulis, tubo infra medium angustato. In Colonia Tovar in Columbiâ (Karsten). Suffrutex bipedalis. Folia 4-6 poll. longa,  $2\frac{1}{2}$ -3 poll. lata. Corolla  $2\frac{1}{2}$  poll. longa, ad faucem 8 lin. in diametro (Kl. et Karsten).

P. 293, LAGOCILIJUM MAXIMILIANUM. Cit. fl. bras. *adde* : t. 10.

P. 294, STROBILORHACHIS BLANCHETIANA. Post loc. nat. *adde* : Moric. pl. nouv. Am. p. 161 t. 94.

P. 295. APHELANDRA TETRAGONA. Synon. *adde* : Aphelandra cristata Bot. reg. t. 1277.

P. 299, APHELANDRA NEMORALIS. Cit. fl. bras. *adde* : t. 11.

P. 299, inseras post APHELANDRAM SCIOPHILAM (n. 17) :

17 bis. APHELANDRA REPANDA, fruticosa, foliis lanceolatis in petiolum longum attenuatis glabris nitidis grosse sinuato-repandis inermibus, spicâ terminali sessili, bracteis oblongis acuminatis subserrulatis margine puberulis 5-nervibus. In Peruviâ, Pangoa (Mathews n. 1238 in h. Hooker). Folia 9-10 poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$  poll. lata. Bracteæ 1 poll. longæ, virides. Corolla 1 $\frac{1}{2}$  poll. longa, coccinea, labii inferioris laciniaæ æqualibus, mediâ ovali, lateralibus oblongo-lanceolatis. Filamenta hirta.

P. 300. APHELANDRAE SQUARROSE, *adde* synon. : Justicia macrophylla Spr. syst. v. 1 p. 79. Willd. sp. pl. ed. Dietr. 1 p. 376.

P. 303, post lin. 10, *adde*

### *Species dubia.*

AFHELANDRA DENHARDTII Tenore ind. sem. 1829. p. 14.

P. 304, lin. 13 infra loco PHLOGANTHUS, *lege* : PHLOGACANTHUS.

P. 304 et 311, nomini generis GALEOTTIA substituendum est alterum : GLOCKERIA in honorem Fernandi Glocker, v. cl., qui flora Balhiensis studio streueue incumbit multasque in istis regionibus plantas collegit. — Galeottio jam ab aliis (Ann. des sc. nat. ser. 3. v. 3. 1845 p. 25) debitus honor persolutus est.

P. 304 et 312, post Habracanthum inseratur :

### XCI bis. HOLOGRAPHIS N. ab E.

Calyx quinquepartitus laciniaæ æqualibus. Corolla ringens, tubo brevissimo, fauibus obconicis longis, labii inferioris trifidi laciniaæ æqualibus palato lævi. Stamina quatuor didynama, tubi apici inserta, hinc libera. Antheræ uniloculares, dorso adfixæ, angustæ, conformatæ, undique latatae. Stigma simplex. Ovarium basi annulo tenui cinctum. Fructus . . . — Fruticulus Mexicanus ramosissimus, floribus axillariis, bibracteolatis, subsessilibus, geminatis, coccineis. — Genus affine Hemigraphi.

H. EHREMBERGIANA. In Mexico, supra la Haciende de Guadela (?) (Ehrenberg! n. 1224 in h. gen. berol.). Fruticulus humilis, rigidus, pubescens. Folia 6-8 lin. longa, ovato-oblonga, obtusa, basi acutâ in petiolum brevem desinentia, margine revoluta, supra pubescentia subtus albido-tomentosa. Flores gemini, axillares, fasciculæ alternis distantibus. Bracteæ duæ, foliis similes, oppositæ, paulo minores, ad basin fasciculi. Bracteolæ tres ad basin singuli floris sublatæ, subæquales, pubescentes, calyce breviores. Calyx 3 lin. longus, sub

ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.) 729

membranaceus, coloratus, albo-pubescentibus, lacinis lanceolato-linearibus.  
Corolla semipolicaris. Antheræ densâ lanâ albæ, angustæ.

- P. 313, CHÆTOTYLAX TOCANTINUS. Cit. fl. bras. *adde* : t. 26.  
P. 314, HEINZELIA LYTHROIDES. Cit. fl. bras. *adde* : t. 27.  
P. 316, SCHAUERIA SULPHUREA. Cit. fl. bras. *adde* : t. 15.  
P. 317. SCHAUERIA VIRGINÉA. Synon., *adde* : Veronica littoralis Vell fl. fl. 1 t. 24.

- P. 319. SCHAUERIA SCHOTTII. Synon., *adde* : Dianthera spicata Vell. fl. fl. 1 t. 28.

- P. 320. PACHYSTACHYS LATIOR. Synon., *adde* : Justicia coccinea hort. berol.

- P. 321. PHLOGACANTHUS ASPERULUS. Synon., *adde* : Justicia quadrangularis Bot. reg. t. 1340 (var. flore carneo).

- P. 323, THYRSACANTHUS BARLERIOIDES. Cit. fl. bras. *adde* : t. 13.

- P. 324, post n. 7. Thyrsacanthus tubæformis inseratur :

7 bis. T. LEMAIRIANUS, foliis lanceolatis utrinque attenuatis (vix petiolatis sub-villosis, thyroso (racemo) terminali multifloro, floribus fasciculato-subternis fasciculis oppositis, pedunculi calycem æquante, bracteis bracteolatisque subulatis pedicello brevioribus, corolla infundibuliformi tubo elongato limbo (ad iconem) subæquali patente, staminibus sterilibus brevissimis apice dilatato petaloideis, ♂ Patria ignota. Colitur in hortis. Eranthemum coccineum Lemaire in Flore des serres, juin 1847 t. 8. Aphelandra longiscapa hort. Salpinxantha coccinea hortul. Paris (nec auct.). Justicia longiracemosa hort. — Rami cylindrici, juniores tomentosi. Folia in petiolum attenuata. Corolla (ex icono) pollicaris, intensa rosea! limbi laciniae oblongæ, duæ superiores altius concretæ. Stamina fertilia exserta. Ovarium oblongo-conicum, 4-ovulatum. — Accedit, quod ad babitum, ad Th. bracteolatum, sed corollis longioribus, staminum sterilium figurâ (quæ quidem soli Th. barleriodi congrua) etc. recedit.

- P. 327. THYRSACANTHUS NITIDUS. Synon., *adde* : Justicia lucida h. hort. berol.

- P. 328. CYRTANTHERA MAGNIFICA. Cit. fl. bras. *adde* : t. 14.

- P. 329, post Cyrtantheram magnificaem insere :

1 bis. CYRTANTHERA LONGIFLORA, glabra, caule suffruticoso subangulato nodoso, foliis ovali-acuminatis subcrenulatis venosis petiolatis, racemo terminali thyroideo, floribus in fasciculis pedunculatis sessilibus, bracteis lanceolatis ciliatis, calycis quinquepartiti lacinis linearis-lanceolatis, corolla tubo calyce triplo longiore, labio superiore, longissimo 5-nervi emarginato plicâ longitudinali stylum includente, inferiore spatulato trinervi lobis rotundatis imbricatis, anteriarum loculis alternis. — Justicia longiflora Vis. sem. hort. patav. a 1839. Schlecht. in Linn. 14. litter. p. 136. An eadem ac C. magnifica?

- P. 330. CYRTANTHERA POHLIANA. Synon., *adde* : Justicia carnea Lindl. et hort.

- P. 333, ad calcem generis Jacobinia, *adde* :

7. JACOBINIA CALIFORNICA, ramulis pubescentibus, foliis petiolatis ovatis vel ovato-lanceolatis basi truncatis vel late cordatis utrinque breviter puberulis, racemis brevibus terminalibus, bracteis minutis, bracteolis linearis-subulatis calyce brevioribus, corolla profunde bilabiata labio superiore emarginato, inferiore apice breviter trifido. ♂ In prom. S. Lucae Californiae. Beloperone Californiae Benth. bot. of the sulphur p. 38. Frutex ramosus, paucifoliatus, ramulis albidis teretibus. Folia pollicaria, saepius triangularia vel cordato-ovata. Racemi 1-2-pollicares, simplices vel subramosi. Corolla 13-14 lin. longa.

## 730 ADDENDA ET CORRIGENDA

AUCTOR NEES AB ES

Ibid. HARPOCHILUS NEESIANUS. Cit. fl. bras. *adde* : t. 24.

P. 339, RHYTIGLOSSA ANGUSTIFOLIA. Cit. fl. bras. *adde* : t. 19.

P. 341. RHYTIGLOSSA LUCIDA. *Adde* synon. : Justicia secunda Spr. in h. hort. berol.

P. 356. AMPHISCOPIA BEYRICHI. Cit. fl. bras. *adde* : t. 26 et synon. Dianthera Brasiliensis Vell. fl. fl. 1 t. 26. Justicia Arrabidae Steud. nomencl. ed. 2 p. 387.

P. 358. AMPHISCOPIA VENOSA. Cit. fl. bas. *adde* : t. 21.

P. 360. SERICOGRAPHIS RIGIDA. Cit. fl. bras. *adde* : t. 16.

P. 363. post Sericographidem paucifloram (n. 11) inseras :

11 bis. S. GHIESBREGTIANA, glabra, ramosissima, ramis nodoso-inflatis subterragonis lineis 4 subelevatis, foliis distantibus ellipticis acuminatis arcuato-recurvatis subcrenulatis, pedicellis bibracteolatis bifloris (axillaribus?), flore uno sessili, calyce brevi glanduloso-piloso, corollâ glabrâ trigonâ bilabiata, basi (intus) squamis 3 sericeo-pilosas adnatis stipitâ, labio superiore brevissime bifido arcuatim plicato venoso, filamentis pubescentibus loculis antherarum inaequalibus basi divaricatis, stigmate ovato bifido articulato glabro. ♂ In Mexico, introduct. in hort. Belgicos a cl. Ghiesbregt. Justicia Ghiesbregtiana Lemaire in flore des serres, juin 1847 misc. n. 7. — Rami ad articulationes atro-rubentes. Limbus foliorum basi decurrentes, late undulatus, obsolete distanterque venuatus, margine subreplicatus nitidus, intense viridis, subtus pallidus punctulatus elevatis glandulosis inspersus; nervi arcuati, subparallel. Calycis laciniae lineares. Bracteolæ linearis-subulate. Corolla sesquipollucaris et ultra, a tergo late rotundata, deorsum angulata (purpurea?); labia æqualia, superius subtriangulare, plicis lateralibus discoloribus notatum, inferius trilobulatum lobulus oblongis. Stylus coccineus. Filamenta a basi ad medium cum tubo corollæ connata et pilosa, hinc libera et nuda. Squamae basis corollæ (maculae) oblongæ. Ovarium oblongum, disco obsolete lobato insertum, loculis biovulatis.

P. 366. HERPETACANTHUS SCHULTZIA. Cit. fl. bras. *adde* : t. 12.

P. 368. *adde* :

2? ANISOSTACHYA VELUTINA, caule foliisque tenuissime velutino-scabris, bracteis muticis. ♂ In Madagascar (h. Hooker!). Antheræ videbantur muticæ et calyx, ad apicem quidem bilabiatus, facile in 4 lacinias discebat. Bracteæ magis cuneatæ quam obovato-cuneatæ. Specimen non sufficit.

ANISOSTACHYA BOJERI circumscribenda est : A. caule foliisque glabris, bracteis muneratis.

P. 378. LEPTOSTACHYA CORDATA deleatur, est enim Rhaphidosporæ generis.

P. 379. LEPTOSTACHYA DICHOTOMA deleatur, repetita suo loco p. 500, sub Rhaphidosporæ dichotomæ.

P. 382. SAROTHECA ELEGANS. Cit. fl. bras. *adde* : t. 18.

P. 386. ADHATODA RAMOSISSIMA. Synon., *adde* : Justicia betonicæfolia hort. angl. in hort. bot. berol.

P. 389. ADHATODA CYDONIÆFOLIA. Cit. fl. bras. *adde* : t. 25.

P. 405. ADHATODA CUNEIFOLIA. Synon., *adde* : Dianthera comata Vell. fl. fl. 1 t. 27?

P. 410.

### Gendarussæ exclusæ :

GENDARUSSA ABYSSINICA Hochst. = Rhipidospora Abyssinica.

G. BIFARIA N. ab E. = Erauthemum bifarium.

## ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.) 731

- G. CUNEATA N. ab E. == Adhatoda (*Tyloglossa*) cuneata.  
G. DECUSSATA Hochst. == Adhatoda (*Tylogl.*) decussata.  
G. DIOSMOPHYLLA N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) diosmophylla.  
G. DIVERSIFORMIS N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) diversiformis.  
G. HYSSOPIFOLIA N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) hyssopifolia.  
G. INCANA N. ab. E. == Adhatoda (*Tylogl.*) incana.  
G. INCANA β N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) divaricata.  
G. LEPTANTHA N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) leptantha.  
G. NEESIANA Wall. == Adhatoda (*Tylogl.*) Neesiana.  
G. ORCHIOIDES N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) orchioides.  
G. PALUSTRIS Hochst. == Adhatoda (*Tylogl.*) palustris.  
G. PATULA N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) patula.  
G. PROTRACTA N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) protracta.  
G. PYGMÆA N: ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) pygmæa.  
G. QUADRIFARIA Wall. == Adhatoda (*Tylogl.*) quadrifaria.  
G. SCHIMPERIANA Hochst. == Adhatoda (*Tylogl.*) Schimperiana.  
G. TRANQUEBARIENSIS N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) Tranquebariensis.  
G. VARIEGATA N. ab E. == Adhatoda (*Tylogl.*) variegata.  
G. VASCULOSA Hochst. == Adhatoda (*Tylogl.*) vasculosa.  
G. VENTRICOSA Hochst. == Adhatoda (*Tylogl.*) ventricosa.  
G. WYNAADENSIS Hochst. == Adhatoda (*Tylogl.*) Wynaadensis.
- P. 411. MONECHÍA BRACTEOSUM. Synon., *adde*: *Justicia alba* hort. berol.  
P. 413. SIMONISIA RIEDELIANA. Cit. fl. bras. *adde*: t. 23.  
P. 416. BELOPERONE COMOSA. Loco: *Affinis B. formosæ*, *lege*: *B. nemorosæ*.  
P. 418. BELOPERONE LONGEFETIOLATA. *Adde*: *Nees* in *Mart. et Endl. fl. bras.* 7 t. 22. *Synon. addas*: *Justicia geniculata* *Vell. fl. fl. 1 t. 31.* *Justicia* *tri-bracteata* *Spr. in h. hort. berol.*  
P. 420. BELOPERONE PLUMBAGINIFOLIA. Synon., *adde*: *Justicia Dianthera* *Well. fl. fl. 1 t. 32.*  
P. 424. *post Beloperonem involucratam, adde*:
30. BELOPERONE MATHEWSIANA, spicis axillaris solitariis geminis seriatim bracteis duabus oblongo-lanceolatis ad basin suffultis, bracteis propriis lanceolatis argute acuminatis calycem coloratum lanceolatum æquantibus bracteolisque anguste triangularibus calyce brevioribus pubescenti-scabris, foliis oblongo-ovalibus acuminatis basi cuneato-attenuata in petiolum obtuse desinentibus glabris. ♂? Ad Moyabamba Peruvia (Mathews! n. 1535 in h. Hooker). Caulis rubiginoso-subtomentosus. Folia speciosa. Ab affini B. involucratâ facile distinguitur. Corolla fero pollicaris, angusta, venosa.
- P. 429, *adde*: *Dicliptera dubia*.
- JUSTICIA VIRIDIS (Blanco fl. de Filipp. p. 15), caule tetragonon articulis inflatis, foliis lato-lanceolatis repandis, petiolis brevibus, spicis axillaris densis compositis, partialibus secundis, bracteolis parvis acutis, corollæ labio superiore recurvo tridentato, inferiore angustiore valde involuto, capsulâ 4-spermâ seminibus unguibus elasticis prosilientibus. ♀ Malipta Philippinarum. (Blanco). Planta in medio lignosa et viridis, 4-pedalis. Corolla alba. Capsula exiguae.
- DICLIPTERA INTERRUPTA (Bl. bijdr. p. 790), caule herbaceo erecto, foliis inferioribus longiter petiolatis ovato-oblongis, superioribus subcordatis subsessilibus integerrimis, spicâ terminali subramosa interruptâ, bracteis ovatis acuminatis

732 ADDENDA ET CORRIGENDA (AUCTOR NEES AB ES.)<sup>o</sup>

veutricosis nervosis glanduloso-pilosiusculis subæqualibus. *2* In umbrosis montanis insulæ Javae, Augusto, etc. (Blume). Rungia interrupta Hassk. h. bogor. alt. p. 151 nota). Vix pro Rungiâ habenda.

P. 415. ANISACANTHUS VIRGULARIS.

Ex vivo : lobus superior corollæ medio binervius, lobo calycis et axi plantæ oppositus, in præfloratione internus, lobi 3 alii medio uniunervii; quæ ad valorem lobi superioris labium dimerum quamvis integrum constantis, et ad æstivationem corollæ in ordine, ut videtur, diversam ab æstivatione Labiatarum Verbenacearum, aliorumque ordinum, plus minus valent. Æstivatio in div. Acauthaceis inquirenda. (Alph. DC.)

---

# INDEX NOMINUM ET SYNONYMORUM

## PARTIS UNDECIMÆ.

*Obs.* Nomina admissa litteris romanis, Synonyma italicis traduntur, nempe in utrâque classe :

Ordinalia majoribus,  
Tribulalia majusculis,  
Generica vulgaribus,  
Sectionalia minoribus.

<i>Abena Schauer</i> .....	561	<i>AVICENNIAE Meissn.</i> .....	698
<i>Abena Neck</i> .....	561	<i>Barbula Lour.</i> .....	624
<i>ACANTHACEÆ R. Br.</i> .....	46, 720	<i>Barleria Linn.</i> .....	223, 725
<i>ACANTHEÆ Nees ab E.</i> .....	264	<i>BARLERIÆ N. ab E.</i> .....	222
<i>ACANTHI Juss.</i> .....	46	<i>Belantheria N. ab E.</i> .....	96
<i>Acanthodium Delil.</i> .....	273	<i>Beloperone N. ab E.</i> .....	413, 731
<i>Achanthopsis Harv.</i> .....	278	<i>Bertolonia Raf.</i> .....	572
<i>Achanthus Linn.</i> .....	269	<i>Bertolonia Spin.</i> .....	706
<i>Adenacanthus Nees ab E.</i> .....	196	<i>Billardiera Moench.</i> .....	535, 550
<i>Adenosma Nees ab E.</i> .....	67	<i>Blairia Gærtn.</i> .....	532
<i>Adhatoda Nees ab E.</i> .....	384, 730	<i>Blairia Gærtn.</i> .....	572
<i>Æchmanthera N. ab E.</i> .....	170	<i>Blechum Browne</i> .....	465
<i>Æginetia Linn.</i> .....	43, 720	<i>Blepharacanthus N. ab E.</i> .....	273
<i>Ægiphila Jacq.</i> .....	647	<i>Blepharis Juss.</i> .....	265
<i>Æthelema R. Br.</i> .....	261, 726	<i>Bontia Plum.</i> .....	716
<i>Agathelphis</i> .....	702 adnot.	<i>Boschniakia C. A. Mey.</i> .....	39
<i>Agricola Schrank.</i> .....	658	<i>Bouchea Cham.</i> .....	557
<i>Aloysia Schauer.</i> .....	572	<i>Brachystegie N. ab E.</i> .....	286
<i>Aloysia Ort.</i> .....	572	<i>Brachystephanus N. ab E.</i> .....	511
<i>Alvarezia Pav.</i> .....	465	<i>Bravaisia DC.</i> .....	524
<i>Amasonia Linn.</i> .....	677	<i>Brochosiphon N. ab E.</i> .....	492
<i>Amblyanthus Nees ab E.</i> .....	387	<i>Buchia Kunth.</i> .....	524
<i>Amphibius Alph. DC.</i> .....	714	<i>Burchardia Duh.</i> .....	640
<i>Amphiscoopia Nees ab E.</i> .....	355, 730	<i>Buterae N. ab E.</i> .....	196, 725
<i>Analectis Juss.</i> .....	612		
<i>Anblatum Endl.</i> .....	42		
<i>Ancylogyne Nees ab E.</i> .....	221, 725	<i>Caldenbachia Pohl.</i> .....	281
<i>Andreaea Vent.</i> .....	706	<i>Callicarpa Linn.</i> .....	640
<i>ANDROGRAPHIDÆ N. ab E.</i> .....	512	<i>Calloreas Cham.</i> .....	601
<i>Andrographis Wall.</i> .....	575	<i>Calochlamys Presl.</i> .....	623
<i>Androcacentrum Lem.</i> .....	725	<i>Calophanes Don.</i> .....	107
<i>ANECHMATICANTHEÆ N. ab E.</i> .....	49	<i>Camara Cham.</i> .....	596
<i>Anisacanthus N. ab E.</i> .....	444, 732	<i>Camara Plum.</i> .....	594
<i>Anisostachya N. ab E.</i> .....	368, 730	<i>Campylostemon E. Mey.</i> .....	376
<i>Anisotes N. ab E.</i> .....	424	<i>Caractera Forsk.</i> .....	594
<i>Anopanthus Endl.</i> .....	41	<i>Cardanthera Ham.</i> .....	67
<i>Anoplon Wall.</i> .....	41	<i>Cardiacanthus N. ab E.</i> .....	331
<i>Anthacanthus N. ab E.</i> .....	460	<i>CARYOPTERIDEÆ Schauer.</i> .....	624
<i>Anthocometes N. ab E.</i> .....	311	<i>Caryopteris Bunge</i> .....	624
<i>Aparinaria Schauer.</i> .....	534	<i>Cæsareta Walp.</i> .....	693
<i>Aphelandra R. Br.</i> .....	295, 728	<i>Chascanum Schauer.</i> .....	559
<i>APHELANDREÆ N. ab E.</i> .....	279	<i>Chascanum E. Mey.</i> .....	557
<i>Apolepsis Hassk.</i> .....	260	<i>Casselia N. ab E.</i> .....	527, 702
<i>Arrhostoxylum Mart.</i> .....	209, 725	<i>CASSELIAE Schauer.</i> .....	527
<i>Asteracantha N. ab E.</i> .....	247, 726	<i>Castelia Cavan.</i> .....	532
<i>Asystasia Blum.</i> .....	163, 724	<i>Castorea Plum.</i> .....	615
<i>Athlianthus Endl.</i> .....	384	<i>Chætacanthus N. ab E.</i> .....	462
<i>Avicenia L.</i> .....	699	<i>Chætothylax N. ab E.</i> ....	313, 328, 729

Chameranthemum N. ab E.	459	ERANTHEMÆ N. ab E.	425
Cheilopsis Moq.	272	Eranthemum Linn.	445
Chilianthus Burch.	524	Eremodendron DC.	712
Chlaucthes R. Br.	531	Eremophila Brown.	712
Chrysomallum Schauer.	694	Erianthera Wall.	514
Cistanche Link et Hoffm.	11	Erythracanthus N. ab E.	78
Citharexylum Linn	609	Euagnus Schauer.	683
Clandestina Tournef.	40	Euamphiscopia N. ab E.	356
Clerodendron Linn	658	Euanoptron Endl.	41
Clinacanthus N. ab E.	511	Euchilus Alph. DC.	714
Clistax Mart.	61, 721	Euclerodendron Schauer.	658
Codonacanthus N. ab E.	103	Eupriva Schauer.	533
Congea Roxb.	623	Eurychanes N. ab E.	208, 725
Conaphalis Wallr.	14		
Carnacchinia Savi.	658	Fabria Mey.	113
Carnuta Burm.	630	Flemingia Ham.	60, 54
Carnuta Plum.	680	Galeattia Nees ab Es.	311, 728
Carythacanthus N. ab Es.	61	Geissomeria Lindl.	286
Crabbea Harv.	237	Gendarussa Rumph.	410, 730
Crabbea Harr.	162	GENDARUSSEÆ N. ab E.	303
Crassandra Salisb.	280, 727	Geunisia Blum.	640
Cryptocalyx Benth.	572	Ghinia Schreb.	528
Cryptophragmum N. ab E.	94, 722	Glandularia Schauer.	550
Cyclanema Hochst.	785	Glandularia Gmel.	535, 550
Cymburus Salisb.	561	Glackeria Nees ab Es.	728
Cyrtanthera N. ab E.	328, 729	Glossacarya Wall.	625
Dasyntera Endl.	728	Glossochilus N. ab E.	83
Dicliptera Juss.	473, 731	Gnephina L.	678
DICLIPTERÆ N. ab E.	463, 731	Goldfussia N. ab E.	171
Diliaria Juss.	268	Goniostachyum Schauer.	574
Dipteracanthus N. ab E.	115, 723	Graptaphyllum N. ab E.	327
Dipterocalyx Schauer.	578	Gunira Schauer.	630
Dipterocalyx Cham.	572	Gunira Rumph.	630
Dipyrena Hook.	535	Gunira Hassk.	630
Dischisma	702 adnat.	Gymnacanthus N. ab E.	219
Disoan Alph. DC.	703	Gymnaudra	702
Dizygandra Meish.	115	Gymnostachyun N. ab E.	93
Donatia Læfl.	699		
Donatia Schauer.	699	Habracanthus N. ab E.	312
Drejera N. ab E.	334	Halodendran Pet. Th.	698
Duglassia Houst.	656	Halplanthera Hochst.	308
Duranta Linn.	615	Halplanthus N. ab E.	512
DURANTEÆ Schauer.	608	Harpachilus N. ab E.	333, 730
Duvernia E. Mey.	322	Harrachia Jacq.	280
Dyschariste N. ab E.	106	Hastatingia Sm.	696
Eberlea Ridd.	85	Hebenstreitia	720
Ebermayera N. ab E.	70, 721	Heinzelia N. ab E.	314, 729
Echinacanthus N. ab E.	168	Hemiadelphis N. ab E.	80
ECHMATICANTHEÆ N. ab E.	79	Hemichoriste N. ab E.	367
Ellisia P. Br.	615	Hemigraphis Nees ab Es.	722
Elytraria Vahl.	62	Hemigymnia Griff.	697
Eudopogon N. ab E.	103, 723	Hemisandra Scheidw.	295
Engelia Karst.	721	Hemitome N. ab E.	295
Epifagus Nutt.	3	Henrya N. ab E.	491
Epiphegus Nutt.	3	Herpetacanthus N. ab E.	365, 730
Epirixanthes Blum.	44	Hesperanthemum Endl.	460
Epirixanthe Blum.	44	Hexacentris N. ab E.	60
Epirhizanthus Endl.	44	Hilsenbergia Tausch.	524
Episanthera Hochst.	208	Holmskioldia Reit.	696
ERANTHEMÆ N. ab E.	425	Halachiloma Hochst.	630
		Holigraphis Nees ab E.	728
		Holtzendorffia Kl. et Karst.	727

<i>Homotropium N. ab E.</i>	113, 723	<i>Nelsonia R. Br.</i>	65, 721
<i>Hosta Jacq.</i>	680	<i>NELSONIEÆ N. ab E.</i>	62
<i>Hostana Pers.</i>	680	<i>Neowedia Schrad.</i>	115
<i>Hoverdenia N. ab E.</i>	330	<i>Nephandra Kothen.</i>	682
<i>Hygrophila R. Br.</i>	85, 722	<i>Nesogenes Alph. DC.</i>	703
<i>HYGROPHILEÆ N. ab E.</i>	79	<i>Neuræanthus N. ab E.</i>	248
<i>Hymenopyramis Wall.</i>	626	<i>Nomaphila Blum.</i>	84, 722
<i>Hypoëstes R. Br.</i>	501	<i>Nuxia Lann.</i>	524
<i>Isacanthus N. ab E.</i>	278	<i>Obolaria Linn.</i>	44, 720
<i>Ischnia DC.</i>	528	<i>Odontonema N. ab E.</i>	323
 		<i>Opata Rheed.</i>	699
<i>Jacobinia Moric.</i>	331, 729	<i>Oftia Adans.</i>	525
<i>Jatus Rumph.</i>	629	<i>Omphalococca Willd.</i>	647
<i>Johnsonia Catesb.</i>	640	<i>Oncoma Spreng.</i>	676
<i>Justicia N. ab E.</i>	426, 731	<i>Onychacanthus N. ab E.</i>	217
 		<i>Ophthalmacanthus N. ab E.</i>	219
<i>Kämpfera Houst.</i>	528	<i>OROBANCHACEÆ Lindl.</i>	1, 717
 		<i>Orobanche Linn.</i>	15, 717
<i>Lagochilium N. ab E.</i>	290, 728	<i>OROBANCHEÆ L. C. Rich.</i>	1
<i>Lantana Linn.</i>	594	<i>OROBANCHINÆ Dumort.</i>	1
<i>LANTANEÆ Schauer.</i>	594	<i>OROBANCHINÆ Link.</i>	1
<i>Lasiocladus Bojer.</i>	510	<i>Orthotactus N. ab E.</i>	357
<i>Lathraea Linn.</i>	40	<i>Ospreoleon Walls.</i>	15
<i>Lepidagathis Willd.</i>	249	<i>Ovieda Linn.</i>	658
<i>Leptacanthus N. ab E.</i>	169	<i>Oxera Labell.</i>	676
<i>Leptantium Raf.</i>	3	 	
<i>Leptocarpus Willd.</i>	528	<i>Pachystachys N. ab E.</i>	319, 729
<i>Leptostachya N. ab E.</i>	376, 730	<i>Patagonula Linn.</i>	524
<i>Leptostachya Mitch.</i>	520	<i>Paulo-Wilhelminia Hochst.</i>	208
<i>Leucorhaphis N. ab E.</i>	97, 722	<i>Pentacælium Sieb. Zucc.</i>	705
<i>Limia Vand.</i>	687	<i>Pentstemonacanthus N. ab E.</i>	464
<i>Lippia Linn.</i>	572	<i>Perama Aubl.</i>	524
<i>Lophostachys Poli.</i>	244	<i>Peristrophe N. ab E.</i>	492
<i>Loxanthus N. ab E.</i>	322	<i>Pronema Jacq.</i>	626
 		<i>Petalidium N. ab E.</i>	114
<i>Mackenziea N. ab E.</i>	308	<i>Petitia Jacq.</i>	639
<i>Macranoplion Reut.</i>	42	<i>Petricanthus N. ab E.</i>	97
<i>Macrostegia N. ab E.</i>	218	<i>Petre Houst.</i>	616
<i>Mallophora Endl.</i>	530	<i>PETREEÆ Schauer.</i>	616
<i>Manabea Aubl.</i>	647	<i>Phacellanthus Sieb. et Zucc.</i>	720
<i>Martynia Monn.</i>	177	<i>Phaylopsis Willd.</i>	261
<i>Mastacanthus Endl.</i>	624	<i>Phelipaea Tournef.</i>	16, 717
<i>Mattuschkia Schreb.</i>	524	<i>Phlebophyllum N. ab E.</i>	102
<i>Melasanthus Pohl.</i>	561	<i>Philoganthus N. ab E.</i>	320, 729
<i>Mendonia Vell.</i>	50, 721	<i>Pholidia Brown.</i>	713
<i>Mendoza R. et P.</i>	50	<i>Phryma Linn.</i>	520
<i>MENDOZIEÆ Meiss.</i>	49	<i>PHRYMACEÆ Schauer.</i>	520
<i>Meyenia N. ab E.</i>	60	<i>Physichilus N. ab E.</i>	81
<i>Michelia Amm.</i>	687	<i>Pityrodia R. Br.</i>	621
<i>Microdon.</i>	702 adnot.	<i>Plagiacanthus N. ab E.</i>	335
<i>Micranthus Wendl.</i>	261	<i>Platonia Raf.</i>	572
<i>Monechma Hochst.</i>	411, 731	<i>Platinum Juss.</i>	696
<i>MONOCHILLEÆ Schauer.</i>	526	<i>Platychila N. ab E.</i>	298
<i>Monochilus F. et M.</i>	526	<i>Platystegia N. ab E.</i>	289
<i>Monothecium Hochst.</i>	310	<i>Pleurostigma Hochst.</i>	557
<i>Mylanche Wallr.</i>	3	<i>Pæciolocnemis Mart.</i>	221, 286
<i>MYOPORACEÆ Lindl.</i>	701	<i>Pappigia Berter.</i>	609
<i>MYOPORINÆ Brown.</i>	701	<i>Pogonia Andr.</i>	706
<i>Myoporum Banks et St.</i>	706	<i>Pogonospermum Hochst.</i>	383
<i>Mutabilindum Vail.</i>	594	<i>Polycaelium Alph. DC.</i>	705
		<i>Polychyma Hochst.</i>	82
		<i>POLYGALÆ, b. Reich.</i>	701

Polythrix N. ab E.	285, 727	Spironema Hochst.	675
Porphyra Lour.	640	Spirostigma N. ab E.	308
Premna Linn.	630	Squamaria Hall.	40
Premnos Schauer.	633	Stachyacanthus N. ab E.	168
Premnus Hassk.	633	Stachytarpha Vahl.	561
Priornitis N. ab E.	237	Stauropogone Wall.	70
Priva Adams.	532	Stemonanthes N. ab E.	205, 725
Pseudopholidia Alph. DC.	704	Stenandrium N. ab E.	281, 727
Psilogyne DC.	682	Stenochile N. ab E.	295
PYRENACEÆ Vent.	522	Stenophilus Brown.	713
Pyrostoma Mey.	693	Stenosiphonium N. ab E.	105
Pyrostoma Schauer.	693	Stenostephanus N. ab E.	310
Quoya Gaudich.	697	Stephanophyllum Pohl.	201
Ramùsia N. ab E.	309	Stiftia Pohl.	70
Ramusia E. Mey.	163	Streptium Roxb.	532
Raniglossa R. et Pav.	609	Strobilanthes Blum.	177, 724
Rhagocarpium Schauer.	557	Strobilarachis Link.	294, 728
Raphidospora N. ab E.	499	Symplochrum Roxb.	621
Rhinacanthus N. ab E.	442	SYMPHOREMEÆ Meissn.	620
Rhodolippia Schauer.	591	Synandra Schard.	295
Rhytidglossa N. ab E.	335, 730	Taligalea Aubl.	677
Riedelio Cham.	572	Tamona Aubl.	528
Roscoea Roxb.	623	Tarphostachys Schauer.	561
Rostellaria N. ab E.	368	Tectona Linn.	629
Rostellularia Reichb.	368	Teliostachya N. ab E.	262, 727
Ruellia Linn.	143, 725	Tetramerium N. ab E.	467
RUELLEÆ N. ab E.	99	Thexa Rheede.	629
Rungia N. ab E.	469	Thunbergia Linn.	54
Russeggera Endl.	249	THUNBERGIEÆ N. ab E.	49, 720
Ruttya Harv.	309	Thyrsacanthus N. ab E.	323, 729
Salpixantha Hook.	289	Tortula Roxb.	532
Sarcocilpia Schauer.	595	Triæanthus N. ab E.	169
Sarotheca N. ab E.	382, 730	Trichanthera Kunth.	218
Sautiera Decne.	98	Trionychion Wallr.	4
Secura Forsk.	698	Tyloglossa N. ab E.	389
Schaueria N. ab E.	314, 729	Tyloglossa Hochst.	384
Schultzia Rafin.	44	Upata Adams.	699
Schultzia N. ab E.	365	Upata Schauer.	699
Schwabea Endl.	383	Uvarowia Bunge.	535, 550
Sclerocalyx N. ab E.	219	Voldia Blum.	658
Sclerochiton Harr.	279	Verbena Linn.	535
Scleroon Benth.	697	Verbenaca Schauer.	536
Scorodoxylum N. ab E.	209	VERBENACEÆ Juss.	522, 703
Sebastianoschaueria N. ab E.	313	VERBENEÆ Reichenb.	522
SELAGINEÆ.	702 adnot.	VERBENEÆ Schauer.	525, 529
Selagia	702 adnot.	Vitex-Linn.	682
Sericographis N. ab E.	360, 730	Viticastrum Presl.	622
Sericospora N. ab E.	444	VITICEÆ Schauer.	627
Shuttleworthia Meissn.	535, 550	VITICEÆ Schauer.	620
Simonia N. ab E.	412, 731	VITICES Juss.	522
Siphonacanthus N. ab E.	199, 725	Volkameria Linn.	656
Siphonanthus Schauer.	670	Volkmannia Jacq.	658
Siphonanthus Linn.	658	Wallrothia Roth.	682
Spartothamnus All. Cunn.	705	Whitefieldia Hook.	220
Sphènodesma Jack.	622	Wilsonia Hook.	535
Sphondylococcum Mitch.	640	Zapania Schauer.	580
Spielmannia Med.	525	Zapania Scop.	572
SPIELMANNIEÆ Schauer.	525		











